



FOR THE PEOPLE  
FOR EDUCATION  
FOR SCIENCE

LIBRARY  
OF  
THE AMERICAN MUSEUM  
OF  
NATURAL HISTORY











506. 13 I  
16  
S

f

i

S

v o n

Q

k

e

n.

S a h r g a n g 1 8 3 8.

Heft I—XII.

(Mit 6 Tafeln.)



Leipzig,

bei Brockhaus.

—  
1838.

RECEIVED  
JAN 10 1898  
LIBRARY

8

1

1

2

8

1

1

2

h k c n

Continental Building

*1898*

3 0 1 8 0 0 1 8 3 8

1898

1898

1898

1898



1898

1898

1898



# U f i S.

Encyclopädische Zeitschrift,

vorzüglich

für Naturgeschichte, vergleichende Anatomie und Physiologie,

von

D f e n.

1 8 3 8.

H e f t I.

(Tafel I.)

Der Preis von 12 Heften ist 8 Thlr. sächs. oder 14 fl. 24 Kr. rheinisch, und die Zahlung ist ungetheilt zur Leipziger Ostermesse des laufenden Jahres zu leisten.

Man wendet sich an die Buchhandlung Brockhaus zu Leipzig, wohin auch die Beträge zu schicken sind.

Unfrankirte Bücher mit der Post werden zurückgewiesen.

Einrückgebühren in den Text oder Umschlag die Zeile sechs Pfennige.

Von Anticritiken (gegen Jsis-Recensionen) wird eine Quartseite unentgeltlich aufgenommen.

(11/11 25)

Brockhaus

Leipzig

Est

# A n z e i g e n.

## Verzeichniß

abgebbarer Vögelbälge in schön conservierten Exemplaren  
von Dr. Walzl in Passau.

<i>Falco</i>	Fl. Kr.	<i>Glareola</i>	Fl. Kr.
pygargus . . . . .	3 —	torquata . . . . .	3 —
palumbarius . . . . .	2 —		
nisus . . . . .	1 10	<i>Merops</i>	
subluteo . . . . .	1 30	apiaster . . . . .	1 12
<i>Strix</i>		<i>Picus</i>	
brachyotus . . . . .	1 30	viridis . . . . .	— 36
<i>Lanius</i>		<i>Motacilla</i>	
meridionalis . . . . .	1 30	citrinella . . . . .	— 20
collurio . . . . .	— 48		
<i>Bombycilla</i>		<i>Ardea</i>	
garrula . . . . .	1 —	minuta . . . . .	1 30
<i>Saxicola</i>		garzetta . . . . .	7 —
rubicola . . . . .	— 30	egretta . . . . .	9 —
oenanthe . . . . .	— 24	ralloides . . . . .	3 30
rubetra . . . . .	1 30	nycticorax . . . . .	3 —
		purpurea . . . . .	3 30
<i>Fringilla</i>		<i>Ciconia</i>	
montifringilla . . . . .	1 —	nigra . . . . .	5 —
paradisea . . . . .	4 30		
phalerata . . . . .	3 —	<i>Platalea</i>	
<i>Corvus</i>		leucorodia . . . . .	5 —
nucifraga . . . . .	1 30		
<i>Cinclus</i>		<i>Colymbus</i>	
aquaticus . . . . .	— 40	arcticus . . . . .	3 —
<i>Cuculus</i>		<i>Anas</i>	
canorus var. moldavicus 1	12	querquedula . . . . .	1 10
		clypeata . . . . .	1 —

<i>Rallus</i>	Fl. Kr.	<i>onocrotalus</i>	Fl. Kr.
porzana . . . . .	1 10		11 —
<i>Cygnus</i>		<i>Quatrupeden</i>	
olor . . . . .	7 —	Arctomys citillus . . . . .	3 —
		Cavia aguti . . . . .	4 —
<i>Pelecanus</i>		Faliscatus ferus . . . . .	4 —

Berichtigung oder Bemerkung zu der Broschüre von Gisl, betitelt:

Ueber eine neue Familie, Sippe und Gattung aus der Ordnung der Käfer. München 1836. 6. J. A. Finsterlin. Ein halber Bogen mit einem schwarzen Kupfer. Preis 24 Kr.

Der hier bekannt gemachte Käfer, den Gisl Mesoclastus paradoxus nennt, ist schon früher von Desmarest in Guérins Magazin de Zoologie, 2me année bekannt gemacht und Hypocephalus armatus genannt worden. Er steht selbst in die Nähe von Negrophorus, möchte aber so leicht nicht einzureihen seyn. Er kommt im Innern von Brasilien vor; ich sah ihn bey Dr. Perty.

## Sömmeringischer Preis.

Als die Senkenbergische naturforschende Gesellschaft eine allgemeine Aufforderung zur würdigen Feier des am 7. April 1828 eingetretenen Doctorjubiläums Samuel Thomas v. Sömmerings ergeben ließ, fand ihr Vorhaben so eifrige Theilnahme unter den Aerzten und Naturforschern Deutschlands, daß nach Bestreitung der Ausgaben für die Widmung einer eigenen Medaille, Druckkosten zc. noch eine Summe zur Stiftung eines



gleich anfangs in Aussicht genommenen Sommerjüngischen Preises vorhanden war, welcher nunmehr nach Hinzufügung der Zinsen von einigen Jahren auf einem unter Verwaltung der Gesellschaft stehenden besten Kapital von 2000 fl. des 24 fl. Fußes beruht. Den getroffenen Bestimmungen gemäß soll alle 4 Jahre am 7. April aus den Zinsen dieses Kapitals der Sommerjüngische Preis im Betrage von 300 fl. des 24 fl. Fußes demjenigen Deutschen zuerkannt werden, welcher die Physiologie im weitesten Sinne des Wortes als die vom vereinigten Sommerjüng vorzugsweise gepflegte Wissenschaft am bedeutendsten gefördert hat, wobei die Arbeiten der letzten vier Jahre besonders berücksichtigt werden sollen. Die Zuerkennung geschieht jedes Mal durch einen auf möglichst umsichtiger Erwägung aller zu ihrer Kenntniß gelangten Arbeiten gegründeten Beschluß der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft.

Zur erstenmaligen Zuerkennung dieses Preises war die Gesellschaft am 7. April 1837 versammelt, und indem sie die in voriger Sitzung bereits gepflogenen Verhandlungen hierüber wieder aufnahm, wurde beschlossen, daß, so Vorzügliches auch von andern Deutschen während der letzten vier Jahre in der Physiologie im weitesten Sinne des Wortes geleistet worden, dennoch die für die Wissenschaft neuesten, wichtigsten und schwierigsten Beobachtungen dem Herrn Professor Dr. Ehrenberg in Berlin verdankt wurden, demselben daher der Sommerjüngische Preis zuerkennen sey, welchem zugleich eine bey Sommerjüngs Jubiläum geprägte Medaille in Silber, auf deren Rand die Worte „Praemium Soemmerjüngianum die VII. Aprilis MDCCCXXXVII. Ehrenbergio Berolinensi societas Senckenbergiana“ eingeprägt waren, nebst den auf die Stiftung des Preises bezüglichen Druckschriften beigesetzt wurden. In der nämlichen Sitzung ernannte auch die Gesellschaft den Herrn Professor Dr. Ehrenberg zu ihrem correspondierenden Mitgliede.

Direction der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M.

## A n z e i g e.

Um die Verbreitung seltener fossiler Pflanzen zu befördern, habe ich den akademischen Zeichner, Herrn Weiss, veranlaßt, Gypsabgüsse von denselben anzufertigen, in so weit es ihre Beschaffenheit gestattet. Da die Ausführung ganz meinen Wünschen entspricht, zögere ich nicht, dieselben zu veröffentlichen, wobei ich jedoch bemerke, daß nur auf an mich direct adressirte Besellungen dergleichen besorgt, und immer die möglichst billigen Preise gestellt werden, da ich dabei keinen persönlichen Vortheil suche, noch weniger etwa gar einen Handelsartikel daraus zu machen beabsichtige.

Von folgenden, in diesem Werke beschriebenen und abgebildeten, oder doch erwähnten Petrefacten, können Gypsabgüsse angefertigt werden:

*Calopteris punctata* G.  
*Calopteris Singeri* G.  
*Gleichenites neuropteroides* G.

(Von dieser Art kann man auch nach vorliegenden Originalen Exemplare von 2 Fuß Länge und 1 Fuß Breite erhalten.)

*Karstenia omphalostigma* G.  
*Karstenia mamillaris* G.  
*Lepidodendron aculeatum* Sternb.  
*Lepidodendron Charpentieri* G.  
*Lepidodendron crenatum* St.  
*Lepidodendron obovatum* —  
*Lepidodendron Ottonis* G.  
*Lepidodendron Mielecki* G.  
*Lepidodendron Steinbeckii* G.  
*Lepidodendron undulatum* St.  
*Lepidodendron Veltheimianum* St.  
*Lepidodendron Volkmannianum* St.  
*Lepidostrobus laticinus* St.  
*Sternbergia transversa* Artis.  
*Stigmaria ficoides* Brong.

Der Preis jedes einzelnen Stückes richtet sich freylich nach der Größe und der zum naturgemäßen Coloriren erforderlichen Arbeit, doch wird er bey den kleineren, mit Ausnahme der *Gleichenites neuropteroides* G., nicht mehr als zwey Drittel bis 1 Thaler betragen.

Breslau, den 29. Juli 1836.

S. K. Göppert.

Unter der Presse ist:

**Insecta Lapponica**

descripta a

Joanne Wilhelmo Zetterstedt,

ein Band von ohngefähr 70 Bogen in groß Fol., in gespaltenen Columnen aus compresse Petit- und Rompareil-Schrift. Ich bin bereits im Besitze des vollständigen Manuscripts und der Druck soll möglichst beschleunigt werden; auch werde ich zur Bequemlichkeit der Käufer das Werk in Lieferungen von 12 Bogen (à 5 ggl.) erscheinen lassen.

Leipzig, im Juny 1837.

Leopold Voss.

# I n n h a l t.

## A. Allgemeines.

— 1 Buquoy, Planmäßigkeit im Weltganzen.

## B. Zoologie.

- 4 Schwedische Abhandlungen 1835.
- 5 Dahlbom, über die Motte der Traubentirpchen.
- 9 Sundewall ornithologisches System; Ypsolophus 20.
- 15 Nilsson, Plesiosaurus in Schweden.
- 22 Zoological Transactions II.
- — Sykes, über die Wachteln und Hemipoden Indiens.
- 28 Templeton, wirbellose Thiere von Noris: Actinia, Xenia, Anisomelus, Piratesa.
- 31 Bennett, Pteropus whitei.
- 33 Lh. Bell, Crustaceen von Südamerika.
- 37 Darrell, über Tenthredo centifolia in Rüben.
- 39 Rüppell, Histiophorus immaculatus.
- 40 The Edinburgh new Philosophical Journal. Vol. XVI.
- — Knox, Zerlegung des Morquats.
- — Goldstream, Bau und Lebensart von Limnoria terebrans. Tafel I.
- 45 Duetolet, Gewicht der Menschen.
- — Don, Cascarillarinde.
- 46 Traill, Milch der Wale.
- 47 Harlan, versteinerte Knochen in America.
- 48 Agassiz über die Lachse.
- — Dalzell, Fortpflanzung schottischer Zoophyten. Taf. I.
- 54 Jardine, Salmoniden in Southerlandshire.
- 61 Thompson, über Leviathan und Behemoth.
- 64 Wilson, Käfer in Southerland.
- — J. Davy, Temperatur der Thunnische.
- 65 Patterson, über eine Beroë an der Nordküste von Irland. Tafel 1.

- 67 Arthur, über die Thränen der Hirsche und Antilopen.
- 68 Selby, Säugethiere und Vögel in Southerland.
- 73 Thompson, über Peniacrinus et Comatula. Tafel I.

## C. Anatomie.

- 75 Webers Schwertzeuge.
- 77 Cuviers vergl. Anatomie.

## D. Medicin.

- — British Annales of Medicin.
- 78 Meixners Hippocrates.
- — Trattenbachers Verdauungsproceß.
- 79 Röschs Heilwissenschaft.
- — Riedes Arzneimittel.
- 80 Mauthners Heilkräfte des Wassers.

## U m f f a g.

Verzeichniß abgegebener Bogenblätter.  
 Berichtigung oder Bemerkung zu der Broschüre von Giff:  
 „Ueber eine neue Familie, Sippe und Gattung aus der Ordnung der Käfer.“  
 Edmerringerischer Preis.  
 Anzeige, fossiler Pflanzen betr.  
 Insecta Lapponica. Ankünd. von Leopold Voss in Leipzig.

## K u p f e r t a f e l I.

- enthält: Limnoria terebrans . . . S. 40.
- Sertularia dichotoma . . . — 52.
- Hydra tuba . . . . . — 53.
- Beroë . . . . . — 67.
- Pentacrinus et Comatula — 73.

1838.

S e f t 1.

## C r i t i s c h e B e m e r k u n g e n

hinsichtlich der Behauptung von einer am Weltganzen bestehenden Planmäßigkeit.

Vom Grafen Georg von Dugouy.

Wenn ich Planmäßigkeit in der Natur wahrzunehmen glaube, so fragt es sich immer noch, ob solche Planmäßigkeit in der Natur selbst liege, oder ob nicht ich — jene vermeintliche Planmäßigkeit, nach den imperativen Formen meiner Anschauung, in das von mir construierte Naturbild lege. Sehr oft wird meine beim ersten Anblick entstandene Vermuthung für die an einer Erscheinung bestehende Planmäßigkeit verschwinden, wenn ich die Erscheinung tiefer verfolge. Betrachte ich z. B. an der Blüthe die Bewegung der Staubfäden, wodurch die Antheren dem Griffel sich nähern und wodurch dann gewöhnlich eine Befruchtung erfolgt; so wäre ich geneigt, hier einen planmäßigen Befruchtungsact zu ahnen und eben aus solcher geahnter Planmäßigkeit vorhinein zu vermuthen, daß oben erwähnte Bewegung in jenem Falle wohl nicht mehr statt finden möchte, wo die Antheren und Griffel von der Blüthe abgelöst würden. Das Experiment überzeugt mich aber vom Gegentheil, indem, nach Wegnahme der Antheren und Griffel, die Bewegung der rückgebliebenen Staubfäden noch ganz so erfolgt wie zuvor.

Zu ähnlichen Betrachtungen führt die Erfahrung, daß häufig noch Geschlechtstrieb nach Ausrottung der Hoden fortbesteht, z. B. bey Dachsen, Schöpfen ufw. Auch beim Menschen sind vollkommen gebildete Genitalien vorhanden, und findet zugleich reger Begattungstrieb statt, bey doch beynahe gänzlich erloschener Zeugungsfähigkeit. Treibt endlich nicht manche Pflanze häufige Blüten, die einer Befruchtung durchaus unfähig sind, wie z. B. so manche Zweigelgewächse? ufw.

Die Teleologen deuten die Beobachtung, daß in jenen Pflanz- und Thiergattungen verhältnißmäßig mehr zu Grunde

gehe, wo eine größere Fruchtbarkeit besteht, gewöhnlich dahin, als sorge ein über der Natur waltendes Wesen dafür, daß die Gattungen unter einander sich stets in einem gewissen Normalstande erhalten möchten. Allein es bedarf hier, zu einer vernunftgemäßen Deutung des Phänomens ganz und gar nicht der Hypothese von einem Zügellenker am Gespanne des Weltwagens. Die unbefangene Beobachtung der Natur, ihrem Leben und Walten nach, führt uns ungezwungen zu der Ueberzeugung von einem allgemein herrschenden Umwandlungs- triebe, welcher sich allemal zugleich als Bildungs- und als Zerstörungstrieb kund gibt; es ist daher sehr natürlich, daß in allen jenen Fällen, wo der Umwandlungs- trieb kräftiger hervortritt, daß, sage ich, nicht bloß der Bildungsact, sondern in eben dem Verhältnisse auch der Zerstörungsact zugleich — entschiedener sich äußere.

Der in der gesammten Natur waltende Umwandlungs- trieb ist, wenn wir rein der Erfahrung gemäß sprechen sollen nicht so eigentlich unmittelbar auf das Umwandeln selbst, nemlich auf das Zerstören oder Bilden selbst, hin gerichtet, als vielmehr auf solche Activitäts-Außerungen, wodurch entweder ein Zerstören oder ein Bilden vor sich gehen möchte, wenn alle jenes Zerstören oder Bilden begünstigenden Umstände vorhanden wären. Die Richtigkeit dieser Behauptung erhellt wohl nirgend so deutlich als aus der ächt naturhistorischen Würdigung des Geschlechtstriebes, der ja am Ende weiter nichts ist, als eine bestimmte Modification des allgemein herrschenden Bildungstriebes bezogen auf die Gattung. Der Drang nach dem Begattungs- acte zielt nemlich unmittelbar nur auf jenen Act selbst

hin, als *Actio actionis causa*, d. h. es faßt die jedesmalige die Einbildungskraft vollständigstige Vorstellung nicht im geringsten den Begriff eines aus jenem Acte entstehen sol-  
 tenden neuen Individuums in sich, sondern ganz und gar die Erwartung einer höchst wonniglichen Aufreizung der Sinnlichkeit.

Bedenkt man die ungeheure Menge des Blüthenpollens, die von Wind und Insecten vertragen, nicht zu der jenem Pollen entsprechenden Narbe gelangt, oder die von dieser durch Regen wieder abgewaschen wird, oder die, selbst bey statt findender Befruchtung unfähige Pflanzever (fälschlich Saamen genannt) gibt; bedenkt man weiters die Anzahl spermatischer Ergießungen, die nicht befruchten, sondern den Thier-Individuen bloßen Sinnenreiz gewähren, als z. B. im Begattungsacte, wo die Befruchtung misslingt, oder wo bereits schon eine Schwängerung vorangegangen ist, oder wo das Alter zu einer befruchtenden Zeugung unfähig macht; ferner die Saamenergießungen durch Traumpollutionen, Onanie, Päderastie, Sobornie usw.; bedenkt man überdieß die Menge von Frühgeburten und durch monströse Größe der Frucht oder Enge des Bedens vereitelten Geburten usw.; so erscheint der Emanationsact von Pollen und Sperma als *Actio actionis causal*, als autonomes Ergö-  
 gungs-Moment am Individuum, und es läßt sich hinsichtlich der Fortpflanzung eigentlich nur soviel sagen, daß der in der Natur durchgehends wal-  
 tende, um die Individuen wenig beküm-  
 merte, bloß die Species berücksichtigende Bildungstrieb hie und da ein Pollenstäubchen oder Spermatröpfchen aus der Menge des in muthwilliger Austobenslust Vergeudeten, zur Erhaltung der Species verwendet.

Wenn wir uns von dem Fehlschlusse: *post hoc ergo propter hoc* frey halten, und wenn wir die Natur an deren unbefangenen Anschauung deuten, so erscheint uns jede einzeln für sich betrachtete Thätigkeit als *actio actionis causa*, jedoch so, daß aus der Concurrentz mehrerer solcher autonomer Actio-  
 nen bestimmte Resultate, aber immer nur hie und da, sich ergeben; daher diese Resultate nicht etwa, nach der falschen Ansicht der Teleologen, als Zweck und jene Actionen als Mittel betrachtet werden dürfen. So z. B. ergiebt sich der Regen über Sandwüsten, kahle Felsen, Landseen, über das Weltmeer, aber hie und da auch über Pflanzengesilde, und hier nur bewirkt der Regen erhöhte Vegetation. So umwehet atmosphärische Luft den ganzen Erdball, aber hie und da ge-  
 langt sie auch zur Wechselwirkung mit den thierischen Tracheen oder Kiemen, oder Lungen, und hier nur bewirkt die atmosphä-  
 rische Luft Cast-Drypation oder Arterisation des venösen Blutes. So sendet das Sonnensphäroid ringum nach dem leeren Raum hin seine Strahlen, die aber hie und da auch auf plan-  
 etarische und satellitische Oberflächen stoßen, und hier nur ent-  
 steht ein Leuchten und Erwärmen. So entströmet den männlichen Blüthen eine Menge Pollen und erfolgen an der Thier-  
 welt (den Menschen mit eingerechnet) unfähige Acte der Ge-  
 schlechtslust: aber nur hie und da gelangt der Pollen zu der ihm entsprechenden Narbe, nur hier und da wird am Thier-  
 weibchen die innere Fläche des Ovariums befruchtend afficirt, und nur in solchen einzelnen Fällen erfolgt Fortpflanzung an der Species.

\* Manche Blüthen sind sogar aller Befruchtung unfähig, z.

So durchkreuzen tausenderley Ideen sich vor der Selbst-  
 bewußtseynsphase des Menschen; aber nur hie und da gestaltet  
 solcher Konflikt sich zu einem geschlossenen Systeme usw.

Was die Harmonie betrifft zwischen der Organen-Ent-  
 wicklung am sich entfaltenden Fötus und der künftigen Le-  
 bensweise am vollendeten Pflanz- oder Thier-Organismus, so  
 bedeutet dieß nicht so eigentlich auf ein planmäßiges Regiert-  
 werden des Weltganzen durch ein demselben vorkommendes ver-  
 nünftiges Wesen (eine unerweisliche Hypothese), als vielmehr  
 (ganz hypothetisch) dahin, daß es ewig nothwendige  
 Norm am Bildungstriebe sen, gerade so — zu bilden,  
 daß Harmonie — bestie zwischen dem ursprünglich plas-  
 tischen Setzen — und dem nachfolgenden dynamis-  
 schen selbstbewußthafte spontanen Verhalten — des  
 Gesetzten, zwischen dem Erscheinen von *potentia* und *qua-*  
*actio*. Es müssen ja, an jeglichem Organismus, dessen Wer-  
 den — und dessen als Geordnetes sich Fortbehalten —  
 einem und demselben Sinne des Lebens, einer und  
 derselben Lebensnorm entsprechen. Jedem Gebilde dient  
 eine und dieselbe Natur als Geburts-, Gedeihens-  
 und Sterbe-Stätte; jedes Gebilde muß also in jenem  
 dreyfachen Erscheinen Homogenität äußern. Der menschliche  
 Fötus entwickelt sich nach menschlichem Typus; der vollendete  
 Mensch lebt nach menschlichem Typus; der sterbende Mensch  
 stirbt nach menschlichem Typus.

## Kongl. Vetenskaps-Academiens Handlingar

für 1835. Stockholm. 1836. 8.

Dieser Band enthält 13 Abhandlungen:

- 1) S. 1—29. *Eradne nordmanni*, ein bisher un-  
 bekanntes Entomofracon, beschrieben von S.  
 L. Löwen. Taf. I. II.

Das hier genau beschriebene und abgebildete Thierchen wur-  
 de vom Verf. im Meerwasser des Sundes entdeckt, und wird fol-  
 gendermaßen characterisirt:

*Tribus. Cladocera Latr.*

B. bey vielen Zwiebelgewächsen, und erscheinen teleologisch  
 gewürdigt als unnützes Bewerk; allein unbefangen ge-  
 würdigt gehören sie zur Architectonik des Weltganzen.  
 Eben so dienen dem Strauß die Flügel nicht zum Flie-  
 gen, sondern completieren bloß die Architectur des Vo-  
 gelkörpers.

- \* So z. B. am Specht. Hier entwickelt sich der Schna-  
 bel zu einem Spitzhammer, die Zunge zu einer hervorzu-  
 schneidenden Saapune, der Schwanz zu an Wämen anleg-  
 baren Greifedern, der Fuß zum Kletterfüße usw., wo-  
 durch das Auffuchen der in Baumrinne befindlichen In-  
 secten möglich wird; zugleich besteht aber auch die  
 Fähigkeit und der Trieb am Spechte, sich eben von  
 solchen Insecten zu ernähren.

A. *Epimera maxima*, in formam valvae utrinque effusa; tergo angustissimo, pedibus 10, occulta.

Gen. *Daphnia*, Lynceus etc.

B. *Epimera angusta*; tergo lato, domato, pedibus 4 liberis.

Gen. 1. *Polyphemus*.

Gen. 2. *Evadne Lovén*: Thorax capiti contiguus, palpi mandibulares (Antennae Latr. Remi Straufs.) bifidi, ramo antico 3 —, postico 4 — articulo.

Species: *Ev. nordmanni* L. v.

*Ev. thorace in gibbum maximum efflato.*

Magn. ♂ 0,38 — 0,44 Millim.

♀ 0,45 — 0,52 —

Folgt eine umständliche Beschreibung auch mit vergleichend-zoologischen Bemerkungen.

2) S. 30 — 42. Bemerkungen über *Tinea padella* Linn. von A. G. Dahlbom. Taf. III.

Sie lebt, wie bekannt, in allen ihren Stadien in einer Art von Staat aus dem Nehlbeer- und dem Traubenkirschenbaum, dem Schlehdorn usw.; ich erinnere mich aber nicht, sie je in einer so großen Menge gesehen zu haben, wie im Sommer 1833 und 1834 in den Gärten von Wadstena (in Ostgothland), wo ihre Larven dem Laube der Apfelbäume bedeutenden Schaden zufügten.

Die ersten Larven wurden im May 1833. beobachtet, als das Apfellaub am meisten ausschlug. Sie waren von 2 — 4 1/2" lang und ungefähr 1/2" breit. Der Körper war entweder aschfarbig, oder graugelb mit 2 Reihen schwarzer Flecken auf dem Rücken; der Kopf und der erste Körpergelenk nebst den Brustfüßen schwarz. Füße in allem 16, 3 Paar unter der Brust, 4 Paar unter dem Bauch und 1 Paar unter dem Schwanz. Die Larven machten ihre Nester zwischen den Blättern, welche sie theils zusammenklebten, theils mit einem feinen Seidengepinnste, gleichend einem Spinnweben, umgaben. Diese Nester waren von der Größe eines Taubens-, Hühners- und Gänseeges, je nachdem sie in denselben eingeschlossene Gesellschaften zahlreich war. Solche Gesellschaften konnten nemlich aus 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, ja 100 und mehr Individuen bestehen.

Da der Umfang des Nestes so unbedeutend und doch hinreichend groß ist, um eine bedeutende Zahl von Larven zu fassen; so muß natürlich die innere Construction desselben so beschaffen seyn, daß ein Individuum das andere in seinen Verrichtungen nicht hindert. Jede Larve spinnt sich deswegen, nach der Dicke ihres Körpers, einen cylindrischen Canal, welcher an beiden Enden offen ist und mit der Blattfläche horizontal geht; an diesen Canal heftet eine zweite Larve ihre Seidenfäden, um ihre kleine Celle zu spinnen; eine dritte bevestigt sich wieder an den der zweyten, eine vierte an den der dritten usw., bis die ganze Einrichtung fertig ist. Zwischen den runden Canälen entstehen Gänge, welche von denjenigen Larven benutzt werden, die an keiner anderen Stelle Platz bekommen können. Alle Canäle sind fast parallel mit der Blattfläche und demnach auch unter einander.

Wenn die Larve fressen will, kriecht sie nicht unmittelbar, wie andere Larven, auf das Blatt, sondern streckt bloß den Kopf über den Seidencanal hinaus, in welchem der übrige ganze Körper ruht, und wähet mit den Kinnladen das obere Blattfleisch ab, läßt aber alle Fasern unberührt; wenn sie aber jenes nicht mehr erlangen kann, so verlängert sie ihren Canal durch das Seidengepinnst so weit, daß sie mit den Kinnladen die unberührte Stelle des Parenchyms erreichen kann usw. Ihre Excremente sind körnig, schwarzgrün und legen sich an das Seidengewebe. Haben die Larven alles Fleisch der Blätter verzehrt, welche ihr Nest umgeben, so verlassen sie dieses und wandern weiter, um 3 — 4 Zoll von dem alten ein neues, meistens mehr nach oben, zu bauen.

Auf solche Weise kann eine Larvengesellschaft, um beständig frisches Futter zu haben, 4, 5, 6 Nester (eines über das andere und jedes um einige Zoll vom andern entfernt) bauen, ehe sie sich verpuppt. Die alten, verlassenen Nester entbedt man leicht dadurch, daß alle Blätter weiß und gelbbraun sind und wie ein Sieb oder wie Flor aussehen, indem alles Fleisch weggenommen ist. Das weiße Seidengewebe ist schwarz- oder braungebüpelt von der Menge der Excremente, welche in den Fäden sitzen; das Nest aber, welches die eigentliche Larvengesellschaft enthält, ist schwer ausfindig zu machen, weil die Larven sich mit vieler Geschicklichkeit zwischen den noch frischen und grünen Blättern zu verbergen suchen.

Werden die Larven beunruhigt, so springen sie eben so schnell rück- als vorwärts in den Canälen; und werden sie verfolgt, so lassen sie sich an einem Seidenfaden herab, welchen sie an dem Blatte bevestigt haben und an dem sie hängen bleiben, bis sie die Gefahr für überstanden halten; dann weichen sie den Faden im Munde wieder auf und ziehen sich wie ein Matrose, welcher mit einer Keine entert, mittelst einer hin und her drehenden Körperbewegung, zu dem Blatte wieder hinauf.

Ich vermuthete, daß sie die Haut wenigstens ein Mal in jedem Neste wechseln, weil sich in allen alten Nestern eine Menge trockener Larvenhäute vorfand.

Am Schlusse des May und während des ganzen Juny erlitten sie ihre Verwandlung und verpuppten sich. Sie spannen zu diesem Zwecke ein sehr horizontales Seidengewebe zwischen je zwey auseinander laufenden Zweigen des Baumes oder auch in einem Loch des Stammes; an die untere Seite dieses Gewebes, welches nun mit einem Dache zu vergleichen ist, hängt sich eine Larve und spinnt um ihren Körper eine lothrechte und spindelförmige Seidenhülle, welche mit ihrem obern (offnen) Ende an dem großen Gewebe oder dem Dache vest hängt; eine andere Larve bevestigt ihre Hülle neben der ersten, eine dritte neben der zweiten usw., bis eine ganze Schicht solcher kleiner Seidenspindeln die ganze Innenseite des Daches bedeckt; darauf fängt von neuem ein Haufen Larven an, auch eine Schicht zu spinnen; ist diese fertig, so folgt ihr eine dritte usw., bis die ganze Höhle oder der ganze Zwischenraum zwischen den Zweigen voll ist; da aber die Seidenhüllen spindelförmig sind, d. h. in der Mitte dick und schmal an beiden Enden, so entstehen auch leere Räume zwischen den Enden; in diesen Räumen werden die Enden der Seidenhüllen der folgenden Schicht bevestigt, gleichsam in sie eingeklebt usw. Das Ganze gleicht fast einem großen, weißlichen, seidenen Beutel

oder einem Vogelneſte. Ein ſolches Neſt wurde in 1, 2, 3 Tagen fertig; das größte, welches ich ſah, enthielt 1500 Seidenhüllen.

Die einzelne Hülle iſt 3 — 4<sup>'''</sup> lang und beſteht aus einem weißen und dünnen Seidenſtoffe, welcher ſo feſt iſt, daß man jene nicht, ohne ziemlich Gewalt anzuwenden, quer durchreißen kann. Während des Verlaufes einiger Tage trock die Larve aus der Haut zum letzten Male, und verwandelte ſich zu gleicher Zeit in die Puppe.

Die Puppe ruht unbeweglich in ihrer Hülle, hat eine braungelbe Körperfärbung, wie die Larve, und iſt mit einer ziemlich harten Schale bedeckt, auf welcher die Augen, die Zunge und die Füße, welche an die Bruſt gedrückt liegen, ferner die Flügel, welche zwischen den Füßen in ihren Scheiden eingewickelt ſind, gleichſam in erhabener Arbeit vorſpringen.

Nach 1 $\frac{1}{2}$  — 2 Wochen, d. h. gegen das Ende des Juny und während des ganzen July ſchlüpfen aus dieſen Puppen die geſchlügelten vollkommenen Inſecten aus. Sie drängen ſich durch die kleinen Wiſchenräume hervor, welche zwischen den Hüllen noch übrig ſeyn mochten, und kamen auf ſolche Weiſe endlich in's Freie; aber ein großer Theil von ihnen, beſonders aus den unteren Schichten, konnte ſich nicht herausarbeiten, weßhalb ſie dann oft todt zwischen den Hüllen angetroffen wurden.

Dieſes kleine Inſect iſt es, welches bey uns vom gemeinen Manne Häggmal, von den Deutſchen Kirchenmotte, Heckenhabe (Köſel), von den Franjoſen Le petit Deuil (Käsaumur) und von Linne (in ſeiner Fauna ſuecica) *Phalaena Tinea padella* genannt wird.

Er iſt ein kleiner, weißer, ſilberglänzender Schmetterling, mit ſchwarzpunctirtem Rücken und Vorderflügeln und ſchwarzen Augen. Die unteren Flügel ſind überall, und die oberen nur an der Innenseite aſchgrau. Der Körper iſt ſelten mehr als 2 $\frac{1}{2}$ <sup>'''</sup> lang, die Flügel aber oft 2 $\frac{3}{4}$ <sup>'''</sup>. Er gleicht der Spindelbaummotte (*Phalaena Tinea evonymella* Linn.) nicht allein in der Lebensweiſe und der Verwandlung, ſondern auch in der Geſtalt und Farbe; aber die letztere wird als Larve nie auf eigentlich ſo zu nennenden Fruchtbäumen angetroffen, und als vollkommenes Inſect iſt ſie allzeit größer, mit gröberem und weit zahlreicheren ſchwarzen Punkten auf den Vorderflügeln verſehen. Wenn Auf- und Untergange der Sonne ſchwärmten dieſe kleinen Inſecten, wie Wäden, zu Tauſenden um die Spitzen der Aeſte und Zweige der Apfelbäume; aber während der wärmeren oder wärmſten Tageszeit verhielten ſie ſich ruhig. Sie waren ſo ſcheu und zugleich ſo leicht, daß ſie bey dem geringſten Luſthauche ins Gras herabſielen. Wollten ſie an dem Grashalm wieder heraufkriechen, ſo hielten ſie die Flügel perpendicular und ſtatternd; aber im ruhenden Zuſtande legten ſie die Flügel über den Rücken gegen einander, ſo daß ſie dann gleichſam einen Kiel oder einen Dachgiebel bildeten. Ihre Paarung weicht, wie die der meiſten andern Motten, von der der großen Schmetterlinge (*Papiliones*) darin ab, daß das eine Geſchlecht nicht auf dem andern ſißt, ſondern beyde in derſelben Ebene ſitzend ſich einander den Hintern zuwenden, und bloß durch die an einander gebrachten Schwanztheile ſich vereinigen. Das Weibchen legte ſeine Eyer ohne Ordnung in ſchmalen Haufen auf die garteren Zweige in der Nähe der Blattwinkel. Die

Eyer waren etwas länglich, blaß, im Anfange weich und halbdurchſichtig, auch ſelten ſo groß als der vierte Theil eines Senfkorns.

Während einiger Tage ſchlüpfen die Larven aus. Die eben ausgeſchlüpfte Larve iſt jedoch viel länger als das Ey, welches beweist, daß ſie als Embryo etwas gekrümmt in der Eryſchale gelegen hat. Sie war anfänglich ſehr blaß, wurde aber bald dunkler und erhielt nach der erſten Häutung die Zeichnung, welche ich oben beſchrieben habe. Ein Theil der Larven verwandelte ſich zum vollkommenen Inſect im Nachherſte; aber die meiſten quatierten ſich zum Winter in die Seidencandeln, welche ſie ſich zu dem Zweck in den Spalten, Zweigtheilungen uſw. des Baumes angelegt hatten. Nach dem Ausſchlagen der Blätter im Mai 1834. kamen dieſe Larven von neuem in einer ſo ungeheuren Menge hervor, daß ſie binnen kurzer Zeit alle Blätter und Knospen der Apfelbäume ſowohl in der Stadt (Wadſtena), als auch auf den nächſtgelegenen Dorſchaften verzehreten. Sie legten auch in dieſem Jahre ein, wie ich wohl ſagen darf, bey einem ſo kleinen Thiere bisher unbekanntes Vermögen, Seide zu ſpinnen, dar; ſie ſpannen nemlich — nicht, wie im vorigen Jahre, bloß ein Neß über die Stellen, an welchen ſie ihre Neſter hatten, ſondern — um die Stämme und die einzelnen Zweige des Baumes herum, von der Wurzel an bis zu den Spitzen, ein feines, ſpinnwebenartiges Seidengewebe von der Feſtigkeit, daß man es aufwickeln konnte.

Die mit dieſem Seidenüberzuge bekleideten Stämme und Zweige ſahen aus, als ob ſie entweder weiß überſtäncht wären, oder als ob man ihnen die Rinde abgeſchält hätte, ſo daß das bloße Holz zum Vorſchein gekommen wäre. An der Innenseite dieſes Seidengewebes ſpazierten die Larven, wie unter einem Dache, auf und nieder, vor- und rückwärts. Jenes Geſpinnſt, mit welchem vor der Verpuppungſtadt begonnen war, ward in einigen Tagen vollendet. Das Geſpinnſt wird ſolgendermaßen verfertigt: Die Larve befeſtigt erſtlich das Ende des Seidenfadens vor ſich an einem Punkte, zieht von dieſem aus einen Faden nach links um ſich vor der Mitte der Körperlänge und befeſtigt ihn dann an einem andern Punkte; von dem Punkte links wird ein Faden wieder nach vorn gezogen und in einiger Entfernung von dem erſten Punkte befeſtigt; von hieraus wird ein Faden rechts hinab gezogen und dem andern oder linken Punkte gerade gegenüber befeſtigt; vom Punkte rechts wird ferner ein Faden bis zur Nähe des erſten Punktes gezogen. Darauf wendet die Larve ſich um und zieht von dieſem Punkte einen Faden gerade nach dem entgegengeſetzten Ende hin, befeſtigt den Faden hier und ſpinnſt darauf von dieſem Endpunkte aus wie von dem erſteren. Darauf zieht ſie Fäden von rechts nach links, nach der Quere und Länge, und umgekehrt, wie es ihr einfällt, und gewinnt zuletzt durch dieſe anhaltende Arbeit ein völlig dichtes Seidengewebe. An dieſer Arbeit nahmen alle oder doch die meiſten zugleich Antheil, woraus ſich die ſo ſchnelle Vollendung erklären läßt.

Die Bewegungsgründe zum Verfertigen dieſes Geſpinnſtes ſcheinen mir folgende zu ſeyn:

- 1) waren die Larven im letztem Jahre um Vieles zahlreicher als im vorhergegangenen;
- 2) würden ſie, ihrer großen Anzahl zufolge, allzuwenig

Spieiraum gehabt haben, sich ihres überflüssigen Seidenstoffes entledigen zu können, wenn sie nicht eine solche Arbeit vorgenommen hätten;

- 3) konnten sie unter diesem Gewebe sich mit mehrerer Sicherheit auf die bevorstehende Verwandlung in Puppen vorbereiten.

Uebrigens bemerkte ich im letzten Jahre keine andern Abweichung bey ihnen von ihrer Lebensart im Jahre vorher.

Der Verfasser gibt nun noch Vertilgungsmittel für dieses schädliche Insect an, bemerkt, daß auch die Natur selbst durch *Inseumoniiden* u. dergleichen für denselben Zweck Sorge trage, und rechnet eine Menge parasitischer Insecten auf, deren Larven er selbst in den Nestern der Kirichenmotte angetroffen hat.

Zum Schluß heist es noch: „ich erachte es für überflüssig, eine systematische Beschreibung dieses so allgemein bekannten Insectes hier beizufügen, und will bloß noch erwähnen, daß

- 1) Kösel (Zaf. Belust. Th. 1e Classe 4. Nr. VII. die graue, gefüllte Heuschabe u. S. 17—19, Taf. 7. Fig. 1—5.) diese Insecten beobachtet haben möge, wenn sie eben angefangen haben, sich zu verpuppen; denn sonst könnte er unmöglich sagen: „diese Schäume hängen zerstreut, die andern Klumpen aber pflegen solche auf einen Haufen zusammen zu setzen;“ da es doch, gewiß ist, daß, nachdem alle sich verpuppt haben, die Puppen mit einander in einem einzigen Klumpen zusammenhängen. Daß die eine oder andere Puppe wohl für sich anzutreffen ist, habe ich auch gesehen; aber das ist nur eine Ausnahme, wie sie allenthalben vorkommt, und kann nicht als Characterzug gelten.

- 2) Linne hat in der Fauna suecica, N. 1363, *Phal. Tinea evonymella*, Réaum. Mém. 2. t. 12. f. 1—9. citirt. Dieses Citat beruht auf einem Irrthum, welcher wahrscheinlich durch einen Druckfehler entstanden ist; denn jeder, welcher Reaumur's *Mémoires* Tom. 2. p. 250—266 Pl. 12. fig. 1—9. mit den von mir oben gemachten Bemerkungen vergleichen will, wird keinesweges bezweifeln, daß Reaumur's *Petit Deuil* mit Linne's *Tinea padella* identisch sey.“

Die Figuren erklärt schon der Text.

- 3) S. 43—130. Ornithologisches System, von C. J. Sundevall.

Eine treffliche Arbeit, welche wir schon mitgetheilt haben.

Folgendes sagt er über die Idee seines Systems:

„Ich bin von dem Gesichtspunct ausgegangen, daß die Singvögel am höchsten stehen, oder daß sie die Idee der Vögelnatur am reinsten oder in höchster Ausbildung darstellen, und dann, daß die Schwimmvögel als die niedersten betrachtet werden müssen. Da für andere Ansichten sehr wichtige Gründe angeführt worden sind, so will ich die Gründe für meine Ansicht etwas ausführlicher darlegen.“

„Die Vögel stehen nicht so unter den Säugethieren, daß man den vollkommensten Vogel betrachten müßte, als ob er

dem niedrigsten Säugethiere nahe käme; sondern es scheint, daß die meisten Vögel auf einer weit höhern Stufe thierischer Entwicklung stehen, als die niedersten Säugethiere; die Vollkommenheit der einen aber kann schwerlich mit der der andern verglichen werden, da sie von einander ganz entgegengesetzter Beschaffenheit sind. Bey den Säugethieren besteht sie in der Ausbildung aller Sinnesorgane und einer Annäherung an menschliches Selbstbewußtseyn; bey den Vögeln in einer höhern Ausbildung der Muskelthätigkeit und des Bewegungsvermögens; so daß der Vogel, welcher diese in geringem Grade besitzt, keinen andern Vorzug hat, welcher den Mangel ersetzen könnte; er steht vielmehr auf einer niedern Stelle, ähnlich dem Säugethiere, welchem es an Ausbildung der Sinnesorgane gebricht (Als Beispiele kann man sich denken: *Picus*, *Alca*, *Aptenodytes*, *Talpa*, *Sorex*, *Vespertilio*, *Phoca* und die Cetaceen). Diese beyden Classen können also nur mit einander verglichen werden, wenn es sich um ihre niederen Formen handelt, während die höheren, als nach verschiedener Richtung hin ausgebildet, außer Vergleichung mit einander treten. Weil aber die Ausbildung der Säugethiere zur Vervollkommenheit eines höhern Organensystems hinstrebt, so müssen sie im Allgemeinen als den Vögeln überlegen angesehen werden. Da nun angenommen wird, daß die Bildung der Vögel nach einer einzigen Richtung hingeht; so muß man auch annehmen, daß die Vögel die höchsten seyen, bey denen jene Richtung die überwiegendste ist; und daß diese bey den Singvögeln der Fall sey, scheint keinem Zweifel zu unterliegen. Sie haben nicht allein eine ausgezeichnete Fertigkeit im Gebrauche der Flügel und Füße, sondern ihre Bewegungen sind von weit mannichtiger Art, als die der übrigen. Die meisten von ihnen hüpfen mit gleichen Füßen auf der Erde, welche Bewegung eine weit größere Muskelthätigkeit voraussetzen scheint, als das Springen oder Gehen, und bey keiner andern Vogelordnung wiedergefunden wird; und was noch von größerer Wichtigkeit ist, ihre Muskelthätigkeit äußert sich außerdem durch das Singvermögen, welches in gleich hohem Grade allen übrigen versagt ist. Es ist die Wuth alles rein thierischen Bewegungsvermögens und mangelt der ganzen Säugethierschaa, bey welcher nur Laute vorkommen, welche Ausdrücke von Leidenschaften sind. Die Vögel dagegen singen oder zwitschern nur dann, wenn sie, für den Augenblick, frey von Leidenschaften sind; bey solcher Gelegenheit aber lassen die Singvögel fast ausschließlich ihre Stimme erschallen; sie ist bey ihnen nur der Ausdruck eines steten Bedürfnisses, ihre Muskelthätigkeit zu üben. Es ist dieselbe Erscheinung, welche sich bey den Kindern äußert, die immer herumrauschen und sich hörbar machen, wenn sie recht wohl auf sind, ohne daß ein besonderes Bewußtseyn ihre Geschäftigkeit begleitet. Eine Art von Gesang findet man zwar auch bey der Wachtel, dem Hühner, den Meeresenten u. m. a.; aber diese können deswegen mit jenen nicht um den Vorrang wetteifern, weil ihr Gesang theils höchst unregelmäßig ist, rückfichtlich der Mannichfaltigkeit der Töne, theils nicht so allgemein bey den Arten der Vögel, zu welchen sie gehören, und vorzüglich bey den Vögeln, weil diese Vögel nichts besorgen, was eigentlich dem Zwitschern oder dem beständigen Ueben der Stimme bey den Singvögeln entspräche. Aber das Wiedervorkommen des Gesanges bey den meisten Vogelordnungen ist ein fernerer Beweis des geringen Unterschiedes, welcher zwischen den Graden der Vollkommenheit bey den Vögeln herrscht.“

„Hierzu kommt noch, daß die Singvögel (*Passeres, Osines Sundev.*), obgleich sie an Zahl, sowohl der Arten, als auch der generischen Formen, stärker sind als alle übrigen, eine bestimmtere Bildungseinheit zeigen als irgend eine der übrigen Vögelabtheilungen desselben Ranges; welches auf einen fast ähnlichen Vorzug zu deuten scheint, wie der ist, durch welchen sich die Säugethiere vor den drei eperlegenden Wirbelthierclassen auszeichnen (Vergl. *Cuvier, Règne animal*, zunächst vor den Säugethieren). Die Füße sind fast gleich gebildet, auch vollständig und regelmäßig bei allen, während diese Theile bei jeder der übrigen Abtheilungen sehr variieren und oft eine Zehe weniger haben. Die Schwungfedern sind völlig ausgebildet, vorzugsweise vor den Deckfedern, welches bei den übrigen Vögeln nicht der Fall ist, bei denen die Federn der zweiten Ordnung die Deckfedern wenig überrreffen. Der eigenthümliche Sing-Apparat findet sich im Larvum, auch bei denen, welche keinen eigentlichen Gesang hören lassen, z. B. den Krähen usw.

Nächst den Gewächsen sind die Singvögel diejenigen Naturwesen, welche am meisten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weshalb ihre verschiedenartigen Beschaffenheit und ihr verschiedenes Vorkommen in sehr bedeutendem Maße, und weit mehr, als jene der übrigen Thiere, dazu beitragen, den verschiedenen Ländern der Erde ein eigenes Ansehen zu geben. Sie sind zahlreicher als andere Vögel in allen Ländern, außer unter der Pole einiger Eismassen und vielleicht (?) im Sandmeere der heißen Wüsten, überall aber da, wo die Erde fruchtbar genug ist, eine reichere, über das Wasser emporragende, organische Natur zu unterhalten. Mit einem Worte: die Singvögel scheinen mit in alle Wege die eigentlichen Vögel zu seyn, und deshalb werden sie hier als Typus für die Vogelform aufgestellt.“

„Die Schwimmvögel werden als die niedersten betrachtet, hauptsächlich deswegen, weil nur unter ihnen sich so unausgebildete Formen finden, wie die Pinguine, und mit so geringer Vogelnatur begabte Wesen, wie die dummen und stummen oceanischen Vögel (die *Procellariiden*), welche, obgleich sie ausgezeichnet gut fliegen, kaum gehen oder sich auf dem Lande bewegen können, und nur des Ernährungsprocesses wegen da zu seyn scheinen. Sie bewahren die allgemeine Regel im Thierreiche, daß in jeder Gruppe die Wasserthiere am tiefsten stehen, um in der Classe der Vögel dasselbe vorzustellen, was unter den Wirbelthieren überhaupt die Fische sind.“

„Im Allgemeinen dürfen, zufolge der Analogie im ganzen Thierreiche, diejenigen Vögel als höher ausgebildet anzusehen seyn, deren Zunge unvermögend sind, sich selbst zu helfen, und deswegen von den Eltern mit vieler Sorgfalt in künstlichen, zu diesem Zwecke erbauten Nestern ernährt werden müssen. Die Fische und Amphibien tragen im Allgemeinen keine Sorge für ihre Brut; die niederen Vögel brüten ihre Eier aus und schützen ihre Jungen; die höheren speisen sie noch über dieß. Das letzte Glied in dieser Kette bilden die Säugethiere, welche aus ihrem eigenen Körper die Kinder ernähren. Je mehr ein Thier ausgebildet ist, einer desto größeren Fürsorge bedarf es während seiner Entwicklungsperiode. Daß ein ähnliches Phänomen unter den Bienen, Ameisen usw. vorkommt, darf unser Urtheil nicht wandeln machen, indem gerade diese, als die höchsten unter den Einschnittsthiere, die einzigen sind, deren thie-

rische Fähigkeiten einigermaßen als sich zu denen der Wirbelthiere erhebende angesehen werden können; obgleich in einer so verschiedenen Richtung, daß irgend eine specielle Vergleichung kaum Statt finden kann.“

„Außer den Sing- und den Schwimmvögeln finden sich noch 2 Hauptgruppen von denselben Range, nemlich die Gruppen derjenigen Vögel, welche in der obigen Uebersicht die Namen *Gressores* und *Cursores* führen. Die ersteren zeichnen sich besonders durch die größere Sinnethätigkeit aus, welche sich bei einigen dieser Formen erkennen zu geben scheint. Diese Thätigkeit äußert sich am deutlichsten in dem außerordentlichen Sehvermögen der *Agraubögel*, der launenvollen Gemüthsart und Augenreizbarkeit der *Papageien*, wie auch dieser und der *Eulen* Fertigkeit sich der Füße wie Hände zu bedienen. Die nach vorn gerichteten Augen der *Eulen*, die rundum geschlossene Augenhöhle der *Papageien* und der deutliche Anfang eines ähnlichen Dinges bei den *Falken* zeigen eine nicht so ganz geringe Analogie zwischen diesen Vögeln und den Affen oder Ragen, und die Ausbildung der äußeren Ohren bei den *Eulen* ist etwas diesen Eigenes. Bei allen diesen Vögeln äußert sich eine größere allgemeine Kraft, welche einen höhern Grad der Thätigkeit des Nervensystems andeutet, welche sie wiederum berechtigt, als den Säugethieren analog betrachtet zu werden. Aber diese Nerventhätigkeit gibt den mit ihr begabten Gattungen einen nur geringen Vorzug, welcher mit diejenigen Vorzüge nicht aufzuwiegen scheint, die sich allgemein bei den Singvögeln finden. Die *Gressores* gleichen ohnedieß in der Form weniger den Singvögeln, als den übrigen Vögeln; ihre ganze Bildung scheint eine Annäherung an die Singvögel zu zeigen, ohne daß sie sie erreicht. Von den Sinnesfunctionen ist es besonders das Gesicht, welches sich ausgebildet bei den Vögeln findet, und dieses ist sogar im Allgemeinen bei ihnen stärker als bei den Säugethieren. Das Gehör kommt als ausgezeichnet nur bei den Raubvögeln vor (oder vielleicht nur bei den *Eulen*), und der Geruchssinn ist bei allen ganz unentwickelt.“

„Das am meisten Ausgezeichnete bei der nun noch übrigen Hauptabtheilung, der der *Cursores*, ist das Vermögen dieser Vögel, auf der Erde zu springen, ihre phlegmatische Gemüthsart, starke Verdauungskraft und ihre langgestreckten Formen, durch welche sie der Classe der Amphibien analog zu seyn scheinen. Diese Analogie gibt sich weniger durch die amphibische Lebensart der *Sumpfvögel* zu erkennen, welche ganz und gar eine Nebenache ist. Der Strauß gehört zu dieser Abtheilung, ob zwar er der einzige Vogel ist, welcher Aehnlichkeit mit den Säugethieren haben soll. Aber diese Aehnlichkeit äußert sich gar nicht in den Sinnesfunctionen und den Kopftheilen, wodurch sich die Säugethiere vorzüglich auszeichnen; sondern im

- „Man glaubt gemeinlich, daß die Raubvögel einen sehr feinen Geruch besitzen; aber daß dies nicht der Fall ist, und daß sie sich fast bloß nach dem Gesichtsinne richten, kann jeder durch directe Versuche leicht ausmitteln. Ein höchst lehrwerthart Artikel über diesen Gegenstand findet sich in Audubon's Abhandlung von den nordamerikanischen Vögeln bei Gelegenheit der Geyer-Gattung. (Sie ist in einem Anhang zu *Jamieson's Ausgabe von Wilson's und Bonaparte American Ornithology* abgedruckt.)“



Becken und den Unterleibsorganen. Das Brustbein und die Vorderextremitäten haben dadurch einige Ähnlichkeit mit denselben Theilen bey den Säugethieren, daß sie wegen des Mangels der Schwungfedern und des Flugvermögens weniger als bey anderen Vögeln von der allgemeinen Gestalt der Extremitäten bey den Wirbelthieren abweichen; aber sie sind dennoch völlig nach dem Vogeltypus gebildet. Die Ähnlichkeit des Straußes mit den Säugethieren scheint sonach auf seiner geringeren Ausbildung, als Vogel betrachtet, zu beruhen, wodurch er sich eben so sehr den Amphibien nähert, mit welchen er übrigens auch eben so viele Ähnlichkeiten anweisen kann; aber weil er ein Vogel ist, muß er auch höher ausgebildet seyn, als die Amphibien.“

„Daß der Strauß wegen seiner Ähnlichkeit mit den Säugethieren als der vollkommenste Vogel angesehen und darum zunächst an die Säugethiere rangiert worden ist, rührt von der Idee einer einfachen Reihenordnung her, welche nach stufenweiser Vollkommenheit durch alle Erzeugnisse der Natur herrschen soll. Aber, daß eine solche einfache Reihenfolge nicht Statt finde, erhellt sogleich aus dem Uebergange des Thierreichs in das Pflanzenreich, welcher sich nur bey den allerniedrigsten Formen beyder findet. Die höheren sind mehr und mehr ausgebildet, bey jedem seiner eigenen Richtung nach, so daß keine Vergleichung dort möglich wird. Jeder sieht, daß eine Lilië und ein Schmetterling zwar sehr hoch vervollkommnete Organismen sind; aber die Frage, welcher von beyden der vollkommenste sey, kann nicht beantwortet werden. Dieselbe Divergenz nach verschiedenen Seiten kommt allenthalben wieder vor und vereitelt jeden Versuch, eine einfache Reihenfolge in der Natur darzustellen.“

„Indessen besteht doch die organische Natur in zwey Reihenfolgen, dem Thierreiche nemlich und dem Pflanzenreiche, deren jedes für sich allmählich in seiner Ausbildung zunimmt; die Einheiten aber in diesen Reihenfolgen sind nicht die verschiedenen Arten, sondern die größeren Abtheilungen jedes Reiches, z. B. die, welche wir Classen nennen, so daß die Classen der Wirbelthiere, nemlich die der Fische, Amphibien, Vögel und Säugethiere einen Theil der Thier-Reihenfolge ausmacht, sobald jede Classe als etwas Ganzes für sich betrachtet wird; \* will man aber jede Art, oder auch nur jede Gattung als Einheit ansehen, so verschwindet jeder Begriff einer Reihenfolge, und die zerstreuten Glieder der Kette liegen, wie in der Welt, statt eines Meisters, in einer Unordnung, welche niemand übersehen kann, der nicht ihre Nummer kennt. In jeder der großen Einheiten (wir haben als Beispiel die Classen genannt) muß wieder ein neues Ordnen eintreten, unabhängig von dem ersten

ren. Jedes Glied in der großen Kette ist aus Theilen zusammengeleget, welche zu einem Ganzen aneinander gefügt werden müssen, bevor das Glied benutzt werden kann. Aber auch hier sind es die größeren Abtheilungen (z. B. die Ordnungen), welche die Einheiten ausmachen, in welchen von neuem wieder ein eigenes Rangieren Statt finden muß, und so weiter bis zu den Arten hinab.“

„Wenn man sich erinnert, daß alle Verschiedenheit zwischen den Thierformen von verschiedener Ausbildung oder dem verschiedenen Uebergewicht irgend eines Organensystems abhängt, und daß sonach, nach Kfens Lehre, so viele Hauptclassen bey den Thieren entstehen müssen, als sie Organensysteme besitzen, ferner, daß ganz eben so beschaffene Verschiedenheiten, obgleich in geringerem Grade, unter den kleineren Abtheilungen jeder Hauptclassen usw., soweit die Theilung geht, wiederkehren müssen; so findet man, daß es immer möglich bleibt, auch wenn die ersten Versuche mißglücken sollten, die Thiere auf die Weise zu ordnen, daß jede kleinere Abtheilung einer Section mit einer der Hauptclassen analog werde, und daß dieselbe analoge Theilung für jede neue Theilung, bis zu den allerkleinsten hinab, zurückkehren kann. Gewönne man auch nicht mehr durch eine solche Anordnung, so gewährt sie doch ein bestimmtes Princip, dem man folgen kann, und das aus ihr folgende Zahlenverhältniß muß dem ganzen System eine Klarheit und Ordnung verleihen, durch welche es leicht wird, es zu übersehen und im Gedächtnisse festzuhalten. Aber man hat überdies den großen Vortheil, die Ähnlichkeiten der Naturerzeugnisse nach vielen Richtungen hin ausdrücken zu können, nemlich theils die Verwandtschaften zwischen denen, welche in derselben Abtheilung zusammen stehn, theils die übrigen Ähnlichkeiten (Analogie) zwischen denen, welche an analoge Plätze im System gestellt werden; und es wird eine Möglichkeit mehr, den Reichthum der Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten in der Natur, welcher jeden ihrer Betrachter in Verwunderung setzt, anschaulich darzustellen.“

„Auf diese Weise habe ich die Vögel zu ordnen gesucht usw.“ \*

Der Verfasser spricht nun noch Verschiedenes über Einzelnes hinsichtlich seines Systems, ehe er dieses selbst darlegt, auch von geographischen Verschiedenheiten der Vögel, und schließt mit der Bemerkung, daß sein System das Resultat sey von Beobachtungen an ungefähr 2000 Vögelarten, im Reichsmuseum zu Stockholm, in der Sammlung des Hofmarschalls, Barons v. Gyllenkröok auf Björnörp in Schonen, im naturgeschichtlichen Museum zu Lund und in der Sammlung des Herrn Ansfing zu Hamburg; die Sammlung des B. v. Gyllenkröok, fügt er hinzu, enthalte eine Menge bengalischer

\* Schon nach dieser einfachen Ansicht des Natursystems muß man es sonderbar finden, daß einige neuere Naturforscher aus der einen oder andern Uebergangsform eigene Classen bilden wollen, z. B. aus dem *Drnithorhynchus*. Mag dieß Thier Eier legen, oder seine Jungen fangen, oder auch beides thun; so hat es dennoch dieselbe Totalbildung wie die Säugethiere, und steht sehr wohl unter ihnen als ein Uebergang zu den Amphibien, oder, wenn man will, zu den Wasservögeln. Aber wie eine aus ihm, auch mit den Walthieren zusammen, gebildete Classe rangiert werden sollte, ist schwer einzusehen.

\* Jeder sieht, daß das Princip hier völlig dasselbe ist, welches Fries in der Botanik eingeführt hat, und daß es nahe übereinstimmt mit Nilssons sowohl als MacLeays Ansichten in der Zoologie. Denken, welcher zuerst in seiner Naturphilosophie ein solches Princip für das naturgeschichtliche System einführte, hat versucht, es auf eine für die Darstellung schwieriger Weise auszuarbeiten, nemlich daß jede Thierform ein gewisses einzelnes Organ des ganzen thierischen Organismus darstellen sollte.

Arten, welche er durch die Güte des Besitzers Gelegenheit gehabt habe zu sammeln und im lebenden Zustande zu studieren.

- 4) S. 131—141. Fossile Amphibien, gefunden in Schonen und beschrieben von Sv. Nilsson. Mit Abbild. auf Taf. VI. und V.

„Während des vergangenen Sommers hatte ich Gelegenheit, verschiedene, im Grünsandfalk in Schonen gefundene fossile Knochen zu bekommen, von denen ich mich, zuerst der königl. Academie Nachricht mitzutheilen, für verpflichtet halte.“

„Bei der Beschreibung dieser Knochen will ich mit denjenigen den Anfang machen, welche auf den ersten Blick am wenigsten deutlich erscheinen und deshalb als die am schwierigsten mit voller Sicherheit zu bestimmenden betrachtet werden können. Diese sind auf Taf. IV. abgezeichnet. Sie liegen in einem ziemlich großen Steine der Gegend von Röpinge Mölla, wo diese Steinbildung, welche dem Grünsandfalk angehört, in Schichten unter dem Namen Pil-Sten vorkommt. Die Schnecken, Muscheln und Gewächse, welche in diesem ältesten Gliede der Kreidebildung, oder, wenn man will, in der Gebirgsart, welche zunächst unter der Kreide liegt, vorkommen, habe ich theils in den Verhandlungen der königl. Academie und theils in den *Petrificata suecana* beschrieben. Ich übergebe deswegen hier die Erwähnung der Steinbildung und halte mich bloß an das Petrificat. Schon der erste Anblick zeigt, daß es aus sogenannten flachen Knochen gebildet wird, deren nach außen gewendete Platte, welche indessen die *Lamina interna* gewesen, fort ist, so daß die Diploe mit ihrer schwammicht faserigen Textur zu Tage liegt. Diese Knochen sind entweder beim Spalten des Steins selbst gespalten oder ihre Oberfläche ist durch die Einwirkung der Luft während der vermuthlich langen Zeit beschädigt worden, da der Stein in einem Steinsäume gefesselt hat, aus welchem er im vorigen Sommer hervorgezogen wurde. Wenn man die Eindrücke in dem Steine betrachtet, aus welchen die Knochenstücken herausgefallen sind, so zeigen sie eine ganz ebene Oberfläche, welches andeutet, daß die Knochen auf dieser Seite eben waren und sonach mit ihrer Außenseite an dem Stein angelegen haben. Daß verschiedene flache Knochen auf dieser Steinfläche lagen, sehen wir deutlich auch aus den verschiedenen Richtungen der Fasern.“

„Der größte dieser Knochen ist der, welcher in der Figur bezeichnet ist mit a a a. Dieß ist offenbar ein *Os parietale* eines Amphibiens, welches zu derselben Unterordnung gehört, wie der ägyptische Monitor und der americanische Reguan — sonach einer Eidechse. Um sich davon zu überzeugen, braucht man es nur mit dem *Os parietale* der genannten Amphibien, wie es von Cuvier in dessen *Recherches sur les Ossements fossiles* V. 2., Tab. XVI. Fig. 1—3; oder 10, oder 23, litt. n., abgebildet ist, zu vergleichen. Für den, der keinen Zugang zu diesem Werke hat, habe ich, der Vergleichung wegen, aus demselben den Schädel des Monitor *niloticus* (Tab. V. Fig. 7.) copieren lassen.“

„Das in Rede stehende *Os parietale* ist sonach, wie bey der zuletzt genannten Eidechse, ein *Os polyedricum*, etwas verbreitert nach vorn, an beyden Seiten für die *Fossae temporales* stark eingeschnitten und nach hinten in zwey lange, aus einander tretende Schenkel auslaufend, um denjenigen Knochen,

über welche wir uns weiterhin äußern werden, entgegenzutreten. An dem Originale konnten wir Spuren einer Quernath am vordern Rande des Scheitelbeines erkennen, obwohl sie in der Zeichnung nicht ausgedrückt waren. Wir sehen auch deutlich, daß dieser Knochen durchbohrt gewesen ist; da aber bloß der hintere, abgerundete Rand des Lochs ganz ist, so wissen wir nicht, ob dieß *Foramen parietale* rund oder oval gewesen sey. Es scheint mir allein dem Scheitelbeine angehört zu haben, wie bey den meisten Eidechsen, und nicht in der Nath zwischen diesem Knochen und dem Stirnbeine, wie beim Reguan, gelegen zu haben. Hat man sich erst Gewißheit über die Bedeutung des in Rede stehenden Knochens verschafft, so kann man mit Sicherheit weiter gehen. Der vor dem Scheitelbeine liegende Knochen ist sonach das *Os frontis principale*. Dieß ist offenbar ein *Os polyedricum* gewesen mit nur einem Ossificationspuncte, von welchem die Knochenstrahlen divergirend auslaufen. Demnach hat das fragliche Thier zu der Abtheilung der Eidechsen gehört, welche nur ein *Os frontalis principale* haben, wie der Reguan und viele andere.“

„An der Vereinigungsstelle des *Os parietale* und des *Os frontis principale* liegt auswendig an jeder Seite ein eigener Knochen, welcher durch eine Nath mit beyden vereinigt ist. Dieser Knochen ist sonach offenbar derselbe, wie der mit litt. ii in der angeführten Cuvier'schen Fig. Taf. V. F. 7.) bezeichnete, dessen Gestalt er auch zum größten Theile gehabt zu haben scheint, also nach Cuviers Terminologie das *Os frontale posterius*. Seine Contouren können nicht genau gezeichnet werden; indessen hat es sich offenbar nach vorn und innen ausgebreitet, um dort, wie vorher erwähnt worden, an die Seitenkanten des *Os parietale* sowohl, als des *Os frontale* zu stoßen. Ob es einen *Processus orbitalis* gehabt habe, kann nicht ausgemittelt werden; ein nach hinten laufender *Processus zygomaticus* aber erscheint deutlich. Dieser legt sich an die Seite eines langen Knochens, welcher hauptsächlich dazu be trägt, den *Arcus zygomaticus* zu bilden, und so ist es derselbe Knochen, wie Cuviers *Os temporale* (T. V. F. 7. 1.). Zwischen dem hintern Theile dieses Knochens und dem Schenkel des Scheitelbeines fehlt das *Os mastoideum* (Cuvier m), sofern sich nicht eine Spur davon in der Grube findet; die *Ossa occipitalia*, welche zwischen dem Schenkel des *Os parietale* gelegen haben, fehlen ganz und gar. Von den Eindrücken, welche vor dem Stirnbeine liegen, scheinen einige Spuren der *Ossa frontis anteriora*, und der *Ossa nasalia* zu seyn.“

„In der linken Schlafgrube liegt das Fragment eines Knochens, welcher zum größten Theile weggefallen ist. Wo dieß geschehen ist, sieht man eine erhabene quere Gelenkfläche, gebildet von dem unterliegenden Stein und einer von demselben ausgehenden Steinfalte. Sonach hat in dem Knochen, welcher darüber gelegen hat und zum Theile noch dort liegt, eine eingebrückte transverselle Gelenkfläche der Art, welche man einen *Ginglymus* nennt, existiert, und von ihr ist eine Rinne längs der obern Fläche des Knochens ausgegangen. Dieser *Ginglymus* hat dem Gelenktheile des Unterkiefers angehört, von welchem jener Knochen also ein Fragment ist, und hinter dieser Articulation ist eine Rinne zur Insertion des *Musculus digastricus* gewesen. Diese Rinne sehen wir an demselben Knochen ebenfalls beim Reguan.“

„Ueber den Stein läuft ein grober, gekrümmter Strich von dort ist der erstere in 2 Stücke zerfallen. Auf der Kantsfläche des kleinen Fragmentes liegt ein Stück vom Zahatheile derselben Kinnlade mit einem in ihm verankerten Zahne (Taf. V. Fig. 1. in natürlicher Größe abgezeichnet). Dieser Zahn, welcher hier zum Theile gespalten ist, ist länglich kegelförmig, etwas gebogen, an der Spitze abgerundet, an der Oberfläche nach unten gegen die Wurzel zu fein und regelmäßig geriefelt, nach oben zur Spitze aber glatt, gewiesener, ferner hohl, wie die Zähne des Krokodills; hier ist der Steinkern, welcher die Höhlung ausfüllt. Ein ähnlicher, aber größerer Steinkern, welcher auch den untern Theil eines hohlen Zahnes gefüllt hat, liegt an einer andern Stelle im Steine; aber die Knochensubstanz, welche ihn umgeben hat, ist weggefallen.“

„Wir haben diesem zufolge vor uns sehr deutliche Fragmente eines Kopfes, welcher dem einer Eidechse, obgleich einer, als solcher, von riesenhafter Größe gleich. Wenn wir uns nun nach den Sattungen der Unterordnung der Eidechsen umsehen, welche früher in den älteren Schichten der Jäsoformation gefunden worden sind, so finden wir eigentlich nicht mehr als 2, Ichthyosaurus und Plesiosaurus, mit denen wir unsern Fund näher vergleichen können (daß er keinem Krokodille angehört haben könne, beweist ein einziger Blick auf einen Krokodillskäbel).“

„Was die erstere Gattung betrifft, so finde ich wenig Ähnlichkeit zwischen den Köpfen derselben, welche Cuvier abgebildet hat (Oss. foss. V. 2. Tab. XXIX.) und den hier beschriebenen Fragmenten. Das Scheitelbein zeigt keine Ähnlichkeit, eben so wenig der Jochbogen usw. Dagegen zeigt der kleine, welchen wir schon vom Kopfe des Plesiosaurus kennen, die größte Ähnlichkeit mit unsern Fragmenten. Man vergleiche ihn mit Cuviers Taf. XXXI. F. 3, wo man bey a in der Hauptsache dieselbe Form am Scheitelbeine sieht wie an dem unserigen. Die kleine Verschiedenheit, welche sich verräth, dürfte meistens daher entstehen, daß sie beyde nicht von einer und derselben Seite angesehen werden. Auch der lange, gerade, nach vorn breite Knochen, welcher die Schlafgrube außen begrenzt, zeigt in der Hauptsache dieselbe Form, wie an unsern Figur. Auch der Zahn beweist, daß er der Gattung Plesiosaurus angehört habe.“

„Diese Gattung hatte einen kleinen Kopf, aber einen ungeheuer langen Hals, wenigstens bey der bisher bekanntesten Art, dem Ples. dolichodeirus Co n y b. Das fast vollständige Exemplar dieser Art, welches man bey Lyme-Regis in England gefunden hat, ist 9' 6" engl. M. oder ungefähr 9' 9" schwed. M. lang, und von dieser Länge nimmt der Kopf nur ungefähr  $\frac{1}{13}$  ein. Der bey Kämpinge gefundene Kopf ist etwa  $1\frac{1}{2}$ ' lang gewesen, welches, wenn die Verhältnisse dieselben waren, wie bey der englischen Art, schließen läßt, daß das ganze Thier ungefähr  $19\frac{1}{2}$  — 20' lang gewesen sey. Wir werden weiterhin die Beschreibung anderer Plesiosaurusknochen geben, welche ein ungefähr eben so großes Thier andeuten.“

„Taf. V. F. 2. 3. 4. stellen ein Wirbelbein vor, welches mir nebst ein Paar anderen, mehr oder minder beschädigten, zu Händen gekommen ist. Daß sie einem Plesiosaurus angehört haben, zeigt sogleich eine Vergleichung zwischen ihnen  
Jhs 1838. Heft 1

und Cuviers Beschreibung a. a. D. S. 477 ff. u. S. 485. Sie wurden in derselben Formation, wie der oben beschriebene Kopf, gefunden, nemlich im Grünandskalk, obgleich in einer andern Gegend von Shoben, im Dorfe Jfötofta bey dem See Jföfjö. Man fand bey dem Brunnengraben in einer Tiefe von 11 Ellen einen ganzen Rückarat, und wahrscheinlich lag dort ein ganzes Skel. Nur 3 Wirbelbeine wurden herausgebracht und die waren alle von den Aeußern mehr oder minder zerbrochen; die übrigen Knochen wurden zerstört oder zu den Steinen hinabgeworfen, die man zum Aussehen des 18 Ellen tiefen Brunnens gebrauchte. Nach einem Jahre war ich so glücklich, die zu Tage geförderten Fragmente zu erhalten; ich begab mich darauf gleich zur Stelle, aber der Brunnen war schon ausgefüllt, und niemand erinnerte sich mit völliger Sicherheit, an welcher Stelle das Skelet gelegen hatte. Ich ließ zwar nachgraben, fand aber nichts. Indessen hoffe ich, daß ein neuer Versuch bessern Erfolg haben werde — und die Gelegenheit ist zu anstehend, als sie ohne neuen Versuch entschlüpfen zu lassen. Vorläufig will ich nun das, was ich bekommen habe, beschreiben, und um zu zeigen, in welcher Formation die Knochen lagen, darf ich nicht unterlassen, zu erwähnen, daß in derselben Erdschicht mit ihren Terebratula defrancii, Belemnites mucronatus und eine Anzahl anderer Schneden vorkamen, welche sämmtlich in unsern ältesten Kreide- oder Grünandschichten angetroffen werden.“

„Bey der am wenigsten beschädigten der genannten Vertebrae ist der Körper (Corpus) benhaye 4" breit,  $3\frac{1}{2}$ " hoch und  $2\frac{1}{2}$ " lang. Seine beyden Enden sind etwas, obgleich nicht bedeutend ausgehöhlt, und in der Mitte sind sie sogar wiederum fast etwas convex. Hierdurch unterscheiden sie sich auf den ersten Blick von den Wirbelbeinen des Ichthyosaurus, welche, wie die der Fische, mit einer kegelförmigen Cavität versehen sind. Ihre Breite ist größer als ihre Länge, doch nicht um so viel, wie bey dem Ichthyosaurus, dessen Wirbelbeine den Steinen eines Bretspiels gleichen. Daß die Pars annularis sich durch eine Naht mit dem Körper vereinigt, findet sich wohl nur bey jüngeren Individuen; bey den vor mir liegenden zeigt sich keine Spur einer Naht. Sie haben vermuthlich einen ziemlich langen Processus spinosus gehabt; aber dieser ist abgebrochen, wie auch die Processus articulares (cc) hier gebrochen sind.“

„Zu beyden Seiten des Körpers liegt eine von erhöhten Rändern umgebene verticale Grube (F. 3. aa), in welcher sich zwey drehrunde Vertiefungen finden, eine untere, etwas größere, und eine obere sehr kleine. Auf der untern Seite des Körpers stehen 2 kleine, ovale Löcher, und diese finden sich an allen 3 Wirbelbeinen. Diese Löcher sind, Cuvier zufolge, charakteristisch für die Gattung Plesiosaurus, und finden sich an allen dessen Wirbelbeinen, des Halses sowohl als des Rückens und Schwanzes. Es ist demnach keinem Zweifel unterworfen, daß die von mir beschriebenen Wirbelbeine einem Plesiosaurus angehört haben.“

„Die Rückenwirbel des schon erwähnten Exemplares von Lyme-Regis hielten, nach Cuvier, im Querschnitte 0,5, oder ungefähr 2" schwed. M., und diese gehörten einem Thiere von 9' 9" schwed. M. an. Die Wirbelbeine bey dem in Rede stehenden schwedischen Exemplare halten im Querschnitte

beynahe 4", welches sonach ein Thier von 19' 5", oder ungefähr von 20', andeutet. Diesem zufolge scheinen der oben beschriebene Kopf und die fraglichen Wirbelbeine ausgewachsenen Thieren einer und derselben Art zugehört zu haben. — Vor mehreren Jahren fand man in der perpendicularen aus unter einander verschmolzenen Schneidenschalen bestehenden Kalkschicht an der Westküste von Isf einige grobe Knochenfragmente, welche aber wegen ihrer Verwitterung unbestimmbar waren. Jetzt erkenne ich in ihnen deutlich die Gelenkfläche eines Wirbelbeines des fraglichen *Plesiosaurus*."

"So hatte also auch unser scandinavischer Norden einmal diese riesenhaften Amphibien in seinen Meeren. Auch an der nördlichen Gränze des vorweltlichen Oceans, wo später die Kreide abgesetzt wurde, und selbst in den Buchten und Schären zwischen den unweltlichen Gesteinen lebten diese Meerungeheuer unter den Thieren der Belemniten und der ungeheuren Ammoniten. Die ganze Schöpfung, die ausgestorbene, wie die lebende, kann kaum ein wunderbarer zusammengefügtes Wesen aufweisen als der *Plesiosaurus* war. Ein kleiner, abgeplatteter Eidschinkenopf, sitzend auf einem Halse, welcher einer ungeheuren Schlange gleicht, und sich an den Körper eines Krokodilles mit vier Beinen heftet, welche doch am meisten den Flossen eines Walfisches gleichen; und alles dieses sich endigend mit einem kurzen Schwanze, wie er sich sonst unter den Sauriern nirgends findet. Ein solches war das unweltliche Thier, von welchem ich hier einige Fragmente, gefunden in schwedischer Erde, vorlege."

"Sowohl in England, als auch in Frankreich, hat man *Ichthyosaurus*-Knochen mit Knochen vom *Plesiosaurus* gefunden. Diese beyden Thiergattungen, welche sich hauptsächlich dadurch unterscheiden, daß bey dem *Ichthyosaurus* die Schwänze der des Delfphins, und die Wirbelbeine denen der Fische gleichen, haben sonach dort zu gleicher Zeit gelebt. Auch in Schonen scheint mir dasselbe Verhalten Statt gefunden zu haben. Ich habe ein Paar Zähne aus der hiesigen Grünsandformation erhalten, welche ohne Zweifel der Gattung *Ichthyosaurus* angehört haben. Diese hat kegelförmige, mehr oder minder spitzige, mehr oder minder dick aufgetriebene, mehr oder minder zusammengebrückte Zähne; ihre Krone ist mit Schmelz versehen und nach der Länge gestreift (Cuv. l. c. p. 454). Bey *Plesiosaurus* sind die Zähne dünn, etwas gebogen und nach der Länge getieft (Cuv. l. c. p. 484)."

"Der größere dieser Zähne, welcher, wie ich glaube, einem *Ichthyosaurus* angehört hat und in natürlicher Größe auf Taf. V. F. 5. gezeichnet worden, ist bey Öppmanna ganz in derselben Grünsandschicht gefunden worden, in welcher das Skelet des *Plesiosaurus* bey Fjöstofta gefunden ward. Er ist verstümmelt, so daß die ganze Wurzel und auch die Spitze fort sind; das übrig gebliebene Stück zeigt, daß er kegelförmig, etwas gebogen, an der Basis aufgetrieben (wodurch er fast birnenförmig erscheint) mit glänzendem, braunem Schmelze versehen, nach der Länge gestreift war, ferner zwar etwas hervorragende Kanten hatte, welche ihn in zwey sehr ungleiche Theile theilten. Die Streifen, welche am deutlichsten an der eingetrüm-

ten Seite des Zahnes sind, sind nicht regelmässig oder gleich groß, und der Zahn ist auf jener Seite, obgleich undeutlich, gegen die aufgetriebene Basis hinab vieleckig. Wie die Wurzel auswendig beschaffen war, ist nicht anzugeben; daß sie aber hohl war, steht man sehr gut. Die Höhle geht aber nicht weit in die Krone hinauf. Wie sich die Spitze verhalten habe, läßt sich auch nicht bestimmen."

"Der kleinere Zahn, welcher in natürlicher Größe auf L. V. Fig. 6. steht, gehört wahrscheinlich derselben Gattung an, wie der vorige, aber bestimmt einer ganz andern Art; er ist mehr zusammengebrückt, gerader, seine Seitenkanten stehen mehr hervor und theilen den Zahn in zwey gleiche Hälften. Er ist an der Basis gar nicht aufgetrieben, aber dort an beyden Seiten vieleckig, auch, wie der vorige, mit bräunlichem, glänzendem Schmelze versehen. Man fand ihn an der Westseite von Isf."

"Das Resultat von all diesem ist, daß auch derjenige Theil der Erdoberfläche, welcher jetzt das südliche Schweden genannt wird, einmal Meer gewesen ist, und daß auch dieses gigantische Amphibien gedächert hat, welche jetzt nirgends, wenn nicht in den heißesten Gegenden zwischen den Wendekreisen, würden leben können. Und an den Stränden dieses Meeres wuchsen Cycadeen, baumartige Farrenkräuter, gigantische Rohrgewächse und andere Baumformen der heißesten Zone, größer und kräftiger als sie jetzt irgendwo auf der Erde gefunden werden. Eine unermessliche Kluft liegt zwischen jener alten Ordnung der Dinge und der gegenwärtigen. Zwischen dem Tage, an welchem der letzte *Plesiosaurus* starb, und dem, an welchem der erste Mensch zum Leben erwachte, liegt eine ganze Welt, ausgestorben in der Tertiärbildung, da. Kann dieser Zeitraum nach Jahrtausenden oder Jahrmillionen ermessen werden? Und doch beträgt er ein Unbedeutendes gegen den Strom der Zeit, welcher dahin rauschte, seit die Trilobiten und die *Orthoceratiten* lebten."

5) S. 142 — 169. Ueber die Destillationsproducte der Traubensäure, *Acidum paratartaricum*, von Jaf. Berzelius.

6) S. 170 — 204. Untersuchung über die Polhöhe des Stockholmer Observatoriums, von N. S. Selander.

7) S. 205 — 208. Eine neue Art der Lepidopteren-gattung *Ypsolophus*, \* beschrieben von A. G. Dahlbom.

Das vollkommene Insect wurde schon 1802. in Malmö von Fallén entdeckt; Dahlbom fand 1834. die Larven auf den Blättern der *Hesperis matronalis*, und beobachtete ihre Entwicklung, beschreibt auch genau (in lat. Spr.) das Insect in allen seinen Zuständen. Er nennt es, *Fallén* zu Ehren, *Ypsolophus falleniellus*, und charakterisirt es folgendermaßen:

\* Der Name muß, richtig geschrieben, *Hypsolophus* lauten.  
Ref.

**Yps. fall.:** subargenteus, capite cum thorace linea laterali recta, alisque superis linea media repanda latiori, nigro- et testaceo-fuscis; his lateribus nigro- punctatis apiceque alternatim nigro- et albo- fimbriatis; oculis viridibus disco aterrimis; pedibus anticis supra infuscatis.

**Longitudo naturalis totius corporis a palpis ad**  
anum  $2\frac{1}{4}'''$  mens. succ.

— — — alarum  $2\frac{1}{8}$  —  $2\frac{1}{2}'''$ .

— — — antennarum  $1\frac{1}{2}'''$ .

**Mas** abdomine angustiore, ano furcato.

**Femina** — crassiore, ano truncato mutico.

**Habitat** in graminosis hortorum Lundensium et Mal-mogiensium, praesertim mensibus Maio et Junio frequens, quo tempore deponit ova l. in axillis l. in gemmulis Hesperidis matronalis.

**Metamorphosis** obiecta.

**Larva** semicylindrica glauca, utrinque linea laterali obsoleta viridi-fusca, capite testaceo. **Long. nat.**  
 $1\frac{1}{2}$  — 3 —  $4'''$ .

8) S. 209 — 221. Beitrag zur nähern Kenntniß der Vitererde und ihrer Verbindungen, von Berlin.

9) S. 222 — 259. Skandinavische Pteromalinen, beschrieben von C. S. Boheman.

Dies ist eine Fortsetzung der in den Verhandlungen der Acad. für d. J. 1833. (S. 375 1835. S. 412) abgebrochenen Abhandlung.

Der Verfasser bemerkt zuerst, daß ihm durch Hr. L. Dalman vor einiger Zeit die äußerst werthvollen Anzeichnungen über die genannte Insectenfamilie, welche der Bruder des genannten, der Prof. J. W. Dalman, hinterlassen, mitgetheilt worden seyen, und zugleich, daß, wenn er in der Folge Dalmanische Beschreibungen vollständig und unverändert geben werde, stets der Name, Dalman, unter dieselben gesetzt werden solle. Für dieß Mal charakterisirt und beschreibt der Verf. weitläufig auf die frühere Weise:

Die Gattung Eurytoma Illig. und ihre Arten: E. concinna Dalm., xanthomelas, biguttata, cynipsea Dalm., nodularis Dalm., appendigaster, tibialis Zetterst., brachycera D., minor D., rufipes D., flavimana D., flavipes D., nigrita D., truncata D., aethiops D., Morio D., afra, maura D., gibba D., brevicornis D., pilicornis, pubicornis D., obscura, longula D., Guttula, verticillata, pusilla D.; ferner

die Gattung Spalangia Spinola und deren Art Sp. nigra.

— — Caratomus und ihre Art C. megacephalus.

10) S. 260 — 281. Beitrag zur Kenntniß der Gattungen Campanularia und Syncoryna, von S. L. Loewen. Mit 3 Steindrucktafeln (Taf. VI. VII. VIII.) Eine treffliche Abhandlung.

11) S. 282 — 293. Untersuchung der Katchu-Säure

und einiger Stoffe, welche sich durch ihre Anwendung bilden, von L. J. Swanberg.

12) S. 294 — 301. Beitrag zur Erläuterung der Frage, in wie fern aufrecht stehende, nicht eisenhaltige Körper Magnetismus verrathen, von G. G. Hallström.

13) S. 302 — 308. Erläuterungen auf Veranlassung der vorigen Abhandlung, mitgetheilt von C. Sanfreen.

## Transactions

of the zoological Society of London. Vol. II. part 1. 1836.  
4. 86. 17 tab. ill. (Preis 1 Pfd. 12 Schill.)

### I. Oberstleutenant W. S. Sykes:

über die Wachteln und Hemipoben von Indien, T. 1 — 4.

Die sipphischen Charaktere sind noch vielem Zweifel unterworfen: man nahm sie von der Gestalt des Schnabels usw., die der Gattungen vom Gesider. Jene reicht aber nicht immer hin, besonders bey den Tetraoniden. Sie paßt wohl auf die typische Gattung und auf einige andere; es gibt aber darunter, welche in der Gestalt des Schnabels, der Flügel usw. so abweichen, daß man sie in besondere Sippen stellen kann, während jedoch die Lebensart ganz gleich ist. So findet es sich bey den Wachteln.

Welche Charaktere verlangen demnach die Vereinigung verschiedener Thiere zu Sippen?

Sieht man bloß auf den Schnabel, so kommen manche Gattungen von Francolinus, Perdix et Coturnix zusammen, andere dagegen weit weg. Coturnix argoondah et pentah gehörten dann zu einer andern Sippe als Coturnix dactylisomans et textilis; Cot. erythrorhyncha müßte ganz allein stehen. Pterocles wäre von den Tetraoniden zu trennen und zwischen dieselben und die Columbiden zu stellen.

Entscheidet die Gestalt, Zahl und Größe der Behen und Nägel, so hätten Hemipodius et Cryptonyx die Hauptcharaktere der Tetraoniden. Aber jene könnte man auch zu den Streuthoniden in die Sippe Otis stellen; die Ähnlichkeit der Zunge, der Blinddärme und der Lebensart der Hemipoden und Trappen könnte dazu berechtigen. Aber die An- oder Abwesenheit einer Hinterzehe hat so wenig Einfluß auf Gestalt, Lebensart, Bau und Verwandtschaft, daß ich durchaus Charadrius bilobus et Vanellus goensis in die Sippe Vanellus stellen muß, obgleich der erstere nur 3 Behen hat. Auch findet sich keine Verwandtschaft zwischen den Trappen und einigen kleinen Diegenpfeifern, besonders dem Charadrius philippensis, alle mit 3 Behen; dagegen eine enge Verwandtschaft zwischen dem letztern und dem Sandpfeifer (Totanus), einem vierzehigen Vogel.

Reissen verbindet Schnabel und Füße, und bekommt dadurch 23 ziemlich natürliche Ordnungen. Dennoch stehen manche widersprechende Sippen neben einander, wie Jacana et Rallus; Ciconia et Tringa; Otis et Himantopus; Parus et Alauda; Picus et Psittacus; Bucco et Cuculus stehen in

befondern Abtheilungen neben einander. Dagegen ist getrennt: *Vanellus* von den Regenpfeifern. Nach seinem System müßte *Hemipodius* neben *Ostralega* kommen.

**Temminck** betrachtet die Gestalt der Flügel als hinreichend, um die Wachteln von den Repphühnern zu trennen; bey jenen ist die erste oder äußere Schwungfeder die längste; bey diesen die vierte und fünfte; die 3 ersten sind die kürzesten. So auch **Viellot**: aber bey der Familie *Gallinae* haben alle kurze und abgerundete Flügel mit Ausnahme der Ganga und des *Heteroclitus*. **Temminck** sagt noch: die Wachteln haben glatte Läufe, keine Sporen und keine Spur von schwieligem Höcker. Die Männchen aber von meiner *Cot. argoon-dah* et *pentah* haben diese Höcker; und die Varietäten der beyden Gattungen, eine vom Himalaya und eine von Madras haben sie ebenfalls. Durch diese Charactere würden 3 Gattungen *Cot.* von der Sippe getrennt werden. Zwei davon haben abgerundete Flügel und Höcker wie *Perdix*, aber einen viel höhern Schnabel: die dritte unterscheidet sich von *Coturnix* nur durch die abgerundeten Flügel. Kein Jäger aber würde diese Vögel von den Wachteln trennen.

Nach der Lebensart und das Betragen gibt nicht immer sichere Charactere. **Temminck** sagt: die *Francoline*, *Coline* und Wachteln unterscheiden sich von den ächten *Tetraones* dadurch, daß sie wandern. Die Wachteln leben die meiste Zeit einsam; die Jungen trennen sich bald: dennoch vereinigen sie sich zur Zugzeit in Scharen. —

Dieses gilt nur von der gemeinen Wachtel und selbst hier nur mit Beschränkung. Die Wachtel von Europa gleicht der von China, Indien und vom Cap. Der einzige Unterschied besteht in dem mehr oder weniger deutlichen Quersfleck an der Kehle, ten mehr oder weniger zahlreichen kleinen Flecken an der Brust, und bey der chinesischen sind die Farben des Rückens glänzender als bey den andern. Die europäische Gattung aber wandert und besucht in zahllosen Scharen die Küsten von Frankreich und Italien; am Cap aber ist sie nach **Temminck** ein Standvogel, und ich kann nach einem 22jährigen Aufenthalt in Indien bezeugen, daß sie das ganze Jahr sich in Dufhun und Goojat findet; wahrscheinlich auch in China. Ob die andern Gattungen wandern, wissen wir nicht. **Sonnerrat** sagt zwar: *Cot. peralta* ziehe von Madagascar an die Südküste von Africa. Von diesem Vogel kennt man aber nur das Weibchen. Nach meiner Erfahrung wandert keine der folgenden indischen Gattungen.

Hinsichtlich der andern Lebensart der Wachteln sagt **Temminck**: sie wären gern allein, seyen ungetreulich; der Hahn verlasse die Henne nach der Paarung. Auch dieses gilt nur von der gemeinen, nicht aber von *Coturnix textilis*, *argoon-dah*, *pentah* et *erythrorhyncha*, die 3 letztern leben sicherlich in Scharen bespinnen und polygamisch. Wenn der Jäger in Indien eine gemeine Wachtel antrifft, so ist auch eine andere nur wenig Schritte davon, und von *Cot. textilis* wurden in einem Felde von *Phaseolus max* 30 Paare in 1½ Stunden geschossen, woraus folgt, daß sie wohl auch gesellschaftlich lebt.

Nach **Temminck** leben die ächten Repphühner nicht in den Wäldern und hecken nicht auf Zweigen, wohl aber die

*Francoline*, und die Hähne hätten einen oder zweien Sporen. In Indien hat der Hahn vom sogenannten *Francolinus pondicerianus* Sporen und sie hecken bisweilen untertags auf Bäumen, häufig, vielleicht immer bey Nacht; bewohnen aber nicht die Wälder, sondern Gärten und Felder, und haben die Gestalt, das Aussehen und die übrige Lebensart des gemeinen Repphuhns in England, *Perdix cinerea*. Jeder Jäger in Indien nennt sie auch Repphuhn.

Das Gefieder ist ein Hauptcharacter für die Gattung, dennoch veranlaßt das oft falsche Trennung. Der dachsförmige Streifen am Schafte der Rückenfedern der gemeinen Wachtel findet sich auch bey *Coturnix textilis* et *Novae Seelandiae*; bey *Cot. excafactoria* ist er nur 1 Lin. und findet sich auch bey den americanischen Gattungen *Colin*. Bey beyden Gattungen der capischen Repphühner ist er breit und sie haben am Schafte der Brustfedern einen breiten weißen Längsstreifen, ganz so, wie die indische Junghe Hen; die Hähne haben Sporen wie die *Francoline*, aber nicht ihr Aussehen. Characteristisches Familiengefieder siebt man bey den Sprossen, obgleich sie in entfernten Gegenden leben; ebenso bey den Tucanen.

Zu diesen Betrachtungen bin ich durch die Schwierigkeiten gekommen, welche mir bey der Anordnung der *Tetraoniden* aufstiegen.

**Temminck** hat *Coturnix* et *Perdix* zu Sippen erhoben. Ich weiß aber keinen, allen Wachtelgattungen zukommenden Character, der sie von *Perdix* unterscheidet: dennoch thut es das Auge. Die *Francoline* dagegen sind nicht als Sippen getrennt und doch unterscheiden sie sich, mit Ausnahme von *Francolinus pondicerianus*, der eine ächte *Perdix* ist, durch ihre schlankere Gestalt, die längern Füße und Schwänze, und besonders durch die Lebensart besser als *Coturnix* und *Perdix*. *Lagopus* wurde von *Tetrao* getrennt durch *Ray*, **Viellot** und **Leach**, aber nicht durch **Temminck**.

*Pterocles* ist eine gültige Sippe, gehört aber nach Gestalt Lebensart, und zum Theil nach ihrem Bau zwischen *Lagopus* und die Tauben. Der *Heteroclitus* ist meines Erachtens ein *Pterocles* mit rauhen Füßen und Beinen, was vom Klima herkommt. **Temminck** sondert die *Coline* der neuen Welt von den Repphühnern nur als Gruppe ab; **Stephens** hat sie aber mit Recht als Sippe, *Ortyx* aufgestellt; jedoch ist *Ortyx temminckii* (*Perdix cristata*) eine Wachtel. *Cryptonyx tinamu* et *Hemipodius* werden mit Recht von *Tetrao* getrennt; der letztere aber möchte nach Gestalt und Lebensart zu *Otis* gehören oder wenigstens daneben. **Temminck** nennt sie Zwergze unter den Hühnern: aber *H. nigrifrons*, *pugnax*, *nigricollis*, *thoracicus*, *tachydromus* et *lunatus* sind so groß als *Cot. textilis*, und 2" größer als die chinesische Wachtel, *Cot. excafactoria*. Eben so groß ist mein neuer *Hem. tai-goor*, und der kleinste, nemlich *H. maculosus*, ist noch größer als die chinesische Wachtel.

Von ihrer Lebensart sagt **Temminck**: sie seyen polygamisch, lebten auf unfruchtbarem Boden im Gras an der Krause der Wälder, liefen lieber als sie flogen und verbargen sich lieber in Gräbchen als daß sie entflohen, fraßen vorzüglich Insecten, berührten selten kleine Samen und nie Körner.

Bey den von mir beobachteten Gattungen; *Hemipodius*

*pugnax*, *taigoor* et *dussumieri* ist das nicht ganz richtig: die 2 ersten bewohnen angebauter Felder wie *Cot. textilis*; die letztere Wästen mit dickem Gras, wie *Otis fulva*, auch Felder. Hinsichtlich der Polygamie trifft man die 2 ersten einzeln oder paarweise, die letztern immer einzeln. Im Magen der 2 ersten findet man schwarze Ameisen, kleine Käfer und Gräseramen. Im Magen des letztern Wadens, kleine Insekten und Samen von *Panicum italicum*. Diese versteckt sich auch lieber als daß sie entflöhe; die beyden ersten aber fliegen davon, ob schon nicht sehr bald.

Da mir äußere Charactere nicht aushalfen, so suchte ich innere, und zwar im Magen, in den Blinddärmen, ihrer verhältnißmäßigen Länge zum Darm, der Länge des Darms zum Leibe, in der Zunge und der Färbung der Iris. Ich untersuchte deshalb 198 Gattungen. Am wichtigsten fand ich die Zunge und die Blinddärme. *Ciconia leucocephala* steht bey *Ardea*, aber die kurze Zunge trennt sie davon; eben so die doppelten und kurzen Blinddärme statt eines einzigen und die besondere Färbung der Iris.

Es folgt nun eine Tafel mit Abbildungen der Zungen, Blinddärme, Schnäbel, Irisfarben und Angabe der Länge des Darms und der Blinddärme von *Cot. dactylisonans*, *textilis*, *argoodah*, *pentah*, *erythrorhyncha*; *Hemipodius pugnax*, *taigoor*, *dussumieri*; *Perdix picta*; *Francolinus pondicerianus*, *spadiceus*; *Columba humilis*, *tigrina*, *oenas*; *Pterocles exustus*. Die Wachteln, Repphühner und *Francolinus pondicerianus* weichen darinn fast gar nicht ab. Bey den dreyzehigen Hemipodien finden wir bey ähnlicher Zunge und Blinddärmen einen längern Schnabel und andere Iris: Zunge und Blinddärme deuten auf ähnliche Lebensart bey Wachteln und Repphühner; die Farbe der Iris aber, die Gestalt des Schnabels und die 3 Behen auf sippische Unterschiede (bey *Coturnix* et *Hemipodius* hat die Zunge hinten nur 3 Spigen; bey *Cot. dactylisonans* 4; bey *Perdix*, *Francolinus* 5; eben so bey *Columba* et *Pterocles*, welcher auch das Aussehen und den Flug der Tauben hat und keine Gallenblase); die Blinddärme dagegen und die Farbe der Iris wie bey *Perdix*, jedoch sind die Blinddärme länger, steht mit hin zwischen *Tetraonidae*. *Columba oenas* hat sehr kurze Blinddärme, die andern gar keine, ob schon Zunge und Schnabel gleich sind; vielleicht ist dieses ein allgemeiner Unterschied zwischen *Pigeons* et *Doves*.

Ich muß bemerken, daß ich keine hinreichenden Unterschiede zwischen Wachteln und Repphühnern gefunden habe. Jene sind, wie Theophrastus sagt, Zwergrepphühner.

### Rasores (Gallinae).

### Fam. Tetraonidae.

Gen. *Coturnix*: rostrum forte, capite brevius; mandibula superiore arcuata. Nares laterales, basales, membrana arcuata semiclausae, antice implumes. Pedes tetradactyli; digitis anticiis membrana usque ad articulum primum connexis. Cauda brevis, rotundata, recumbens.

Obs. Magnitudine ut plurimum *Perdix cinerea* dimidium paulo superantes.

A. Mandibula superiore parum arcuata; alis acuminatis; tarsis muticis.

Stis 1833. Heft 1.

## 1) *Coturnix dactylisonans* Meyer. Lohah et Lohah der Maratten.

Der indische Vogel ausführlich beschrieben. Länge  $7\frac{1}{2}$ “, wovon der Schwanz 2, Darm 16, Blinddärme  $2\frac{1}{2}$ “. Im Magen Gräseramen, Insekten, viele Pflanzensamen von den haarigen Kelchen des *Dolichos biflorus* und Samen von *Phaseolus aconitifolius*. Während der Moonsons leben sie paarweise; im October gibt es Junge, brüten mithin in der Regenzeit vom Juny zum Ende Octobers, schaaren sich nie zusammen und ziehen nicht fort. Das Geheer ist wie bey der englischen. In historischer Hinsicht ist dieser Vogel sehr wichtig, da er höchst wahrscheinlich *Tetrao israelitarum* ist, den der Himmel den hungerigen Israeliten in der Wüste geschickt hat. Rudbeck (*Ichthyologia biblica*) hielt ihn für einen fliegenden Fisch, Ludolf (*Hist. aethiop. p. 108*) für eine Heuschrecke, aber Vers 26 — 29 des Psalm 78. sagen, es sey ein Vogel: „Er erregte einen Südwind und durch seine Macht kam ein Südwind. Es regnete Fleisch über sie wie Staub und besiedelte Vögel wie Sand am Meer; und er ließ sie fallen mitten in ihr Lager, rings um ihre Wohnungen. So aßen sie und wurden gesättigt.“

Nach Bochart und Harris (*Natural history of the Bibel* 317) ist das hebräische Wort Selaw, arabisch Selwee oder Selvai (Wachtel), welches die Septuaginta mit *Ortygometra*, eine große Art Wachteln übersetzt. Aristoteles versetzt unter *Ortygometra* die Vögel *Rallus* et *Crex*, aber das Wort bedeutet wohl nur die Größe von *Ortyx*, und Josephus nimmt beyde für gleich bedeutend, und sagt, daß die Wachteln häufig im Busen des rothen Meeres seyen (*Lib. III. Cap. 1*). Bekanntlich sind sie häufig in Aegypten, der Barbarey, Kleinasien und zu diesen Zeiten in Europa. Dafür spricht auch, daß die gemeine Wachtel die einzige Gattung ist, welche zieht.

Zu Kämpfen wird dieser Vogel nicht gebraucht.

2) *Coturnix textilis* Temm., etwas kleiner,  $6\frac{1}{2}$ “ lang, wovon der Schwanz gegen  $1\frac{1}{2}$ “. Das Fleisch ist braun, das der gemeinen weiß. Darm  $11\frac{1}{2}$ “ lang; Blinddärme  $1\frac{1}{2}$ “. Im Magen Gräseramen, Pflanzensamen und Keime von Hülsenfrüchten. Sie sind über ganz Indien verbreitet. Während der Moonsons brüten sie und leben paarweise, sonst in Menge versammeln; im April 1829. wurden in Dufhun 570 Paar geschossen mit 4 Flinten in einem Tage.

B. Mandibula superiore parum arcuata; alis rotundatis; tarsis muticis.

3) *Cot. erythrorhyncha*: supra saturate brunea, infra dilute castaneo, nigro (praeter ventrem medium) undequaque guttata maculataque, scapularium maculis maximis, pectoris guttis minimis; scapularium tegminumque alarum superiorum albo fasciatarum rhachibus albis, crucem efformantibus; remigum pogoniis externis rufescenti fasciatis maculatisque; fronte nigro; striga frontali utrinque supra oculum producta gulaque albis.

Fœm. Fronte, striga inde ad utrumque latus ducta, gulaque dilute castaneis. Irides obscure flavo-ochraceae; rostrum rubrum. Long. corp. 5 unc. caudae  $1\frac{1}{10}$ “.

Diesen niedlichen Vogel fand ich nirgends als im Thale



Karle in den Gauths mit *Perdix picta*. Länge  $6\frac{1}{2}$ ", wovon der Schwanz  $1\frac{1}{2}$ ", Darm 13, Blinddärme  $1\frac{1}{2}$ ". Im Magen Grasmamen mit einigen Wicken (*Ervum lens*).

C. Mandibula superiore valde arcuata; alis rotundatis; tarsi tuberculatis.

4) *Cot. argoondah*: supra rufescenti brunnea, fasciis angustis dilute ferrugineis notata; infra sordide alba, fasciis aequidistantibus nigris; fronte mentoque ferrugineis; striga superciliari rufescenti-albida.

Foem. Infra dilute ferruginea; fasciae nullae.

Irides fusco-rubrae; rostrum nigrum.

Long. corporis 5 unc. caudae  $5\frac{1}{10}$ ".

Der Schnabel ist höher als breit und verhältnismäßig kürzer als bei der gemeinen und dem Repphuhn; die Flügel rundlich wie *Perdix*, aber ein kleiner Sporn wie *Francolin*: bäumt aber nie auf. Länge  $6\frac{1}{2}$ ", wovon der Schwanz  $1\frac{1}{2}$ "; im Magen nichts als Grasmamen. Lebt nicht in angebauten Feldern, sondern in ganz Dunkun im ebenen Land zwischen Felsen und Heden: sie fliegen in Ruden auf von 10—20 unter den Füßen des Jägers sehr schnell und laut. Man sieht sie immer geschaart, also wahrscheinlich polgamisch. Fleisch weiß. Diese Gattung wird von den Eingebornen zu Wachteleisen gebraucht, nicht die gemeine und die *Coturnix textilis*.

5) *Cot. pentah*: supra saturate brunnea; infra rufescente-albida nigro fasciata; ventre crissoque albidoferrugineis; interscapulo scapularibusque nigro maculatis, plumarum rhachibus dilute flavis; remigibus brunneis pallide ferrugineo maculatis; striga superciliari sordide alba; mento rufescente.

Foem. Infra rufescens, haud fasciata; plumarum rhachibus albis.

Irides ochraceo-brunneae; rostrum rufescenti-brunneum; pedes flavescens.

Long. corp.  $6\frac{3}{10}$  unc. caudae  $1\frac{7}{10}$ ".

Der Hahn hat Höcker am Laufe. Länge  $6\frac{3}{4}$ ", wovon der Schwanz  $1\frac{3}{4}$ ". Finden sich nur im Gebirge, erheben sich in Ruden aus Schilf und hohem Gras mit Geschrey wie *C. argoondah*. Meine Exemplare wurden 4000' über dem Meere geschossen. Sie finden sich auf dem Himalaya, bei Madras auf dem Tafelland von Mysore; das Gefieder etwas verschieden, so wie auch bei denen aus China und vom Cap.

Temmincks *Perdix cambayensis* (Pl. col. 447. fig. 1. 2.) ist wahrscheinlich derselbe Vogel, jedoch kaum 6" lang und aus Bengalen. Wegen des zufälligen Verlustes eines Nagels an der Hinterzehe hielt man ihn für einen *Cryptonyx*.

*Hemipodius* Reinwardt.

1) *H. pugnax* Temm. (Pl. col. 60. f. 2.) ist gut beschrieben, nur vergessen die gelblich weißen Ränder am Ende jeder Mittelfeder, und daß die braunrothe Farbe an der Mitte des Bauches durch eine scharfe Linie von den schwarzen und gelblich weißen Streifen der Brust getrennt ist. Das reiche

Obergefieder besteht aus einer Menge braunen, schwarzen und gelben Streifen. Männchen und Weibchen gleich; die 4 ersten Schwungfedern gleich lang. Leben paarweise und meist einzeln, nicht in Ruden, lieben Felder, besonders von *Capsicum annuum* (Chillie fields) und mit *Cot. textilis*. Sie fliegen kurz und nicht gern. Länge  $5\frac{3}{4}$ ", wovon der Schwanz  $1\frac{1}{2}$ ", der Darm 11. Blinddärme  $1\frac{1}{2}$ ". Das Fleisch lagenweise braun und weiß. Im Magen schwarze Ameisen, kleine Käfer und Grasmamen. Unterschieden von *Otis* durch den Muffelmagen und den langen Darm; die Gewohnheit zu laufen aber und die Gestalt des Schnabels entfernt ihn von den *Tetraoniden* und nähert ihn den *Struthioniden* hinter *Otis*.

Seine Kampflust ist in Dufkun und Java unbekannt. Findet sich auch bei Madras, also weit verbreitet.

2) *H. taigoor*: supra castaneus; plumis stramineo marginatis nigroque undulatis fasciatis; tegminibus alarum stramineis nigro fasciatis; remigibus fuscis; mento gulaeque albis; pectore nigro alboque fasciato; ventre crissoque dilute ferrugineis. Irides pallide flavae; rostrum nigrescens. Long. corp.  $4\frac{8}{10}$  unc. caudae  $1\frac{7}{10}$ ".

Unterscheidet sich von dem vorigen nur durch den dünneren Schnabel, das weiße Kinn und Kehle, den schwachrothen Bauch statt braunroth, und durch das weniger glänzende Gefieder.

3) *H. dussumieri* Temm. Pl. col. 454. fig. 2. — Button Quail. Zunge wie bei Wacheln, Iris gelb, Füße weißlich, Geschlechter gleich; lieben dickes, kurzes Gras und Felder von *Dolichos biflorus*, *Phaseolus max*, *Ervum lens*; nur einsam, ist schwer zu schießen; erhebt sich unter den Füßen und fliegt so eilig und kurz, daß er wieder liegt, ehe die Kinte in Ordnung ist; Länge  $5\frac{1}{4}$ ", wovon der Schwanz  $1\frac{1}{3}$ ", Darm 8", Blinddärme 1.

Abgebildet sind *Cot. erythrorhyncha*, *argoondah*, *pentah*. *Hemipodius taigoor*. Alle sehr schön.

## II. 25. Robert Templeton.

Beschreibung einiger wirbelloser Thiere von der Insel Morix, Tafel 5.

1) *Actinia sanguineo punctata*, f. 1. 2.: flavescens rufescens, guttulis punctatis sanguineis confertis per series longitudinales numerosas dispositis ornata; ore guttis caeruleis quinque circumdato; tentaculis viridescentibus, hyalinis.

Wird nicht über 1" groß, auf Felsen um die ganze Insel.

2) *Xenia desjardiniana*, fig. 3—8.: pallide livido-caerulea; polypis 8- rarius 9-radiatis [et pinatis].

Scheibe blaßblau mit einem kleinen verkümmerten Maul und einer schwachen Erhöhung auf der Mitte: die 8 oder 9 Strahlen sind dick, fleischig und die scheibenförmige Oberfläche mit vielen kleinen Körperchen besetzt, welche den Saugnäpfen der Sepien gleichen. Der Stiel dick, in Ringel verkümmert, wenn er nicht ausgestreckt ist, bläulich, wird allmählich fleischig,



sowie er sich der weichen Corticaltextur nähert, von welcher alle Stiele entspringen.

Nicht selten an Steinen. Die Masse, woraus die Stiele entspringen, ist über die Steine ausgebreitet, oft mehr als 1', fast 1" dick; eingeschnitten besteht sie aus unregelmäßigen verschlungenen Röhren verschiedener Größe; dazwischen eine Menge weißlicher Körner wie Eyer; aber hin u. wieder zeigen sich kleine Knöpfe, offenbar junge Stiele, welche keinen Zweifel über die Fortpflanzungsart lassen. 8 oder 9 solcher Röhren (nach der Zahl der Strahlen), verwachsen, bekommen eine gemeinschaftliche Dicke und bilden den Stamm, in dessen Mitte der Nahrungs canal liegt, eine besondere Röhre, deren innere Membran runzelig und walsig ist. Die Röhren lassen sich trennen, weil sie nur durch Zellgewebe verbunden sind. Ihre innere Fläche gleicht dem centralen Nahrungs canal, hat aber keine Falten. Sie laufen mit einander fort bis zur Mundscheibe, trennen und verlängern sich jede in einen Strahl und schicken zuletzt einen Zweig in jeden kleinen Saugnapf; er ändert aber hier in einen Blind sack und öffnet sich nicht auf die äußere Fläche. Der Mund bildet einen fleischigen Ring oder einen Schlig, oder auch 3 oder 4 Falten.

Die Scheibe ist in beständiger Bewegung, bildet Wellen von einer Seite zur andern, als wenn sie etwas suchte; sobald etwas einen Strahl berührt, so schlagen sich die Sauger oder Cilia dicht darüber; der Strahl biegt sich wie ein Finger um und führt die Beute ins Maul. Ist das Ding zu groß, so helfen zwei oder 3 Strahlen; kann es nicht verschluckt werden, so wird es losgelassen.

[Nach der Abbildung hängen 34 Stiele mit ihren Sternen an einem gemeinschaftlichen Grunde zusammen. Jeder Stiel 1 — 1½" lang, 1½ Lin. dick, die Scheibe die Strahlen 3; die Saugnäpfe stehen in 2 Reihen, oben auf jedem Rande der dicken Strahlen in der äußern Reihe 8, in der innern 5 mit einem Endnapf.]

#### *Anisomelus.*

Os tentaculis simplicibus octo, per paria dispositis, filiformibus, prehensilibus instructum. Branchiae simplices, tentaculiformes, pedibus haud multo longiores, in segmentis corporis quatuor anterioribus sitae.

Testa cylindrica, calcarea, erecta, ad basin in saxis immersa.

Obs. Numero et symmetria tentaculorum, necnon branchiarum simplicitate? a *Terebella* caeterisque generibus affinis distinguitur.

Mund einfach, mit vielen länglichen Fühlfäden umgeben. Die obern Ringe des Leibes haben auf der Bauchseite 6—10 kleine Tentacula sive Cilia, welche wahrscheinlich die Riemen sind; jeder andere Ring hat einen spatelförmigen Fuß mit vier Dornen, die etwas eingezogen werden können.

Der Leib steckt in einer aufrechten Kalkröhre, welche zum Theil in den Corallenfelsen eingesenkt ist.

3) *A. luteus*, fig. 9—14.; Totus pallide luteus.

Weiß, Fühlfäden 8; ein Paar sehr kurz, ein anderes

lang und einer dazwischen an jeder Seite mächtig lang mit Querfalten; unter der Scheibe und den Wurzeln der Fühlfäden ein doppelter Kreis kleiner schwarzer Fühlfäden und ein verlängerter Halsteil, welcher in das erste Ringel eingezogen werden kann. Die Leibesringe zeigen sich nur im unausgestreckten Zustande des Thiers: von den 3 oder 4 obern entspringen kleine Arme, welche wie Fühlfäden aussehen [in der Abbildung an jedem Ringel etwa 2]; die untern Ringel haben jederseits einen spatelförmigen Fuß, vor dessen Spitze 4 Stacheln stehen, welche etwas zurückgezogen werden können.

Sie finden sich auf Corallenfelsen in der Nähe des Blackrivers auf der Insel Moritz.

Die kleine Gattung macht sich eine dünne Kalkröhre, welche auf dem Stein steht, aber nicht so lang ist, daß der ganze Leib sich hineinziehen könnte. Die Röhre ist daher in der Substanz des Coralls verlängert, was man bemerkt, wenn man das Thier wegnehmen will, indem die geringste Berührung die äußere Röhre scharf abbricht. Bei der geringsten Störung zieht sich das Thier in seine Zelle und oft legen sich auch die langen Fühlfäden längs den Seiten des Leibes; meistens bleiben sie jedoch im Wasser fliegen. Streckt es sich aus der Röhre, so geht es nicht weiter als bis zum vierten oder fünften Fuß; dann schwingt es sich von einer Seite zur andern und bewegt die Fühlfäden herum: wird Futter entdeckt, so ergreifen es die Fühlfäden, wie die *Sapajus* mit ihrem Wicelschwanz, führen es zum Mund, von dem es verschluckt oder zurückgestoßen wird, je nachdem es paßt oder nicht. Die Fühlfäden bestehen aus einer Menge Ringel, sind hohl und enthalten ovale Kügelchen, welche sich hin und her bewegen, so wie einige Ringel in Bewegung kommen. [Nach der Abbildung ist die vorragende Schale kaum 3" lang und ½ dick; der Leib ragt nur 2" hervor und ist nur fadenstark; die Fühlfäden wie das dünnste Haar; die Füße so klein, daß man sie nur durch Vergrößerung sieht. Das Thier mahnt an eine verkümmerte *Terebella*.]

#### *Piratesa.*

Os tentaculis seu branchiis numerosis, longe ciliatis, subulatis, simplici serie dispositis cinctum.

Testa cylindrica, calcarea, erecta, e saxo parum prominente.

Obs. Genus propter tentaculorum branchiferorum dispositionem a *Sabella* Cuv. sejungendum.

Mund einfach, am Gipfel einer schwachen Erhöhung: Mundscheibe mit vielen gewimperten Fühlfäden umgeben. Hals wenig verengert, kann sich in das erste Leibesringel einziehen. Der Leib scharf geringelt, an jedem Ringel ein flacher Stiel oder Fuß mit Dornen; der vom zwölften Ringel am größten: das letzte oder Schwanzringel sehr klein, mit 3 Stielen oder Füßen, 2 zur Seite und einer auf dem Rücken.

Das Thier bildet eine Kalkröhre, welche etwas über den Corallenfelsen hervorragt.

4) *P. nigro-annulata*, fig. 15—18.: brunnea, tentaculis pallidioribus, nigro confertim interrupte annulatis.

In Corallenriffen zwischen den Rissen in der Nähe des Black river an der Insel Moris.

Da ich keine Sippe finden kann, worin dieses kleine Thier paßt, so habe ich eine neue aufgestellt; jedoch mit sehr viel Zweifel. Der Mund ist eine einfache Oeffnung in der Mitte der Scheibe, der Rand etwas erhöht und mit einer flüchtigen und gefalteten Membran umgeben; sie setzt sich nach unten in das Thier fort. Die äußere Fläche des Leibes sieht aus wie die des Regenwurms, hat aber viele Runzeln auf den Gläzchen der Ringe. Die Füßsäulen haben eine doppelte Reihe von Wimpern, welche seitwärts von der obern Fläche entspringen und alles, was sie antreffen, fest umschlingen. Im Ruhezustande sind sie in ein Knäuel gerollt und werden nur ausgebreitet, wenn das Thier nach Futter sucht. In diesem Fall streckt es sich aus der Röhre, dreht die Scheibe nach unten auf den nächsten Theil des Steines mit sehr überlegter Bewegung, untersucht denselben ganz genau und die Füßsäulen tapfen herum, so daß sie auch den kleinsten Gegenstand erwischen, welcher sich dafelbst finden mag.

[Nach der Abbildung gleicht dieses Thierlein dem vorigen und ist nicht viel größer: die Röhre kaum 4" lang und 1 dick; der vorragende Leib 3", die Füßsäulen 4 oder 5 strahlig ausgebreitet; die Wimpern einseitig und gerollt, der Leib kaum 1/2" dick. Die Füße mit ihren 6 Borsten ohne Vergrößerung nicht sichtbar. Mahnt ebenfalls an eine verkümmerte *Terebella*.]

### III. S. 31. E. L. Bennett,

über eine merkwürdige Gattung von *Pteropus*.

Beym ersten Blick fällt ein sonderbarer weißer Fleck von langen weißen Haaren an jeder Seite des Halses gerad vor den Schultern auf, welcher aussieht, wie eine Masse weißer Federn. Sie sind dem übrigen Pelze so ungleich und so verschieden von Allem, was man bey den Fledermäusen sieht, daß man es für einen Betrug halten kann: genaue Untersuchung aber hat mir bewiesen, daß dieses wunderliche Anhängsel natürlich ist. Jedes Büschel mißt von vorn nach hinten im Durchschnitt 1": es besteht aus geraden linden Haaren, welche nach allen Richtungen aus einem gemeinschaftlichen Centrum ausstrahlen; die mittlern am längsten. Sie sind auch bündelweise in die Haut geheset und lassen zwischen sich nackte Räume; in jedem Bündel 50—60 Haare; es sieht aus, wie wenn von einem Federkiel eine Menge Härte ausgingen; auch die kürzern Pelzhaare um den weißen Fleck sind noch bündelförmig gestellt; unten weiß, an der Spitze blaßbraun wie der übrige Pelz.

Etwas Aehnliches findet sich jedoch auch bey *Pt. macrocephalus* aus demselben Lande (*Zoolog. Proceedings* III. p. 101), aber so wenig in die Augen fallend, daß man es erst bemerkt, wenn man es sucht. Die an den Seiten des Halses stehenden Haare sind etwas länger als die andern, zahl und gehen allmählich in die flachern an der Bauchseite über; auch sind sie bündelweise eingefügt und etwas strahlig. Bey *Pt. lithaecheilus* hat Temminck etwas Aehnliches bemerkt (*Monogr. I. pag. 198*). Das Männchen hat an jeder Seite des Halses von einem Centro ausstrahlende Haare, weiß beym Jungen, glänzendroth oder hochgelb beym Alten; er glaubt auch, daß es sich ebenso bey *Pt. amplexicaudatus* verhalte.

Er ist der Meinung, daß unter diesen Haarbüscheln Drüsen liegen, worin die riechende Substanz abgesondert wird. Analog ist die Höhle an der Stirn bey *Rhinolophus speoris*; die Oeffnung an der Brust bey *Phyllostoma hastatum*; die kleine Höhle unter der Kehle bey *Dysops velox* und der große Sacl unter dem Kinn bey *Tapozous saccolaeus*. Die Riechstoffe dienen wahrscheinlich nur zum Auffuchen während der Paarungszeit; vielleicht hindern sie auch die Reibung dieser vorragenden Theile während des Fluges, besonders da diese Absonderungsorgane überall vorwärts liegen. Die großen Schulterbüschel in der vorliegenden Gattung stehen vielleicht auch in Beziehung mit einer besondern Einrichtung der Fittiche, welche hier soweit hinten stehen, daß sie hinter dem Centrum der Schwere zu liegen scheinen: die Büschel geben dem Leibe eine bauchende Gestalt und tragen vielleicht das Gewicht des Kopfes und Halses; indessen könnte das Thier beym Ausstopfen etwas verzerrt worden seyn. Wäre aber diese Lage natürlich, so könnte das Thier vielleicht eine eigene Sippe bilden unter dem Namen *Epomophorus*, und dazu könnte auch *Pt. macrocephalus* gehören, welcher die Fittige auch weiter nach hinten hat, jedoch nicht so viel. Er stimmt auch im Gebiß überein; ebenso *Pt. gambianus* aus demselben Lande.

Ogilby sagt; beyde zeigen einige Abänderung im Gebiß, welche eine Unterippe andeutet, die die gewöhnlichen asiatischen Formen an der Westküste von Africa vertritt. Ihre Schneid- und Eckzähne sind wie bey den andern; aber sie haben oben nur 3, unten 4 Backenzähne. Die Schneidezähne sind klein und regelmäsig, Eckzähne mäsig: der erste unächte Backenzahn im Unterkiefer ist klein und von der normalen Gestalt; der zweyte aber in diesem Kiefer und der erste im obern haben die Gestalt der Eckzähne und sind nur um ein wenig kleiner, so daß es bey offenem Maul aussieht, als wenn in jedem Kiefer 4 Eckzähne wären. Dann folgt in jedem Kiefer ein Zahn mit einem großen Lappen am äußern Rand und mit einem kleinen am innern; er hat eine Mittelform zwischen den achten und unächten Backenzähnen. Dann folgen 2 normale Backenzähne im untern und einer im obern Kiefer.

Alle sind durch eine Lücke von einander getrennt: diese Lücke ist besonders groß im Oberkiefer zwischen dem achten und dem unächten Eckzahn oder ersten unächten Backenzahn; im Unterkiefer enthält sie den erwähnten kleinen unächten Backenzahn.

Diese Beschreibung paßt genau auf das Gebiß von meiner neuen Gattung: nur findet sich eine schwache Abweichung in den Schneidezähnen, welche wohl nur zufällig ist; im Oberkiefer stehen nemlich auf der linken Seite ihrer 3. Die obern Schneidezähne sind klein, kegelförmig und spitzig; die untern breit am Ende und etwas gelappt.

Bev den *Pteropiden* ist die normale Zahl der Zähne 34, 16 oben, 18 unten; oben 4 Schneidezähne, 2 Eckzähne, 2 unächte, 6 achte Backenzähne und 2 kleine dahinter; unten 4, 2, 2, 8. Diese Zahl wechselt aber: bey *MacroGLOSSUS* fehlen die unächten Backenzähne in beyden Kiefern; bey *Cynopterus* sind sie da, aber es fehlt der hintere kleine Backenzahn; bey *Cephalotes* wie *MacroGLOSSUS*, aber es fehlen zwey Schneidezähne in jedem Kiefer; bey *Harpyia* fehlen unten alle Schneidezähne; oben sind nur zwey; bey *Epomophorus*

fehlt der kleine hintere Backenzahn überall, der mächtige oben.

Hier ist der Kopf länger als bei den andern, sowie bei *Pt. macrocephalus*, auch fehlt der Schwanz. Der Pelz ist dicht und lind und mäßig lang; die Haut zwischen den Hinterfüßen ist behaart. Das Haar ist hier wie bei andern Fleckenmäusen sägeförmig, fast wie bei den Federn; die Zähne sehen aber nicht aus wie Härte, sondern gleichen freien Endigungen von Scheiden um den Stamm des Haars wie bei den Monocotyledonen, so daß sie gegliedert erscheinen wie bei manchen Sertularien, natürlich nur bei Vergrößerung. Es kommen auch bei andern Thieren vergleichene Haare vor.

*Pt. whitei*: pallide brunneus, postice pallidior; ventre albedo; scopa humerali alba magna. Long. tot. 6 $\frac{3}{4}$  poll.; capitis 2 $\frac{1}{4}$ ; expansio alarum 12.

Habitat in regione Gambiensi, D. Rendall.

Obs. Scopa humeralis forsans maribus propria.

Färbung bläßbraun, etwas ins Röthliche, unten heller, in der Mitte des Bauches weißlich, Schulterbüchel weiß; an der Wurzel der nackten Ohren vorn und hinten kurze und weiße Haare. L. 6. stellt das Thier vor. L. 7. die vergrößerten sonderbaren Haare wie aus lauter kurzen Scheiden bestehend.

#### IV. S. 39. Thomas Bell.

Crustaceen von den Küsten Südamerica's, welche Cuming und Miller mitgebracht haben, L. 8—12.

Es sind 150 Gattungen, worunter viel neue. Die Charaktere sind gegeben und eine umständlichere Beschreibung, welche wir aber unmöglich mittheilen können.

#### *Brachyura*, *Ozyrhynchi*, *Leptopodiadae*.

1) *Leptopodia sagittaria*, Valparaiso.

2) *Eurypodius Latreillii* ibid.

#### *Majadae*.

#### *Microhynchus*.

Testa subtriangularis, postice rotundata, antice rostro brevissimo terminata.

Oculi pedunculo elongato multo crassiores, retractiles. Orbita supra uniffissa, extrorsum unidentata. Antennae exteriores ad latera rostri insertae, articulo basilaro rostro paullo breviores. Antennae interiores in fossula integra, apice aperta, et ad apicem rostri fere attinente, locatae.

Pedipalpi externi caulis interni articulo secundo cordiformi, antice emarginato. Pedes antici maris corpore vix longiores, reliquis multo crassiores, [digitis arcuatis; foeminae minimi: pedes octo posteriores subconsmiles, corpore fere duplo longiores, unguibus leviter curvis. Abdomen maris 7-foeminae 5-articulatum (hujus articulis tribus ultimis conjunctis). Affinis Camposciae, inter Composciam et Inachum.

3) *Microhynchus gibbosus*, t. 8. fig. 1.: testa 3ffe 1838. Sept 1.

*gibbosa*, rostro bifido; ad Gallapagos. Long. 6 lin. Lat. 5. Color luteo-albus.

4) *Micr. depressus* fig. 2.: testa depressa granulata, rostro nullo, triangulari integro. Long. et lat. 6 lin. Col. albidus.

5) *Libinia rostrata*, fig. 3.: rostro producto valido, bidentato, dentibus compressis, acutis, divergentibus; long. 2", 8 lin.; lat. 2", 3 lin. Col. fuscus. Affinis *Herbstiae*.

#### *Rhodia*.

Testa pyriformis, in rostrum parvum, bidentatum antice producta.

Oculi retractiles, globosi, pedunculo crassiores. Orbita fissura magna, superne aperta. Antennae interiores in foveolis profundis, lunatis, antice separatis receptae. Antennae exteriores, rostro duplo longiores, articulo basilaro bidentato, reliquis cylindricis, ad rostri latera insertae. Pedum par anticum maris (immaturi) reliquis brevius; digitis minutissime serratis: paria quatuor posteriora testa longiora, a secundo ad quintum sensim paullo breviora. Abdomen maris 7-articulatum. Foeminae?

6) *Rhodia pyriformis*, t. 9. fig. 1., ad Gallapagos. Long. 8; lat. 6 lin. Col. rufus.

#### *Pelia*.

Testa pyriformis, rotundata, antice rostro elongato, apice bifido, terminata. Orbita supra fornicata, externe uniffissa, infra emarginata. Oculi retractiles, globosi, pedunculo crassiores. Antennae interiores in basin rostri insertae. Antennae exteriores rostro haud multo longiores, articulo basilaro longissimo, ad medium rostri attinente, extus unidenticulo; articulis secundo et tertio cylindricis; reliquis setaceis gracilibus.

Pedipalpi externi caule externo semifusiformi; caulis interni articulo primo elongato-rhomboides, secundo trapezoideo, margine integro. Pedum par anticum reliquis paullo crassius, secundo brevius; digitis apicem versus serrulatis, digito immobili ad medium excavato, tuberculum unicum digiti mobilis recipiente: paria quatuor posteriora gracilia, compressa pilosa. Abdomen maris 7-articulatum. Inter *Herbstiam* et *Pisam*.

7) *Pelia pulchella*, fig. 2., ad Gallapagos; Long. 4. lat. 2 $\frac{1}{2}$  lin.

8) *Herbstia edwardsii*, fig. 3. Pedum pare antico inermi. Long. 7., Lat. 6 $\frac{1}{2}$  lin. Col. griseo fuscus.

#### *Thoe*.

Testa subtriangularis, depressa, horizontalis, rostro minimo, apice leviter fesso terminata. Orbita edentata, fissuris tribus inconspicuis. Oculi subretractiles, globosi, pedunculo brevi. Antennae interiores in fossula antice tantum divisa insertae. Antennae exteriores ad latera rostri insertae, rostro triplo longiores, extrorsum pilosae,

articulo basilari latissimo, antice et postice producto. Pedipalpi externi introrsum ciliati, caulis interni articulo primo subrhomboideo, secundo rotundato margine integro. Pedes antici maris reliquis longiores, brachiis supra et externe serie cellularum erosis; manibus laevibus, digitis arcuatis, ad apicem tantum contingentibus: posteriores depressi, lateribus pilosis. Abdomen in utroque sexu 7-articulatum. Affinis *Herbstiae*.

- 9) *Thoë erosa*, fig. 4. ad Gallapagos. Long. 6. Lat. 5 lin. Col. luteo fuscus.

10) *Hyaedwardsii*, fig. 5.: testa antice angustata, post orbitas haud coarctata, pilosa; orbitarum dente interno mediocri; abdominis (maris) articulo penultimo utrinque unidenticulato. Hab. apud Valparaíso et ad Gallapagos. Long. 9. Lat. 7 lin. Col. rufus.

11) *Pisa spinipes*, fig. 6.: testa ovata; dente articuli basilaris antennae exterioris dente supraorbitali longiore; margine antico laterali et pedibus omnibus spinosis. Hab. ad Gallapagos et apud St. Elenam. Long. 8. Lat. 5. lin.

12) *Pisa aculeata*, fig. 7.: testa triangulari, dente articuli basilaris antennae exterioris dente supraorbitali breviore; margine antico-laterali inermi, regione branchiali spinis quatuor armata; pedibus supra spinosis. Hab. ad Gallapagos. Long. 8. Lat. 7 lin. Col. fuscus.

13) *Mithrax rostratus*, tab. 10. fig. 1.: testa spinosa, rostro elongato, bidentato, dentibus divaricatis, ad apicem incurvis, terminata; pedibus spinosis; manibus laevibus. Hab. ad Gallapagos.

Long. 2 poll. 2 lin. Lat. 2 poll. Col. fuscus.

14) *Mithrax ursus*, fig. 2. 3.: testa granulata, verrucoso-tuberculata, rostri dentibus obtusis, granulosis; tuberculis octo pone rostrum, et sex circum orbitas; manibus laevibus. Junior *Cancer ursus* Herbst. I. pag. 217 t. 14. f. 86. Hab. ad Insulas Gallapagos. Long. 2 poll. Lat. 2 poll. Col. purpureus.

15) *M. nodosus*, t. 11. f. 1.: testa trigono-rotundata; margine tuberculis tribus fortibus, rotundatis, et dente unico; rostro brevi; pedipalpi articulo secundo caulis externi irregulariter lunulato; manibus laevibus, supra carinatis; brachiis et carpis tuberculatis; pedibus posterioribus supra spinosissimis et pilosis. Hab. ad Gallapagos. Long. 1 poll. Lat. 1 poll. 3 lin. Col. fuscus.

16) *M. denticulatus*, fig. 2.: testa profunde sculpta; articulo laterali dentibus quatuor obtusiusculis; pedipalpi articulo secundo caulis interni cordato; manibus laevibus; pedibus posterioribus pilosis, spinosissimis. Hab. ad Gallapagos. Long. 5. Lat. 6 lin. Col. plumbeus.

17) *M. pygmaeus*, fig. 3.: testa depressa, rotunda-

ta laevi; fronte obtusissimo lato, obsoleto bilobato; pedibus anticis corpore duplo fere longioribus; manibus laevibus. Hab. ad Panama, Americae centralis. Long. 3. Lat. 3 lin. Col. fuscus.

### *Othonia*.

Testa late ovata, rostro parvo, brevi, bifido, haud deflexo, terminata. Oculi pedunculo elongato, cylindrico, subcurvo haud crassiores. Antennae interiores minutissimae. Antennae exteriores breviusculae, articulo basilari lamellosa, extus dente triangulari armato; secundo compresso cordato, antice emarginato et tertio multo majore; reliquis parvis cylindricis. Pedipalpi externi caulis interni articulo secundo triangulari, extrorsum subproducto.

Pedes mediocres. Par anticum maris . . . ? foeminae reliquis minus, digitis minute serrulatis, digito mobili longiore; paria quatuor posteriora ordine 2. 3. 4. 5. gradatim breviora; digitis subtus minutissime denticulatis. Abdomen maris . . . ? foeminae 7-articulatum.

ſt verwandt der Sippe Micippe.

18) *Othonia 6dentata*, t. 12. f. 1.: testae margine laterali dentibus sex triangularibus acutis. Pitho 6dentata, Bell in Proc. Zool. Soc. Part. III. pag. 172. Hab. ad Gallapagos. Long. 9. Lat. 8 lin. Color.

19) *O. 5dentata*, fig. 2.: testae margine laterali dentibus quinque triangularibus acutis armato. Pitho quinquentata, Bell in Proc. Zool. Soc. Part. III. pag. 172. Hab. ad Gallapagos. Long. 6 lin. Color fuscus.

### *Tyche*.

Testa oblonga, depressa, angulata, antice declivis, fronte lata, rostro bidentato piloso terminata; rostri dentes compressi, obtusi, apicem versus interne emarginati. Orbita supra latissima, in dente prominenti complanato antice producta, infra carens. Oculi pedunculo elongato minores. Antennae interiores in fossula ad basin rostri insertae. Antennae exteriores rostro longiores, articulo basilari latiusculo, antice angustiore; articulo tertio secundo abrupte minore; omnibus externe pilosis. Pedipalpi externi rugosi, caule exteriori subulato, caulis interioris articulo primo canaliculato, extus profunde emarginato, secundo securiformi, tridentato. Pedes antici graciles, simplices, pari secundo breviores, digitis inermibus; posteriores cylindrici, unguibus acutis, curvis, complanatis terminati. Abdomen maris 7-articulatum. Foeminae . . . ?

Affinis *Criocarcino*.

20) *T. lamellifrons*, f. 3. Hab. ad Panama. Long. 7 lin. Lat. 4. Col. fuscus.

21) *Pericera villosa*, fig. 4.: testa depressa villosa, regionibus elevatis, sulcis separatis, spina obtusa laterali utrinque; rostri cornibus validis, sublamelliformibus, divergentibus; dente articuli basila-

ris antennae externae dente supraorbitali multo longiore; antennis exterioribus sub rostro insertis.

Hab. in sinu Quayaquil.

Long. 1 poll. 7 lin. Lat. ead. Col. rufus.

22) *P. ovata*, fig. 5.: testa elongato-ovata, spinis viginti ad viginti quatuor armata; dente supraorbitali dente articuli basilari antennae externae longiore. Hab. ad Gallapagos. Long. 1 poll. Lat. 6 lin. Color rufus.

23) *P. heptacantha*, fig. 6.: testa pyriformi, dorso quinque-spinoso, ordine 1—3—1 lateribus utrinque unispinosi; rostri cornibus parvis, acutis. Hab. ad Americae centralis oras (Puerto Portrero). Long. 1 poll. 5 lin. Lat. 1 poll. Col. fuscus.

24) *Acanthonyx petiverii* ad Gallapagos.

25) *Epialtus dentatus* ad Valparaiso.

26) *E. marginatus*, t. 11. fig. 4. tab. 13.: rostro bifido; dente minimo utrinque ante orbitam; margine laterali marginato, dentibus duobus antice et tuberculis duobus ad latera, quorum posterior obsoletum. Hab. ad Gallapagos. D. Cuming. et ad oras Brasiliae. D. Miller. Long. 4 poll. Lat. 3 poll. 3 lin. Col. fuscus.

Die Abbildungen sind sehr schön illuminiert und meistens mit Zerlegung der Greifwerkzeuge, Füße und Schwänze.

#### V. 67. W. Varrell,

einige Beobachtungen über die Lebensart eines den Rüben (Turnips) schädlichen Kerfs. Taf. 14.

Obgleich das Kerfsammeln Manche wie ein kindisches Spiel erscheint, so gibt es doch Fälle, wo sein Nutzen anerkannt werden muß, besonders dem Ackerbauer. Bekanntlich hat kürzlich auf der Insel Granada ein kleines Kers  $\frac{1}{2}$  des Ertrags vom Zuckerrohr zerstört und seine Verwüstungen auf  $\frac{2}{3}$  der Insel ausgedehnt; im Sommer 1831. sind auf ähnliche Art in England die Rüben zerstört worden; ein Theil von den Larven der *Haltica nemorum* et *concinna*, wie man es in dem Report of the Committee of the Doncaster agricultural Association 1834. lesen kann. Der Verwüster eines großen Theils derselben auf Kreidenboden im letzten trockenen Sommer ist ein anderes Kers, welches zum Glück nur in regenlosen Jahren in Menge erscheint.

Die erste Nachricht davon gab W. Marshall in den *Philosoph. Transact.* 1783. Man mußte im Jahr 1782. mehrere Tausend Aker Rüben umackern. Vor den Raupen sah man eine Menge gelbe Fliegen herumschwärmen, besonders in der Nachbarschaft der Füße von Norfolk, und man glaubte, sie kämen über das Meer her, weil die Klippen zuerst damit bedeckt waren; nachher kamen sie wie Bienenschwärme 3—4 englische Meilen ins Land hinein.

Auch im vorigen Jahre wurden die Süd- und Ostküsten am meisten heimgesucht; sie zeigten sich aber auch zu gleicher Zeit im Innern und sind mithin jetzt einheimisch.

Im July 1835 sah man sie wieder häufig auf den jungen Rüben, und man erinnerte sich, daß dieselbe gelbe Fliege schon 1818 in Menge da gewesen und auf sie die schwarze Raupe gefolgt ist.

Das Weibchen macht mit seiner Legsäge eine kleine Öffnung an der untern Seite des Blattes und legt ein Ei hinein; so nach und nach an verschiedenen Stellen 20 Eier, woraus in 8—10 Tagen eine dunkle Raupe kommt, welche gierig die weichen Theile verzehrt und die Fasern löst. Sie häutet sich nach einigen Tagen und wird graulich. In kurzer Zeit sehen alle Blätter aus wie Besenreis, während die Rüben schon ziemlich groß geworden sind. Dann gräbt sich die Raupe in die Erde und bildet sich mit ausgeschwilter Materie eine starke ovale Hülse.

Die frühern Bruten verwandeln sich sehr bald in Fliegen, die voll Eier sind. Es ist eine Sägfiege, *Tenthredo* sive *Athalia centifolia* Panz., welche Stephens so beschreibt (*Illustrations of british Entomology* p. 42): Kopf und Fühler schwarz, Mantel gelblich, Brust gelb mit einem schwarzen dreieckigen Flecken jederseits, der sich bis zur Mittelbrust erstreckt; Bauch blaßgelb, Wurzel des ersten Ringels schwarz, ebenso die Spitze der Legröhre; Füße blaßgelb. Spitze des Schienbeins und eines jeden Sehengliedes schwarz; Flügel an der Wurzel blaßbraun, übrigen farblos, Adern dunkelbraun; Costa et Stigma schwärzlich. Länge des Leibes 3—4 Linien, Flugweite 7—8. \* Die Raupe ist  $\frac{1}{2}$ — $\frac{5}{8}$  lang, so dick wie eine Rabenfeder. Kopf und obere Seite fast schwarz, an den Seiten ein hellgrauer Streifen, 6 gegliederte Füße und 8 Paar Hautfüße. Am 16. Nov. hatte sich die Raupe in dem Gespinnste noch nicht verändert; das letztere war innen glatt und silberweiß.

In den Grafschaften Kent, Essex, Sussex, einem Theil von Buckinghamshire, Hampshire und Wiltshire hatten die Rüben ganz fehlergeschlagen und die verschiedenen Bruten zerstört auch die zweite und selbst dritte Saat; das Uebel hörte erst bei dem Regenwetter im Sept. nach dem trockenen Sommer auf. Einige Pächter säeten nach dem ersten Regen noch einmal und bekamen noch etwas. Solche Rüben, deren Blätter gelitten hatten, aber doch nicht soviel, daß die Pflanze starb, wurden preßig und fast unbrauchbar. Der Ertrag war an der Küste so gering, daß man ganze Schiffsladungen vom festen Lande holen mußte.

In Kent trieb man anfangs Hunderte von Enten in die Felder und ein Knabe schlug mit einer Stange die Raupen von den Blättern; sie wurden gierig von den Enten aufgefressen. An andern Orten zog man des Abends, wo die Raupen

\* Kirby setzt hinzu: Fabricius hält *A. centifolia* für *Hydrotoma spinarum*, und bemerkt von der letztern: *Larva tota nigra victitat in Brassica rapa, quam destruit.* Sind beyde verschieden, wie Stephens meynet, so würden ihrer 2 die Rüben zerstören; beyde kommen bey und vor. Sie sind aber einander ganz ähnlich und nur durch die Farbe der Fühler unterschieden, was aber sehr wechelt, und daher hält sie Kirby für einerley. Bey meinem Exemplare sind die Fühler der abgebildeten Männchens unten schwammig gelb.

fragen, eine schwere Waise über die Felber. Das wirksamste aber war das Aufstreuen von geranntem Kalk, das man erneuerte, wann ihn der Wind weggeweht hatte. Dadurch soll ein Feld bey Dover gerettet worden seyn, obgleich es ringsum von Feldern umgeben war, welche zu Grunde giengen.

Abgebildet ist ein angestoffenes Blatt mit Raupen, die Puppe, Hülse und Fliege. Die Larve einer Mücke (*Musci-deae*) lebt als Schmaroger in diesen Raupen.

#### VI. S. 71. E. Rüppell,

über eine neue Gattung *Histiophorus* aus dem rothen Meer. T. 15.

Cuvier und Valenciennes haben VIII. p. 293 beschrieben *Hist. indicus, americanus et pulchellus*; der meinige von Djebba an Arabien nähert sich dem zweyten; er wurde in einem Netze gefangen, ist aber selten. Der *Hist. indicus* unterscheidet sich durch lange und starke Brustflossen, deren erster Strahl sehr groß und schneidend ist,  $\frac{1}{2}$  der Leibeslänge; *H. pulchellus* durch einen Stachel am untern Winkel des Vorderbeckens; beyde und *H. americanus* haben die erste Rückenflosse gefleckt; der meinige ganz schwarz und halbkreisförmig ausgeschnitten, daher nenne ich ihn *H. immaculatus*. Der Leib langwalsig, senkrecht niebergebrückt, Schwanzflosse stark mondförmig. Erste Rückenflosse, welche gleich hinter dem Kiemenbeckel entspringt, besteht ganz aus einfachen Strahlen, der 18te der längste, 3mal so lang als der Leib hoch; dann nehmen sie ab bis zum letzten, 47sten, welcher an die zweyte sehr kleine Flosse stößt; diese ist sehr niedrig und besteht aus 7 verzweigten Strahlen. Darunter steht die zweyte Streifflösse, jener ganz gleich; davor die erste aus 10 einfachen Strahlen. Die Bauchflossen unter den Brustflossen bestehen aus 3 ungegliederten Strahlen; der erste sehr kurz, der zweyte sehr lang, reicht bis zum After; der dritte so kurz als der erste. Brustflossen klein. Haut mit kleinen abfälligen Schuppen bedeckt.

P. 1 + 19. V. 3 + 0. D. 47 + 0, 0 + 7. A. 10 + 0, 0 + 7. C. 5 + 17 + 5. M. B. 7.

Kopf und Rücken dunkel violettblau, Bauch silberglänzend, Iris hellbraun, um das Sechloch ein gelber Ring, Brust- und Streiffllossen grau, die andern bläulich schwarz; an der untern Spitze der ersten Streifflösse ein schwarzer Flecken.

Am Rande der Kiefer ein Band feiner Körner, die man Sammetzähne nennen könnte; hinten im Gaumen jederseits ein kleines Band feiner Körner; Zunge und Kiemenbögen glatt.

Von meiner ersten Reise ans rothe Meer habe ich fast an 100 neue Fische beschrieben und abgebildet; bey meiner 2ten an demselben Meer fast ebensoviel entdeckt, und doch bekam ich keine aus der Tiefe, weil die Fischer nicht darauf eingerichtet sind.

Die Abbildung stellt den ganzen Fisch vor, in der Länge gegen 1', die Höhe über 3". Die Größe ist nicht angegeben, kann aber nicht bedeutend seyn, da der Fisch in Brantwein ist.

(Die Fortsetzung folgt.)

### The Edinburgh

new Philosophical Journal by R. Jameson. vol. XVI—XX.  
(Fortsetzung von der Jhs 1834 S. 998.)

Band XVI. Nr. 31. 32. October 1833 — April 1834.

S. 38 R. E. Grant, fossiler Zahn im rothen Sandstein in Berwickshire; wie der Eckzahn eines Wolfes.

67 Kiernz, Bemerkungen über die Zigeuner (*Gypsies*), seyen Paria aus Asindien.

137 W. Nicol, über den Bau der lebenden und versteinerten Coniferen. S. 369.

175 Graham, seltene Pflanzen.

181 Knor, Zerlegung eines Morquais. Länge 80', Kopf 23, Umfang 34, Schwanzbreite 20, Gaumenbreite 11', enthielt über 1000 Fischbeintafeln; an einer Seite sieht man über 650. Das Skelet wiegt 32 Tonnen, das Hirn 50 Pfd. Kehlkopf ganz einfach und verschieden von dem des Delphins; die Naslöcher mit 2 ungeheuern Knorpelmassen ausgefüllt, welche durch Muskeln in der Mitte des Dberkiefers in Bewegung gesetzt und beim Athmen auf die Seite gezogen werden.

192 Hibbert, versteinerte Zahn wie vom Gavial. Fig.

316 J. Coldstream zu Leith, über den Bau und die Lebensart von *Limnoria terebrans*, eine kleine Krabbe. Tafel 6. (Jhs Tafel I.)

Dieses kleine krabbenartige Thier lebt im Meer an der Küste und grabt sich über 2" tiefe Höhlen in Holz, worinn es sehr viel Schaden anrichtet, weil es sehr zahlreich ist. Da es nach allen Seiten bohrt, so spielt das Wasser Lage nach Lage ab, bis das Holz ganz zerstört ist. Seine Verwüstung wurde zuerst vom Ingenieur Stevenson bey der Errichtung des Leuchthurms von West-Mode bemerkt; ganze Holzstämmen, die man zu Verarbeiten brauchte, wurden in sehr kurzer Zeit durch sein Bohren gänzlich zerstört.

Er schickte Exemplare 1811 an Dr. Leach, welcher sie unter dem Namen *Limnoria* zu den Aselliden stellte (*Linnean Transact. XI. 370.*), später zu den Tisopoden mit stiellosen Augen, Palpen an den Oberkiefern, ohne Anhängsel an den Füßen neben *Eurydice* et *Cymothoa*. Latreille und Lamarck stellen sie unter die letzte Sippe, allein diese besteht aus Thieren, welche als Schmaroger auf den Walen und Fischen leben, Blut saugen und sich sonst noch unterscheiden, obgleich sie in der Gestalt der *Limnoria* gleichen.

Seitdem hat man sie auch an vielen andern Küsten von England gefunden, wo sie ebenfalls an verschiedenen Plätzen den Pfählen sehr schädlich sind: dennoch haben die Naturforscher sich noch nicht viel um sie bekümmert.

Länge  $1\frac{1}{2}$ ", Breite  $\frac{1}{10}$  oder fast  $\frac{1}{2}$ "; es gibt aber auch zwey Linien lang und verhältnißmäßig breit. Das Weibchen ist  $\frac{1}{3}$  größer. Färbung oben blaß graulich braun; einige am Kopf dunkel gestreift. Bauch und Füße fast weiß. Leib ziemlich durchscheinend. Die Gestalt, Fig. 1., ist halbwalsig, oben gewölbt, unten etwas hoch, vorn und hinten abgerundet. Das ganze Thier besteht aus 14 Gelenken, wovon eines der

Kopf, die 7 nächsten tragen die Füße, die übrigen 6 machen den Schwanz. Kopf schmaler als die andern, das fünfte am breitesten, das zweite, dritte, vierte und fünfte fast gleich lang; die folgenden 6 [so] viel kürzer; die 2 letzten Abtheilungen des Schwanzes sind unter allen die längsten. Der Kopf ist fast kugelförmig und trägt 4 Fühlhörner, 2 Augen und die Organe des Mundes. Von den 7 fußtragenden Ringeln haben 4 auf der Bauchfläche Schuppen, welche eine Art Sack bilden, worin die Jungen einige Zeit nach dem Auskriechen aus dem Ei getragen werden. Die Schwanzringel haben auch an der Bauchseite 6 Paar schuppenartige Anhängsel in 3 Reihen und 2 Paar Griffel, welche jederseits unter dem letzten Ringel hervortragen. Der Rücken mit steifen, gesteckten Haaren bedeckt, länger als die andern kleinen Crustaceen. Unter diesen Haaren sind zahlreiche kleine Scharroter fast wie *Echinorhynchi* und *Acari*. Sie sitzen auch an den Kiemen.

**Anatomie.** Die Cruste der Ringel ist ziemlich weich, aber kalkartig, härter und spröder am Kopf, bräunt etwas im Säure. Die Anhängsel unter dem Schwanz dienen zum Schwimmen, müssen aber als Athemorgane betrachtet werden. Die 7 Fußpaare hängen unter dem Rande der Rückencruste und sind fast ganz unter den Bauch geschlagen. Sie bestehen aus 4—6 Gliedern. Das fünfte und sechste Paar sind am längsten. Das erste Paar ist  $\frac{1}{2}$  Linie lang und hat 4 Glieder, wovon das erste das längste, das zweite hat an der untern Seite eine Reihe Höcker; die Klaue ist stark und scharf.

Das zweite Paar ist kürzer und dicker und hat nicht so starke Höcker. Das 3te und 4te ebenso; das 5te schlanker aus 6 Gliedern, wovon die 2 ersten länger. Das 6te und 7te Paar ebenso, aber etwas kleiner. An allen ist nur eine Klaue die etwas hakenförmig. Alle sind ferner schwach behaart.

Die 4 Fühlhörner liegen vorn am Kopf, die obern nahe an einander fast in der Mitte, die untern mehr nach außen; jene viergliederig mit langen Endborsten; diese fünfgliederig, etwas länger als die andern aber mit kurzen Borsten.

Augen an den Seiten schwarz, zusammengesetzt aus 8 Kügelchen, wovon eines in der Mitte; wenig vorragend. Die Griffel hängen unten am letzten Ringel, jederseits 2 auf einem gemeinschaftlichen Stiel; der äußere kurz, 3 oder 4gliederig, der andere 2gliederig mit langen Borsten.

Zwei Paar Unterkiefer (Jaws), ein Paar starke Mandibeln, 4 röhrenförmige Organe mit der Speiseröhre in Verbindung, ein Magen und ein Darm. Die Unterkiefer sind mit ihrem hintern Rand an das Corcelet articuliert; die äußeren 2gliederig, wovon das eine Glied seitwärts liegt und nichts zur Bildung des Mundes beiträgt. Das andere ist am Grunde schmal, wird breiter nach vorn; sein innerer Rand gerade und einschlagen, so daß die Fläche, welche den Mundspalt begränzt, breit ist. Alle Kiefertheile sind behaart. Die innern Unterkiefer sind einfach und haben eine lang viereckige Gestalt mit kleinen Borsten am Ende.

Die Mandibeln liegen schief und so, daß ihre scharfen Spitzen über den Kopf hervortragen, wenn sie seitwärts bewegt werden: jeder hat zwei scharfe und harte braune Spitzen, wovon die eine innenwärts steht und an die entsprechende des andern Kiefers stößt, die andere auswendig und gerade nach vorn

gerichtet. Sie sind  $\frac{1}{6}$  Lin. lang, ihre Spitzen ganz glatt und tragen in der Mitte eine dreigliederige Naife. Diese Mandibeln sind ohne Zweifel das bohrende Organ, und man kann leicht begreifen, wie kräftig sie, ungeachtet ihrer Kleinheit, wirken können. Sie haben übrigens weniger Eigenthümlichkeiten in der Gestalt und dem Bau, als man bey einem Thier erwarten möchte, dessen Lebensart von der der andern Crustaceen so verschieden ist. Hier ist durch eine geringe Veränderung im Bau das Organ zu einem ganz abweichenden Zweck tauglich geworden. Nicht durch Bildung neuer Organe wird eine neue Verrichtung erreicht, sondern oft bloß durch eine schwache Aenderung der Gestalt eines schon vorhandenen Organs.

Innerhalb der Mandibeln glaube ich einigemal etwas zu sehen, was mit wie trichterförmige Lippen vorkam, welche zum Saugen dienen könnten; im Kopf hängen an der Speiseröhre 4 Röhren, welche bis zum vierten oder fünften Ringel sich erstrecken, 2 länger als die andern, angefüllt mit einer zähen, durchsichtigen Substanz, untermischt mit kleinen Theilchen; bisweilen zeigen sie sich geringer. Ähnliche findet man bei den *Oniscus asellus* (Slater), wo sie aber nicht gerade, sondern wellig sind. Sie scheinen den Speichel- oder Gallengängen in den Käfern zu entsprechen. Der Magen liegt im ersten Leibestriegel  $\frac{1}{6}$  so weit als die Breite des Leibes und mit gelblichweißer Materie angefüllt; er steigt bis zum sechsten Ringel herunter, schlägt sich um, wird dünn oder zum Darm, der sich wieder am fünften Ringel erweitert. Der Darm läuft sodann gerade ins letzte Ringel; er ist ebenfalls mit gelblichem Brei ausgefüllt.

Gefäße konnte ich keine bemerken, auch nicht mit der besten Vergrößerung einen Blutlauf sehen.

Die Athemorgane bestehen aus 6 Paar schuppenartigen Körpern, welche von den vordern Schwanzringeln herabhängen, 3 Paar nebeneinander; die äußern oval, die innern länglich viereckig, beyde mit bewimperten Borsten am Rande. Die ovalen haben strahlige Linien von ihrer Mitte aus, und dazwischen sieht man zahlreiche Körner. Die 3 Paare dieser Kiemen decken sich wie Ziegel und jedes ist an einen gemeinschaftlichen Stiel eingelenkt.

In der Schwanzhöhle hinter den Kiemen liegen 2 ovale Bläschen an einem gemeinschaftlichen Stiel voll rundlicher Körner bey Männchen und Weibchen.

Die Eier schwimmen zu einer gewissen Zeit in einer Flüssigkeit in der allgemeinen Leibeshöhle (vielleicht in dünnen Säcken längs den Seiten). Das Weibchen trägt die Jungen in einem Beutel von Schuppen, welche vom dritten, vierten und sechsten Ringel herunterhängen. Öffnet man das Thier, so dringt Flüssigkeit heraus, und darinn unzählige Kügel  $\frac{1}{100}$ — $\frac{1}{4000}$  Zoll; gerade so wie bey vielen Meerwürmern. Erygänge habe ich keine gefunden, aber oft im Herbst und Frühjahr junge im Bauchbeutel, der aus 8 oder 10 ovalen Schuppen besteht, deren Ränder zusammenhängen, vielleicht durch eine innere Membran, welche den Sack überzieht. Ich habe darinn 5, 6, 7 und 9 Junge gefunden, schon weit entwickelt, aber ohne Lebenszeichen; Kopf und 6 vordere Ringel größer als bey dem alten, Fühlhörner und Augen deutlich, Kiefer, Kiemen und Füße hängen los herunter und sehen ziemlich alle wie Füße aus.



## Verrichtungen und Lebensart.

Berührt man sie, so kugeln sie sich fast ganz zusammen wie *Armadillo vulgaris*, *Sphaeroma serrata*, *Typhis ovoides*. Beim Kriechen bewegen sie die untern Füßhörner nach allen Richtungen; die obern aber sind über den Kopf geschlagen.

Sie kriechen sehr langsam vor- und rückwärts, schwimmen aber schnell, indem sie mit den Schwanzblättern rudern; bisweilen schießen sie auch 1 oder 2' vorwärts durch einen Ruck mit dem Schwanz. Oft schwimmen sie in Kreisen, den Kopf nach unten, und bisweilen sind die Kreise so eng, daß sie sich wie ein Wirbel zu drehen scheinen.

Die Nahrung besteht ohne Zweifel in dem abgenagten Holz. Denn man sieht nie Sägmehl aus der Höhle kommen, während das Thier bohrt; ich sah es nie andere Substanzen angreifen; der Inhalt des Magens sieht wie Sägmehl aus. Das Thier macht mirhin eine Ausnahme von den andern Crustaceen, welche alle Fleisch fressen sollen.

Sie greifen verschiedene Holzarten an, Fichten, Eichen, Black birch und anderes.

Man hat ihnen Lerchholz vorgelegt; das war das einzige, das sie nicht durchbohrten. Man hat nie bemerkt, daß sie fliegendes Holz anrühren, sondern nur feststehendes an der Kiste und zwar oft so hoch, daß sie bey der Ebbe ins Trockene kommen.

Zuerst greifen sie die weichen Holzstreifen zwischen den härtern Jahrringen an, bohren so tief hinein als ihr Leib ist, dann aufwärts unter einem Winkel von 45°, immer in der weichern Lage. Dabey scheinen die Mandibeln das Hauptwerkzeug zu seyn. Stellt man ein Stück mit diesen Thieren angefülltes Holz in ein Glas mit Seewasser und schneidet mit Vorsicht soviel ab, daß man das Thier sehen kann; so bemerkt man, daß es den Mund an das Holz legt und mit Hilfe der Füße den Leib dreht. Die Gänge gehen zwar meistens nach oben, oft aber auch schieblich und bisweilen senkrecht auf- oder abwärts. In der Regel sind jedoch die Gänge hin- und hergeschlungen. Sie sind walzig,  $\frac{1}{20}$  —  $\frac{1}{15}$  Zoll weit und so durchaus, was anzugehen scheint, daß die Thiere, sowie sie größer werden, ihre alten Werke verlassen und neue anfangen. Ihre Wände sind ganz glatt und endigen selten mehr als 2' von der Oberfläche des Holzes. Man bemerkt nirgend eine besondere Art von Lebensmittel. Die harten Holzringe und Zweige bleiben stehen. Obgleich die Gänge oft sehr nahe zusammen sind, so öffnen sie sich doch selten in einander. Im Wasser bewegen sich die Kiemen beständig und langsam 20 — 30mal in der Minute von und zu der Bauchfläche, wodurch ein Strom entsteht, so lang als der Leib. Hindert ein Stückchen Straub die Kiemen, so schaffen es die Hinterfüße weg. Beim Schwimmen bewegen sich die Kiemen viel schneller, und die Ströme sind viel länger, eben so in süßem Wasser, worin sie mehrere Stunden leben. Werden die Bewegungen der Kiemen schlaff, so dauern nur die der innern Reihe fort. Außer dem Wasser bewegen sie sich sehr langsam, leben aber mehrere Stunden. Die Kiemenblättchen rühren sich nicht.

## Geschichte der Verwüstung.

Der vorläufige Leuchthurm bey Wellrock stand auf 12

großen Fichtenstämmen in Löchern, die man für sie in Felsen gehauen hatte: sie waren an den Seiten verbohrt und verpicht; ihre Sohle aber hat man bloß gelassen, weil sie dicht am Felsen anlag.

Im zweyten Sommer der Arbeit, nemlich 1808 fand man die Ränder dieser Pfosten verdorben, und Stevenson entdeckte die Thierechen in ihren Löchern. Nachher fand man auch die Fichtenstämme der vorläufigen Eisenbahn sehr beschädigt. 1807, wo man sie legte, waren sie 10' stark, 1811 nur noch 7, mithin wurden sie jährlich um 1 Zoll dünner. Bald nachher fand Stevenson auch die hölzerne Brücke von Montrose durchbohrt, daß Einsturz drohte. Man beschlug daher die neuen Pfeiler mit Kupfer; dasselbe fand er an den Schlußenthoren am Grinan-Canal; sie ließen in einer Nacht 7' tief Wasser durch.

Der letzte, mir selbst bekannte Fall von Verwüstung ist bey dem Trinity Zimmerplatz in der Nachbarschaft, wo die Pfeiler dieses nützlichen Bauwerks im J. 1825, 4 Jahre nach ihrer Einrammung, so zerstört waren, daß man sie mit großen Kosten wegnehmen und mit neuen ersetzen mußte. Sie waren ursprünglich 12' stark oder 48 im Umfang, und in dieser kurzen Zeit wurden sie so zerstört, daß der Umfang nur noch 6" betrug und die geringste Gewalt sie zerbrechen konnte.

Von dieser Zeit an zogen diese Thiere die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich, und es wurden viele Vorschläge dagegen gemacht. Nach 2 — 3jährigen Versuchen fand man das Beste, die Pfähle unter Wasser mit Nägeln mit sehr breiten Köpfen dicht zu beschlagen. 4 Jahre nachher wollte man den Zimmerplatz von Leith auf Pfeilern erweitern; jeder Pfahl kostete 1000 Pf.; alle 30,000. Bis jetzt, nach 4 Jahren, hat das Thier keinen dieser vernagelten Pfähle angegriffen, während anderes auch hängendes Holzwerk für Schubkarren und dergleichen schon fast gänzlich zerstört ist. Dasjenige, welches nur 2' stark war, ist fast ganz abgefressen.

Das war der Fall selbst ganz nahe an Nägeln und Ringen; die Gänge waren manchmal nur einige Linien davon entfernt; die vernagelten Pfeiler blieben jedoch unverfehrt. Der Grund liegt nicht in der entstehenden Rinde von Rost: es blieben einige Pfeiler ohne dieselbe, und dennoch wurden sie nicht angegriffen. Vielleicht schmedt den Thieren der Rost nicht, der sich bald um die Nägel bildet; indessen scheint er nicht tödtlich auf sie zu wirken. Ein Pfahl, der nur auf 3 Seiten vernagelt war, war ganz zerfressen und es blieben nur die 3 vernagelten Wände stehen, soweit nemlich die Nägel und der Rost reichten.

Diese Fälle beweisen, daß das schädliche Thier sehr zahlreich an den schottischen Küsten ist. Es findet sich aber auch an den englischen, an Frankreich und den Niederlanden.

Fig. 1. Rücken der *Limnoria* 10mal vergrößert.

— 2. Bauch.

— 3. Querschnitt des zweyten Ringels mit dem ersten Fußpaar;

— 4. drittes;

— 5. fünftes;

— 6. obere Füßhörner;

— 7. untere;



- Fig. 8. Kopf von der Seite;  
 — 9. beyde Kieferpaare;  
 — 10. inneres;  
 — 11. Mandibeln;  
 — 13. ein Schwanzringel mit 2 Paar Kiemenblättern.  
 — 18. Fötus von der Seite.

Nachtrag in Band XVII. S. 340.

Ich sagte daß die Verwülstungen zuerst 1809 wären bemerkt worden; nun finde ich aber in Band 22. 1783. des *Journal de Physique*, daß Dictionnaire schon einen Bericht über die Zerstörungen eines Crustaceenartigen Thiers bey Havre de Grace gegeben hat, woraus hervorgeht, daß es *Limnoria terebrans* war. Er sagt:

Ich habe die steinzerstörenden Meerthiere, welche uns zwingen, die Schließungen zu erneuern, bereits beschrieben. Es gibt aber auch welche, die alle Arten von Holz fast auf dieselbe Weise zerbohren. Man hielt in einem Becken Fichtenstämme, woraus man Masten machen wollte. Vor einigen Jahren bemerkte man, daß die weichen Theile  $1\frac{1}{2}$  tief von Meer-Insecten durchbohrt waren, so daß der Durchmesser um 3" vermindert wurde. Später hat man das Holz in die Bestungsgräben gebracht. Nachher fand ich an alten Fischerplätzen Stämme von Aeschen, Rüstern und selbst Eichen angegriffen, und ich sah die Thierchen bey Hinnwegnahme der Oberfläche des Holzes. Ich nahm einige aus ihren Löchern und setzte sie in frisches Holz in Meerwasser, in welches sie sich binnen 12 Stunden einbohrten. Dann wird das Thierchen beschrieben. Die Eyer und Jungen kämen aus einer dreyeckigen Oeffnung in der Mitte des Bauchs.

## Band XVI.

334. Quetelet, über das Gewicht der Menschen. Brüssel 1833. 4. 43. Vollständige Tabelle nebst Alter und Größe. Neugeborene Kinder wägen 7 Pfd., einjährige 21; 3jährige 27; 6jährige 39; 10jähr. 54; 15j. 88; 16j. 109; 20j. 132; 30 bis 50j. 140; 60j. 136; 70j. 131; 80—90j. 127. Das männliche Geschlecht wiegt immer etwas mehr als das weibliche. Um die Last auf einer Brücke zu berechnen, muß man den Mann auf 98, die Frau auf 93 Pfund anschlagen.

367. David Don, Pflanzen, welche die Cascarillarinde liefern. Mehrere Arten von *Eroton*, aber sonderbarer Weise nicht *Cr. cascarilla* L., sondern *Cr. eluteria*. Sloane Jamaica II. E. 174. §. 2.

Man bekommt aber die Rinde nicht aus Jamaica, sondern von der spanischen *Terra firma* in der Provinz Vera Cruz und Mexico, wo sie Copalche oder Quina genannt wird von Schiele und Deppe entdeckt worden ist. Der Baum ist aber etwas verschieden von *Cr. eluteria*, 25—30" hoch und hat herzformige, scrippige Blätter. Ich möchte sie *Cr. cascarilla* nennen und der linneischen *Cacarilla* Jacquins Namen *Cr. linearis* lassen.

Bd. XVII. Nr. 33. 34. April—Octob. 1834.

150. D. Don, neue Anordnung der Ericaceae. *Ericaceae*, *Rhodoraceae*, *Vacciniaceae*, *Pyroleae*, *Monotropeae*, *Epacridae*.

S. 177. Traill, über einige Dinge bey den Cetaceen.

Bekanntlich entstand in der Pariser Academie Streit über ihre Euter.

Aristoteles sagt: die jungen Delphine werden von ihren Müttern mit Milch ernährt und schwimmen mit ihnen herum. Plinius sagt: *nutrunt uteribus sicut balenae. Quin et adultos diu comitantur; magna erga parvum charitate.*

Daß sie Euter haben ist unsern Grönländsfahrern so wohl bekannt, daß ich nie einen Zweifel darüber gehört habe; sie sagen: die Milch fließt aus dem Euter, sobald man es drückt.

Scoresby sagt von *Balaena mysticetus*: die Euter beym Weibchen liefern die Mittel zum Aufbringen des Jungen. Sie liegen am Bauche an jeder Seite der Geschlechtsöffnung und sind zween Schuh von einander; scheinen nicht über 2" weit hervorgetrieben werden zu können; beym todtten Thier stehen sie immer hervor. Die Milch fließt aus wie die der vierfüßigen Thiere; sie soll fett und schmachhaft seyn. *Arctic regions* I.

Ich habe verschiedene Delphine untersucht und kann versichern, daß die Weibchen Euter haben mit Warzen, welche Milch absondern.

1809. beschrieb ich nach J. Watsons von Orkney Zeichnungen und Notizen einen neuen Delphin, unter dem Namen *Delphinus melas* (Micholsons Journal XXII.), später unter dem Namen *Delphinus deductor*, weil sie sich zusammenschlaaren und einem Führer folgen (*Scoresby's arctic Regions*); daß das Junge saugt, ist bemerkt, aber kurz, weil damals niemand daran zweifelte. In Watsons Papieren, die ich besitze, ist es mehr bestätigt. Er hat eine Heerde von 92 Stück, die an den Orkney-Inseln strandeten, beobachtet.

In einem Brief von 1807 schrieb er: am 13ten Dec. wurden 92 Delphine getödtet; sie waren von verschiedener Größe, 5—20" lang, und die kleinen hatten keine Zähne und saugen an ihren Müttern.

Eine andere Person, welche dabey war, erzählt mir in diesem Augenblicke folgendes: „als die Wale in der Scheyppbay an den Strand getrieben waren, schwärmten die Jungen um ihre Mütter herum, bis die Ebbe sie ebenfalls auf dem Trocknen ließ; während dieser Zeit sah ich einige davon an den Zitzen ihrer Mütter hängen. Wurden sie weggenommen, so floß die Milch in großer Menge aus den Zitzen. Sie war weiß und während des Fließens von der Dicke dünner Rahmlich; bey'm Stehen schien sich Rahm oben auf zu legen.“

Bey'm Herumgehen zwischen den Thieren sah ich hin und wieder Lachen von Milch. Das Winseln der Mütter erregte Mitleiden, besonders als ihnen das Junge genommen wurde. Dieses veranlaßte einen meiner Bedienten, ein kleines aufzuheben und es an die Zitze zu legen, die es sogleich anfaßte. Ich erinnere mich nicht, daß ich es wirklich saugen sah, aber es ergriff die Zitze mit seinem zahnlosen Maul, und ich hielt dafür, daß es sauge.

Dieses sahen Hunderte von Menschen, unter denen ich keinen fand, welcher über das Milchgeben dieser Delphine eine andere Meynung gehabt hätte.“

In Watson's Papieren finde ich noch Folgendes,

„Das Auge,  $2\frac{1}{2}$ “ lang und  $\frac{5}{8}$  breit, steht 18“ hinter der Schnauze, zwischen den Augen ist das Spritzloch mondförmig,  $4\frac{1}{2}$ “ lang, 2 breit. Länge des Thiers 20“, Umfang  $11\frac{1}{2}$ ; Brustflossen  $5\frac{1}{2}$  lang, 15“ breit; Schwanz  $5\frac{1}{2}$ “ breit, 2 tief.

Bähne kegelförmig  $1\frac{1}{2}$ “ lang, etwas einwärts gebogen, in jedem Kiefer 24.“

Es scheint mir, daß der kürzlich von den Franzosen beschriebene *Delphinus globiceps* mein *Delph. deductor* sey.

In meiner Abhandlung steht: die Brustflossen sind 6 — 8“ lang; soll heißen 4 — 6. Ein anderer in Scoresbys Werk maß  $19\frac{1}{2}$ “; die Brustflossen nur  $3\frac{1}{2}$  lang,  $1\frac{1}{2}$  breit. Die Hörner des Spritzloches vorwärts.

Scoresby hat *Balaena rostrata* beschrieben mit Maßen von Watson nach einem gestrandeten. Scoresby gibt den Umfang auf 20“ an; in Watson's Papieren finde ich nur 10. Ihre Barten sind weißlich, bei andern Gattungen dunkelbraun.

189. Graham, seltene Pflanzen.

260. Walker-Arnott, neue Pflanzensippen.

342. K. Karlan, kritische Bemerkungen über die versteinerten Knochen in Nordamerika (aus Trans. geol. soc. of Philadelphia 1834.).

*Mastodon giganteum s. maximum.*

*Tetracaulodon* sey nichts anders als ein junger *Mastodon*. *Elephas primigenius*, *Tapirus mastodontoides*. *Equus caballus*, *Rhinoceros alleganiensis*. *Megatherium cuvieri*. *Megalonyx jeffersonii*, *laqueatus*, *Cervus americanus*. *Bos bombifrons*, *latifrons*, *pallasii*, *Trichecus rosmarus*. *Manatus*. *Cetacea*.

*Aves*; *Scolopax*.

*Chelonia*.

Fortssetzung. XVIII. p. 28.

*Crocodilus macrorhynchus*; *Plesiosaurus*; *Basilosaurus*; *Ichthyosaurus missouriensis*; *Mosasaurus*; *Geosaurus*; *Sauropscephalus lanciformis*, *leanus*; *Sauropscephalus*.

*Ichthyolitha*.

*Carcharias*; *Esox*; *Sphyrina*; *Palaeothrissum*.

## Band XVII.

363. Traill, über den Bau und die Einrichtung der Milchdrüsen der Wale.

Geoffroy St. H. glaubt, man könne unter dem Wasser nicht saugen, weil beim Schlucken Luft durch die Nase in den Mund kommen müsse.

Ich versuchte sogleich mit zugehaltener Nase zu saugen und zu schlucken, was ohne alle Schwierigkeit gieng; auch wenn man das Gesicht mit der Nase unter Wasser steckt.

Um aber die Sache so ähnlich als möglich dem Saugen der Wale unter Wasser zu machen, nahm ich eine Blatter mit

einer halben Pinte Milch mit einer Glasröhre, über welche die Röhre einer Kuh gezogen war. Damit setzte ich mich in ein Bad, tauchte den Apparat und meinen ganzen Leib unter, und fand, daß ich saugen und schlucken konnte sogar wie in der Luft. Die Schwierigkeit war so gering, daß ich die Röhre abzog und alle Milch während 4 Untertauchungen ohne alle Anstrengung ausgoß und verschluckte. Wenn das der Fall bei einem Menschen ist, der nicht länger als eine halbe Minute unter Wasser aushalten kann, wie sollen wir zweifeln, daß Wale, welche 15 bis 20 Minuten aushalten, saugen und schlucken wiederholt ausführen können? Damit man nicht etwa sage, es wäre ein Fehler vorgegangen, so will ich bemerken, daß Dr. Cumming von Ghesler dabei gegenwärtig war. Sept. 1834.

## 380. Agassiz, über die Lachse.

Die Clupeae sind mit den Salmones zu vereinigen, weil der einzige Unterschied in der Fettflasse liegt, ein zu unbedeutendes Organ, das ohnehin bei mehreren Sauriden fehlt, auch manche Lachse, z. B. *Serrasalmu*, *Myletes*, Strahlen in der Fettflasse haben. Bei den Lachsen ist der Rand des Oberkiefers gebildet durch das innere und obere Kieferbein, und bildet einen einfachen fortlaufenden Bogen, wie bei den höheren Thierklassen, was man nur noch bei den Clupen findet. Die Färbung der Lachse ändert sich mit dem Alter und auch nach den Jahreszeiten. Alle Gattungen von *Salmo* lassen sich auf 6 zurückführen.

*Salmo umbla* Linn. ist der Char in England; *Ombre chevalier* des Genfersees, Kösteli der deutschen Schweiz, Schwarzreiter von Berchtesgaden, *Salmo salvelinus*, *salmarius*, *alpinus* Linn. non Bloch.

2. *Salmo fario*, Trout of brooks, Common trout, Gillaroo-trout, Par, *Salmo sylvaticus* Schrank, *alpinus* Bloch, *punctatus* et *marmoratus* Cuvier, *erythrinus* Linn.

3. *Salmo trutta*, Sea trout, Salmon trout, *Salmo lemanus* Cuv., *albus* Rondelet.

4. *S. lacustris*, *S. schiffermuelleri* Bl., *S. illanca*.

5. *S. salar*, The True Salmon. *S. hamatus* Cuv. ist der alte *S. goedenii* Bl. jung.

6. *S. lueho* nur in der Donau.

411. Graham Dalzell, über die Fortpflanzung schotischer Poophyten. (3tes Taf. I.)

Eine *Actinia equina*, die ich hielt, brachte in 6 Jahren über 276 Junge hervor. Die Embryonen zeigen sich zuerst in den Spitzen der Füßfäden, von wo sie können eingezogen und zuletzt aus dem Mund getrieben werden während starker Compression der Mutter; als eine Spitze mit ihrem Embryo abgeschnitten wurde, begann derselbe nach 14 Monaten Junge hervorzubringen, und lebte 5 Jahre. Sie haben nicht bloß eine Oeffnung, sondern man sieht Wasserstrahlen aus den Füßfäden der *Actinia crassicornis* strömen, und jeder der 13 oder 14 Höcker der *Actinia equina* öffnet sich und entleert purpurfarbene Floden, nachdem das Thier gefressen hat.

2. *Hydra tuba*, neue und größte Gattung 2“ lang, schwebt mit seinen langen, weißen Füßfäden, wie ein feiner Pinzel im Wasser; pflanzt sich fort durch Knospen an den

**Seiten.** In 13 Monden hatte ein einziges Stück 83 Nachkommen und dann sehen sie sehr sonderbar und verzerrt aus, so lange sich nemlich die Knospen noch nicht abgelöst haben. Die Beobachtungen dauerten 5 Jahre an denselben Thieren.

**3. Tubularia indivisa** hängt an Felsen und Schalen mit einem schlangen Fuß, am Ende ein scharlachrother Kopf wie eine schöne Blume mit zahlreichen äußern und innern Fühlfäden. Es kommen prächtige Gruppen vor von 50 und selbst 100 Stück. Der Gerüststock besteht in mehreren Trauben um den Kopf, woraus das Ey oder der Embryo auf den Boden fällt. Bald zeigen sich Erhöhungen für die Fühlfäden, worauf das Thier, wenn sie länger werden, sich stellt, also verkehrt, und herumspaziert. Dann scheint es eine Ruhestelle zu suchen, kehrt sich um, daß die Fühlfäden nach oben kommen, wurzelt fest und dann verlängert sich allmählich der Stiel.

**4. Die schönsten Sertularien** sehen aus wie üppige Sträucher in Miniatur mit Stengeln, Zweigen, Tausend Zellen und Polypen. Eine Gattung *Sertularia* aber erhebt sich 3' hoch. Manche tragen Bläschen, viermal größer als die Zellen, mit rothen, weißen, braunen, grünen oder gelblichen runden Körperchen, welche man für Eyer gehalten, was aber meine jahrelangen Beobachtungen nicht bestätigen. Das Bläschen enthält je nach den Gattungen 1—30 Körperchen, welche später länglich werden und als ein vollkommenes Thier aus der Öffnung des Bläschens hervorgehn und dann ganz in Gestalt und Bewegung wie Planarien aussehen. Keines länger als eine Linie. Dieses Thier soll *Planula* heißen; es kommt von 8—10 Sertularien und nie ist etwas anderes aus einem solchen Bläschen gekommen.

Anfangs kriecht dieses Thier sehr hurtig; nach einigen Tagen wird es matt, bleibt liegen, verschlumpft und stirbt, zersetzt sich aber nicht so schnell wie die Planarien. Sind viele weiße oder gelbe *Planulae* in einem Gefäß gewesen, so bemerkt man bald eine Menge weiße oder gelbe runde Flecken, deren Gipfel sich in einen Stachel erhebt, zu einer Zelle anschwillt und sehr bald einen munteren Polypen ausbreitet. Der Stengel wächst und bringt andere Zellen rechts und links hervor; der ursprüngliche Flecken bricht sich in Würzeln und verschwindet wirklich. Auf diese Art kann man Hunderte von Sertularien-Pflanzungen anlegen.

**5. Flustra carbasea** sieht aus wie ein gelbes lappiges Blatt voll Zellen auf einer Fläche; in jeder Zelle ein lebhafter Polyp; in einigen große, gelbe, runde und gewimperte Thierchen, welche sie verlassen und trägt unten herumswimmen, nach einigen Tagen bewegungslos werden und sterben, ohne sich zu zerlegen. Bald entsteht darunter ein gelber Kern mit einem hellern Saum; wird becherförmig, endlich eine Zelle mit einem Polypen. Die alte *Flustra* steht senkrecht, die neue Zelle wagrecht, dann erhebt sich ein Ende der Zelle senkrecht und darin bildet sich eine zweite Zelle mit einem Polypen, welcher über den ersten hängt. Dieser stirbt, ehe der zweite ganzreif ist; so entsteht eine dritte Zelle ufo.

**6. Cristatella mirabilis** im süßen Wasser ist sehr merkwürdig und sollte vielleicht eine eigene Sippe bilden. Sie gleichen einem durchschnittenen Ellipsoid 6—24 L. lang und 2—3 breit; die ganze Unterfläche und die Mitte der obern

glatt; diese von 100, 2—300 Polypen umgeben in 3 Reihen. Das Ganze ist grün und von weicher fleischiger Substanz. Jeder Polyp ist ein besonderes Thier, besteht aus einem fleischigen Stamm, der aus der Masse kommt mit einem Kopf wie Huf von 100 Fühlfäden umgeben. Fühlscheiben werden verschluckt und kommen in den Magen und in den Darm, den man im Leibe sieht. Die gemeinschaftliche Masse kann sich langsam bewegen, vor- und rückwärts. Schneidet man die Masse entzwei, so zieht sich jeder zurück, als wenn alle Polypen einmüthig Willen hätten.

In dem Fleische stecken 20—30 linsenförmige Körperchen, welche am Ende des Herbstes, wann die Masse zerfällt, frey werden und herumswimmen. Es sind Eyer mit einer harten Schale und gelblichem Innhalte; am Rand umgeben mit einer Reihe doppelter Häuten. Nach 5 oder 6 Monaten klappt eine Seite wie eine Austerchale und läßt einen Polypen heraus, welcher den Kopf nach unten wendet, um seine Nahrung zu holen. Endlich verläßt er das Ey, setzt sich fest, ein zweyter Polyp erscheint an seiner Seite, dann ein dritter ufo. Vielleicht besteht schon in der ersten Bildung eine Reihe Polypen um das fleischige Centrum. Wie die Masse sich verlängert, vermehren sich die jungen Polypen. Der üppigste Zoophyt demnach, der aus 1000 Thierchen bestehen kann, entspringt aus einem einzigen Polypen; und sein erster Ursprung ist ein runder Flecken.

Bey *Sertularia polyzonias* ist der erste Zustand eine Erweiterung des Gipfels des Stengels, umgeben mit einer zarten Membran, welche, statt einen einzigen Kopf einzuschließen, auch 2 Knospen bedeckt. Wie der erste erwächst, gabeln sich die letztern davon ab. Das Wachsthum der *Tubularia* geschieht nur, während der Kopf bleibt; er fällt aber bald ab, nachdem er aus dem Meer genommen worden. Er erzeugt sich aber von 10 zu 10 Tagen einige Wochen lang; jedoch vermehren sich immer die äußern Organe, obgleich der Stengel sich immer verlängert. Er scheint sich in dem röhrigen Stengel zu erheben und von der in demselben enthaltenen zähen Materie abzuhängen. Schneidet man den Stengel über der Wurzel ab, so entsteht ein neuer Kopf aus demselben, und so kann man durch Abschneiden eine Menge Köpfe hervorbringen, mehr wie es scheint, als die Natur hervorgebracht hätte. In 550 Tagen habe ich 22 Köpfe von 3 Schnitten erhalten. Bey manchen Thieren ist die Reproduction sehr groß. Es wäre zu untersuchen, ob bey manchen Würmern nicht alle Elemente zu einem ganzen Thier in jedem Ringe enthalten sind. Stücke vom untern Ende von *Amphitrite ventralis* und von andern Gattungen dieser Sippe haben den schönen Federbusch wieder hervorgebracht, vorn die Kiemen, hinten die Absonderungsdrüsen, für die man sie halten muß, da sie die fleberige Materie zur Verfertigung der Nöhre liefern. Alle diese Vorgänge sind gezeichnet.

Fortsetzung in Bd. XXI. 1836. S. 88.

Die meisten niedern Thiere pflanzen sich durch ein Ey fort welches die Elemente zum Keim nebst der Nahrung enthält. Es ist unbeweglich, auch bey den Bewegungen des Fötus, wie es sich bey Planarien und Seepien zeigt. Die Entwicklung des Fötus geschieht bisweilen in der Mutter. Davon giebt es doch Ausnahmen.

1. Eine gesunde *Actinia* heftet sich gewöhnlich wagrecht

an die Seite des Glases, damit sie ihre Organe gehörig brauchen könne. Dann sind die ausgedehnten Fühlfäden der unteren Hälfte voll Junge von verschiedenem Alter, und in andern Fühlfäden dazwischen sieht man unendlich kleine Körperchen unregelmäßig in der Flüssigkeit herumlaufen. Beim Abschneiden der Fäden fallen einige heraus: alle sind undurchsichtig, dick, roth, schwer und sehen aus wie Infusorien. Unter der Vergrößerung haben sie allerlei Gestalten, wie flache Erbschen, länglich, höckerig, manche wie aus 2 oder 3 Kugeln zusammengekehrt. Der Rand ist bey allen mit Wimpern umgeben; meistens zur Bewegung, welche bald grad ausgeht, bald im Kreise, bald um eine Achse drehend, wenn der Leib aus mehreren Kugeln besteht. Schafft man sie künstlich heraus, so gehen sie in einigen Tagen zu Grunde; da aber die Actinia gebärend ist und die reifen Jungen durch den Mund ausstößt, so kommen bisweilen von den genannten Körperchen mit heraus. Auf diese Art brachte eine Actinia equina sive mesembryanthemum 14 dergleichen, nachdem sie während 7 oder 8 Monaten viele vollkommene Junge geliefert hatte. Sechs davon waren Junge mit Fühlfäden und 8 solche Körperchen, welche letztere ich in ein besonderes Gefäß that. Sie waren ziemlich lebhaft, bald ruhig, bald in Bewegung, kurz und lang, schnell und langsam, aber immer etwas schwerfällig, als müßten sie ihre spezifische Schwere überwinden. So gieng es 8 Tage, und dann veränderten sie etwas ihre Gestalt. Eines wurde vorn abgestutzt, hinten ausgebläht, wie ein Zuckerhut: dann erschlaffte ihre Bewegung. Die Wimpern verschwanden und endlich lagen sie still. Eelf Tage nach ihrer Geburt zeigte eines Spuren von Fühlfäden, nach 19 Tagen ein anderes 8 oder 9 solcher Fäden und dieses setzte sich nun wie eine junge Actinia auf seinen Fuß. Andere setzten sich auch, wurden walzig, aber die Fühlfäden weniger deutlich. Die Actinien haben also in der ersten Zeit eine andere Gestalt, können sich bewegen, haben äußere Organe, welche verschwinden, sobald sie sich besetzen und sich andere Organe entwickeln.

2. Die Alconien bestehen aus einer dicken gallertartigen oder fleischigen Masse mit Zellen und lebhaften Hydran. Im schottischen Meer gibt es verschiedene, besonders *A. gelatinosum*, und eine dünne, grüne, flache, handförmige Art, noch unbekannt.

Aus dem fleischen Theil dieser Producte kommt ein weißes ovales, früher unsichtbares Körperchen, besonders wenn ein Reiz, wie z. B. Licht darauf fällt. Als ich ein kleines Exemplar, das bereits viele geliefert hatte, aus einem dunkeln Ort in ein mäßiges Licht gebracht hatte, verließen in einer Stunde wenigstens 150 ihre Schlupfwinkel. Sie sind viel lebhafter als die Körperchen der Actinien, schwimmen nach allen Richtungen, gerad und krumm; nach und nach ändert sich ihre Gestalt, die Wimpern um den Leib gehen bald geschwinde, bald langsamer; endlich setzen sie sich fest, es ergiebt sich ein Rand um den Leib, die Mitte wird durchsichtig und zeigt eine unreife Hydra, welche in 9—10 Tagen aus ihrer Hülle sich ausbreitet. Die innere Fläche eines jeden Fühlfadens ist nun mit einer doppelten Reihe starkbewegter Wimpern besetzt, abwechselnd, die auf einer Seite aufwärts, die auf der andern abwärts schlagen. Der anhängende Grund ergießt sich weiter und bildet Zellen für andere Hydran.

Die Fortpflanzung der *Flustra carbacea, foliacea et truncata* geschieht auf ähnliche Art. Ein gewimpertes Körperchen von verschiedener Gestalt verläßt das Laub, schwimmt herum, setz

sich fest und es entsteht eine junge Flustra auf der Stelle. Von einer mäßigen Flustra foliacea kamen über 10 Tausend solcher Körperchen, so daß der Boden von ihrer Menge ganz gelb wurde und das Wasser verdarb, als sie faulten.

3. Viele Sertularien pflanzen sich durch kleine, flache, glatte Wesen fort mit einer regelmäßigen schleichenartigen Bewegung; sie kommen aus den Bläschen und ich habe sie schon früher Planula genannt.

Etwas Sonderbares aber kommt bey *Sertularia dichotoma* vor, ein zierliches und zartes Sträuchlein, das manchmal mit 1500—2000 lebendigen Hydran gezier ist. Die Bläschen sind selten, etwa eines auf 30 Hydran und angefüllt mit 20—30 graulichen Körperchen, die anfangs alle unreif und ruhig sind, aber endlich anfangen, sich zu bewegen; sie werden deutlicher; aus der Öffnung des Bläschens werden mehrere dünne Arme hervorgetrieben, welche in heftiger Bewegung sind, und nach vielem Zappeln entschlüpft endlich ein thierisches Wesen. Es hat aber keine Aehnlichkeit weder mit der Planula der Sertularien, noch mit den Körperchen der Flustren, Alconien oder Actinien; eher könnte man es zu den Quallen stellen. Es sieht aus wie eine Sandglocke und ich habe es daher anfangs *Animalculum tinnabulum* genannt. Es ist weißlich, etwas durchsichtig, eine halbe Linie dick, gefaltet wie ein Uhrglas, oben darauf in der Mitte ein Kamm und unten hängt eine Franze aus etwa 23 Fühlfäden an der Lippe. Diese Fäden sind rauh und mit der Lippe durch einen Knollen verbunden, der noch einmal so dick als sie selbst ist. Der Gipfel des Kamms entfaltet sich manchmal in 4 Blätter und an seiner Basis giengen 4 von der Converität des Leibes vortragende Organe. Es schwimmt ruckweise oder hüpfend und sinkt langsam abwärts; das Licht veranlaßt es zur Bewegung; es lebte wenigstens 8 Tage und dann habe ich es aus den Augen verloren. Aus den Bläschen der *Sertularia dichotoma* ist nie ein anderes Product zum Vorschein gekommen.

Fig. 1. Thierchen aus dem Bläschen der *Sertularia dichotoma*.

a. Kamm mit den Fortsätzen an seinem Grunde.

b. Fühlfäden vergrößert.

[Dieses Thierchen ist offenbar nichts anderes als *Stalaber Sea-Nesselden* (Physic. Delust. T. 9. F. 5—8), *Obelia sphaerulina* meines Lehrb. d. Nat. G. III, 1. 1815. S. 115. T. 5. F. 2—D.]

4. Die einzige, sicher beobachtete Fortpflanzungsart von *Hydra tuba* geschieht durch Aus sprossen eines Jungen vom Leibe des alten; und das ist eine Sprossung im eigentlichen Sinne des Wortes. Ich hielt 6 Jahre lang eine Colonie dieser Thiere und ihrer Nachkommen; eine Menge wurde reif; sie fraßen sehr rüberlich; sie wuchsen und brachten Junge hervor in allen Jahreszeiten. Im Hornung aber und März wird die Fläche oder Scheibe einiger Hydran mit einer hängenden biegsamen Verlängerung von umgekehrter Kegelform besetzt, welche die Fühlfäden gänzlich verschwinden macht. Die Spitze hängt an der Scheibe und diese hängende Masse dehnt sich nach und nach 2 oder 3 Linien lang aus und entwickelt sich in 20 oder 30 Schichten, die auswärts breiter werden. Bey größerer Reife zeigt das heftige Schlagen der sich am Ende ausdehnen-

den Arme, daß jede Schicht ein thierisches Wesen ist, welches nach ungleichemem Zappeln frey wird und herumschwimmt. Man kann es mithin zu den Quallen stellen. Es ist viel größer als das vorige, 2 Linien im Durchmesser, weißlich und etwas durchsichtig. Der Leib gleicht einem schwachen Uterus; der Rand dehnt sich in 5—12 wagrechte breite Lappen aus, jeder halb gespalten, mit einem schwarzen brüsenartigen Flecken in der Mitte der Gabel. Von der convergen Seite des Leibes erhebt sich eine viereckige Säule und bisweilen bemerkt man an ihrem Grunde noch 4 Organe. Die Bewegung geschieht rückwärts fast wie bey den Quallen durch Schlagen der Lappen auf das Wasser, der Kamm nach unten. Ob die hängende Masse oder die individuellen Theile in einer gemeinschaftlichen Hülle enthalten sind, oder in vielen besondern Hüllen, ist zweifelhaft: aus jedes der Thiere, woraus sie besteht, kommt nach und nach zur Reife und löst sich ab. Wenn die hängende Hervorragung verschwindet, so bekommt die Hydra wieder ihre vorige Kraft und die Fühlfäden, nun befreit von ihrer Last, wodurch sie zeitlich verschwanden, nehmen wieder ihre natürliche Gestalt und Berichtung an. Während dieses Processes vergehen Wochen.

Fig. 2. Das Thier, welches von der Scheibe der Hydra tuba sich erhebt.

a. Der Kamm.

b. Die Arme.

Fig. 3. Dasselbe in Ruhe.

[Dieses Thierchen ist meines Erachtens Basters Medusa minutissima, Opusc. subsec. II. 1. T. 7. F. V., Med. hyoscella, Orythia minima meines Lehrb. d. N. S. III. 1. 14. T. V. — D.]

5. In Bezug auf Tubularia indivisa muß ich noch bemerken, daß sowohl hier, als bey T. polycyps ein zusammengefügter Uterus, aus vielen Blasen bestehend, an der Fläche der Hydra erzeugt wird. Jede enthält an jedem Ende das Junge, welches als eine weiße, derbe Kugel ausgestoßen wird, woran sich bald die äußern Organe entfalten. Wird es aber zufällig zurückgehalten, so geht die Entwicklung in der Blase vor sich und die Fühlfäden treten aus der Oeffnung hervor. Wahrscheinlich wird daher das Junge als ein Fötus ausgetrieben, von einem Amnion umgeben, welches die runde Gestalt verursacht. Von den allmählich hervorprossenden Fühlfäden getragen, kann er sich umherbewegen, bis er endlich sich umkehrt und Wurzel faßt, was bisweilen in 2 Tagen geschieht.

6. Die verschiedenen Gattungen schottischer Cristatellen pflanzen sich auf eine den höhern Thieren ähnlichere Art fort, durch ein Ey mit einer härtern Schale und flüssigem Innhalt. Es entschlüpft erst bey der Fällniß der Cristatella mirabilis und braucht 200—230 Tage bis zur Reife des Jungens, bey Cristatella lacustris 167 Tage: dann spaltet sich das Ey wagrecht von einander und läßt das Junge heraus.

Die erwachsenen Sertularien und Flustren vergrößern sich durch Sprossen im eigentlichen Sinn. An den Enden entstehen Knospen; jede enthält eine Hydra, welche die Hülle zerprengt und ihre Organe aus der Zelle breitet. Auf dieselbe Weise enthalten neue Zellen, gebildet durch die Erweiterung des Laubes

der Flustra, sich entwickelnde Hydræ, welche bey der Reife ihre Theile ausbreiten.

Aus diesen Beobachtungen ist es sehr schwer, zu sagen, ob man dem gewimperten Corpusculo oder der Planula den Namen Ovulum oder Gemmula beylegen kann; vielleicht sind beide eher als ein Thier zu betrachten, weiter vorgerückt als Gemmula aut Ovum etwa in dem Verhältniß wie die Raupe zum Ey. Diesen Wechsel von Bewegung und Ruhe bey diesem Wesen kann ich nur von Belebung herleiten. Sie ruhen auch aus beym Uebergang aus einem Zustand in den andern wie die Larven, obgleich etwas unbedeutlicher: so bey den Actinien und noch mehr bey den Sertularien, Flustren und Actyonien; diese Ruhe endigt in ein scheinbares Absterben und ist doch der Vorbereitungszustand zur Entwicklung der Hydra. Günstige Umstände mögen andere Naturforscher in Stand setzen, die Geschichte der 2 den Quallen verwandten Wesen zu verfolgen, um zu erforschen, ob eine Aehnlichkeit vorhanden ist, zwischen der Fortpflanzung aus der Blase an der Fläche der Hydra, der Tubularia indivisa und der Fortpflanzung von dem hängenden Nidus an der Fläche der Hydra tuba.

Manche Infusorien mögen wohl nichts anderes als Junge von Zoophyten seyn in einem Zwischenzustand. —

Band XVIII. No. 35. 36. October 1834 — April 1835.

S. 46. W. Jardine, über die Salmoniden in Sutherlandshire im Westen von Schottland; im Juny 1834. Sie finden sich daseibst sehr häufig in Teichen und Flüssen.

### a. Zug: Salmen.

Daher gehören: Salmo salar, trutta, eriox et albus; ob die drei letzten ächte Gattungen sind, laß ich dahin gestellt seyn.

1. Salmo salar sive Common salmon. Er steht an der Spitze wegen seines Kaufpreises, wegen der Größe und wegen der Achtung, in der er beyrn Fische steht. Die Salmonfischeren war in Schottland von sehr großem Werth; aber seit 12—15 Jahren hat sie so schnell abgenommen, daß sie an manchen Orten kaum  $\frac{1}{2}$  beträgt. Die Grafschaft Sutherland dehnt sich weit an der Küste hin, hat viele Buchten und Thäler mit Seen und Flüssen und ist mithin ein passender Aufenthalt für die Lachse. Die Fischeerey wurde verpachtet und daher Alles ausgefischt. Deshalb zog sie der Herzog wieder an sich und hat seit 2 Jahren nicht fischen lassen; daher mehren sich jetzt die Fische auch wieder bedeutend.

Man hat darüber gestritten, ob die aus dem Laich gekommenen Fische, welche sich ins Meer begeben haben, wieder in derselben Jahreszeit unter dem Namen Grilse in die Flüsse zurückkehren. Ich hab es seit mehreren Jahren geglaubt, konnte es aber nicht beweisen. Im Tweed habe ich sehr früh im Jahr Grilse gefangen, nicht schwerer als 2 Pfund, und gesehen, daß sie an Größe zunahmten mit dem Fortrücken der Jahreszeit: aber eine Mittelgröße zwischen den ausgeschlossnen Fischen und den Pfündigen Grilsen habe ich nicht bemerkt. Während der 2 Jahre, wo die Fischeerey im Besitze des Herzogs selbst waren, wurden von seinen Aufsehern Versuche angestellt, welche allen Zweifel heben. Im letzten Frühjahr wurden mehrere Tausend ausgeschlossene Junge in verschiedenen Flüssen gezeig-

net, namentlich im Laxford und Dinard. Dort kehrten die ersten Grilse, die als ganz jung im April gezeichnet wurden, am 25ten Juny zurück und wogen  $3\frac{1}{2}$  Pfd. Viele erreichten in dieser Zeit  $6\frac{1}{2}$  Pfd.; durch die Zeichnung erfuhre man, daß sie wieder ebenso häufig und beständig an ihren Geburtsort zurückkehrten wie die höhern Thiere. Diese Größe und dieses Gewicht stimmt genau mit dem der Grilse bei ihrem ersten Zug an anderen Orten überein; und meines Erachtens kehren sehr wenig in die Flüsse zurück, ehe sie 3 Pfd. erreicht haben.

Es gibt sogenannten frühe und späte Flüsse, d. h. in einigen steigen die Salmen schon im Frühjahr heraus und laichen schon in dieser Zeit. Die Ursache kennt man nicht. Uebrigens sind die nördlichen Flüsse mit wenig Ausnahme die frühesten, was man auf den Londoner Märkten sehr wohl weiß; weiter nördlich scheint sich die Laichzeit nach der geographischen Breite zu richten. Arctidi sagt: in Schweden laichen die Salmen in der Mitte des Sommers. Man hat angenommen, daß diese Verschiedenheit in der Jahreszeit von der Wärme des Wassers abhängt und daß die aus starken Quellen kommenden Flüsse wärmer seyen, mithin der Laich sich früher entwickle. In Sutherlandshire gibt es 2 Flüsse, welche diese Verschiedenheit zeigen. Der Dikel entspringt aus einem kleinen Alpensee, etwa  $\frac{1}{2}$  engl. Meile breit. Der Shin fließt in den vorigen 5 Meilen von seiner Mündung, entspringt aber aus einem tiefen und großen Dämpfel, der mit anderen zusammenhängt. Im Frühjahr gehen alle Salmen durch die gemeinschaftliche Mündung; die meisten gehen jedoch in den Shin oder den wärmern Fluß, während sehr wenige im Dikel aufsteigen und zwar in einer spätern Zeit.

Man hält unrichtig dafür, daß die Laichzeit nur zwischen dem October und Hornung sey. In vielen Flüssen fängt sie schon Ende Augusts an, und in denjenigen, welche man 2 Jahre lang ungehört gelassen hat, rückte sie um 4—6 Wochen vor.

Nach den Fischern findet sich nie Nahrung im Magen der im Meer gefangenen Salmen. Es ist aber jetzt ausgemacht, daß sie bloß kleine Entomostrecken und den Laich der Meerestiere fressen. In Sutherland fängt man viele, wenn man Sand = Kalle als Köder braucht. An den Flussmündungen schnappen sie nach den künstlichen Fliegen und dem Regenwurm.

2. *Salmo trutta* sive Sea Trout ist der nächste Fisch in Beziehung auf seine Wichtigkeit: man scheint aber zweyerley Fische darunter zu verstehen und unterscheidet sie nur nach der Größe und der verschiedenen Zeit ihres Zugs. Der frühere wurde als der ächte *Salmo trutta* betrachtet: der Zug beginnt in der ersten Woche des Juny, ist am stärksten in der Mitte und dann nimmt die Zahl ab; dann folgen die des spätern Zugs. Bey ihrer Annäherung an den Mündungen, wo sie gleichsam unteruchen, welchen Fluß sie vorziehen wollen, sieht man ganze Bänke von diesen Fischen in den Bagen hüpfen und spielen, 1—3 oder 4 Pfd. schwer; in den kleinern Bagen ziehen diese Bänke im Kreise herum und scheinen der Nahrung nachzugehen. Man fängt sie dann mit Reizen und angelt sie mit Fliegen wie in den südlichen Flüssen die Grilse; sie schnappen so gierig darnach, daß man 34 an einer Schnur fangen kann 1½ Stunden. Sie gehen in schlaffer Menge in jeden Fluß und Bach und sind, wenn man gerade Salmen fangen will, hinderlich. Wie hoch ihre Zahl steigt, weiß man nicht, da die

Pächter es verheimlichen: man fängt aber oft in einem Zug 200 und mehr. Sie fressen allerley im Meer: man findet manchmal kleine Fische, manchmal Fliegen, Käfer und andere Kerfe, welche der Wind ins Meer treibt, wovon der Brackstör in manchen Gegenden einen großen Theil ausmacht: das allgemeine Futter scheint jedoch *Talitrus locusta* zu seyn, womit oft der Magen ganz ausgefüllt ist.

3. *Salmo albus* sive Herling, beym Fischer kleinere Meerforelle; ihr Zug beginnt Mitte July im Laxford; sie sind einerley mit dem Herling aus dem Solway = Firth, welchen Dr. Fleming *Salmo albus* nennt. Das ist bey weitem die häufigste Gattung in den nördlichen Flüssen und es kommen ihrer 10 auf einen von denen, welche zuerst ziehen.

4. *Salmo eriox* sive Grey. Ich führe nur diesen noch als Zuglaimen auf, jedoch habe ich bey den genannten Orten keinen angetroffen. Uebrigens fängt man bisweilen an der Nordküste einen großen Fisch, der unter dem Namen Norway-Trout bekannt ist. Das mag entweder der große Bull-Trout mit dem vieredigen Schwanz seyn vom Irce, oder eine nord-europäische Gattung, welche man aber in Schottland noch nicht angetroffen hat.

### b. Nicht wandernde.

5. *Salmo lario* sive Common Trout. In Nord-Europa sind auch die meisten Seen und Flüsse von dieser Forelle bewohnt. Das nördliche Sutherland ist ihr mit seinen großen Flüssen, reißenden Bergwässern und hochgelegenen Seen besonders günstig und sie ist auch fast der einzige, aber zahlreiche Bewohner. An diese Wäse ist noch niemand außer dem Fischer und Schäfer gekommen, in der Absicht, die Producte dieser Gegenden zu untersuchen. Am meisten fällt in all diesen Wässern die Unähnlichkeit auf, welche unter den Fischen herrscht. Die Führer der Fremden prahlen mit den verschiedenen Fischen, welche sie in ihren Dämpfen haben. Man fängt auch wirklich in kleinen Bagen, welche nur durch ein schmales Vorgebirg getrennt sind, dem Anschein nach ganz verschiedene Forellen. Die Ursache von diesem Wechsel in unsern Seen und Flüssen wurde noch nicht aufgesucht; vielleicht sind es besondere Gattungen: denn sie sind wirklich gar zu sehr in Gestalt und Färbung verschieden. Indessen kann der verschiedene Boden und das Futter Vieles ändern; zur Zeit des Laichens werden die Kieme länger und die Schuppen glänzender wie beym Hockzeitend der Vögel; am Ende der Laichzeit tritt ein anderer Wechsel ein, der mit dem mit den dünnen und durchsichtigen neuen Schuppen zusammenfällt.

Während meines Ausflugs traf ich sehr verschiedne gezeichnete Varietäten von Forellen, die sich immer von einander unterscheiden ließen; auch der Magen war etwas anders gestaltet; die Schuppen anders, selbst das Betragen, die Art des Schwimmens, wie man verwandte Vögel im Flug unterscheidet.

Die erste Varietät ist von Loch Craigie am Südrande von Sutherland, wo der Granit vorherrscht und kein Moos zeigt; das Wasser ganz hell. Die Forellen wogen 1 Pfd.; 1 oder 2 wurden gefangen von 5—6 Pfd. und eine einzige zu 2½. Die Gestalt ist symmetrisch, Kopf aber besonders klein, Rücken gebogen, daher die senkrechte Höhe groß, die Farben höchst glänzend, oben schön braun, untere Hälfte und Bauch

tief goldgelb, die Flecken zahlreich aber nicht streng begränzt und oft kreisförmig. Die Fische waren nun Anfangs Junge in ihrer höchsten Vollkommenheit und das Fleisch hochgefärbt; wenn sie an einer Angel hingen, so waren sie besonders lebhaft und kräftig.

Unmittelbar daneben waren 3 oder 4 andere Leiche mit Forellen; die Ufer moosig, der Boden voll Pflanzen und das Wasser dunkel. Die Fische gleichen in Gestalt und Flecken den vorigen, entbehren aber gänzlich der glänzenden Farben und der Güte; scheinen indessen zu derselben Varietät zu gehören, nur durch den Aufenthalt verändert.

So ist es aber nicht mit der zweyten Varietät im Loch oder Leiche Shin, der sehr groß und tief ist, nur 3—4 Meilen von dem andern, liegt aber viel niedriger: der Boden sandig und felsig, die Ufer moosig, das Wasser braun. Diese Forellen schienen alle sich wohl zu befinden, fielen aber auf durch ihre verlängerte und ierliche Gestalt, nicht bloß des Leibes, sondern auch des Kopfes und der Flossen, welche beyde fast zugespitzt waren; die Rückenflosse sehr hoch; die Strichflosse mit dem ersten Strahl doppelt so lang als bey voriger; der Schwanz tief getheilt und die äußeren Spigen einwärts gekrümmt. Die Nebenflosse der Bauchflosse sehr verlängert und spitzig, auch die Schuppen länger und schmaler. Die Farben nicht so glänzend wie bey den ersten, aber rein und hübsch aus Olivenbraun und Graulichgelb, die Flecken groß und rund in einem blassen Feld nicht zahlreich; Gewicht  $\frac{3}{4}$ —1 Pfd., auch einige von 2.

Die dritte Varietät ist aus einem kleinen kalten Teich auf den Ben-Moore Bergen bedeutend hoch; die Gegend moosig, aber der Boden sandig, das Wasser hell, die Felsen kalkstein. Die Gestalt ganz anders: Kopf rund, Nase stumpf; ihre Entfernung bis zum Ende des Kiemenbeckels groß; Leib sehr dick, tief und rund; Flossen dick und muscülös, die untern rundlich, der Schwanz vieredig. Grundfarbe dunkel, purpur-olivengrün mit Schlein aus dem Grauen ins Goldgelbe; das Ganze sammt den Finnen mit einem blassen Purpurschein glaziert; die oberen Theile und die Kiemenbedel voll rund brauner Flecken, einige in blassem Feld; unter der Seitenlinie mehr zerstreut, gehen aber fast bis zur Bauchflosse. Diese Forelle ist sehr gut, das Fleisch roth und herb; an der Angel sehr stark, aber nicht so lebhaft wie die am Leiche Craigie. Im Magen nichts anders als Wasserflöhe; dennoch fraßen sie Fliegen und gefälschte Minnows, welche sie wahrscheinlich selbst nicht im frischen Zustande gekostet hatten.

Die vierte Varietät im Teich Assynt mit viel fließendem Wasser ist viel kleiner; der Boden moorig und moosig und das ganze Thal voll kleiner Teiche, an Zahl über 200 bis gegen die Küste. Die Forellen waren hier in unzähliger Menge und schnappten nach jedem Köder; keine wog über ein halbes Pfd.; die meisten nur 5—6" lang; ziemlich dick, Flossen mäßig, die untern spitzig, die Bauchflosse gabelig, Farben schön glänzend, oben schön olivenbraun mit gelbem Schiller; die 2 oberen Drittel des Leibes, Kiemenbedel und Rückenflosse dick, mit großen, runden, schwarzen Flecken bedeckt in einem blassen Kreis, auf dem Rückgrath diese Flecken oft verfloßen. Diese Varietät nimmt also einen großen District ein.

Die fünfte Varietät findet sich in einer Reihe von Teichen zwischen Nichtonich und Larford, und in dem Fluß Larford, welcher aus dem Teich Stach kommt. Sie ist kurz, aber sehr hoch, die Flossen

sehr kurz, rundlich und muscülös; die Gestalt schleichenartig; der Kopf dagegen sehr lang. Sie scheinen groß zu werden; einer wurde gefangen von 4 Pfd., mehrere von 2—2½. Das Fleisch weiß und weich, die Farben nicht glänzend und die Flecken groß, aber weit von einander. Die Fischer nennen sie Loch-Trout im Gegensatz zu den gewöhnlich gezeichneten Bachforellen. Die Kopfknochen der großen Exemplare scheinen sehr von der gemeinen Varietät der Bäche abzuweichen. Das Kieferbein ist sehr stark und schmal und länger als bey einem Salmen von 18 Pfd.

Ich glaube nicht, daß alle diese Varietäten zur Gattung *S. fario* gehören.

6. *Salmo ferox*, welcher in diesen wilden Wassern vorkommt, ist nicht bloß verschieden von allen brittischen Fischen, sondern nach dem Aussprüche eines tüchtigen Ichthyologen von allen des Continents. Es ist die große, graue oder Loch-Trout (*S. ferox*) von Jardine und Selby.

Dieser Fisch scheint zuerst in den schottischen Teichen vor 45 Jahren bemerkt worden zu seyn; Spätere haben eine große Forelle in den Teichen von Schottland und Irland bemerkt, sie aber nur für eine große gemeine Forelle gehalten. In Schottland sind sie allgemein verbreitet, in allen tiefsten Teichen, Loch Awe, Laggan, oben im Loch Shin, im Loch Loyal und Assynt, wo sie durch einander rauben und fast bloß von kleinen Fischen leben. Man bekommt sie bloß mit Sezgangeln während der Nacht, selten mit der künstlichen Fliege, wohl aber mit starken Stricken, woran kleine Forellen. Sie sind außerordentlich gefräßig und haben sie einmal einen Köder ergriffen, so ziehen sie denselben 40—50 Schritt weit; verlieren sie ihn, so schnappen sie gleich wieder darnach.

Er scheint ganz auf die Teiche beschränkt zu seyn, geht selten in die Flüsse und wandert nie ins Meer. Zur Laichzeit steigen sie ein wenig in die Flüsse herauf, aber nie herunter; im Loch-Awe jedoch laichen sie an einer Sandbank in der Nähe des Ausflusses am Ende des Septembers und daseibst schnappen sie auch glerig nach Fliegen.

Der größte, der gefangen wurde, hatte 28 Pfd.; gewöhnlich stehen sie zwischen 10 und 20. Es ist eine sehr kräftige Forelle, hat aber nicht die Hurligkeit eines Salmen von demselben Gewicht.

Die Hauptunterschiede liegen in ihrer Größe, dem vieredigen Schwanz, der Gestalt der Kiemenbedel und der Zähne, der relativen Lage der Flossen, der Gestalt der Schuppen, besonders in der Seitenlinie und in der zarten Haut, unter der man die durchsichtigen Schuppen hervorziehen kann. Rückenflosse 2,11—4,11; Brustflosse 12; Bauchflosse 1,10; Strichflosse 1,11; Kiemenstrahlen 14. Der größte Wechsel findet sich in der Rückenflosse. Im Loch Awe haben die meisten 15 Strahlen.

Im Loch loyal fanden wir eine sonderbare Varietät. Zwen Stück von 5 Pfund hatten eine purpurbraune Grundfarbe ins Schwarzlichgrau; die oberen Theile des Leibes Sepienbraun gefleckt; die untern Theile hatten kleinere Flecken. Bei der gewöhnlichen Gattung sind die untern Theile graulich gelb.



7. *Salmo salmulus sive* Parr. Dieser kleine Fisch findet sich sparsam in einigen Bächen und wird seltener gegen Norden. Man steht im Zweifel, ob er der Junge von andern ist. Folgendes ergibt sich aus Exemplaren aus dem Arctik:

Es gibt keinen brittischen Salm, dessen Lebensact so regelmäßig und dessen Farben und Zeichnungen so beständig sind, wie bey diesem. Er findet sich in den klarsten Flüssen mit Kiesboden, besonders an den seichtesten Stellen in ganzen Schaaren und in beständiger Thätigkeit wie es scheint, Tag und Nacht. Er geht an allen Körber und zu jeder Zeit ohne Scheu und man kann 100 fangen, während keine andere Forelle, groß oder klein, steigt, obgleich sie häufig darunter sind. Ueber ihre Laichen ist man noch ungewiß. Man findet Räucher so weit vorgerückt, daß der Milch ausfließt, wenn man sie anfäht; zu derselben Zeit aber ist der Moogen der Weibchen noch ganz zurück, und man hat sie nie laichen sehen, weder in den seichtesten Flüssen, noch in den Bächen, wie die andere Forellen.

Die Zeichnungen sind so deutlich, daß man sie auf der Stelle von den andern unterscheidet. Die Reihe von blauen Zeichen, die man auch bei der jungen Forelle und bei den Jungen von verschiedenen andern Salmen findet, ist im Parr schmaler und länger. Die übrigen Fleden erstrecken sich selten bis unter die Seitenlinie und zwei dunkle Farben an den Kiemendeckeln sind ein sehr beständiges Zeichen. Bey genauerer Vergleichung einer jungen Forelle mit einem Parr gleicher Größe findet man folgende Unterschiede: Der Parr ist zarter gestaltet, die Nase stumpfer, der Schwanz mehr gegabelt; der Hauptunterschied aber liegt in der viel größeren Stärke der Brustfloßen. Sie sind größer, viel musculöser und fast ein Drittel breiter, und daher kann auch dieser kleine Fisch sich fast beständig im schnellsten Strome schwabend erhalten. Schuppen aus der Seitenlinie, unter der Rückenflosse, sind größer, fast ein Drittel länger, die Furchen zarter und die Gestalt des Kanals nicht so deutlich gegen das Wurzel-Ende der Schuppe. Die Kopfknochen überzeugen noch mehr vom Unterschiede; sie sind viel zarter. Der Hinterdeckel ist runder als in der Forelle, fast wie beim Salm; bei der Forelle ist der untere Winkel eckig. Der Zwischendeckel beim Parr ist länger und schmaler; das Kieferbein am hintern Winkel breiter und viel kürzer; das Scharbein schwächer, die Kiemenstrahlen länger und viel schmaler als bei der Forelle; die Zähne schwächer, das Zungenbein länger, schwächer und schmaler, der Unterkiefer viel schwächer und der Abstand seiner Aeste ein Drittel kleiner. Ich betrachte daher den Parr nicht bloß als verschieden, sondern als eine der besten und unveränderlich gezeichneten Gattung. Die leichtesten Kennzeichen sind die Größe der Rückenflossen, die Kürze der Kieferbeine und mithin das kleinere Maul, verglichen mit einer gleich großen Forelle, und die Entfernung der Unterkiefer-Aeste.

8. *S. alpinus sive* Char fanden wir ebenfalls bei diesem Ausfluge, bekamen aber nur wenig, weil uns die rechten Netze fehlten. Es gibt viele in den nördlichen Bächen, werden aber nur gefangen, wann sie zur Laichzeit an die Mündungen der Bäche kommen. Sie werden ziemlich groß und scheinen ihre Nahrung mehr bei Nacht zu suchen, als irgend eine der genannten Forellen; auch fressen sie nahe am Boden. Im März fanden wir Wasser-Insekten.

E. 59. Marcel de Serres, Untersuchung, ob irgen

ein Landthier seit der Erschaffung des Menschen aufgehört hat zu existiren und ob der Mensch schon gelebt hat zur Zeit der gegenwärtig verlorenen Thiere. Eine sehr gelehrte antiquarische Abhandlung.

E. 81. Alphons Decandolle, Geschichte der versteinten Pflanzen.

121. W. Thompson, Ueber *Teredo navalis* et *Limnoria terebrans*.

Die letzte Schrift über *Teredo navalis* ist von Dör Phil. Trans. 1826. Er behauptet, sie sey in England fast ganz verschwunden. Bei Falmouth und Plymouth, wo sie vor einigen Jahren so häufig waren, keine mehr; auf den Werften von Devon Port fand man als eine Seitenzeit nur 2 Stück; in den vielen Tausend Küstenschiffen keine, obgleich sie nicht beschlagen sind.

Ich habe sie an vielen Orten gefunden. Sie haben vor 5 Jahren die Pfähle zu Vortpatrik an der Küste von Arshire sehr beschädigt und einige ganz durchbohrt; und seit der Zeit hat sich das Uebel weiter verbreitet. Es gab Thiere darunter, welche 2½" lang waren, also wie in Ostindien; eine Klappe ¾" lang und ebenso breit; die Röhre ¾" dick, am Ende 3 — 1½"; unten ist sie geschlossen bey denjenigen, welche etwas über 2" lang sind, also bey den größten; bey andern offen. Bey einer 20" langen war unten 3½" lang keine Schale. Alles Holz war Nadelholz; in Calcutta aber ist es nach der mündlichen Mittheilung des Capitains Jayer Tekholz und anderes hartes Holz, wovon Schiffe gebaut werden; manchmal wird eines in 4—5 Monaten zerfressen. Bei Vort Patrik finden sie sich von der mittlern Fluth an bis 30" tief. Die Bohrmuscheln haben sich daseibst seit 10 Jahren eingenistet und sich seit dieser Zeit nicht verändert. In diesem kleinen Haven kommen nie fremde Schiffe an. Was dieser Wurm innerndig zerstört, das vollendet noch *Limnoria terebrans* von außen, welche im Trocknen 8—14 Tage lebendig bleibt, nemlich in dem aus dem Wasser genommenen Holz. Holz, welches 1828 im Haven Donaghadee ins Wasser kam, hatte im Jahr 1832 schon einige Löcher von *Teredo* und war von außen schon fast ganz von *Limnoria* zerfressen.

181. Von Audubons Birds of America ist der zweyte Band erschienen in Fol. mit prächtigen Abbildungen. Derselben seine Ornithological Biography II. 8. den Beschreibungen, welche sehr weitläufig sind und in einem blühenden Styl.

154. Trevelyan über die Vegetation der Farber.

164. W. Gregory und A. Walker, Zerlegung der Coprolithen.

197. Knop, Zerlegung einer *Balaena rostrata*; lang 10 Schuh, bis zum Ohr 4⅔, Umfang 3. Am Ende der Schnauze 8 deutliche Borsten in senkrechten Reihen in jedem Kiefer; Bartentasteln 614, lang 2½ Zoll.

Band XIX. No. 37. 38. April — October 1835.

56. J. Macnab, seltene Pflanzen in Canada.



208. *Jameson*, einige Vögel vom Himalaya.

209. *Parnell*, neue Fische von England: *Solea*; *Platessa*; *Pleuronectes limandanus*.

211. *Jameson*, neue Vögel: *Aquila nigra* aus Südamerika; *Lophophorus nigelli* aus Persien; *Ibis spinicollis* aus Neu-Holland; *Tanagra nigricapilla* aus Westindien; *Rupicola litteri* vom Himalaya.

244. *Niarcel de Serres*, Unterschied des Hundes, Wolfes und Fuchses im Knochengeriist (aus *Bibliothèque universelle* 1835).

263. Ueber Leviathan und Behemot der heil. Schrift.

*Th. Thompson* zu Hull hält den Leviathan für den *Megalosaurus*, eine Raub-Eidechse, 60–70' lang, deren Knochen man findet in den Schichten unter der Kreide; den Behemot für *Zuganodon*, eine Pflanzen-fressende Eidechse über 60' lang, ebendasselbst.

Man versteht unter *Chan* oder *Chanin* das Crocodill und deshalb könne Leviathan nicht das Crocodill seyn, weil beide Thiere als verschieden in der Schrift vorkommen.

Es ist kein Zweifel, daß *Chan* bisweilen in der Schrift das Microcöbill bedeutet, z. B. *Ezechiel* 29, 3. „Sieh, ich will an dich, Pharao du König in Aegypten, du großer Drache (*Chanin*), der du in deinem Wasser liegest“ und in einigen andern Stellen. Allein die Hebräer verstanden unter dem Worte auch andere Thiere. Wir finden es angewendet auf giftige Schlangen und auf Eidechsen und Schlangen in trocknen Gegenden, wo kein Crocodill leben kann, so heist es *Deut.* 32. 33.: Ihr Wein ist das Gift von *Chanin* und das grausame Gift von *Petanim*. *Jeremias* IX. 11: Ich will Jerusalem zum Steinhaufen und zur Drachenwohnung (*Chanin*) machen. *Jeremias* X. 22. daß die Städte Juda verwüstet und zur Drachenwohnung (*Chanin*) werden sollen. Wir finden zu Jerusalem eine Quelle, welche ihren Namen von *Chanin* hat; mithin muß dieses Thier daselbst gelebt haben. *Nehemia* II. 13.: und ich ritt zum Thalthor aus bey der Nacht vor dem Drachenwuthen (*Din Chanin*) und an das Mithor: und that mir weh, daß die Mauern Jerusalems zerissen waren und die Thore mit Feuer verzehrt. *Maleachi* I. 3. wird der *Chan* beschrieben als wohnend in den trockensten Gegenden ohne Bäche, wo sich kleine Eidechsen und Schlangen aufhalten, „und ich haßte Esau, und habe sein Gebirge öde gemacht und sein Erbe den Drachen (*Chanet*) zur Wüste.“ Das Wort *Chan* oder *Chanin* wurde also gebraucht als ein Ordnungsname für Schlangen und Eidechsen, und daher auch manchmal für das Microcöbill.

In einer einzigen Stelle bedeutet es etwas Anderes. In *Lam.* IV. 3. gibt der *Chan* seinen Jungen zu fassen. In das Buch ist ganz poetisch, wir können es für eine poetische Lizenz halten.

*Chan* bedeutet mithin einen Lurch und Leviathan einen, welcher sehr groß und den Menschen gefährlich war. Das beweist *Jesaias* XXVII. 1.: Zu der Zeit wird der Herr heim-

suchen mit seinem harten, großen und starken Schweiß, beide den Leviathan, der eine schlechte Schlange; und den Leviathan, der eine krumme Schlange ist: und wird die Drachen (*Chanin*) im Meer erwürgen.

Da das Capitel am Ende ausdrücklich Aegypten nennt, so ist offenbar Leviathan und *Chanin* als Bewohner des Nils betrachtet. Kann man aber annehmen, daß *Megalosaurus* zur Zeit des *Jesaias*, nur 300 Jahr vor Herodot daselbst gelebt hat? Das hat Thompson auch gefühlt, und daher sagt er bey *Hiobs* Leviathan, daß Hiob vielleicht vor Moses gelebt habe, vielleicht vor der Sündfluth.

Man darf annehmen, daß Leviathan und *Chanin* bey *Jesaias* einerley Thier bezeichnet. Leviathan bedeutet durchbohrende und krumme Schlange in der genannten Stelle. Die Hebräer hatten auch verschiedene Worte für Löwe. Auch *Psalm* 74, 13. 14. bedeutet *Chanin* und Leviathan einerley und zwar in Aegypten. Repetitionen, die einerley bedeuten mit verschiedenen Worten, kommen oft vor, z. B.: Du brichst die Köpfe der *Chanin* in den Wässern; und wieder: Du brichst die Köpfe der Leviathan in Stücke.

*Chan* bedeutet also bei *Ezechiel* Microcöbill; Leviathan bey *Jesaias* und *Psalm* 74 ist einerley mit *Chan* und zwar ist dabey Aegypten gemeint. Auch hat man unter *Chan* andere Eidechsen oder Schlangen verstanden; unter Leviathan aber kein anderes Thier als das Microcöbill.

Die einzigen Stellen, wo das Wort noch vorkommt, ist *Psalm* 104, 26 und *Hiob* 41. Deym ersten ist Leviathan ein Wasserbewohner; bey *Hiob* ein Bewohner der Wasser und bisweilen tiefiger Buchten, was offenbar auf das Crocodill paßt. Die Schuppen des Leviathan bilden einen dichten und undurchdringlichen Panzer; seine Zähne sind fürchterlich, die Augen blüend, Dampf geht aus den Naslöchern, der Hals ist stark, seine Bewegungen bringen im Wasser Getös hervor; seine Gegenwart ist fürchterlich; das Alles paßt auf das Crocodill. *Hiob* sagt zwar, man könne den Leviathan nicht fangen; *Ezechiel* sagt aber, man könne die *Chanin* mit einem Haken fangen; dasselbe sagen Herodot und *Plinius* vom Microcöbill. *Hiob* hat auch vor *Ezechiel* und Herodot geschrieben, wo man es noch nicht gewagt hat, das Crocodill zu fangen. *Hiobs* Buch ist offenbar nach der Sündfluth geschrieben *XVI.* 15, 20. und vor Moses; denn es wird offenbar von Spätern nachgeahmt, von David und Salomon wie Homer von Griechen; selbst Moses hat ihn nachgeahmt. *Hiob* IV. 9. *Eröb.* 15. 7. 8. *Hiob* 8, 8–10. *Deut.* 32, 7. *Hiob* 29. 6. *Deut.* 32. 13. 4. *Hiob* 14, 17. *Deut.* 32, 34. Ueberall sind dieselben Bilder. *Hiob* ist also 1000 Jahr älter als *Ezechiel* und 1200 als Herodot; er konnte also die Art, das Crocodill zu fangen, nicht kennen.

Es gibt noch andere Wörter, worin *Chan* nur als ein Theil steht, z. B. *Deut.* 32. 33. *Pethan* und anderswo; diesem wird oft eine giftige Eigenschaft zugeschrieben, man kann es übersetzen: Mund-*Chan*, was andeutet, daß das Gift durch den Biß mitgetheilt wurde: Leviathan heist: zusammengefüger *Chan*, was auf den Panzer anspielt. *Hiob* 41, 15–17. Der *Megalosaurus* hatte keinen solchen Panzer.

## Behemoth

ist schwerer aus Hieb zu bestimmen, aber sicherlich ist es keine Eidechse, sondern ein großes pflanzenfressendes Säugethier. Levit. 27. 9. wird ein Behemoth gezüchtet. Die Hebräer opferten aber nur Thiere mit gespaltenem Huf, welche wiederkäuten. Genes. 34, 23: Ihr Vieh (Behemetham) wird unser seyn. Hieb hat die alten Sagen, welche später in der Genes. vorkommen, auch schon gewußt und daher stimmen eine Menge Stellen in beiden überein (werden zahlreich angeführt).

Am sechsten Schöpfungstage wurden die Säugethiere mit dem Menschen hervorgebracht; so auch der Behemot mit dem Menschen, Hieb 40, 10; kriechende Thiere, wie Insekten und Lurche am 5. Tage; Levit 11, 42. Er kann daher nicht Iguanodon seyn. Die Wörter Hathaninim hagadolim Genes. 1. 21. dürfen nicht mit große Wale überfetzt werden, sondern große Lurche; sie wurden am 5. Tage erschaffen. Die Lurche kommen auch in älteren Gebirgsformationen vor.

Behemoth war also ein pflanzenfressendes Säugethier, aber keines von denen, wofür es gehalten wurde.

Hieb sagt 40, 10. sieh, der Behemoth, den ich mit dir gemacht habe, frist Gras wie ein Ochs; B. 11. Sieh, seine Kraft ist in seinen Lenden und sein Zeugungsvermögen im Nabel seines Bauches; 12. sein Schwanz bewegt sich wie eine Ceber; die Muskeln seiner Furchtbareit sind gewunden; seine Knochen sind so fest wie Erz; sein Knochengestütz gleicht Eisensangen; er ist das Haupt auf den Wegen Gottes; der, der ihn gemacht hat, kann ihn angreifen mit seinem Schwerd. Die Gebirge bringen ihm Futter und alle starken Raubthiere kämpfen dabeist. Er liegt unter den schattigen Bäumen im Rohr und Schlamme verborgen. Die schattigen Bäume bedecken ihn und das Gebüsch der Felsufer umgibt ihn. Sieh die Kirch schlägt über ihn; er flieht nicht vor Furcht; er ist sicher, obgleich der Jordan gegen sein Maul strömt. Will man ihn offen, oder wann er es sieht, fangen und seine Nase mit einem Galfried durchbohren?

Mit scheint es, daß alle diese Stellen auf eine große Gattung Rinder passen. Vergleichend sind die Büffel von Indien und Afrika. Ihre Lenden sind stark und die Geschlechtstheile treten am deutlichsten dem Nabel hervor; der Schwanz kann mit seinem Busch einer Ceber verglichen werden; im Kampf stellen sie sich gewunden. Sie bewohnen Gebirge und Ebenen. In Indien lieben gewisse wilde Büffel Moräste und Sümpfe, andere nur trockene Gegenden. Selbst die zahmen Büffel in Indien stoßen im Jörn auf den Tiger und tödten denselben; man hält sogar Wettkämpfe mit diesen beiden Thieren; die Hirten reiten auf den Büffeln und bleiben bis Nachts in den Wäldern, ohne Furcht vor wilden Thieren.

Die Büffel weiden auf den Bergen, liegen im Schatten der Wälder, wälzen sich im Schlamm und vergraben sich selbst hinein bis an die Augen.

Sie gehen ins Wasser oft zum Zeitvertreib und schwimmen sehr gut, besonders der Arni in Indien, wo sie sogar untertauchen, mit den Hörnern Wasserpflanzen heraufziehen sollen. (Hamilton Smith in Griffiths Kingdom IV. 386. etc.)

Im Osten hält man die zahmen Ossen und Büffel an einem durch die Nase gezogenen Ring, was auch bei uns mit den Stieren geschieht. Diese Stelle in Hieb deutet, daß man zu seiner Zeit den zahmen Ossen auf ähnliche Art gebändigt hat; daß es aber mit dem Behemoth nicht gieng und daß dieser mithin ein ähnliches Thier war. Vom Leviathan sagt die Stelle in Hieb, man könne ihn nicht mit einem Haken fangen, was für Fischer paßt.

Alles spricht mithin den Behemoth als ein Rind an; und es fragt sich nur, ob es eine so große, wilde und unzählbare Gattung gibt. Allerdings. Den afrikanischen beschreibe Bruce, Thunberg und Andere mit fürchterlichen Farben: Er ist noch nicht gebändigt durch die Colonisten am Cap, obgleich sie Alles versucht haben, um seine große Stärke und Schnelligkeit zu ihrem Nutzen zu verwenden. H. Smith erwähnt eines gigantischen Arni am Fuße des Himalaya, welches die Bumas als das gefährlichste Thier nach dem Tiger betrachten. Einer rannte einem Elephanten die Hörner unter den Bauch und hob ihn auf. Er war über 6' hoch, Hörner 5½' lang.

Der Behemoth bewohnte das Thal des Jordans. Kann nicht der Büffel eher in einem so beschränkten District gelebt haben oder das Nilpferd? Beide lieben südlichere Gegenden. Der Urochs ist auch seit Cäsars Zeiten in Deutschland ausgerottet worden. Vielleicht ist derselbe der Behemoth.

292. Wilson, über die Vertheilung der Räder in Seetherland und Schottland. Ein Verzeichniß derselben.

Besonders hervorgehoben sind: entweder als sehr gemein oder sehr selten:

*Cicindela campestris*.

*Carabus catenulatus, violaceus, hortensis, glabratus, clathratus*.

*Helobia gyllenhali (nivalis)*.

*Cestus rufescens; Lamprias chlorocephalus; Tarus bassalis; Abar striola; Blemus paludosus; Plethissa multipunctata; Elaphrus cupreus*.

*Silpha; Byrrhus aeneus* unter Steinen selten.

*Geotrupes vernalis, laevis, stercorarius; Phylloperda horticola; Trichius fasciatus*.

*Ctenicerus tessellatus; Campilus linearis; Otiorhynchus lagotus*.

*Rhagium bifasciatum, Helops caraboides; Coccinella 13 punctata*; sonst keine.

300 Conelle, Bestandtheile der verfeinerten Schuppen von Fischen.

325. J. Davy, Temperatur einiger Thunfische. Beträgt ungefähr 99° Fahrenheit, während das Wasser 80.4 ist. Die Fischer behaupten, der Thunfisch habe warmes Blut.

353. Versammlung der Naturforscher zu Dublin. Meistens Physikalisches und Physiologisches, wenig Zoologisches und Botanisches.

Band XX. No. 39. 40. October 1835 — April 1836.

§. 26. K. Patterson zu Belfast, über eine Beroe an der Nordostküste von Irland. Isis Taf. I.

**Fleming** trennte die Beroen mit langen gewimperten Fühlfäden von denen, welchen sie fehlen und nannte sie *Pleurobrachia*; dazu *Beroë pileus*.

Im letzten Frühjahr und Sommer bekam ich in kleinen Netzen eine Menge auch mit Fühlfäden, aber verschieden von *B. pileus*. Ich that sie in Gläser und gab ihnen täglich zweimal frisch Wasser, wo sie 5 Tage lebten und dann that ich sie wieder ins Meer. Länge 2—7 L., Dicke  $\frac{1}{3}$  weniger, Gestalt oval, einige rundlich wie Pomeranze; farblos, durchsichtig, eine rothbraune Linie gegen die Mitte des Magens, welche sich aufwärts gabelt.

Ist von 8 Bändern umgeben, welche sich auf  $\frac{1}{4}$  erstrecken vom Mund gegen den After, dem letzten näher. Diese Bänder sind mit Wimpern besetzt und in der Mitte breiter. Grant gibt 40 Wimpern in jedem Band an und sagt, sie bestehen aus Fäden durch Haut verbunden wie Klossen (Zool. Trans. I.). Bey den meinigen ist die Zahl der Wimpern viel geringer, nur 15—27, und die neben einander liegenden Fäden jeder Querreihe von Wimpern sind durch keine Membran verbunden, sondern ganz getrennt und sehr gewöhnlich. Auf jedem Band läuft eine Leiste, welche es in 2 theilt und mithin auch die Fäden in 2 Längstreifen, wovon jede sich besonders bewegt; jedoch nicht immer alle Wimpern zu gleicher Zeit. Die Wimpern sind so lang als der Raum zwischen den Querreihen.

Der Magen besteht aus 2 häutigen Klappen an ihren Rändern verbunden; er kann aber auch röhrenförmig werden. Der Oberand jeder Membran theilt sich in 2 runde Klappen, welche sich vergrößern und verkleinern können. Sind sie verlängert, so bekommt das Thier die Gestalt einer Flasche mit einem kurzen Hals, der gewöhnlich zu oberst ist.

Mund und Speiseröhre sind nach Grant weit und der Magen erstreckt sich bis zum Centrum des Leibes. Diese Theile scheinen sie sehr ausdehnen zu können. Ich fieng des Abends mit denselben eine Menge grüne Cyclopen, 1—1 $\frac{1}{2}$  Lin. lang, und setzte sie zu jenen in ein Glas. Als ich nach einer Stunde mit dem Lichte zusah, fand ich mehrere Beroen mit einem solchen Thierchen im Magen; 2 Beroen hatten sogar zwei Cyclopen verschluckt, obgleich diese  $\frac{1}{4}$  so lang waren als sie selbst. Während sie indessen kleine Crustaceen fressen, werden sie wieder das Futter der Medusen. Am 12. Mai setzte ich eine kleine Callirrhoe, noch undescriben, mit einer Beroe in ein Glas. Während die letzte mit ihren lieblichen und zielichen Bewegungen im Glas herumschwamm, stieß sie an die Fühlfäden an den Armen ihres Cameraden. Die Arme schlossen sich augenblicklich und die Beroe war gefangen. Ich suchte sie zu befreien und bewegte sie mit einem Cammelhaar-Pinsel hin und her, aber vergebens. Als ich nach einer halben Stunde wieder nachsah, waren sie von einander; die Beroe schwamm herum und ihre Wimpern zitterten wie gewöhnlich. Sie kam jedoch nicht unverletzt davon. Die Callirrhoe hat ihr aus dem Leibe einen halben Mond genommen. Das Stück erstreckte sich quer über 3 Bänder und längs  $\frac{1}{3}$  ihrer

Isis 1838. Heft 1.

Länge: allein nichtsdestoweniger war sie munter und schwamm 4 Tag herum, als wenn ihr nichts geschehen wäre. Bey dieser Unempfindlichkeit gegen Schmerzen bringt doch das Lebensprincip durch alle Theile. Bey 2 nach einem Sturm gefangenen Beroen waren einige Wimpern abgerieben und selbst Theile vom Leibe; dennoch waren die Wimpern in Bewegung. Die am meisten beschädigte wurde in verschiedene Stücke geschnitten und dennoch blieb die Bewegung der Wimpern. Ein Stück wurde wieder in so kleine Theile geschnitten, daß sie nur noch eine oder 2 Wimpern hatten; und dennoch gieng das Zittern fort, 33 Stunden lang; bey einem Stück mit 2 Wimpern 42.

Einmal starb eine Beroe im Glas. Ich machte dann in ihren Leib einen Längsschnitt und legte ihn in ein concaves Glas, wo er bald in eine wässrige Masse geriet. Nach und nach verdunstete aber das Wasser, die Masse wurde fester und zeigte die zwei Fühlfäden und einige Bänder mit den Wimpern. Die letzten blieben am Glas hängen und sahen noch so frisch aus, als wenn sie lebendig wären. Ihre feste Masse ist demnach außerordentlich wenig, und dennoch sind sie ziemlich derb. Sie sind mir oft auf den Boden gefallen; ich habe sie aufgehoben und in Glas gethan, ohne daß es ihnen etwas schädete. Drückt man sie gleich nach dem Tode, so zerreißen sie nicht, sondern gleiten aus der Hand. Etwas gehört zu ihren Bestandtheilen: denn in Weingeist oder heißem Wasser werden sie undurchsichtig und gerinnen ein wenig.

Bey Licht sah man unter der Linse mehr als bey'm Sonnenschein viele dunkle, unregelmäßige und fast parallele Linien längs jedem Bande. Bey'm Fang zeigen sie in der Sonne die prächtigsten Regenbogenfarben durch das Zittern ihrer Wimpern und dabey sanken und stiegen sie und wälzten sich, daß es eine Lust anzusehen war.

Wisseisen erhoben sie sich langsam bis an die Fläche wie ein Ballon und dann ließen sie sich ebenso nieder: Ein andermal stiegen sie schneller, kehrten das Maul nach unten und sanken ebenso schnell. Ein andermal wälzten sie sich um die Quersache, dann um die Längsachse, den Leib senkrecht, und so tummelten sie sich rund im Glas herum. Wie manchartig müssen also die Bewegungen der Wimpern seyn, durch welche der Leib fortgetrieben wird. Sie ruhen nie mehr als 1 oder 2 Secunden aus; und selbst dann haben sie nur eine schwächere und abwechselnde Bewegung. Nur die Wimpern an einem oder 2 nachbarlichen Bändern bleiben stehen und die andern zittern fort: dann hören diese auf und jene kommen wieder in Gang. Das Alles ohne regelmäßige Folge. Sie sind daher sowohl Athmungs- als Bewegungsorgane.

Nach den Wimpern ziehen die Fühlfäden am meisten die Aufmerksamkeit auf sich. Sie sind oft eingezogen. Unter den ersten 35 gefangenen hatten sie nur 2 herausgehängt. Sie fehlten aber keinem. Sie streckten sie selten heraus gleich nach dem Fang, oder wenn sie viel im Glase waren. Befanden sich aber nur 5 oder 6 darin, so schoben sie sich heraus und wurden 5—6mal länger als der Leib. Bey Grants Beroë pileus waren sie 5mal länger. Die Röhren, worin sie stekten, waren krumm; bey den meinigen nicht, und die Oeffnung ist nicht in der Nähe

des Mundes, sondern des After. Die Wimpern davon waren  $\frac{1}{2}$  lang und schön rothbraun und an der Zahl gegen 50 an jedem Fußfaden; sie sahen aus wie eine Perlenkette, andere ganz glatt, was von der verschiedenen Lage herkommt. Die Fußfäden nehmen alle möglichen Gestalten und Lagen an. Sie sind sehr empfindlich und ziehen sich manchmal plötzlich zurück bey der geringsten Berührung; ein andermal gar nicht. Sie scheinen ihnen gar nicht als Ruder oder Schwefstangen zu dienen. Einmal aber waren sie am Boden wie angesogen und das Thier stieg und fiel nach Belieben. Das Maul nach oben wie gewöhnlich.

In Grants Exemplar bildeten die Eperstöcke 2 rothe Haufen von Bläschen. Diese fehlten in den meinigen bey mehr als 200 Stücken. Grant hatte die feinen im September, ich im Jan. Ich bekam aber auch am 3. Juny, am 14., 22. und 24. July, am 20. August und am 14. September; alle waren denen im Frühjahr gleich.

Macartneys *Boreoe fulgens* (Phil. Trans. 1810. 264.) leuchtete; die meinigen nicht im geringsten.

Es ist offenbar eine neue Gattung, vielleicht beschrieben in dem Werke von Eschscholtz, das mir fehlt [von den neuen bey Eschscholtz ist es keine: sondern wahrscheinlich *B. infundibulum*. — D.].

Am meisten findet man bey schönem Wetter; bey Sturm sinken sie unter, werden aber dennoch oft verlegt, herausgezogen oder an den Strand geworfen.

Taf. L. Figur 11 vorbere Ansicht der Magenlappen der Boreoe und Seitenansicht der Scheiden der Fußfäden. Fig. 13. Die Wimpern sehr vergrößert. Sie sind etwas länger vorgestellt, als sie wirklich sind, um die Verwirrungen zu vermeiden, welche durch das zigelartige Ueberfließen entsteht.

S. 74. J. Arthur, über die Thränen der Hirsche und Antilopen.

Sie bestehen aus 2 ovalen Eindrücken,  $1\frac{1}{2}$  lang,  $\frac{1}{2}$  breit,  $\frac{1}{3}$  tief, und liegen im Gesicht unter dem innern Augewinkel. Der Boden dieser Vertiefung ist meistens kahl, bisweilen behaart, und ist mithin nichts anders als die eingesackte Haut, welche in einer entsprechenden Vertiefung der Gesichtstechnen liegt. Bey vielen Thieren läuft eine durch Faltung der Haut gebildete Rinne so unmittelbar vom Auge, daß man glauben sollte, die Thränen müßten durchlaufen; bey andern aber ist diese Verbindung so unvollkommen, daß man Ursache hat, daran zu zweifeln, um so mehr, da diese sogenannten Thränen nur bey Fischen und Antilopen vorkommen und selbst da nicht bey allen; auch fehlen sie bey Thieren, welche keinen Thränengang haben sollen, wie bey dem Elephant und Nilpferd; endlich bestehen die harten Concretionen, welche sich darin bilden, nicht aus Steffen, die aus den Thränen kommen. Sie müssen daher unter die Absonderungs- oder Nierdrüsen gerechnet werden, welche sich in die Haut öffnen wie die Drüsen an den Seiten des Kopfes zwischen Augen und Ohren bey dem Elephant; die zwischen den Augen und der Nase bey manchen Fledermäusen, welche ein sinkendes Fett absondern; ebenso unter den Augen bey dem Murmeltier und dem zweifelhafte Ameisenbären; an den Seiten der Brust bey dem Spigmasus, in den Weichen bey dem Hasen. Noch merkwürdiger sind die Nierdrüsen bey dem

Bisamthier, Biber und der Irbethkase, welche man auch bey der Fischotter, der männlichen Hyäne, dem Schmeumon, Dachs findet; endlich die Nierdrüsen des Peccari. Bey dem Hirsch ist der Inhalt der Thränengrube wie Thranenschmalz und verhärter bey alten Hirschen zu einer Art Bezoar, 11 L. l., 7 breit, 6 dick, wie es Daubenton fand.

Camper fand gelbliche Theile bey dem weiblichen Hirsch; H. Grimm in einer Antilope eine gelbliche, fette und klebrige Flüssigkeit, welche noch wie Bisam und Campher. Nach Bosmar erhärtet sie, wird schwarz und das Thier reibt sie an seinem Gitter ab. Vallas stimmt damit überein in seiner Beschreibung der Antilope grimmia.

Die Thränengruben haben jedoch keinen drüsigen Bau, wie bey dem Elephanten und dem Peccari; aber auch bey den Fledermäusen, dem Bisamthier und dem Biber sind es nur Säcke.

G. White sagt in seiner Natural History of Selbourne und Hamilton Smith bestätigt es, wenn der Hirsch saure, so werde Luft aus diesen Gruben getrieben, daß die vorgetragene Hand oder Licht das Ausströmen wahrnehme. Das kann aber nicht seyn, denn diese Gruben sind gegen die Nasenhöhle ganz verschlossen und die Luft kann nur durch die weiten Thränengänge herausfinden, deren 2 Öffnungen so weit sind, daß man eine Nadelspitze einschieben kann.

Schwache Spuren von dieser Grube findet man auch bey Geissen, Schafen und vielleicht bei allen Wiederkäuern.

Bey dem Bapiti (*Cervus canadensis*) bekam ich eine große, verhärtete Masse, zwischen deren Schichten Haare und Hautschuppen stecken. Dr. Geoghegan hat sie zerlegt. Sie ist von einer feinen durchsichtigen Haut umgeben, fast wie Goldschaum; darunter 4 oder 5 concentrische Blätter wie Leder; sie scheinen von der dunkelbraunen Materie durchdrungen zu seyn, welche die Hauptmasse bildet. Die Dicke jeder Schicht beträgt  $1\frac{1}{2}$  L. Die darinn enthaltene Materie ist röthlich braun, gleicht verhärtetem Thranenschmalz und ist mit feinen Haaren durchsetzt. In einem Stück war sie klebrig und zäh wie Terpentin, in einem andern zerreiblich. Beide hatten einen Geruch von Seife aus Thran; das zerreibliche Stück fast wie Crocot. Das Gewicht 1,081. Der Geschmack bitterlich, nicht auflöslich im Mund, macht auf Papier einen Fettfleck; schwillt in der Hitze auf, schmilzt zum Theile verbrannt und hinterläßt eine graulichke Asche. Die Hauptbestandtheile sind ein braunes Fett, flüchtiger Nierstoff, Extractivstoff, milchsaure Soda mit Kalk, etwas phosphorsaurer Kalk und viel Kochsalz.

79. J. E. Gray, über die Schwierigkeit, die Schalthiere bloß aus ihrer Schale zu erkennen [aus Phil. Trans. 1835].

156. Selby, über die vierfüßigen Thiere und Vögel in der Grafschaft Southerland in Schottland im Sommer 1834.

1. *Sorex araneus*, gemein.
2. *S. fodiens*, gemein an Ufern.
3. *Talpa europaea*.
4. *Meles taxus*, zerstreut im Mittelgebirge.
5. *Vulpes vulgaris*, eine große Art mit schwarzer

**Schwanzspitze**; sehr gemein und schädlich, besonders den Lämmern; es wird daher für einen männlichen bezahlt 15 Schilling, für ein Junges 7 Schilling 6 Pf., für ein Weibchen 2 Pfund 2 Schill. Untertags ziehen sie sich in die Berge zurück und verstecken sich in Höhlen und zwischen Steine. Es gibt eigene Fuchsjäger, deren Geschäft sehr mühsam ist. Sie müssen des Nachts bei Wind und Wetter mit verschiedenen Hunden und Falken in's Gebirg gehen; nebenbei fangen sie auch wilde Katzen und Marder. Die Gräfinn von Southerland hat einen in jeder Pfarce, gibt ihm 20 Pfund des Jahres, ein Haus mit einem Erdäpfel-Garten und Habermehl für 10 Hunde; und außerdem die Bezahlung für jedes Stück, so daß ein Jäger auf 40 Pfund kommt.

Vom März 1831 — 1834 wurden gefangen 71 Weibchen, 95 Junge, 73 Männchen, 901 wilde Katzen, Marder und Fische, 418 Wiesel, 263 Fischottern, 191 Adler, 53 Junge, 936 Raben, 1055 Habichte, 1739 Krähen (*Corvus cornix*) und Aelstern, 528 Ringfischer, so heißt daselbst der Dipper (*Cinclus aquaticus*). *Alcedo ispida* ist selten.

Im Ganzen 6323 Stück; dafür wurde bezahlt 879 Pfd.

6. *Mustela vulgaris*.

*Must. herminea* häufiger.

*M. putoria*, Fumart, gemein an Ufern.

*M. fagorum* auf abietum häufig im Gebirge, besonders in Birkenwäldern, schädlich den Lämmern und in Hühnerställen.

*Lutra vulgaris* häufig wegen der vielen Seen, schaden den Lachs Fischereien, bezahlen aber mit ihrem guten Fell.

11. *Felis sylvestris*, wilde Katzen, sehr zahlreich und schädlich den Lämmern, verstecken sich in den Kalkstein-Höhlen; specifisch verschieden von der Hauskatze in der Gestalt des Schwanzes; es gibt keine Wastarde.

*Phoca vitulina* häufig in den Teichen mit Salzwasser, raubt vorzüglich Salmen. *Phoca barbata* an den Fern-Inseln, kommt hier nicht vor.

13. *Mus musculus, sylvaticus, decumanus.*

16. *Lepus timidus* gemein in den Ebenen.

*Lepus variabilis* sehr häufig im Gebirge.

18. *Arvicola aquatica*, Water-Rat, gemein an langsamen Strömen, darunter auch die schwarze Abart

19. *Arvicola agrestis*, cort-tailed field mouse, gemein.

20. *Capra hircus*, einige verwildert im Gebirge.

21. *C. elaphus* in großen Rudeln.

22. *C. capreolus* nicht zahlreich.

### Vögel.

1. *Aquila chrysaetos*, Golden Eagle, ziemlich häufig im Gebirge, obgleich ein hoher Preis darauf steht; schadet den Lämmern.

2. *Haliaeetus albicollis*, Sea Eagle, auf den nördlichen Felsen, ziemlich häufig, brütet auf den höchsten Klippen.

3. *Pandion haliaetus*, Osprey, am häufigsten an der Westküste, an den Salzteichen, wo er Salmen fängt, besonders *Salmo trutta*, aber keine Lämmer.

4. *Falco islandicus*, Jer Falcon, kommt nur auf Befuch.

5. *F. peregrinus* häufig, frisst Wasser- und Feldhühner und Alpenhasen.

6. *Falc. tinnunculus* gemein.

7. *Buteo vulgaris*, Common Buzzard, an verschiedenen Orten.

8. *Circus cyaneus*, Hen Harrier, selten.

*Otus brachyotus* soll vorkommen, sonst keine Eule.

9. *Hirundo rustica*, Chimney Swallow, gemein.

10. *Hirundo urtica*, Martlet, vollauf, brütet in Menge an den Marmorfelsen.

11. *H. riparia*, Martin, nicht viel.

12. *Cypselus murarius*, Swift, nicht häufig.

13. *Muscicapa grisola*.

14. *Merula musica* überall, besonders in den Birken- und Haselwäldern, auch auf Felsen; wandern nicht.

15. *Merula viscivora* selten.

16. *M. vulgaris*, Black Bird, nicht häufig.

17. *M. torquata* brütet des Sommers häufig im Gebirge.

18. *Cinclus aquaticus*, Dipper, in Menge wegen des vielen Wassers, wird sehr verfolgt unnötiger Weise: denn dem Laiche der Salmen kann er kaum bekommen, da er auf dem Boden liegt; er frisst wohl nur den tauben schwimmenden Laich.

19. *Saxicola oenanthe*, Wheat Ear, häufig.

20. *Sylvia rubetra* (Whin-chat) nicht häufig.

21. *Saxicola rubicola*, Stone chat, selten.

22. *Erithaca rubecula*, Red breast, an verschiedenen Orten.

23. *Salicaria phragmitis*, Sedge-Warbler, ziemlich allgemein verbreitet, der einzige Warbler.

24. *Currucula cinerea*, White-Throat, selten.

25. *Sylvia trochilus*, Willow-Wren, zahlreich in Birkenwäldern, die einzige *Sylvia*.

26. *Parus caeruleus* in Fichtenwäldern.

27. *P. ater* ebenda.

28. *Accentor modularis* fast überall.

29. *Motacilla alba* zerstreut.

30. *Motacilla boarula*, Grey Wagtail, an den meisten Ufern.

31. *Anthus pratensis* auf den höchsten Hügel.

32. *Alauda arvensis* sehr häufig.
33. *Emberiza miliaria*, Common Bunting, sehr gemein in Ebenen.
34. *E. citrinella*, Yellow Bunting.
35. *E. schoeniclus*, Reed Bunting, gemein in Sümpfen.
36. *Passer domesticus* in allen Dörfern.
37. *F. caelebs* hin und wieder.
38. *Linaria cannabina* selten, singt sehr schön.
39. *L. montium*, Twite, häufig, singt artig.
40. *L. minor*, Lesser Redpole, in Birkenwäldern.
41. *Sturnus vulgaris* brütet in Kalksteinhöhlen.
42. *Corvus corax*, Raven, auch häufig, greift Lämmer an.
43. *Corvus cornix*, Hooded Crow, ist die gemeine Krähe der Gegend, zerstört die Eier und die Jungen der Feldhühner und Hasen, nistet am Grunde der Birken auf Felsen, in Buchwäldern. *Corvus corone*, Carrion-Crow, ist unbekannt.
44. *Corv. frugilegus*, Rook, nicht häufig, aber im Späthjahr in großer Menge in der ganzen Gegend, gehen auch auf Berge und fressen die Larven der Schnaken, Bienen u. dergl.
45. *Troglodytes europaeus*, Wren, selten.
46. *Cuculus canorus* überall, legt die Eier gewöhnlich in die Nester von Anthus, lebt von den Raupen der Tagfalter *Lasiocampa*, *Odonestis*, *Saturnia*.
47. *Columba palumbus* wenig, in Birkenwäldern.
48. *C. livia*, Rock-pigeon, verwildert an der Nordküste in Felsenhöhlen häufig; Färbung dunkelblau, Bürzel weiß, 2 Querbinden auf den Flügeln schwarz.
49. *Tetrao tetrix*, Black-Grouse, überall häufig.
50. *Lagopus scoticus*, Red-Grouse sive Red-Ptarmigan, in der Mitte der Grafschaft häufig.
51. *L. mutus*, Common Ptarmigan, häufig auf allen Gebirgen; Richardson hielt ein geschossenes für *Lagopus rupestris* seiner Fauna bor. americ.
52. *Perdix cinerea* nicht häufig.
53. *Ardea cinerea*.
54. *Numenius arquatus* sehr häufig auf Sümpfen.
55. *N. phaeopus*, Whimbrel, selten.
56. *Totanus calidris*, Red-Shank, brütet daselbst; am Neste gestört sind sie sehr laut, fliegen um einen herum und stürzen nach dem Kopfe wie der Kibitz.
57. *Totanus hypoleucos*, Sandpiper, sehr häufig.
58. *Totanus glottis*, Greenshank, sein Nest wurde noch nicht in Britanien gefunden; wir entdeckten es in verschiedenen Sümpfen. Er ist sehr wild und vorsichtig, außer wenn er Junge hat, wo er sehr nahe kommt und auf einen schießt, wie *Tot. calidris*. Gehört man ihn, so kommt er nicht wieder nahe; er macht viel Geschrey.

59. *Scolopax gallinago*, Common Snipe, sehr häufig.
60. *Sc. gallinula*, Jack Snipe, brütet daselbst jedes Jahr; des Winters häufig an Quellen.
61. *Tringa variabilis*, Dunlin, Purro, häufig das Nest in Grasbüschen.
62. *Crex pratensis*, Meadow Crane sive Corn Crane, sehr häufig im Getraide.
63. *Fulica atra* nicht häufig.
64. *Haematopus ostralegus* gemein an den Salzseen, wo er brütet.
65. *Vanellus cristatus* sehr häufig.
66. *Charadrius pluvialis* überall häufig, brütet in Menge.
67. *Ch. hiaticula* sehr zahlreich.
68. *Anser ferus* (segetum), Bean-Goose, brütet jährlich an verschiedenen Seen, auf manchen Inseln 30—40 Paar; wir sahen alte und junge. Sie werden zahm, mischen sich aber nicht mit den andern.
69. *Anas boschas* fast überall.
70. *Mareca penelope*, Wigeon, wurde noch nicht brütend in Britanien gefunden, aber hier entdeckten wir ein Nest im Schilf aus Schilf und Federn; die Eier kleiner als des wilden Entes und rahmsfarben.
71. *Fuligula marila* einzeln, aber mit Jungen; sonst wurde noch kein Nest in Britanien gefunden.
72. *Mergus merganser* einzeln.
73. *Merg. serrator* überall häufig, brütet.
74. *Podiceps minor*, Döbchick, hin und wieder.
75. *Colymbus glacialis* einzeln, brütet wahrscheinlich.
76. *C. arcticus*, Black throated Diver.; diese schöne Gattung, deren Brutplatz nicht bekannt war, fanden wir auf den meisten inneren Seen und 2 Eier auf dem nackten Boden einer kleinen Insel 12' vom Wasser; das Weibchen saß darauf wagrecht; sein Gefieder gleicht dem des Männchens. Als man nach ihm schoß, tauchte es unter, oft 2 Minuten lang und kam weit entfernt wieder herauf; es suchte nie zu fliegen. Auf dem Boden ruht es fort und stößt sich mit den Beinen. Später fand man Junge. Endlich schoß man auch Männchen und Weibchen.
77. *Colymbus septentrionalis*, Red throated Diver, brütet auch an vielen Seen.
78. *Uria troile* gemein an den Küsten, brütet in Menge auf den Abgründen.
79. *Uria grylle* auch häufig.
80. *Alca torda* auch gemein.
81. *Fratercula arctica*, Puffin, gemein an der Küste und an salzigen Einläufen.
82. *Phalacrocorax carbo* zahlreich in allen Buchten.

83. *P. cristatus* auch häufig, brütet auf Abgründen.  
 84. *Sula bassana* viele am Meer.  
 85. *Sterna doysii* wurde gesehen an Buchten.  
 86. — *arctica* häufig an allen Buchten, brütet an flachen Küsten.  
 87. *Larus ridibundus* häufig, brütet im Schilf.  
 88. *Larus canus* brütet fast in allen Teichen.  
 89. *L. rissa* gemein auf Felsenküsten.  
 90. *Larus argentatus*, Herring Gul, an den meisten Salzteichen.  
 91. *Larus marinus* wenig.  
 92. *Larus fuscus*, viele Colonien an Teichen.  
 93. *Cartaractes richardsonii* einzeln.  
 94. *Phoenicurus ruticilla* einzeln.  
 95. *Carduelis vulgaris* einzeln.  
 96. *Caprimulgus europaeus* einzeln in einem Birkenwald.

295. J. V. Thompson, *Pentacrinus europaeus*,  
 ist das Junge von *Comatula* Taf. II. (Sis Taf. I.)

Ich habe in meiner Abhandlung über die Cirripeden gezeigt, daß diese Thiere zuerst herumschwimmen und dann erst sich festsetzen; neu ist es aber, daß ein Thier zuerst fest sitzt und dann vom Stiel abfällt und sich frey bewegt. Als ich in meinem „Mémor on *Pentacrinus europaeus*. Cork, 1827.“ dieses Thier zuerst beschrieb, fiel es mir nicht ein, daß es einmal herumkriechen und sogar schwimmen würde. Die *Comatula* bewegt die Arme stoßweise und steigt, geht vor- und rückwärts, ziemlich wie die Quallen.

Daß es das Junge ist von *Comatula*, zeigt die Vergleichung von Fig. 3 u. 4 mit Fig. 5 u. 6; jene sind ein vorgerückter *Pentacrinus*, der gerade seine Fiedern treibt; diese die jüngste *Comatula*, welche man aus dem Meere bekommen kann. Bey *Pentacrinus* beginnen sich die Fiedern foben zu bilden; sie haben die schwefelgelbe Farbe und dunkeln Randflecken wie bey andern, was beweist, daß die obern Fiedern zuerst gebildet werden. Bey Fig. 5 und 6 haben wir ungefähr drey Paar Fieder mit zwen dazwischen liegenden Articulationen des Arms zwischen ihnen; dann drey Articul (von der Spitze an nach unten gerechnet) und noch ein Paar Fieder im Beginn hervorzuspriessen.

Von diesen bis zur Basis des Arms sind noch fünf Articul, bis jetzt ohne Fieder; die Basis eines jeden Arms an jeder Seite hat ein langes Fieder, welches im Dienste des Mundes steht. Wendet man das Thier nach oben, so sieht man, daß die Cirren des Rückens sich vermehrt haben von fünf auf neun, wovon mehrere zeigen, daß sie kürzlicht gebildet worden sind. Etwas ältere Individuen sind verhältnismäßig gemein; bey ihnen sind die Fieder vollständig und von dieser Periode an scheinen sie sich regelmäßig an der Spitze des Arms zu bilden, sowie sich dieser verlängert. Diese kleinen *Comatulae* behalten ihre ursprüngliche schwefelgelbe Farbe gegen die Spitzen der Arme; die untern Theile aber und der Leib nimmt das charakteristische Roth der alten *Comatula* an. Nach wiederholten Beobachtungen halte ich es für wahrscheinlich, daß die *Comatulae* ihr volles Wachsthum in einem Jahre erreichen,

Jhs 1838. Heft 1.

daß sie im Stande sind, im nächsten Sommer sich fortzupflanzen. Zu dieser Zeit, nemlich im May und Juny, haben diese ausgewachsenen Individuen die häutige Ausbreitung an der innern Seite eines jeden Fieders bedeutend vergrößert, wenigstens bis zum 15. oder 20. Paar; diese sind die Matrices oder Conceptacula, und zeigen sich endlich strotzend voll von Eiern, welche im July und selbst früher aus einer runden Oeffnung an der Vorderseite eines jeden Conceptaculum treten, hängen jedoch in einem rundlichen Klumpen von etwa 100 zusammen und zwar vermittelt ihrer verlängerten Nabelschnur. Auf welche Art diese Eier sich zerstreuen und an die Stengel und Zweige der Corallinen hängen, bleibt noch zu entdecken; es ist aber sehr wahrscheinlich, daß das Thier das Vermögen hat, sich selbst an die passende Stelle zu bringen, sonst würden wir sie auch an Tangen, Schalen, Steinen usw. finden, was nicht der Fall zu seyn scheint. Wie dem auch sey, so sehen wir zuerst die zerstreuten und anhängenden Eier in der Gestalt einer ovalen Scheibe, welche an dem gewöhnlichen Fleck befestigt bleibt; daraus kommt ein undeutlich gegliederter Stengel, welcher in einen keulenförmigen Kopf endigt, wie Fig. 2 e. zeigt; hier ist das Thier so weit entwickelt, daß es die beginnende Bildung der Arme und des Mundes mit seinen Fühlfäden sehen läßt, und damit bekommt es das zu seinem Wachsthum nöthige Futter. Bey d. derselben Figur ist ein anderes, etwas weiter vorgerücktes, in welchem man die Ossicula der Arme bis zur Gabelung wahrnimmt. Bey a. b. und c. sieht man den ausgewachsenen *Pentacrinus*, wie ich früher glaubte; a. zeigt den klappigen Mund, x. die Asteroöffnung, b. zeigt deutlich die Cirri oder Ranken am Gipfel des Stengels, und c., daß das Lebensprincip durch den ganzen Körper sich erstreckt, indem der Stiel verschiedene Bewegungen zeigt. In einer spätern Zeit bemerke ich Individuen mit einem höhern Grad der Entwicklung Fig. 4; die Arme gabeln sich wieder zweymal am Ende und haben schwefelgelbe Farbe bekommen mit einer Zone von dunkeln Flecken längs jedem Rande.

Ein anderer Beweis, daß dieses das Junge von *Comatula* ist ergibt sich daraus, daß man diese *Pentacrinus* zuerst sieht zur Zeit der Zerstreuung der Eier der *Comatulae* und daß sie im September gänzlich verschwinden, in der einzigen Jahreszeit, wo man junge *Comatulae* bekommt, solche wie sie Fig. 5 und 6 abgebildet sind. Von diesen habe ich die Punkte, worin sie den vorgerückten *Pentacrinus* ähnlich sind, schon berührt und es ist augenscheinlich, daß, seitdem sie sich los gelöst haben, Fieder hinzugekommen seyn müssen und zwar in beiden Richtungen aufwärts gegen die Spitze und abwärts gegen die Basis der Arme. Solche Exemplare, welche weiter fortgeschritten sind, sind sehr zahlreich und haben alle Fieder vollständig bis zur Gabelung mit einigen Spangen oder Ranken, die auf dem Rücken hinzugekommen sind.

Figur 7 stellt eine mittelgroße, zehnamige *Comatula* vor, wie sie im Juny mit Eiern erfüllt erscheint; Fig. 8 ist ein Stück von einem Arm vergrößert, mit den Eiern, welche aus den Conceptaculis treten und zwar allmählich von der Basis nach oben. Miller hat in seinem vortrefflichen Werk über die Crinoideae unsere *Comatula* in diesem Zustande als eine neue Gattung abgebildet unter dem Namen *C. sinuata*. Diese Thiere zeichnen sich noch ferner dadurch aus, daß sie zwen Oeffnungen des Darmcanals haben, und dadurch unterscheiden sie sich von den andern Asterien.



Die große Menge Comatulæ an ihren Wohnplätzen ist nicht zu bewundern, wenn man ihre außerordentliche Fruchtbarkeit bemerkt: jeder Arm kann 30 Conceptacula tragen, jedes mit 100 Eiern, macht, da es 10 Arme sind, 30,000.

Zur Naturgeschichte der Comatula gehört noch ein unbeschriebener Scharroher, welcher die Zoologen außer Fassung bringen kann: weder aus seiner Gestalt, noch aus seinem Bau kann man die Classe bestimmen, wohin er gehört. Fig. 9 und 10 stellt dieses Thierchen sehr vergrößert vor; seine Größe übertrifft nicht die Breite der Ossicula an den Armen der Comatula; es gleicht einer flachen Schuppe, läuft ziemlich hurtig an den Armen des Thiers herum und stößt bisweilen einen biegsamen röhrenartigen Küssel hervor, der in einen warzigen Rand endigt. Die Scheibe oder der Leib ist von 18 oder 20 retractilen und beweglichen Fühlfäden umgeben und unten ist er mit fünf Paar kurzen Wimpern versehen, jedes mit einer krummen Klaue am Ende. Ist es ein vollkommenes Thier oder eine Larve und gehört es zu den Crustaceen, Anneliden oder?

Tafel I. Fig. 1 *Pentacrinus europæus*, ein Gruppe in natürlicher Größe.

Fig. 2 dasselbe vergrößert; f. Basis, e. und d. zwei Individuen im frühern Zustande des Wachsthum's, a. b. c. vollkommen entwickelte Individuen, h. x. ist der After und darunter der klappige Mund [dieses ist dieselbe Figur, welche sich in des Verfassers Memoir befindet, copiert in Heusingers Zeitschrift für organische Physik II. 5.].

Fig. 3 und 4 ein Individuum in natürlicher Größe und vergrößert, weiter entwickelt; die Fieder fangen an sich zu bilden, gegen die Enden der Arme bey a. und b.; hier sind die Cirren oder Ranken am Rücken des Thiers deutlich zu sehen. [Auch diese Figuren sind aus dem genannten Memoir.]

Fig. 5 und 6 eine sehr junge Comatula; a. der Mund in der Mitte, x. der After, h. b. zwei Cirri oder Ranken am Rücken.

Fig. 7 ausgewachsene Comatula *decacnemus*; c. die Rückenranken;

Fig. 8 Theil eines Arms von der untern oder vordern Seite; a. Eyer, aus dem Conceptaculo getreten; b. gerade hervortretende Eyer; c. ein Conceptaculum noch mit Eiern angefüllt; d. vergrößerte Eyer.

Fig. 9 der Scharroher, vergrößert, zeigt die Rückenseite; m. das Maul.

Fig. 10 derselbe liegt auf dem Rücken; m. Mund, f. Füße, o. Eyer, a. natürliche Größe.

## Mechanik

der menschlichen Werkzeuge von Chevard und Wilhelm Weber. Göttingen, bei Dieterich. 1836. 4. 17 Taf.

In dem anatomischen Theile dieses Werkes macht er besonders auf folgende Untersuchungen aufmerksam.

Erstens auf eine neue Untersuchung über die Neigung des Beckens. Zur Bestimmung dieser Neigung mißt er zunächst den senkrechten Abstand der Spitze des Schwanzbeins über den Scheitel des Schambogens nach der von Nägele angegebenen Methode. Daraus mißt er auch den horizontalen Abstand derselben Punkte von einander, indem er von beiden Punkten zugleich zwei Senkel herabläßt und ihre Entfernung von einander bestimmt. Die beiden gemessenen Linien sind die Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks, dessen einer Winkel der Neigungswinkel des unteren geraden Durchmessers ist. Da in diesem Dreieck zwei Seiten und der eingeschlossene rechte Winkel bekannt sind, so können daraus die übrigen Winkel also auch jener Neigungswinkel berechnet werden. Auf diese Weise hat er den Neigungswinkel des unteren geraden Durchmessers bei 15 wohlge wachsenen Männern gemessen und ihn im Mittel zu 16,5 gefunden. Verschafft man sich durch zahlreiche Messungen an Leichen den mittleren Werth des Winkels, den der untere gerade Durchmesser des Beckens mit dem oberen macht, und addirt denselben zu dem Neigungswinkel des unteren geraden Durchmessers; so erhält man einen nähereten Werth für den Neigungswinkel der oberen Apertur. Dr. W. fand im Mittel von mehreren Becken den Winkel des oberen und unteren geraden Durchmessers = 49° und folglich den mittleren Neigungswinkel des oberen geraden Durchmessers = 65,5. Aus der Vergleichung dieser Messungen des männlichen Beckens mit denen von Nägele am weiblichen Becken ergab sich, daß hinsichtlich der Beckenneigung zwischen beiden Geschlechtern kein Unterschied Statt finde.

Zweitens macht Dr. W. auf eine neue Untersuchung über die Lage und Bestimmung der ligamenta teretia aufmerksam. Er fand nemlich, daß, wenn man einem frischen Becken, an welchem sich noch die Knochen der Füße befinden, die durch obige Messungen ermittelte Stellung ertheilt und durch die Mittelpunkte beider Schenkelköpfe senkrecht von oben nach unten durchfährt, die beiden ligamenta teretia ihrer Länge nach gespalten werden. Die ligamenta teretia liegen daher bei aufrechter Stellung senkrecht und die incisura acetabuli zu unterst am Pfannenrande. Hierdurch erhält man ein Mittel, jedem Becken die richtige aufrechte Stellung zu geben, wenn man nemlich das Becken in eine solche Lage bringt, daß die incisura acetabuli zu unterst am Pfannenrande liegt. Dr. W. hat bei einer Anzahl so aufgestellter Becken ebenfalls den Neigungswinkel gemessen und gefunden, daß diese Messungen mit der von Nägele und ihm an aufrechtstehenden Menschen gemachten Messungen übereinstimmen.

Drittens macht Dr. W. auf eine neue Untersuchung des Kniegelenks und dessen Mechanismus aufmerksam, welcher sich wesentlich von dem aller anderen Gelenke unterscheidet:

1) Die Condylen des Oberschenkelbeins haben von vorn nach hinten eine spindelförmig gekrümmte Gelenkfläche, deren hinteres Stück mit einer Cylindersfläche zusammenfällt.

2) Die spiralförmigen Condylen stehen auf der fast ebenen Fläche der tibia und berühren sie nur in wenigen Punkten.

3) Die Seitenbänder sind in den Endpunkten der Arce des Kniegelenks befestigt, mit welcher das hintere Stück der spiralförmigen Condylen zusammenfällt.

4) Die Kreuzbänder sind excentrisch von dieser Arce befestigt,



das vordere in einer senkrechten Linie, das hintere in einer horizontalen.

Aus diesen Verhältnissen erklären sich folgende Erscheinungen:

1) Die Seitenbänder erschaffen in der Beugung und gestatten alsdann eine Rotation des Unterschenkels von  $56^\circ$ , spannen sich in der Streckung und verbinden dann die Rotation des Unterschenkels und die Streckung des Gelenkes über die gerade Linie hinaus, weil die von den Arthropuncten, in welchen sich die Seitenbänder befestigen, nach verschiedenen Puncten des Randes gezogenen Linien von hinten nach vorn stetig zunehmen. Dr. W. macht auf die Ähnlichkeit aufmerksam, welche dieser Mechanismus mit der von Herrn Hofmann in Leipzig erfundenen Walzenpresse hat, welche darauf beruht, daß eine mit einer excentrischen Nre versehene Walze bald ihre kürzeren, bald ihre längeren Radien gegen eine Platte preßt. Das Beispiel der Walzenpresse dient zur Erläuterung der großen Spannung der Bänder, welche bei der Streckung des Knies von selber eintritt und das Knie in eine steife Stütze verwandelt.

2) Die einzelnen Bündel der Kreuzbänder werden bei der Beugung und Streckung nicht gleichzeitig gespannt, weil, wegen ihrer excentrischen Befestigung, der eine Punct ihrer oberen Insertionslinie herabsteigt, während ein anderer heraussteigt; wegen dieser Einrichtung geschieht es, daß die Kniegelenkflächen durch die Kreuzbänder in allen Lagen zusammengehalten werden, auch wenn die Seitenbänder erschlafft sind.

## Vorlesungen

Über vergleichende Anatomie von G. Cuvier. 2. Auflage von G. Cuvier, L. Duvernoy und Laurillard, überfetzt von Dr. G. Duvernoy in Stuttgart. Stuttgart, bei Hoffmann. 1837. 8. 1. 1. 296.

Cuviers Werke bedürfen keiner Empfehlung. Diese Ausgabe ist schon von ihm selbst vorbereitet worden und hat daher Vermehrungen erhalten; noch größere sind dazu gekommen von den drei Herausgebern, deren große Kenntnisse und fleißige Arbeiten ebenfalls hinlänglich bekannt sind. Sie haben auch ganz im Sinne von Cuvier gearbeitet, sich rein an die Thatsachen gehalten, wie es sich für ein solches Werk allein schickt. Es wäre daher besser gewesen, sie hätten von den neuern Bestrebungen in diesem Felde gar keine Notiz genommen. Wir zweifeln nicht, daß diese Ausgabe in Deutschland ihr Glück machen werde. Der Preis des Ganzen wird etwa 16 fl. betragen.

## British Annals

of Medicine, Pharmacy, vital Statistics and general science. London, Sherwood. 1837. No. 1. 8. 32.

Diese neue wöchentlich erscheinende Zeitschrift hat vorzüglich die Absicht, die auswärtigen Entdeckungen und Ideen so schnell als möglich zu verbreiten und besonders dem Schenkbrian

im Medicinalwesen Englands entgegen zu arbeiten. Sie scheint auch mit Ernst und Sachkenntnis redigiert zu werden und wird daher ohne Zweifel ihren Platz ausfüllen. Das erste Heft enthält: über einige Puncte der Pathologie der Knochen, von Hodgkin; über den Urin, von Thomas Thomson, S. 5; über den krampfhaften Tic, von M. Hall, S. 8, mit zwey Eindrücken; Ausschneidung der Schilddrüse, von R. Lister, S. 11; Puncturierung des Wasserbruchs, von T. King, S. 13; über die Unversehrtheit von Uley im Pomeranzenblüthen-Wasser, von P. Squire, S. 15. Dann folgen Anzeigen von Schriften, S. 16: Pharmacopœa collegii medicorum; Maunds Botanist, S. 20; über den Zustand der Medicin in England, Miscellen usw.

## Neue Prüfung

der Richtigkeit und Reihenfolge sämtlicher Schriften Hippocrates des Großen von Dr. Fr. S. Weizner. München, bey Fleischer. 1836. 1. 1. 8. 36.

Der Verfasser greift diesen Gegenstand mit einem großen Eifer und einem gründlichen Studium der Schriften des großen Meisters an und nimmt überdieß alle Stellen zu Hülfe, welche bey den Alten Auskunft geben können; und nach Allem, was in diesen wenigen Bogen geleistet ist, scheint es dem Verfasser zu gelingen, Licht in dieses Dunkel zu bringen, wofür ihm gewiß die gelehrte Welt dankbar seyn wird. Es ist ein schwieriges Unternehmen, welches viele Kenntnisse und viel Zeit kostet, wie denn auch der Verfasser bereits schon 10 Jahre auf dieses Studium verwendet hat.

## Der Verdauungsproceß

in Beziehung auf das Wesen der einzelnen Vorgänge, dargestellt von Dr. M. Erättenbacher. 1836. 8. 79.

Dies ist eine sehr sinnreiche Entwickelung des Verdauungsprocesses, von welchem man bisher meistens nichts anderes als die mechanischen und chemischen Vorgänge beschrieb. Der Verfasser hat sie aber mit physiologischem und philosophischem Geiste aufgefaßt und dieselben in einen nothwendigen Zusammenhang gebracht, sowie mit den andern Processes des Organismus. Er betrachtet das Wesen und das gegenseitige Verhältniß dieser Vorgänge, die stufenweise Verwandlung der Nahrungsmittel in organischen Bildungsstoff, in der Mundhöhle, im Magen und im Blinddarm; die Theilung der bildungsfähigen Masse in nöthige und überflüssige; die Absonderungsäfte des Pankreas und der Leber; die Förderung dieser Wirkungen durch den Einfluß der Milz und endlich die Ausstoßung der festen Stoffe durch den Dickdarm. Wir zweifeln nicht, daß bey Aerzten und Physiologen die hier niedergelegten Ideen Beyfall und Eingang finden werden; sie sind nicht bloß ein schöner Beweis von dem wissenschaftlichen und thätigen Streben des Verfassers, sondern auch für sich wärbig, mit Beachtung geprüft zu werden.

## Untersuchungen.

aus dem Gebiete der Heilwissenschaft von Dr. C. Risch.  
Stuttgart, bey Brodhag. 1837. 1. 837. 8. 273.

Diese Schrift ist mit viel Ernst und Sachkenntnis geschrieben und ist sowohl in physiologischer als in pathologischer Hinsicht von Wichtigkeit. Dieser Band besteht aus 2 großen Capiteln, in deren erstem der Verfasser die seit alten Zeiten bewegte Frage: gibt es primäre Krankheiten des Bluts? nach allen Seiten untersucht, prüft und erwägt. Erinnerungen aus der Physiologie über die organischen Säfte: Verschiedenheit derselben und des Bluts nach individuellen Verhältnissen des Organismus, nach der Stärke und Art der Einwirkung der zum Leben notwendigen und der nicht notwendigen Dinge, welche Krankheit oder Heilung hervorbringen; Entwicklung des Begriffs von primärer Krankheit des Bluts und über die in ihm begründeten Krankheitsprocesse. Der Verfasser zieht Alles in sein Reich, was schon von Andern über diesen Gegenstand gedacht worden ist und was in der Natur der Sache liegt: angeborene Anlage, Temperament, geistige Thätigkeit, Einwirkung der Inponderabilitäten, des Bodens und Klimas der Jahreszeiten, der Luft, der Getränke und der Nahrung; Genius epidemicus, Ansteckung; Vollblütigkeit, Entzündung, Blutmangel, Absonderung usw. Dies ist Alles besonders in physiologischer Hinsicht von Wichtigkeit; der andere Aufsatz, S. 201, von den freiwilligen Blutungen, mehr in pathologischer.

## Die neuern Arzneimittel,

ihre physischen und chemischen Eigenschaften, Bereitungsweise, Wirkung auf den gesunden und kranken Organismus und therapeutische Benutzung von Dr. W. A. Riche. Stuttgart, bey Hoffmann. 1837. 8. 477.

Diese, sowohl für Aerzte als für Apotheker wichtige Schrift, ist mit ungemeinem Fleiße bearbeitet, und wird daher ihren Zweck, den praktischen Aerzten eine compendiöse Uebersicht der in der neuern Zeit in Aufnahme gekommenen wichtigen Arzneimittel in die Hand zu geben nicht verfehlen, und den Pharmacuten als Rathgeber dienen zur Bereitung der vielen neu entdeckten chemischen Präparate. Der Verfasser führt bei jedem


Mittel alle Verhältnisse auf, gibt die physischen und chemischen Eigenschaften an, Bereitung, die Wirkungen, die Art in der Anwendung bey den verschiedenen Krankheiten, und theilt auch, wo es nöthig ist, die Arzneiformeln mit. Die Anordnung ist nach dem Alphabet, was uns eine sehr gute Wahl dünkt, bey einem Werk, welches keine Classification erlaubt. Bey wichtigeren Mitteln hält sich der Verfasser länger auf, zum Beispiel bey Goldpräparaten, Crocot, Eisen, Guaco, Jod usw., und führt die Aerzte, sowie die Fälle namentlich auf, welche damit in Verbindung stehen. Wir zweifeln nicht, daß das medicinische Publicum aus dieser Schrift vielen Nutzen ziehen wird, und glauben, dieselbe mit Vertrauen empfehlen zu dürfen.

## Die Heilkräfte

des kalten Wasserstrahls. Mit einem Rückblick auf die Geschichte und mit besonderer Rücksicht auf das Staubregenbad und die kalten Bäder von Dr. L. W. Mautzner. Wien, bey Strauß. 1837. 8. 421. 4 Tafeln.

Es ist in der neuern Zeit das Baden und Brunnentrinken fast ebenso wieder in Schwung gekommen wie bey den Alten, nur nicht mit so viel Geschmack und Lebensweisheit, sondern mit all dem kleinen Wust, welcher das neuere Leben bezeichnet. Auch die Wassercuren wurden bis zum Himmel gepriesen und in regelmäßige Anstalten verwandelt. Das vorliegende Werk beschäftigt sich mit den eigentlichen Bädern und gibt vorzüglich eine ganz umständliche Geschichte derselben von ihrem Zustande bey den Alten und durch das ganze Mittelalter bis auf die neueste Zeit, nachdem die verschiedene Art der Bäder überhaupt geschildert worden, sowohl die gemeinen Bäder, als die Fall- und Regenbäder in ihren Arten und Wirkungen. Es ist in einem fließenden Styl geschrieben und sehr reichlich ausgestattet mit der Kenntniß von Allem, was bisher darüber geschehen ist. Nützlich nicht bloß dem Arzt, dem Badgast und dem Badwirth, sondern auch dem Geschichtsforscher, sowohl dem des Alterthums als der neuern Zeit. Das Werk verdient daher eine der ersten Stellen in dieser Art von Literatur. Es wird gewiß auch den Geschmack in Erbauung der Bäder befördern und besonders die Nachahmung der römischen, welche offenbar viel verständiger eingerichtet waren, als die unserigen, die nichts mehr als Prübele oder wasservolle Särge find.

Limnoria.



Beroë.

11

Comatula  
Fig. 1-10.





Fig. 1 Thierchen von Sertularia dichotoma.

Fig. 2-3 Hydra tuba.





# U f i S.

## Encyclopädische Zeitschrift,

vorzüglich

für Naturgeschichte, vergleichende Anatomie und Physiologie,

von

### D e n.

1 8 3 8.

### S e f t II.

T a f e l II.

Der Preis von 12 Heften ist 8 Thlr. sächs. oder 14 fl. 24 Kr. rheinisch, und die Zahlung ist ungetheilt zur Leipziger Ostermesse des laufenden Jahres zu leisten.

Man wendet sich an die Buchhandlung Brockhaus zu Leipzig, wohin auch die Beyträge zu schicken sind. Es wird gebeten, dieselben auf Postpapier zu schreiben.

Unfrankirte Bücher mit der Post werden zurückgewiesen.

Einrückgebühren in den Text oder Umschlag die Zeile sechs Pfennige.

Von Anticritiken (gegen Iffis-Recensionen) wird eine Quartseite unentgeltlich aufgenommen.

Leipzig, bey Brockhaus.

# A n z e i g e n.

## Statuten

### des entomologischen Tausch = Vereins.

#### §. 1.

Der Zweck des Vereins ist Förderung des Studiums der Entomologie, namentlich der deutschen Käfer und Schmetterlinge durch Vereinigung einer möglichst großen Anzahl von Naturforschern und Sammlern, sowohl zu gegenseitigem Austausch von Doubletten, als auch zu genauerer Bestimmung von zweifelhaften oder unbekannten Arten.

#### §. 2.

Es stellt demnach jedes Mitglied jährliche Verzeichnisse der Doubletten auf, die es zum Austausch bestimmt hat, und zwar von Käfern oder Schmetterlingen, oder von beidem, jedoch immer getrennt, und bemerkt darinn

- a) den vollständigen Namen, Fundort und Autor,
- b) die Anzahl der Exemplare von jeder Art, welche zum Tausche angeboten wird.

#### §. 3.

Diese Verzeichnisse werden dem Geschäftsführer vor dem letzten Dec. jedes Jahres zugesandt, und derselbe trägt Namen und Anzahl, so wie sie von den Theilnehmern gegeben werden, in ein Generalverzeichnis, welches sofort gedruckt und jedem Mitgliede zugesandt wird, damit diese sich spätestens bis Ende Februar das Fehlende oder Wünschenswerthe daraus selbst wählen und bestimmen können. Die Generalverzeichnisse der Käfer oder Schmetterlinge werden auch getrennt und den Theilnehmern, je nachdem sie Käfer oder Schmetterlinge, oder beides zugleich sammeln, zeitig mitgetheilt.

#### §. 4.

Bis Ende Februar hat jeder Theilnehmer die Namen der von ihm gewünschten Käfer oder Schmetterlinge dem Geschäftsführer anzuzeigen. Diejenigen Insecten, für welche sich ein Theil-

nehmer besonders interessiert, können bezeichnet, und sollen dann bey der Vertheilung möglichst berücksichtigt werden. Eben so ist die Anzahl der Exemplare bey den Desideraten anzugeben, wenn ein Theilnehmer mehrere Exemplare von einer Art zu haben wünscht.

#### §. 5.

Der Geschäftsführer zeigt bis zum letzten März jedem Mitgliede die Namen und Anzahl der von ihm zu liefernden Insecten an, und sind dieselben bis zum 1. Mai an ihn einzusenden und zwar

- a) müssen die Exemplare gut gehalten und möglichst vollständig seyn. Käfer oder Schmetterlinge, denen ein wesentlicher Theil fehlt, können nur dann zum Tausche angenommen werden, wenn dieß auf den eingesandten Doublettenverzeichnissen bereits angegeben war.
- b) Jedem Exemplare der zu liefernden Insecten ist ein Zettel beizulegen, der den Namen desselben, den Fundort, den Autor und den Namen des Einsenders angegeben enthält.

#### §. 6.

Der Geschäftsführer sendet jedem Mitgliede die von ihm gewünschten Käfer oder Schmetterlinge spätestens bis Ende Mai durch die Post oder sonstige sichere Gelegenheit zu, und zwar mit dem von dem Einsender abgegebenen Zettel, ohne daß er für die richtige Bestimmung garantirt.

#### §. 7.

Sollten die erhaltenen Käfer oder Schmetterlinge Stoff zu Berichtigungen oder sonstigen bemerkenswerthen Mittheilungen darbieten, so werden die Theilnehmer aufgefordert, dieselben dem Geschäftsführer anzuzeigen, um sie nebst andern Beobachtungen dem Jahresberichte beizufügen.

#### §. 8.

Verzeichnisse oder Insecteneinfundungen, welche der Geschäftsführer nach Ablauf der festgesetzten Zeit erhält, können nicht berücksichtigt werden.

§. 9.

Alle Mittheilungen und Sendungen an den Geschäftsführer können nur frankirt angenommen werden. Zur Deckung der Druckkosten der Generalverzeichnisse und Jahresberichte hat jeder Theilnehmer jäherlich zu entrichten:

für Käferaustausch	12	ggr. oder 15	Egr.
für Schmetterlingstausch	6	"	7½ "
für beydes zusammen	18	"	22½ "

welcher Betrag der in §. 5. bemerkten Sendung beizulegen ist. Ueber Verwaltung dieser Beiträge hat der Geschäftsführer im Jahresberichte, der jedem Theilnehmer mitgetheilt wird, genaue Rechnung abzulegen.

§. 10.

Wer Theilnehmer des entomologischen Tauschvereins zu werden wünscht, hat dieß entweder dem Geschäftsführer oder einem ihm zunächst wohnenden Mitgliede anzuzeigen, worauf ihm ein Exemplar der Statuten eingehändigt wird. Durch zeitgemäße Einsendung eines Doublettenverzeichnisses (§. 2.) bezeugt er seinen wirklichen Beitritt und unterwirft sich den in den Statuten enthaltenen Bestimmungen.

§. 11.

Verändert ein Theilnehmer seinen Wohnort in der Zeit von der Einsendung des Doublettenverzeichnisses an bis zur Empfangnahme der Insecten, so ist der Geschäftsführer davon in Kenntniß zu setzen.

§. 12.

Der Austritt aus dem Vereine ist dem nächstwohnenden Mitgliede und durch dieses dem Geschäftsführer, jedoch zeitig, schriftlich anzuzeigen.

§. 13.

Die unterzeichneten Mitglieder betrachten sich als die Stifter des Vereins, und hat jedes vom 1. Januar 1838. neu hinzukommende Mitglied als Eintrittsgeld 1 Thlr. Preuss. zu entrichten. Auch dürfte es bey einer größeren Ausbreitung des Vereins vorthellhaft seyn, Vorsteher zu ernennen, welche, wie bey dem botanischen Tauschvereine, die Verzeichnisse und Sendungen der ihnen zunächst wohnenden Mitglieder sammeln und an den Geschäftsführer gelangen lassen.

§. 14.

Nach Ablauf eines Jahres wird eine Revision der Statuten Statt finden.

Dr. C. A. Buhle, Insp. d. zoolog. Kab. z. Halle;  
Ph. Hoffmeister, Pfarrer z. Kleinschmalkalden und Geschäftsführer d. Vereins;  
C. S. Hornung, Apoth. zu Aschersleben;  
Kellner, Förster zu Gella;  
Dr. Valliartdy, Brunnenarzt zu Franzensbad;  
C. Hering, Apoth. zu Asch in Böhmen;  
Hölzer, Förster zu Kleinschmalkalden;  
C. Tigen, Pfarrer in Raurod im Nassauischen;  
Lüden, Rector zu Aschersleben;  
W. Rosenhauer, cand. med. zu Erlangen;  
Wellmer, königl. Buchhalter zu Berlin, Zimmerstraße Nr. 97.

## Erklärung.

In einer, übrigens in jeder Hinsicht sehr dankenswerthen Beurtheilung des von mir aus dem Schwedischen übersehten Werks von Ekström über die Fische in den Scheeren von Norð vom Herrn Professor Bronn in den Heidelberger Jahrbüchern der Literatur, Jahrgang 29. Heft 11., ist mir, rückfichtlich der Bearbeitung, ein Verdienst bezeugt worden, welches ich mir nicht zurechnen kann. Hr. Pr. Bronn äußert nämlich, daß die besseren Abbildungen, statt der den Ekström'schen Beobachtungen früher beigegebenen, von mir herrühren, welches ein Irrthum ist, zu welchem ich die Veranlassung zu meinem Bedauern selbst gegeben, indem ich in meinem Vorworte S. XV nicht ausdrücklich gesagt habe, daß jene vom Hrn. Ekström besorgt worden seyen. Dieß ist aber der Fall; die verbesserten Zeichnungen sind mir von demselben zugesandt worden, und ich habe nur für die gute Ausführung des Stiches Sorge getragen.

In der Isis 1837. S. 70 wird gesagt, daß ich die Ekström'schen Beobachtungen aus den „Schwedischen Verhandlungen“ gesammelt habe; aber sie waren aus diesen schon früher in Schweden selbst gesammelt und für sich herausgegeben worden, welches ich auch in dem Vorworte, S. XIV, gemeldet habe. Ferner findet sich hier in der Angabe der in dem Werke beschriebenen Fischearten der *Cyprinus microlepidotus* Eiks tr. und dessen illuminierte Abbildung ausgelassen, und es wird eine Abbildung des *Cyprinus rutilus* angeführt, welche das Werk nicht hat.

Creplin.

A. Naturgeschichte.

- 81 Auszüge aus dem philosophischen Magazin. V — XI.  
 — Babbage, Cerapistempel bey Pozzuoli.  
 — 83 Westwood, neue Mücken.  
 — 87 Brayley, Baumennagel des Drang-Utangs.  
 — 88 Jones, Rethaut der Eintuschnecke.  
 — — Buckland und Agassiz, verfeinerte Zähne der Chi-  
 maera.  
 — 90 Hufsey, Kerntewanze.  
 — — Falconer und Gaultley, über Sivatherium. T. II. 104.  
 — 100 Schomburgk, Mooraly-Gift.  
 — — Kernbeisser, Guinoa, Cynomorium, Palmenzucker, Spin-  
 nen, Timmen, Hobben.  
 — 102 Bader und Durand, verfeinerter Affe. Taf. II.  
 — Anatifa, Wärme der Kerse.  
 — 103 Owen, Toxodon platensis.  
 — 105 Harz-Berein von 1837; Gernar, Verfeinerungen;  
 — Förmung, Hydroporus thermalis; Rimrod, Mäuse,  
 — Bögell.  
 — 111 Aeserstein und Tantscher, Schall bey Nacht.  
 — 113 Senffer, Keimfähigkeit unreifer Samen.  
 — 117 Zoological Transactions II. 1.  
 — — Bennett, Octodon, Ctenomys.  
 — 120 Edinburgher n. phil. Journal von Jameson. 21 — 23.  
 — — Shaw, der Fisch Parr.  
 — 126 Thompson, Metamorphose der Krebse.  
 — 127 Jameson, Thiere der Insel Gerigo.  
 — 130 Dierbach, Arzneymittel des Alterthums; Cap. I. Milch.  
 — Cap. II. Fett, Salz, Mart usw.

U m f c h l a g.

Statuten des entomologischen Tauschvereins.  
 Creplin's Erklärung.

Eingegangen.

An Büchern.

- Die Jugendfeste, Freundschaft auf das Jahr 1838. für die Ju-  
 gend, ihre Eltern, Lehrer und Freunde, von J. J. Sprüngli.  
 Zürich bey Schulthes. 204. 12 Tafeln.  
 Mittheilungen der Zürcherischen Gesellschaft für vaterländische  
 Alterthümer. II. 1838. 4. 16. 4 Taf. (Neujahresstück).  
 Schönherr, Synonyma Insectorum. Genera et Species Cur-  
 culionidum. Parisiis apud Roret et Lipsiae apud Friedr.  
 Fleischer. IV. 1. 1837. 8. 600. IV. 2. 1838. 601 — 1124.  
 Eitenberg, römische Niederlassung bey Messkirch. Constanz  
 1836. 8. 53. 5 Tafeln.  
 Reise des Prinzen Maximilian von Wied in das innere Nord-  
 America in den Jahren 1832 — 34. Coblenz b. Hölcher. 4.  
 S. 1. S. 96. T. 8. Fol.  
 Jetterstedt insecta lapponica. Lipsiae apud L. Voss. 1838.  
 4. 194 — 383.  
 Dahlbom, skandinaviska Insecternas skada och nytta i  
 Hushållningen. Lund, Berling 1837. 8. 341 — 350 t. 1. 2.  
 Das Nichtentstandene und das Entstandene, von einem Angelehr-  
 ten. 1838. 8. S. — 37.  
 Bujač, Naturgeschichte der höheren Thiere mit besonderer Be-  
 rücksichtigung der Fauna prussica. Königsberg, Gräfe und  
 Unger. 1837. 8. 2 Taf.  
 Dr. C. Küppell, neue Wirbelthiere zur Fauna von Abyssinien.  
 Liefer. XI. Frankfurt bey Scherzber. 1837. Fol. Taf.  
 15 — 21. ill.  
 Graf von Berchtold, W. B. Seidl und Dpig, öconomisch  
 technische Flora Böhmens. Prag I. 1. 2. 8. 515.  
 J. Sturm, Deutschlands Fauna. Insecten XII. 1837. 8. Taf.  
 244 — 258.  
 Derselbe, Deutschlands Flora, Pilze XVI. 1837.  
 Fr. Liedemann, das Hirn des Regers mit dem des Europäers  
 und Drang-Utangs verglichen. Heidelberg bey Winter.  
 1837. Fol. 84. 6 T.  
 Fr. Arnold, Annotationes academicae de velamentis cerebri  
 et medullae spinalis. Turici apud Orell. 1838. fol. 25. t. 1.  
 M. Herschel, de Staphylomate scleroticiae. Heidelberg. Oss-  
 wald. 1838. 4. 47. t. 1.  
 M. J. Thuet, Disquisitiones anat. psittacorum P. Turici Orell.  
 1838. 4. 36. t. 2.



1838.

S e f t II.

## THE LONDON AND EDINBURGH

philosophical Magazine and Journal of Science by Brewster, R. Taylor, R. Phillips.

V. July — Decemb. 1834. 8.

(Fortsetzung von der Ffß 1835. S. 606.)

Seite 50. F. Blackwall beschreibt *Drassus cupreus*; *Theridion riparium*; *Neriere nigra*, *pygmaea*, *Liniphia pusilla*.

70. D. Don, Mißbildung in *Telopea pretiosissima* (Proteaceae).

R. Brown, über die Frucht der *Rafflesia*. Bildet mit *Hydnora* et *Cytinus* eine Familie, verwandt mit *Asarinae*, gehören nicht zu *Balanophoreae*. Beide Familien enthalten übrigen Spiralgefäße.

102. J. Hogg, Einfluß des Klimas in Neapel auf die Perioden der Vegetation.

112. P. Keith, Pflanzenbau, auch 181.

205. Derselbe, über das Absteigen des Samenwurzels. *Chen* usw.

213. Ch. Babbage, über den Serapistempel bey Pozzuoli. Es stehen noch 3 Marmorsäulen, welche bey der Höhe von 11'—19 an allen Seiten durchbohrt sind von *Modiola lithophaga*; die Schalen stecken noch darinn. Er behauptet Folgendes:

1) Der Tempel stand ursprünglich an der Oberfläche des Meers zum Gebrauch der Bäder und zugleich einer warmen Quelle, welche noch gegenwärtig auf der Landseite des Tempels ist.

2) In der Folge sank der Grund allmählich, das Salzwasser drang ein, mischte sich mit dem warmen Quellwasser. Ffß 1838. Heft 2.

und bildete einen Teich. Der Tempel wurde incrustiert und daran sitzen *Serpulen*.

Der Tempel wurde nun 7' hoch mit vulcanischer Asche oder Sand gefüllt, so daß das Meerwasser nicht mehr eindringen konnte. Das warme Wasser setzt kohlensauren Kalk an Wänden und Säulen an.

4) Der Tempel sank immer und wurde vom Meer überschwemmt; es entstand ein neuer Boden, welcher das vorige bedeckte.

5) Das Land sank immer und dieser Boden kam auch unter Wasser; dann fiengen die *Modiolae* an zu bohren. Der Tempelboden war jetzt 19' unter dem Meer.

6) So blieb es eine Zeit lang, dann hob sich der Boden. Süßwasser-Absatz, Luff und Sand kam hinein.

Gegenwärtig ist der Tempelboden so hoch als das Meer.

Ähnliche Erscheinungen zeigen sich in der Nachbarschaft.

Beym Monte nuovo stehen aufrecht Säulen von einem Neptunstempel im Meer; an der Brücke des *Caligula* sieht man gegenwärtig Muschellocher 4' über dem Meer. Am 6ten Pfeiler, 10' darüber, am 12ten 32' darüber an einem Felsen gegenüber der Insel *Misida*. Wenn unter dem Tempel Sandstein 5 engl. Meilen tief auf 100° F. erhitzt wurde, so mußte er durch die bloße Ausdehnung des Sandsteins 25' hoch steigen.

S. 244. Carter, über Bekes Meinung wegen des Go-

pherholzes an der Arche Noë und die Ausdehnung des persischen Meerbusens 284.

284. P. Keith, Pflanzenbau.

355. J. Thomson, über die Bestandtheile der ägyptischen Mumien-Windeln. Sie bestehen sämtlich nach der Untersuchung mit dem Mikroskop aus Glas, nicht aus Baumwolle.

Vol. VI. Jänner — Juni 1835.

§. 4. P. Keith, über den Bau der Thiere.

241. Braxley, über die Gesehe, welche in den Thiergruppen das Vermögen, Wärme und Licht hervorzubringen, regulieren.

280. Westwood, Dipterorum novorum exoticorum descriptiones.

1) Gynoplistia, Westw. (Anoplistes, Westw. in Zool. Journ. No. 20. ined.)

Ctenophorae affinis. Antennae in utroque sexu pectinatae, ♂ 18, ♀ 17 articulatae. Alarum nervi ut in Ctenoph. flavolata dispositi.

Sect. 1. Antennae ♂ articulis 3 — 7 unipectinatis.

Spec. 1. Gyn. vilis. Ctenoph. vilis Walk. Ent. Mag. 2. 469. Anoplistes nervosa, Westw. Zool. Journal. No. 20. ined.

Spec. 2. Gyn. cyanea Westw. Nigra; abdomine chalybeo purpureoque niteni; femoribus tibiisque ad basin minus obscuris; alis obscure nervosis, costa maculisque duabus subcostalibus fuscis: ♀ antennis mutilatis. Long. corp. lin. 6.

Habitat in Nova Hollandia.

Obs. A Tipulidis omnibus colore metallico diserepat.

Sect. 2. Antennae ♂ articulis 3 — 14 unipectinatis.

Spec. 3. Gyn. bella. Ctenoph. bella. Walk. Ent. Mag. 2. 470. Anoplistes variegata. Westw. Zoolog. Journ. No. 20. ined.

Hab. in Nova Hollandia.

Spec. 4. Gyn. annulata Westw. ♀ Nigra; thorace coxisque laete fulvis; alis fuscis; abdomine serice subaurea oblecto, tibiis annulo centrali albo tarsisque basi fulvescentibus; antennis ♀ 17 articulatis, articulis 3 — 7 ramum brevem obtusum emittentibus, 10mo interne acute producto, reliquis simplicibus. Long. corp. lin. 5. Exp. alar. Lin. 9½.

2) Ptilogyra Westw.

Tipulae affinis. Antennae in utroque sexu pectinatae; ♂ 13 articulatae, ramulis 7 internis, 15 externis longis; ♀ 14 articulatae, ramulis 7 internis, 8 externis brevibus. Alae cellula discoidali subapicali 7 angulata, fere ut in Limnobia trisulcata Schumm.

Spec. 1. Ptilog. ramicornis. Tipula ramicornis. Walk.

Ent. Mag. 2. 469. Ptilog. marginalis Westw. Zool. Journ. No. 20. ined.

Hab. in Nova Hollandia.

3) Ozodicera, Macq. Dipt. p. 92 (Hemiteina, Westw. in Zool. Journ. No. 20. ined.)

Spec. 1. Ozod. pectinata Wied. (Ozod. ochracea Macq. loc. cit.)

Spec. 2. Ozod. gracilis Westw. Fusco-ochracea; rostro subfulvo, antennis fuscis, basi ochraceis; thorace subvittato; alis subfumosis, nervis stigmatique ochraceis. Long. corp. lin. 10. ♂.

Hab. in Brasilia.

4) Cerozodia Westw. (Ozocera Westw. Zoolog. Journ. No. 20. ined. — nec Ozodicera, Macq.)

Limnobiae affinis. Antennae thorace paulo longiores articulis 32; 3 — 31 ramulum longum emittente. Palpi perbreves. Alarum nervi ut in Gynoplistia vili dispositi.

Spec. 1. Cer. interrupta, Westw. Ochracea; ramulis antennarum subfuscis; alis maculis 4 parvis discoidalibus longitudinaliter collocatis, cinereis. — Long. lin. 10.

Hab. in Australia apud Swan River.

5) Bittacomorpha Westw.

Genus anomalum. Tipulariis terricolis Latr. evidenter pertinens. Caput et Thorax parva. Abdomen valde elongatum et depressum. Pedes longitudine mediores; femoribus tibiis gracilibus; tarsis basi dilatatis dense ciliatis. Alae nervis perpaucis, fere ut in genere Sciophila dispositis. Antennae graciles, filiformes. Palpi capitis longitudine, articulis 4 aequalibus. Lobi labiales magni. Ocelli 0.?

Spec. 1. Tipula clavipes. Fab. Sp. Ins. 2. 404. Ptychoptera clavipes, Fab. Syst. Rhynch. Wied. Aust. Zweifl. Ins. 1. 59. Long. corp. lin. 8. Exp. alar. lin. 8½.

Hab. in America boreali. In Insula Newfoundland.

6) Midas maculiventris Westw. Obscure niger; abdomine testaceo-fuscani, segmentis apice pallidis et (nisi segmentis duobus basalibus) macula triangulari obscura in medio notatis; hae maculae versus apicem abdominis magnitudine crescent; segmento anali fusco; abdominae toto subtus concolori; alis flavido fuscantibus, regione nervorum internorum colore obscuriori tincta. Long. corp. lin. 11. Exp. alar. lin. 19.

Habitat ?

M. auripennis Westw. Niger; capite cum antennis, pedibus (nisi basi femorum), abdomine (nisi segmento basali marginibusque terminalibus segmentorum 2 et 3) laete luteis; alis auricolaribus, macula versus apicem costae nigra, margineque interno pallido, mesosterni lateribus unispinis. Alarum nervorum directio Midasibus veris paulo discrepat. Long. corp. lin. 11. Exp. alar. lin. 19.

Habitat in Nova Hollandia.

*M. viduatus* Westw. Niger; faciei thoracisque lateribus, et macula triangulari utrinque ad basin segmentorum 3 et 4 abdominalium sericie argentea obtectis; alis pallidis in medio fuscantibus, nervis fuscis. Long. Corp. lin. 10. Exp. alar. lin. 16.

Hab. in Nova Hollandia.

7) *Philopota* Wied. maculicollis Westw. Nigra; thorace antice maculis 2 minutissimis, alterisque 2 parvis ad basin alarum fulvis; abdominis marginibus tenuiter flavo notatis, segmentis terminalibus sericie subaurea tectis; antennis nigris; facie albida; femoribus nigris, apice rufis, pedum geniculis pallidis; alis infumatis. — Long. corp. lin.  $4\frac{1}{2}$ . Exp. alar. lin.  $11\frac{1}{2}$ .

Hab. in Brasilia.

8) *Lepidophora* Westw. (Fam. Bombyliidae)

Antennae capite triplo longiores, squamulis obtaectae, articulo 1mo? brevi, 2do longo gracili, 3tio breviori latiori, stylo apicali. Proboscis antennarum dimidio brevior. Thorax valde gibbosus. Abdomen elongatum, parallelum, cauda squamulosa ornatum. Alae farinosae, nervis ut in *Cylenia* dispositis. Pedes longi, graciles.

Obs. Kirby et Spence hoc genus commemorant libro „Introductio ad Ent.“ vol. III. p. 646 pl. 12. f. 23., ubi *Culicem* cum *Anthraxe* etc. conjungere credunt.

Spec. 1. *Lep. aegeriiformis* Westw. MSS. *Ploas aegeriiformis*, G. R. Gray, in Griff. An. K. pl. 128.

Niger; thoracis lateribus flavo pubescentibus; abdomine maculis 6 lateralibus flavis; alis infuscatis. — Long. corp. lin.  $5\frac{1}{2}$  —  $6\frac{1}{2}$ . Exp. alar. lin. 11 — 14.

Hab. in Georgia Americae.

Obs. *Toxophora lepidocera* Wied. congenerica videtur.

9) *Nemestrina* Latr. Rhynchocephalus Fisch. Fallenia Meig. t. 2.

Subgen. 1. *Fallenia* Macquart. Palpi elongati, attenuati; antennarum stylo cylindrico; alarum cellula 3tia submarginali minuta, clausa. — *Cytherea fasciata* Fab.

Subgen. 2. *Nemestrina* proprie sic dicta. Palpi minuti; articulis rotundatis; antennarum stylo setiformi 3articulato; alarum regione apicali valde transverse reticulata; oculis laevibus. — *N. reticulata* Latr.; longirostris Wied.

Subgen. 3. *Trichophthalma* Westw. Palpi magnitudine intermedii; articulis plus minusve ovalibus; antenna ut in Subgen. 2.; alarum regione apicali longitudinaliter nervosa, nervis ut in *Fall. caucasica* (Meig. vol. II. t. 16. f. 14.) dispositis, nervo fere recto, e medio nervi subcostalis, apicem versus marginis postici oblique currenti; nervo secundo apicali furcato; oculis pubescentibus.

Hic pertinere videntur *Rhynch. Tauscheri*, Fisch., Meig. v. 6. pl. 66. f. 67. et *Rhyn. caucasicus* Fisch. Meig. l. c. etiam.

Trich. bivittata Westw. Thorace cinereo; capite magno; oculis fulvescenti-pubescentibus; proboscide capite longiori; abdomine nigro, vittis duabus longitudinalibus latis albis; antennis pedibusque rufescentibus; alis hyalinis; nervis costalibus et basalibus fusco rufis. reliquis nigris. — Long. corp. (probosc. excl.) lin. 7. Exp. alar. lin. 15.

Hab. in Nova Hollandia.

Trich. costalis Westw. Thorace fusco; capitis facie alba; oculis piceo pubescentibus; abdomine rufescenti-fusco; basin et apicem versus corporeque toto subtus pubescentia albo-cinerascenti indutis; pedibus rufescentibus; antennarum articulis terminalibus nigris; alis elongatis; costa late fuscanti; proboscide nigro; capite paulo longiori. — Long. corp. (probosc. excl.) lin. 7. Exp. alar. lin. 17.

Hab. in Nova Hollandia.

Trich. obscura Westw. Obscure cinerea; pedibus rufescentibus; facie alba; proboscide capite fere duplo longiori; alis ad costam tenuiter fuscantibus; oculo antico alius remoto. — Long. corp. (probosc. excl.) lin.  $5\frac{1}{2}$ . Exp. alar. lin. 14.

Hab. in Africa.

Trich. subaurata Westw. Fusca; pubescentia subaurata tecta; thorace lateribus et in medio longitudinaliter pallide bivittato; abdomine magis fulvescenti, vitta obscuriori centrali longitudinali; pedibus et antennis rufescentibus, harum seta nigra, alis brevioribus; costa late fuscanti; proboscide capite plus quam duplo longiore. — Long. corp. (probosc. excl.)  $5\frac{1}{4}$ . Exp. alar. lin.  $13\frac{1}{2}$ .

Hab. in America meridionali (Valparaiso).

Obs. Sectio 3tia supra descripta affinitatem generis *Nemestrinae* cum *Hermoneura* facile demonstrat, inde in ordine naturali genus *Nemestrina* locum intermedium tenet inter *Cyrtum*, *Lasiem* etc. familiae *Vesiculosarum* et *Hermoneurum* familiae *Anthracarum*.

Obs. Genus *Midas*, neuratione alarum similiter insolita, gaudens ramulo laterali systematis, generis supra praedictis conjungi videtur. An genus osculans ad *Asilidas* etc. adducens?

10) *Apiocera* Westw. Genus quoad habitum *Midasibus*, *Corsomyzis* et *Nemestrinis* approximare videtur. Caput transversum. Antennae capite breviores; articulo primo crasso, 2do parvo, his articulis cum setis rigidis armatis; 3tio parvo pyriformi; seta minuta terminali. Proboscis exserta, capitis longitudine. Palpi exserti, spatuliformes. Abdomen thorace fere duplo longius, obconicum. Femora postica haud incrassata. Tarsi bipulvillati. Alarum nervi fere ut in *Midase* dispositi; nervo tertio longitudinali, ante apicem fuscato, recto; nervo quarto longitudinali, suppleto lementali, apice ocululae primae dis-

coidali exeunti, inde cellulae 4 posteriores marginales efformantur.

Spec. 1. *Apiocera asilica* Westw. Nigra; vertice, thoracis lateribus piceis; palpis albidis; alarum nervis nigris. — Long. corp. lin.  $9\frac{1}{2}$ . Exp. alar. lin. 17.

Hab. in Nova Hollandia.

Spec. 2. *Ap. fuscicollis* West. Obscure fusca; thorace cinereo subvittato; palpis albidis; alarum nervis internis pallidis; corpore subtus albedo villosus. An varietas praecedentis? — Exp. alar. lin. 17.

Hab. in Nova Holl.

11. *Pangonia* Latr. *MacroGLOSSA* Westw. Pallide fusco pubescens; facie alba (ocellis O.), thorace vittis duabus longitudinalibus in medio, lateribus, et macula utrinque basin versus alarum albis; abdomine piceo, segmento primo fulvo-marginato, 2do et quarto albo marginato, tertio rufo-marginato, reliquis fusco marginatis; alis basi et ad costam late infumatis; pedibus testaceis. — Long. corp. lin.  $8\frac{1}{2}$ , long. probosc. lin. 15. Exp. alar. lin. 16.

Hab. in Georgia Americae.

*Pangonia maculiventris* Westw. Nigra; thorace haud vittato, abdomine rufescenti-fusco, serie dorsali macularum rotundarum nigrarum; alarum nervis (praesertim transversis) fusco tinctis; pedibus fuscis; corpore subtus pallide pubescenti; ocellis 3. — Long. corp. lin.  $6\frac{1}{2}$  (proboscide mutila). Exp. alar. lin. 14.

Hab. in Nova Hollandia.

S. 424. Ueber die Ankunft von 26 Zugvögeln bey Carlisle im Frühjahr 1834.

## Vol. VII. July — December 1835.

S. 72. Braxley, über den öftern Mangel des Nagelglieds am hintern Daumen des Drang-Utangs.

Owen sagt, daß Camper bey acht Drang-Utangen den Mangel des Nagelglieds des Daumens bemerkt habe; kürzlich aber habe man bey 2 Exemplaren 2 Glieder in diesem Daumen mit einem schwarzen, jedoch kleinen Nagel gefunden (Lond. and Edinb. phil. Mag. VI. 466). Ich habe schon 1828. mich überzeugt, daß der Mangel oder das Fehlen des Nagels nicht zur Unterscheidung von Gattungen bey diesen Affen dienen könne.

Kaffes sagt (Linn. Transact. XIII. p. 241).

Bey einem lebenden Drang-Utang von Borneo fehlte der Nagel am Hinterdaumen. Camper (Phil. Trans. 69. 145) und Linne hielten diesen Mangel für einen Character des Drang-Utangs, was jedoch Cuvier läugnete. J. Grant sagt im Edinburghischen Journal July 1828.: der Hinterdaumen von Abels Drang-Utang auf Sumatra hat einen Nagel ganz wie die andern Fehen. Wurms Pongo von Borneo hatte am Hinterdaumen einen viel kleinern und kürzern Nagel als die andern; einem Drang-Utang von Borneo fehlte derselbe, und hatte dagegen einen harten Höcker an der Stelle (Linn. Trans.

XV. 472). Montgomerie sagt: an 12 Drang-Utangen von Borneo fehlte der Nagel; nur an einem habe er ihn gesehen; die Thiere seyen aber übrigen einander ganz gleich gewesen.

Ich habe unter 28 Exemplaren 20 ohne Nagel gefunden. Sie waren von Borneo, wo es also vielleicht 2 Varietäten gibt. Es bleibt noch zu untersuchen, ob die von Sumatra verschiednen sind.

S. 357. H. Johnson: Ursache der Bewegung in Pflanzen.

## Vol. VIII. Jänner — Juny 1836.

S. 1. J. W. Jones, über die Retina und das Pigment bey *Sepia loligo*. I. 1.

Die Neghaut soll hinter einer dicken Lage im Pigment liegen, wodurch die Lichtstrahlen unterbrochen würden. Das ist nicht der Fall. Was man bisher als Pigment angesehen, ist nur eine nervige Ausbreitung von besonderem Bau mit einem röthlichen Braun gefärbt. Der Sehnerv weicht von dem der andern Thiere sehr ab.

An jeder Seite steht mit dem Hienknoten ein großer Nervenknoten in Verbindung, von welchen Fäden auf eine besondere Art zum Augapfel gehen. Jederseits des Sehnervs entspringen die Fäden und kreuzen sich sogleich, so daß die von der einen Seite zum Auge auf der entgegengesetzten gehen: die Fäden am vordern Ende des Knotens kreuzen sich jedoch nicht. Die Fäden sind in sehr großer Zahl, bedecken in großer Ausdehnung die hintere Fläche des Auges und jeder durchbohrt einzeln die dünne knorpelige Lamina, welche der Sclerotica entspricht; sodann breiten sie sich in eine röthlich braune Lage aus, welche ich die erste Lage der Retina nennen will. Die zweyte Lage ist die röthlich braune Membran, welche man für das Pigment ansieht. Sie liegt innerhalb der ersten und zwischen beyden eine ziemlich dicke und undurchsichtige Schicht vom Pigment, durch deren Löcher die Nervensubstanz in der ersten Lage zur zweyten geht. Unter dem Microscop erscheint die zweyte Lage zusammengefaßt aus kurzen Fasern senkrecht auf ihre Fläche; sie endeten gegen die innere Seite in eine zarte, breyartige Nervensubstanz, auch röthlich braun gefärbt, besonders an ihrer innwendigen Fläche, wo sie ein warziges Ansehen hat. Bey *Octopus* findet sich derselbe Bau.

S. 4. Buckland, versteinerte Chimaera.

Vor 6 Jahren bekam Ph. St. Egerton aus Kimmridge-Thon bey Dorset 5 sonderbare Körper, die wie Schnäbel von Dintenschneden und Schildkröten ausahen.

1832 entdeckte Townsend in Portlandstein ebendasselbst ähnliche, aber viel größere Knochen von einer andern Gattung. Mantell verglich sie mit ähnlichen aus seiner Sammlung aus dem Kreidenmergel von Hamsey und aus der Kreide von Lewes. Es waren dieselben Theile von 2 andern Gattungen. Mirgenbs konnte ich Aufschluß darüber finden. Carus sagte mir bey der Versammlung der Naturforscher zu Bonn, ich sollte sie mit dem Schnabel von *Tetradon* vergleichen. Zu Leyden fand ich neben *Tetradon* das Skelet der seltenen Chimaera mon-

strosa, und erkannte auf der Stelle im Ober- und Unterkiefer die Gegenstände meines langen Suchens. Die zween Zwischenkieferknochen entsprechen dem Paar zahnartiger Knochen aus dem Kimmeridge-Thon; die Oberkiefer einem andern Paar ebendaher; der Unterkiefer dem aus dem Portlandstone Kimmeridge-Thon, Kreiden-Mergel und der Kreide. Die Gattung aus dem Portlandston nenne ich *Chimæra townsendii*,

die aus dem Kimmeridge-Thon *Ch. egertonii*,  
aus dem Kreidenmergel *Ch. agassizii*,  
aus der Kreide *Ch. mantellii*.

Die einzige Gattung der lebendigen *Chimæra* ist weit verbreitet, verfolgt Häringe und findet sich vorzüglich in nördlichen Meeren und auch im Mittelmeer, ist 2—3' lang und den Hagen sehr verwandt. Wegen der knorpeligen Natur ihrer Knochen findet man nichts als ihre Kiefer. Ihre harten Hornplatten aber, welche diese Kiefer bedecken, fanden sich nicht bey den Versteinerungen. Die 2 Internarrillarrücken von *Ch. egertonii* sind so hart wie Schmelz und scheinen keinen hornigen Ueberzug gehabt zu haben; wohl aber die Ober- und Unterkiefer derselben Gattung, weil sie rauhe Oberflächen haben; eben so die Unterkiefer von *Chimæra agassizii* et *mantellii*. Ihr Vorkommen in so frühen Perioden wie die Koogenstein- und Kreidenformation, ist sehr merkwürdig. Einige darunter sind viel größer als die lebende Gattung.

#### Zusatz von Agassiz.

Die *Ch. townsendii* ist die größte: Unterkiefer sehr groß, kurz und dick; Naht weniger tief, Höhlung des Zahnrandes breiter als bey andern; äußere Fläche convex und längsgefurcht mit feichten Kungeln. Zwischenkiefer sehr gebogen.

Unterkiefer von *Ch. egertonii* kurz und flach, Schnauze abgestumpft und sehr breit; Höhle des Zahnrandes sehr weit und die Naht sehr tief; Zwischenkiefer stark gebogen, Zahnrand abgestuft und viereckig; Oberkiefer unregelmäßig dreieckig, sehr verlängert, wird gegen das Ende des Zahnstücks schmaler und ist dabselbst gespalten.

Unterkiefer von *Ch. agassizii* hat die regelmäßigste Gestalt von allen; fast viereckig, der Zahnrand schwach geöffnet; Naht flacher als bey andern.

Unterkiefer von *Ch. mantellii* gerader und dünner; äußere Fläche ganz glatt und flach; Schnauze sehr verlängert und zugespitzt; Höhle des Zahnrandes weiter.

Seitdem habe ich in Grenouhgs Sammlung eine 5te Gattung gefunden, welche von allen abweicht durch den kurzen Unterkiefer, der nicht so lang ist als hoch; Naht flach; Zahnrand abgestuft, hinten grubig; äußere Fläche glatt, die innere in der Mitte concav; Zwischenkiefer flacher als bey *Ch. egertonii*, endigt in eine gerade Spitze; Oberkiefer kürzer als bey derselben Gattung. Soll *Ch. greenovii* heißen.

[Es wäre gut gewesen, wenn die Maße wären angegeben worden.]

§. 366. Ph. M. R. Gr. Egerton, Verzeichniß seiner verkleinerten Fische; eine große Menge.

3fs 1838. Heft 2.

§. 481. F. Blackwall, Characteres neuer Spinnen, *Walkenaeria fuscipes*, *depressa*, *obtus*; *Theridion angulatum*, *filipes*; *Neriene rubripes*, *tibialis*, *livida*, *furva*; *Linyphia nigella*, *tardipes*; *Thomisus luctuosus*; *Lycosa exigua*.

Vol. IX. July—December 1836.

§. 15. Th. F. Sufsey, über die Aertnerwanze, *Acarus autumnalis*.

Von dieser plagerischen Milbe gibt es noch keine gute Abbildung; die von Shaw ist schlecht [die hier gegebene ebenfalls], was daher kommt, weil sie fast unsichtbar ist. Sie hat 6 Füße, ist glänzend scharlachroth, läuft sehr schnell; um sie daher gehörig betrachten zu können, muß man sie in einen Tropfen Wasser thun, wo sie gut schwimmt, selbst noch 7 Stunden. Leib oval mit steifen Haaren gebrenkelt, hinten 16 sehr starke; Füße hornig wie bey einem Käser, mit 2, bisweilen 3 Klauen, womit sie so rasch arbeitet nach Art der Mulkwürfe, daß sie in wenig Secunden unter der Haut ist, worauf sie etwas anschwillt und unerträglich juckt, im Schlaf stört und die Leute mit dem Nagel so kränzt, daß der Schmerz sehr heftig wird. Shaw, Latreille und White von Selborne behaupten, sie lebe auf Korn, Bohnen u. dgl., wo sie wohl nur dem Volksglauben nachsprechen und weil sich darauf oft *Oecypte* findet. Nach meiner Erfahrung lebt sie auf dem Boden, besonders gern auf Kreideboden. Geht man auf dem Riese herum, weit von allen Pflanzen, so sind die Strümpfe bald von ihnen bedeckt; sie laufen schnell aufwärts und dringen durch, wo die Strümpfe am genauesten anliegen. Die Pferde leiden viel von ihnen; ihre Lippen und Nasen sind oft davon bedeckt; sie kommen während des Waidens daran, können aber wahrscheinlich die Haut nicht durchbohren. Diese Plage zeigt sich jedoch nur in der Sonnenhitze.

32. Küppell, über die verkleinerten Pseudammoniten und Ichthyosaggoniten (Tellinites). Sie haben wahrscheinlich dem Thier als eine Art Deckel gebient oder als Kautorgan; die andere Gattung betrachte ich als eine innere Schale in einer großen elliptischen Muschelmasse.

193. Hugh Falconer und P. L. Cautley, über das *Sivatherium giganteum* (aus Asiatic Researches III. tab. 2.). 3fs Taf. II.

Ist größer als das Nashorn; ein Wiederkäufer, welcher die Verbindung mit den Dächthürten vermittelt. Der Name ist nach dem indischen Gott Siva geformt. Die Vorhügel des Himalaya heißen Sivalik. Die Verfeinerung wurde darin gefunden.

Das Gesandene besteht in einem vollständigen Kopf und steckt in einem harten Stein, gegen welchen lange Zeit Wasser strömte. Ein Zahn guckte heraus, und man hatte viele Mühe, die harte crystallinische Steinbede wegzubringen. Dann zeigte sich aber der ungeheure Kopf mit 2 Hörnern zwischen den Augen, nur an ihren Spitzen etwas abgebrochen; die Nasenbeine ragten als ein feiner Bogen hoch über die Gesichtsfurche hervor.

Alle Backenzähne sind vorhanden und vollkommen. Die einzige Verletzung findet sich am Wirbel, wo die Fläche des Hinterhauptbeins sich mit der der Stirn verbindet; auch ist die Schnauze vor dem ersten Backenzahn ein wenig abgestutzt. Die einzigen noch im Steine verborgenen Theile sind ein Stück des Hinterhauptbeins, die Schläfengruben an beyden Seiten und der Schädelgrund am Keilbein.

Die Gestalt des Kopfes ist so sonderbar und wunderbar, daß man bey dem ersten Anblick überrascht wird. Das Auffallendste ist

- 1) die Größe, fast wie bey einem Elephanten;
- 2) die ungeheure Entwicklung und Breite der Hirnschale hinter den Augenhöhlen;
- 3) die 2 divergierenden knöchernen Hornzapfen, welche von der Stirn zwischen den Augen hervorstecken;
- 4) die Gestalt und Richtung der Nasenbeine, welche weit über die Gesichtsfurche hervortragen und über die Naslöcher wie ein Spikbogen hängen;
- 5) die Plumpheit, Breite und Kürze des Gesichts vor den Augen;
- 6) der große Winkel, unter welchem die Kaufläche der Backenzähne aufwärts abweicht von der des Schädelgrundes.

Von der Seite gesehen gibt die Gestalt und Richtung der Hörner, die Erhöhung und Senkung der Nasenbeine dem Kopf einen von allen andern Thieren ganz abweichenden Charakter. Die Nase gleicht einigermaßen der des Nashorns; aber die Aehnlichkeit täuscht, denn sie beruht bloß auf der abgestutzten Schnauze. Von vorn gesehen ist der Kopf etwas keilförmig, am breitesten auf dem Wirbel; nimmt dann allmählich ab gegen die Schnauze und ist nur eingezogen hinter den Augen nach den Backenzähnen. Die Jochbögen sind größtentheils verborgen und nicht vorstehend; die Stirn breit, flach, schwillt seitlich in 2 Converitäten an; die Augenhöhlen sind weit von einander und nach vorn geschoben von der starken Erhebung des Stirnbeins. Es finden sich weder Rämme noch Leisten; die Oberfläche des Schädels ist glatt, die Linien sind Curven ohne Winkel. Vom Wirbel zur Nasenwurzel geht die Stirn-Ebene in gerader Linie mit einer schwachen Erhebung zwischen den Hörnern.

**Zähne.** (Die Abbildung des Gaumens ist in einem etwas größern Maassstab.)

Im Oberkiefer sind jederseits 6 Backenzähne. \* Der 3te oder letzte Milchbackenzahn hat dem entsprechenden bleibenden Zahn Platz gemacht; die Abkautung des letztern und der hintere Backenzahn ist weit vorgerückt, und beweist, daß das Thier mehr als ausgewachsen war.

Die Zähne sind in jeder Hinsicht die eines Wiederkäuers mit einigen geringen Eigenthümlichkeiten.

Die 3 hintern oder doppelten Backenzähne bestehen aus 2 Stücken oder Halbwalzen, wovon jede zum Theil abgekaut ist und einen doppelten Halbmond vom Schmelz einschließt, die Converität nach innen. Der letzte Backenzahn hat nach der Regel bey den Wiederkäuern keinen Ansatz, wie es bey dem entsprechenden im Unterkiefer der Fall ist. Die Kaufläche neigt sich vom äußern Rand nach innen. Die Gestalt ist im vergrößerten Maassstab genau wie bey dem Rind oder Camel. Die Schmelzleisten sind ungleich erhoben und die Höhlen dazwischen ungleich vertieft. Jede Halbwalze hat im waechten Schnitt an der äußern Fläche drey vorspringende Leisten mit zwey Einschnitten dazwischen; an der innern Fläche ist ein einfacher Bogen. Es sind indessen einige Eigenthümlichkeiten vorhanden, durch welche diese Zähne von denen anderer Wiederkauer abweichen.

Gemäß der Kürze des Kiefers ist die Breite der Zähne viel größer im Verhältniß zur Länge, als es in dieser Kunst gewöhnlich ist. Die Breite des dritten und 4ten Backenzahns verhält sich zur Länge wie 2,24 und 2,2 zu 1,55 und 1,68 Zoll; die Mittelbreite der ganzen Reihe zur Länge wie 2,13 zu 1,76 Zoll. Ihre Gestalt ist weniger prismatisch, indem der Grund ihres Schafts in ein Halsband anschwillt, von welchem die innere Fläche schief nach außen läuft, und etwas in die Höhe steigt. Auf diese Weise wird das Kronstück etwas eingezogen. Im dritten Backenzahn verhält sich die Breite des Kronstücks wie 1,93 zum Halsband des Schaftes wie 2,24. Die Leisten und Vertiefungen an der äußern Fläche steigen weniger auf den Schaft herunter und verschwinden am Halsband. An der Verbindungsfurche der innern Seite finden sich keine Zusatzleisten. Die mondformigen Schmelzplatten haben einen Character, wodurch sie sich von allen bekannten Wiederkäuern unterscheiden: der innere Mond läuft, statt eine einfache Furche zu bilden, zickzackförmig in großen ausgesetzten Biegungen, einigermaßen wie bey Elasmotherium.

Die 3 doppelten Backenzähne unterscheiden sich von einander nur durch den Zustand ihrer Abkautung. Der vorvorletzte ist am meisten abgekaut und hat weniger gekrümmte, näherstehende und weniger deutliche Mondplatten; der vorletzte und letzte sind weniger abgekaut und haben deutlichere Zeichnungen.

Die 3 vordern oder einfachen Backenzähne haben die gewöhnliche Form wie bey andern Wiederkäuern, eine einfache Halbwalze nur mit einem Paar von Monden. Der erste ist stark abgekaut und zum Theil verstümmelt; der zweite ist weniger verlehrt, weil er nicht so lang gebraucht wurde, und zeigt die geschweiften Curven deutlicher am Schmelz des innern Mondes; der letzte hat die einfache Gestalt des bleibenden Zahns, welcher den letzten Milchzahn ersetzt; er zeigt auch die wellige Gestalt des Schmelzes.

Rücksichtlich der Stellung der Zähne im Kiefer laufen die 4 hintern, nemlich die 3 bleibenden und der letzte Ersatzzahn in einer geraden Linie und find denen der andern Seite parallel und gleich weit von ihnen entfernt; die 2 vordern sind plötzlich einwärts gerückt und denen der andern Seite um vieles genähert. Wären die 2 ersten Backenzähne nicht so eingerückt, so würden die zwey Zahnreihen genau zwey Seiten eines Wiercks bilden: die Länge der Zahnreihen und der Raum zwischen den äußern Flächen der 4 letzten Backenzähne sind fast gleich, nemlich 9,8 und 9,9 Zoll.

\* Die Abbildung Nr. 4. ist getreu nachgemacht; ohne Zweifel ist sie richtiger in Asiatic Researches. D.

Die Abkantungsfäche der ganzen Reihe ist nicht wagrecht, sondern bildet eine schwache Curve und läuft aufwärts unter einem beträchtlichen Winkel mit dem Schädelgrund, so daß, wenn der Kopf auf den Gelenkköpfen des Hinterhauptes liegt und den letzten Backenzähnen, eine Ebene durch diese Punkte durchschnitten wird von einer Schne längs der Abkantungcurve der ganzen Zahnreihe unter einem Winkel von ungefähr 45°. Dieses ist einer der ausgezeichnetsten Charaktere des Kopfes.

### Zahnmaasse.

	Länge, Zoll.	Breite, Zoll.
Letzter Backenzahn rechts . . . . .	—	2,35
Vorletzter . . . . .	2,20	2,38
Vorvorletzter . . . . .	1,68	2,20
Letzter einfacher . . . . .	1,55	2,24
Zweiter . . . . .	1,70	1,95
Erster . . . . .	1,70	1,90

### Äußere Flächen. Innere Flächen.

Raum zwischen den Flächen des hinteren Backenzahns . . . . .	9, 9	5,5
des dritten . . . . .	9,8	5,5
des zweiten . . . . .	8,4	4,5
des ersten . . . . .	6,4	3,2

Raum, welcher durch die Linie der Backenzähne eingenommen wird 9,8 Zoll.

Kopf- und Gesichtsknochen. Die Rätze sind wegen des Alters des Thiers ganz verwachsen und nicht mehr zu erkennen.

Das Stirnbein ist breit und flach und an der oberen Hälfte ein wenig concav; es dehnt sich seitwärts in 2 beträchtliche Anschwellungen am Wirbel aus und fällt in einer weiten Krümmung zu den Schläfenbeinen ab ohne Ecken; wird vorwärts hinter den Augen schmaler, dehnt sich wieder aus und schickt einen Fortsatz zum Backenbein, wodurch der hintere Umfang der Augenhöhle vervollständigt wird. Breite des Beins, wo es am schmalsten ist, hinter den Augen, ist noch sehr groß, nemlich 16,2 Zoll.

Theils zwischen und theils hinter den Augen erheben sich mit einem breiten Grunde, der unmerklich in das Stirnbein verläuft, 2 kurze, dicke, kegelförmige Fortsätze. Sie verfügen sich schnell bei einer Spitze, wovon jedoch ein kleines Stück abgebrochen. Sie ragen so gerade von der Stirn empor, daß ihre Achse senkrecht auf ihrem Boden steht; sie divergieren aber unter einem beträchtlichen Winkel. Sie sind vom Grunde bis nach oben frey von allen Nauhigkeiten und haben eine ganz glatte und ebene Oberfläche. Sie sind offenbar die Zapfen von 2 intraorbitalen Hörnern. Wegen ihrer Lage und Größe bekommt der Kopf vorzüglich sein merkwürdiges Aussehen. Die Verbindungen des Stirnbeins sind nirgends zu erkennen, weil keine Spur von Rath geblieben ist. Am oberen Ende des Beins ist der Schädel gebrochen und der Knochenbau bloßgelegt. Die äußere und innere Platte stehen weit von einander und der Zwischenraum hat große Blätter von Ausbreitungen der Diploe wie beim Elephanten. Der Zwischenraum im Hinterhauptbein beträgt 2½ Zoll. An der linken Seite des Stirnbeins hat die Anschwellung am Wirbel die obere Platte verloren, und die Zellen zeigen mandelförmige Oberflächen oder Erhöhungen mit glatten Höhlen dazwischen.

Das Schläfenbein liegt größtentheils in der Steinmasse versteckt, ohne Spur von Schuppennath mit dem Stirnbein. Die unteren Fortsätze beim äußeren Gehörgang sind zerstört oder im Stein verdeckt. Hochfortsatz lang, läuft vorwärts zum Fortsatz des Jochbeins mit wenig Erhöhung oder Converität. Eine Linie längs demselben nach vorn würde durch die Tuberositäten der Kiefer gehen und rückwärts längs dem obern Rand der Gelenkköpfe des Hinterhauptbeins. Der Fortsatz ist stark und blau; Die Schläfenarube sehr lang und ziemlich leicht; sie steigt nicht hoch an der Seite des Schädels hinauf und ist überspannt von den walzenförmigen Seiten des Stirnbeins. Die Lage und Gestalt der Gelenkfäche mit dem Unterkiefer ist vom Stein verdeckt.

Gestalt und Größe der Scheitelbeine können wir nicht bestimmen, da der Schädel an dieser Stelle beschädigt ist; scheinen aber dieselbe Gestalt gehabt zu haben wie beim Rind.

Gestalt und Character des Hinterhauptbeins sind deutlich. Es nimmt einen großen Raum ein, hat eine beträchtliche Höhe und eine zum Stirnbein verhältnismäßige Breite. Seitwärts dehnt es sich in zwei Flügel aus, welche am obern Rande des Foramen magnum anfangen und auswärtwärts laufen. Sie sind flach und ausgehöhlt, unten und auswärtwärts fast von den Gelenkköpfen an bis zur Gegend des Warzenbeins. Ihre innern Ränder gehen fort als eine Leiste vom Rande des Hinterhauptlochs, laufen auseinander fast unter einem rechten Winkel, und umschließen eine große dreneckige Grube, in welche sie sich plötzlich senken. Sie ist meist ausgefüllt von Stein, scheint aber nicht leicht zu seyn und eine Modification desselben Baues beim Elephanten. Keine Spur von Hinterhauptskamm oder Höcker. Seitwärts an der Verbindung mit den Schläfenbeinen ist das Bein beschädigt. An diesen und den obern Bräthen zeigt sich der Bau, große Zellen mit der in Platten ausgedehnten Diploe und das äußere und innere Blatt weit von einander; so besonders deutlich am obern Rand, wo die Zellen an die des Stirnbeins zu stoßen scheinen.

Die Gelenkfortsätze sind sehr groß und vollkommen erhalten; längs der Durchmesser 4,4 Zoll, Abstand über das große Loch von ihren äußeren Ecken 7,4 Zoll; Maasse, welche die des Elephanten übertreffen. Gestalt ganz wie bei den Wiederkäuern, nemlich die äußere Fläche aus 2 Converitäten gebildet, welche an ihrer abgerundeten Kante zusammenstoßen; eine in der Linie der langen Achse erstreckt sich schief rückwärts zum vordern Rande des großen Lochs; die andere vor- und auswärtwärts vom hintern Rand, und die Linie ihrer Commissur liegt im Querdurchmesser des Lochs. Auch dieses ist groß. Der Längsdurchmesser 2,3 Zoll, der quere 2,6. Die großen Maasse des Lochs und der Gelenkköpfe müssen auf die Entwicklung der Wirbel Einfluß haben und die Gestalt des Halses und der Vorderfüße modificieren.

Das Keilbein und der ganze Grund der Hirnschale bis zum Gaumen fehlt oder ist verdeckt.

Der Theil der Stirn, wo die Nasenbeine anfangen, ist nicht zu unterscheiden: die Rath mit dem Stirnbein ist verwachsen. Zwischen den Hörnern ist eine Erhöhung in der Stirn, welche sich ein wenig nach vorn senkt; in der Verbindungslinie zwischen den vordern Augenwinkeln ist eine kurze Erhöhung in der Stirn. Von dieser Stelle, welche als der Ursprung der Nasen-



beine betrachtet werden kann, steigen sie von der Stirnebene unter einem beträchtlichen Winkel in die Höhe. An ihrem Grunde sind sie breit und stark gewölbt, gehen vorwärts mit einem convergen Umriß, werden plötzlich schmaler und endigen in eine nach unten gekrümmte Spitze, welche über die äußern Naslöcher hängt. Sie sind einen großen Theil ihrer Länge mit den Oberkiefern verbunden; vorwärts aber von dem Punct an, wo sie schmaler werden, beginnen, ist ihr unterer Rand frei und vom Kiefer durch einen weiten Ausschnitt getrennt, so daß sie von der Seite aussehen wie der Dorschfisch eines Habichts, vom untern abgesondert. Die Vorderländer der Oberkiefer sind beschädigt, so daß man die genaue Länge der Nasenbeine, soweit sie nicht mit denselben zusammenhängen, nicht bestimmen kann. In der Versteinerung sind 4 Zoll vom untern Rande der Nasenbeine längs der Krümmung gemessen, frey. Dieselbe Beschädigung verhindert zu sehen, wie nah die Zwischenkiefer an den Nasenbeinen standen, an welche sie nicht zu stoßen scheinen. Dieser Punct ist von großer Wichtigkeit, weil man daraus auf die weichen Theile um die Nase schließen kann. Die Höhe und Gestalt der Nasenbeine gehören zu den merkwürdigsten Abweichungen des Kopfes: von oben gesehen verjüngen sie sich plötzlich von einem breiten Grunde zu einer scharfen Spitze, und die senkrechte Höhe ihres convexen Theils über der Stirn an ihrem Grunde beträgt  $3\frac{1}{2}$ ". Die Gestalt der Oberkiefer ist ausgezeichnet durch ihre Kürze im Vergleich mit ihrer großen Breite und Tiefe; ferner durch die Richtung nach oben der Linie der Alveoli vom letzten Backenzahn an nach vorn, wodurch das Ansehen entsteht, als wäre das Gesicht nach oben gehoben, damit es der Erhebung der Nasenbeine entspreche. Diese Kürze des Kiefers zeigt sich auch in den Maßen der Zähne, indem dieselben zusammengedrückt sind und ihre Breite die Länge weit übertrifft, was bey den Wiederkäuern nicht gewöhnlich ist. Der Raum zwischen den äußern Flächen der Alveoli ist so groß als die Länge der Zahnlinie.

Die Backenhöcker sind sehr groß und vorragend. Der Durchmesser am Grunde 2" und die Breite des Kiefers über denselben 12,2", zwischen den Alveoli nur 9,8.

Sie liegen über dem dritten und vierten Backenzahn, gehen aufwärts von demselben gegen das Backenbein, und daselbst ist eine undeutliche Leiste am Bein.

Das Infracorbitalloch ist groß, senkrecht, 1,2 Z. weit und liegt über dem ersten Backenzahn wie bey Hund und Hirsch. Das Schnauzenstück des Weins ist abgebrochen, 2,8" vor dem ersten Backenzahn; von dessen Alveolarrand bis zur Fläche der Lücke oder der Lade (Diastema) ist eine plötzliche Senkung von 1,7 Z. Die Schnauze ist hier verschmälert auf 5,8" und vorwärts am abgeflachten Theil auf 4,1 Z.

Der Gaumenbogen ist convex von hinten nach vorn und concav nach der Quere. Keine Spur von Gaumenlöchern oder Nebenhöckern. Die Keilgaumenfortsätze und alles bis zum großen Loch fehlen oder stecken im Stein, mit Ausnahme eines Stücks vom Keilbeinfortsatz des Hinterhauptbeins, welches dem der Wiederkäuern gleicht. Das vorn abgebrochene Stück läßt die Verbindung der Zwischenkiefer mit den Oberkiefern nicht sehen; sie scheinen aber nicht bis zur Verbindung derselben mit den Nasenbeinen gereicht zu haben.

Das Jochbein ist dick, massiv und ziemlich vorstehend;

der untere Rand steigt herunter zum Oberkiefer, der obere bildet einen großen Theil der Augenhöhle. Der hintere Augenforsatz verbindet sich mit einem Fortsatz des Stirnbeins und vervollständigt hinten den Umfang der Augenhöhle. Der Jochanfang ist stark, dick und ziemlich flach. Kein Theil des Bogens, weder im Schläfen- noch im Jochstück, ragt hervor; der Raum zwischen den vorspringenden Punkten ist viel kleiner als der hintere Theil der Hirnschale, und etwas kleiner als die Entfernung zwischen den Körpern der Jochbeine.

Größe und Gestalt der Thränenbeine nicht zu bestimmen; ihre Fläche geht glatt in die anliegenden Beine über. Im untern und vordern Rande der Augenhöhle sind keine Thränenlöcher, und keine Grube darunter deutet auf einen Sinus lacrymalis. Auch keine Spur von einem Superciliarloch am Stirnbein.

Die Augenhöhlen liegen vorwärts wegen der großen Entwicklung der Hirnschale nach oben und wegen des kurzen Gesichts; auch liegen sie niedrig, ihr Centrum ist 3,6 Zoll unter der Stirnebene. Wegen einiger Verletzung beim Ausmeißeln entspricht sich die Kreisgestalt beyder Augenhöhlen nicht ganz. Auf der linken Seite, welches die bessere ist, macht die lange Achse einen kleinen Winkel mit der der Stirnebene; der Durchmesser von vorn nach hinten beträgt 3,3 Z., der senkrechte 2,7. Im Rand der Augenhöhlen ist keine Vorragung oder Ungleichheit wie bey den Wiederkäuern, die Ebene des Randes ist sehr schief: der Raum zwischen den obern oder Stirnrändern beyder Augenhöhlen ist 12,2 Zoll, der der untern oder Zahnländer 16,2 Zoll.

Die Maße:	engl. Zoll.	Met.
Vom vordern Rand des großen Lochs bis zum Alveolus des ersten Backenzahns . . .	18,85	0,478
Von da zum abgebrochenen Ende d. Schnauze . . .	20,6	0,5268
Von da zum hintern Rand des letzten Backenzahns . . .	10,3	0,262
Von der Spitze der Nasenbeine zum obern abgebrochenen Rande der Hirnschale . . .	18,0	0,4568
Von da bis ebendahin nach d. Krümmung . . .	19,0	0,4822
Von da bis dahin längs der Krümmung, bey welcher der Nasenbogen sich von der Stirn erhebt . . .	7, 8	0,198
Vom letzten Punct bis zum abgebrochenen Rand der Hirnschale . . .	11,2	0,284
Von der Nasenpitze bis zu einer Sehne von einer Hornspitze zur andern . . .	8,5	0,216
Vom vordern Winkel der rechten Augenhöhle zum ersten Backenzahn . . .	9,9	0,251
Vom hintern Winkel bis zum abgebrochenen Rand der Hirnschale . . .	12,1	0,3075
Breite der Wirtelschale am Wirbel . . .	22,0	0,559
Breite zwischen d. obern Rändern d. Augenhöhlen . . .	12,2	0,3095
Zwischen den untern . . .	16,2	0,4108
Hinter den Augenhöhlen bey der Verschmälerung des Stirnbeins . . .	14,6	0,3705
Zwischen der Mitte der Jochbögen . . .	16,4	0,4168
Zwischen den Körpern der Backenbeine . . .	16,62	0,422
Breite des Schädelsgrundes hinter den Warzenfortsätzen beyderseits abgebrochen . . .	19,5	0,496



	engl. Zoll.	Meter.
Breite zwischen den Backenhöckern der Oberkiefer	12,2	03,095
Schnauzenstück der Oberkiefer vor dem ersten Backenzahn	5,8	0,149
Am abgebrochenen Ende	4,1	0,104
Zwischen den äußeren Flächen der Hörner an ihrem Grunde	12,5	0,312
Zwischen ihren abgebrochenen Spitzen	13,65	0,347
Senkrechte Höhe an einer Schne zwischen ihren Spitzen auf die Stirn	4,2	0,165
Von der Convergenz der Gelenkköpfe des Hinterhauptes auf die Mitte des Stirnbeins hinter den Hörnern	11,9	0,302
Vom Körper des Keilbeins zum Stirnbein zwischen den Hörnern	9,94	0,252
Von der Mitte des Gaumens zwischen dem dritten und vierten Backenzahn zum Stirnbein am Grunde der Nasenbeine	7,52	0,192
Von der hinteren Fläche des letzten Backenzahns zum Ende der Nasenbeine	13,0	0,331
Von der Kaufläche des vorletzten Backenzahns zur Wurzel der Nasenbeine	10,3	0,262
Von der Convergenz an der Spitze der Nasenbeine zur Gaumensfläche vor dem ersten Backenzahn	5,33	0,14
Von der Mitte der Hinterhauptsfügel zur Anschwellung auf dem Wirbel des Stirnbeins	8,98	0,228
Vom untern Rande der Augenhöhle zur Kaufläche des fünften Backenzahns	7,3	0,186
Von der Kaufläche des ersten Backenzahns zum Gaumenrand vor demselben	2,6	0,066
Raum vom vordern Augenwinkel zur Nasenspitze	10,2	0,2595
Durchmesser der linken Augenhöhle von vorn nach hinten	3,3	0,084
Senkrechter	2,7	0,0685
Großes Loch von vorn nach hinten	2,3	0,058
Nach der Quere	2,6	0,066
Langer Durchmesser des Gelenkkopfes des Hinterhauptbeins	4,4	0,112
Kürzer oder querer	2,4	0,0603
Zwischen ihren äußeren Winkeln über das große Loch	7,4	0,188

Unter den vielen in der Nachbarschaft gefundenen Knochen ist das Stück eines Unterkiefers von einem sehr großen Wiederkäuer, ohne Zweifel von demselben Thier. Es ist das Hinterstück des rechten Kiefers, abgebrochen am vordern Drittel des letzten Backenzahns. Kron- und Gelenkfortsatz und der Winkel fehlen. Vom letzten Backenzahn sind nur die 2 hintern Drittel vorhanden; die Kaufläche verkehrt, zeigt dennoch die Schmelzmonde des Wiederkäuers. Der Umriß im Vertikalschnitt ist eine zusammengedrückte Ellipse, die äußere Seite mehr convex als die innere. Der Knochen verbündet sich auf der innern Seite gegen den Winkel in eine breite und deutliche Muskelgrube; und von da läuft auf den Ast gegen das Arterienloch eine deutliche Furche wie bey den Wiederkäuern. Die Oberfläche des Zahns ist mit sehr kleinen Rauhigkeiten und

Isis 1835. Heft 2.

Streifen besetzt wie die im Oberkiefer. Er bestand aus 3 Halbwalzen nach der Regel dieser Junst, und die starke Abkantung beweist, daß das Thier mehr als erwachsen war.

#### Sivatherium. Büffel. Camel.

Tiefe des Kiefers vom Alveolus des ersten Backenzahns	4,95"	2,65	2,70
Größte Dicke desselben	2,3	1,05	1,4
Breite der Mitte des Backenzahns	1,35	0,64	0,76
Länge der hintern 2 Drittel desselben	2,15	0,95	1,15

Kein bekannter Wiederkäuer hat einen so großen Unterkiefer; die gegebenen Maße betragen über das doppelte von denen des Büffels, dessen Kopflänge 19,2" (0,489 Meter); sie übertreffen selbst die des Nashorns. Es gehört daher unbedingt zum Sivatherium.

Consi haben wir nichts vom Kopfe gefunden. Später aber hat Cautley in Journal as. soc. IV. Folgendes angezeigt: während meiner Reise in den Bergen Sivalik am Pinjor-Thal wurde ein Skelet ausgegraben. Es steckt noch im Felsen und scheint zu bestehen aus dem Schenkel, Schienbein, der Fußwurzel, dem Mittelfuß und den Zehengliedern. Ich konnte aber keine Maße nehmen.

Es ist zu bedauern, daß man nichts über die Schneid- und Eckzähne sagen kann, und auch nicht, ob noch außerdem 2 Hörner dagewesen sind. Wahrscheinlich fehlten aber die ersten, wie allen Wiederkäuern, mit anstoßenden Backenzähnen; bey den Camelen sind die vordern unsymmetrisch und von den andern abgesondert.

Weder bey den Rindern noch bey den Camelen erheben sich die Nasenbeine über die Stirnebene; also ganz verschieden von unserm Thiere, wo sie sich in einem rundlichen Winkel unter 130° erheben, also mehr als bey Nashorn, Tapir und Paläotherium. Wahrscheinlich waren sie vorn frey und nicht mit den Zwischenkiefern verbunden. Was die weichen Theile der Schnauze betrifft, so müssen sie denen des Tapirs am ähnlichsten gewesen seyn, d. h. es muß eine Rinne gehabt haben; dafür spricht auch das große Infraorbitalloch, mithin der dicke Nerve zur Oberlippe; die weite Trennung der Tafeln der Kopfknochen mit Zellen wie bey Elephanten; die breiten Hinterhauptsfügel, welche auf große Halsmuskeln deuten, wie sie bey Thieren mit einem Büffel vorhanden sind; die großen Gelenkköpfe, selbst größer als bey Elephanten. Der Hals konnte daher nicht sehr beweglich seyn. Da es ein großstehendes Thier ist, so mußten die Halswirbel sehr lang seyn, wenn es keinen Büffel hatte; aber dann wäre es nicht denkbar, wie die Muskeln den Hals sammt dem Kopf hätten tragen können. Er muß also kurz gewesen seyn wie bey Elephanten. Endlich ist das Gesicht kurz, breit und massiv wie bey Elephanten und wie bey keinem Wiederkäuer.

Kein Wiederkäuer hat die Hörner so stehen wie hier. Sie müssen dick, gerad, aber nicht lang gewesen seyn. Nur bey Antelope quadricornis (Chicara) in Hindostan stehen 2 Hörner vor den andern.

Bey den Rindern erhebt sich das Stirnbein jederseits gegen die Hornapfen; nicht so bey den hornlosen Wiederkäuern, aber bey Sivatherium, hat also vielleicht noch zwei Hörner

weiter hinten gehabt: wenn nicht, so ist der Bau noch sonderbarer.

Bei den meisten Wiederkäuern mit anschließender Zahnreihe ist der Raum vom ersten Backenzahn bis zum Vorderende des Zwischenkiefers fast so lang als die Zahnreihe; bei den Camelien aber, wo die Zahnreihe unterbrochen ist, verhält es sich nicht so; die Entfernung vom ersten Backenzahn bis zum Rande des Zwischenkiefers ist kleiner. Bei *Sivatherium* sind die Backenzähne angegeschlossen; und so darf man schließen, daß die Schnauze vom ersten Backenzahn an fast 10" gewiesen und der ganze Kopf 28,85.

Die Lage und Größe des Auges unterscheidet die Wiederkäuer von den Dickhäutern; bei jenen groß und voll, bei diesen klein und eingesenkt: bei *Sivatherium* ist die Augenhöhle viel kleiner als bei irgend einem Wiederkäuer, ist auch mehr vorwärts gerichtet und steht tiefer unter der Stirn; der Rand springt nicht vor wie bei den Wiederkäuern und seine Ebene ist schief, da der Raum zwischen beiden Augenhöhlen am oberen Rand 12,2" beträgt, am unteren 16,2; der Längsdurchmesser zum senkrechten wie 5 zu 4; die lange Achse fast in einer Linie vom Sinus naso-maxillaris zum hinteren Rand des Jochbogens; das Auge war also kleiner und stand weniger vor als bei den andern Wiederkäuern, der Blick schwerer und unedler, jedoch weniger als bei den Dickhäutern; der Blick ziemlich vorwärts und seitwärts, aber nicht nach hinten.

Die innere Centralplatte des Schmelzes auf der Kaufläche ist ausgemerzt fast wie bei *Elasmotherium*, wodurch das Kauvermögen verstärkt wird und man schließen muß, daß das *Sivatherium* mehr von Blättern und Zweigen lebte als von Gras, oder daß wie beim Pferde das Futter mehr gekaut wurde, die Verdauungsorgane daher zusammengefaßt waren, der Leib weniger dick und das Bedürfnis des Wiederkäuens nicht so groß wie bei den jetzt lebenden.

Vergleichung:	Elephas.	Sivath.	Rhinoceros
Vom Rand des großen Lochs zum ersten Backenzahn . .	23,10"	18,85	24,9
Breite der Hirschkale . .	26,0	22,0	12,05
Breite des Gesichtes zwischen den Backenbeinen . .	18,5	16,62	9,20
Größte Tiefe des Schädels	17,80	11,9	11,05
Langer Durchmesser des großen Lochs . . . . .	2,55	2,6	2,6
Kurzer . . . . .	2,4	2,3	1,5
Mittel	15,06	12,38	10,22

Dieses merkwürdige Thier füllt also den Raum aus zwischen den Wiederkäuern und den Dickhäutern; Zähne und Hörner wie bei den erstern; Oberlippe, Gesichtsknochen, Größe und Stand der Augenhöhlen wie bei den letztern. Rüssel bei einem Wiederkäuer fällt am meisten auf; aber beim Camel ist auch eine Neigung dazu; die Oberlippe gespalten und jede Hälfte für sich beweglich.

Die Versteinierung fand sich am Marklandfluß in einem kleinen Thal, welches zwischen dem Kparada-Dun und dem Thale von Pinjor streicht, in dem Sinait oder dem subhimalayischen Gürtel von Hügel mit Knochen von *Elephas*, *Mastodon*, *Rhinoceros*, *Hippopotamus* etc. Es war nicht

zahlreich und verglichen mit *Mastodon et Hippopotamus sivalensis* n. mit 6 Schneidezähnen in jedem Kiefer, sehr selten. Northern-Doab am 15ten Sept. 1835.

St. 201. Bishop, Untersuchungen über die menschliche Stimme.

411. F. D. Ward, physiologische Bemerkungen über den großen Brustmuskel t. 4.

Vol. X. Nr. 58—63. Jänner—Juni 1837.

St. 1. Charlesworth, über den Trag und die Erzhümer in der Classification der tertiären Ablagerungen.

37. P. Reith, über die Classification der Pflanzen.

51. Hall, über J. Müllers reflectierende Function des Rückenmarks.

72. N. H. Schomburgk: das Wooraly oder Ourary-Gift bereiten die Indianer Makoosies von Pirarira und die Warpeshanas von den Concon-Gebirgen am Dronoco aus einer neuen *Strychnos*, *toxifera*: *Folius ovato lanceolatis, acuminatis*, 3—5 *nervis utrinque ramulisque ferrugineo tomentosis*, *bacca polysperma*.

*Pithecia leucocephala* (Saki et yarke).

Männchen ist glänzend schwarz, das Gesicht aber und das Weibchen braun; lebt im Innern von British Guyana, zwey Tagereisen von den Ufern des Rupunumy, in beträchtlicher Menge.

Nicholson, *Coccothraustes europaea* brütet auch in England.

A. B. Lambert, es gibt zwey Arten der peruvianischen Samen von Guinoa, wovon der dunklere eine eigene Gattung bildet. *Chenopodium altissimum* wird 12' hoch. Wird auf Hochebenen 13000 hoch gebaut; ehemals fast nichts anderes; der Anbau hat aber jetzt in Peru und Chili sehr nachgelassen seit der Einführung des europäischen Kornes.

Ward; *Cynomorium coccineum*, wird am Berg Sinai gegessen; findet sich auch in Malta, Sicilien und der Barbarey: aber sehr örtlich.

77. Oberlieutenant Colebrooke. Auf Ceylon gewinnt man crystallisirten Zucker vom Lobby, dem Saft der *Cocospalme*. Man sammelt den Saft in reine Gefäße, in welche man ein wenig vom *Al-* oder *Banyan*-baum thut, um die Gährung aufzuhalten. Ehe diese beginnt, seigt man ihn durch Leinwand, kocht ihn in einer metallenen Pfanne und schäumt ihn ab. Sobald er sein wässriges Aussehen verliert und etwas röthlich wird, kommt er in eine andere Pfanne, wo er stark gekocht und wieder abgeschäumt wird. Dann wird das Feuer allmählich vermindert, bis oben weißer Schaum entsteht. Dann wird der Saft kleeartig und kommt vom Feuer. Zur Prüfung läßt man ihn etwas erkalten und wägt es zwischen den Fingern zu einem Draht. Wird dieser einen Zoll lang, ohne zu brechen, so nimmt man den Syrup vom Feuer, gießt ihn in ein anderes Gefäß und läßt ihn erkalten, bis er nur lauwarm ist. Dann mischt man etwas crystallisirten

Früher oder Zuckerkandeln damit, thut ihn in ein anderes Gefäß, welches unten einen Stöpsel hat, welcher den uncrystallisirten Theil ausfüllern läßt. In einer Woche ist die Crystallisation zu Ende; man nimmt den Stöpsel heraus und läßt alle Flüssigkeit ablaufen; nach der zweiten Woche thut man den crystallisirten Zucker in einen Sad neben ein Feuer. Die Gewinnungskosten betragen  $1\frac{1}{2}$  Pennn auf Pfund, mit Ausnahme der Kosten der Geschirre.

**E. 100. J. Blackwall**, Charactere einer neuen Sippe von Spinnen.

*Inaequitelae*. *Deletrix*; 6 Augen u. *D. exilis*, nur 1 Linie lang, unter *Steinen*, dem *Scytodes* verwandt.

*Theridium formosum*  $1\frac{1}{2}$  Linie lang.

*Orbitelae*, *Epeira nubila*,  $\frac{1}{2}$  Linie lang.

*Laterigradae*, *Philodromus variatus*, 3 Linien lang.

*Ph. mistus*, 3 Linien lang.

**Citigradae**: *Lycosa leucophaea*,  $\frac{1}{4}$  Zoll lang. Alle in England gefunden und ausführlich beschrieben.

108. **Reith**, über Classification der Pflanzen.

137. **Williamson**, Bertheilung der Versteinerungen im Roogenstein.

223. **Babington**, Beschreibung der Gattungen *Polypogonum* aus Indien.

440. **Westwood**, Beschreibung von neuen brittischen Thieren.

Die Charactere werden gegeben von *Encyrtus dalmanni*, *zetterstedtii*, *alipes*, *sulphureus*, *schoenherri*, *dahlbomii*, *bohemanni*, *aderaeus*.

*Choreus ineptus* (*Sphenolepis*).

*Agonioneurus albidus*, *subflavescens*.

464. Seit kurzer Zeit sind gestorben:

Edward Turner Bennett, Verfasser der *Zoological Gardens* u.; *H. Th. Colebrooke*; *A. Collie*; *E. Donovan*; *Joh. Latham*; *W. C. Leach*; *J. Oliveira*; *J. Sabine*; *A. Agelius*; *A. L. de Jussieu*; *Christ. F. Persoon*; *H. A. Schrader*.

487. **R. Ball**; über die Robben an Irland.

Die gemeinste ist *Phoca gryphus*, welche sich nach Nilsson in der Ost- und Nordsee findet. Die Lebensart der irischen ist aber ganz verschieden; daher vielleicht eine besondere Gattung. Die Färbung ändert so sehr nach Geschlecht, Alter und Jahreszeit, daß sie nicht den geringsten spezifischen Werth hat. Die Zähne nähern sich denen des Delphins und daher hat man mit Recht daraus die Sippe *Halichoerus* gebildet. Das Profil ist gerad, das Aussehen wild, die Länge verhältnißmäßig größer. *Donovans Phoca barbata* (und *Parsons* lange Robbe) im brittischen Museo ist ein schlecht ausgestopftes Exemplar von *Halichoerus gryphus*.

*Phoca vitulina* (*variegata* Nilss.) ist einerley mit

*James Robbe* in *Philos. Transact.* 1822. von den Ostsee-Inseln; welcher man aber, wie es scheint, einige Zähne von der *Phoca groenlandica* in den Oberkiefer gesteckt hat. Der schiefe Rand der Backenzähne bey *Phoca vitulina* findet sich nur bey den jüngeren und auch etwas bey *Halichoerus*, ist daher kein Gattungscharacter.

Die in dem Severn gefangene Robbe, welche Nilsson für *Phoca annellata* hielt, ist *Phoca groenlandica*, ungeachtet ihrer Kleinheit. Die Gestalt des Zwischenkiefers ist anders als bey *James Robbe*.

Er glaubt auch, *Phoca barbata* an der Südküste von Irland gesehen zu haben.

Vol. XI. Nr. 64—70. July—Dec. 1837.

**E. 13. J. B. Reade**, über den Bau der Äsche in den Pflanzen und ihre Analogie mit dem Knochen-system der Thiere L. 1.

33. **B. C. Baker** und **H. M. Durand**, fossiler Kiefer eines riesenartigen Affen, verwandt mit den Sippen *Semnopithecus* et *Cynocephalus*. *Asiatic Journal of the Asiatic Society of Bengal*. V. p. 739 (Jfss Taf. II.).

Bekanntlich kommen Thiere, welche auf Bäumen leben, wie Vögel und Affen, selten versteinert vor; von den letztern hat man noch gar keine gefunden. Den vorliegenden Kiefer fand man in den Hügeln bey Sutlej am Himalaya. Das Bruchstück ist die rechte Hälfte des Oberkiefers mit allen Backenzähnen, wovon aber der vordere etwas vom Schmelz verloren hat, und eben so der fünfte. Der zweite und dritte ist ziemlich abgekauert und der Zustand des vierten und fünften zeigt an, daß das Thier ausgewachsen war. Der Eckzahn ist klein und sehr verkrümmelt; nur seine Einfügung in den Kiefer und sein Durchschnitt ist zu erkennen.

Die Gestalt der Backenzähne zeigt entschieden, zu welchem Thier sie gehören; es ist aber auch noch genug von der Augenhöhle übrig, um dieses zu bestätigen: der untere Theil der Augenhöhle und ein Stück des Jochbogens sind so deutlich, daß aller Zweifel verschwindet, da die Augenhöhlen der Affen so eigenthümlich sind, daß man sie mit denen anderer Thiere nicht verwechseln kann.

Nach **Fr. Cuviers** Abbildungen des Gebisses hat diese Versteinerung viel Aehnlichkeit mit *Semnopithecus*; der Durchschnitt des Eckzahns und die Gestalt und Größe der übrigen Backenzähne sind denen von *Semnopithecus maurus* aus Java sehr ähnlich; noch mehr denen des *Semna. entellus* aus Indien. Der dritte Backenzahn ist zu sehr abgekauert, als daß er sich vergleichen ließe; der vierte gleicht dem von *S. maurus*; der fünfte aber gleicht keinem von den durch Cuvier abgebildeten Gattungen: denn er hat eine kleine interstitiale Spitze von Schmelz an der innern Seite, welche sich bey den andern nicht findet. Die Schneidezähne fehlen, aber der Zwischenkiefer ist erkennbar.

Außer der Größe des Eckzahns und fünften Backenzahns hat das Exemplar einige Aehnlichkeit mit *Macacus* oder *Cynocephalus*, aber der kleine Eckzahn und die großen Backenzähne

nähern es mehr dem *Semnopithecus*; indessen ist der Unterschied zwischen beynen groß; denn *Semnopithecus* entellus soll  $3\frac{1}{2}$  Schuh hoch werden, während die Höhe des versteinerten Thiers gleich der von *Pithecus satyrus* gewesen seyn muß; denn der Raum der Backenzähne beträgt 2,5". Dieses riesenhafte Thier war also gleichzeitig mit den Dickhäutern am untern Himalaya.

In Fig. 2. ist a. der Boden der Augenhöhle;

b. der aufsteigende Theil desselben.

48. E. F. Bromhead, Bemerkungen über den gegenwärtigen Stand der botanischen Classification.

89. Verhandlungen der königlichen geologischen, zoologischen und irischen Gesellschaft. Das Wichtige theilen wir ein ander mal mit.

135. Portlock zählt die Anatifen auf, welche um Irland vorkommen.

*Anatifa vitrea* (fascicularis, dilatata), sonst sehr selten, welche Lamard von Noire-Moutier bekommen hat. Auch an der Nordküste von Antioche, an der Küste von Youghal, von Clare, ist also weit verbreitet; auch an der Westküste von England im St. George's Canal und an Hiltland.

Dabey ist gewöhnlich *A. laevis* (*Lepas anatifera*).

Es findet sich noch an Irland:

*A. sulcata* bey Kenmare; *A. striata* bey Dublin; *Polycipes scalpellum* ebenda; *Cineras vittata* (*Lepas membranacea*); *Otium Cuvieri* (*Lepas aurita*), an Balanen.

189. G. Newport, über die Temperatur der Kerse.

Ist niedriger bey den Larven als bey den Fliegen; bey den Raupen 0,9 bis 1,5, bey den Faltern 5—10.

Bey der Larve der Immen 2—4, bey der Fliege 4—15 und selbst 20, was von der Lebhaftigkeit des Thieres abhängt. Den Winterschlaf leitet er von Anhäufung der Fettmasse ab; ist sie zur Ernährung erschöpft, so wacht das Thier auf. Fliegende Kerse find wärmer, und unter diesen wieder diejenigen, welche bey Tag fliegen.

Die gesellschaftlichen Kerse, wie Hummeln und Bienen, können willkürlich durch Vermehrung des Athmens die Wärme erhöhen. Die Stockbienen erhalten während des Winters keine höhere Temperatur, wosfen sie nicht beunruhigt werden; sie treten dann in den Zustand der Uebernwinterung; werden sie aber gestört, so erhöhen sie ihre Temperatur selbst im Winter; sie ist am niedrigsten im Fänner, wächst bis zur Zeit des Schwärmens im May oder Juny und nimmt dann ab. Sie ist im July und August 10—15 Grad. Während des Verdauens nimmt die Wärme zu wegen der vermehrten Athmung. Das Nervensystem trägt nichts dazu bey.

205. Owen, Beschreibung des Schädels von *Toxodon platensis*, einem fossilen und riesenhafteu Nagthier mit Verwandtschaften zu den Dickhäutern und grasfressenden Walen, gefunden in weißlicher Thonerde am Flusse Saranibó, welcher in den Rio negro fällt, 120 englische Meilen nordwestlich von Montevideo.

Der Schädel ist so groß wie der des Nilpferds, 3 Schuh, 4 Zoll lang, 1 Schuh 4 Zoll breit; länglich, niedergedrückt, mit sehr großen Jochbögen und einem senkrechten Hinterhauptslöcher. Riefertheil von den Seiten zusammengedrückt, schmal mit großen, am Ende etwas breiteren Zwischenkieferbeinen, Backen- und Schneidzähne; der letztern vier im Oberkiefer, die zwey mittleren sehr klein, die zwey äußeren sehr groß, gebogen und ihre Höhle erstreckt sich rückwärts durch die Zwischenkieferbeine bis zum Oberkieferbein und endigt ohne Verkleinerung unmittelbar vor den Backenzähnen. In Gestalt und verhältnißmäßiger Größe müssen sie Nagzähnen gleichen haben.

Die Backenzähne zeigen nicht weniger eine große Annäherung in Gestalt und Bau zu den Backenzähnen der grasfressenden Nagthiere. Ihre Zahl ist jederseits 7 im Oberkiefer, und aus ihren Höhlen zu schließen, waren sie einander im Bau gleich.

Aus dem übrigen Bau schließt der Verfasser, daß es ein Wasserthier gewesen. Es könnte zum *Dugong* gehören, wie das *Dinotherium*: aber die Luftzellen oder Sinus in den obern Wänden der Hinterschale zeigen, daß man dabey nicht auf ein walartiges Thier schließen darf. Von den Nagthieren weicht es ab durch die überabstehenden Schneidzähne, sowie durch die Zahl und die Richtung der Krümmung der Backenzähne, durch die quere Richtung der Gelenkhöhlen für den Unterkiefer und durch die Lage des Jochbogens; es weicht von beynen ab durch die senkrechte Lage des Hinterhauptslöcher und der hintern Fläche des Schädels; in der Gestalt und Lage der Gelenkköpfe des Hinterhauptbeins; in der Lage der Naslöcher, in der Dicke und dem Gewebe der Schädelwände, und zeigt darinn eine Verwandtschaft zum *Dinotherium* und den Walen.

Die Entwicklung der Nasenhöhle und die Anwesenheit von Stirnhöhlen machen es jedoch höchst unwahrscheinlich, daß das Thier ausschließlich im Wasser gelebt und keine Hinterfüße gehabt habe; es gehörte daher nicht zu den Walen, sondern deutet nur einen Uebergang an, von den Nagthieren durch die Dickhäuter zu den Walen, worauf schon das *Capybara* hinweist, welches in denselben Gegenden wohnt.

Ch. Darwin beschreibt soeben das geognostische Vorkommen dieses Thiers. In Schlamm und Geröll bey *Basia blanca* einige Hundert Meilen südlich vom Plata findet sich *Megatherium Cuvieri* und eine kleinere Gattung; ferner ein Thier wie das *Amadill*, aber fast so groß wie ein Pferd; einige kleinere Nagthiere und andere.

Einige hundert Meilen weiter nach Süden fand er Knochen von einem Thier, welches nach Owen mit dem Lama oder *Guanaco* verwandt ist, aber von riesenhafteu Größe. Dabey waren, wie auch bey dem vorigen, Schneckenfalten gleich denen, welche noch im benachbarten atlantischen Meer vorkommen.

247. Bromhead, über die Verwandtschaften des botanischen Familien.

344. Bafe, über die Complexion der alten Aegyptier.

E. 394. Capitán Cautley schreibt von Sahampur im November 1836, daß der Major Selwin wieder in den Gewaltthügeln am Himalaya einen Kopf vom *Sivatherium*

entdeckt habe, woraus sich ergab, daß das Thier 4 Hörner habe, zwei vorn auf der Stirn und zwei große dreieckige dahinter. Er betrachtet das Thier als verwandt der Antilopen-Gruppe Dicranocerine von Hamilton Smith.

Auch wurden Versteinerungen von Mastodon angustidens nebst zwei andern Gattungen; Anaplotherium sivalense, Camelus sivalensis, Antelope, Hippopotamus sivalensis, dissimilis, Elephant, Nashorn, Schwein, Pferd, Bisamthier, kaum größer als ein Hase, Felis cristata, Canis, Hyæna, Ursus sivalensis, Ratel; Vogelknochen größer als die von Ciconia argala; von Lurcheu außer dem Gavial und Magar (Leptorhynchus gaugeticus), L. crassidens; Emyx et Triouyx.

§. 409. Lindley, über die botanischen Verwandtschaften von Orobanchen.

Sollen so stehen: Pyrolaceae (inclusis Monotropaceis), Orobanchaceae, Gentianaceae.

413. Reade, über den Bau der festen Theile in der Achse der Pflanzen.

452. Solly, über den Rußbaum (Palo de vaca).

Der naturwissenschaftliche Verein des Harzes

hatte am 26. Febr. 1837. seine 7te (jährliche) Versammlung zu Merisbad. Der 3. Vorsitzende des Vereins, Herr Oberbergath Zincken aus Magdeburg, eröffnete die durch Anzahl und Character der Theilnehmer glänzende Sitzung mit einer Relation über die bisherige, bereits ersprießliche Resultate gewährende Wirksamkeit des Vereins und über die demselben jetzt zunächst vorliegenden Aufgaben.

Herr Prof. Germar aus Halle sprach über die Petrefacten des Harzes, vertheilte das hier beigelegte Doppelverzeichnis, und zeigte viele instructive Exemplare vor. Er forderte die Harzer Naturforscher auf, die Versteinerungen des Harzes sorgfältig zu sammeln und sie einer Untersuchung zu unterwerfen. Zwar habe Krüger in Neubüding die Versteinerungen seiner Umgebung sehr sorgfältig gesammelt, auch aus dem Lias bei Oeder wäre viel bereits zusammen getragen, die organischen Ueberreste im Kupferschiefer wären fast alle bekannt und eben so auch aus den Steinkohlenlagern von Wettin bereits sehr viele; aber der hohe Harz mit seinen Schiefen und Kalksteinen sey fast noch eine terra incognita. Er glaubte deshalb, daß es von einem Interesse seyn dürfte, die ihm bekannt gewordenen Versteinerungen der alten Formationen aufzuzählen, die ihm Gelegenheit zu einigen Bemerkungen geben würden.

Die Grauwacke und der ältere Kalkstein nehmen einen großen Theil des Harzes ein, sind aber nur an wenigen Punkten durch deutliche Versteinerungen ausgezeichnet, jedoch auch sehr wenig untersucht. Aus der sonst in diesem Gesteine so verbreiteten Familie der Trilobiten wurde Ref. nur ein einziges, aber ziemlich vollständiges Exemplar einer Calymene Blumenbachii in der Grauwacke vom Kloster Michelstein bekannt. Jfe 1838. Heft 2.

Von den vielen Arten von Orthoceratiten sind nur Bruchstücke von Orthoceratites communis vom Büchenberge bey Elbingerode, aber nichts von Goniatites und Planulites vorgekommen; doch erwähne Schlottheim eines Goniatites (primordialis) von Grund. Von Schnecken überhaupt sah er noch nichts als einige undeutliche Steinern, die wahrscheinlich von einem Turbo abstammen, aus der quarzigen Grauwacke von Schafke. Die Classe der eigentlichen Muscheln (Acephala) würde ohne Repräsentanten seyn, wenn er nicht ein Exemplar von Nucula antiqua von Schafke und einen Steinern von einer Cyclus oder Tellina aus Harzer Grauwacke ohne nähere Angabe des Fundortes erhalten hätte.

Von Brachiopoden kommen Orthis pecten und Delthyris macroptera und laevicosta am Rammelsberg und auch bey Schafke nicht selten vor. Merkwürdig ist ihm ein Abdruck eines Delfels von Calceola sandalina, ebenfalls aus harzer Grauwacke und wahrscheinlich am Rammelsberge gefunden. In großer Menge trifft man Trochiten und Entrochiten des Cyathocrinites pinnatus, wo die Steinern der Entrochiten von Kriebel und unter dem Namen Schraubensteine oder Eritoniten längst bekannt sind. Am Rammelsberge, bey Schafke, selbst in dem Kalksteine des Büchenberges sind die eingelenkten Trochiten eine häufige Erscheinung. Ein Abdruck eines Stiels mit Hüskarmen und den ersten Kelchgliedern in Grauwacke wurde Ref. auch, als vom Harze stammend, mitgetheilt. Corallinen werden sich gewiß in der Folge zahlreich finden; bis jetzt sind ihm nur Calamopora gothlandica vom Rammelsberge, C. spongites in Gesellschaft von Eritoniten des Kriebelandes vorgekommen, so wie Cyathophyllum caespitosum und ceratites von Grund und vom Büchenberge. Pflanzen sind ihm vom eigentlichen Harze auch unbekannt, während der Grauwackenzug bey Magdeburg reich an interessanten Stämmen ist.

Der Kohlenbergbau am Pappenberge und Mißdorf hat aufgehört, ohne daß die dabei im Schieferthon vorkommenden Pflanzenabdrücke genauer berücksichtigt worden wären. Desto mehr Ausbeute haben die Kohlenlager von Wettin und Lößeburg gewährt, wo Ref. die Entdeckung machte, daß Sternbergs Volkmanntia gracilis nur die Aehre des Sphenophyllites schlottheimii sep. Es würde zu weit führen, hier ein Verzeichniß der dort vorkommenden Pflanzen zu geben, und eines dieß erhält Prof. Göppert alle Entdeckungen, und wird sie seiner Zeit bekannt machen; nur des Diplacites emarginatus, der sich durch die weit von einander abstehenden Fiedern der Blätter, so wie des Calamites varians, dessen jährlicher Trieb sich durch allmähliche Abnahme der Länge der Glieder und runde Narben am Ende des letzten Jahrgliedes auszeichnen, sey hier gedacht, so wie der Blätter derselben, die an den Gelenken sitzen und der Pflanze Verwandtschaft mit der Hippuraria geben.

Der Bechstein des Mansfeldischen ist sehr arm an Versteinerungen; nur als Seltenheiten und undeutlich kommt die Leptæna pelargonata mag schloth. und ein Anthophyllum, dem Anthophyllum caespitosum sehr nahe verwandt, bey Eisleben vor. Ob die sich ähnlichen Concretionen eben daher wirklich Fische oder Concretionen sind, läßt Ref. unentschieden.

Reich ist der bituminöse Mergelschiefer und die Fische hat Agassiz abgebildet. Der *Trilobites bituminosus* ist nichts als die noch zusammenhängenden Gaumenzähne eines *Placodus*. Zweifelsfrei sind noch die so genannten Altraupen, der festschlangenhähnliche Fisch *Schlottheims* und der *Acrolepis asper*. Als neue Entdeckungen sind vorhanen ein *Palaeniscus Freislebeni* mit deutlicher Wirbelsäule, ein *Pygopterus Humboldti* mit chagrinartiger Haut und ein *Alethopteris*, der Aleth. Bronnii Goepf. aus Frankenberg nahe verwandt. *Caulerpi-tes lycopodioides* und *selaginoides* möchten nur Abänderungen einer Art seyn. Merkwürdig ist, daß die Verfeinerungen des bituminösen Mergelschiefers bey Jämenau und Glücksbrunn, obgleich ähnlich, doch alle der Art nach verschieden sind, so daß Refert. fast zweifelt, ob der Monitor antiquus, von dem ein einziges Mal ein Exemplar bey Rothenburg gefunden wurde, hieher gehört und nicht vielleicht von einer verwandten Art stamme.

Der Stifter und Ehrenpräsident des Vereins, Hr. Apotheker Hornung aus Aschersleben, sprach über einige, theils überhaupt, theils doch für das Harzgebiet neue Käfer, und versprach, sein von ihm, mit Unterstützung der Herren Ahrens in Hettstedt, Sarsen in Clausthal, Director Dr. Suffrian in Siegen, und Rector Lüben in Aschersleben entworfenes Verzeichniß der Käfer des Harzes nächstens zum Druck zu bringen und später ein allgemeines entomologisches Verzeichniß zu liefern.

Von den neuen Käfern verdient der *Hydroporus thermalis* Horn. besonderer Erwähnung.

Er lebt in den 40—50° R. heißen Quellen der Bäder von Abano in den Euganeen, aus denen er von Hr. Dr. Rüking mit Conserven herausgenommen wurde. Er mißt kaum  $\frac{3}{4}$  Linien und ist unter unsern einheimischen Arten dem *H. geminus* noch am nächsten verwandt, doch wesentlich verschieden; er ist folgenmaßen zu characterisiren.

**H. thermalis** Horn. länglich eiförmig flach, der Kopf, der beiderseits am Hinterrande mit einer eingedrückt Linie versehen Halschild, die Fühler und Füße röthlich gelb, die Flügeldecken gelb, die Basis derselben, die Nath und ein großer zweilappiger Fleck (welcher an die Figur des doppelten Reichs-adlers erinnert) rothbraun oder schwarzbraun, neben der Nath beiderseits eine feine eingedrückt Linie. Die Unterseite rothbraun oder schwarzbraun. —

Bei manchen Exemplaren überwiegt die gelbe Grundfarbe, bey andern die der braunen Abzeichnungen, doch ohne wesentliche Verschiedenheit in dem Umrisse dieser Abzeichnung.

Eine Abbildung desselben wird Herr Prof. Germar in dem nächstens erscheinenden 20ten Hefte seiner Fauna europ. liefern.

Herr Apotheker Hampe aus Blankenburg lieferte zu sehem, in der Linnaea, Bd. 11. P. 1., abgedruckten *Prodromus florae hercyniae*, welcher 1271 Phanerogame und (ohne Algen und Pilze) 596 Cryptogame aufzählt und in besonderen Abdrücken an die Vereins-Mitglieder vertheilt wurde, Nachträge (Phanerogame 5, Cryptogame 13 Species) und Synonymen-Erörterungen, welche ebenfalls werden gedruckt werden.

Herr Apotheker Dr. Wey aus Bernburg sprach über die Praxis der Bereitung von Zucker aus Runkelrüben.

Herr Dr. Rüking aus Nordhausen demonstirte seine Entdeckungen über Hefe und Efigimutter, welche nächstens werden gedruckt werden, und reihete daran allgemeine Erörterungen über Organismus überhaupt, organische Chemie u. m. a.

Herr Dr. Phöbus aus Berlin (d. 3. zu Jülich) demonstirte einen Theil seiner Entdeckungen über die Fortpflanzungsorgane der Hutpilze, welche in den Acten der Kais. Leop. Carol. Academie werden gedruckt werden.

Herr Oberberg. Zincken sprach über die Grünsteine der Heintichsburg bey Magdesburg und demonstirte Zeichnungen. Die Resultate der Untersuchung waren, daß 1) dieser Grünstein dem Hypersthensfels angehört; — 2) die anliegenden Schiefer auf kurze Erstreckung (1—2 Lachter) theilweise Veränderungen erlitten haben, welche zu theilen seyn möchten: a) in Wand- und Gletschiesier (Sandjaspisarten; Desmostit und Epilosit), b) in kiesel-schieferartige dichte Felspathmassen; — 3) der Grünstein sich gangförmig bewiese und sehr in dem Schiefer verzweige, die anliegenden Schiefer aufgerichtet stehn. —

Die ganze Abhandlung wird in die größere Arbeit „über die massiven Gesteine und Gänge des östlichen Harzes,“ welche wir von dem Hrn. Verf. zu erwarten haben, aufgenommen werden.

Herr Eisenhüttenleve Zeuner sprach über die Grognoſtie des Seltethales, und legte ebenfalls Zeichnungen vor.

Herr Oberberg. Zincken las über das Vorkommen verschiedener, theils für den Harz, theils überhaupt, neuen Mineralien: 1) des Doppelspathes bey Mübeland in einem den dortigen Kalkstein durchsetzenden dolomitischen Conglomerate; 2) des Dolomits im Mühlenthal bey Elbingerode, als Veränderung des an den granitartigen Porphyr unmittelbar angelagerten Kalksteins; 3) des Polybastits von Andreasberg (Grube Bergmannstrost), in einem alten Stücke; 4) der Breithauptischen Feuerblende, zu Andreasberg in verschiedenen Gruben, schon seit langer Zeit vorgekommen, aber wohl stets verkannt; 5) des Arsenkupfers von Copiapo in Chili, welches dem Conduccit ähnlich zu seyn scheint (dies legte bereits in Poggend. Ann. 1837. P. 8. abgedruckt).

Hr. Prediger Rimrod aus Quedlinburg überreichte ein Verzeichniß der Säugthiere, Vögel und Amphibien der Grafschaft Mansfeld und des oberen Herzogthums Bernburg, woraus wir folgendes entnehmen: *Mus decumanus* ist erst seit 1785, wo auf einmal eine starke Colonie derselben sich vor hiesigem Orte unter einer Weidenanpflanzung zeigte, in hiesiger Gegend einheimisch, und hat seit etwa 30 Jahren die Hausratten vertrieben und deren Stelle eingenommen. — *Mus musculus* war seit einigen Jahren hier ganz verschwunden und ihre Stelle durch eine andere, noch nicht beschriebene Mäuseart eingenommen. Diese letztere ist größer, dunkler, ihr Haar struppig und länger, die Augen kleiner als bey *M. musculus*. Anfangs lebte sie nur in den Scheunen und Ställen, nachher vertrieb sie *M. musculus* auch aus den Wohngebäuden; indes zeigt sich diese letztere wieder mehr, und jene scheint selten zu werden (Darf man hiebei nicht an eine Spielart denken?). — *Falco buteo*. Grist außer Mäusen und Maulwürfen auch Raupen,

**Frösche und Schlangen:** ich fand die Haut einer glatten Ratter und Frösche nebst Raupe im Kropfe. Horstet auf hohen Eichen und Buchen, doch habe ich auch in einem Sahlweidenbuche auf einer Wiese einen Horst mit 2 Eiern an der Erde gefunden, obgleich nur einige Hundert Schritte entfernt hohe Eichen standen. — **Corvus corone** ist keine Spielart oder climatische Abart von **C. cornix**, sondern eine eigene Art, wie schon der freiere und leichtere Gang und der ganze Anstand zeigt. Auch lebt **C. cornix** während des Sommers in den Niederungen der Saale und Elbe, kommt nur gegen den Herbst in hiesiger Gegend an, bleibt den Winter über und zieht im Frühling wieder ihren Brütorten zu; der Kolltrabe bleibt aber das ganze Jahr hindurch in hiesiger Gegend. — **Corvus glandarius.** Während die Weibchen brüten, streifen die Männchen in Gesellschaften von 8 und mehreren Stücken in den mehrere Stunden von den Hölzern entfernten Anpflanzungen der Dorfschaften herum. — **Picus medius.** Ich besäße eine ganz hellgelbe Spielart mit rothem Scheitel und Aft. — **Alauda arvensis.** In hiesigen Feldern ist die mit fleischfarb- gelblichen Beinen einheimisch. Die mit dunkeln, schwarzbraunen Beinen (wahrscheinlich nur climat'sche Varietät) kommt erst spät im Herbst, wenn jene schon weggezogen, in unseren Feldern an, und bleibt einzeln oder in kleinen Gesellschaften, selbst bey strenger Kälte, im Winter hier, wo ich sie bey 17° Kälte geschossen habe; im Frühling ist sie auch die erste und kommt meist schon in den ersten Tagen des Februars, oft selbst in großen Schaa ren, wieder zurück, wahrscheinlich um dem hohen Norden zuzuziehen. — **Ardea.** Das ganze Weibergeschlecht hat auf der Brust, als auf der über dem Schlüsselbeine liegenden Stelle, und auch unter den Schenkeln, wo dieselben im Fluge nach dem Schwünge zu gestreckt und angelegt werden, schwammige oder filzige Hautflächen, welche äußerlich mit einer eigenen Art Flaum bewachsen sind. Sollte diese Einrichtung wohl den Zweck haben, dafelbst Heizung aufzubewahren und solche sowohl zum Horste als auch auf der Reise mitzunehmen. Zwey wahrgenommene Fälle sprechen wenigstens für diese Vermuthung. — **Grus cinerea.** Nur Zugvogel. Der Zug der Kraniche ist oft sehr regelmäßig, so daß sie vor einigen Jahren auf dem Herbstzuge in großer Anzahl mehrere Tage nach einander jedesmal fast halb 2 Uhr Nachmittags über meinem Orte eintrafen. Ganz dasselbe beobachtete auch ein Freund, welcher 7 Stunden von mir, so daß die Linie zwischen unsern Wohnorten die Richtung des Kranichzugs ungefähr senkrecht durchschneidet, wohnt. Man könnte auf diese Weise nach Ermittlung ihrer nächtlichen Ruhestätten die Weite ihrer Tagereisen erforschen. Auf dem Frühjahrszuge kommen sie gewöhnlich Abends gegen 6 Uhr hieselbst an.

Hr. Oberberg. Zinden erbot sich für die Anfertigung eines *crypto-* und geognostischen Verzeichnisses der Fossilien des Harzes noch eine längere Frist. Es wurden dann noch verschiedene, die Organisation des Vereins betreffende Angelegenheiten verhandelt, namentlich der schon früher gemachte Vorschlag, durch Diplome ordentliche, correspondierende und Ehren-Mitglieder zu ernennen, angenommen, zum Orte der nächstjährigen Versammlung Goslar erwählt, und die von dort anwesenden Herrn Bergamts-Assessor Hagemann und Bergmeister Abrenb geben, die nöthigen Anordnungen deßhalb zu treffen. Nachdem die Sitzung, mit einer kurzen Unterbrechung, fast 7 Stunden gedauert hatte, wurde die Versammlung von St. Durch-

laucht dem Herzoge von Anhalt-Bernburg, in dessen Namen Herr Oberberg rath Zinden und Dr. Hofrath und Leibarzt Dr. Curze aus Ballensiedt die Functionen des Wirthes versahen, mit einem Diner bewirthet, welches noch durch die Gegenwart der Gattinnen und Töchter einiger Mitglieder des Vereins verschönert wurde.

**Versteinerungen aus der Grauwacke, dem Grauwackensandsteine und dem Bergkalk des Harzes.**

- Calymene macrophthalma** Brong. Grw. Klostergrund Michaelstein.
- Orthoceratites communis** Wahlb. Kfsl. Büchenberg bey Elbingerode.
- \***Ammonites (Goniatites) primordialis** Buch. Schloth. Kfsl. Grund, Goslar?
- \***Ammonites (Goniatites) simplex** Buch. Grw. Goslar.
- \***Bellerophon nodulosus** Goldf. Grw. Goslar. Turbo? Steinfern, GSchf. Schalk.
- \***Cardium alaeforme** Sow. (Bucardites hystericus Schloth.) Kfsl. Grund, Verbach.
- Nucula antiqua** Goldf. GSchf. Schalk.
- Cytherea?** -- Steinfern. GSchf. Schalk.
- \***Pterinea lamellosa** Goldf. GSchf. Schalk.
- \***Pecten Oceani** Goldf. Grw. Goslar.
- Calceola sandalina** Lam. Grw. Goslar.
- \***Terebratula elongata** Schloth. Kfsl. Grund.
- Delthyris macroptera** Goldf. (Terebratul. paradoxus Schloth.) Grw. Goslar.
- Delthyris laevicosta** Goldf. (Terebr. hystericus Schloth.) Grw. Goslar.
- \***Orthis pecten** Dalm. GSchf. Schalk.
- Cyathocrinites pinnatus** Goldf. (Enerinites epithonius Schl.) Grw. Goslar; GSchf. Schalk, Rübeland; Kfsl. Büchenberg.
- Calamopora spongites** Goldf. GSchf. Rübeland.
- Calamopora polymorpha** Goldf. Grw. Goslar.
- Cyathophyllum caespitosum** Goldf. Kfsl. Grund, Büchenberg.
- Cyathophyllum ceratites** Goldf. Kfsl. Grund.
- \***Phytolith?**

**Versteinerungen aus dem Mansfelder Kupfer-schiefer und Zechsteine.**

- \***Monitor antiquus** Holl. (Protorosaurus Spenneri Meyer.) Kfsl. Rothenburg.
- Palaeoniscus Freieslebeni** Agas. Kfsl.
- \***Palaeoniscus magnus** Agas. Kfsl.
- Pygopterus Humboldt** — —



\**Acrolepis asper* Agas. Kschf.

*Platysomus gibbosus* — —

*Platysom. Rhombus* — —

\**Ichthyolithus serpentinus* Schloth. Kschf.

*Ichthyolithus? fusiformis* Kschf.

*Ichthyolithus?* Bschf. Eisleben.

*Placodus bituminosus* Germ. Gaumenzähne.

(*Trilobites bitum.* Schl.) Kschf. Eisleben.

*Leptaena pelargonata major* Schl. Bschf. Eisleben.

*Anthophyllum caespitosum* Goldf. — —

*Alethopteris* nov. spec. Kschf. Eisleben.

*Caulerpites lycopodioides* Sternb. Kschf.

*Caulerpites selaginoides* — —

Die mit \* bezeichneten fehlen in der academischen Mineralien-Sammlung zu Halle.

## U e b e r

die größere Intensität des Schalls während der Nacht, von A. Kerserlein zu Erfurt.

In der Versammlung der deutschen Naturforscher zu Bonn während des Jahres 1835 hat Herr Prof. Berthold aus Göttingen über den angegebenen Gegenstand einen interessanten Vortrag gehalten und darin ausgeführt, wie die Ursache, daß der Schall während der Nacht bey weiten deutlicher and weiter als am Tage gehört werde, theils objectiv sey, theils aber auch wol ein subjectiver Grund darinn vorwalte, daß die Nerventhätigkeit in der Nacht mehr als am Tage gesteigert sey und dann das Ohr in einen höheren Grad von Empfindlichkeit gerathe (Ziss 1836. Heft 9. und 10. S. 677).

Meiner Ansicht zufolge dürfte die Ursache sich dadurch am besten erklären lassen, wenn passende Versuche an solchen Orten angestellt würden, die am Tage wie während der Nacht gleiche Verhältnisse darbieten, und wo zu beyden Tageszeiten eine gleiche Ruhe herrscht.

Hierzu qualifizierten sich wohl am besten unterirdische Räume, in welche die auf der Oberwelt herrschende Bewegung des Lebens am Tage nicht dringt. Ich ersuchte zu dem Ende Hrn. Marksheider Lantscher zu Camsdorf bey Saalfeld, einen tüchtigen Naturforscher und sorgfältigen Beobachter, einige diesen Gegenstand betreffende Versuche anzustellen, welcher mir darüber folgendes wörtlich mittheilte: „der zweite Gegenstand, worüber ich Ihnen Auskunft zu geben versprach, betrifft die Fortpflanzung des Schalles in Bergwerken bey Tag und bey Nacht, und die Beantwortung der Frage: ob sich der nämliche Unterschied zwischen der Fortpflanzung des Schalles bey Tag und Nacht in Bergwerken wie auf der Oberfläche der Erde ergebe, um eventuell daraus eine gründliche Erklärung über das bekannte Phänomen, daß der Schall sich bey Nacht weiter verbreitet, herleiten zu können. Die Gruben, welche ich wählte,

um den bezüglichen Versuch zu machen, waren Himmelsfahret und bergmännische Hoffnung; ihre Tiefe beträgt ca. 120 Fuß, und ihre Entfernung 420 Fuß. Zwischen ihnen befindet sich ein ausgebehnter Eisensteinbergbau, und es sind noch zusammenhängende große offene Räume vorhanden. Die Beobachtungszeit war am 16ten August d. J. Mittags 12 und Mitternachts 12 Uhr. Der Schall ward sowohl durch Rufen als durch Schlägen mit einem Hammer auf einem Brett hervor gebracht. An genanntem Tage stand Mittags 12 Uhr

das Barometer = 27" 2,4 Linien,

das Thermometer über Tage im Schatten

bey Himmelsfahret 19½° Reaum.

— bergm. Hoffn. 20° —

das Thermometer unter Tage

bey Himmelsfahret 7½° R.

— bergm. Hoffn. 7¼° —

und in der Eisensteinweitung 8°, es wehete scharfer Nordostwind und der Himmel war ganz wolkenfrey.

Mitternacht 12 Uhr stand

das Barometer = 27" 2,4 Linien

das Thermometer über Tage

bey Himmelsfahret = 12½° R.

— bergm. Hoffn. = — —

das Thermometer unter Tage

bey Himmelsfahret = 7° R.

— bergm. Hoffn. = — —

es wehete ein schwacher Südostwind und der Himmel war ganz wolkenfrey und heiter.

Der Thermometerstand über Tage hatte sich also zwischen Mittag und Mitternacht 7—8° R. geändert, während die Veränderung in der Grube nur resp. ¼ und ½° betrug; der Barometerstand war ganz gleich geblieben. Besondere Witterungserscheinungen waren nicht vorhergegangen und auch nicht an dem Tage der Beobachtung vorhanden.

Als Resultat ergab sich, daß man in der Grube den Schall sowohl zu Mittag als Mitternacht gleich weit hörte und daß auch nicht der geringste Grund zu der Vermuthung vorhanden war, daß er zu Mitternacht stärker gehört worden wäre.

Außer mir haben sich davon noch zwey zuverlässige Personen überzeugt. Bey obigem Versuch hörte man in der Nacht ein kleines Geräusch beynähe halbe Stunden weit, und über Tage konnte man sich in einer Entfernung von 500 Fuß gut verstehen. In der Grube waren die Erscheinungen dieselben bey Tag und bey Nacht, und nur erst bey 360 Fuß hörte man vernehmlich rufen, bey 420 Fuß, der wahren Entfernung beyder Schächte, gar nicht. — So weit Hr. Lantscher.

Ich überlasse es den Physikern, was für ein Resultat aus der gegebenen Beobachtung zu erzielen ist, und erlaube mir nur die Schlussbemerkung, ob wir nicht am einfachsten mit Aristoteles in der Sonne oder dem Lichte als Princip des Lebens und der Bewegung die Lösung dieses Problems finden werden,



## Ueber die Keimfähigkeit unreifer Samen.

Bei der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Stuttgart im Sept. 1834. konnte ich aus Mangel an Zeit den Sitzungen der botanischen Section leider nicht beywohnen, und erst, nachdem die Versammlung auseinander war, erfuhr ich, daß Hr. Professor Dr. Kurr aus Stuttgart seine Erfahrungen über die Keimfähigkeit unreifer Samen in der ersten Sitzung der botanischen Section am 19ten Sept. vortragen hatte.

Vielleicht dürfte es von einigem Interesse für die Pflanzen-Physiologie seyn, wenn ich einige Beobachtungen über den gleichen Gegenstand zur nähern Würdigung hiemit vorlege, Beobachtungen, die vielleicht zu weiteren Versuchen und interessanteren Resultaten führen könnten.

Zu nachstehenden Versuchen, die ich einige Jahre hinter einander wiederholt habe, veranlaßte mich die künstliche Vereitelung eines sehr schwachhaften Wintergemüses aus dem *Pisum sativum* und der weitere Umstand, daß manche Pflanzen aus der Familie der Papilionaceen wenigstens in Württemberg im freyen Lande, namentlich von Bäumen die *Sophora japonica* keine reifen Samen liefern und somit deren Fortpflanzung nur durch Verschreibung des Samens anderswoher möglich wird.

Bekanntlich wurde zuerst in England aus dem *Pisum sativum* ein sehr schwachhaftes Wintergemüse auf folgende Art bereitet und kann in jedem geheizten Zimmer bereitet werden. Man legt nemlich die Samen von *Pisum sativum* dicht nebeneinander in ein Kistchen, welches mit humus-reicher, etwas feuchter Erde zur Hälfte so angefüllt ist, daß über dieser Erde bis zum Rand des Kistchens noch ein leerer Raum von 6 bis 8 Zolln übrig bleibt, bedeckt das Ganze mit einem Deckel so, daß in den leeren Raum des Kistchens kein Licht eindringen kann, stellt es in die Nähe eines geheizten Ofens, "ober in einem Treibhause auf einen nicht zu heißen Wärmecanal mit unterlegten Ziegeln, so daß die Luft auch von unten das Kistchen bestreichen kann.

Nach einigen Tagen, wenn man die Erde stets etwas feucht erhält, fangen die Erbsen zu keimen an, und wenn die Keime 4 bis 6 Zoll hoch sind, werden sie abgeschnitten und als Gemüse benutzt.

Bei dieser Manipulation fand ich, daß, wenn man diese ersten Keime 1 bis 2 Zoll über der Erde abschneidet, diese Keimrösse an ihren Knoten abermals Sprossen treiben, eine Art Reproductionskraft, die mir um so auffallender erschien, weil die Pflanzen aus Mangel an Licht und durch das schnelle Treiben in einem quasi krankhaften Zustand sich befanden, die in der Erde befindlichen Samenlappen bis auf die Häute keimen Nahrungsstoff mehr hatten und das Wurzelschen ziemlich klein und dünn mit wenig Wurzelsafern war. Diese im Verhältniß des Wurzelschens noch sehr bedeutende Reproductionskraft leitete mich zu verschiedenen Versuchen über die Keimfähigkeit der Samen von den Papilionaceen überhaupt und insbesondere in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen.

Die ersten Versuche stellte ich mit noch ganz grünen und unreifen Samen von *Pisum sativum*, *Phaseolus vulgaris*, *Vicia faba*, *Ervum lens* und *Cytisus laburnum* an. Die-  
Ziss 1838. Heft 2.

bey konnte ich von den genannten Pflanzen keinen unreifen Samen zum Keimen bringen, solange nicht die Sotyledonen etwas etwas feste Substanz in sich bekamen und so lange nicht vermöge einer gewöhnlichen Lupe das Rostellum und die Plumula als ausgebildet erkannt werden konnten; sobald aber beides der Fall und der Samen noch ganz grün und nicht viel über die Hälfte der Größe seines reifen Zustandes erreicht hatte, glückten mir die Versuche durch folgende Manipulation beynabe immer.

Ich schnitt nemlich ganze Stängel von den genannten Pflanzen mit ihren Blättern und Samenhülsen ab, ließ dieselben mit allem an einem luftigen aber schattigen Orte aufhängen und solange in diesem Zustande, bis die Blätter beynabe dürr geworden und die Hülsen mit den Samen etwas abgewelkt waren. Zu diesem Abwelken veranlaßte mich der Umstand, weil ich vermuthete, daß ohne dasselbe die Samen zu saftig bleiben und in die Erde gebracht zu schnell in Gährung und somit in Fäulniß übergehen würden. Nachdem nun auf diese Art die Hülsen mit ihren Samen abgewelkt waren, löste ich letztere aus erstem mit einem scharfen Messer so sorgfältig ab, daß das Hilum auf keine Art verletzt wurde und an demselben noch von der Hülse etwas hängen blieb.

Von *Pisum sativum* legte ich 20 auf diese Art behandelte grüne Samen in einige mit humus-reicher und etwas feuchter Erde angefüllten Töpfe einen halben Zoll tief ein und brachte sie in eine Temperatur von 18 bis 20° + Reaum. Am 9ten Tage zeigten sich 13 keimende Samen.

Von *Phaseolus vulgaris* keimten von 20 Samen 11, auf die gleiche Art behandelt, am 17ten Tage; von *Vicia faba* am 19ten Tage 9; von *Ervum lens* am 12ten Tage 7, und von *Cytisus laburnum* am 18ten Tage 14 Samen. Nachdem sich aus den so gekeimten Samen die Pflanzen auf einige Zoll Höhe entwickelt hatten, stülzte ich die Töpfe sorgfältig und setzte davon je in einen Scherben nur eine, woraus sich dann ganz vollkommene Pflanzen bildeten, die im nämlichen Sommer noch reife Samen lieferten, natürlich mit Ausnahme von *Cytisus laburnum*, wovon jedoch noch 7 Exemplare in den königl. Parkanlagen stehen, die zu großen und ganz gesunden Büschen herangewachsen sind.

Bei den seit dem Jahr 1821 hierüber fortgesetzten Versuchen mit den genannten und noch andern unreifen Samen von Papilionaceen, namentlich auch mit mehreren *Dolichos*-Arten zeigten sich beynabe immer die gleichen Resultate, ein auf fallendes aber von der *Sophora japonica*.

In dem hiesigen botanischen Garten befindet sich nemlich ein großes Exemplar davon; jedes Jahr fängt dasselbe, je nachdem der Sommer warm oder kühl ist, in der Mitte des Monats August, öfters erst Anfangs Sept. und noch später zu blühen an, und wenn die Nächte während der Blüthe kühl werden, fallen gewöhnlich die Blüthen, sobald sie ausgebildet sind, ohne Befruchtung ab, so daß sich selten Samen ansetzen.

Im Jahr 1822. zeigte sich dieses Abfallen wenig und es entwickelten sich ganze Büschel mit Samen. Da jedoch diese Pflanze hier wenigstens niemals reife Samen lieferte und in der Mitte Sept. die Hülsen mit ihren Samen kaum die Hälfte ihrer Größe im reifen Zustande erreicht hatten, somit keine

Hoffnung vorhanden war, reife Samen zu erhalten, so wurden viele Keste mit den Samenblüscheln abgeschnitten, sobald sich die Samen auf die obengenannte Art ausgebildet zeigten, auf die oben beschriebene Weise behandelt und in ein kaltes Mißbeet gebracht und hiedurch gegen 500 junge Pflanzen erzielt, wovon jetzt viele und schöne Exemplare in dem Park Rosenstein üppig herangewachsen sind, der Rest aber noch in der erotischen Baumschule zu Hohenheim zu sehen ist.

Diese wenigstens mit früher noch nicht bekannten Erscheinungen über das Keimen der Samen von Papilionaceen dürften vielleicht weitere Versuche mit andern Pflanzenfamilien veranlassen, wozu ich mich mit vielem Vergnügen anschließen würde.

Eine weitere Erscheinung glaube ich schließlich noch anführen zu dürfen, die über eine Species und wahrscheinlich eine Varietät davon Aufschluß gibt, der noch bei manchen andern Pflanzen näher zu verfolgen und zu beachten seyn dürfte und wodurch vielleicht manche Unzahl von Species bey manchen Generibus nach und nach reducirt werden könnte.

Im Jahr 1827. ließ ich nehmlich von einem im hiesigen botanischen Garten befindlichen Exemplar des *Sorbus* oder *Crataegus hybrida* die reifen Samen abnehmen, einige Wochen in Flußsand aufbewahren und in der Mitte Octobers in der erotischen Baumschule zu Hohenheim in ein Beet von ziemlich magerem Boden reihenweise 2 Zoll tief einlegen. Der größte Theil dieser Samen keimte im Frühjahr 1828., die jungen Pflanzen aber zeigten Blätter, die von *Sorbus aria* bis zu *Sorbus hybrida* eine ganze Reihensfolge von allen Nuancen von Blattform zwischen diesen beyden angezeigten Arten zeigten, jedoch näherte sich der größere Theil der jungen Pflanzen in seiner Blattform mehr dem *Sorbus aria* als dem *Sorbus hybrida*, jedoch meistens mit mehr länglichen Blättern, als der *Sorbus aria* hat.

Diese Erscheinung war mir um so auffallender, weil ich bey'm Abnehmen und Einlegen der Samen acqwenwärtig war, keine Samen von *Sorbus aria* in diesem Jahre für die Baumschule eingesammelt wurden, mithin auf keine Art eine Verwechselung Statt finden konnte, überdies auch keine Befruchtung von den Blüthen des *Sorbus aria* auf die von *S. hybrida* Statt finden konnte, weil nur ein Exemplar von ersterem in der Nähe vorhanden war, das jedoch im gedachten Jahre keine Blüthen hatte.

Da ich übrigens vor dieser Erscheinung noch keine Samenpflanzen von *Sorbus hybrida* im ersten Jahre gesehen hatte, so täuschte ich mich mit der Vermuthung, daß vielleicht die Blätter der jährigen Pflanzen oder vielmehr im ersten Sommer von ihrem Keimen an, erst im folgenden Sommer ihre eigenthümliche Blattform zeigen werden; allein auch in dem 2ten und den folgenden Jahren blieben sich die Blätter an den einzelnen Individuen bis jetzt gleich. Aus dieser Erscheinung und da ich überdies in den Blüthen und Früchten des *Sorbus aria* und *S. hybrida* keinen solchen Unterschied finden konnte, daß beyde als besondere Species angenommen werden können, indem mit hauptsächlich die verschiedene Blattform bey *Sorbus aria* folia subrotundo ovata inciso-dentata, bey *S. hybrida* aber folia semipinnata sinuata, die Trennung in 2 Species veranlaßt zu haben scheint, den Schluß ziehen zu dürfen, daß

*S. hybrida* nur eine Varietät von *Sorbus aria* ist, die durch besondere Local-Verhältnisse entstanden zu seyn scheint, wie solches noch bey manchen andern Pflanzen der Fall seyn kann, die für besondere Species ausgegeben werden, und worüber ich einen weitem Beleg mir anzuführen erlaube, aus dem ebenfalls geschlossen werden könnte, daß *Pyrus baccata* eine bloße Varietät von *Pyrus malus* sey, wie jede andere Apfelsorte.

Von einem Exemplar, das sich durchaus in seinem ganzen habitus durch seine dünnen Zweige und Blätter, so wie durch seine beynahe runden und schön roth gefärbten Früchte mit langen Stielen so auszeichnet, daß man diese Früchte in der Ferne für sogenannte Herzkiemen halten könnte, wurden im Jahr 1823. die Samen genommen und eingesät. (NB. Dieses Exemplar steht in der erotischen Baumschule ganz isolirt von andern Apfelsäumen.) Die hievon gewonnenen Samenpflanzen zeigten sich zum Theil in ihrem ganzen habitus, und in den Blättern im ersten und den folgenden Jahren von einander verschieden, wurden im 2ten Jahre in Beete auseinander gesetzt und ein großer Theil davon wurde im Jahr 1829. für den Park Rosenstein verwendet.

Im Jahr 1832 und 1834. zeigten dieselben eine Menge Varietäten von Früchten; das eine Individuum hatte wahre Spitzäpfel, welche die Frucht vom Mutterstamm, *Pyrus baccata*, in der Größe um das Fache übertrafen, grün blieben, ganz kurze Stiele hatten und im Saft bey weitem nicht so abstringirend waren. Von diesem Individuum zeigten sich die übrigen immer mehr abweichend in habitus, Blättern und Früchten abwärts vom gewöhnlichen Spitzapfel bis zum ächten *Pyrus baccata*; und es scheint hieraus hervorzugehen, daß, wie alle verschiedene Sorten von Äpfeln aus Samen entstanden sind, auch *Pyrus baccata* aus dem gewöhnlichen *Pyrus malus* entstanden ist, von dem ja durch Localverhältnisse, Kultur usw. so vielerley Exemplare existiren, die von dem gewöhnlichen wilden Apfel *Pyrus malus* in ihrem habitus, Blättern, Blüthen und Früchten bey weitem mehr abweichen, als *Pyrus baccata*.

Seyffer,

mit dem Wunsche, daß sich die Herren Botaniker Deutschlands vereinigen möchten, auch über diesen Zweig des Pflanzenlebens weitere Versuche anzustellen, woran ich mit Vergnügen Theil nehmen und die beste Gelegenheit vermöge meiner amtlichen Stellung hiezu haben würde, indem die königl. Parke und der botanische Garten unter meiner unmittelbaren Aufsicht stehen.

## Transactions

of the zoological Society of London. Vol. II. part. 1. 1836.  
4. 66. 17 tab. ill. (Preis 1 Pfd. 12 Schll.)

(Fortsetzung von Heft 1. 1838. S. 40.)

## VII. S. 75. E. T. Bennett,

über die Gippe Octodon und eine neue Ctenomys.

In den Zoological Proceedings of the committee II. pag. 46 nannte ich das von Cuning aus Südamerika gebrachte Nagthier *Oct. cuningii*. Nach Friedrich Cuvier sind Octodon, Ctenomys (Blainville Bullet. philos. 1826. pag. 62) und Poephagomys mit einander verwandt. Annal des sc. nat. 1834. I. 321. Nach ihm sind die Backenzähne von Ctenomys ohne Wurzeln.

Oct. steht zwischen beyden.

Die Zahnfiguren der pflanzenfressenden Nagthiere ändern sich durch das Abkauen am wenigsten, weil die Backenzähne wie die wurzellosen Schneidezähne immer nachwachsen; sie können nur klein zerriebene Speisen verschlucken.

Bey Oct. sind die Zahnkronen in beyden Kiefern auffallend verschieden, die obern wie bey Ctenomys, die untern wie bey Poephagomys.

Die obern Backenzähne von Octodon haben an der innern Seite eine schwache Schmelzfalte, als wenn der Zahn in 2 Walzen zerfiel; an der äußern Seite ist eine tiefere Falte und der Hintertheil der Krone nicht so breit als der vordere; die vordere Walze ist ganz, die hintere hat gleichsam ihre äußere Hälfte verloren. Die Zahl dieser Zähne ist jederseits 4, der hintere am kleinsten.

So sind die Zähne in beyden Kiefern bey Ctenomys, nur sind die Kronen schlanker und schiefer gestellt, der hintere Zahn sehr klein. Ich habe ein Exemplar, welches der Capitän P. P. King von der Magellanstraße mitgebracht hat.

Die untern Backenzähne bey Oct. bestehen aus 2 Walzen, jederseits mit einer Falte, wovon die innere die tiefste, sehen aus wie die Ziffer 8.

Bey Poeph. sind alle Zähne so. Nach der Abbildung von F. Cuvier. Ich habe kein Exemplar.

Das Aussehen dieser Thiere gleicht dem der Wasserratte, Leib gedrungen, Kopf kurz und rund, Füße mäsig, Schwanz kurz behaart, kürzer als der Leib, bey Octodon mehr als die Hälfte des Leibes, bey Ctenomys mehr als  $\frac{1}{3}$ ; bey Poeph.  $\frac{1}{2}$ . Bey Octodon et Poeph. die Ohrmuschel mäsig, so lang als der Abstand zwischen ihr und dem Auge; bey Ctenomys unter dem Pelz verborgen. Ein anderer Unterschied ist wichtiger: bey Oct. et Poeph. sind die Klauen ziemlich lang, mäsig gekrümmt und scharf, was auf Klettern deutet; bey Ctenomys lang, fast gerad, dick und stumpf, fast wie bey grabenden Thieren. Bey allen 5 an jedem Fuß. Bey Octodon et Poeph. ist die innere Klaue am Vorderfuß flach wie ein Nagel; bey Ctenomys wie die andern Klauen, aber kürzer und krümmter. Bey beyden vor mir liegenden Thieren findet sich der auf den inneren Klauen der Hinterfüße liegende Vor-

stienkamm; daher wird er auch wohl bey andern seyn. Bey Ctenomys ist der Schädel länger und die Anhängsel der Gehörtheile größer als bey Octodon. Die Ausdehnung der Knochenzellen steht im umgekehrten Verhältniß zur Ohrmuschel, und der Mangel der letztern bey Ctenomys wird ausgeglichen durch die Vergrößerung der Gehörgellen, daher ist der Schädel hinten sehr breit und viereckig; bey Octodon am breitesten bey dem äußern Gehörgang. Der Umriß des Schädels von oben oval, bey Cten. wie ein länglicher Triangel. Bey beyden ist das Foramen infraorbitale einfach und sehr weit. Der Oberkiefer klein.

Schädelänge bey Octod. 1,6, bey Cten. 1,75.

Breite bey dem äußern Gehörgang 0,75 — 0,95.

Bey dem Vordrigen 0,9 — 1,0.

Zwischen den Augenhöhlen 0,45 — 0,4.

Bey Poeph. ist der Blinddarm sehr groß, größer als der Magen; ebenso bey Octod.; Dünndarm  $2\frac{1}{2}$ ; Dickdarm  $1\frac{1}{2}$ , 7mal soviel als der Leib, also wie bey andern pflanzenfressenden Nagthieren.

## Octodon; Fam. Arvicolidae?

Dentes primores  $\frac{3}{2}$ , acutati, antice laeves: molares utrinque utrinsecus  $\frac{3}{2}$ , complicati, subaequales; superiores subtransversi, fascia antica lata, postica (ob incisuram externam profundam) duplo angustiore, interna in medio uniplicata, plicis a primo ad postremum sensim minoribus; inferiores obliqui, singulo plica externa internaue suboppositis coronidem in areas duas oblique, transversales, figuram 8 vel clepsydram quodammodo similes, subdispartientibus, plica externa in postremo vix conspicua. Artus subaequales, omnes pentadactyli, digitis liberis; unguitibus falcularibus, subcurvis, acutis; ungue pollicari lamnari. Cauda mediocris, subannulata, pilosa, ad apicem floccosa. Americae australis incolae, terrestres vel arborei, subsalientes.

1) *Oct. cuningii*: supra fusco-flavescenti-griseus nigrescente intermixtus, infra et ad pedes pallidior; cauda supra et ad apicem floccosum nigra.

Oct. cum. Benn., in Proc. Comm. Sor. Zool. II. pag. 46.

Dendrobis degus Meyen, in Nov. Act. acad. Caes. Nat. Cur. XVI. p. 600. t. 144.

Hab. in Chili prope Valparaiso.

Gleicht in Größe und Gestalt der Wasserratte, zu der es auch im System gehört; Augen klein, Ohren mäsig, rund, dünn behaart; Schnurren länger als Kopf, Pelz gerade  $\frac{1}{2}$  — 1" lang, kürzer an Schwanz und Füßen, Hinterfüße etwas länger, überall 5 Zehen, innere sehr kurz und zurück, an der vordern ein kurzer flacher Nagel, der Schwanz geringelt. Färbung bräunlich grau mit unbestimmten schwärzlichen Flecken. Schwanz fast schwarz, Bauch dunkelgrau.

Die Länge des Leibes 6,66", Schwanz 4, Kopf 1,66, Schnurren 2; Ohren 0,75. Breite 0,7.

Das Thier ist sehr häufig und findet sich zu Tausenden

bei Valparaiso, gräbt nach Cuming unter Büschen; auf der Straße zwischen St. Jago und Valparaiso sieht man oft über 100 nach Futter gehen, bisweilen auf den untern Zweigen der Bäume. Sie fliehen beim geringsten Geräusch und tragen dabei ihre Schwänze bogenförmig. Sie werden von einer Horneule gefressen.

Cuming brachte 1831. 2 lebendig aus Chili in den zoologischen Garten, wo eines entfloß, eines aber bis jetzt munter fortlebte. Es ist scheu und nicht lustig, hüpfet hurtig und leicht vom Boden des Käfigs auf eine Stange 1' hoch, wo es sitzen bleibt. Frisst nichts als Pflanzen.

1833. wurde es von Meyen beschrieben in der leopoldinischen Academie unter dem Namen *Dendrobates degus*, weil es für Molinas *Degus* hielt; er stellt dazu *Myoxus getulinus* von Pöppig und *Tamias degus* von andern. Die Beschreibung von Molina paßt aber nicht darauf. Es steht auch mit Unrecht bei den Eichhörnchen.

### *Ctenomys*:

*Dentes primores* 2, *acutati*, *antice laeves*; *molares utrinque utrinsecus* 3, *postremo subobsoletos*, *caeteris similibus*, *simpliciusculis*, *veluti e lamina simplici subarcuata constantibus*, in *maxilla superiore externe et postice*, in *inferiore interne et antice*, *late excusculati*. *Artus subaequales*, *omnes pentadactyli*, *digitis liberis*, *unguibus falcularibus*, *unguliformibus*, *subelongatis*. *Cauda breviuscula*, *subannulata*, *pilosa*. *Americae australis incolae*, *fodientes*.

1) *Ct. brasiliensis*: *supra nitide rufus*, *subtus rufescenti-albidus*; *cauda nigrescenti-brunnea* (fide Blainv.).

*Oryzomys* sive *Ctenomys brasiliensis*; Blainv. in *Bull. Soc. Philom.* Avr. 1826. p. 62. — Icon. *ibid.*

Hab. in Brasilia, in Provincia Minas Geraes.

2) *Cten. magellanicus*: *flavescenti-fusco-griseus*, *subtus pallidior*, *pedibus caudaque albidibus*.

Habitat ad Fretum magellanicum prope Cap. Gregory.

Gleicht in Gestalt dem vorigen, der schwach behaarte Schwanz aber kürzer und die Ohren unsichtbar, fast nackt; Haare  $\frac{3}{4}$ " lang, lind; alle Klauen stark, lang und fast gerad. Färbung bräunlich grau ins Gelbliche, mit wenig schwarz, unten heller.

Länge 7,5", Schwanz 2,75; Kopf 1,9; Schnurten 2,25; Ohren 0,1; Breite 0,25.

Nach Ring findet sich dieses Thierchen auf dem Boden zerstreut; die Nagzähne roth. Es ist sehr furchtsam, frist Gras und wird von den Patagoniern gefressen, gräbt Höhlen und scheint häufig zu fern, weil es viele solche Höhlen gibt. Es bewohnt den östlichen Eingang der Magellanstraße am Cap Gregory.

Abgebildet ist *Octodon* ill. Schädel von drei Seiten Tafel 16.

*Ctenomys magellanicus* ill., Schädel beagl. I. 17.

## The Edinburgh

new Philosophical Journal by R. Jameson. vol. XXI—XXII. (Fortsetzung von der Ffs 1838 S. 75.)

Vol. XXI. n. 41, 42. April — October 1836.

S. 88. Gr. Dalryell, Fortpflanzung der Zoophyten. Schon gegeben.

99. John Shaw, Beweis, daß der Parr das Junge des Salmen ist.

Ich habe folgende Versuche mehrere Jahre hindurch angestellt und habe fast mein ganzes Leben an Flüssen zugebracht, wo der Salm laicht und daher der Parr häufig ist; es fehlte mir daher nicht an Gelegenheit zu beobachten.

Am 11. July 1833. fieng ich 7 Parr und setzte sie in einen Teich mit zuffießendem Wasser. Sie geblieben darinn ausnehmend wohl, fiengen Fliegen und spielten an der Oberfläche bei schönem Wetter.

Im April 1834. bekamen sie ein anderes Ansehen, was man schon bemerkte, wenn sie im Wasser schwammen; ich fieng einen im Neg am 17ten May und überzeugte alle meine gegenwärtigen Freunde, daß er jetzt völlig das Aussehen des Fisches angenommen habe, den man Salmon-fry (Salmenlaich) nennt. Auf dem Rücken waren sie nun schön blau, mit einem zarten Silberfchein an den Seiten, und zugleich blieben die Silberfchuppen bei der Verührung sehr leicht an der Hand hängen; der Bauch war weiß; die Länge 6"; 60 Wirbel.

Ich muß eines Umstands erwähnen, obgleich ich nicht viel Gewicht darauf lege. In der ersten Woche des May, nachdem sie sich schon so verändert hatten, bemerkte ich, daß ihrer weniger waren; sie hatten sich auf das Ufer geschneelt und waren todt. Ob das geschah aus Begierde, Fliegen am Ufer zu erhaschen, oder in der Hoffnung, ins Meer zu kommen (weil jetzt ihre Zugzeit war), weiß ich nicht.

Im März 1835. nahm ich wieder 12 Parr aus dem Fluß, welche deutlich die charakteristischen Streifen (Bars) hatten; Länge 6". Ich that sie auch in einen passenden Teich und Ende Aprils nahmen sie ebenfalls das vollkommene Aussehen der Salmon-fry an; die Streifen wurden bedeckt mit den neuen Silberfchuppen, womit die Häßrigen Parr jedesmal bekleidet werden, ehe sie ins Meer ziehen.

Nach diesen Versuchen bleibt wohl kein Zweifel, daß die großen Parr des Winters und des folgenden Frühjahrs im Fluße (d. h. zu einer Zeit, ehe die Salmon-fry ziehen), wirklich die Salmon-fry selbst sind, und daß die kleinen oder Sommer-Parr (heissen in Dunsfrieshire May-Parr), welche noch im Fluße bleiben, die einjährigen sind, und daß sie noch ein Jahr lang warten müssen, ehe sie den Character der Salmon-fry erhalten.

Man hat bisher irrig angenommen, daß der Salmon-fry 6 oder 8" wachse in soviet Wochen und ins Meer gehe nach Verlauf dieser kurzen Periode. Zu diesem Irrthum hat die Schnelligkeit verleitet, womit der zweijährige Parr das Aussehen des Salmon-fry annimmt. Er zieht zu derselben Zeit sein

neues Kleid an, wo der junge Salm so schnell wachsen soll, ehe er fortzieht.

Da der ununterbrochene zweijährige Aufenthalt des Parrs, sowie die Thatfache, daß zu gleicher Zeit in dem Flusse zwei Generationen vorhanden sind, nicht allgemein geglaubt wird; so halte ich es für nöthig, das Umständlichere anzuführen, wodurch diese Sache bewiesen wird.

Daß dieser Fisch sich nicht früher im Flusse befinden sollte, als der May- oder Sommer-Parr, ist mir lang sonderbar vorgekommen. Ich stellte daher eine genaue Untersuchung des Flusses an, worinn der alte Salm den Winter vorher geliegt hat, und ich fand einen sehr kleinen, aber lebhaften Fisch in ungeheurer Menge; ich hielt ihn für den jungen Parr oder den Samlet dieser Jahreszeit. Um das zu beweisen, nahm ich einen Raif, überspannte ihn mit Gaze, da die Fische zu klein sind, um in einem andern Netze gefangen zu werden, und fieng am 10ten May 1834. 2 bis 3 Duzend. Sie maßen 1"; der Kopf war groß im Verhältniß zum Leibe, welcher sich nach hinten wie ein Keil oder eine kleine Nadel zuspitzte; die kleinen Querstreifen, welche dem Parr eigenthümlich sind, waren deutlich zu bemerken. Ich setzte sie sodann in 2 verschiedene Teiche mit laufendem Wasser, worinn sie sehr gut gediehen.

Im May 1835., nachdem ich sie also 12 Monate gehabt hatte, zog ich einige heraus. Sie waren nun  $3\frac{1}{2}$ " lang und gleichen in jeder Hinsicht dem Parr von demselben Alter im Flusse, zeigten aber noch keine Spur von dem Aussehen des Salmon-fry. Ich behielt sie daher im Teiche, und in der 2ten Woche des May 1836. hatten sie, wie bey den frühesten Versuchen, genau das Aussehen des Salmon fry. Sie maßen  $6\frac{1}{2}$ "; der Rücken schön blau, die Seiten silberglänzend, Rücken-, Brust- und Schwanzflosse schwarz gepunktet, der Bauch, die Bauch- und Steißflosse weiß. Bey der genauesten Vergleichung mit denen, welche nun den Fluß hinunter zogen, war auch nicht der geringste Unterschied zu bemerken. Der Parr bleibt mithin 2 Jahre, ehe er das Aussehen des jungen Salmen oder des Smolt bekommt.

Dieser kleine lebhafte Parr, welcher, wie ich gezeiget habe, der einige Wochen alte Parr ist, findet sich nirgends als in den Flüssen, worinn der alte Salm im Winter vorher den Laich abgelegt hat, oder wenigstens nur in der unmittelbaren Nachbarschaft dieser Flüsse. Schon im Anfang des Aprils 1835. fand ich sie in dem oben genannten Fluß, aber, weil sie so eben aus dem Ey geschlüpft waren, so jung und schwach, daß sie sich nicht gegen den Strom halten konnten, wo er ein wenig stark war. Sie hielten sich daher in irgend einem kleinen Widerstrom, gewöhnlich da, wo ein durchgehendes Pferd eine Vertiefung im Kies gelassen hatte. Darin blieben sie und spielten beständig mit ihrem Schwanz, bis sie meine Annäherung bemerkten und sodann sich unter den Steinen verbargen. Bey ihrem ersten Erscheinen findet man sie nur unter dem losen Kies 2 oder 3" tief im Wasser, dicht am Rande des Stroms oder in den kleinen Bächlein, welche im Kies schief herumlaufen und die Hauptströmungen verbinden; diese Wasserläufe sind besonders dem Laichen günstig, und daher gehen ihnen die Salmen zur Laichzeit sehr nach. In solchen Plätzen nun findet man diese Fischlein während des Aprils und May, und selbst im Juny; so wie sie aber größer und stärker werden, so zer-

Juni 1838. Heft 2.

streuen sie sich in alle feichten Theile des Flusses, besonders wo der Boden aus feinem Gries besteht. Die einjährigen oder Sommer-Parr findet man nun in jedem Strömlein, besonders wo das helle und rieselnde Wasser in einen Dämpfel enbigt, wo man sie während des ganzen Sommers, besonders aber im August und Sept. mit einer kleinen Fliege in ungeheurer Menge anget.

Da ich nun die Fortschritte des kleinen eingölligen Fisches durch alle Zustände des Parrs bis zur Zeit seiner Wandernng verfolgt habe; so will ich auch meine Versuche mit dem Laich mittheilen, um zu beweisen, daß dieser Fisch wirklich von den im vorhergehenden Winter vom Salm gelegten Eiern herkommt.

Am 10ten Jänner bemerkte ich ein großes Weibchen etwa von 16 Pfd., und 2 Männchen, wenigstens von 25 Pfd., im Laichen begriffen. Die Stelle war etwas entfernt von einigen andern Salmen, welche dasselbe thaten, und näher am Ufer, aber noch in ziemlich tiefem Wasser. Beide Männchen hatten den ganzen Tag mit einander Streit um das Weibchen und trieben einander oft fast ans Ufer, zeigten oft ihre Rückenflosse und schlugen mit dem Schwanz aufs Wasser. Ueberzeugt, daß es ächte Salmen sind, indem wenigstens 10 Paar dieser Fische im Laichen begriffen waren, so benutzte ich die Gelegenheit und verschaffte mir soviel von dem Laich als möglich. Das that ich 3 Tage, nachdem er gelegt war, und die Männchen u. Weibchen besuchten noch bisweilen das Lager. Ich ließ einen Canevassack an einem Drahttragen unter den Laich legen und eine andere Person mit einer Schaufel den Gries aufgraben, so daß der Strom die Erer in den Sack führte, während der Gries unterwegs liegen blieb. Dann legte ich den Laich wieder in den Gries unter Wasser an einem zum Beobachten bequemen Ort. Am 26. Hornung, d. h. 48 Tage, nachdem er gelegt war, fand ich eine Spur von Weibung; einen kleinen Streifen Blut im Ey, welcher von 2 kleinen, schwarzen Punkten wie Nadelknopf abgeht, den Augen.

Am 8ten April, also 90 Tage, seit er im Gries lag, fand ich die Jungen ausgeschloffen, was einen Tag vorher nicht war. Die Temperatur des Wassers war 43, im Fluß 45, in der Luft 39. Beym Anfang des Ausschließens hatten sie ein sonderbares Aussehen, der Kopf groß, der Leib sehr klein,  $\frac{5}{8}$ " lang, bläugrau. Das sonderbarste war aber ein Sack, welcher am Hals oder am oberen Theil des Bauches hing; kegelförmig, die Basis am Fisch, die Länge  $\frac{2}{3}$ ", schön durchsichtig roth, fast wie eine Johannisbeere und daher sichtbar auf dem Boden des Wassers, während man den Fisch selbst nicht bemerkt. Er hat noch eine Sonderbarkeit, nemlich eine Finne oder Franze, wie der Schwanz einer Kaulquappe, laufend von der Rücken- und Steißflosse zum Ende des Schwanzes und schwach eingeschnitten. Es scheint nicht, daß dieses Fischlein den Gries gleich verläßt, sondern es bleibt noch an 50 Tage unter demselben mit seinem Sack, aus dem es während der Zeit seine Nahrung zieht, wie andere Embryonen. Am Ende des 50ten Tags oder am 30ten May war der Sack verschwunden oder vielmehr zusammengezogen und bildete den Leib; auch die Franze verschwand und theilte sich in die Rücken-, Fett- und Steißflosse. Die kleinen Querstreifen, welche 2 Jahre lang den Fisch als den Parr charakterisiren, sind auch erschienen. Es vergingern mithin vom 10ten Jänner bis En-

de May 140 Tage bis zur Vollendung des Fisches, und nun maß er nicht weit über 1 Zoll und gleich in jeder Hinsicht dem Fischlein, an welchem ich meine früheren Versuche angestellt, und ebenso denjenigen, die sich in der Nachbarschaft fanden des Flusses, aus welchem ich die Eier genommen und wo sie gegenwärtig sich in großer Menge finden.

Ich habe meine Beobachtungen nur an 3 Fischlein gemacht, welche ich an dem Tage ausgegraben, an welchem sie ausgeschlüpft waren; die andern blieben ungestört unter dem Gries, den ich jetzt erst wegshob, und dann schossen sie fort. Beide sind einander ganz gleich.

Es ist bekannt, daß die Salmen im Herbst anfangen zu laichen und in vielen Flüssen fortfahren bis zur Mitte des Hornungs; auch ist es bekannt, daß der Salmon-fry in den meisten Flüssen im May nach dem Meere zieht. Dem mag seyn wie ihm wolle, so kann ich wenigstens in Rücksicht auf den Fluß Mich mit Gewißheit sprechen. Der Umstand, daß Salmen erst in der Mitte Hornungs laichen und die Eier 140 Tage im Gries liegen bleiben, beweist, daß nicht alle im May wandern können; hier muß es erst in der Mitte Juny geschehen; diejenigen, welche früher gelagt worden, zeigen sich daher auch früher bey Tausenden. Alle diese Fischlein bleiben im ersten Sommer und werden nicht bemerkt. Selten gehen sie an die Flüge des Anglers, und wenn es auch geschieht, so werden sie weggeworfen, weil sie nicht größer sind als ein (Minnow). Sind sie 12 oder 13 Monat alt, so sind die größten Parr als Salmon-fry verschwunden. Dieser Umstand macht, daß der Angler ihn mehr kennen lernt, und daher kommt auch der Name May- oder Sommer-Parr.

Es ist sonderbar, daß sich die Angler nicht fragen, was aus der älteren Generation der Parr geworden ist, welche sie so häufig anfangs Aprils gefangen haben, während man Ende May keinen Parr findet, der größer wäre als  $3\frac{1}{2}$ ", und selbst diese noch ziemlich selten.

Ich habe noch einen andern Versuch mit dem Salmen-lai ch gemacht.

Am 8ten Jänner 1836. fieng ich einen alten Milchner und Roegner 16—20 Pfund schwer während des Laichens. Dann machte ich eine Furche in den Kies und ließ ein Strömchen Wasser durchlaufen 2" tief. Ich hielt sodann beyde Fische Seite an Seite in die Furche und drückte den Laich und den Milch mit der Hand aus; sie mischten sich im Wasser. Einige Minuten nachher that ich den Laich in Wasser, wohin kein anderer Fisch kommen konnte, und am 11ten April, 94 Tage nach der künstlichen Befruchtung, schloffen die Jungen aus den Eiern, und sie sahen ganz aus wie die im vorigen Versuch und waren nur etwas heller. Da ich fürchtete, sie in diesem offenen Strom zu verlieren, that ich sie in einen Teich, wo ich ihre weitere Entwicklung hoffen beobachtet zu können. Diese künstlich befruchteten Eier brauchten also 4 Tage mehr zur Entwicklung, allein dieser unbedeutende Unterschied kann von der Temperatur, vielleicht auch von unvollkommener Befruchtung herrühren.

Daß der weibliche Parr nicht laicht, ist eine unlösbare Thatfache; und obschon der männliche 18 Monate alte Parr in dem Fluß so mit Milch angefüllt gefunden wird, daß der

selbe überfließt und zwar den ganzen Winter bis Ende Hornungs; so ist mir doch nie der Fall vorgekommen, daß der Roogen bey einem Weibchen von demselben Alter oder überhaupt von irgend einem Alter ebenso reif gewesen wäre. Die weiblichen Parr findet man im Fluß im Herbst ziemlich in gleicher Zahl mit den männlichen, aber der Roogen hat nicht das entfernteste Aussehen von Reife. Ich habe auch manchmal während des ganzen Winters gefangen, wenn das Wetter mild war, und dennoch war der Roogen nicht weiter vorgerückt; und selbst zur Zeit ihrer Wanderung findet man den Roogen in ebenso unreifem Zustand. Da der männliche Parr sich seines Milchs entlediget hat und daher keinen deutlichen Geschlechtsunterschied zeigt; so sind manche zu dem Irrthum verleitet worden, anzunehmen, daß alle Parr Bastarde seyen. Bey genauer Untersuchung bemerkt man jedoch zwey sehr kleine röhliche Gefäße jederseits neben der Schwimmblase vom Halse bis zum After, welche den Milch enthalten hatten, aber entleert sehr klein wurden und schwer zu erkennen sind.

Man hat behauptet, daß man bisweilen den weiblichen Parr laichen gesehen hat; ich bin aber überzeugt, daß man die gemeine Forelle für den Parr angesehen hat. Beide sehen einander so gleich, indem beyde die Querstreifen haben, daß der Irrthum sehr leicht vorkommen kann. Wenn der Parr überhaupt im Flusse laicht, oder in seinen Nebenbächen, wohin die kleinen Fische sich zu diesem Zwecke begeben, und wenn wir bedenken, daß  $\frac{1}{10}$  von den kleinen Fischen in diesem Theil des Flusses Mich Parr sind; so müssen sie sich in beträchtlicher Menge in diesen Bächen versammeln, was nicht unbemerkt geschehen könnte. Die augenscheinliche Reife der männlichen Zeugungsorgane und die entschiedene Unreife der Weibchen in demselben Alter sind Thatfachen, über welche ich jetzt keine Meynung wage.

Ich besitze indeffen gegenwärtig dreijährige Parr, d. h. ein Jahr älter als sie das Kleid des Salmon-fry angenommen haben, und kann beweisen, daß sie keine reifen Fische sind, indem sie in eben dem Maße wachsen als vor dem Absetzen ihres Milchs, d. h. um 3 Zoll in 12 Monaten: denn jetzt sind sie  $9\frac{1}{2}$ " lang. Da diese Fische bis jetzt in ihrem freyen Zustande 12 Monate im Meere zugebracht hätten; so kann man nicht erwarten, daß sie in ihrer künstlichen Lage eben so viel wie dort gewachsen sind. Das Verhältniß ihres Wachstums stimmt übrigens mit dem von solchen, welche im Fluß beobachtet wurden, überein. Angenommen, daß die Länge des jungen Parrs, wann er unter dem Gries hervor kommt, einen Zoll beträgt; so müßte er zu derselben Zeit des folgenden Jahres  $3\frac{1}{2}$ "; im 2ten Jahr 6" und ist dann der Salmon-fry. Ich habe den männlichen Parr des Winters, während der alte Salm laicht, gefunden und im letzten Jänner über 3 Dugend gefangen. Es waren lauter Männchen, und da sie um das Lager, welches der Salm gemacht hatte, versammelt waren, so kann man nicht zweifeln, daß sie es thaten, um den Laich zu fressen und die Wasserkies, welche der weibliche Laich ans grub; ich fand beydes in ihrem Magen. Daß aber keine Weibchen darunter waren, kann ich mir nicht erklären, besonders, da sie in andern Theilen des Flusses während dieser ganzen Zeit eben so zahlreich sind, wie die Männchen.

Ich habe in 3 verschiedenen Fällen Gelegenheit gehabt, die Rückkehr oder vielmehr die erste Wanderung des Salmon-

fry nach dem Meer in kleinen Schaaen zu beobachten. Das  
erstmals in der ersten Woche des May 1831. und sah dabei  
deutlich die Querstreifen des Parrs, sowohl im Wasser als  
wenn ich sie in der Hand hatte, besonders wenn ich sie unter  
einem gewissen Winkel ansah; sah ich aber die breite Seite des  
Fisches gerade an, so bemerkte ich die Streifen nicht. Zieht  
man die Seitenhäuten ab, so zeigen sich die Streifen deut-  
lich darunter in der Haut; und dann beobachtete ich wieder  
den Zug des Salmon-fry nach dem Meer am 3. May 1833.  
Es sah alles ebenso aus wie vorher; sie zogen in kleinen Schaa-  
ren von 40—60 Stück und machten 2 Meilen in der Stun-  
de. Die Vorsicht, welche sie bey der Ankunft an einer starken  
Strömung beobachteten, war lustig anzusehen; sie kehrten sich  
plötzlich gegen den Strom und ließen sich allmählich bis an den  
Rand des Falles treiben, kehrten aber oft zurück, bis endlich  
einige Kühnere sich fallen ließen, was dann auch die andern  
nach und nach thaten. Hatten sie wieder ruhigeres Wasser  
erreicht, so drehten sie den Kopf um und setzten ihre Reise fort.

Endlich traf ich sie auf der Wanderung im May 1836,  
wo ich einige, welche das Silberkleid des Salmon-fry ange-  
nommen hatten, mit denjenigen, welche ich 2 Jahr lang habe  
und die noch den Parrcharacter zeigten, verglichen habe, wie  
oben bemerkt. Da der Fluß in diesem Monate sehr niedrig  
stand, so konnte ich genauer die Zeit bemerken, welche sie zu  
ihrer Wanderung brauchten; sie dauerte den ganzen Monat; in  
der zweyten Woche aber waren die Schaaen größer und zahl-  
reicher. Sie sahen alle aus wie die frühern und waren 6—  
7" lang.

Meine Beobachtungen über diese Fische, welche ich für  
die jungen Salmen halte, beschränkten sich zwar nur auf ein-  
en Fluß: da man aber den Parr in allen Flüssen für einze-  
len hält und allgemein angenommen wird, daß er nur in den-  
jenigen vorkommt, in welche der Salm dringen kann; so kann  
man dagegen, daß meine Beobachtungen nur an einem Flusse  
angestellt wurden, nichts einwenden. Daß der kleine 1" lan-  
ge Parr im April in losem Kies am Rande der Ströme, wo  
der Salm den Winter vorher gelaicht hat, das Junge dessel-  
ben ist, kann meines Erachtens keinem Zweifel unterliegen.  
Der Parr hat eben soviel Wirbel als der alte Salm, und er  
kann in seinem neuen Kleid nicht vom Salmon-fry unter-  
schieden werden. Daß der Parr nicht das Junge der gemeinen Fo-  
relle ist (Common Trout), wird aus dem Umstande klar, daß  
er in einer bestimmten Jahreszeit sein Ansehen ändert und dann  
ins Meer geht, was die Forelle nie thut. Die Verschieden-  
heit der Gattungen wird auch dadurch bestätigt, daß die Fo-  
relle nie in dem Flusse laicht, in welchem ich meine Beobach-  
tungen gemacht habe. Ist die Forelle nicht zu groß, was im  
Nith nicht der Fall ist, so zieht sie immer die Nebenquellen  
zum Laichen vor. Auch ist mir kein Fall bekannt, daß die  
Seeforelle oder der Herling in diesem Flusse laicht; diese Fische  
ziehen schon früh im Herbst entweder zu seiner Quelle oder in  
Nebenbäche.

S. 150. King, Beobachtungen über die Temperatur  
der Säugethiere, Vögel, Fische, Pflanzen und der Erden im  
arctischen America während Barks Expedition. Eine Tabelle,  
welche zeigt, daß die Wärme der Bäume bald größer, bald  
geringer ist als die der Luft, jedoch meist größer; die Vögel

meist 109; die Säugethiere 102; die Fische 36, bey einer  
Luftwärme von 12—50.

S. 160. R. Parnelle. Im Frith of Forth zeigte  
sich der White-bait (*Clupea alba*) in Menge. *Clupea sprat-*  
*rus* heißt Sprat und Garvey-Herring.

221. W. B. Thompson, Metamorphose der lang-  
schwänzigen Krebse.

In meinen Zool. Researches habe ich die Metamor-  
phosen der Brachypuren dargestellt und jetzt habe ich dieselbe  
beym Prawn (*Palaemon serratus*) und auch beyhm Shrimp  
verfolgt. Bey allen ist die Larve eine Schizopoda (verschie-  
den von der der Kurzschwänze), sehr abweichend vom alten  
Thier, anfangs nur mit wenigen gespaltenen Gliedern 2 oder  
3 Paar, ganz wie bey Zoö. Sie werden in spätern Zustän-  
den nicht Megalopae, wie die der Kurzschwänze, sondern schei-  
nen einer allmählichen Entwicklung zu unterliegen, welche wahr-  
scheinlich mehrere Zustände umfaßt.

In mehreren Jahren vor 28 fand ich im Haven Cove  
wiederholt Thiere, welche Slabbers metamorphosirter Zoö (mei-  
ne Zool. Res. Tab. 1. f. 1. b) so ähnlich waren, daß ich  
wünschte, die Sache durch Beobachtung irgend einer Zoö ins  
Reine bringen zu können. Im Sommer 1828. fand ich dazu  
Gelegenheit: es entwickelten sich bey mir eine Menge Eyer des  
Prawns, wovon ich entdeckte, daß sie der erste Zustand dieses  
Thieres sind. Fig. 1. Die Langschwänze metamorphosiren sich  
also auch; die Larve aber gleicht der Zoö nur in den Füßen,  
welche ebenso gespalten sind; das äußere Stück zum Schwim-  
men gebildet.

Slabber hat ohne Zweifel einen Mißgriff gemacht (wie  
ich Zool. Res. p. 3 andeutete): denn wahrscheinlich sind beyde  
Thiere einerley und stammen von *Palaemon serratus* her.

Ich habe vergeblich versucht, sie lebendig zu erhalten.

In derselben Zeit des vorigen Jahrs fieng ich ein Thier  
Fig. 2., welches wahrscheinlich ein mehr vorgerückter Zustand  
desselben Thieres ist; es hat ein Paar Füße mehr bekommen  
und ein Paar Schuppen an jeder Seite des Schwanzes, wie  
das Thier in Zool. Res. t. 1. f. b. a. aus den Aequatorial-  
Gegenden des atlantischen Meers.

Am 25ten July 1824. fieng ich ein anderes Thier Fig.  
3. 4. 5., welches nichts anderes als ein noch weiter vorge-  
rückter Prawn seyn kann; es hat schon alle Charactere des  
vollkommenen Thiers, besitzt jedoch noch das zum Schwimmen  
gebildete Stück der Füße, welche sich nun auf 6 Paar vermehrt  
haben; die Subabdominalflossen zeigen sich zwar, aber noch un-  
vollkommen, und die Stirnspitze ober das Rostrum hat nur  
Zähne, die weit hinten stehen, auf dem Rücken des Schildes;  
es ist vorwärts so stark verlängert, daß es fast so lang ist als  
die Füßhörner.

Wir haben also hier 3 Zustände, in deren jedem das  
Thier verschieden ist; und da der zweyte und dritte so ungleich  
sind, so steht wahrscheinlich noch einer dazwischen, worin das  
Rostrum kürzer ist, mit weniger Zähnen, und wo auch die  
Fußzahl geringer ist. Gibt man darauf nicht Acht, so macht  
man eine Menge neuer Gattungen von Schizopoden.



Um Beobachtungen anzustellen, ist es gut zu wissen, daß die Weibchen, welche viel zahlreicher sind als die Männchen, die Eier in Gruppen am innern Zweig der Subabdominal-flossen tragen. Diese Eier sind zuerst oval, gelblich braun und klein, werden bei der Vergrößerung mehr rund, dunkelbraun, dann rötlich braun, endlich mehr durchsichtig und blaß fleischfarben mit schwarzen Augen. Man muß den Weibchen oft frisches Meerwasser geben.

S. 247. Alph. Decandolle, über Marcel de Serres Untersuchungen, ob die Pflanzen in den Steinkohlen den jetzigen unter dem Aequator gleichen.

263. R. Jameſon, Naturgeschichte der Insel Cerigo. Es wird gebaut: vorzüglich Weiskorn, Hülsenfrüchte, Oliven, aber schlecht; Wein, Baumwolle und Flachs, Taback wenig, Indigo auch; Erdäpfel wenig.

## Band XXII. n. 43. 44. October 1836. — April 1837.

### Thiere der Insel Cerigo.

S. 62. Rote und weiße Corallen werden hirtweilen auf folgende Art geholt: Ein Taucher befestigt ein starkes Netz, fast wie ein Nusternetz auf eine Corallen-Bank; Leute auf dem Wasser ziehen es und brechen die Nette ab. Ein Taucher kann 2 Minuten unter Wasser bleiben. Auch Schwämme werden auf ähnliche Art heraufgezogen. *Janthina fragilis* wird viel durch den Südwind angetrieben; daher soll die Insel ihren alten Namen *Porphyra* gehabt haben.

Lurche: *Testudo graeca*, *europaea*, *caretta*; *Lacerta agilis*, *ocellata*, *viridis*; *Ascalabotes*; *Coluber natrix*, *vipera*, *herus*, *ammodytes*; *Rana esculenta*, *arborea*; *Bufo communis*.

Vögel: wenig bleibenbe: *Turdus cyaneus*; *Pyrgita vulgaris*; *Corvus corax*; *Monedula*? *Perdix rufus*.

### Sehr viele Zugvögel:

Die Wachtelſläge, welche im Früh- und Spätjahr erscheinen, sind jetzt wegen der häufigen Verfolgung nicht mehr groß. Ein Hund, ziemlich wie der Dachsband (Lurche) sucht sie auf und dann werden sie mit Handnetzen an einem Raif gefangen. Daran ist eine Stange 10—14' lang. Damit gehen ihrer zweien oder drey auf die Jagd und bekommen des Tags 20—30 Paar. Wann der Hund steht, so gehen sie von verschiedenen Seiten darauf zu. Liegen die Wachteln in Büschen wie gewöhnlich, so treiben sie den Hund hinein und schlagen beim Aufsteigen die Netze auf die Wachteln. Gleich nach ihrer Ankunft sind die Wachteln so ermattet, daß man sie mit der Hand oder dem einfachen Netze fangen kann. Im Frühjahr sind sie so mager, daß man sich nicht darum bekümmert, im Spätjahr aber sehr fett und werden als Leckerbissen geschätzt. Eine Menge wird aufbewahrt und fett gemacht; ohne gute Vorsorgung sterben sie bald. Viele Privatleute haben im Herbst mehrere Hundert behalten, aber sie starben alle, ehe die kalte Witterung eintraf.

### Im Frühling zeigen sich:

*Vultur fulvus*; *Falco tinnunculoides*, *tinnunculus*, *peregrinus*, *subbuteo*, *rufipes*, *aesalon*.

*Nisus vulgaris*.

*Buteo communis*.

*Circus cyaneus*, *rufus*.

*Otus communis*.

*Bubo vulgaris*.

*Scops vulgaris*.

*Lanius excubitor*, *minor*, *collurio*.

*Muscicapa grisola*, *albicollis*.

*Turdus merula*, *musicus*, *saxatilis*.

*Oriolus galbula*.

*Saxicola rubetra*, *rubicollis*, *oenanthe*, *stapazina*.

*Sylvia rubecula*, *phoenicurus*, *tithys*.

*Curruca turdoides*, *atricapilla*, *vulgaris*, *cinerea*.

*Budytes flava*.

*Cypselus apus*, *melba*.

*Hirundo rustica*, *riparia*, *rupestris*.

*Alauda cristata*.

*Parus caeruleus*.

*Emberiza melanocephala*, *miliaria*.

*Fringilla coelebs*.

*Carduelis vulgaris*.

*Linaria cannabina*, *spinus*.

*Coccothraustes chloris*.

*Pica vulgaris*.

*Garrulus glandarius*.

*Coracias garrula*.

*Upupa epops*.

*Merops apiaster*.

*Alcedo ispida*.

*Picus medius*.

*Cuculus canorus*.

*Coturnix vulgaris*.

*Columba turtur*, *livia*.

*Charadrius morinellus*.

*Ardea minuta*, *garzetta*, *nycticorax*, *ralloides*.

*Ibis falcinellus*.

*Numenius arquata*.

*Scolopax gallinago*, *rusticola*, *major*, *gallinula*.

*Rallus crex*, *porzana*.

*Glareola torquata*.

*Podiceps anarus*, *minor*.

*Larus ridibundus*, *melanocephalus*.

*Pelecanus onocrotalus*.



*Anser ferus.*

*Anas rufus.*

*Rhynchaspis clypeata.*

**cella** *Tadorna boschas, sponsa, penelope, vulgaris; Sarcrecca, querquedula.*

*Mergus albellus.*

**Im Sommer:**

*Pastor roseus.*

*Oriolus galbula; Saxicola rubecula, rubetra.*

*Sylvia palustris, melanocephala, galactotes.*

*Hirundo rustica, rupestris.*

*Caprimulgus europaeus.*

*Parus major, caeruleus.*

*Emberiza melanocephala.*

*Pica vulgaris; Garrulus glandarius; Coracias garrula.*

**Yunx** *Upupa epops; Merops apiaster; Alcedo ispida; torquilla.*

*Pterocles alchata.*

*Ardea cinerea, nycticorax, purpurea.*

**nus** *Grus cinerea; Ciconia alba; Ibis falcinellus; Numenius arquata; Totanus glareola; Himantopus melanopterus.*

*Larus marinus, canus; Stolidia vulgaris.*

**Im Herbst:**

*Vultur fulvus.*

**rupes, peregrinus.** *Falco tinnunculoides, tinnunculus, subbuteo, aesalon,*

*Nisus vulgaris.*

*Bubo communis.*

*Circus cyaneus, rufus; Scops vulgaris.*

**la, rubetra; Sylvia rubecula, phoenicurus, titlfs; Motacilla alba, cinerea; Budytes flava.**

**pestris; Caprimulgus europaeus.**

*Garrulus glandarius; Coracias garrula.*

**Yunx** *Upupa epops; Merops apiaster; Alcedo ispida; torquilla; Cuculus canorus.*

*Coturnix vulgaris.*

*Columba turtur, livia.*

**mus crepitans; Vanellus cristatus.**

**loides.** *Ardea cinerea, minuta, garzetta, nycticorax, ralloides.*

*Ciconia alba.*

**Gallinula major; Rallus crex, porzana.**

*Podiceps minor, auratus; Larus canus, marinus.*

**Winter.** Einige der oben genannten Raubvögel:

*Turdus merula, musicus, pilaris; Saxicolae, Curcae et Reguli* wie im Frühjahr.

318 1838. Heft 2.

*Budytes flava; Alauda cristata; Parus major, caeruleus; Emberiza miliaria; Fringilla caelebs; Carduelis vulgaris, Linaria cannabina, spinus; Coccythraustes chloris; Picus medius.*

*Ardea nycticorax; Scolopaces* wie im Herbst.

*Larus ridibundus, melanocephalus; Pelécanus onocrotalus; Lamellirostres* wie im Frühjahr.

Säugethiere wenige.

*Canis aureus.*

*Vespertilio murinus; Rhinolophus ferrum equinum.*

*Mustela foina.*

*Lepus timidus, cuniculus; Mus musculus, rattus.*

Schafe sind die meisten, 17000; kaum 1 Dugend Pferde, Maulesel und Esel 870; Rinder 3000; Ziegen 5500.

Die Ochsen kurz und stark, dunkelbraun.

Schweine fast in jedem Bauernhaus; ihre Häute und die der Ziegen zu Weinschläuchen, um denselben auf die Märkte zu schaffen. Esel und Maulesel sind die einzigen Lastthiere.

Zweierley Hunde, der Schäferhund zum Wachtsfang und ein Grayhound aus Candia.

S. 116. M. Barry, über die Einheit des Baues im Thierreich, T. 1. Entwicklung des Embryo. Fortsetzung S. 345. Hermaphroditen.

S. 281. A. Connell, Zerlegung versteineter Schuppen.

## U e b e r s i c h t

der gebräuchlichsten Arzneimittel des Alterthums

mit besonderer Rücksicht auf die Werke des Dioscorides und Plinius.<sup>1</sup>  
Ein pharmatologischer Versuch von Dr. J. Heinrich Dieckbach.

Erster Abschnitt.

Nährende Mittel aus dem Thierreiche.

Erstes Capitel.

Milch und andere Stoffe aus der Classe der Säugethiere.

Zu allen Zeiten ist die Milch nicht nur als ein liebliches Getränk, als ein vorzügliches Nahrungsmittel, sondern auch in vielen Krankheiten als ein höchst schätzbares Arzneimittel betrachtet

<sup>1</sup> Ich benutzte vorzugsweise die von Kühn besorgte Ausgabe der Werke des Dioscorides mit den Commentarien von Sprengel, vorzüglich aber auch die geschätzte Edition des Sarracenus und einige andere. Die hier vorkommenden Citationen des Plinius beziehen sich, so oft nichts näheres bemerkt ist, sämmtlich auf die sehr schöne Ausgabe, welche Sigismund Gelenius in Lyon besorgte, Lugduni, 1562. folio.

worden, und eine vergleichende Uebersicht von dem, was die Ärzte und Naturforscher der Vorzeit in dieser Hinsicht hinterlassen, verglichen mit den Erfahrungen und Beobachtungen der neueren Zeit, dürfte geeignet seyn zu zeigen, wie lange oft längst bekannte nützliche Wahrheiten übersehen oder vergessen werden konnten, und wie auf der andern Seite zumal die so weit vorgedrungenen naturhistorischen Kenntnisse unseres Jahrhunderts geeignet sind, die Vorschriften und Heilmethoden der griechischen und römischen Ärzte richtiger und nützlicher und auf geeignetere Art zu benutzen.

Die Frauenmilch (*Lac muliebne*) ist, wie Dioscorides sagt, unter allen die süßeste und ungemein nährend, und als Arzneimittel zumal dann nützlich, wenn sie unmittelbar aus den Brüsten gezogen werden kann. — Sonst ist sie ziemlich dünn, bläulichweiß von Farbe, die darinn enthaltene Butter ist weich und gelblichweiß. Nach Bergelius besteht diese an Stickstoff so reiche Drüsenflüssigkeit aus Sahne und eigentlich sogenannter Milch. Letztere enthält Wasser, Käse mit einer Spur von Zucker, Milchsücker, salzsaures und phosphorsaures Kali, Milchsäure, essigsaures Kali, milchsaures Eisen und phosphorsauren Kalk. Die Sahne enthält Butter, Käse und Molke.

Frauenmilch ist am wenigsten zum Gerinnen geneigt, und desto weniger, je strenger animalisch die Diät der Säugenden ist; als ein Merkmal ihrer Güte sieht man es an, wenn sie nach 24 Stunden sich noch nicht scheidet. Bergius beobachtete, daß Milch von Frauen, die eine animalische Diät führten, sich in der Wärme mehrere Wochen lang hielt ohne zu gerinnen; sie wurde vielmehr dicker und blieb immer süß und mild. Aber Milch von solchen Personen, die eine mehr vegetabilische Diät führten, war leichter zum Gerinnen zu bringen.<sup>2</sup> Meggers hofen beobachtete, daß die Frauenmilch in gewöhnlicher Temperatur sich meistens nicht coaguliert, auch nicht unter Zusatz von Säuren oder Metallsalzen; dagegen die gleich nach der Niederkunft abgesonderte allerdings gerinnt und zugleich weniger reich an Käsestoff ist. Von besonderer Wichtigkeit ist der Einfluß moralischer Ursachen und Leidenschaften auf die Beschaffenheit und Wirkungsart der Muttermilch, und das uralte deutsche Sprichwort: „Der oder Die hat schlimme Milch getrunken,“ ist wohl nicht ohne gründliche Bedeutung.

Zum medicinischen Gebrauche benutzt man vorzugsweise oder einzig die Milch kräutereffender Thiere. Dahin gehört:

Die Kuhmilch (*Lac vaccinum*); sie ist wenigstens heutzutage und bei uns die beliebteste, sowie die gewöhnlichste; sie ist etwas dickflüssig und weiß, undurchsichtig, von angenehmem süßem Geschmacke, gerinnt sich selbst überlassen bald, auch auf Zusatz vieler Säuren, Alaun, schwerer Metallsalze, Weingeist, Gerbstoff u. s. w. Wird die erwärmte Kuhmilch mit Zucker oder Gummi gesättigt, so gerinnt sie ebenfalls, weogegen mehrere Neutralsalze dies nicht bewirken; auch mit Alkali und Ammoniak gerinnt die Milch nicht, es löst vielmehr den Käse wieder auf, wenn er bereits getrennt seyn sollte.

Die Ziegenmilch (*Lac caprinum*) ist etwas dicker von Consistenz als die Kuhmilch, und haucht einen eigenthümlichen, aber nicht lieblichen hochartigen Geruch aus. Sie ist reich an Rahm, der eine weiße Butter liefert, die ebenfalls einen starken Geruch hat; überdem enthält sie eine beträchtliche Menge von weichem Käsestoff und eine besondere Säure (Hirnsäure), von der der berührte Geruch abzuleiten ist.

Die Schafmilch (*Lac ovillum*) ist specifisch schwerer als Kuhmilch, enthält weniger wässerige Theile und mehr Butter, die blaßgelb, mehr weich und leichter zerfließlich ist; auch der Käsestoff der Schafmilch ist fetter und klebriger, als bei der Kuhmilch und Ziegenmilch.

Eselinnen-Milch (*Lac asinum*). Kommt in ihren Eigenschaften der Frauenmilch am nächsten, enthält aber weniger Rahm und etwas mehr Käsestoff; auch ist sie leichter gerinnbar; ihre Butter ist weich, weiß, geschmacklos, sie ist erst nach langem Schütteln zu erhalten und wird leicht ranzig. Die Molken der Eselinnenmilch enthalten viel Milchsücker und haben einen angenehmen süßen Geschmack.

Stutenmilch (*Lac equinum*). Sie hält der Consistenz nach ungefähr das Mittel zwischen Frauenmilch und Kuhmilch; sie enthält wenig Rahm und dieser liefert keine oder nur eine sehr geringe Menge von flüssiger unangenehm schmeckender Butter. Säuren präcipitiren den nur sparsam darinn enthaltenen Käsestoff in kleinen Flocken. Dagegen ist die Stutenmilch vorzüglich reich an Milchsücker.

Kameelmilch (*Lac camelinum*). Nach Plinius gibt sie ein sehr angenehmes Getränk ab, wenn man ein Maas derselben mit drei Maas Wasser vermischt. Auch Schinz sagt: die Kameelmilch ist sehr fett, nahrhaft und wohlgeschmeckend, aber für sich allein zu stark, daher wird sie immer mit wenigstens einem Dritttheil Wasser vermischt.<sup>3</sup> Galenus und Orisbasius versichern dagegen, die Kameelmilch sey sehr dünn, sie enthalte wenig Fett und viele Molke, äußerst wenig Käse; sie sey wenig nährend, sondern eher erstickend.

Aus den bemerkten Thatfachen läßt sich entnehmen, daß Ziegen- und Schafmilch am reichsten an Butter- und Käsestoff, deshalb am nahrhaftesten, und auch zugleich schwerer verdaulich sind. — Eselinnen- und Stutenmilch dagegen haben bey weitem weniger fette Theile, aber um so mehr Milchsücker, sie sind weniger nahrhaft, werden aber auch viel leichter verdaut und vertragen. In der Mitte aller dieser Milcharten steht die Kuhmilch.

Beträchtlich ist der Einfluß des Clima, so wie der Jahres- und selbst Tageszeiten auf die Beschaffenheit der Milch. Nach Sömberg bekommen europäische Frauen, die nach Java reisen, eine so süßig schmeckende Milch, daß sie nicht mehr ihre Kinder säugen können, und nach Bernardin de Saint Pierre ist die Kuhmilch in der russischen Tartarei so mager, daß man keine Butter davon erhält, und eben deswegen die Stutenmilch benutzt. Nach Dioscorides ist die

<sup>2</sup> Boigtel Arzneimittellehre, herausgeg. von Kühn Bd. 2 S. 140. Man vergleiche auch Magendie Grundriß der Physiologie, aus dem Franz. von G. J. J. G. Bd. 2 S. 449.

<sup>3</sup> Naturgeschichte und Abbildungen der Säugethiere, 2. Aufl. S. 273.

Milch im Frühjahr wässriger als im Sommer, und wenn die Thiere auf der Weide gefüttert werden, wirkt die Milch mehr auf den Stuhltag. **Sermbsstädt** fand, daß die Morgens gemolkene Milch deutlich Lakmuspapier röthet, nicht aber die Mittags oder Abends erhaltene. Nach **Schübler** ist die Morgenmilch reicher an Rahm als zu anderen Tageszeiten. In den Winter-Monaten giebt sie bedeutend weniger; auch mit dem Alter der Kühe nimmt die Absonderung der Milch ab, und sie enthält weniger Rahm und Käse.<sup>4</sup>

**Lassaigne** hat die Milch einer Kuh in verschiedenen Epochen vor und nach dem Kalben einer chemischen Untersuchung unterworfen, und dabei bemerkenswerthe Veränderungen in ihren Bestandtheilen beobachtet. Die Milch, welche der Gegenstand der Versuche war, wurde von einer jungen Schweizerkuh genommen, welche die beiden letzten Monate ihres Trächtigkeitss und einen Monat lang nach dem Wurf des Kalbes auf dieselbe Weise gefüttert ward, damit die Resultate in Bezug auf die erhaltene Nahrung vergleichbar blieben, auch geschah das Melken immer möglichst zu derselben Tageszeit. Folgendes ist das Wesentlichste des Resultates: 1) Ein und vierzig Tage vor dem Kalben ist die Milch von der gewöhnlichen ganz verschieden, sie ist dichter, äußert eine alkalische Reaction auf Lakmus, besitzt einen Gehalt an Eiweiß; es fehlen aber darin: Milchzucker, freie Milchsäure und Käsestoff. 2) Die Zusammenfügung dieser Flüssigkeit bleibt so, wie sie eben beschrieben worden ist, bis ungefähr 10 Tage vor der Geburt des Kalbes, wo sie schwach süß wird, saure Reaction annimmt und alle Bestandtheile der gewöhnlichen Milch, außerdem aber noch eine gewisse Quantität Eiweiß enthält. 3) Vier bis fünf Tage nach der Geburt gleicht die Milch in allen Stücken der gewöhnlichen.<sup>5</sup>

**Apotheker Sollandt** in Güstrow und **Domänenrath Donner** zu Mierendorff, beschäftigten sich mit ähnlichen Versuchen und erhielten Resultate, die denen, welche **Lassaigne** bekannt macht, sehr nahe kommen; die ersten bemerkten noch, daß die Milch atmliehender Kühe weniger Butter und Käse enthält, als die von frischemilchenden, die erste röthete das Lakmuspapier weniger als die letzte, welche mehr Milchsäure enthielt. Die erstere gerann zu einer verdünnern und dickern Milch und hatte eine weit stärkere Rahmschicht als letztere, welche auch weniger Butter und Käse lieferte.<sup>6</sup>

Daß Krankheiten auf die Milch der Thiere oft einen nachtheiligen Einfluß haben, kann wohl nicht bezweifelt werden; auch hat schon **Natoliolus** auf diesen Umstand aufmerksam gemacht, und der Gegenstand hat öfters die Aufmerksamkeit der Gesundheitspolizei auf sich gezogen, so daß bey epidemischen Krankheiten des Rindviehes aller Milchverkauf verboten wurde, in einer deshalb ergangenen Braunschweigischen Verordnung wird gesagt: die Milch des inficirten Viehes pflege etwas gelbbräunlich zu seyn, oder habe doch gelbbräunliche Striche. **Timäus von Guldensee** berichtet den Fall einer von einem tollen Hunde gebissenen Kuh. Der Bauer, dem solche gehörte, desselben Weib und fünf Kinder, die Waid und eine Nachbarin mit

vier Kindern, hatten täglich von dieser Kuh die Milch genossen. Alle bekamen nach und nach die Wuth. Der Bauer und sein jüngstes Kind wurden am Leben erhalten, die übrigen alle mußten elend sterben.<sup>7</sup>

**Labillardiere** wies nach, daß die Milch einer Kuh, die an einer Art knotiger Lungenschwindsucht (pommelière) litt, siebenmal mehr phosphorsauren Kalk enthielt, als die gewöhnliche Milch, was um so mehr zu beachten ist, da diese Krankheit in Städten, wo man die Kühe in eingeschlossnen Ställen nährt, häufig genug vorkommt. **Pereira** meint deshalb, dieß sollte die Aerzte bestimmen, jeder an einer Spur von Phthisis tuberculosa leidenden Frau das Stillen zu verbieten. Nicht als wenn einige Gran phosphorsauren Kalkes mehr oder weniger die Milch so verderblich machen könnten, sondern weil der Verdacht rege werden müsse, daß sich noch andere dem Kinde schädliche Substanzen in solcher Milch befinden mögen, die bisher noch nicht erkannt sind. Nicht die Phthisis allein, setzt er hinzu, sondern noch manche andere Krankheiten äußern auf die Milch einen schädlichen Einfluß. Ganz besonders sollte, nach der Ansicht der Herren **Nirat** und **Leur** jenen Frauen das Selbststillen untersagt werden, die an Scropheln oder andern erblichen Krankheiten leiden. Die Herren **Parmentier** und **Dreyer** wiesen nach, daß die Milch einer an einer Nervenkrankheit leidenden Frau, so oft sie ihre Anfälle bekam, durchsichtig und flebrig wurde, und erst nach Verlauf einiger Stunden ihre natürliche Beschaffenheit annahm. Indessen scheint doch nicht jede Krankheit einen wesentlichen Einfluß auf die Milch zu haben, denn der berühmte **Peter Frank** versichert ausdrücklich: man wisse viele Beispiele sehr kranker Mütter, welche ihre Kinder ohne Nachtheil fortgesaugt hätten.

Nicht selten beobachtete man, daß die Milch verschiedenen gefärbt vorkommt, und bereits **Plinius** rebete (lib. 2. cap. 103.) von einer schwarzen Stutenmilch, die als Nahrungsmittel diene und allem Ansehen nach von besondern Kräutern herrührte, welche die Thiere auf der Weide gefressen hatten. Mit besonderm Fleiße hat **Sermbsstädt** diesen Gegenstand behandelt, und insbesondere die blaue Milch näher untersucht. Wenn das Blauwerden der Milch eintritt, so wird in dem Zustande, wie sie aus dem Euter der Kühe kommt, nichts Widenatürliches daran wahrgenommen, weder an der Farbe noch an dem Geschmack oder Geruch; kommt sie aber in die Rahmgäße: so bilden sich erst ganz kleine blaue Punkte, die sich nach und nach weiter verbreiten und die ganze Oberfläche des Rahms wird mit dem schönsten indigofarbenen Blau bedeckt. Auch die Milch der Schafe ist dem Blauwerden unterworfen, und erzeugt sich besonders, wenn die Thiere auf der Stoppel weiden. — Wird ein solcher blauer Rahm gebuttert, so erscheint die daraus erhaltene Butter rein an Geschmack und ganz einer aus farblosem Rahm gewonnenen gleich, aber die Buttermilch ist blau. Nach wenigen Tagen scheidet sich die blaue Buttermilch in zwei Theile: einen dickern, der sich ablagert und farblos ist, und einen flüssigern, der das blaue Pigment enthält. Käse, der aus solcher blauen Milch gewonnen wird, ist gleich-

4 **Kießemann**, Physiologie des Menschen, Bd. 3 S. 271.

5 **Journal de Chim. med.** 1832 Mars p. 143. **Pharm. Centralbl.** 3. Jahrgang S. 238.

6 **Allgem. landwirthschaftl. Zeitung** 1834 S. 283.

7 **Frank**, System der med. Polizei, Bd. 3 S. 148. Nordamerikanische Aerzte beschreiben eine eigene Milchkrankheit, erzeugt durch den Genuß der Milch kranker Thiere. **Man** sehe **Fuß** **Magaz.** Bd. 18 S. 176.

falls farblos, und von keinem andern zu unterscheiden. Was die Pflanzen anlangt, deren Genuß sich das Erscheinen der blauen Milch wegen Gehalts an einem indigähnlichen Farbstoffe mit Wahrscheinlichkeit beimesßen läßt, so erwähnt **Hermbsstädt** die *Esparettie* (*Hedysarum onobrychis*), die gemeine Schenkwurze (*Anchusa officinalis*), den Aderfuchtelbalm (*Equisetum arvense*), Binkelkraut (*Mercurialis annua*), Vogelknöterich (*Polygonum aviculare*) und Buchweizen (*Polygonum fagopyrum*). Herr **Vallot**, der über dieselbe Sache schrieb, gesteht, daß er die Ursache der blauen Milch, die man zumal im Departement der untern Seine und von Calvados beobachtete, nicht kenne, erinnert aber, daß Einige sie vom Genuße des *Hyacinthus comosus*, Andere von *Butomus umbellatus* ableiten. — Noch muß man aber auf zwei andere Pflanzen aufmerksam machen, die häufig auf den Weiden vorkommen und wohl mit den größten Theil an der Erzeugung der blauen Milch haben dürfen, nemlich: *Melampyrum arvense* und *Rhinanthus alectorolophus*.<sup>8</sup> **C. Nodat** bemerkt in einer kurzen Notiz, daß, wenn man den Käsestoff blauer Milch calcinirt, die Asche in einer gewissen Epoche der Calcination blau durch Gehalt von phosphorsaurem Eisen wird.

Auch rothe Milch hat man öfters beobachtet, und **Hermbsstädt** gibt zwar zu, daß diese Erscheinung von dem Genuße mehrerer Gewächse aus der Gruppe der Stellaten herühren könne, wie von *Rubia tinctorum*, *Galium rubioides*, *G. verum*, *G. boreale* usw.; allein da, wo die aus rother Milch erzeugte Butter farblos erscheine, könne die rothe Milch nicht vom Genuße einer der genannten Gewächse abhängen; es sey vielmehr anzunehmen, daß die blutenden Euter der Kühe (von Insectenstichen) die wahre Ursache seyen.<sup>9</sup> Noch redet **Vallot** von gelber und grüner Milch, aber ohne etwas Näheres darüber mitzutheilen.

Der Einfluß der Nahrung der Thiere auf die Menge und Beschaffenheit der Milch ist ohne Zweifel sehr bedeutend, und von den alten Aerzten gar wohl bekannt, wie denn **Plinius** eine ganze Reihe von Pflanzen nennt, welche die Eigenschaft haben sollen, die Secretion der Milch zu befördern, und andere, die deren Absonderung unterdrücken oder mindern; in ersterer Hinsicht nennt er besonders *Glaucion*, *Hippomarathrum*, *Erigeron*, *Polysylla*, *Tragion* usw., aber auch, auffallend genug, den *Nosmarm*; denn alle Beobachtungen der neueren Zeiten berechtigen zu dem Schlusse, daß aromatische Dolden ausgezeichnet die Milch-Secretion vermehren,<sup>10</sup> aromatische Labiata (zumal *Mentha*) sie eben so ausgezeichnet vermindern. Einen gleichen Einfluß haben narcotische Gewächse, unter denen schon **Plinius** den Schierling aufführt, dessen Wirkkraft in dieser Hinsicht auch von neueren Aerzten bestätigt worden ist.<sup>11</sup>

Sehr reichliche Milch liefern die Thiere, zumal die Kühe, wenn sie mit Gramineen und Leguminosen gefüttert werden, insbesondere wenn die ersteren reich an Zuckersstoff sind, wie dies die Versuche von **Parmentier**, **Deveux**, **Hermbsstädt** und **Schübler** mit Maistengeln lehren. *Trifolium alpinum* liefert nach **Vallot** eine besonders süße Milch, vielen Rahm enthält sie nach **Schübler** bey der Fütterung mit dem Luzernerklee (*Medicago sativa* L.). Nach **Percival** ist die Milch von Kühen, die auf sehr feuchten Wiesen weiden, dünnflüssig, fade, liefert eine weiche Butter und wenig Käse, am schmackhaftesten ist sie dagegen auf Bergen, wo viele Leguminosen, aromatische Umbelliferen usw. wachsen. Die besten Futterkräuter auf den Schweizer Alpen sind: *Phellandrium mutellina*, *Alchemilla vulgaris* et *alpina*, *Plantago alpina*, *Pimpinella alpina*, *Aurelia helvetica* et *alpina*, *Trifolium alpinum*, *Astragalus alpinus* usw.<sup>12</sup>

Der Geruch und Geschmack mancher Pflanzen ist deutlich in der Milch wahrzunehmen; dieß gilt von den Cruciferen und andern, zumal solchen, die einen knoblauchartigen Geruch haben, wie *Allium ursinum*, *Thlaspi alliaceum*, *Erysimum alliarum*. Bittere Milch hat man öfters wahrgenommen, und zwar wenn die Thiere, wie **Vallot** sagt, *Wermuth*, *Hollunder*, *Karioffeln* oder auch den *Onchus alpinus* gefressen haben. Bitterer Rahm entsteht nach **Hermbsstädt**, wenn die Kühe im Winter, bey Mangel an besserem Futter, mit Gerstenstroh gefüttert werden, was mit der schon von **Einhof** bekannt gemachten und später bestätigten Erfahrung zusammenhängt, daß in jedem Pfunde von reifem Gerstenstroh über fünf Loth bitterer Extractstoff enthalten ist. Die aus solchem Rahm gewonnene Butter ist gleichfalls bitter.<sup>13</sup>

Eine scharfe schädliche Eigenschaft bekommt die Milch, wenn die Thiere (zumal Schafe undiegen) Wolfsmilch-Arten fressen. **Lorry**, **Tozzetti**, **Gmelin** und andere Schriftsteller bezeugen dieses und nennen besonders *Euphorbia cyparissias*, *E. esula* und *E. helioscopia*, die auch bey uns, zumal die erste, am verbreitetsten sind. Die Milch der im Freyen weidenden Ziegen erfordert überhaupt besondere Vorsicht, da sie manche Pflanzen fressen, die ihnen gar nicht schädlich sind, wohl aber den Menschen. **Dr. Bonorden** erzählt den Fall einer Vergiftung von 5 Kindern, 2—15 Jahr alt, durch Ziegen-Buttermilch, bey der die Untersuchung der Milch durchaus keine anomalen Zusammensetzungen zeigte, und man ihre nachtheiligen Folgen nur davon abzuleiten wußte, daß die Ziegen narcotische Kräuter, namentlich *Aethusa cynapium* L. gefressen hatten.<sup>14</sup>

Schon **Dioscorides** wußte, daß die Ziegenmilch purgirend wirkt, wenn die Thiere die jungen Blätter von weißer Nieswurz gefressen haben; überhaupt sagt er, wenn die Thiere an Dornen weiden, wo sie *Scammonia*, *Helleborus*, *Mercurialis* und *Clematis* unter dem Futter bekommen, nimmt die Milch eine Brechen und Durchfall erregende Eigenschaft an, wie er dieß selbst auf den westindischen Bergen wahrgenommen habe.

8 Man vergleiche deshalb meine Uebersicht einiger Gewächse, welche einen blauen Farbstoff liefern: *Annalen der Pharmacie*, Bd. 3 S. 45 ff.

9 **Erdmann's Journal** XVII. S. 11—19.

10 Schon in den Hippokratischen Büchern werden *Smyrnium Olus atrum* und *Anethum Foeniculum* Säugenden zur Vermehrung der Milch angerathen und letztere Pflanze dient dazu noch bis auf den heutigen Tag, was auch von *Carum Carvi* gilt.

11 **Murray**, *Apparat. Medicam.* I. p. 217.

12 **Ersch** und **Gruber**, *Encyclopädie*, Bd. 3 S. 205.

13 **Berchtold** und **Dpig**, *ökon. technische Flora Böhmens*, Bd. 1 S. 310.

14 **Ruß**, *Magazin*, Bd. 27 S. 195.

Wenn die Rube das Gottesgnadenkraut (*Gratiola officinalis* L.) fressen, wird ihre Milch bitter und purgirend.

Die Milch einer säugenden Frau wirkt purgirend auf den Säugling, wenn sie (nach Wedekind) Klob oder Rhabarber eingenommen hat, aber, auffallend genug, keineswegs nach dem Gebrauche der Salappe. Der gewandte Chemiker M. E. Peligot stellte vielfache Versuche mit Eselinnen-Milch an, um auszumitteln, welchen Einfluss die verschiedene Nahrung dieser Thiere auf die Milch habe: er bemerkte unter andern, daß bey der Fütterung mit gelben Rüben die farbige Substanz derselben in die Milch überging; ferner, daß Kochsalz sich in der Milch deutlich nachweisen ließ, während lösliche schwefelsaure Verbindungen nie darin gefunden werden konnten. Wenn die Eselinnen ein Jodid oder überhaupt ein Jod-Präparat erhielten, so konnten in der Milch durch Analyse deutlich die Spuren des Jods dargehan werden; bey Quecksilber-Präparaten war dieß keineswegs der Fall, wie denn auch schon früher Herr Chevallier vergebens Mercur in der Milch der Ammen des Hospital de Veneriis zu Paris gesucht hatte. Wenn einer Eselinn Chlornatrium zu 10 Gran in einem Tag gegeben wurde, so war das Mittel schon durch den Geschmack in der Milch erkennbar; bey einer Ziege, die 12 Gran erhielt, war dieß nicht der Fall. Man ließ eine Eselinn innerhalb 6 Tagen 30 Grammen doppelt kohlensaures Natron nehmen; die Milch, obgleich unmittelbar nach dem Meßen sauer reagirend, zeigte sich doch kurze Zeit nachher statt alkalisch.<sup>15</sup>

Diese Thatfachen verbieten wohl die volle Aufmerksamkeit der Aerzte und dürfen wohl bey der Behandlung der Scropheln, der Lungenschwindsucht und anderer Krankheiten zumal bey Kindern eine rationelle Anwendung finden.

Professor Herr in Freiburg stellte eine ganze Reihe Arzneisubstanzen zusammen, die nach innerer oder äußerer Anwendung in der Milch wieder gefunden werden konnten, unter andern *Herba jaceae*, Lichen islandicus, Knoblauch und Zwiebel, Levisticum, Mentha silvestris, Wermuth, Simmet, Indig, Scammonium, Fliegenschwamm, Opium, blausaures Eisenfali usw.<sup>16</sup>

Den Unterschied der Nahrung der Thiere und die davon abhängende verschiedene Wirksamkeit in Krankheiten beobachtete schon Dioscorides; er erinnert, die Ziegenmilch wirke weniger auf den Stuhlgang, weil diese Thiere viele abdringende Pflanzen fressen, wie die Blätter der Eiche, des Mastix und Zerpenshinbaums, der Nüthe usw., deßhalb bekomme auch die Ziegenmilch dem Magen besser. Auf diese Umstände gestützt, glauben die Aerzte, sich eine besonders heilkräftige Milch verschaffen zu können, wenn sie die Thiere mit solchen Kräutern füttern lassen, die zur Heilung bestimmter Krankheiten dienlich sind;<sup>17</sup> so soll man sie bey der Lungensucht Fichtensprossen,

überhaupt balsamische Kräuter oder Hufslattig fressen lassen; bey Krämpfen Schafgarbe oder Chamillen, bey Scorbut Brunnenkreffe und Beecabunga.<sup>18</sup> Diese Sache verdient gewiß alle Aufmerksamkeit, wenn gleich Cullen und Andere Einwendungen dagegen gemacht haben. Indessen bey der Ausführung finden sich denn doch manche Schwierigkeiten, indem es nicht bloß darauf ankommt, daß man wolle, das Thier soll diese oder jene Pflanze fressen, sondern auch, daß gerade diese Pflanze dem Thiere behage, von ihm gern gefressen werde und ihm zuträglich sey; so daß also für diese oder jene Curart, bald eine Ziege, bald eine Eselinn, bald eine Kuh vorziehbar seyn dürfte. Vielleicht ließen sich manche Umstände dabey verständig benutzen, z. B. daß die Esel sehr gerne Pflanzen aus der Familie der Centaureen und Carduaceen fressen, daß die Pferde sehr begierig nach Rhus toxicodendron sind, ebenso die Ziegen nach den Blättern des Aesculus hippocastanum, daß sie Aconitum und Conium maculatum ohne Schaden fressen usw. Videre licet pinguescere saepe Cicuta barbigeros pecudes, homini quae est acre venenum. *Lucret. V. 897.*

Berühmt war im Alterthume Tabae, ein Berg, in der Nähe des Besus, wohin Viele reisten, um da die Milchcur zu gebrauchen;<sup>19</sup> denn seit den ältesten Zeiten benutzte man die Milch als Heilmittel bey verschiedenen Krankheiten,<sup>20</sup> und gleichsam als Präservativmittel tranken sie, nach der Versicherung des Plinius, die Arabier im Frühjahr.

Ungemein häufig wird sie im Alterthume bey phthisischen Leiden, bey Feschwärungen innerer Organe und hektischen Fiebern empfohlen; nach Dioscorides ließ man die Milch abkochen und suchte die wässerigen Theile noch dadurch zu mindern, daß man glühende Kieselsteine hineinwarf; bey Feschwörung des Kehlkopfs, der Lunge, der Gedärme, Nieren und Harnblase rühmt sie Dioscorides, auch empfiehlt er da Frauenmilch, unmittelbar aus den Brüsten gesogen; eine Verordnung, die man öfters in den Schriften der älteren griechischen Aerzte wiederholt findet. Galen gedenkt hier als einer Curart des Eurypphon, Herodotus und Prodicus und setzt die Bemerkung hinzu, daß wenn die Milch unmittelbar aus den Brüsten getrunken werde, sie am wirksamsten sey, indem so keine ihrer guten Eigenschaften verloren gehen könne; noch hält er auch die Eselinnen-Milch für Schnindsüchtige zuträglich.<sup>21</sup> Alexander Trallianus empfiehlt bey eiternder Lungensucht zuvörderst Eselinnen-Milch, sodann Stutenmilch, auch Asymatische sollen sich bey der Milchdiät wohl befinden. Damit die Milch den Magen nicht verderbe, rath er an, sie auf Kohlen einzufochen; nicht minder empfiehlt er Milch mit Similago, Reiß, Alica, Eygelb usw.<sup>22</sup> Man sieht,

15 *Annales de Chim. et de Physique*. Aout, 1836. p. 432 bis 438. *Annales der Pharm.* Bd. 15 S. 164.  
16 *Theorie der Arzneiwirkungen*. Freiburg, 1836. S. 41. — Man sehe auch dessen Schrift: Ueber den Einfluss der Gäfte auf die Entstehung der Krankheiten. Freiburg, 1834. S. 33 ff.  
17 Kreuz, Neue praktische Versuche über die mit besondern Arzneikräften geschwängerte Weismilch. Leipzig, 1783.  
358 1838. Heft 2.

18 Richter, Arzneimittellehre, Bd. 1 S. 207.  
19 Galen, Method. medend. Lib. V. cap. XII. p. 123. Tom. X. Edit. Chartarii.  
20 Man vergl. Arzneimittell des Hippocrates. Heidelberg, 1824. S. 6 ff. Celsus lib. 3 cap. 22 pag. 170. Edit. Anton. van der Linden. Lugduni, 1657.  
21 Galen, Method. medend. Lib. VII. cap. 6. p. 160. Tom. X. Edit. Chartarii; sodann De probis praviague alimentorum succis. p. 426; ferner De Maceore cap. 9. p. 190.  
22 *Alexandri Tralliani Medici libri duodecim graece et latine*, Joanne Guinterio Andernaco interprete. Basil.  
9 \*

daß dieß die Vorläufer des noch heutzutage für Schwindflüchtige so oft gerühmten präparierten Gerstenmehles sind, wozu **Thilenius** die Vorchrift gab, und das selbst in der neuesten Ausgabe der *Pharmacopoea borussica* eine Stelle fand. — Bey Geschwüren im Halse gibt **Cornelius Celsus** die Milch als das beste Nahrungsmittel (lib. 4. cap. 4. p. 200). Bey Vereiterung der Nieren gibt er die Milch mit Mandeln und etwas Saffran (lib. 4. cap. 10). — In diesem letzteren Falle, so wie bey Vereiterung der Harnblase schätzte **Alexander Trallianus** besonders die Eselinnen-Milch (lib. 9. cap. 5). Bey **Marasmus** überhaupt wird von **Aretaeus** die Milch als Heilmittel gerühmt.<sup>23</sup> Auch **Celsus** erinnert (lib. 3. cap. 22. p. 170), obgleich die Milch in acuten Fiebern, und bey dem davon abhängenden Durste, Koppweh usw. auch bey galligen Krankheiten schädlich sey und vermindert werden müsse, so nütze sie doch bey einem phthisischen Zustande, sowie bey allen chronischen Fiebern.

Bey **Dyspnoe** läßt **Celsus** (lib. 4. cap. 4) morgens nüchtern warme Ziegenmilch trinken, und **Cälius Aurelianus** rühmt (Chron. 3, 1. p. 207) gegen Engrüstigkeit die Eselinnen-Milch. Bey **Pleurispen** läßt **Alexander Trallianus** Kuh- oder Ziegenmilch trinken, und setzt hinzu, es gebe weder ein Medikament, noch eine Speise, oder sonst irgend etwas, was solchen Kranken so nützlich und zuträglich sey, als eben die Milch.<sup>24</sup>

Nicht ohne guten Grund schätzten die alten Aerzte die Milch als ein Hülfsmittel bey Vergiftungen, und zwar bedienten sie sich ihrer ziemlich allgemein bey Vergiftungen durch mineralische Stoffe, scharfe Insekten- und Giftpflanzen; so gab man die Milch bey Vergiftung durch Bleiweiß, wo man sie meistens mit Honig vermischt nehmen ließ; gegen die üblen Folgen des genommenen Quecksilbers rühmt sie schon **Plinius** (XVIII. 9.). Bey Vergiftung mit Canthariden und der **Buprestis** wird nicht nur der innerliche Gebrauch der Milch, sondern auch Clystiere von Schafmilch empfohlen. Personen, die mit **Cicuta**, **Ephemerum**, **Doryenium**, **Hyoscyamus** usw. vergiftet worden waren, ließ man ebenfalls reichlich Milch trinken.<sup>25</sup>

Bey Krankheiten des Unterleibes, zumal gegen Durchfälle und Ruhr wurde die Milch sehr oft benutzt. So empfiehlt **Celsus** (lib. 4. cap. 15) Milchclystiere in der Dysenterie, und **Cälius Aurelianus** bey Durchfällen, wo er noch ganz zweckmäßig Stärkemehl mit der Milch vermischen läßt (Chron. IV. 3. p. 308). Bey **Erstzwang** (**Tenesmus**) läßt **Alexander Trallianus** (lib. 8. cap. 6) Milch mit

Honig gemischt in Clystieren beybringen, und bey der Ruhr läßt er auf gleiche Weise Kuhmilch mit Mehl und Oehl gemischt appliciren (lib. VIII. cap. 8), und rühmt überhaupt bey entzündlichem Zustande des Mastdarms als milderndes und schmerzstillendes Mittel, Clystiere von Milch, mit Gerstenschleim und ähnlichen Decocten der Getreidearten. Auch bey Durchflüssen verschiedener Art benutzte **Cälius Aurelianus** eine Verbindung von Milch mit Stärkemehl, oder **Lac. amydatum** (Chron. II. 13. p. 182). Bey Geschwüren im Darmcanale und damit verbundenem blutigen Durchfall empfiehlt derselbe eine unter Zusatz von calcinirten Schnecken- oder Austeruschalen eingedickte Milch (**Diacocone**, *κοχλινες*); erwähnt von diesem Mittel, daß es den Bauchfluß durch Verdickung der Flüssigkeiten hebe, die Geschwüre reinige, die Schäfte der Gänge mildernd und dabey ohne Beschwerde den Körper nähre; aber er verlangt auch, daß die Thiere, von denen man die Milch nimmt, nicht in den Ställen der Städte, sondern auf dem Lande gehalten würden, und namentlich mit abstringirenden Redutern, mit den Blättern der Brombeere, Eichen, Weiden, Epheu, Myrten usw. gestüttert würden. (Chron. IV. 3. p. 308 ff.) **Praxagoras** ließ bey der Ruhr reichlich Milch mit Honigwasser gemischt trinken<sup>26</sup> und einen Brei aus Milch und Mehl zur Speise genießen. **Alexander Trallianus** hält (lib. 8. cap. 7) die Milch bis zu einem Drittel eingedickt und mit Honig gemischt getrunken für das beste aller Mittel, das sich bey galligen Bauchflüssen auffinden lassen könne. Ist der Abgang in Durchfällen scharfer Art, so hält er, die Buttermilch für ein sehr heilsames Mittel, zumal wenn man ein glühendes Eisen in derselben lösche (lib. 8. cap. 9).

Bey Anschwellungen der Milz empfiehlt **Scribonius Largus** die Milch einer bloß mit Epheu genährten Ziege (Composition. medicam. 132) und auch **Plinius** gibt denselben Rath (XXVIII. 9.), allein **Celsus** hält (IV. 9.) in solchen Fällen Milch und auch Käse nicht für passend.

Zur Heilung der Sicht hat man in alten und neuen Zeiten oft genug eine Milchblut angerathen, und **Celsus** versichert (IV. 24.) uns mitleidlich, daß Einige, die sich lediglich mit Eselinnenmilch genährt hätten, vollkommen und für immer von dieser Krankheit befreit worden wären, und auch **Plinius** versichert, daß man **Pobagra** und **Chiragra** bloß durch Eselinnenmilch geheilt habe (XXVIII. 9.).

**Cälius Aurelianus** ließ epileptische Kinder Ziegenmilch trinken (Chron. I. 4. p. 40).

Die Milch ist, wie **Celsus** wohl mit Recht erinnert (V. 11 und 13.), innerlich und äußerlich angewendet ein milderndes und schmeibendes Mittel, das bey Entzündungen aller Art nützlich wird; so empfiehlt er (VI. 6. p. 385) bey Augenentzündungen den Gebrauch der Frauenmilch.<sup>27</sup> Zumal bey sehr heftigen Formen dieses Augenleidens empfiehlt sie **Demosiphenes**.<sup>28</sup> **Plinius** rühmt bey Augentriefen die äußerliche

1556. Lib. 7. cap. 2. Man vergleiche noch besonders Schola Salernitana, sive de conservanda valetudine praecepta medica. Ratisbonae, 1711. p. 209.

23 De Curatione morborum acutorum. Lib. 1. cap. 3. p. 81. Lib. 7. cap. 1 in fine.

24 Bey Calculus empfiehlt **Alexander Trall.** (Lib. 9. cap. 7) Eselinnen- oder Ziegenmilch als Speise und Trant. Ueber den Gebrauch in Augenkrankheiten sehe man noch **Aretaeus** de Cur. morb. diut. Lib. 1. cap. 8. p. 127.

25 **Nicander Alexipharm.** 90. 140. 206. 263. 358. 385. 423. **Scribonius Largus** 179. 181. 184. 189. 191. **Celsus** Lib. 5. 27. p. 313.

26 **Cel. Aurel.** Chron. IV. 6. p. 325 et 326.

27 Die Kennzeichen einer guten Frauenmilch geben mehrere alte Aerzte genau an, z. B. Moschion. cap. 74; **Alex. Trall.** Lib. 1. cap. 15. p. 65.

28 **Oribasius Synops.** Lib. 8. cap. 40. p. 181 b.



Anwendung einer Mischung von Milch und Eiweiß (XXVIII. 7). Zur Heilung der Ohrengeſchwüre ſoll man ebenfalls Frauenmilch benutzen (lib. 20, cap. 5).

Zu erweichenden Eurgelapſſen benutzte Celsus vielſach die Milch (V. 22.) und nicht minder zu Wäſchungen bey geſchwellenen Tonſillen (VI. 10. p. 385).

Die Eſelinnenmilch galt im Alterthume als ein Schönheitsmittel, zumal zur Erlangung einer feinen weichen weißen Haut, und allbekannt iſt in dieſer Hinſicht das Verfahren der Poppäa, Gemahlin des Kaiſers Nero, wovon Plinius ſpecielle Nachricht gibt (lib. 11. cap. 41).

Zu den Beſtandtheilen der Milch gehört die Molke, welche man erhält, wenn die Milch ſo lange ſtehen bleibt, bis ſie von ſelbſt gerinnt oder indem man durch geeignete Zuſätze die Scheidung beſchleunigt: erſtere nannten die Alten Serum lactis, die letztere wurde mit dem Namen Lac schiston bezeichnet; ausführlich beſchreibt Dioſcorides deren Bereitungsart, wovon das Weſentlichſte darin liegt, daß der kochenden Milch, unter beſtändigem Umrühren mit einem friſchen Zweige von einem Feigenbaume, ein Gemüſche aus Eſſig und Honig zugeſetzt wurde.

Man ließ die Molken als ein gelinde eröffnendes Mittel trinken, zumal dann, wenn ſchärfere Purgiermittel ſchädlich geworden wären; nach Dioſcorides ließ man beſonders Melancholiſche und Gallſüchtige Molken trinken, nicht minder bey chroniſchen Hautauſchlägen, zumal bey den verſchiedenen Arten des Ausſages (Lepra und Elephantiaſis). Die Kranken mußten bey dieſer Curart ſich fleißig Bewegung machen. — Nach Celsus (lib. 2. cap. 12. p. 84) läßt man Kuhmilch oder auch Eſelinnen- oder Ziegenmilch unter Zuſatz von Salz kochen, und gibt dann die ſo entſtandene Molke nach Entfernung der Käſetheile als Abführungsmittel. Gegen Elephantiaſis rühmt Celsus Aurelianus (Chron. IV. 1. p. 286) vorzugsweiſe Molken aus Eſelinnenmilch. Man ſehe auch Alex. Trallian. lib. 8. cap. 8.

Die Molken ſind wohl hauptſächlich durch ihren Gehalt an Mälzucker wirksam und werden auch in neueren Zeiten wieder vielſeitig, zumal zu Heilung mehrerer chroniſcher Krankheiten benutzt — ſo zwar, daß in größeren Städten, wie z. B. in Wien, eigene Molkenanſtalten vorhanden ſind; dergleichen findet man auch zu Dobruca, Salzbrunn und andern durch ihre Heilquellen berühmten Orten. In der Schweiz erſtiren deren mehrere, wie zu Unterſtachen, Miringen, auf dem Rigi im Canton Appenzell, auf dem Weißenſtein bey Solothurn uſw. Sonſt iſt noch anzuführen die Molkenanſtalt in dem Franziskanerkloſter auf dem Kreuzberge, dem höchſten des Rhöngebirges in Franken. Noch ganz neuerlich iſt eine ſolche Anſtalt im ehemaligen Kloſter Beuron im Fürſtenthum Hohenzollern-Sigmaringen errichtet worden.<sup>29</sup>

Es ſollen auch öfters künstliche, d. h. ohne friſche Milch bereitete Molken vorkommen; ſie unterſcheiden ſich von den wahren dadurch, daß ſie bey'm Schütteln nicht ſchäumen und bey

Zuſatz von Schwefelſäure nicht den eigenthümlichen Kuhgeruch entwickeln. Auch hat man die Verſchrift bekannt gemacht, wie ſolche künstliche Molke zu bereiten iſt, wobey jedoch der Zuſatz von Salpeter und Weiniſſen eben nicht empfehlenswerth iſt.<sup>30</sup>

Man vergleiche übrigens folgende Schriften:

J. H. Heim, über den mediciniſchen Gebrauch der Molken. St. Gallen, 1824.

Zeller, die Molkencur in Verbindung mit der Mineralbrunnen-Cur. Würzburg, 1826. 74 Seiten und eine Abbildung.

v. Kronsfeld, Salz-, Weißbad und die Molkenkuren im Canton Appenzell. Conſtanz, 1826.

Krottmann, der Weißenſtein, die Milch und Molkenkuren, auch Molkenbäder auf dem Jura bey Solothurn. Solothurn, 1829.

Zu den Producten, welche die Milch liefert, gehören auch noch Butter und Käſe, welche hier ebenfalls nicht übergangen werden dürfen. Die Butter, deren Bereitungsart Jedermann kennt, iſt eine fettartige Subſtanz von milchtem Geſchmack, die, ſo lange ſie friſch iſt, noch Käſe und Waſſer (Buttermilch, Lac ebutyratum) enthält, was durch Auslaſſen entfernt wird. Dieſe ausgeſaſſene Butter beſteht nach Chevreul aus Stearin, Elain und Butyrin in veränderlichen Verhältniſſen, wozu noch gelber Farbestoff bey der Kuhbutter und ein eigener aromatiſch riechender Stoff kommt. Das Butyrin, als der Hauptbeſtandtheil der Butter, liefert bey der Saponification Butterſäure, auch wird es ſelbſt ſehr leicht ſauer. Ausgeſaſſene Butter hält ſich lange unverändert, während die friſche bald ranzig wird und einen eigenen übelen Geruch und Geſchmack annimmt. Ranigſe Butter kann, nach der Angabe eines Franzoſen, durch Behandlung mit kochendem Waſſer wieder gut und brauchbar gemacht werden,<sup>31</sup> was auch der Pharmacente Ludwig Peters in Bonn beſtätigt und das dabey nöthige Verfahren beſchreibt.<sup>32</sup> Um friſche Butter haltbar zu machen ſalzt man ſie auch ein, oder aber was beſſer iſt, man legt ſie in Zuckertheup, der ſie gut conſerviert. Schon 1795 gab Anderson an, die Butter erhalte ſich ſehr gut durch Zuſatz einer Miſchung von einem Theile Zucker und zwey Theilen Salpeter, wovon eine Unze für ein Pfund Butter genommen wird.

Kuhbutter iſt weiß oder nur wenig gelblich, aber ſie wird zum Verkauf gar oft mit gelben Rüben und ſelbſt mit Drlean gefärbt. Ziegenbutter iſt ſehr veſt und ganz weiß; auch die Schafbutter iſt weiß, dabey viel weicher und ſchneller der Verderbniß unterworfen, als Kuhbutter. Stutenbutter iſt flüſſig und ſonſt die ſchlechtere von allen. Eſelinnenbutter iſt ſehr weich, mattweiß und in der Buttermilch aufſchliclich.

<sup>30</sup> Man ſehe Journal des connoissances usuelles Sept. 1835 p. 132. Pharm. Centralbl. 6. Jahrg. S. 909.

<sup>31</sup> Annales de la Société Linnéenne. Mai 1827. Magazin für Pharm. Bd. 22 S. 68.

<sup>32</sup> Magazin für Pharm. Bd. 29 S. 191.

<sup>29</sup> Vorläufige Nachricht davon theilte Heyfelder mit in dem Würtemb. medicin. Correſpondenzblatt Bd. 7 S. 162.

Die Butterbereitung erlernten die Griechen von den Scythen und zwar war es die Pferdebutter, die ihnen zuerst bekannt wurde, wie diß aus den Schriften der Hippokratiker und auch des Herodot erhellet; allein die Griechen mochten die Nachricht von dieser Sache längst kennen, ohne darum eine Anwendung davon zu machen, — deshalb kann die Angabe des Oppianus wohl gegründet seyn, wenn er sagt, daß Aristäus Proconneus, der sich lange bei den Issedonen und anderen hyperboreischen Völkern aufgehalten hatte, die Butterbereitung in Griechenland eingeführt habe, wie denn mehrere frühere Schriftsteller, namentlich Aristoteles, kaum diese Sache genau kannten.

Aus der fettesten Milch wird nach Dioscorides die beste Butter bereitet, namentlich aus Schafmilch, oder auch aus Ziegenmilch, sie ist, wie er sagt, eine erweichende Fettigkeit; daher sie reichlich genommen eröffnend wirkt und gegen tödtliche Gifte anstatt des Oeles angewendet werde, wenn dieses mangle; Butter mit Honig gemischt und damit das Zahnsfleisch eingerieben, erleichtere den Kindern den Ausbruch der Zähne, auch diene es als ein Mittel gegen die Schwämmchen im Munde. In die Haut eingeriebene Butter schütze den Körper vor Ungeziefer. Frische unverborene Butter, fähret er fort, ist nützlich bey Entzündung und Verhärtung des Uterus, nicht minder bey Diarrhöen und Verschwürungen ist sie dienlich in Eysieren. Passend seze man Butter jenen Mitteln zu, welche die Eiterung befördern sollen, namentlich bey Verwundungen der Nerven, der Hirnhäute und des Halsenhalses. Endlich fügt er noch hinzu, frische Butter könne man verschiedenen Speisen statt Oel und dem Kuchen statt Fett bemischen. Auch Strabo erwähnt, die portugiesischen Bergbewohner bedienten sich der Butter statt des Oeles. Uebrigens scheint bey den Griechen und Römern Butter als Speiszzusatz keineswegs gebräuchlich und gewöhnlich gewesen zu seyn, wie denn namentlich Apicius in seinem Werke von der Kochkunst nirgends die Butter erwähnt; um so gebräuchlicher war, wie Plinius sagt, die Butter bey den barbarischen Völkern.

Cornelius Celsus zählt (V. 15) die Butter unter die erweichenden Mittel, er bediente sich ihrer äußerlich mit Rosenpulver vermisch bei Stuhlzwang (IV. 18); bey Ruhren läßt er Eysiere aus geschmolzenem Fett, aus Hirschmark oder auch aus Butter mit Rose aromatisirt verpfehen (IV. 15). Scribonius Largus braucht sie auch als Zusatz zu Pflastern.

Claudius Galenus wundert sich, daß Dioscorides von Schabutter und Ziegenbutter redet, er selbst sah sie nur aus Kuhmilch bereiten, und spricht besonders von ihrer Anwendung in Wädern zu Salben statt Oel usw.<sup>33</sup> Alex. Tralianus empfiehlt bey Colik Eysiere mit Butter nebst aromatischen oder narcotischen Mitteln (lib. 10. cap. 1).

Noch haben wir von dem Käse zu reden, der in diätetischer Hinsicht zumal wohl beachtet zu werden verdient; er besteht aus einer eigenen azothaltigen organischen Substanz, die man Käsestoff nennt, verbunden mit Säuren, zumal mit Essigsäure. Wird die Milch selbst überlassen, so wird sie

sauer: es bilden sich Kohlensäure und Essigsäure, durch welche letztere die Fällung der käsigten Bestandtheile bedingt ist. Im reinen Zustande ist der Käsestoff im Wasser löslich, seine Gerinnung in der Milch liegt daher darin, daß die Essigsäure mit dem Käsestoffe eine unlösliche Verbindung bildet, wodurch dieser als unlöslicher effigsaurer Käsestoff abgeschieden wird. Läßt man den Käsestoff in Gährung und Fäulnis übergehen, so bilden sich eigene Verbindungen, die auf die Eigenschaften dieses Nahrungsmittels sehr großen Einfluß haben: es entsteht nemlich nach Proust Käse-säure,<sup>34</sup> die aber nach Braconnot keine besondere Säure bildet, sondern ein Gemische ist von Essigsäure mit einer durch Gallapfelinctur fällbaren thierischen Materie, etwas Aposepidin, etwas effig- und salzsaures Ammoniak, phosphorsaures Ammoniak, Natron und Spuren eines scharfen gelben Oels. Von dem mit den genannten Säuren verbundenen Ammoniak rührt der eigenthümliche Geruch und pikante Geschmack des alten Käses her. Ein fernerer Bestandtheil des alten Käses ist das Käseoryd, Casein oder auch Aposepidin genannt; es ist im reinen Zustande eine weiße, geschmacklose, leichte, schwammige Materie.

Es gibt sehr viele Käsearten, die zuvörderst in zwey Hauptabtheilungen gebracht werden können, nemlich:

1) Sauer-milch-Käse, der aus der von selbst durch längeres Stehen sauer gewordenen Milch erhalten wird; im frischen Zustande ist diese Substanz als weißer Käse bekannt genug und bedarf keiner Beschreibung. Diesen frischen weißen Käse führt Dioscorides (lib. 2. cap. 79) unter den Arzneimitteln an, und sagt davon, der frische ungesalzene Käse sey als Speise benutz ein gutes dem Magen dienliches Nahrungsmittel, das leicht verdaut werde und den Stuhlgang mäßig unterhalte, doch sey er verschieden und mehr oder weniger zuträglich, je nach der Milch, aus der er bereitet worden. Werde er gekocht, ausgepreßt und dann gebraten, so nehme er einen den Stuhlgang verstopfende Eigenschaft an; er nütze in Form von Entapfismen gebraucht bey Augenentzündungen und Eysilationen. — Auch Apicius gedenkt in seinem Kochbuche des weißen Käses, den er weißen oder auch süßen Käse nennt. Caseus mollis; C. dulcis.

In den Neckar- und Rheingegenden weiß jede Hausfrau, wie man aus weißem Käse die sogenannten Handkäse bereitet, die man auch in Westphalen kennt, und deren Bereitungsart Brandes genau beschrieben hat<sup>35</sup>; sie werden gewöhnlich mit Kümmel gewürzt, und es gehören dahin auch die so berühmten Holländer, zumal Leidner Kümmelkäse, auch Kompen-Käse genannt, denen außer Kümmel auch noch Gewürznelken zugesetzt sind. Sie mußten hier erwähnt werden, da ganz ähnliche Bereitungen schon den Griechen und Römern bekannt waren; namentlich gehört dahin die Käseart, deren Plinius unter dem Namen Oxygala erwähnt, auch Galen gedenkt ihrer (De alimentorum facultatibus III. 17) und bemerkt, daß sie frisch am besten seyen, namentlich die zu Pergamus und in Mysien bereitet würden. Sonst ist Galen eben kein Lobredner des Käses, indem er ausführlich genug den

33 Ausführlich hat Wedemann diesen Gegenstand behandelt in seinen Beiträgen zur Geschichte der Entzündungen, Bd. 3 S. 270 — 295, wo alle darauf bezüglichen Stellen der Alten gesammelt sind.

34 Annales de Chim. et de Physique Oct. 1827 p. 159. — Magazin für Pharm. Bd. 22 S. 59.

35 Archiv für Pharmacie Bd. 23 S. 129 ff.



Nachtheil befehlen für die Gesundheit auseinander ſetzt. *Columella* gibt umſtändlich die Bereitungsart der *Oxygala* an,<sup>36</sup> es ſoll dazu Schafmilch genommen werden, während *Plinius* von Ziegenmilch redet; man würzte dieſe Käſe mit Coriander, Origanum, *Mentha*, mit *Thymian*, *Saturen* und ähnlichen aromatiſchen Kräutern oder Samen.

2) **Süßmilchkäſe.** Sie unterſcheiden ſich von den vorigen dadurch, daß man die Käſetheile der Milch durch ein künſtliches Gerinnungsmittel, unter Verhülfe der Wärme, abfondert; gewöhnlich dient dazu der Labmagen der Kälber. Ein Theil dieſer Subſtanz iſt zureichend 1800 Theile Milch bey 40° R. zum Gerinnen zu bringen. Die neueſte Vorſchrift zur Bereitung eines einfachen und guten Lab iſt die nachſtehende: — Man nimmt die Labmägen junger Kälber, die noch keine andere Nahrung, als die Muttermilch geſſen, wäſcht ſie forgfältig in reinem Waſſer aus und bewahrt ſie gut eingefalzen zwey Monate lang auf. Nach dieſer Zeit hängt man ſie, mit Salz umgeben, in einem Saute aus grober Leinwand, nicht zu nahe am Feuer in den Schornſtein, um ſie 10 Monate lang daſelbſt zu laſſen. Im Frühlinge ſammelt man ſich dann Schließblumen, deren Blumenkronen man aus ihren Kelchen zupft und welche man eine Viertelſtunde lang unter Zuſatz von 1 Pfund Kochſalz und 1 Unze Maun auf 12 Pinten Waſſer mit einer hinlänglichen Menge Waſſer kocht. Wenn der Abſud über Nacht geſtanden hat, ſo ſieht man ihn von den Blumen ab, und gibt daſür in 2 Pinten beſſeren 2 Labmägen, die man 4 Tage lang damit abſtreifen läßt. Die Flüſſigkeit wird, nachdem man ihr 2 — 3 Gewürznelken und eben ſo viel von irgend einem andern Gewürz für jede Flaſche zugeſetzt hat, in Bouquetillen gefüllt und gut verkorkt, wo ſie dann ein Jahr lang und ſelbſt darüber aufbewahrt werden kann. Zwey ſtarke Löſſel dieſer Flüſſigkeit reichen hin, um ein Faß Milch zum Gerinnen zu bringen. Die Labmägen können, nachdem ſie getrocknet worden, und dann abermals 14 Tage lang eingefalzen geſehen ſind, noch einmal auf dieſelbe Weiſe benutzt werden. Wäre dieſes Lab nicht ſtark genug, ſo braucht man ihm nur einen halben oder den vierten Theil eines jungen Schweinsmagens, der nach Art der Kälbermägen zubereitet worden iſt, zuzufügen.<sup>37</sup>

Man ſchreibt auch einigen Pflanzen die Eigenschaft zu, den Käſeſtoff der Milch abzufondern, obgleich eine freye Säure in ihnen kaum nachgewieſen worden iſt, namentlich den Labkräutern, inbeſondere dem *Galium verum L.*, deſſen Blüten, wie man ſagt, bey der Bereitung dieſe ſo berühmten Cheſterkäſes verwendet worden;<sup>38</sup> andere ſchreiben die gelbe Farbe dieſes Käſes einem Zuſaße von Safran oder Orlean zu. Nach dem Berichte des *Mathiolus* ſcheidet man in Toſkana die Milch zur Käſebereitung mit den Blumen der *Artichode* (*Cynara scolymus*), und etwas ähnliches beobachtete Herr *Préf. Linné* in Portugal, wo man Blumen der *Cynara silvestris Lamarek* dazu verwendet.<sup>39</sup> Die Blumen des *Saffors* (*Car-*

*thamus tinctorius L.*) beſitzen dieſelbe Eigenschaft, und ſie findet ſich wahrſcheinlich noch in mehreren andern Gewächſen aus der Gruppe der *Cynarocephaleen*.

Ruhmilchkäſe ſind im Ganzen die beliebteſten und verbreiteſten, in unſern Tagen wie im Alterthume; ſie ſind grobentheils ſehr nährend, aber nicht immer gleich leicht verdaulich; ſchwerer zu vertragen ſind die feſteſten Sorten, welche man aus friſcher Milch bereitet und ihnen noch ſüßen Rahm zuſetzt, wie der Rahmkäſe, Münſterkäſe, der Goyenſer vom Canton Freyburg in der Schweiz, und andere. Weniger fett ſind ſie, wenn jener Rahmzuſatz unterbleibt, wie bey dem Schweizer Emmenthaler, dem Cheſterkäſe, den hollſteinſchen und holländiſchen Käſen, inbeſondere der Edamer, wovon es roth- und weißtruſtige gibt, die vorzüglichſte Sorte iſt die ſogenannte Präſentkäſe. Am leichteſten verdaulich ſind die mageren Käſe, welche man aus abgerahmter Milch bereitet, wie der Käſe von Gypere und der aus der Milch der Büffelmilch verfertigte *Margatino*. Zu den fetten Sorten gehört der Parmeſankäſe, der zum Theil auch aus Büffelmilch bereitet wird.<sup>40</sup>

Die bithyniſchen oder ſalonitiſchen Käſe waren im Alterthume ſehr berühmt. *Apicius* und *Plinius* rühmen inbeſondere den veſtiniſchen Käſe. Leſterer ſcheint ein großer Freund der Käſearten geweſen zu ſeyn, indem er deren mehrere anführt, und bemerkt, daß *Zoroaſter* zwanzig Jahre lang von Käſe gelebt und ſich dabey wohl befunden habe. Weit weniger günſtig urtheilt *Celſus* von ihm, zumal von altem Käſe, welcher ſchwer verdaulich, Blähungen erregend und zumal Milzkrankheiten nachtheilig ſey. Nach *Tiedemann* iſt der alte oder fermentierte Käſe, in geringer Menge geſſen, als eine Würze zu betrachten, welche die Speicheldrüſen und den Magen zu reichlicher Abſonderung reizt. In großer Menge verzehet bewirkt er Menſchen mit ſchwachen Verdauungsorganen und ſolchen, die eine ſitzende Lebensart führen, Störungen in der Verdauung, Magenbrüchen, Uebelkeit, ſaures Aufſtießen und Gas-Entwicklung.<sup>41</sup>

Nach Herrn *Kobinet* iſt der Gebrauch des Käſes, d. h. beſſenigen, welcher entſchieden alkaliſche Eigenſchaften beſitzt, ganz oder beynahe dem Gebrauche der Alkalien von kohlſaurem Natron gleich zu ſehen, wenn es darauf ankömmt, durch Sättigung der Säure im Magen die Verdauung zu erleichtern.<sup>42</sup> Solche alkaliſche Käſe dürften vorzugsweiſe zum Nachtriſſe zu empfehlen ſeyn.

Geht der Käſe in Verderbniß über, was bey den Sorten aus Sauermilch, leichter als bey den Süßmilchkäſen zu geſchehen ſcheint, ſo veranlaſſen ſie öfters Symptome von Vergiftung und gefährliche Zufälle verſchiedener Art; wie dieſe auch in neuen Zeiten öfters beobachtet worden iſt.<sup>43</sup> Welcher Stoff aber in den giftig

36 De re rustica XII. 8.

37 Dingler, polytechniſches Journal, Bd. 64 Heft 1 S. 80.

38 Koſtietzky, medicin. Flora, Bd. 2 S. 542.

39 Bemerkungen auf einer Reiſe durch Frankreich, Spanien und vorzüglich Portugal, Bd. 2 S. 220.

39a 1938. Heft 2.

40 Virey, histoire naturelle des medicamens, alimens etc. p. 112.

41 Physiologie des Menſchen Bd. 3 S. 123.

42 Von dem Käſe und den Paſtillen aus kohlſaurem Natron von Kobinet, mitgetheilt von Dpport. Duſeland's Journal Juni 1827 S. 127 — 129.

43 Man vergleiche Peter Frank's System einer vollſtändigen medicin. Polizei Bd. 3 S. 136 ff. — Verſuche und Beo-

wirkenden Käsen sich gebildet habe, und dem die gefährlichen Eigenschaften zugeschrieben werden könne, darüber ist man noch völlig im Dunkeln, denn Brandes fand bey genauer chemischer Untersuchung ganz guter und unschädlicher Handkäse keine wesentliche chemische Verschiedenheit von solchen, die giftartig wirkten, und diese Sache erheischt darum noch eine fernere und sorgfältige Prüfung.<sup>44</sup>

Schaffkäse sind zwar im Allgemeinen leichter verdaulich als Kuhkäse, aber zugleich auch weniger nahrhaft.<sup>45</sup> Schon Plinius erwähnt die Schaffkäse, die damals besonders aus Ligurien nach Rom kamen; jetzt sind die sardinischen am geschätztesten, wie die von Saffai, Ischia ufw., sie werden zum Theil im Rauche getrocknet, und auch diesen Umstand merkt Plinius schon an. Die geschätztesten Schaffkäse Frankreichs sind die von Rochefort und Prie; in Deutschland ist der Limburger Käse der bekannteste der Art und auch zugleich am weitesten verbreitet, von seiner Form wird er auch da und dort Backsteinkäse genannt.

Ziegenkäse erwähnt gleichfalls schon Plinius, und zwar schätzte er die in Rom selbst bereiteten und gedürrten am meisten; die französischen schmeckten zu stark und arzenmäßig; sonst rühmt er noch jenen aus Bithonien. Tournefort fand den Ziegenkäse der Insel Milo besonders wohlschmeckend.<sup>46</sup> Der in Frankreich so beliebte fromage du mont d'or ist Ziegenkäse; in Deutschland ist der, welchen die Zyruler bereiten, am bekanntesten. Seines eignen und dabey sehr scharfen Geschmacks wegen behagt er nicht Jedermann.

Pferdekäse darf hier nicht übergangen werden, da Dioscorides ihn (II. 80) unter dem Namen Hippae anführt; er soll unangenehm riechen, aber sehr gut nähren und sonst mit dem Kuhkäse übereinstimmen.

Zieger- oder Schottenkäse werden im Canton Glarus und Graubünden aus Milken bereitet, die auch Siete oder Schotte heißen und nach der Ausscheidung des Käses übrig bleiben, und zwar durch Zusatz von Milken-Essig. Man kennt diese Käseforte unter dem Namen Schabziger- oder Kräuterkäse, sie hat einen eignen Geruch und Geschmack, der von dem Zusatz des Pulvers des blauen Steintalks abhängt. Peter Frank ist diesem Producte nicht hold, er sagt: diese Kräuterkäse verdienen, da sie wegen der vielerlei hitzigen Kräuter mehr einem Apothekerproducte als einem Nahrungsmittel gleichen, gänzlich verbannt zu werden.

Den arabischen Aerzten, namentlich dem Avicenna, war der aus Milken bereitete Käse gar wohl bekannt (lib. 2. Canon. tract. c. 127), nur setzte man damals keine Kräuter zu, wie heutzutage. Die Italiener nennen den Zieger Ricotta, und

Natholiou hat in seinen bekannten Commentarien einiges darüber mitgetheilt.

Die Lösung des unreinen Käsestoffs in Kali, welche sich trocken lange unverändert erhält, schlägt Braconnot zu mehreren technischen und öconomischen Anwendungen vor, namentlich als vorzügliches Nahrungsmittel auf Reisen zur See, mit Zucker und Citronenscalen versetzt, besonders für Genselnde, zur Darstellung künstlicher Milch, welche man durch Zusatz von Butter und Zuckerwasser erhält; auch theilt derselbe ein Verfahren mit, die Milch auf ein kleines Volumen zu bringen und sie haltbarer und angenehmer zu machen. Man versetzt etwa 5 Pfd. bis auf 38° R. erwärmte Milch unter beständigem Umrühren mit verdünnter Salzsäure, fündert die Molken ab, vermischt das Coagulum mit ungefähr 5 Grammen crystallisirtem gepulvertem kohlensauren Natron und löst es in gelinder Wärme auf, was sehr rasch geschieht. Diese Flüssigkeit besigt fast den nämlichen Geschmack wie frische Milch, und gibt etwa ein Pfund von einer Art Sahne, oder der vielmehr vortreflichen Franchipane, die zu einer Menge köstlicher, verschiedenartiger Speisen benutzt werden kann. Vermischt man sie mit eben so viel Wasser, als Molken davon getrennt worden sind, und setzt etwas Zucker zu, so bekommt man eine der Milch im Ansehen ganz gleiche Flüssigkeit, die noch weit angenehmer schmeckt; versetzt man diese mit eben so viel Zucker, so erhält man einen vortreflichen Milchsyrup, der sich sehr gut hält; mit Wasser verdünnt, gibt es eine weiße Flüssigkeit wie gezuckerte Milch, aber von weit angenehmem Geschmack. Braconnot schlägt diese Milchconserve anstatt des Milchpulvers Kranken und Genselnden vor; durch vorsichtiges Verdampfen, zuletzt an der Luft in dünnen Scheiben, erhält man eine trockne zerreibliche Masse, welche sich ein Jahr lang unverändert erhält.<sup>47</sup>

## Zweytes Capitel.

Fett, Talg, Mark, Magenfat, Blut und einige andere von Säugethieren entnommene Stoffe.

Braconnot und Chevreul haben gezeigt, daß jeder fette Körper wesentlich aus Del und Talg zusammengesetzt ist, so zwar, daß, je mehr Talg (Stearin) in einem fetten Körper enthalten, desto fester und wachstüchtiger seine Consistenz bey gewöhnlicher Temperatur ist: gerade das Gegentheil wird Statt finden, je größer der Gehalt an reinem Oele (Elain) zu dem Talge sich vorfindet. Ueberdem enthalten die fetten Körper noch einige Nebestandtheile, von welchen gewöhnlich ihre Farbe, Geruch und Geschmack abhängt.

Die alten Aerzte glaubten, daß das Fett eines jeden Thieres seine eigenthümliche Heilkraft besitze, weshalb sie denn auch in der Auswahl dieser Stoffe genau und sorgfältig waren. Es erhielt sich diese Ansicht bis auf die letzten Jahrhunderte

bachtungen über die Keesäure, das Wurst- und das Käsegift. Aus dem Englischen von Dr. Carl Kühn und Otto Kühn. Leipzig, 1824. S. 133 ff.

44 Archiv für Pharm. Bd. 29 S. 85.

45 Willeberg Pharmacologie und Pomatologie für Kranke. Berlin, 1831. S. 27.

46 Reise in die Levante Bd. 1. S. 242.

47 Annales de Chimie et de Physique Tom. 43. p. 337. — Magazin für Pharm. Bd. 32 S. 384. — Man vergleiche über diesen Gegenstand Heidelberger klinische Annalen Bd. 9 S. 286. — Neue Entdeckungen in der Materia medica 2. Aufl. S. 343.

berah, und die Zahl der von den römischen und griechischen Aerzten benutzten Fettarten wurden, zumal im Mittelalter, noch bedeutend vermehrt. In den jüngsten Zeiten ist dagegen die Ansicht ziemlich allgemein verbreitet, es sey ziemlich gleichgültig, von welchem Thiere man das Fett zum medicinischen, zumal zum äußern Gebrauche verwende, weshalb man denn auch jetzt in den Officinen nur das Fett der Hausthiere, zumal das Schweinefett antrifft, offenbar aus keinem andern Grunde, als weil es eben am leichtesten zu haben ist. Allein es ist denn doch zu bedenken, daß die Fette nicht nur in Hinsicht des Verhältnisses an Stearin und Elain abändern, worauf besonders ihre Consistenz beruht; sondern das Daseyn jener oben berührten Nebenbestandtheile dürfte selbst in therapeutischer Hinsicht nichts weniger als gleichgültig seyn. Schon das Fett junger Thiere weicht von dem der älteren bedeutend ab, bey jenen ist es reichlicher vorhanden und von weißerer Farbe, bey diesen dagegen kommt es sparsamer vor und ist mehr oder weniger gelblich. Bey wiedererkennenden und nagenen Thieren ist das Fett weiß, geruchlos, von mehr oder weniger süßem Geschmack; bey Fleischfressenden dagegen ist es weich und von starkem widerlichen Geruche; das Fett des Crocodils riecht biesamartig; das der Fische und Cetaceen ist flüchtig usw.<sup>48</sup> Mit diesen Bemerkungen ist jedoch keineswegs der Wunsch verknüpft, daß man die Sitte vergangener Jahrhunderte wieder einführen und in den Officinen eine ganze Reihe von Fetten verschiedener Thiere vorräthig halten möge; denn wenn schon die baldige Verderbnis dieser Stoffe davon auf das bestimmteste abzurathen muß, so steht zugleich zu erwarten, daß die Apotheker ihre wohl bekannte Sitte wieder einführen, und sämtliche Fettarten aus einem und ebendenselben Topfe dispensiren würden.

Die vorzüglichsten Fettarten von Säugethieren, deren sich die alten Aerzte bedienten, möchten die nachstehenden seyn, welche man in drey Sectionen theilen kann, nemlich:

- a) Von Hausthiere: wie das Schwein, der Ochse, die Ziege, das Schaf, der Esel, die Kaze.
- b) Von wilden europäischen Thieren: wie der Hase, Fuchs, Bär, Hirsch, Wolf.
- c) Von exotischen Thieren: wie der Löwe, Panther, Elephant.

Das Fett des Schweines<sup>49</sup> (*Sus Scrofa*) ist heutzutage zu Selten und dergleichen das gewöhnlichste, und scheint auch von den alten Aerzten oft genug nicht bloß äußerlich, sondern auch innerlich benutzt worden zu seyn; man benutzte es theils frisch und rein, theils eingesalzen; und es ist auffallend, daß man ihm um so mehr Heilkräfte zutraute, je älter es geworden war. Bey chronischem Husten empfiehlt *Plinius*, es mit Wein zu kochen und mit Honig gemischt zu nehmen. In der Schwindsucht empfiehlt er altes ungesalzene Schweinefett in Pillen; er führt diese Sache mehrmals an und

scheint darum einiges Gewicht darauf zu legen. — Dieser Fettgebrauch in der Schwindsucht kommt übrigens auch in späteren Zeiten wieder öfter vor, so rühmte *Lentilius* das Fett von Hunden, *Lange* das von Pferden. Nach *Tasse* lassen die westphälisch-ravensbergischen Bauern die Schwindluchtigen einige Zeit hindurch bloß mit Roggenbren, zu dem das Fett eines besonders dazu gemästeten Hundes gekostet worden ist, sich ernähren, und bewirken damit auffallende Heilungen.<sup>50</sup>

In den jüngsten Zeiten hat die Methode des Doctor *Edgar Aise Spilsbury*, Lungenluchtige mit Fetteinreibungen zu behandeln, vieles Aufsehen gemacht; woran sich die Methode des *Dr. Walters* schließt, der Pomade einreiben läßt, was ja auch Schweinefett ist.<sup>51</sup> Dieser äußere Gebrauch dürfte um so eher vorziehbar seyn, da gewiß kein Schwindluchtiger reines Fett innerlich genommen nicht vertragen werden; höchst interessant ist übrigens eine Aeußerung des *Plinius*, die bisher wenig beachtet worden zu seyn scheint. Er sagt nemlich, das Schweinefett habe eine so große Kraft, daß wenn man es in die Kniekehle einreibe, so fühle man den Geschmack dermaßen im Munde, daß man Fett auszuspeien glaube (*redeat in os sapor, eamque [adipem] expuere videantur*).

Gar häufig wurde das Schweinefett äußerlich angewendet, und besonders ist *Plinius* sehr reich an Vorschriften und Zubereitungen zum Gebrauche desselben. *Dioscorides* rühmt es besonders bei Verbrennungen. Mit Wein gewaschen soll es in der Pleuritis dienlich seyn. Bey Geschwüren der weiblichen Geschlechtstheile braucht es *Celsus*, vieler andern Angaben nicht zu gedenken.

Sehr ausführlich geben *Dioscorides* (II. 77) und *Plinius* die Art und Weise an, wie das Schweinefett gereinigt und zum medicinischen Gebrauche aufbewahrt werden soll; auch wußte der letztere vollkommen gut, wie ranzig gewordenen Fett von seinem übeln Geschmacke und Geruch befreit und wieder brauchbar gemacht werden kann. Als im May 1827 ein Franzose bekannt machte, daß ranziges Fett durch Behandlung mit heißem Wasser wieder hergestellt und brauchbar gemacht werden könne, bemerkte der verstorbene Professor *Geiger* in seinem Magazine für Pharmacie: „Es wäre auch für den Pharmaceuten von Wichtigkeit, wenn sich dieses einfache und unschuldige Mittel bewährte, und setzte hinzu: es würde ihm annehmlich seyn, darüber mehrere Erfahrungen für seine Zeitschrift mitgetheilt zu erhalten“, und doch ist diese Sache uralt: *Plinius* läßt das Fett zuerst schmelzen, dann mit kaltem Wasser öfters auswachen, dazu dann guten Wein setzen, und es endlich so oft und so lange kochen, bis es ganz rein geworden ist.<sup>52</sup>

48 Man vergleiche C. H. E. Allmer Disquisitio anatomica de pinguedine animal. Jenae, 1823. 4.

49 Adeps suilla ist wohl sprachrichtiger, als das gewöhnliche *Axungia porci*, was doch eigentlich = Wagenschmiere bedeutet. — Antiqui maximo aribus vehiculorum perungendis, ad faciliorem circumactum rotarum utebantur, unde nomen, sagt *Plinius*.

50 Archiv für med. Erfahr. Berlin, 1824. Juli und August. VIII. 1. — Man sehe auch Hertholt über die Lungen-schwindsucht. 1813.

51 Neue Entdeckungen in der Mater. medica. 2. Aufl. S. 621.

52 Si vero vetus roveatur ad curam, liquefieri prius jubent, mox frigida aqua lavari saepius, dein liquefacto affuso vino quam odoratissimo. Eodemque modo iterum ac saepius coquunt, donec vinum evauescat. Daß hier der Wein gespart werden kann und nur das Auswaschen mit Wasser die Hauptsache ist, braucht kaum erinert zu werden.

Der Ansicht des **Galen** zufolge sind Fette eher als Gewürze und Zusätze zu Speisen, denn als Nahrungsmittel anzuführen; dadurch daß sie den Magen erschaffen, schwächen sie überhaupt, machen Ekel und verderben den Appetit (*De alimentorum facult. cap. 27*). Ueberhaupt glaubte man im Alterthum, das Fett vermehre die Gallenabsonderung und muß darum besonders von cholerischen Personen gemieden werden. — Alle thierische Fette, sagt **Tiedemann**, machen, den Speisen in großer Menge zugesetzt, diese schwer verdaulich, verursachen Magenbrüchen, Uebelkeit, saures Aufstossen und Gas-Entwicklung. Sind sie ranzig, so können sie Erbrechen und Durchfälle und selbst Erscheinungen von Vergiftung bewirken.

Bey Vergiftungen mit Canthariden und andern scharfen Substanzen ließen die alten Aerzte so lange eine fetts Brühe nehmen, bis Erbrechen folgte.<sup>53</sup> Gegen Starckrampf empfiehlt **Celsus** (*lib. IV. cap. 3*) Einreibungen von ganz altem Fett.

Fett und Talg des Ochsen (*Bos taurus*). Nach **Dioscorides** wird zum medicinischen Gebrauche vorzugsweise Nierenfett gewählt; auch unterscheidet er genau zwischen dem Fett oder Talg des Rindes (*sebum bubulum*) und des Stieres (*sebum taurinum*), letzteres wird mit Flußwasser abgewaschen, die häutigen Theile entfernt und in einem neuen Topfe mit etwas zugesetztem Salze geschmolzen, worauf man das flüssige Fett in reines Wasser abseiht. Wenn es anfängt zu geseihen, soll man es stark mit den Händen kneten, und immer und so lang das unreine Wasser abgießen und frisches zusetzen, bis es ganz vollkommen rein ist. Dann kocht man es in einem Topfe mit dem gleichen Gewichte guten Weines (*vinum odoratum*); nachdem es mehrmals aufgewallt hat, nimmt man das Geschirr vom Feuer und läßt den Talg über Nacht stehen. Sollte am andern Tage noch etwas übelstehendes bemerkt werden, so wird das nämliche Verfahren in einem neuen Topfe wiederholt, und zwar so lange, bis es ganz geruchlos ist. Zu manchen Zwecken wird es auch ohne Salz geschmolzen; aber das auf solche Art zubereitete wird nicht so weiß. Auf gleiche Weise kann auch das Fett des Panthers, des Löwen, des Ebers, des Kameels, des Pferdes und anderer Thiere präparirt werden.

Rindertalg wird auf nachstehende Weise zubereitet, man entfernt die häutigen Theile und wäscht es mit reinem Meerwasser aus und knetet es fleißig in einem Möser unter öfterem Zusatz von Seewasser. Ist dieses gehörig geschehen, so kocht man es in einem neuen Topfe mit Seewasser, das wenigstens spannenhoch über dem Talg stehen muß, so lange, bis es den eignen Geruch verloren hat, sodann setzt man jeder attischen Mina des Talges vier Drachmen beturisches Wachs zu. Man seigt es nun durch, läßt den auf den Boden sitzenden unreinen Theil weg und bringt es in eine neue Schüssel, in der man den Talg täglich der Sonne aussetzt, bis aller übler Geruch entfernt und es schön weiß geworden ist.

Die Composition und Vereitungsart einer Majoran-salbe, zu der vorzugsweise Rindertalg genommen wurde, beschreibt **Dioscorides** ausführlich und zwar, wie es scheint, nur in der Absicht, um zu zeigen, wie der liebliche Geruch des Majorans dem Fette mitgetheilt werden könne.

Noch bedienten sich die alten Aerzte öfters des Rindertalgs, den auch **Celsus** erwähnt, und des Ochsenmarkes; diesem schreiben sie, wie allen Markarten, eine erweichende Kraft zu, während sie von den genannten Talgarten glaubten, daß sie eine verdichtende Eigenschaft besäßen und den Stuhlgang verstopfen.

Das Fett und der Talg des Hammels (*Ovis aries*) wird ebenfalls von den Aerzten oft angeführt, und auf gleiche Weise wie der Rindertalg zubereitet.

Häufig diente auch die von den Ausbünstungen des Thieres beschmutzte und fettige Wolle,<sup>54</sup> *Lana succida* genannt; man nahm sie von weiblichen Thieren und schnitt sie am Halse ab. Diese Wolle in Essig, Del oder Wein eingetaucht, diente häufig zum Belegen frischer Wunden, bey Contusionen, Fracturen und andern äußern Verletzungen. Auch bey Neuralgien verschiedener Körperteile pflegte man dergleichen besudelte Wolle als ein schmerzlinderndes Mittel aufzulegen. In Frankreich ist noch heutzutage die *Lana succida* ein beliebtes Mittel, um an kranken Theilen die Transpiration zu unterhalten und Verhärtungen zu zertheilen; namentlich belegt man damit scrophulöse Geschwülste, geschwollene Weiberbrüste ufw. Fast in allen diesen Fällen ist bey uns die Baumwolle an die Stelle jener beschmutzten Schafwolle der alten Aerzte getreten, wovon manche Beispiele aus der jüngsten Zeit angeführt werden könnten.<sup>55</sup>

**Plinius** hat der medicinischen Anwendung der *Lana succida* einen eigenen Abschnitt gewidmet (*lib. 29. cap. 2*), der hier seiner Länge wegen nicht mitgetheilt werden kann. Bey Leidenweh läßt er die Wolle in ein Gemische von Natron, Schwefel, Del, Essig und Pech eintauchen und so warm als es ertragen werden kann, zweymal des Tages auflegen. Man zog die *Lana succida* aus Attica, Melesia ufw. vor, wie die Franzosen die aus der Normandie.

Die aus jener Wolle sorgfältig ausgezogene Fettigkeit hieß *Oesypum*, und **Dioscorides** gibt sehr umständlich das verschiedene Verfahren an, wie man haben zu Werke gehen muß. Die spanische Pharmacopoe hat dieses Mittel noch beygehalten, nach ihrer Angabe wird es folgendermaßen dargestellt: Man kocht die unreine Wolle in einer zureichenden Menge Wasser so lange, bis die Flüssigkeit sich verdickt und fast breiartig wird; man seigt sie nun durch ein Haarsieb und raucht sie unter beständigem Umrühren mit einem hölzernen Spatel bis zur Consistenz eines weichen Extractes ab, das man zum Gebrauche aufbewahrt. Diese Materie war ein im Alterthum äußerst beliebtes Mittel zur Heilung der Geschwüre, insbesondere am After und den Geschlechtsstheilen, wo man es noch mit Melliste und Butter zu vernichten pflegte, oder auch etwas Gänsefett zusetzte. Nicht minder benutzte man es bey verschiedenen Krankheiten der Augenlider ufw.

<sup>54</sup> Man vergleiche **C. P. Schmidt** *Dissertatio de panui asperi lanae usu medico et chirurgico*, praeside Delio. Erlangae, 1786. 4.

<sup>55</sup> Man vergleiche auch den interessanten Aufsatz in *Ruß's Magazin* Bd. 23. Heft 2. S. 351. In den Hippokratistischen Schriften ist davon oft die Rede, wie ich andernorts gezeigt habe.

Noch biente, nach dem Berichte des **Herodot**, die *Lana succida* als Brenn-Mittel gleich der Moxa; wenn, sagt er, die Kinder der Libyer vier Jahre alt geworden sind, so brennen sie die Aern des Scheitels mit fetter Schafwolle, andere brennen auf gleiche Weise die Venen der Schläfe, und zwar in der Absicht, um auf solche Art allen rheumatischen und catarrhatischen Beschwerden für immer vorzubeugen, und sich so eine langdauernde Gesundheit zu sichern.<sup>56</sup> Es ist nach dem Gesagten die gewöhnliche Annahme, daß den Griechen die Moxa unbekannt gewesen sey, und die Europäer sie erst durch die Japaner kennen gelernt hätten, kaum als richtig zu betrachten.

Der Talg des Boockes und der Ziege (*Capra Hircus*) ist weisser als das der Schafe, hat aber einen unangenehmen Beygeruch. **Dioscorides** schreibt auch diesem Talge eine stopfende Eigenschaft zu, und er verordnet ihn daher innerlich bey Durchfällen mit Pulenta, mit Käse und selbst mit Sumach, bisweilen auch in Verbindung mit Gerstenscheim oder Pfisane. Die fette Ziegentalg-Brühe ließ man Schweinschäpfe trinken, und verordnete solche als ein Gegenmittel bey Vergiftung mit Canthariden. Wockstalg äußerlich angewendet hielt man für ein kräftig zertheilendes Mittel und wendete ihn daher als Umschlag mit Safran und andern Dingen verbunden bey pobagrighen Leiden an.

Sonst wurde auch bisweilen das Mark der Ziegen wie der Schafe von den Ärzten in Gebrauch gezogen.

Das Fett des Esels (*Equus Asinus*) rühmt **Dioscorides** als ein Mittel, um, äußerlich angewendet, die durch ihre Farbe ausgezeichneten Narbenstellen mit der übrigen Haut gleichfarbig zu machen.

Das Fett der Hauskatze (*Felis catus domesticus*) kommt in den Schriften des **Dioscorides** nicht vor, wohl aber erwähnt es **Celsus**, ohne ihm besondere Eigenschaften zuzuschreiben. Auch das Fett des Hundes haben die alten Ärzte kaum angewendet, obgleich junge Hunde nach dem Zeugnisse des **Plinius** als ein Leckerbissen gespeist wurden.

Von wilden europäischen Thieren benutzte man vorzugsweise:<sup>57</sup>

Den Talg des Hirschhies (*Cervus Elaphus*), der im Alterthume sehr beliebt war, und noch bis auf diesen Tag wenigstens vom Wolfe als Heilmittel geschätzt ist. Sorgfältig gibt **Dioscorides** an (II. 88), wie der Hirschtalg und die ihm an Consistenz ähnlichen des Schafes und Boockes zubereitet und gereinigt werden sollen.

Auch das Mark wurde benutzt, und von allen Markarten für das beste gehalten; es folgen dann der Reihe nach das des Kalbes, des Stieres, der Ziege und des Schafes. Alle Marksorten sollen nur im Spätsommer eingesammelt werden, sie wurden besonders zur Heilung der Geschwüre verwendet.

Verschiedene Talgarten, vorzugsweise aber das des Hirschhies, sowie dessen Mark pfligten die Alten zu aromatischen Salben zu verwenden; wozu verschiedene wohlriechende Substanzen dienten, wie *Schoenus arabicus*, *Cassia*; *Calamus*, *Aspalathus*, *Xylobalsamum*, *Cinnamomum*, *Cardamomum*, *Nardus* und manche andere gewürzhafte Kräuter und Drogenen.

Das Fett des Bären (*Ursus arctos*) wurde von den griechischen und römischen Ärzten besonders geschätzt; man hielt es für ein Mittel gegen das Ausfallen der Haare und benutzte es auch bey Frostbeulen. Auch in neueren Zeiten hat das Bärenfett seine Lobredner gefunden. Nach Herrn **Blainville** (*Cours de Physiologie generale* I. 73) ist das Fett dieses Thieres, sowie der Winterschläfer überhaupt, von besonderer Feinheit und merklicher Flüchtigkeit (*sensiblement volatile*); es enthält reichlich, und bey weitem mehr als bey andern Thieren, ein stark riechendes Princip; seiner Feinheit wegen wird es sehr leicht absorbiert; auch liefert das Bärenfett, wie das des Dachses, viel bessere Linimente als das dazu gewöhnlich benutzte Schweinefett. Auch **Ritter** bemühte sich, die Vorzüge des Bärenfettes auseinander zu setzen.<sup>58</sup> **G. W. Jahn** rühmt unter den Fetten, um das Wachsthum der Haare zu befördern, sie geschmeidig und glänzend zu machen, besonders das Bärenfett.<sup>59</sup>

Das Fett des Wolfes (*Canis lupus*) wird von **Dioscorides** nicht aufgeführt; allein **Nassarius** soll es nach dem Zeugnisse des **Plinius** von allen Fettarten zum medicinischen Gebrauche für das beste erklärt haben; auch benutzte man es zu Augen salben, bey Krankheiten der weiblichen Genitalien usw.

Das Fett des Fuchses (*Canis vulpes*) rühmt **Dioscorides** besonders gegen Ohrenschmerz; kommt auch in den Schriften des **Aetnarius** vor. Nach dem Zeugnisse des **Galen** (*de aliment. facult. lib. III. cap. 2*) aßen die griechischen Jäger im Herbst gern die Füchse, zu welcher Jahreszeit diese Thiere sich mit Trauben mästten.

Von den Fetten ausländischer Säugethiere ist nicht viel zu sagen, sie mochten wohl zu allen Zeiten, auch in Griechenland und Rom selten und kostbar gewesen seyn. Uebrigens erwähnt **Dioscorides** das Fett des Elephanten (*Elaphus maximus*), des Löwen (*Felis Leo*) und des Panthers (*Felis Panthera*). In den Schriften des **Aretäus** und **Celsus** kommen die beyden letzteren ebenfalls vor.

#### Magenfett der Säugethiere. (Coagulum. Succus gastricus.)

Diese albuminöse Flüssigkeit wurde vielfach im Alterthume angewendet, und lauch in neuen Zeiten mehrfach theils zum innern, theils zum äußern Gebrauche verordnet, wie von **Jurine**, **Carminati**, **Schäfer**, **Brera**, **Anebel** und Andern; indessen scheint das Mittel keineswegs den von ihm gehegten Erwartungen entsprochen zu haben, und so ist es nun fast wieder in Vergessenheit gerathen.

56 Herodot IV. 187. p. 284.

57 Das in späteren Zeiten so oft angewendete Fett des Dachses und des Hasen benutzten die ältesten Ärzte kaum.

Flis 1838. Heft 2.

58 Gräfe und v. Walther Journal Bd. 4. St. 1. S. 115.

59 Der Doctozzt Bd. 1. Cap. 7.

**Dioscorides** rühmt (lib. II. cap. 2) vor allem den Magenfaß des Hasen, den man zu 3 *Oboli* schwer mit Wein gegen die Folgen des Bisses giftiger Thiere, bey der Ruhr und dem *Auxus colicacus*, sowie bey dem weißen Fluße reichen soll; nicht minder bey Bluthusten. In ähnlichen Fällen empfehlen ihn noch viele andere alte Aerzte, so namentlich **Aretäus** beym Blutpeien, doch mit dem auffallenden Besatze, der Arzt möge sich hüten, ja nicht zu viel zu reichen, indem dieß schon tödtliche Folgen gehabt habe (lib. 2. cap. 2. p. 55). — **Moschion** rühmt (cap. 137) den Magenfaß verschiedener Thiere als ein Mittel gegen den weißen Fluß. Als ein Antidotum bey dem Bisse giftiger Thiere galt der Magenfaß des Hasens allgemein im Alterthume (*Nicaander Theriac*. 577). Endlich schrieb man ihm so seltene Eigenschaften noch zu, daß man heutzutage Anstand nehmen muß, davon zu reden.

Der Magenfaß des Pferdes, auch *Hippace* genannt, wurde vorzugsweise bey der Ruhr und andern Bauchflüssen benutzt.

Dem Magenfaße junger Böcke, der Lämmer, des Hirschkalbes, der Ziege, des Hirschkes und verschiedener Antilopen schrieb man ganz gleichförmige Wirkungen zu, und brauchte ihn vorzugsweise bey Vergiftung mit *Aconitum*, bey Vergiftung mit Ochsenblut und in ähnlichen Fällen.<sup>60</sup>

Der Magenfaß des Seehundes soll, wie **Dioscorides** sagt, in Hinsicht der Wirkung mit dem *Castoreum* übereinstimmen, man gab ihn darum in der Fallsucht und bey hysterischen Beschwerden. Das Mittel wurde nicht selten verfaßcht, weshalb **Dioscorides** die Kennzeichen der Reinheit und Güte genau angibt.

#### Blut der Säugethiere.

Man dampfte es bis zur Trockenheit ab und bewahrte es zum Gebrauche in Pulverform auf, und dergleichen ist bis auf den heutigen Tag in den Apotheken noch da und dort anzutreffen; denn wenn gleich die Aerzte es längst nicht mehr verordnen, so hat doch das Volk den Glauben an die Wirksamkeit des Mittels noch nicht aufgegeben.

**Dioscorides** rühmt das Blut des Bockes, der Ziege, des Hirschkes und der Hasen innerlich gereicht als ein Mittel gegen die Ruhr und andere Bauchflüsse. In Wein genommen soll es gegen Gifte dienlich seyn. Mit dem noch warmen Blute des Hasens bestrich man das Gesicht gegen Sommerflecken und ähnliche Verunreinigungen der Haut. Hundsklut gab man als ein Mittel zur Verhütung der Wasserscheu vom Bisse eines tollen Hundes. Stierblut mit *Valenta* gemischt diente äußerlich zur Zertheilung verhärteter Geschwülste.

Das Blut der Hengste gehörte zu den antiseptischen Mitteln. Auch das Blut noch mancher anderer Thiere führen **Plinius** und **Dioscorides** auf und selbst von den Heilkräften des Menstrualblutes der Frauen redet der letztere.

Das Blut des Esels mit Essig verblüht fährt **Plinius** (lib. 28. cap. 16) unter den Mitteln gegen die Fallsucht an, und **Opianer** berichtet von einem Berliner Volksmittel gegen die Epilepsie, das darin bestand, daß man den Kranken von dem Blute einer trächtigen Eselin trinken ließ, oder man tränkte Leinwand damit, trocknete diese, goß weißen Franzwein darauf und gab diesen als *Anti-Epilepticum*. Selbst das Blut der Gladiatoren wandten die Römer (**Plinius** lib. 28. cap. 2) gegen diese schauerliche Krankheit an, und **Aretäus** berichtet als Augenzeuge, wie mehrere Fallsüchtige von einem eben Ertrunkenen das Blut als Heilmittel tranken (*Diuturn*. morb. cur. lib. I. cap. 4). In neueren Zeiten hat wieder **Dr. Rittmeister** in Paulowsk auf den Nutzen des warmen Thierblutes gegen die Fallsucht aufmerksam gemacht.<sup>61</sup>

Bemerkenswerth ist, daß in den Schriften der alten Aerzte öfters das Thierblut als Gift vorkommt; so sagt **Dioscorides** (*Alexipharmaca* Edit. *Sarraeni* cap. 25). Wenn Jemand das Blut eines frisch geschlachteten Ochsen getrunken hat, so entsteht beschwerliches Athmen und Gefühl von Erstickung, unter heftigen Convulsionen werden die Wege des Schlingens verschlossen. Die Zunge wird hochroth, die Zähne werden angegriffen und in ihren Zwischenräumen zeigen sich schon Spuren des geronnenen Blutes. **Plinius** berichtet, es habe der Volkstribun *Vesuvius* Ziegenblut getrunken, damit er ein blasses Ansehen erhalte, und so seinem Feinde **Quintus Cæpio** nachreden könne, als habe er ihn vergiften wollen. Selbst zu Hinrichtungen der Verbrecher wurde das Blut verwendet, wie **Ctesias**, einer der bekanntesten knidischen Aerzte, der zu den Zeiten des **Sofrates** lebte, von dem **Tamogares** berichtet, welcher auf Befehl des **Cambyses** durch Ochsenblut getödtet wurde. Mehrere in der Geschichte sehr berühmte Männer fanden durch eben dasselbe Gift, das sie freiwillig nahmen, ihren Tod, wie **Midas**, **Themistocles** und Andere, ja selbst **Sannibal** starb auf diese Weise.<sup>62</sup>

Mehrfach und nicht ohne Grund ist jedoch dieser gefährlichen Wirkungsart des Rindsblutes widersprochen worden, ja einige spanische Aerzte sollen das frisch getrunken Blut eines auf dem Kampfplatze erlegten, wüthenden Stieres für ein herrliches Mittel in verschiedenen Krankheiten, besonders bey Obstructionen ansehen, daher finden sich in dem Augenblicke, da das Thier stirbt, Leute mit Gläsern ein, die diese Panacee mit der größten Begierde verschlucken.<sup>63</sup>

#### Förner, Klauen, Zähne usw. (*Cornua, Ungulae, Dentes*.)

Die Knochen und Hörner der Säugethiere sind sehr reich an nährender Gallerte, weshalb sie hier am schicklichsten ihre Stelle finden, obgleich die alten Aerzte sie kaum um ihres Ge-

60 *Nicaander Alex.* 67 u. 323. *Scribonius Largus* 188.

61 Meine Entdeckungen in der *Materia medica*. 1828. p. 250.

62 Man vergleiche meine frühern Notizen über diesen Gegenstand in *Brandes Archiv* Bd. 16 S. 155 ff. *Förner Krüggstein* im Novemberheft 1828 der *Altenburger medicinischen Annalen*.

63 *Nicaander* Volksheilmittel S. 100.

haltes an Gelatina zu verordnen pflegten. In den Schriften des *Dioscorides* finden sich nachstehende Drogen.

Das Hirschhorn, *Cornu Cervi*; das man im geraspelten Zustande noch immer in den officinen aufzubewahren pflegt, dessen Stelle freilich oft andere Thierknochen vertreten müssen. *Plinius* redet noch von dem Arzneigebrauche der Dorschhörner und anderer.

Die Eselsklauen, *Ungulae asinorum*. Mit Del zubereitet, sollen sie als Mittel gegen Kröpfe nützlich seyn, und in Form von Cataplasma aufgelegt gegen Frostbeulen benutzt werden. Im gebrannten Zustande ließ man sie gerauma Zeit hindurch, und in ziemlich starker Dosis gegen epileptische Anfälle nehmen. In späteren Zeiten scheinen die Klauen des Elefantens (*Ungulae Elephas*) an ihre Stelle getreten zu seyn.

Pferdespath, *Lichenes eorum*. Sind verhärtete callöse Stellen an den Knien und Hufen der Pferde. Sie wurden zerrieben und mit Essig gemischt innerlich gegen die Fallsucht gegeben.

Das Elfenbein, *Ebur*, wurde für ein adstringirendes Mittel gehalten, und in Umschlägen gegen den Wurm am Finger benutzt.

Die Hörner der Thiere dienten angezündet, schon in den Hippokratrischen Zeiten als ein krampfwidriges Mittel: auch bey *Lethargus* zündete man Hirschhorn als Erweichungsmittel an (*Celsus* III. 20). Diefem Hirschhornrauche schrieb man noch die Eigenschaft zu, alle schädliche Thiere, zumal giftige Schlangen, zu vertreiben (*Nicander Theriaca*. 21 ff.). Eine Infusion von Hirschhorn wurde als *Collutorium* bey Zahnkrankheiten benutzt.

Merkwürdig ist der Gebrauch der Hirschhornseile, die mit einer Holzseile (*lima lignaria*) dargestellt werden soll, gegen Würmer. <sup>64</sup> Nach *Celsus Aurelianus* soll man dieses Mittel, das er *Serrago cornu cervini* nennt, und das bey den Griechen *Rinema* heißt, gegen Spulwürmer mit Essig und Honig nehmen. <sup>65</sup> *Alexander Trallianus* empfiehlt <sup>66</sup> geraspelteltes Elfenbein als ein Mittel gegen Ascariden und überhaupt gegen Würmer ohne Unterschied. In neueren Zeiten hat man statt Hornseile vielmehr Zinnseile (*Limatura stanni*), zumal gegen den Bandwurm gegeben, und beyde dürften auf einerlei Weise, d. h. durch mechanische Reizung der Würmer, diese abtreiben und tödten; auch das *Stizolobium*, oder die steifen Haare an den Hülsen der *Mucuna urens* und *pruriens*, die man als *Anthelminticum* reichte, dürfte auf ähnliche Art seine Wirksamkeit äußern.

War häufig gebrauchten die alten Aerzte gebranntes Hirschhorn, und zwar gegen Blutspien, Ruhr und andere Bauchflüsse, gegen Gelbsucht, Steinbeschwerden ufw., oft in Verbind-

ung mit Traganth; auch gegen weißen Fluß rühmte man dasselbe. Weißgebranntes Hirschhorn, das aus Knochenasche, basisch phosphorsaurem Kalk mit kohlensaurem Kalk besteht, rühmt *Scribonius Largus*, der die Bereitungsart umständlich beschreibt, gegen Kolik. Hauptächlich diene aber dieses weiß gebrannte Hirschhorn bey Augenkrankheiten und zum Reinigen der Zähne; in welcher Hinsicht das Zahnpulver des *Democrazes* berühmt geworden ist. <sup>67</sup> Hierher gehört auch das Zahnpulver der *Messalina*, der berühmten Gemahlin des Kaisers *Claudius*; es enthält außer dem Hirschhorn noch Mastix aus Echio und Salmiak. <sup>68</sup>

Noch ist hier der Leim (Gluten) zu erwähnen, der auch Holzleim (*Xylocolla*) oder Stierleim (*Taurocolla*) genannt wurde. Den besten erhielt man nach *Dioscorides* (III. 90) aus Rhodos, wo er aus Schensellen bereitet wurde. Man zog mit Recht den hellen durchscheinenden dem unreinen schwarzen vor. In Essig aufgelöst wendete man ihn gegen hartnäckige Krankheiten, zumal den Ausfluß, an. Bey Verbrennungen bestrich man die ergriffenen Theile mit in warmem Wasser aufgelösten Leime. Endlich wurde derselbe mit Honig und Essig verdünnt zur Heilung der Wunden angewendet.

In neueren Zeiten hat man den Stierleim gegen erfrorene Glieder mit glücklichem Erfolge angewendet; die Frostbeulen wurden mit Leim bestrichen und noch in Leim getränktes Zuckerpapier darüber gelegt. <sup>69</sup> *Serapides* von Tarent benutzte den Leim äußerlich gegen Flechten, und *Crito* heilte ebenfalls herpetische Ausschläge durch Bestreichen mit Leim. <sup>70</sup> Den Blutflüssen wendete *Diocles* den Leim innerlich an, zugleich mit einem *Decoctum rubi* mit Mehl. <sup>71</sup>

Bei ruhrartigen Durchfällen empfiehlt *Alexand. Trallianus* eine Gallerte aus Kalbsfüßen mit etwas Essig gesäuert; erinnert aber, daß nur Personen mit guten Verdauungskraften sie vertragen, denn bey schwachen Magen werde der Durchfall dadurch nur vermehrt. <sup>72</sup>

Hier ist wohl die schicklichste Stelle, einer Reihe von thierischen Theilen zu gedenken, die, ehemals als Heilmittel benutzt, den Ansichten der meisten heutigen Aerzte zufolge keine Stelle unter den Arzneimitteln einnehmen können, und die man wohl auch die partie honteuse der *Materia medica* der Alten nennen möchte. So legte man zerstückte Hausmäuse auf die Biskunden der Scorpionen (*Dioscorides* II. 74). Zerstückte Spitzmäuse legte man auf die von ihnen selbst herübergehenden

67 *Galen de comp. medicam. sec. locos*. lib. 5 p. 486. Eine specielle Erläuterung dieses Mittels gab Herr Prof. *Harless* in seinem Programm: *Servilii Democrazis quae supersunt carmina medicinalia*. Bonnæ, 1833. p. 32.

68 *Scribon. Largus* 60. *Messalina dei nostri Caesaris*, sagt dieser alte Arzt!

69 *Russ Magazin* Bd. 26 Heft 2 S. 369.

70 *Galen de Comp. Medicam. sec. locos*. lib. 5 p. 467. *Ibid.* lib. 1 p. 353.

71 *Cael. Aurel. Chron.* 2. 13. p. 188.

72 *Lib.* 8 cap. 8.

64 *Scribonius Largus* 141.

65 *Chron.* IV. 8. p. 341.

66 *De lumbricis epistola* 322.



**Biswunden.** Gegen mancherley Uebel benutzte man das Gehirn der Hasen, man bestrich zahnenden Kinbein das Zahnfleisch damit u. s. w. Mit der Lunge eines Schweines, Schafes oder Bürea bestrich man die Füße, um das Wundseyn derselben zu verhüten. Die Lunge des Fuchses diente bey asthmatischen Beschwerden und ist deßhalb in den Pharmacopöen des vorigen Jahrhunderts noch anzutreffen. Gebratene Eßelsleber ließ man Morgens nüchtern als ein Mittel gegen die Fallsucht essen. Ziegenleber diente bey Augenleiden, man ließ sie essen und das Gesicht dem Dampfe der kochenden Leber aussetzen. Die Leber des wilden Schweines soll gegen den Biß giftiger Schlangen nützlich seyn. Die Leber eines wüthenden Hundes soll von dem durch ihn Gebissenen zur Verhütung der Wasserscheu gegessen werden. Die Hoden des Klippferdes gab man mit Wein gegen Schlangenbiß, die Ruthe des Hirsches mit Wein gegen Vipernbiß. Der Urin des Menschen und mehrerer Thiere wurde innerlich und äußerlich gegen mancherley Krankheiten verordnet, ja man scheute sich nicht selbst den Darmthoth des Menschen und vieler Thiere als Arzneymittel theils innerlich nehmen zu lassen, theils äußerlich zu appliciren, oder auch in Räucherungen anzuwenden.

Bemerkenswerth ist besonders die sogenannte *Ustio arabica*, welche mit Ziegenoth gegen Hüftweh und zwar auf eben so schmerzhaftes als wenig geeignete Weise verrichtet wurde. Man legte nehmlich in Del getauchte Wolle in die kleine Höhle der Hand, die zwischen dem untersten Gelenke des Daumens und des Zeigefingers sich findet. Auf diese mit Del getränkte Wolle brachte man nun glühende Kügelchen von Ziegenoth, und legte deren immer so lange neue hinzu, bis der Schmerz von dem Brande durch den Arm hindurch bis zur Hüfte sich ausbreitete und dort den Gichtschmerz linderte. Diese *Ustio arabica*, de-



ren erste Erwähnung bey **Dioscorides** vorkommt, erlernten, wie **Sprengel** sagt, die Römer von den Arabern, woraus der Name zu erläutern ist, indem die arabischen Aerzte von den ältesten Zeiten her sich der Brennmittel bedienten, und zwar so häufig, daß sie den Gebrauch derselben für eine nothwendige Bedingung der Gesundheit und des Lebens ansahen. Nach Rom soll diese Methode zu den Zeiten des **Augustus** gekommen seyn, während dessen Regierung **Aelius Gallus** Arabien mit Krieg überzog. Doch führt **Albucasis**, der berühmteste Wundarzt der Araber, diese Heilmethode nur so an, wie sie **Dioscorides** beschrieben hat, aus dessen Werken er offenbar seine Angaben schöpfte. **Archigenes** von Apamda benutzte dieses Mittel und bezeugte dessen Wirksamkeit. **Antyllus** aber, der gleichzeitig mit **Archigenes** lebte, vollbrachte die Operation auf sehr grausame und nicht nachzuahmende Weise, indem er die Muskelsubstanz der großen Zehe bis auf den Knochen durchbrannte, und dann, um den Schmerz zu entfernen und die Wunde in Eiterung zu unterhalten, verschiedene Cataplasmata auflegte. Nach **Plinius** legte man auf die Seite der schmerzenden Hüfte heißen Rinderthoh; auch erwähnt er den Gebrauch des Ziegenoths, dessen Anwendung er jedoch ganz abweichend von der Angabe des **Dioscorides** beschreibt. **Arctaeus** hat eine ganz eigene Curart des Hüftwehes, er läßt eine Ziege mit Triskraut füttern, sie dann schlachten, ihre Bauchhöhle mit Ziegenoth anfüllen, in den dann der Patient seine Füße stecken muß.<sup>75</sup>

73 Capram oportet herbam iridem ad satietatem depasci: deinde interposito tempore, quantum ad pabulum in ventriculo conciliendum satis sit, capram immolare: atque intra ejus ventrem in fimo pedis aegrotantis oculere. Man vergleiche Sprengel in den Commentarien zum **Dioscorides** S. 448.



(Fortsetzung folgt.)



*Sivatherium*



*Simia*





THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

RECEIVED

1911

1911



# S f i s.

## Encyclopädische Zeitschrift,

vorzüglich

für Naturgeschichte, vergleichende Anatomie und Physiologie,

von

### D e n.

---

1 8 3 8.

S e f t III.

---

Der Preis von 12 Heften ist 8 Thlr. sächs. oder 14 fl. 24 Kr. rheinisch, und die Zahlung ist ungetheilt zur Leipziger Ostermesse des laufenden Jahres zu leisten.

Man wendet sich an die Buchhandlung Brockhaus zu Leipzig, wohin auch die Beiträge zu schicken sind. Es wird gebeten, dieselben auf Postpapier zu schreiben.

Unfrankierte Bücher mit der Post werden zurückgewiesen.

Eindrucksgebühren in den Text oder Umschlag die Zeile sechs Pfennige.

Von Anticritiken (gegen Fests-Reценsionen) wird eine Quartseite unentgeltlich aufgenommen.

---

Leipzig, bey Brockhaus.

# A n z e i g e n.

## Einladung zur Subscription.

Ausführliche Naturgeschichte aller Vögel Europa's, in Abbildungen und Beschreibungen nach der Natur von Eugen Ferdinand von Sömer in Berlin bey Anclam in Vorpommern, Christian Ludwig Landbeck in Wöppingen bey Lübingen und Carl Freiherr von Schortel-Burtenbach in Kirchheim unter Teck, im Königreich Württemberg, mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglieder. Der Prospectus, welcher alles Nähere besagt, ist in Lübingen durch die Gottaische Buchhandlung, in Leipzig durch G. F. Köhler, in Greifswald durch G. A. Koch, in Anclam durch W. Dieze und durch die Verfasser zu beziehen. Bestellungen werden entweder directe oder durch obige Buchhandlungen erbeten.

Kirchheim, Wöppingen, Berlin im April 1838.

Die Verfasser.

## Verzeichniß

von türkischen Coleopteren, die bey Unterzeichnetem zu haben sind.

(Preis in Conv. Münze oder 20 fl. Fuß.)

<i>Cicindela dilacerata</i>	-	-	-	-	fl. 15 kr.
<i>Carabus graecus</i>	-	-	-	-	1 - -
<i>Ditomis tenebricosus</i> Kg.	-	-	-	-	30 -
— <i>eremita</i>	-	-	-	-	18 -
— <i>nitidulus</i>	-	-	-	-	18 -
<i>Pristonychus conspicuus</i> Kg.	-	-	-	-	30 -
<i>Procrustes vicinus</i> Friv.	-	-	-	-	24 -
<i>Cephalostenus elegans</i> Dj.	-	-	-	-	30 -
<i>Dendarus cribratus</i> Kg.	-	-	-	-	20 -

<i>Dendarus stygius</i> Helf.	-	-	-	-	fl. 15 kr.
<i>Guathosia caraboides</i> Dj.	-	-	-	-	18 -
<i>Tentyria grossa</i>	-	-	-	-	12 -
<i>Helops obesus</i> Wl.	-	-	-	-	20 -
— <i>coelestinus</i> Kg.	-	-	-	-	20 -
— <i>mucorens</i>	-	-	-	-	15 -
<i>Cetonia adspersa</i> Friv.	-	-	-	-	20 -
— <i>atrocoerulea</i>	-	-	-	-	20 -
<i>Onitis bubalus</i> Latr.	-	-	-	-	20 -
<i>Amphicomma cyanipennis</i> Friv.	-	-	-	-	24 -
<i>Pimelia verrucifera</i> Solier	-	-	-	-	24 -
— <i>granulosa</i>	-	-	-	-	20 -
<i>Scarabaeus laevigatus</i>	-	-	-	-	18 -
<i>Melolontha carbonaria</i> Dj.	-	-	-	-	24 -
<i>Onitis irroratus</i>	-	-	-	-	18 -
— <i>moeris</i>	-	-	-	-	18 -
<i>Buprestis porosa</i> Klg	-	-	-	-	1 - -
— <i>tenebricosa</i>	-	-	-	-	12 -
<i>Trichodes crabroniformis</i>	-	-	-	-	15 -
<i>Amphicomma mustela</i> Friv.	-	-	-	-	24 -
— <i>bicolor</i>	-	-	-	-	24 -
— <i>Lasserei</i> Parr	-	-	-	-	24 -
— <i>psilotrichus</i>	-	-	-	-	18 -
— <i>purpuricollis</i> Friv.	-	-	-	-	30 -
<i>Lytta phalerata</i> Friv.	-	-	-	-	48 -
<i>Mylabris conspicua</i> Helf.	-	-	-	-	15 -
— <i>14 punctata</i>	-	-	-	-	15 -
— <i>4 punctata</i>	-	-	-	-	15 -
— <i>fasciata punctata</i>	-	-	-	-	15 -
— <i>Dejeanii</i>	-	-	-	-	12 -
— <i>10 punctata</i>	-	-	-	-	15 -
<i>Apalus bipunctatus</i>	-	-	-	-	30 -
<i>Lydus algiricus</i>	-	-	-	-	15 -
<i>Phylan punctulatus</i>	-	-	-	-	12 -
<i>Larinus hirtus</i> Helf.	-	-	-	-	15 -
<i>Lithophilus ruficollis</i>	-	-	-	-	18 -
<i>Apate bimaculata</i> Friv.	-	-	-	-	20 -
<i>Tageia puncticollis</i> Dhl.	-	-	-	-	10 -
<i>Mylabris maculata</i>	-	-	-	-	15 -
<i>Dorcadion Kindermanni</i> Friv.	-	-	-	-	40 -

<i>Dorcadion catenatum</i> Friv.	-	-	-	fl. 40 kr.
— <i>ornu</i> Schh.	-	-	-	30 —
<i>Lytta chalybea</i> -	-	-	-	12 —
<i>Melolontha torulosa</i> Friv.	-	-	-	20 —
<i>Onthophagus pallipes</i> -	-	-	-	15 —
<i>Clerus transversalis</i> -	-	-	-	15 —
<i>Cerocoma Kunzei</i> Friv.	-	-	-	20 —
<i>Oenas crassicornis</i> -	-	-	-	18 —
<i>Opatrum geminatum</i> -	-	-	-	10 —
<i>Clythra valerianae</i> Menet.	-	-	-	12 —
— <i>rufa</i> -	-	-	-	12 —
— <i>binotata</i> Kg.	-	-	-	12 —
<i>Cerambyx rosarum</i> -	-	-	1	— —
<i>Dorcadion laqueatum</i> Kg.	-	-	-	30 —
— <i>graecum</i> -	-	-	-	20 —
<i>Cephalotes nobilia</i> -	-	-	-	30 —
<i>Mylabris militaris</i> Kg.	-	-	-	15 —
<i>Saperda humeralis</i> Menet.	-	-	-	20 —
<i>Galleruca rustica</i> -	-	-	-	10 —
<i>Brachycerus Besseri</i> -	-	-	-	18 —
<i>Clythra limbata</i> -	-	-	-	12 —
<i>Lytta erythrocephala</i> -	-	-	-	10 —
— <i>collaris</i> -	-	-	-	12 —

<i>Onitis Menalcas</i> -	-	-	-	fl. 20 kr.
<i>Malachius coccineus</i> Kg.	-	-	-	10 —
<i>Staphylinus albiventris</i> -	-	-	-	18 —
<i>Amphicoma vulpes</i> -	-	-	-	12 —
<i>Onthophagus lucidus</i> -	-	-	-	9 —
<i>Cetonia cinctella</i> -	-	-	-	12 —

*Orthoptera et Neuroptera.*

<i>Gryllus regina</i> -	-	-	-	1 — —
<i>Coa lusitanica</i> -	-	-	-	20 —
<i>Ascalaphus pallescens</i> WL.	-	-	-	15 —
— <i>laetus</i> WL.	-	-	-	15 —

Bestellungsbriefe können wie die mit Anweisungen oder Geld beschwerten Schreiben frankirt einlaufen. Für Emballage wird nichts gerechnet. Mir unbekannte Abnehmer werden ersucht, den Betrag der Bestellung beizufügen. Auch sind größere Verzeichnisse von vorräthigen Insecten vorhanden.

Paffau.

Waltl, Dr. med.

## I n n h a l t.

- C. 161 P. Freiheit des Menschen.  
 — 167 Berchold's öconomische Flora.  
 — — Sturm's Flora.  
 — — Hoppe und Fühnrohrs botanische Zeitung.  
 — 168 Auszüge aus Zool. Proceedings 1836.  
 — — Brut von Crux, Phalangista, Antilope montana.  
 — — Gould, Bestimmung neuer Vögel 174. 193. 195 197.  
 199. 206. 223.  
 — — Hodgson, Schnepfen.  
 — 170 Thibaut fängt Giraffen.  
 — 172 Garner, Classification der Muscheln.  
 — 176 Owen, über Dintenschneden, Cranchia, Argonauta.  
 — 179 Ogilby, über den Daumen der Affen.  
 — 181 Martin, Zerlegung des Sarama, Cozythaix.  
 — — Bennett, indische Antilope.  
 — 182 Owen, Drüsenbälge der Antilopen.  
 — 185 Macropus penicillatus, Chimpansee, Rostellaria, Glomera, Zerlegung aus Nepal, Cervus elaphoides.  
 Owen, Zerlegung des Bombats.  
 — 186 Harvey, Tubularia gracilis.  
 — 187 Martin, Cynictis melanurus.  
 — 187 Ogilby, Chironectes Yapock.  
 — 188 Martin, Knochen der Meerrotter.  
 Gray, Wisamthiere; Fußquasten der Hirsche.  
 — 191 Waterhouse, Myrmecobius fasciatus 219.  
 — 192 Martin, Zerlegung des Octodon.  
 — 194 Williamsson, Vögel in England.  
 — 195 Vigors, Tinamotis.  
 — 196 Martin, Cercopithecus.  
 — 197 Fuller, Hühnerbastarde.  
 — 198 Gray, Sohlen- und Zehentreter.  
 — 200 Owen, Schädel des Orangutang.  
 — 203 Strickland, Vögel bey Smyrna.  
 — 205 Ogilby, Antilope koba et kob; Canis himalaicus; Ixalus 213.  
 — 207 Martin, Felis marmoreata; Koala.  
 — 209 Bennett, Glaucus.  
 — 214 Gray, Thier von Argonauta.  
 — 215 Owen, Eingeweidewurm, Gnathostoma.  
 — 217 Bennett, Caschelbi.  
 — 218 Reid, Perameles lagotis.  
 — 219 Ogilby, Charactere der Niederkauer.  
 — 227 Bucher von Hippel, Schönherr, Dahlbom, Zetterstedt, Guérin, Wilsch, Liebmann, Arnold, Thuet, Schmid.  
 — 232 Dierbach, Krzneyen der Alten, drittes Capitel: Eyer.  
 — 238 Pommers Schweizerische Zeitschrift.  
 Philipp's Diagnostik der Lungen- und Herzkrankheiten.

- C. 239 Hasler, de neuromate.  
 Dantobel, de Fungo medullari ac haematodi.  
 — 240 Wilsch, die häutige Bräune und die Gehirnentzündung.  
 Herschel, de staphylomate scleroticae.

## I n f c h l a g.

Hempey's Vögel; Baltis türkische Käfer.

## W e r k e h r.

### E i n g e g a n g e n :

#### A n B ü c h e r n.

- Leopoldin. Verhandlungen. Bonn bey Weber. 1836. XVIII. t.  
 4. 543. 83.  
 Zetterstedt, Insecta lapponica. III. Lips. Voss. 1836. 4.  
 386—575.  
 Fischer von Köslersham, Abbildungen der Schmetterlinge.  
 Leipzig bey Hinrichs Heft IX. 4. 103—120. X. 41—45.  
 R. Wilsch's häutige Bräune und Gehirnentzündung. Wien  
 bey Strauß. 1837. 8. 162.  
 Derselben Grundzüge der allgemeinen Naturlehre des Menschen,  
 ebd. 1838. 8. 352.  
 J. G. Commer's Lehrbuch der Erd- und Staatenkunde. Prag  
 bey Galve. 1837. II. 2. 8. 189—432.  
 Derselben geographisches Taschenbuch für 1838. 311. 6 X.  
 P. J. Philipp's Diagnostik der Lungen- und Herzkrankheiten.  
 Berlin bey Hirschwald. 1836. 8. 358. X. 1.  
 J. Baumann's Naturgeschichte für Volksschulen Luzern bey  
 Meyer. 1838. 8. 162 mit 120 Eindrücken.  
 G. G. Carus's System der Physiologie. Leipzig bey G. Fischer.  
 1838. 8.

#### I n Z e i t s c h r i f t e n.

- Annalen der Physik 1837. Nr. 9—12. 1838. Nr. 1.  
 Archiv der Pharmacie 1838. 1—5.  
 Pharmaceutische Zeitung 1837. 21—26. 1838. 1—5.  
 Blätter für literar. Unterhaltung 1837. Heft 12. 1838. 5. 1—3.  
 Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft. Leipzig b. Wigand.  
 1838. 4. Jänner 47.  
 Guérin, Revue zoologique par la société cuviérienne. Paris  
 vue de Seine-St. Germain. 1838. 8. N. 1—3. p. 48.  
 Bulletin de la soc. impér. des Naturalistes de Moscou. Moscou  
 chez Semen 1837. No. IV. 8. p. 64. 2 tab.

1838.

H e f t III.

## Nochmals versuchte Beantwortung

der wichtigen Frage, ob der Mensch frey ist?

Es gibt eine Gränze zwischen einem Reiche, was aus der Nothwendigkeit entsteht, und jenem Höheren, was der freye Geist anbaut: in die Nothwendigkeit sind wir geboren; wir finden uns zuerst in ihr; aber zu jenem freyen werden wir erhoben.

Briefwechsel eines Kindes mit Göthe.

Diese, unsre, durch des Grafen von Buquoy „Widerlegung der, hinsichtlich einer bestehensollenden moralischen Freyheit herrschenden Irrlehre“ [Jhs 1. Hft 1837.] von neuem veranlaßte Einwendung gegen seine Ansicht möge um so mehr nur durch das Vergnügen entschuldigt werden, womit wir jede Gelegenheit ergreifen, mit einem so tiefdenkenden Gelehrten zu verkehren, als wir dessen noch nicht erschienenen System nur aus den bisher in der Jhs mitgetheilten Excerpten kennen; und es daher kommen könnte, daß durch dessen Kenntniß sich später manche einstweilige Mißverständnisse in Einverständnisse verwandelten: doch nun gleich zur Sache.

Bor's erste ist zu bemerken, daß das stete Hindeuten auf ein Weltfatum dem Leser der erwähnten Widerlegung leicht die irrige Meynung beybringen könne, der Herr Verfasser negiere alle und jede Freyheit, erklärte er nicht ausdrücklich, daß nur deren voller Grund im Menschen, als einem Bedingten, nicht liege; womit dem Unbedingten also jener zugestanden, dem Bedingten aber ein Theil derselben, nebst dem Streben zur unbedingten Freyheit nicht abgesagt ist.

Die unbedingte Freyheit kann aber nur in einem Handeln nach sich selbst gegebenen Gesetzen, oder in einem Bewegen innerhalb sich selbst der Ewigkeit her gezogener Grängen und Formen bestehen: die bedingte menschliche aber, nur in der

Erkenntniß der dem Menschen von der Naturkraft bestimmten Schranken, und in einem dieser Erkenntniß gemäßen, beschränkten Wollen und Handeln: denn es ist ja klar, daß, wer nicht mehr begehrt als er darf, und dem gemäß handelt, frey sey. \*

Gesieht aber der Herr Verfasser, wie er, unseres Erachtens, nicht anders kann, dieses zu; dann stehn sogleich mehrere seiner Beobachtungen, und besonders mehrere von ihm zum Nachweise des bloß durch die Naturgesetze bedingten menschlichen Willensgebrauchte Analogien in großem Widerspruche mit seinem Zugeständnisse; denn es ist dann klar, daß z. B. der anschließende Salzcrystall und das von der Leidenschaft getriebene, dem Zwange nur nach und nach durch Gewohnheit sich fügende Thier, im Vergleiche zum Menschen, höchst unfrey erscheinen müßte; und daß deren Unfreyheit auf ihn, selbst vergleichungsweise, übertragen, nichts anderes heiße, als alle und jede Freyheit zweifelhaft machen. Mit andern Worten dasselbe gesagt, hieße es, der Mensch hat vor dem Thiere die Freyheit des Unterdrückens oder Hervorrufens des Wollens oder Nichtwollens, der Willkür voraus, wodurch seine Selbsterziehung bedingt ist, die dem allerdings dagegen oft wahrer und stärker als

\* Das Nicht-erkennen dessen ist das Uebel unsrer Zeit.

er empfindenden und seiner Empfindung gemäß handelnden Thiere fehlt.

Zum Beispiel: ein Mensch fühle einen Drang in sich, einen Stein zu werfen, so würde er erst durch den Entschluß, ihn zu fassen und fortzuschleudern, frey werden; müßte er aber beydes aus Gründen oder aus Schwäche unterlassen, dann würde ein vernünftiges Unterdrücken des Entschlusses ihn vom Drange der Begier befreien, und diese Freyheit reicht aus, um ihn weder als Automat der Natur, noch als ein von der Leidenschaft beherrschtes Thier erscheinen zu lassen; denn die ihn als leibding dennoch oft quälende, ja oft den Ausschlag bey seiner Willkür gebende Begier gilt bey ihm nur als Ausnahme, bey'm Thiere ist sie Naturgesetz.

Jene oben erwähnte Selbsterziehung ist aber sicher theilweis der Grund dessen, was der Herr Verfasser würdigere **Geartung** nennt, und nimmermehr ist letztere aus einer **Naturnothwendigkeit** allein hervorgehend anzunehmen, wenn man sich nicht in große Widersprüche verwickeln und die Discussion darüber in einen nie zu endenden unnützen Wortstreit verwandeln will. Gegen diese Annahme spricht nemlich: 1) der vom Herrn Verfasser selbst dem Menschen zugesandene Theil von Freyheit: 2) jedes Menschen unwiderprechliche Empfindung **Seiner** selbst, die er unmöglich für eine moralische Täuschung, gleich mancher physischen, halten kann: 3) die auf **Selbstbeobachtung** sich gründende Erfahrung, daß der Mensch durch öfteres Hervortreten oder Unterdrücken der Willkür sich hinsichtlich seiner Selbstbeherrschung stärkt, wie der Magnet durch öfters Anziehen des Eisens gestärkt wird.

Es mag sonach immerhin Naturgesetz seyn, daß in der **Menschheit** eine würdigere Geartung hervorgerufen werde; wie und wo dieses aber geschehn, oder ob selbst das Gegenheil, nemlich das Herabsinken zum Unwürdigen Statt finden soll, das bleibt sicherlich, wenigstens theilweis, dem freyen Willen und Streben der einzelnen Individuen anheim gestellt; denn allerdings wirkt günstige Naturanlage in Verbindung mit günstigen Zu- und Gegenständen hiebey mit; allein selbst jenes Streben des Einzelnen zum Würdigen sowohl wie zum Unwürdigen, als unnütze Anstrengung oder verhängnißvollen Eizel darzustellen — als beydes könnte es nie bewiesen werden — heißt wohl nichts andres, als alle Selbstempfindung für Täuschung erklären und dabey Gefahr laufen, sich eines Grundsatzes halber selbst zu täuschen. \*

Wie oft aber unumstößlich scheinende, besonders auf philosophische Gegenstände angewendete Grundsätze täuschen können, davon kann man sich durch deren genaue Prüfung überzeugen. Als Beispiel eines solchen diene ein, in den frühern Heften der Isis vom Herrn Verfasser selbst einst angeführtes

- Die einem solchen Grundsatz entgegengestellte Ueberzeugung widerspricht zwar der vom Herrn Verfasser aus jenem vorläufig gezogenen schlimmen Folgerung, daß unterlassenes Hervortreten des Würdigen, oder vielmehr directes Wollen des Unwürdigen [Bösen] als unfreywillige Bosheit zu bestrafen sey; aber leider umgekehrt führt sie zu der fast eben so schlimmen Erfahrung, daß wahre, freywillige Bosheit auf Erden oft deshalber ungestrakt bleibt, weil sie mit Verstand und Selbstbeherrschung gepaart ist.

Problem, welches, als Stütze des atomistischen Materialismus zulässig angenommen, aller und jeder Freyheit ein blindes Factum substituieren würde: es ist jenes, daß 3 Körper a, b, c sich gegenseitig bestimmen können sollen, ohne einer äußeren Bestimmung zu bedürfen. Wir halten dieß so lange für unmöglich, bis uns die Möglichkeit dargethan wird. Wären nemlich z. B. a, b, c 3 Stücke eines Gewölbes, so läge ihre wechselseitige Bestimmung in der ihnen von dem Baumeister gegebenen Lage, vermöge welcher sie sich zwar gegenseitig halten, aber auch zugleich von einer äußeren Ursache, d. h. von dem Schwerpunkte der Erde, dem sie alle 3 zustreben, zusammen gehalten werden: wären die 3 Körper aber gemischt auf einander einwirkende, so wäre wiederum die allgemeine Anziehungskraft die Ursache ihres wechselseitigen Sichzubindens: oder spannten sich die Körper, so würde eine ihrer Substanz fremde, ihr erst zukommende Beharrlichkeit, d. h. die ihr Streben nach außen hin bebingende [durch Härtung entstandne] Federkraft sie veranlassen, auch gegen einander zu streben. Nun reducieren sich aber wiederum selbst diese, der Erscheinung nach getrennte Kräfte zuletzt auf eine, ihnen allgemeine Ursache; denn die Schwerkraft ist z. B. eine Abart der allgemeinen Anziehung, welche in höherer Potenz Liebe heißt u.s.m.: sonach fällt das wechselseitige Sichbestimmen der Körper a, b, c bey genauer Prüfung des Satzes gänzlich weg, und der Materialismus hätte an ihm eine so schlechte Stütze, als an des Epicurus Princip, der Summa infinita, die eine *contradictio in adjecto* ist.

Noch weniger haltbare Axiome liefern die Zeitschriften fast täglich wiederholt. So erinnern wir uns, um nur noch ein Beispiel anzuführen, im Morgenblatte einst ziemlich barsch folgenden, gegen Jean Paul gerichteten critischen gelesenen zu haben „Fortdauer“ [im Bezuge auf den Menschen], „ohne Erinnerung ist ein Ungeданк“ — Ein Satz, den die gemeinste Erfahrung widerlegt; da niemand sich aller seiner Zustände, z. B. gleich dessen vor seiner Geburt, oder selbst nach dieser, bewußt zu seyn behaupten, und doch dabey läugnen dürfte, daß seine Fortdauer seit jenem Zustande unterbrochen worden sey.

Leider führt das stete Sichwiederholen solcher hingeworfener Sätze zuletzt auf die traurige Bemerkung, daß bis dato in unser aufgeklärt Zeit tausend und tausende der von uns täglich mechanisch ausgesprochenen Worte ihrer Begriffe entbehren; ja, daß in der That nur das Mathematische nebst dem ihm gleichgestellten Logischen uns wahrhaft begrifflich sey [hinc ille lacrymae!].

Kommen wir nun von dieser Ausschweifung auf einen vom Herrn Verfasser wirklich gegen die menschliche Freyheit gebrauchten, uns nicht haltbar scheinenden Satz: es ist folgender:

„Der Mensch ist durch und durch dem Selbstimpulse hin gegeben.“ — Hätte er ihn dem Gesamtimpulse der Außenwelt preisgegeben dargestellt, so würden wir weniger dawider einzuwenden haben; mit jener Annahme sind wir nur zur Hälfte einverstanden, da wir, wahrscheinlich in Uebereinstimmung mit ihm, kein eigentliches Individuum annehmen, als nur das dem Einen Zugekehrte, das Un-verum, alles andre Einzelne aber mit diesem aufs Unendlicste verbunden finden, z. B. eben den



zwischen Gewesenseyn, Seyn und Werden schwebenden, mit der ganzen Außenwelt in ewigem Wechselverkehre (der uns als Dauer erscheint) begriffenen Menschen; ja nicht weniger als diesen, selbst seinen Wohnplatz, die Erde. Wie könnte er aber deshalb, weil er auf ihr wandeln muß, nur ihrem Impulse dahin gegeben seyn? Ist er denn nur schwer und cohärent? scheint er nicht selbst schon durch seine aufrechte Stellung dem Lichte und noch einem Immaterialielleren als diesem, vermittelt einem, seine Existenz begründenden Raum- und Zeitlosen zugekehrt zu seyn? —

Aber wie, wenn ihn, was besonders ehemals oft behauptet wurde, kein solches Unbestimmbares, Freyes durchdränge? —

Auf diesen, mit der menschlichen Freyheit freylich in engster Verbindung stehenden Gegenstand näher einzugehen, tragen wir Bedenken, indem eine lange Erfahrung uns belehrt, daß manche, ein [individuelles] Seelenleben völlig abläugnende Philosophen [z. B. Göthe], ohne es vielleicht selbst zu wissen, davon sehr innig überzeugt und nur über den Begriff des Wortes Seele in Zweifel waren.

Alle Beweise darüber stützen sich entweder auf Erfahrung, z. B. auf die, daß nach Unterbindung eines Nerven die geistige Function aufhöre, wonach der Geist selbst sich als ein Materialles, z. B. als Nervenfluidum oder gar als Hirnhöhlenpunkt [nach Herrn Blumenbachers Ansicht] darstelle: oder auf Analogien, z. B. auf die Vernichtung der Lichterscheinung, beim Verlöschen der dem Geiste ähnlichen Flamme: oder sie suchen sich durch Raisonement zur Wahrscheinlichkeit zu erheben, indem sie z. B. die Verbindung eines Immateriellen mit einem Materiellen als unmöglich zeigen. Jedem von diesen Beweisversuchen steht aber einer des Entgegengesetzten zur Seite, und allen zusammen der Zweifel, weshalb wenig von ihnen zu sprechen ist.

Wer sieht z. B. nicht ein, daß der unterbundene Nerv so wenig gegen das Daseyn des Geistes beweise, als der zerbrochne Leitungsdraht gegen das der Electricität? oder wer wird die Vernichtung der Lichtkraft deshalb annehmen, weil seine Sinne zu schwach sind, ihr aufs Minimum reducirtes Fortwirken gewahr zu werden, nachdem sie aufgehört, concentrirt als Flamme oder im Brennpuncte zu wirken? oder warum soll die Verbindung eines Materiellen mit dem Immateriellen unbegreiflich seyn, da jede Uhr, deren letzter Bewegungsgrund, er sey Schwer- oder Federkraft [Zusammen- oder Auseinanderstreben] stets immateriell ist, das Gegentheil beweist? —

Mag also immerhin z. B. Lord Byron und mit ihm jeder, der, nur mit der Außenwelt verkehrend, auf die Kenntniß Seiner selbst verzichtete, den Geist etwas nennen, dem alles widerspricht [NB. alles Sinnliche]: das hindert ja seine Existenz nicht, sondern beweist sie! Die von der Sinnlichkeit abgeleitete, durch sonach und also unterstützte Beweise sind oft sehr trügerisch, und bekanntlich war das Wandeln der Erde um die Sonne lange Zeit ein Allem-widersprechendes und von Allen Widerspruches.

Wie haben übrigens durchaus keinen klaren Begriff weder vom Geiste noch von der Materie, noch von den Größen beyder festgestellt: eben so wenig vom Vernichtetwer-

den \* und von der Fortdauer. Wir kennen noch viel weniger die materiellen und geistigen Ueber- und Untergänge \*\* [inter-itus] in der Empfindungswelt: nur die Verwandlung des Insectes zeigt Etwas dem analoges. Dennoch reden wir fort und fort von all diesem als einem Erscheinenden. Der Erscheinung nach stellt sich uns aber der Mensch bloß als starr, weich, flüchtig und lüthig dar. Wie er in diesen Eigenschaften durch eine centrale Spannkraft concentrirt wird, dieß ist kein Gegenstand unres Begriffsvermögens, wohl aber einer der Empfindung und Erkenntniß unfrey selbst. Soviel ist gewiß, daß, wenn jene entfiel, ihr Gegenstand, der Körper sich als unwirksam und abgepannt erweist, analog dem Eisen, wenn die aus dem Zinke in seine Structur, ohne sie zu ändern, als Electrochemismus übergegangene, in ihm als Magnetismus erwachte Seele entwich.

Wir verlassen diesen unfruchtbaren Gegenstand, um noch zum Schluß eine Einwendung gegen das zu richten, was der Herr Verfasser eine Illusion nennt, vermöge welcher sich die sogenannt Edelhandlenden zu ihrem Handeln und zur Verzichtung auf die Sinneslust bestimmen lassen sollen. Wir läugnen keineswegs, daß Edelthum, Tugend usm. ebenfalls unbestimmte, eines deutlichen Begriffs ermangelnde Worte seyen, die in der That nur Gefühl für Harmonie und Schönheit und ein diesem gemäßes Wirken und Schaffen bedeuten können. Letztes aber für eine Illusion auszugeben, hieße nichts andres, als die Harmonie selbst für eine Täuschung halten. Diese aber existiert, z. B. gleich in der Bewegung der Weltkörper, wirklich, ewig und ungewungen. Auf uns Erdbewohner und auf unser Thun und Treiben bezogen, scheint uns allerdings ein vielen Gegensätzen abgezwungner, aber eben darum höchst verbindlicher Zustand zu seyn. Diesen, durch ein edles Streben in einen freyen zu verwandeln, sich aus einer rohen, wahren Natur, durch den Trug und Schein hindurch, zu einer ebenfalls wahrhaften, gebildeten zu erheben, scheint uns und andern [sieh das Motto, womit der Herr Verfasser sicher einverstanden ist] die Bestimmung des einzelnen Menschen, so wie der ganzen Menschheit zu seyn.

g \*\*\*\*\*

\* Nichts scheint uns das, was nie war, nicht ist, und nie seyn wird, anzeigen zu sollen.

\*\* Explodieren, Sähren [ein fortgesetztes Explodieren], Verbrennen und Verwesen, alles dieß ist als eine Verschiedenheit der Uebergangsformen des unfreyen Geistigen anzusehn. Der Materialist gesteht diesem nur die letzte zu: er erlaubt dem Lichte, im Augenblicke Weltträume zu durchleiten, aber sein Aggregat, Geist, muß die Gedärme durchziehen! Verwesung bündet das Gras, welches die Kuh nährt, deren Milch wir trinken usw.

## Deconomisch technische Flora Böhmens

von F. Grafen von Berchtold Seidl und Dipz.  
Prag 1836. 8. I. 516.

Dieses Werk ist nach einem ausgebreiteteren Plane bearbeitet und enthält nebst der systematischen Beschreibung der wilden und angebauten Gewächse auch die genauere Angabe ihres Nutzens und Schadens, sowie ihre Behandlung und Anwendung in Künsten, Gewerben, Land-, Forst- und Hauswirthschaft. Es wird bekanntlich in Böhmen sehr viel für die Naturgeschichte gethan, und auch in der Botanik ist schon vieles vorgearbeitet; was den Verfassern zum Vortheil war. Die Anordnung ist nach dem Linneischen System, was man bey einem solchen Werk nicht anders als billigen kann. Es sind gewöhnlich auch die Abarten aufgeführt; dabey ist alles angegeben, was im practischen Leben wichtig ist, die chemischen Bestandtheile, die physischen Eigenschaften, die Anwendung derselben unter allen möglichen Verhältnissen; auch der Nutzen, welchen sie dem Wild und den Vögeln gewähren. Das Buch scheint mehr Gattungen zu enthalten, als für den Zweck nöthig wäre; indessen ist die Gränze hier sehr schwer anzugeben. Vor jeder Ordnung ist eine Uebersicht der Sippen mit ihren Characteren in deutscher Sprache; bey den Gattungen die Anführung der besseren Schriftsteller und Abbildungen; die Charactere sind kurz, so wie die besondere Beschreibung. Bey den Getreidearten sind alle Sorten vollständig aufgeführt nebst Bemerkung ihres Werths. Das Werk ist mit ungemeinem Fleiße bearbeitet und wird gewiß den Beyfall, besonders der Deconomen einräumen.

## Deutschlands Flora

von Sturm. Pilze. Heft 16. Nürnberg. 1837.

Dieses Heft enthält:

*Polyporus intermedius, confluent, helvolut, rutilans, crispus, adustus, dichrous, borealis, suaveolens, fumosus, marginatus, hirsutus, versicolor, stereoides, castaneus, radiatus.*

## F l o r a

oder allgemeine botanische Zeitung, herausgegeben von Hoppe und Kuhnrich, Regensburg 1837. 8. 768. Beyblätter 72. 128. Intelligenzblatt 44. 28. Literatur-Blätter 184. 3. 5.

Man sieht schon aus den Seitenzahlen, um wie vieles diese nützliche Zeitschrift sich vermehrt hat; ein Beweis, daß sie Beyfall findet und sich weit verbreitet. Sie enthält auch sehr viele wissenschaftliche Abhandlungen, ohne den eigentlichen Pflanzenverehr und das Leben und Weben der Botaniker zu vernachlässigen. In diesen Jahrgang haben mehrere Duzend von Botanikern gearbeitet und Wichtiges mitgetheilt so:

wohl über den Bau der Pflanzen und ihre Physiologie als für das System und die Floren, wober die Schweiz diesmal besonders reichlich beobachtet worden ist. Man muß den Herausgebern allen Dank wissen bey dem großen Fleiße, welchen sie auf die Beförderung und Bearbeitung dieser Zeitschrift verwenden.

## A u s z ü g e

aus Proceedings of the zoological society of London IV. 1836.

J ä n n e r 1836.

**§. 1. R. Heron:** Brüten von *Crax rubra* im letzten Sommer. Der Hahn war ganz schwarz, das Weibchen röthlich braun und gestreift. Er bekam 6 Junge in 3 Brutten von je 2 Eiern, welche Hennen und Bruthennen untergelegt wurden. Fünf hatten die rothe Farbe der Mutter; 2 davon wurden nach 3 Wochen von einer Ratte gefressen, 2 andere wurden versandt; eines gieng verloren; das sechste ist fast ausgewachsen. Die Hauptnahrung der Alten ist Weischofen und Grünes, das sie gemeinschaftlich fressen. Gibt man ihnen aber, was geschieht, wann Besuch kommt, Zuckerbrod, so bricht es der Hahn, hält es im Schnabel und wartet lang, bis es ihm die Henne daraus nimmt, was sie ohne alle Freundlichkeit thut, ob schon beyde gut mit einander stehen.

**Leysgham:** Im Sommer 1835. brüteten auf Skiddow mehrere *Charadrius morinellus*.

Man fieng zum drittenmal ein einjähriges Junges der graue Schnepfe (*Macroramphus griseus*) in England und zwar bey Carlisle.

**Martin:** Zerlegung von *Phalangista vulpina* foem. Leib 1' 7 1/2"; Schwanz 11"; kein Deutel, nur 2 Rippen, 1/4" von einander, sehr klein, spitzig und in die Haut gezogen. Der Leib war mit Fett überladen, auf den Bauchmuskeln 1/2" dick. Magen groß und einfach. Dünndarm 6' 10", Dickdarm 4' 10", Unrath knollig; Blinddarm 1' 4 1/4"; um den After 4 große Drüsenkugeln, Zunge glatt, 2 1/2" lang, 3/4" breit.

**Küppell** fand bey *Antelope montana* in Abyssinien Eckzähne, aber nur bey dem jungen Boek im Oberkiefer und sehr klein. Die Weibchen haben keine Hörner. Diese Gattung wird fast um die Hälfte größer als *Antelope saltiana*, und heißt *Madoqua*. Bekanntlich haben die Camele, das Wisamthier und der Muntjack auch Eckzähne in beyden Geschlechtern; Hirsch und Rennthier nur im männlichen.

**Martin** fand einmal im Oberkiefer eines weiblichen Hirsches einen kleinen Eckzahn unter dem Zahnsfleisch.

**§. 5. Gould:** Vögel aus der Sammlung

1. *Edolus grandis*: ater viridi metallic splendens; capite cristato; rectricum duarum externarum scapula longissimis, vexillis ad apicem late spatulatis. Long. tot. (rectricibus externis exclusis) 14. unc.; rostri 1 1/2; alae 6 1/2; caudae 7; tarsi 1 1/2. Rostrum pedesque nigri. Habitat in Nepalia et (verosimiliter) in Sumatra.

Unterscheidet sich von *E. malabaricus* durch mehr Größe; auch ist der Ramm länger und voller; die rückgebogenen Federn oben auf dem Kopf  $1\frac{1}{2}$  Zoll lang.

2. *E. rangoonensis*: ater viridi splensens; rectricum externarum scapis longissimis, vexillis late spatulatis ad apicem marginem anteriorem praeditis. Long. tot. (rectricibus externis exclusis) 12 unc; rostri  $1\frac{1}{4}$ ; alae 6; caudae  $5\frac{3}{4}$ ; tarsi 1. Rostrum pedesque nigri. Hab. apud Rangoon.

Unterschieden von *E. malabaricus* durch den kürzeren Schnabel, die etwas kürzern Flügel und den Mangel der gekrümmten Stiefelfedern.

3. *E. crishna*: velutino-ater viridi metallice (praesertim ad alas) splensens; gutturis plumis sublaevigatis, viridibus; capite pilis longissimis pluribus ornato; rectricum externarum vexillis spiritaliter intortis. Long. tot. (rectricibus externis exclusis) 12 unc; rostri  $1\frac{1}{8}$ ; alae 7; caudae 6; tarsi 1. Crishna Crow, Lath. Hist.

Hab. in Nepalia.

Schnabel ist hier mehr messerförmig und länger als gewöhnlich; die äußeren Schwanzfedern spiralförmig einwärts geschlagen und nicht so lang als bey *E. malab.*; die haarigen schwarzen Fäden am Kopfe 4 Zoll.

4. *E. viridescens*: intense splensens, chalybeo viridis, supra magis saturatus. Long. tot. 11 unc; rostri  $4\frac{1}{4}$ ; alae  $5\frac{3}{4}$ ; caudae 5; tarsi 1. Rostrum pedesque nigri. Hab. apud Manillam.

5. *Orpheus modulator*: saturate brunneus, alis pallidioribus albo bifasciatis; corpore subtus, gutture, genis, strigae superciliari cinerascens-albidis; rectricum (praeter intermediarum quatuor) apicibus late albis. Long. tot. 10 unc; rostri  $\frac{7}{8}$ ; alae  $4\frac{3}{4}$ ; caudae 5; tarsi  $\frac{5}{8}$ . Rostrum pedesque saturate brunnei.

Hab. in Fretu magellanico.

Die größte Gattung; gleich *O. polyglottus* et minor und ist wahrscheinlich *Turdus orpheus* Spix. und die graue Aelster von Edwards aus Brasilien. Die Flügelbänder kommen von den weißen Spitzen der secundären Federn.

6. *Ixos leucotis*: supra cinereo brunneus, subtus pallidior; vertice, gutture, pectoreque nigris; auribus genisque albis; tectricibus caudae inferioribus ochraceis; cauda ad basin cinerea in nigrescenti-brunneo apicem versus transeunte, rectricum omnium apicibus albis. Long. tot.  $6\frac{1}{2}$  unc; rostri  $\frac{3}{4}$ ; alae  $3\frac{3}{8}$ ; caudae 3; tarsi  $\frac{3}{4}$ . Rostrum pedesque saturate brunnei.

Hab. in India orientali.

7. *Colluricincla fusca*: supra saturate brunnea, plumis omnibus pallidioribus marginatis; subtus cinereo-albida, plumis in medio lunula brunnea notatis; uropygii plumarum rectricum apicibus albis. Long. tot. 11 unc; rostri  $5\frac{1}{4}$ ; alae  $5\frac{1}{2}$ ; caudae 5; tarsi  $\frac{1}{2}$ . Rostrum pedesque pallide brunnei.

Habit. vel in Nova-Zeelandia, vel in Nova-Cambria Australi.

Jhs 1838. Heft 3.

Ein Drittel größer als *C. cinerea*.

8. *Trichophorus flavoculus*: cristatus, supra olivaceo-flavescens, subtus flavus; alis caudaque olivaceo-brunneis; genis guttureque sordide albis. Long. tot. 8 unc; rostri 1; alae 4; caudae  $3\frac{1}{2}$ ; tarsi  $\frac{3}{4}$ . Rostrum pedesque corneo brunnei.

Hab. in montibus Himalayensibus, in Nepalia etc.

Der Ramm besteht aus verlängerten Federn mit Borsten untermischt wie bey allen.

9. *Geocichla rubecula*: dorso, alis, caudaque saturate caeruleo-cinereis, alis albo late fasciatis; capite, collo, corporeque subtus nitide ferrugineis; crasso caudaeque tectricibus inferioribus albis. Long. tot. 8. unc., rostri 1; alae  $4\frac{1}{4}$ ; caudae  $2\frac{1}{2}$ ; tarsi  $1\frac{1}{2}$ . Rostrum nigrum; tarsi brunnei.

Hab. in Java.

Sieht aus wie *Erithacus rubecula*.

Er stellt *Turdus macrourus* als folgende neue Sippe auf.

Genus Kittacincla.

Rostrum caput longitudine aequans, ad apicem emarginatum, rectriusculum, compressiusculum. Nares basales, plumis brevibus ut plurimum tectae. Alae mediocres, rotundatae: remige 1a brevissima, 4ta, 5taque subaequalibus longioribus. Cauda elongata, gradata. Tarsi digitique longiusculi, tenues. Obs. Maribus color supra ut plurimum niger; subtus brunneus vel albus.

Sodgson: über einige Scolopaciden aus Nepal. *Scolopax rusticola* wandert auch daselbst zu der nämlichen Zeit wie in England. *Gallinago media* Ray faum verschieden von der europäischen; diese hat aber nur 14 oder 16 Schwanzfedern, jene 22—28, und davon sind die 6—10. äußeren schmaler, härter und zugespitzt; soll *Gallinago heterura* heißen.

*Gallinago solitaria* hat sehr lange Flügel und ist oben fein weiß gefleckt und gestrichelt mit Braun gemengt, Bauch weiß, an den Seiten grau gestreift.

*Gall. nemoricola* ist dunkel gefärbt, Flügel kurz, Bauch dicht quer und braun gestrichelt auf weißlichem Grunde 16—20 Schwanzfedern.

Hornung 1836.

S. 9. Thibaut schreibt am 8ten Jänner 1836. von Malta über die Schwierigkeiten, Giraffen zu bekommen. Er war schon 12 Jahr in Africa gereist und stand gut mit den Arabern.

Am 15ten April 1834. schiffte er den Nil hinauf bis zum zweiten Fall, nahm dann Camels bis Dengolah und gieng am 14. July nach der Wüste von Kordofan, wo er den Arabern Belohnung versprach, wenn sie mit ihm auf die Jagd giengen. Diese jagten dieselben bis jetzt bloß wegen des Fleisches und der Haut, woraus sie Schilder und Sandalen machen. Sie brachen sogleich nach Schwärzen von Kordofan auf und sahen zuerst am 15. August 2 Giraffen. Eine schnelle

Jagd auf Pferden, an die Beschwerlichkeiten der Wüste gewöhnt, brachte uns nach 3 Stunden in Besitz des größten Stacks; es war die Mutter von einem der Jungen, welches ich nun pflege. Da sie nicht lebendig zu bekommen war, so töteten sie die Araber mit Säbelhieben, gerschnitten sie in Stücke und schafften das Fleisch in unser Hauptquartier, das wir in einem Walde aufgeschlagen hatten, damit die Cameele Waid fanden. Die Araber sind sehr lustig nach dem Fleisch und ich aß mit. Die Gluthen waren bald mit Streifen von Fleisch bedeckt, welche vortreflich schmeckten.

Am andern Tag, den 16ten August, giengen die Araber des Morgens früh, um das Junge aufzusuchen, welches sie leicht zu bekommen hofften. In dem Sandboden fanden wir bald die Spur und folgten derselben schnell und still, um es nicht schon in der Entfernung zu vertreiben. Erschischt durch den Schlaf folgte ich den Arabern und um 9 Uhr war ich im Besitz der Giraffe. Der Jäger, welcher zuerst mit seinem Pferde das Thier erreichte, bekam eine Belohnung, die er wohl verdiente, da die schwierige Jagd mitten durch Gesträuch und dornige Bäume gieng. Wir mußten nun 4 Tage warten, um das Thier einigermaßen zahm zu machen: während dieser Zeit hielt es ein Araber beständig am Ende eines langen Seils. Allmählich gewöhnte es sich an die Gegenwart des Mannes und nahm ein wenig Nahrung, nelmlich Milch, wozu ich weibliche Cameele genommen hatte. Es gab sich allmählich zufriedener und folgte willig auf den kurzen Tagreisen, welche unsere Carawane machte.

Diese 4 Tagreisen von Kordofan gefangene Giraffe, deren Wachsäum ich bis jetzt beobachtet habe, läßt mich ungefähr ihr Alter bestimmen. Anfangs mußte man ihr einen Finger ins Maul stecken, damit sie glaubte, den Strich des Cunters zu haben; und dann sog sie ganz ordentlich. Nach der Meynung der Araber und nach der Zeit, während welcher ich sie hatte, kann sie höchstens 19 Monat alt seyn. Sie vergesserte sich um das Doppelte.

Anfangs laufen die Giraffen außerordentlich geschwind, so daß das hurtigste, aber an die Wüste nicht gewöhnte Pferd nur mit der größten Schwierigkeit nachkommen kann. Die Araber gewöhnen ihre Renner an Strapagen. Milch ist ihre gewöhnliche Nahrung und gibt ihnen Kraft, sehr lange zu laufen. Die Giraffen rennen sehr hurtig die Berge hinauf; ihre Füße sind wie die der Ziegen, und daher haben sie auch die Geschicklichkeit derselben. Sie springen über die Wasserriese mit unglaublicher Kraft, und da können es die Pferde nicht mit ihnen aufnehmen.

Sie lieben walbige Gegenden: Baumblätter sind ihr Hauptfutter, welche sie gemäß ihrer Gestalt erreichen können. Die zuerst getödtete war 21 Pariser Schuh hoch von den Ohren bis zu den Hufen. Auch Gras ist ihnen sehr angenehm: aber ihr Bau erlaubt ihnen nicht, es auf dieselbe Art abzuweiden, wie Schen und Pferde. Sie müssen die Vorderbeine weit aus einander spreiten und den Hals bogenförmig biegen. Beym geringsten Geräusch raffen sie sich auf und entfliehen.

Sie fressen sehr artig, nehmen Blatt für Blatt und zwar mit ihrer langen Zunge, und lassen die Dornen stehen, wodurch

sie sich von den Camelien unterscheiden. Da das Gras, was sie nun bey mir fressen, gemäht ist, so nehmen sie nur den obern Theil desselben und kauen ihn, bis sie fühlen, daß der Halm für sie zu hart ist. Ihre Erhaltung fordert große Sorgen und besonders viel Reinlichkeit.

Sie lieben sehr die Gesellschaft. Ich habe eine Thränen vergiesen sehen, als sie ihre Cameraden nicht mehr bemerkte, oder die Personen, welche sie warteten.

Ich war so glücklich, 5 Stücke in Kordofan zu bekommen; aber das kalte Wetter im December 1834 tödtete 4 von ihnen in der Wüste auf dem Wege nach Dongolah, von wo ich nach Bebbah reiste. Nur das Junge ist mir geblieben. Nach einem 22tägigen Aufenthalt in der Wüste erreichte ich Dongolah am 6. Jänner 1835.

Da ich nicht gern nach Kairo zurückkehrte, ohne der zoologischen Gesellschaft mehr schicken zu können, und ich einmal in Dongolah war, so entschloß ich mich noch einmal zur Giraffenjagd. Ich blieb 3 Monate in der Wüste und durchkreuzte sie in allen Richtungen mit Arabern, auf die ich mich verlassen konnte. Die Wüste war von allem entblößt, und die Araber von Darfour, wo ich die ersten Berge sah, zu fürchten. Unsere Jagd war glücklich. Wir bekamen drey Giraffen, kleiner als die, welche ich schon hatte. Die Erfahrung hatte mich indessen belehrt, wie sie zu erhalten wären.

Nun kam die Schwierigkeit, die Thiere zu Schiff von Wabi Halsa nach Kairo, Alexandria und Malta zu schaffen. Es wurden aber alle Schwierigkeiten überwunden. Am meisten litt sie auf dem Meer bey einer 24tägigen Ueberfahrt und stürmischem Wetter.

Ich erreichte Malta am 21. November, wo wir 25 Tage Quarantaine halten mußten, und dann kamen die Thiere an einen passenden Ort, wo ihnen nichts fehlte. Um sie zur Temperatur ihres künftigen Wohnortes vorzubereiten, ist es mir nicht eingefallen, ihnen Kleider machen zu lassen.

In der letzten Woche hatten sie größere Käse zu extragen als bisher: indessen geht es gut. Es sind 3 Männchen und ein Weibchen und sehr schön: sie können des Tags sechs Stunden machen ohne die geringste Ermüdung. Vielleicht gelingt es, Junge von ihnen zu bekommen, wenigstens haben sie einander gern.

Goold bekam von Ratterer Trogon *resplendens et pavoninus* und zeigt, daß sie verschiedene sind; bey dem ersten sind die hintern Federn des Rückens 3' lang und hängen ziemlich weit über den Schwanz herunter; bey dem letztern sind die Rückenfedern kaum so lang als der Schwanz; Ratterer sah sie nur bey einem  $\frac{1}{4}$  länger.

R. Garner. Anatomie der Muscheln mit Blattkiemen. Er betrachtet Anomia als Glied zwischen diesen Muscheln und den Brachiopoden, unterscheidet sie genau.

Er gibt folgende Classification:

I. Nur ein Schließmuskel. — Monomyaria.

A. Fühlklappen sehr lang, nicht von den Kiemen unter-

schieden; außer den gewöhnlichen Muskeln noch andere. — *Anomia*.

## B. Füßklappen kurz, getrennt von den Kiemen:

a. kein Fuß — *Ostrea*.

b. ein Fuß.

### 1. Kiemen längs der Mitte getrennt:

Fuß lang, walzig, Augen am Mantelrand — *Pecten*.

Fuß kurz, dick, mit einer Scheibe, aus deren Mitte ein gestielter, ovaler Körper hängt; Augenflecken — *Spondylus*.

Fuß zusammen gedrückt, keine Augenflecken — *Lima*.

### 2. Kiemen längs der Mitte verbunden — *Vulsella*.

## II. Zwei Schließmuskeln — *Dinnyaria*.

### A. Mantel ohne getrennte Löcher.

Fuß dünn, mit Bart; Füßklappen fixiert — *Avicula*.

Fuß dick, rund, mit einer Schwiele — *Arca*.

Fuß zusammengedrückt, beilförmig — *Pectunculus*.

Fuß unten oval mit Füßfäden am Rande; Füßklappen gewunden — *Nucula*.

Fuß groß, vorwärts gespitzt, in einen Winkel gebogen — *Trigonia*.

### B. Mantel mit einer besonderen Aftöffnung:

a. Fuß klein mit Bart,

1. Vorderer Muskel klein; Rückziehmuskeln des Fußes zahlreich, Bart groß.

Bart zum Grunde getheilt — *Mytilus*.

Bart mit einem gemeinschaftlichen hornigen Centro — *Modiola*.

Der Anus mit einer langen, zungenförmigen Klappe versehen — *Pinna*.

2. Muskeln gleich; Rückziehmuskeln des Fußes nur zwey Paar, Bart kümmerlich — *Lithodomus*.

b. Fuß groß, ohne Bart — *Unio*.

### C. Mantel mit einem oberen und untern Loch, nicht in Röhren verlängert.

Mantel weit geöffnet — *Cardium*.

Mantel um den Fuß oder Bart geschlossen.

Fuß kurz und scheibenförmig mit Bart; vorderer Muskel klein — *Tridacna*.

Fuß klein, walzig, winkelförmig gebogen; Lippen blätterartig — *Chama*.

Fuß klein, scharf, Lippen einfach — *Isocardia*.

### D. Mantel mit 2 verlängerten Röhren.

a. Kiemen nicht verlängert in die untere Röhre.

1. Mantel um den Fuß geschlossen — *Loripes*.

2. Mantel offen.

Röhren getrennt; Fuß lancetförmig.

Fuß groß, ziemlich sichelförmig; äußere Kiemen verkürzt;

Mantel und Füßfäden; Füßklappen der Lippen groß — *Donax*.

Fuß klein; äußere Kiemen verkürzt, Mantelrand einfach; Füßklappen klein — *Psammobia*.

Fuß mäßig; äußere Kiemen so lang als die innern; Füßklappen groß; Mantelrand ganz — *Tellina*.

Fuß klein; Kiemen gleich; Mantel mit Füßfäden — *Amphidesma*.

Röhren mehr oder weniger verbunden; Fuß verschieden.

Kiemen längs der Mitte verbunden.

Röhren klein, theilweise getrennt; Fuß sehr lang und spitzig — *Macra*.

Röhren groß, Fuß kurz und hinten hervorstehend — *Venerupis*.

Kiemen längs der Mitte getrennt.

Fuß lanzetförmig, hinten hervortragend; Röhren klein, verbunden — *Cytherea*.

Fuß beilförmig; Röhren größer und mehr oder weniger getrennt — *Venus*.

b. Kiemen verlängert in die untere Röhre oder daran hängend, Röhren immer verwachsen.

1. Mantel nur unten geöffnet zum Hervorstrecken des Fußes.

Röhren klein; Lippen lang.

Fuß klein; Kiemen jederseits in eine einzige verwachsen — *Pandora*.

Fuß größer; Kiemen getrennt — *Corbula*.

Röhren lang; Lippen klein.

Fuß ohne Bart; Röhren groß und lederig — *Mya*.

Fuß mit Bart; Röhren mäßig — *Hiatella*.

### 2. Mantel vorn geöffnet.

Fuß lang, keulenförmig; Röhren kurz — *Solen*.

Fuß sehr kurz, rundlich.

Zwey getrennte Schließmuskeln, der vordere liegt unter einem zurückgeschlagenen Stück des Mantels, welcher statt des Bandes die Schnäbel verbindet; Füßklappen groß — *Pholas*.

Leib sehr verlängert; Schließmuskeln vereinigt; am Ende des Mantels 2 kalkige Stücke; kein Knorpelband oder zurückgeschlagenes Mantelstück — *Teredo*.

§. 17. Gould legt Vögel vor aus der Sammlung, darunter ein sonderbarer Hocker, der sich unter keine Zunft bringen läßt; soll daher eine eigene bilden.

### *Paradoxornis*:

Rostrum altitudine longitudinem superans ad basin vibrissis instructum; mandibula superiore valde compressa; culmine acuto, valde arcuato; tomio edentulo, apicem versus valde incurvo ad basin producto; mandibula inferiore ad basin lata, robusta; tomio emarginato.

Nares parvae, rotundatae, pone rostrum sitae.

Alae breves rotundatae: remigibus 4ta, 5ta et 6ta longioribus.

Cauda mediocris, gradatā. Tarsi robusti, laeves.

Pedes magni, subtus lati: digitis magnis; halluce ungue postico maximis. Ptilosis ampla, laxa.

Die Breite der untern Fläche der Füße ist so groß, daß sie mit viel Kraft müßen umfassen können.

1. *Par. flavirostris*: arenaceo brunneus, subtus pallidior; capite nuchaeque rufo-brunneis; auribus partim aterrimis; facie guttureque albis nigro variis; pectore nigro. Long. tot. 8 unc; alae  $3\frac{1}{2}$ ; caudae  $4\frac{1}{2}$ ; tarsi  $1\frac{1}{4}$ ; hallucis (arcuati)  $\frac{7}{8}$ .

Rostrum splendide aurantiaco flavum; pedes caerulescentes.

Hab. (verosimiliter) in Nepalia.

Folgender Vogel bildet einen neuen Typus unter den Drosophila.

#### *Actinodura*:

Rostrum subcompressum, subarcuatum, ad apicem submarginatum.

Nares basales, lineares, operculo magno tectae.

Alae molles, breviusculae, concavae: remige prima brevissima, 4ta, 5taque longioribus. Cauda mollis, elongata gradata. Tarsi elongati. Pedes majusculi; halluce ungueque postico longiusculis. Ptilosis mollis, laxa.

Flügel und Schwanz sind quergebstreift.

2. *Act. egertoni*: cristata; supra nitide rufo-brunnea olivaceo tincta, subtus pallide rufo-brunnea; cristā, occipite, genisque brunnescenti-cinereis; remigibus ad basin rufis, pogniis nigro flavoque fasciatis; rectricibus sordide rufo-brunneis, lineis saturatioribus transversim notatis, alboque apiculatis. Long. tot.  $4\frac{1}{2}$  unc; alae  $3\frac{3}{8}$ ; caudae  $4\frac{3}{4}$ ; tarsi  $1\frac{1}{4}$ ; rostri 1. Rostrum pedesque brunnei.

Hab. in Nepalia.

Folgende Gattungen werden so bestimmt:

3. *Corvus pectoralis*: niger caeruleo-iridescens; macula nuchali lata fasciae lunata pectorali albis. Long. tot. 17 unc; rostri  $2\frac{1}{2}$ ; alae  $11\frac{1}{2}$ ; caudae  $7\frac{1}{2}$ ; tarsi  $2\frac{1}{4}$ . Rostrum pedesque nigri.

Hab. in China. Statura *Corvus Corone*.

4. *Corvus curvirostris*: niger chalybeo caeruleo-purpureoque iridescens; macula dorsali fasciae lata ventrali albis. Long. tot. 17 unc; rostri  $2\frac{1}{4}$ ; alae  $2\frac{3}{4}$ ; caudae  $7\frac{1}{2}$ ; tarsi  $2\frac{1}{4}$ . Rostrum pedesque nigri.

Hab. in Africa occidentali.

Nähe verwandt dem *Corvus scapularis* aus Süd-africa, aber kleiner, der Schnabel schwächer und ziemlich gebogen.

5. *Prionites caeruleiceps*: iridescenti olivaceo-viridis, pteromatibus secundariisque magis viridibus; cauda ad basin viridi, dein caerulea, ad apicem nigra; capite caeruleo, fascia frontali flavescenti-viridi, lineaque nigra a nare per oculum aureumque ducta et finem versus caeruleo submarginata, notato. Long. tot. 18 unc; rostri  $1\frac{1}{4}$ ; alae  $5\frac{1}{2}$ ; caudae  $11\frac{1}{4}$ ; tarsi  $1\frac{1}{2}$ . Rostrum nigrum; pedes brunnei.

Hab. in regione Taumalipas.

Die 2 mittleren Schwanzfedern haben gegen das Ende nackte Schäfte, wie in der ganzen Sippe, 2 Zoll weit; an der Kehle die gewöhnlichen Büsche schwarzer Federn.

6. *Phylotophus productus*: rostrum elongato; brunneus, capite nuchaeque pallide brunnescenti-griseis, harum dorsique plumis saturatiore marginatis; uropygio, ventre, crissosque saturate rubris; gutture pectoreque flavis, illo ad gulam rubro tincto; alarum flexura subtus flava olivaceo-rufo tincta; rectricibus ad basin aurantiaco flavo brunneoque fasciatis; remigum pogoniis internis ad basin subtusque sordide rufo brunneoque fasciatis. Long. tot. 15 unc; alae 10; caudae 6; tarsi  $1\frac{1}{4}$ ; rostri  $2\frac{1}{2}$ . Rostrum pallidum; pedes saturate brunnei.

Habit.

Der Schnabel ist sehr verlängert, der obere ragt um die Hälfte seiner Länge über den untern hervor.

Der Vogel gehört zu derjenigen Gruppe, welcher Kuhl den Namen Nestor gegeben hat.

§. 19. Owen: Beschreibung einiger seltener Cephalopoden, welche Georg Bennett mitgebracht hat.

Er fang *Cranchia scabra* mit einem Schleppeh unter 12 Grad 15 Min. S. Br. 10 Grad 15 Min. W. L., und sah sie anfangs für eine Qualle an. Diese Sippe unterscheidet sich von *Loligo* et *Onychoteuthis* durch den Zusammenhang des Mantels mit den Rückenwänden des Kopfes; von *Sepioteuthis*, *Sepiola* et *Rossia* durch die Verhältnisse und die Lage der Flossen. Die Gestalt der letzteren reicht nicht allein hin zur Unterscheidung der Sippen, da sie bey den Gattungen von *Onychoteuthis* sehr wechselt, auch bey *Loligo* besonders *L. brevis* sind sie so rund wie bey *Cranchia scabra*, stehen auch am Ende, so daß beyde ohne die Mantel-Anheftung siphonisch nicht getrennt werden könnten. Da bey *Cranchia cardioptera* s. *minima* der vordere Mantelrand auf dem Rücken frey ist, wie bey den ächten *Loligines*, so ist ihr Stand bey *Cranchia* sehr zweifelhaft; und dasselbe gilt von *Cranchia bonelliana*. Diese Mantel-Anheftung ist der wesentliche Charakter von *Cranchia*.

Diese *Cranchia scabra* ist kleiner als die von Leach und mißt nur 1" 8''' sammt den ausgestreckten Fühlfäden. Der Leib ist sehr schlaff wegen der wenigen Eingeweide, welche vorn liegen, bey *Loligopsis* hinten im Sack; dagegen fehlt beyden die trichterförmige Klappe, welche sich bey allen andern gehäuflichen Cephalopoden findet; ferner die Articulation der Wurzel des Siphos durch eine doppelte Kugel und Grube mit der innern Fläche der seitlichen Bauchtheile des Mantels, wel-

ches Gelenk ebenfalls bey allen andern vorkommt, aus Knorpelmasse besteht, mit einer feinen Synovial-Membran bedeckt ist, die Kugeln am Trichter. Bey *Sepia* hat der vorspringende Knorpel eine ovale Gestalt, bey *Loligo* ist er eine verlängerte Leiste; bey *Onychoteuthis* ebenso, fängt aber schon am vorderen Rande des Mantels an und erstreckt sich ein Drittel herunter am Sacl, bildend zwei dünne seitliche Knorpellamina, welche ziemlich gegen die Bauchseite des Mantels liegen: auf der entgegengesetzten Seite des Trichters spielt eine verlängerte Grube auf jeder dieser Leisten. Bey *Loligopsis* hängen die Seiten des Trichters an den entsprechenden Knorpellaminen, welche von den Seitenknorpeln der andern zehnfüßigen Cephalopoden sich nur durch die größere Länge und die höckerige Gestalt unterscheiden.

Bey *Cranchia* fehlen diese Knorpel gänzlich wie bey den Octopoden: aber die Bauchwand der Wurzel des Siphos werden breiter, dünn und durchsichtig, hängen an den entsprechenden Theilen des Mantels und werden eine Fortsetzung derselben.

*Loligo laticeps* n. 3 4 Stück, wovon das größte sammt den ausgestreckten Fühlfäden nur  $1\frac{1}{2}$ " misst, gefunden unter Sargasso 29 Grad N. B. 47 W. L. Lebendig sind sie schön purpuroth mit dunkelrothen Flecken; jetzt fast farblos; nur einige Flecken am untern Theil des Kopfes und Mantels; an der innern Fläche des ersten, 2ten und 3ten Paares der Arme bildet das dunkle Pigment breite Querbänder, welche zwischen jedem Paar Saugnapfen durchgehen.

Der Kopf ist vergleichungsweise breit und die Arme sind länger als bey den andern *Loligines*; das zweite und dritte Paar fast so lang als der Rumpf, welcher ziemlich walzig ist und kegelförmig abnimmt bis zum hintern Ende der Finnen. Diese stehen hinten und auf dem Rücken, sind vorn eine halbe Linie von einander, an der hintern Spitze des Rumpfes aber verbunden; ihr oberer Umriß bildet einen stumpfen Winkel, ihr unterer Rand ist rund.

Bey *Cranchia cardioptera*, welche mit der vorigen Aehnlichkeit hat, ist der Umriß der gleichfalls am Ende stehenden Finnen halbrund, und sie sind vorn weit getrennt, reichen auch über das Ende des Rumpfes hinaus, was bey der vorigen Gattung nicht der Fall ist. Der Rumpf ist breiter im Verhältniß zum Kopfe und nicht kegelförmig, sondern hinten abgerundet.

*Cranchia minima* unterscheidet sich von *Loligo laticeps* dadurch, daß der Rumpf über die kleinen runden Finnen hinausragt, wodurch das hintere Ende des Leibes dreylappig erscheint. Im innern Bau stimmt *Loligo laticeps* mit den andern *Loligines* überein. 3 Stücke von einem zehnfüßigen Cephalopoden von Port Jackson scheinen zu einem *Loligo* oder einer *Sepioteuthis* zu gehören. Da bey einigen Gattungen beyder Sippen die äußere Lippe 8 kurze Fortsätze hat, an deren inneren Fläche und zwar an ihrem Ende 3 oder 4 kleine und gestielte Saugnapfe stehen, welche genau denselben Bau haben, wie die an den 8 größeren äußern Armen; so zeigt sich in dieser Wiederholung des Baues der äußern Reihe der Kopffortsätze eine Analogie zu den verschiedenen Reihen der Lippenfortsätze des Nautilus. Bey einigen Gattungen, z. B. *Loligo pealii* sind die Saugnapf tragenden Lippenfortsätze mehr entwickelt

3fis 1838. Sept. 3.

als bey dem von Bennett mitgebrachten Exemplare. Bey *Loligo cordiflora* hat Bojanus sie verglichen mit der inneren kürzeren Reihe Fühlfäden bey den Quallen, welches eine andere, wenn gleich entfernte, Analogie zwischen den Cephalopoden und den Radiaten anzeigt.

Da die zweiseitigen Fortsätze am Ende des Mastbarnes hier eine Klappe zur Schließung des Afters bilden, so hat Owen diesen Bau auch bey andern Gattungen untersucht und gefunden, daß ähnliche, aber in Gestalt und Lage wechselnde, Anhängel dasselbe bey andern Decapoden thun. Da bey *Onychoteuthis* et *Loligopsis* diese Aftersfortsätze zu dünn sind, um den After zu schließen, so dienen sie vielleicht als Empfindungsorgane und reizen die muskulösen Theile um den After zur Schließung. Bey den Octopoden ist nichts dergleichen um den After, und es scheint, daß die Klappenbildung nur unter denjenigen Cephalopoden entwickelt ist, welche im Wasser vorwärts schießen können.

Hinsichtlich der Geschlechtstheile findet sich ein kleiner, runder, fleischiger Körper an der vorderen Öffnung der zwey Geschlechtsdrüsen ohne Ausführungsgang und von gelber Farbe. Solch ein zweylappiges, gelbes oder rothes Organ hat schon Swammerdam bey *Sepia* entdeckt. Bey *Sepioida* ist dieser Körper einzeln und rosenroth. Bey einem kleinen, von Capitän Ross an der Küste Boothia entdeckten Cephalopoden, welchen Owen kürzlich unter dem Namen *Rossia palpebrosa* beschrieben hat, finden sich zwey dergleichen Körper. Er betrachtet sie als entsprechend den Nebennieren, welche man bis jetzt nur in den Wirbelthieren gefunden hat.

4. Bennett fand mit dem *Loligo laticeps* unter dem Sargasso, der mitten im Ocean bekanntlich eine große Bank bildet, auch einen kleinen Octopus, welcher aber noch jung war, und nur  $1\frac{1}{2}$ " lang sammt den Armen. Das Rückenpaar ist das längste wie bey vielen andern; das zweite eben so lang; das dritte (welches bey den Decapoden gewöhnlich das längste ist) ist hier kaum halb so lang als das erste; das 4te fast 2 Drittel so lang als das erste. Die Spannhaut, welche gewöhnlich zwischen der Wurzel aller Arme der Octopoden liegt, findet sich hier nur zwischen den 4 Rückenarmen; soll deshalb *Octopus semipalmatus* heißen. Der innere Bau stimmt überein mit *Octopus vulgaris*.

5. *Argonauta hians*: Schale und Thier, gefunden unter 4 Grad S. B. 17 W. L. Es war lebendig, fiel aber den andern Morgen aus der Schale als es sich bewegte. Dann zeigte sich eine Masse Eyer in dem eingerollten Theil der Schale, welche sich im Weingeist so vergrößerte, daß jetzt nur noch  $\frac{1}{2}$  vom Leibe des Thiers hineingeht.

Da alle bisher in den Schalen gefundenen Thiere gattungsartig verschieden waren, wenn es ihre Schalen gewesen, was nicht bloß von *A. argo*, *tuberculata* et *hians* gilt; sondern auch von dem neuen *A. rufus*, welchen Capitän P. King aus dem indischen Meer mitgebracht hat; so glaubt Owen, daß die Schalen wirklich zum Thiere gehören. Er läßt daher dieser Gattung den Namen *A. hians* statt *Ocythoe cranchii*, welche ihr Leach beigelegt hat.

Die innern Organe sind wie bey *Octopus*; das Thier entfernt sich aber wie *A. argo* von den nachden Octopoden



und nähert sich den Decapoden im Bau der Kiemenherzen, welche ein fleischiges Anhängel haben; in der Gestalt der Anhängel der Vena cava, welche kürzer und dicker sind; in der verhältnismäßigen Lage des rautenförmigen Dintenbeutels, der nicht in der Substanz der Leber liegt, sondern in ihrer vorderen Aushöhlung: die untern Speicheldrüsen sind auch kleiner.

Mit *Octopus* verglichen zeigen sich folgende Unterschiede: Der blätterige pancreatische Beutel ist dreieckig und nicht spiralförmig gewunden; die zweien Esgänge haben nicht die zickelförmigen und blätterigen Drüsen, welche um die Mitte derselben bey *Octopus* liegen; sie bilden 4 oder 5 Windungen hinter den Wurzeln der Kiemen und endigen weiter vom Grunde des Trichters.

Die Seitenmuskeln, welche bey *Nautilus* so groß sind und an der Schale hängen, sind hier außerordentlich klein. In den Eiern war noch nichts als Dotter.

### M a r z 1836.

S. 25. Ogilby: Bemerkungen über den Daumen gewisser Säugethiere als zoologischen Character.

Er bemerkte im Sommer 1829. bey zwey *Mycetes seniculus*, daß sie die Gegenstände nicht, wie sonst die Affen, mit dem Vorderbaumen und den Fingern hielten, und fand bey genauerer Untersuchung, daß der Daumen nicht entgegensehbar ist, sondern in einer Linie mit den Fingern entspringt. Durch fortgesetzte Beobachtung entdeckte er, daß es sich eben so verhalte bey allen Sippen der südamerikanischen Affen, von denen allen er lebendige gesehen hat. Keiner hat vorn einen achten Daumen, und sie gehören daher eigentlich nicht zu den *quadrumana*. Nur *Azara* hat dieses schon bemerkt, aber man hat sich nicht darum bekümmert.

Unter den 8 americanischen Sippen hat allein *Ateles* keinen Daumen, oder nur als Spur unter der Haut. Bey 5 andern: *Mycetes*, *Lagothrix*, *Aotus*, *Pithecia* et *Hapale* steht der Vorderbaumen in derselben Linie mit den andern Fingern, hat dieselbe Gestalt, wirkt in derselben Richtung und kann sich nicht entgegensetzen. Bey *Cebus* et *Callichris* gleichen die Vorderglieder mehr den Händen des Menschen und den Affen der alten Welt; der innere Finger steht weiter hinten als die anderen, und so sieht es aus, als wenn er denselben entgegen stände: er ist aber, wie es schon *Azara* bey *Cebus capucinus* bemerkt hat, weniger abgeändert als bey Menschen; ist außerdem eben so dünn wie die anderen, schwächer, ohne Kraft, sich entgegenzuweichen, und wirkt auch mit ihnen in derselben Richtung; die Vorderglieder sind mithin nicht als Hände zu betrachten; ja der Daumen wirkt nicht einmal zu gleicher Zeit mit den andern Fingern, sondern hängt bloß an der Seite, wie es auch Ogilby bey *Opossum*, *Phalanger* und andern kletternden Säugethiern gesehen hat: wird er jedoch in Thätigkeit gesetzt, so nimmt er immer dieselbe Richtung wie die anderen Finger. Dieses ist ein wichtigerer Unterschied zwischen den Affen der alten und neuen Welt, als die Dicke der Rautenschwanz oder der Mangel der Backentaschen und der Gesichtsschwielen. Die Americaner können mithin nicht mehr als qua-

drumana, sondern müssen als *pedimana* betrachtet werden, paraktet den Affen der alten Welt.

Diese bestehen aus zwey Gruppen: *Simia* et *Lemuridae*. Es fragt sich nun, ob auch den letztern eine Gruppe unter den *Pedimana* analog ist, und er findet eine solche in *Didelphys*, *Chironectes*, *Phalangista*, *Petaurus* et *Phascolarctos* (nebst einer neuen Sippe *Pseudochirus*, welche er von *Phalangista* trennt); diese Gruppe nennt er *Didelphidae*. In Bezug auf das verschiedene Gebiß und die daraus folgende Ernährungsart hat er durch die Beobachtungen von vielen Säugethiern im zoologischen Garten gefunden, daß wenig oder gar kein Unterschied in letzterer Hinsicht Statt findet zwischen *Opossum* und *Phalanger*, und daß sie sämmtlich alles fressend sind; auch findet er keinen so wesentlichen Unterschied im Gebiß; auch sey der Uebergang ununterbrochen von den *Opossum* mit einem nackten Wicelschwanz durch die gleichfalls mit einem nackten Schwanz versehenen *Cuscus*, *Balausta* der indischen Inseln zu den ächten *Phalanger*, und von diesen einerseits zu *Petaurista*, anderseits durch *Pseudochirus* zu *Koala*.

Einen Wicelschwanz haben die meisten *Pedimanan* und fast allein: nur 3 andere Sippen haben noch einen solchen, *Syntherus Myrmecophaga* et *Cercoleptes*. Dieses wichtige Organ ersetzt einigermaßen den Mangel des entgegensetzbaren Vorderbaumens. Bey allen *Pedimanan* und andern Gruppen, welche einen Wicelschwanz haben, bemerkt man Langsamkeit und Vorsicht in der Bewegung; aber bey keinen *Quadrumana*, mit Ausnahme von *Nycticebus*. Bey keinen der ächten *Quadrumana* findet sich ein Wicelschwanz.

Auch die geographische Verbreitung unterscheidet die *Pedimana* et *Quadrumana*; die letztern bloß in der alten Welt, jene fast ausschließlich in der neuen, wozu auch Australien mehr gehört als zu Asien. Die wenigen scheinbaren Ausnahmen finden sich bloß in dem Vorkommen der *Phalanger* auf der langen Inselreihe zwischen der Südküste von Asien, und der Nordostküste von Australien, welche man theils dahin, theils dorthin rechnen kann; deshalb nehmen auch ihre Geschöpfe Theil am Character von beyden.

Den Aye-aye (*Chiromys*) von Madagascar hat er nie selbst untersucht können, hält ihn aber für eine dritte Abtheilung unter *Pedimana*, und stellt ihn zwischen die Affen der neuen Welt und die *Didelphiden*: er würde ihn zu den letztern stellen, wenn ihm der Beutel nicht fehlte.

Bey einigen *Didelphiden* wie den *Phalanger* und *Petauristen* fangen die Vorderzähne an, die Gestalt von Nagazähnen zu bekommen, wie sie *Chiromys* hat.

Der Mensch bildet eine eigene Gruppe.

Er nennt alle Thiere mit Händen *Chiropoda* und ordnet sie wie folgt:

Säugethiere mit gegensetzbaren Daumen:

A. nur an den Vordergliedern — *Bimana*.

B. an den vordern und hintern — *Quadrumana*.

a. mit Zähnen wie bey Menschen — Affen der alten Welt,

b. mit abweichenden Zähnen — Lemuriden,



C. nur an den hintern — *Pedimana*.

a. mit Zähnen wie beim Menschen — Affen der neuen Welt.

b. mit Nagzähnen — *Chiromys*.

c. mit abweichenden Zähnen — *Didelphiden*.

**C. 29. Martin\*,** Zerlegung des *Sariama* (*Dicholophus cristatus*). Die Luftröhre geht gerad in die Brust; die Speiseröhre hat davor einen kleinen Kropf, Magen groß, dünn, aber muskulös, jederseits mit einer sehnigen Stelle, so groß wie eine halbe Krone; Vormagen. Am Zwölffingerdarm kein Anhängsel wie beim Adjutant; Gallenblase wie ein Wallnuß. Dünndärme 2 Sch. 10 Z., Dickdarm 5; 2 Blinddärme  $7\frac{1}{2}$  Z. lang. Im Magen war unverdautes Fleisch, Federn und Steine. Die Eingeweide ziemlich wie beim Kranich; bey *Anthropoides paradiseus* ist jedoch der Magen muskulöser, der Darm 5' 3".

Der kurze Hals, die starken Rippen und die kurzen Flügel stecken ab gegen die langen Beine, besonders das Schien- und Fersebein; die Beine sind kurz, die hintern hoch oben, tritt nicht auf; der Schädel auch ziemlich wie beim Kranich; Naselöcher groß, weit, oval und offen. Die Wirbel kurz und stark mehr wie bey Hühnern, unterscheiden sich wenig von denen des *Opihotocornus cristatus*; 13 Hals-, 7 Rücken-, 12 Kreuz-, 8 Schwanzwirbel. Brustbein weicht sehr von dem des genannten Kranichs ab: die Furche für die Luftröhre fehlt, der Kiel ist nicht groß, sitzt vorn nicht an das Gabelbein (wie beim Kranich); der hintere Rand schmal und lang wie bey den Hühnern; beim Kranich breit und viereckig. Länge des Brustbeins  $4\frac{1}{2}$ " , Breite des Kiels  $1\frac{1}{2}$ ; Gabelbein sehr dünn, reicht nicht bis ans Brustbein.

Dieser Vogel kann wenig fliegen, worinn sehr verschieden vom Kranich. Schenkel kurz wie beim Kranich,  $3\frac{1}{2}$  Z. lang, Schienbein  $8\frac{1}{2}$ ; Wadenbein nur wie ein Griffel; 3 Z., Fersebein  $6\frac{1}{4}$ .

Im Knochensystem ist daher wenig Ähnlichkeit mit den Raubvögeln; um die Augen aber auch ein starker Knochenring, welcher bey den Stumpfvögeln kaum verknöchert ist.

**Derfelbe.** Zerlegung von *Corythaix Buffonii* fem. Länge 8 $\frac{1}{2}$  Z. ohne die Federn. Zungenspitze hornig, aber ohne Borsten, wie sie sich bey *C. porphyreolopha* finden, und den *Ramphastos*. Kein Kropf, aber ein Vormagen. Muschelhaute des Magens dünn. Dünndarm  $11\frac{1}{2}$  Z., Dickdarm 5, Blinddarm nur ein runder Beutel; Luftröhre gerad; Augen wie bey den Papageyen, mit einem Knochenring; Brustbein sehr kurz, der Kiel nur  $1\frac{1}{2}$  Z. lang.

**Bennett.** Ueber die indische Antilope *cervicapra*; 4 Stück im Garten, ein alter Boek von Bombay durch Sykes vor 5 Jahren gebracht, ein junger doch ausgewachsener, der vor 2 Jahren ankam; ein unreifer kürzlich angekommen; ein verschüttener ausgewachsen.

Beim ältesten ist die Färbung so satt, daß sie fast schwarz ist; die Hörner stark und ganz entwickelt; fehlen den Geissen.

Der zweite ziemlich so; beim dritten, dem jüngsten, sind die Hörner klein, kaum geringelt am Grunde; die erste Windung fängt erst an; Färbung wie bey der Geisse; mattfahl mit einem blassen Streifen längs der Seiten; der verschüttene ist aber größer als der älteste Boek; hat die matte fahle Farbe behalten; die Hörner sind schwach, ohne Ringel und Windung, etwas nach hinten gerichtet, fast wie beim africanischen Schaf. Das Thier ist sehr zahm.

Die Thranendrüsen enthalten viel wachsartige Materie, welche hartnäckig riecht, oder wie die Geschlechtstheile. Auch glaubt er, daß sie mit der Geschlechtsverrichtung zusammenhängen. Dieser Thranenbalg steht bey dem ältesten Boek weit vor und ist immer zum Theil umgestülpt; und wenn das Thier gereizt wird, so stülpt er sich ganz um; das Thier drückt ihn gern an Gegenstände an. Beim zweyten auch ausgewachsenen ist die Umstülpung gering; beim jüngsten gar nicht vorhanden: die Öffnung bildet nur einen Schlit. Beim verschütteten nicht größer, obschon ganz ausgewachsen; erweitert sich auch nicht, wie bey den andern, wenn er gereizt wird; er ist überhaupt gleichgiltig.

Owen hat, um zu erfahren, ob durch den Geruch der an Gegenstände geriebenen Materie die Thiere sich zusammenfinden, die Anwesenheit der Thranenbälge, der Drüsen am Kiefer, hinter den Ohren und in den Weichen, tabellarisch zusammengestellt, und gefunden, daß sie in keiner Beziehung stehen mit der geselligen Lebensart dieser Thiere, denen sie oft fehlen, während sie bey einsamen auf Felsen lebenden vorkommen. Hier ist seine Tabelle.

A. Weichenporen.

Thranenbälge und Kieferdrüsen.

a. Thranenbälge groß.

*Antelope sumatrensis* lebt in Wäldern; Lebensart der Ziegen.

A. *cervicapra*; gesellig in freyen Ebenen Indiens.

A. *quadriscopa*; Senegal.

A. *melampus*; ihrer 6 oder 8 besammeln in den Ebenen der Raffel. Thranenbalg zweifelhaft.

A. *forkex*; Africa, auch zweifelhaft.

— *adenota*; Africa, bezgleichen.

— *quadicornis*; auch zweifelhaft.

— *picta*; in dichten Wäldern Indiens.

— *scoparia*; in kleinen Heerden; Ebenen von Süd-Africa.

— *tragulus*; paarweise; steinige Ebenen und Thäler von Süd-Africa.

— *melanotis*; paarweise in Ebenen; versteckt sich im Unterholz.

— *dorcas*; in Heerden am Rande der Wüste.

— *kevella*; heerdenweise. Steinige Ebenen am Senegal.

— *subgutturosa*; heerdenweise. Ebenen in Central-Asien.

— *Bennetti*; nicht heerdenweise; Felsenbügel von Deccan.

— *arabica*; Felsenbügel von Arabien.

**Ant. Soemmerringii**, nicht heerdenweise. Hügel in Abyssinien.

— **euchore**, heerdenweise, trockene Ebenen von Süd-Africa.

— **pygarga**, heerdenweise; Ebenen von Süd-Africa.

— **mhorr**, Wüsten von Marocco.

— **dama**.

— **rusticollis**, heerdenweise. Wüsten von Nubien.

**b. Thranenbälge** klein bey

— **colus**, heerdenweise, wandert; in der Nähe der Seen.

— **gutturosa**, periodisch in Heerden; dürre Wüsten Asiens.

#### **B. Keine Weichenporen.**

**a. Thranenbälge.**

— **saltiana**, paarweise. Gebirge von Abyssinien.

— **oreotragus**, lebt wie die Gemse auf den Gebirgen am Cap.

— **thar**, nicht heerdenweise, Hügel in Nepal.

— **gazella**, Senegal.

**b. Thranendrüsen.**

— **bubalis**, heerdenweise; Gebirge und Wüsten von Tripolis.

— **caama**, heerdenweise; Ebenen von Süd-Africa.

— **lunata**; Süd-Africa. Weichendrüsen zweifelhaft.

— **gnu**, heerdenweise in der Karroo von Süd-Africa.

— **taurina** s. **gorgon**; heerdenweise. Süd-Africa.

#### **C. Weichenporen.**

**a. Kieferbälge.**

— **syliculatrix**, Africa in Dicksch und Unterholz.

— **mergens**, paarweise; Wälder und Unterholz von Süd-Africa.

— **grimmia**, Guinea.

— **burchellii**.

— **platous**.

— **perpusilla**, paarweise. Gebüsch in Süd-Africa.

— **maxwellii**.

— **pygmaea**.

**b. Keine Kiefer- und Thranenbälge.**

— **strepsiceros**, in kleinen Heerden. Wälder und Ufer der Kafferei.

— **sylvatica**; paarweise. Wälder der Kafferei.

— **scripta**.

— **koba**, Senegal.

— —

— **eleotragus**, in kleinen Heerden an schiffigen Ufern des Caps.

— **redunca**. Goree.

— **capreolus**, in kleinen Heerden; Unterholz, Süd-Africa.

**c. Bälge** hinter den Ohren.

— **rupicapra**, in kleinen Heerden. Gebirge von Europa.

#### **D. Keine Weichenporen.**

Keine Thranen- und Kieferbälge.

**a. A. addax**, paarweise. Wüsten von Nord-Africa.

— **leucoryx**, heerdenweise. Acacienwälder von Nord-Africa.

— **oryx**, in kleinen Heerden. Wälder und Ebenen von Süd-Africa.

— **leucophaea**, in kleinen Heerden. Freye Ebenen von Süd-Africa.

— **barbata**, paarweise. Freye Ebenen von Süd-Africa.

— **equina**, paarweise. Ebenen v. Süd-Africa.

— **ellipsiprymnus**, Süd-Africa.

— **oreas**, heerdenweise. Freye Ebenen v. Süd-Africa.

— **canna**, heerdenweise. Wüsten am Cap.

— **goral**, heerdenweise. Hochebenen am Himalaya.

Ogilby bemerkt: er habe bey einer Geisse der indischen Antilope (*Antilope cervicapra*) die Thranenbälge in einem ganz ruhigen Zustande gesehen; einen Monat später, wo sie wahrscheinlich mehr zugenommen hatte, in einem ebenso reizbaren, als bey dem alten Voch. In der Regel seyen die Bälge bey den Gattungen zwischen den Wendekreisen größer als bey nördlicheren Gattungen und bey solchen, die nur in Gebirgen leben. Bey einer todtten Gazelle fand er, daß die Drüse 6 Ausführgänge im Kreise hatte, und einen in der Mitte; man konnte Säden einer dicken wachsartigen Materie ausdrücken.

Bennett hat einen Brief von Hodgson in Nepal erhalten, worin bemerkt ist, daß bey **A. thar** die Thranenbälge viel thätiger sind zur Brunstzeit.

Bey **A. chiru** sind die Weichensäcke ungemein groß und hängen an einem langen, engen Hals von den Weichen herunter.

Die Kieferdrüsen vom **Cambin Otan** bezweifelt er, und glaubt, die Thranenbälge seyen wie bey **A. thar**, wo sie ganz anders sind, als bey irgend einer Antilope oder Hirsch. Sie haben eine ungeheure Drüse, welche sie ganz ausfüllt, so wie die Vertiefung im Schädel, während diese Drüse bey den meisten andern ein dünnes und selbst zweifelhaftes Ding ist. Unter dem Balg ist nie ein Loch im Knochen, so wenig als im Balg selbst. **Cervus Aristotelis** hat auch diesen Balg. Bey einem getödteten Männchen steckte ich eine Röhre in die Nase und suchte den Balg aufzublasen, aber vergebens. Das Thier kann den Balg umstülpen mittelst kreuzweis liegender Muskeln um den Rand. Die Drüse ist sehr klein, wie auch bey dem **Muntjac**. Bey **A. thar** dagegen ist sie so groß wie ein Dotter, und im Frühjahr läuft unaufhörlich klebrige Materie heraus wie bey keinem Hirsch; er glaubt, daß diese Drüse mit den Geschlechtstheilen in Verbindung stehe, und hält die reichliche Secretion für ein Erleichterungsmittel des Thiers von dem großen Reiz zur Brunstzeit, besonders wenn es keinen Gatten findet. Dieser Reiz dauert 6 Wochen, sowohl örtlich als allgemein, und ist fürchterlich stark.

Die Lippenfäcke oder Internarrillarbeutel bey *A. chira* hängen mehr mit dem Athmen zusammen und sind gleichsam accessorische Naslöcher, mit denen sie sich erweitern und verengern. Diese Gattung hat bloß 5 Backenzähne jeden Dets.

A p r i l 1856.

**E. 41. Bennett,** über *Macropus penicillatus* (Brush-tailed Kangaroo).

Es springt außerordentlich leicht vom Boden auf irgend ein schwaches Gefümpe, bleibt darauf stehen und hält sich mit dem ausgestreckten Schwanz, welcher beim Gehen ihm nicht hilft.

**Owen,** über die krankhaften Theile bey dem gestorbenen Schimpansee. Die Darmdrüsen waren vereitert; keine Eingeweidwürmer. Der Bau stimmt überein wie ihn *Tyson* angegeben hat und *Traill*. *Werner Trans. II.*

**Broderip** beschreibt folgende Schnecken:

*Spondylus albidus*, *Voluta beekii*, *concinna*; *Conus adamsonii*; *Purpura gravesii*; *Bulinus crichtoni*, *inflatus*, *pusio*.

**E. 46. J. B. Harvey** schiebt eine Reihe *Rostellaria pes pelicani* ein, woraus hervorgeht, daß die äußere Lippe dieser ist vor der Vollenzung der Schale, und daß dann ein Theil davon absorbiert wird; ist das Thier ausgewachsen und hat jeder Fortsatz der Schale eine Furche, so ist sie sehr dünn.

**Sodgson;** Fledermäuse aus der Mittellegend von *Nepal*: *Rhinolophus armiger*, *tragatus*; *Pteropus leucocephalus*, *pyrivorus*; *Vespertilio formosus*, *fuliginosus*, *labiatus*.

Ein neuer Hirsch, *Bahraiya*; bildet ein Mittelglied zwischen dem Hirsch von *Rusan* und der *Claphingruppe*, mit welcher letzterer er durch die zahlreichen Zinken am Ende des Geweihs übereinstimmt, aber mit dem ersten in der Abwesenheit eines Zinkens in der Mitte des Geweihs und in den einzelnen Augenprossen. In der Größe steht er zwischen *Cervus hippelaphus* et *elaphus*; er nennt ihn *Cervus elaphoides*.

**Harrell** empfiehlt den Landreisenden, von den Fischen nur eine Hälfte zu trocknen, weil sie dann leichter mitzunehmen sind. Er zeigt dann eine Reihe *Trout* und *Charr* von verschiedenen Orten und Farben je nach Lage, Jahreszeit und Nahrung; so dann die britischen Rochen; die Haut der Roogner ist immer glatter, die Zähne kürzer und weniger spitzig.

M a y 1856.

**E. 49. Ein Haliaetus albicilla** 16 Jahre eingesperrt, legte ein Ey weiß und fast so groß wie ein Ganssey; eine Pene bekam Hahnengestieber vor drey Jahren.

**Owen:** Zerlegung von *Phascolumys wombat*. Er lebte 5 Jahre im Garten. Ein Weibchen wog 59½ Pfund; *Home's* 20, war 2' 2" lang und ein Männchen (*Philos. Trans.* 1808.).

Unter den Bauchdecken viel Fett fast wie Speck; Zitzenbeutel und Knochen wie bey andern; Därme wie bey Pflanzensressenden Nagthieren; am Eingang des Magens Drüsen wie bey *Viber* und *Siebenschläfer*; der Zwölffingerdarm beginnt mit einer Erweiterung wie bey *Paca* und *Capybara*, Dünndarm 11' 3", Blinddarm kurz und weit, Wurmfortsatz 2 Zoll lang, Dickdarm 9', noch einmal so weit als der dünne; hinter dem Magen am Zwölffingerdarm einen Fortsatz wie Blinddarm.

**E. 54. J. B. Harvey,** verschiedene Meerthiere von *Devonshire*:

**Capros aper.**

Eine *Tubularia* wie *indivisa*, aber etwas verschieden; er nennt sie *gracilis*. Die Röhre ist durchaus hohl und einfach; die kopfartige Erhöhung hat um den Mund eine Reihe langer Fühler, darunter eine Reihe noch längerer und zwischen je 2 ein kurzer rother; außerdem 2 oder 3 Reihen weiße und rothe Warzen, welche dem Thier das Ansehen einer Blume geben. Er hatte sie 10 Tage lebendig. Bey der geringsten Verhinderung zogen sich alle Fühler zurück, ganz so wie bey *Caryophyllia*, welche er seit 2 Jahren lebendig hat und in derselben Schüssel mit *Tubularia*. Wenn die letztern jenen nahe kamen, wurden sie aufgefressen. Sie stehen an der Kette, welche über den Dartsfluß gespannt ist, auch an der zu *Devonport*.

Ich hatte mehrere Blüthe in der Schüssel; nach 2 Tagen ließen die Thiere den Kopf hängen und am dritten ganz abfallen. Die zurückgebliebenen Röhren hatten nach 5 Tagen wieder Köpfe, denen aber noch die rothen Warzen fehlten.

**Martin,** über eine neue Gattung *Cynictis*, wovon *Strachan* einen Balg von *Sierra Leone* mitgebracht hat. Bildet ein neues Glied unter den *Wiberviden*, *Cynictis steedmanni*, ist abgebildet in *Zool. Trans. I.* Steht zwischen *Herpestes* et *Ryzaena* in der Gestalt, in der Zahl der Behen und der Zähne; das Thier ist jedoch noch jung und die Zahnsippen noch spitzig; während sie bey *C. steedmanni*, einem alten Thier, sehr abgekaut waren. Die neue Gattung unterscheidet sich von der vorigen nur noch durch einen kleinen innern Höcker am obern äußern Schneidezahn, welcher der früheren fehlt; der innere Rand des obern Reißzahns ist scharf und kegelförmig statt stumpf; die Zähne dahinter fehlen in beiden Riefen in diesem Balg. Die Klauen sind kürzer; unter der Fußwurzel läuft eine nackte Linie vom Ballen bis zur Ferse; bey der früheren Gattung ist alles behaart.

*C. melanurus*; *saturate rufus nigro punctulatus*, ad *latera pallidior*; *gula sordide flavescenti-brunnea*; *artubus interne abdomineque sordide flavescenti-rufis*; *cauda apicem versus late nigra*, ad *apicem floccosa*. *Long corporis cum capite*, 12 unc; *caudae pilis inclusis* 11, *capitis* 2 unc. 1 lin.

Der Pelz ist glatter, kürzer und glänzender, der Schwanz weniger buschig; Kopf, Rücken und Glieder dunkler, Kehle schwärzlich braun; Schwanzspitze schwarz, bey *C. steedmanni* weiß.

**Ogilby** meynt, diese Gattung könnte *Boesmans Kokeboe* seyn.

**Ogilby**, über *Chironectes Yapock*, welchen er von **Natterer** aus Brasilien bekommen hat; Männchen mit Geschlechtstheilen wie bey andern Beutelhieren; nach **Natterer** haben die Weibchen einen vollkommenen Beutel. Findet sich in allen kleinen Flüssen von Brasilien und scheint verbreitet von den südlichen Grenzen dieses Reichs bis an die Honduras Bay. **Buffons** Stück kam von Capenne, und kürzlich bekam **Brown Scott** einen Balg unter dem Namen *Demerara Otter*. Beide stimmen mit **Buffons** Abbildung und Beschreibung überein, sind aber größer und haben ein graues Querband auf der Stirn statt eines bloßen Fleckens über jedem Auge. Bey dem brasilischen ist nur  $\frac{1}{2}$ " der Schwanzspitze weiß, bey dem von *Demerara* 4". Schwanz so lang als Leib, beyde 10" bey dem ersten, 12 bey dem letzten. **Natterer** hat aber 14—15" lange.

Die Zähne verschieden von den andern Dibelphen und von denen, welche **Friedrich Cuvier** vom *Yapock* S. 73 abgebildet hat; vielleicht hat er einen unrichtigen Schädel dafür angelesen. Mein Schädel streckte noch im Balg. Schneid- und Eckzähne in Gestalt und Zahl wie bey den ächten Dibelphen; die zwey mittleren Schneidzähne oben etwas länger als die seitlichen; die untern breiter und etwas getrennt. Backenzähne jeden Bets 5, 2 unächte und 3 ächte. Der erste unächte ziemlich klein und dicht am Eckzahn; der zweyte um die Hälfte größer, beyde dreieckig mit zwey Wurzeln. Die 3 ächten ganz wie die der andern Dibelphen; der erste oben länger als breit, mit 4 scharfen Höckern und einem niedern Absatz nach hinten; der zweyte ebenso gestaltet, aber größer und breiter, der dritte klein wie der Höckerzahn der reissenden Thiere. Im Unterkiefer sind alle 3 gleich groß, schmaler als die obern, ihre Höcker in einer einzigen Längsreihe, ein großer in der Mitte und ein kleiner an jeder Seite.

Das Thier hat sehr große Backentaschen, welche weit hinten in den Mund reichen und deren Oeffnung sehr augenfällig ist. Dieser Umstand wirft viel Licht auf die Lebensart dieses seltenen Thiers, welches darnach zu schließen Süßwasser-Crustaceen, Kerkelven, Fischlaich u. zu fressen scheint, wie das Schnabelthier; es bewahrt sie wahrscheinlich in den weiten Backentaschen auf. 2" von der Schwanzwurzel sind mit demselben feinen Pelz bedeckt wie der Leib; von da an bis zur Spitze mit kleinen Schuppen in regelmäßigen Spiralfreihen, unterstreut mit Borstenhaaren, besonders an der untern Fläche. Ein Beweis, daß es kein Wirbelschwanz ist, wie man gemeynat hat. Dieser Schwanz gleicht vollkommen selbst mit der weißen Spitze dem von *Hydromys chrysogaster*. Ein Wirbelschwanz würde auch einem Wasserthier nichts nützen. Auch die Füße beweisen, daß es nicht klettern kann: die hintern sind breit wie bey dem Fliby; die Behen sammt dem Daumen durch eine Haut verbunden und mit kleinen krummen Klauen; keine am Daumen, wie bey den andern Dibelphen. Die vordern Finger getrennt, sehr lang und dünn und das letzte Glied breiter und flach wie bey *Gecko*; Mittel- und Ringfinger am längsten, Daumen hinter den andern, sieht aus, als wenn er gegensehbar wäre; gleicht ganz dem der amerikanischen Affen. Die Klauen sehr klein und schwach, reichen nicht über die Finger hinaus und sind weder zum Klettern noch Graben brauchbar. Weit hinter den andern an der äußern Seite der Handwurzel ist ein länglicher Höcker wie ein 6ter Finger, aber viel kürzer als die

andern und ohne Knochen. Was er zu thun hat, ist schwer zu sagen, aber die langen und dünnen Finger ergreifen wahrscheinlich das Futter und stecken es in die Backentaschen.

J u n y 1 8 3 6.

S. 59. Vögel aus Nord-Africa von **Th. Reade**. Darunter *Anas marmorata*, welche nach **Gould** in der Schnabelform sich *Anas acuta* nähert, hat aber keine veränderten Schwanzfedern. *Anas cristata*, strepera, quercudula, *Tringa pugnax*, *Limosa melanura*, *Oriolus galbula*.

Die vier Giraffen, welche **Thibaut** angekündigt hat, sind im Garten angekommen.

**Martin**, Knochensystem der Meerotter (*Enhydra marina*), eingeschickt von **D. Douglas**. Gehört richtig abgebildet von **Home** in *Phil. Trans.* 1796. Schneidzähne 2; der äußerste größer, hat im Oberkiefer fast die Gestalt des Eckzahns; dieser stark, Backenzähne 2, wovon oben 2 unächte, unten 3, werden allmählich größer nach hinten; die ächten Backenzähne groß, breit, mit flachen Kronen, etwas vertieft in der Mitte; oben ist der hinterste viel größer als der andere, unten dagegen kleiner.

Das ganze Skelet 3' 2" lang, wovon auf den Schädel 5", auf den Schwanz 10 kommen.

Der Schädel ziemlich wie bey der gemeinen Fischotter, aber breiter, an den Seiten mehr conver fast wie bey den Robben. Rippen 13 (nicht 14, wie **Home** angibt); die 5 letztern halb; Lendenwirbel 6, Vorderfüße kurz, Elle und Spritze getrennt, Behen kurz, nur  $2\frac{1}{8}$ " lang, bey der gemeinen Fischotter 3. Hinterfüße stärker, länger als Schwanz, Sohle  $7\frac{1}{4}$ " lang; Rutenknochen  $3\frac{3}{4}$ " lang. Und das ist ein Hauptunterschied von der gemeinen Fischotter; steht im Knochenbau näher den Robben.

Ein neuer *Scineus* von der Abtheilung **Tilius**.

**T. fernandi**: auribus profundis, latis, margine antico simplici; squamis dorsalis valde tricarinalis: supra pallide brunnea strigis saturatioribus ornata infra albescens; lateribus brunneo variis alboque maculatis; gula brunneo lineata. Long. corporis capitique 6 unc.; capitia collique  $2\frac{1}{4}$ ; caudae?

**Hab. apud Fernando Po.**

In den Riefen eine einfache Reihe stumpfer Zähne.

S. 68. **Gray**, über die Wisamthiere nebst zwey neuen Gattungen.

Der einzige Unterschied vom Hirsch liegt im Mangel der Hörner: denn die meisten indischen Hirsche haben ebenfalls lange Eckzähne, besonders der *Muntjac*. Das Fell aber, die Behaarung oder Nacktheit des Mittelfußes, die An- oder Abwesenheit des Wisamdeutels bey den Männchen geben gute Charaktere zur Unterscheidung dieser Thiere in 3 Unterarten.

Die erste enthält bloß *Moschus moschiferus*. Die hintere und äußere Seite des Mittelfußes ist dicht mit Haaren

bedeckt wie bey den Hirschen und Antilopen; der Pelz ist spärlich wie bey den Hirschen; die Kehle ganz behaart; Bisambeutel; die Zungen gefleckt wie bey den meisten Hirschen.

Die zweite Untersippe *Memina* enthält auch nur eine Gattung, *Moschus memina*. Der hintere Rand des Mittelfußes ist mit Haaren bedeckt; an der äußeren Seite aber etwas unter der Ferse ist eine ziemlich große, nackte, fleischrothe Hervorragung; der Pelz ziemlich lind, weiß, gefleckt und gesprenkelt, was sich im Alter vermindert, aber nicht ganz verliert, Kehle behaart, die Afterhufe vorhanden, obgleich geläugnet von Linne und Buffon, aber kein Bisambeutel.

Die dritte Untersippe *Tragulus* hat den hintern Rand des Mittelfußes fast ganz nackt und etwas schwierig, wodurch sie sich von andern Wiederkäuern unterscheiden; Pelz lind und anliegend wie bey *Memina*, aber nicht gefleckt, selbst in der Jugend; an der Kehle eine ziemlich nackte vertiefte, etwas brüßige, schwierige Schelde zwischen den Nesten des Unterfessers, von der ein Band zum Kinn läuft; kein Bisambeutel, aber Afterhufe, wie alle Gattungen. Die meisten haben an den Rändern des Unterfessers 3 weiße, zur Brust laufende Bänder; auch der Bauch ist mehr oder weniger weiß. Die Zungen sind nicht gefleckt und gleichen in dieser Hinsicht den alten.

Zu dieser Untersippe gehören vier Gattungen, wovon zwey neu. Es sind folgende:

1. *Moschus javanicus*: ferrugineus, nigro variegatus: collo saturate brunneo griseo nebulato; menti margine, strigis pectoralibus tribus postice latioribus, pectore, abdomine, femoribus interne, caudaeque subtus, albis; pedibus, capitis lateribus, prymnaeque nitide fulvis; occipite nigrescenti. Long. corp. capitisque simul poll. 24; metatarsi  $4\frac{1}{2}$  poll.

*Moschus javanicus*, Gmel. syst. nat. I. p. 147 ex Pallasio. Raffles in Linn. Trans. XIII. p. 261? Benn. Zool. Gard. p. 41.

*Tragulus javanicus*, Pallas spic. zool. XII. pag. 18. in nota.

*Moschus indicus*, Gmel. syst. nat. I. p. 172.

*Cervus javanicus*, Osbeck, Iter, p. 273.

*Moschus napu*, F. Cuv. Mamm. t.

Chota Beta, Ron de Ramon, Cab. Madr. t. 9.

Hab. in Insulis Java et Sumatra.

2. *Moschus kanchil*: fulvus; nigrescenti variegatus; nucha striga lata nigra longitudinali, gula, colli corporisque lateribus palide flavescentibus, pilis nigro apiculatis; antipedibus nitide fulvis; menti marginibus, strigis tribus pectoralibus, pectore, abdomine, femoribus postice caudae in illo saturatiore, in hoc pallidiore. Long. capitis corporisque simul poll. 20; metatarsi  $3\frac{1}{2}$  poll.

*Moschus kanchil*, Raffles in Linn. Transact. XIII. p. 262.

Le Chevrotain adulte, Buffon Hist. nat. tom. XII. pag. 344.

Le Chevrotain de Java Buff. Hist. suppl. t. VI. p. 219 t. 20.

Javan Musk, Shaw Zool. t. 173. ex tab. Buffon.

Hab. in Java.

3. *Moschus fulviver*: fulvus, nigrescenti variegatus; nucha striga longitudinali lata nigra; gula, colli lateribus antipedibusque rufescenti-fulvis; lateribus subtusque rufescenti-fulvis; menti marginibus, strigis tribus pectoralibus, striga lata utrinque in pectore abdomineque, femoribus interne anticeque, caudaeque subtus, albis.

Le jeune Chevrotain, Buffon Hist. nat. XII. p. 342 t. 42. 43.

Habit. in Insulis Malaicis et in Penninsula Indiae orient.

4. *Moschus stanleyanus*: rufescenti-fulvus, pilis nigro apiculatis, subtus minus nitidus; collo pectoreque nitide fulvis; menti marginibus, strigis tribus pectoralibus, pectore, femoribus interne anticeque, cauda subtus, albis; syncipite, pedibusque a genubus inde saturatioribus; rhinario, striga utrinque oculos ambiente, auriculaeque extus et ad margines, nigris.

Var. menti marginibus minus albis; strigis pectoralibus interruptis minus conspicuis; gulaque paulo saturatiore. \*Hab.

Unterscheidet sich von allen andern durch die glänzende Farbe und den Mangel des Nackenstreifens, so wie der weißen Farbe am Bauche.

Es sind gegenwärtig 4 Lebende bey Earle of Derby zu Knowsley und zwey im zoologischen Garten. Woher weiß man nicht.

Die Synonyme kann er nicht ins Reine bringen, weiß auch nicht, ob der von Marsden abgebildete *Pelandoc* oder das *Pygmy Musk* von Sumatra in Griffith's *Animal Kingdom* dazu gehört. Linne's *Moschus pygmaeus* ist eine Antilope mit ganz behaartem Hintertheil der Fußwurzel und sehr kleinen, verflummerten Afterhufen. *M. americanus* scheint wegen seines gefleckten Kleides ein Hirschkalb zu seyn; eben so *M. delicatulus* oder *Shaws Leverian Musk*. Shaw citirt dazu Seba's Abbildung, worauf allein *Moschus americanus* gegründet ist, und stellt doch *M. americanus* wieder als eigene Gattung auf.

Er spricht ferner über die Haarbüschel an den hintern Füßen der Hirsche, wodurch man diese in natürliche Abtheilungen bringen kann.

Sie stehen bald aus, bald innwendig, bald an beyden Seiten bey allen Hirschen, mit Ausnahme des *Muntjac*, welcher Mangel jedoch vom Einsperren dieser Thiere herkommen kann. Sie sind überhaupt bey Thieren im Freyen größer als bey denen in Käfigen. Sie finden sich in jedem Alter und Geschlecht, und sind daher sehr schätzenswerth bey der Bestimmung der gewiesenen Weibchen, so wie zur Unterscheidung von den weiblichen Antilopen, wo sie fehlen, oder an den Vorderbeinen stehen.

Sie wurden sonst nur zufällig bey dieser oder jener Gattung erwähnt, von Buffon beim americanischen Hirsch, von Luvier beim Wapiti; Hamilton Smith sagt, daß sie bey dem letztem um eine Fetzdrüse stehen, was sehr wahrscheinlich ist. Sie sind bläulich als die andern Haare und manchmal ganz weiß, wie bey *Cervus virginianus*. Da sie dem Muntjac zu fehlen scheinen und er auch seine Geweihe nicht abwirft, so könnte er eine eigene Sippe bilden. Eine andere Gattung kann man nach ihrem Stande und ihrer Zahl in 3 Abtheilungen bringen, besser als nach den Geweihen, die abfallen.

1) Nur ein Haarbüschel an der äußern Seite des hintern Mittelfußes, ein Drittel vom Ferseubein gegen die Hufe. *C. elaphus, canadensis, axis, porcinus, hippelaphus, dama, niger, tuncuc*, welchen er jedoch für eine Gattung aus Hamilton Smiths Rusjen-Gruppe mit mißgefalteten Geweihen hält. Bey *C. canadensis* und vielleicht bey einigen andern ist ein Wandel aufrechter Haare am hintern Rande des Mittelfußes.

2) Bey andern gibt es zwey Haarbüschel, eines an der äußern Seite des hintern Theils des Mittelfußes, etwa  $\frac{2}{3}$  vom Ferseubein gegen den Huf; das andere an der innern Seite der Ferse. *Cervus virginianus* et *varietas mexicanus* und eine verwandte Gattung, wovon das Weibchen im Museum steht. Bey *C. virginianus* ist das innere Büschel sehr deutlich; auch das äußere, weil es weiß ist. J. Derby's Wildmeister versicherte ihn, daß im Park von Knowsley zwey Abarten sind, wovon man bey der einen die Haarbüschel deutlicher sieht als bey der andern.

3) Andere haben ein sehr deutliches Büschel an der innern Seite der Ferse, aber keines an der äußern des Mittelfußes. So bey zwey lebenden Stücken, beim Lord Derby von Demetera, welche am besten mit *C. rufus* übereinstimmen; bey einer andern Gattung aus Südamerika der vorigen verwandt, welche Egerton 1828. der zoologischen Gesellschaft geschenkt hat; ferner bey einem sehr jungen gesleckten Kalb in Brammwein. Vermuthlich haben auch die Spießer (Brockets) aus Südamerika denselben Character; auch meynt er, die innere Büschel an den Renntbieren im Museum zu sehen, aber keine Spur von den äußern; der ganze Hinterrand des Mittelfußes ist gleichförmig dicht mit Haaren bekleidet.

Ein Elenn im brittischen Museum hat deutliche Büschel an der innern Seite der Ferse und auch an der äußern des Mittelfußes  $\frac{1}{3}$  von der Ferse, wie in der ersten Abtheilung; von der beständigen Anwesenheit der letzten Büschel hat er jedoch keine Gewisheit. Vielleicht bildet diese Gattung eine vierte Abtheilung.

### J u l y 1 8 3 6.

E. 69. Waterhouse, über eine neue Säugthiersippe aus Neuholland, wahrscheinlich ein Beuteltier.

Lieutenant Dale hat den Balg vom Schwanenfluß, 90 englische Meilen Südost von seiner Mündung mitgebracht. Er sah zwey Stücke; beyde flohen in einen hohlen Baum, worin eines zu todt gebrannt wurde, als man es durch Rauch vertreiben wollte. Die Gegend ist voll von faulem Holz und von Ameisenhaufen; und W. glaubt aus diesem Umstande und ei-

nigen Eigenthümlichkeiten im Bau des Thiers, daß es größtentheils, wenn nicht ganz, von Ameisen lebt, daher nennt er es:

*Myrmecobius*:  $\text{Dentes incisores } \frac{8}{6}$ ,  $\text{canini } \frac{0-0}{1-1}$ ,  $\text{pseu-}$

$\text{domolares } \frac{5-5}{4-4}$ ,  $\text{molares } \frac{3-3}{4-4} = 48$ . *Pedes* antici 5-dactyli, *digitis* tribus intermediis longioribus, *postici* 4-dactyli, *digitis* duobus intermediis internum superantibus; externo brevissimo; unguibus longis acutis subfalcularibus. *Scelides* antipedibus longiores. *Caput* elongatum; *rhinario* producto; *auriculis* mediocribus acutis. *Corpus* gracile. *Cauda* mediocris.

Als das Thier getödtet war, streckte es die Zunge 2 Zoll weit über die Nasenspitze heraus; sie war drey Sechsheitel eines Zolles breit; dieser Umstand sowie die Gestalt der Zähne bestärkten ihn in dem Glauben, daß es von Ameisen lebt. Ueber seine unmittelbaren Verwandtschaften weiß er nichts zu sagen. Beym Abziehen des Balgs wurde der Theil, wo der Beutel liegen sollte, so verflümmelt, daß man nichts Sicheres darüber sagen kann: doch scheint es ein Weibchen gewesen zu seyn mit zwey Zügen und Ueberbleibseln eines Beutels.

W. denkt, es werde *Phascogale* verwandt seyn; auch erinnern manche Punkte an *Tupaia* und das Grunbeichhörnchen (*Tamias*).

*M. fasciatus*. Länge 10", Schwanz 6 $\frac{1}{4}$ ", Kopf bis zu den Ohren 1 $\frac{1}{2}$ ". Oben röthlich ockergelb, unterstreut mit weißen Haaren; die hintere Hälfte des Leibes geziert mit abwechselnden schwarzen und weißen Querbändern, ziemlich wie bey *Thylacincus cynocephalus*; unten gelblich weiß; Vorderfüße innwendig ebenso, auswendig blaßrothbraun (Ruß). Hinterfüße auch blaßrothbraun; das Schienbein aber vorn weißlich, wie die Sohle ganz nackt. Die Haare am Schwanz sind schwarz, weiß und röthlich gelb gemischt; jede dieser Farben irgendwo vorherrschend. Das Röthliche an den vordern Theilen des Leibes geht allmählich ins Schwarze über, welches auf der hintern Hälfte vorherrscht und daseibst mit 9 weißen Bändern geziert ist; das erste unbedeutliche Band liegt noch etwas vor der Mitte des Leibes und ist, so wie das zweyte, auf dem Rücken von der Grundfarbe unterbrochen; das dritte, vierte und letzte gehen ununterbrochen von einer Seite zur andern; das fünfte, sechste, siebente und achte gehen über den Rücken, ohne an einander zu stoßen, und bilden mit denen der andern Seite eine Art Schwalbenschwanz [nämlich in der Mitte schmal, an den Enden breit]. Das Haar am Kopf ist sehr kurz und oben bräunlich (bestehend aus einem Gemisch von Schwarz und Röthlichbraun mit einigen weißen Haaren); unten weißlich. Nase und Lippen schwärzlich; unter den Augen und an den Seiten der Schnauze entspringen einige lange, schwarze Haare. Der Leib ist mit zweyerley Haaren bedeckt: das äußere mäßig lang, ziemlich rauh und dicht auf dem Rücken und den vordern Theilen des Leibes; auf den Hüften aber und an der untern Seite, wo bey den Beuteltieren der Beutel liegt, ist es lang. Die Grundwolle ist kurz, fein und nicht dicht. Der Schwanz überall mit langen Haaren bedeckt.

Martin, Beschreibung der chilianischen Buschratte (*Octodon cumingii*).

Männchen 7" lang; der Schwanz war nicht vollständig. Dünndarm  $2\frac{1}{4}$ ", Blinddarm 3", Dickdarm  $1\frac{1}{2}$ ", Knochentrommel in der Eichel.

**E. 73. Gould**, über eine neue Vogelsippe von den Freundschaftsinseln und Neuholland. Stehe zwischen Lanius, Turdus et Lamprolanius, gehöre jedoch mehr zu den Drosseln.

**Aplonis**: Rostrum capite paulo brevius, robustum, subcompressum; mandibula arcuata, ad apicem emarginata. Nares basales, ovals, patulae. Alae breves; remigibus 2do et 3tio longissimis, 1mo et 4to aequalibus. Cauda brevis, lata, quadrata vel subbifurca. Tarsi robusti; digitis magnis, unguibus magnis curvatis, hallucis praecipue valido.

Die Federn am Kopfe sind bey beyden lanzettförmig und das Gefieder hat oben einigen Glanz, besonders am Kopf, Hals und Rücken.

**A. marginata**: pileo metallice brunneo; notaeo saturate brunneo, remigibus secundariis margine externo albescentibus; humeris fere nigris; remigibus caudae saturate brunneis; rostro tarsisque nigrescenti brunneis, gastraeo pallide brunneo, rachibus plumarum fere albis. Long. tot.  $7\frac{1}{2}$  poll.; rostri a rectu ad apicem 1; alae  $3\frac{3}{8}$ ; caudae  $2\frac{1}{2}$ ; tarsi  $1\frac{1}{8}$ .

Hab. in Insulis Amicorum.

**A. fusca**: pileo et regione parotica obscure nigro splendentibus; notaeo pallide brunneo; gastraeo pallidior; remigibus caudae brunneis; rostro tarsisque nigris. Long. tot.  $6\frac{3}{4}$  poll.; rostri a rectu ad apicem vix  $\frac{7}{8}$ ; alae  $3\frac{5}{8}$ ; caudae  $2\frac{1}{2}$ ; tarsi vix 1.

Hab. ad ripas fluvii Murrumbidgee in Nova Hollandia australi.

Diese Gattung brachte Captain Sturt mit.

August 1836.

**E. 75. Gould**: neue Vögel.

1. **Ortyx ocellatus**: nigro brunneus, dorso punctis rufis brunneis adperso, lateribus ocellis albi-flavidis notatis, femoribus nigris. Long. corp.  $6\frac{1}{2}$  unc.; alae  $4\frac{1}{2}$ ; tarsi  $1\frac{1}{4}$ . Haec Species ad Ort. Montezumae in affinitate proxima.

Folgende zwey hat Captain Sturt aus Neuseeland mitgebracht. Sie gehören zu der neuen Sippe Zosterops unter den Sylviaden, von der man anfänglich nur 2 Gattungen kannte; Gould bringt nun 6 neue hinzu.

**Z. albogularis**: Corpore superne, alis, caudaeque, olivaceis; dorso, tectricibus alarum caudaeque castaneo brunneis; oculo plumulis albis circumdato; genis macula nigra notatis, auricularibus griseis; gula, ventre, crissosque albis; lateribus castaneis, rostro pedibusque purpurascens griseis. Long. corp.  $5\frac{1}{2}$  unc.; rostri  $\frac{7}{8}$ ; alae 3; caudae  $2\frac{1}{2}$ ; tarsi 1.

Hab. in Australia, apud flumen Murrumbidgee dictum. 3tes 1838. Heft 3.

**Z. tenuirostris** Gould: Vertex capitis, nucha, gula, thoraceque viridiflavus; oculo plumulis albis circumdato; dorso, scapulis, olivaceo-griseis; primariis rectricibusque viridi late marginatis; ventre, crissosque brunneo flavis; rostro pedibusque brunneis. Long. corp.  $5\frac{3}{8}$  unc.; rostri  $\frac{3}{4}$ ; alae  $2\frac{3}{4}$ ; caudae  $2\frac{1}{8}$ ; tarsi  $\frac{7}{8}$ .

Hab. in Australia apud flumen Murrumbidgee dictum.

Es sind die zwey größten Gattungen der Sippe.

**C. Williamson**, seltene Vögel bey Scarborough, welches eine Art Halbinsel bildet und mit Wald bedeckt ist.

**Siskin** (*Fringilla spinus*) erscheint im April auf dem Wege nach Norden.

Einige Wiedehopfe.

Eine Racker, Roller, *Coracias garrula*, hatte im Magen Ueberbleibsel von Rüsseltäfern.

Die Wasseramsel (*Cinclus aquaticus*, Dipper) soll an einem Ufer untertauchen und lieber unter einem Steg zum andern Ufer wandern, als darüber fliegen. Das Nest steht oft unter einem Wasserfall.

Die Rothdrossel, *Turdus iliacus*, zeigt sich Ende May und verräth sich durch ein eigenes Geschrey.

Die Krähe (*Corvus cornix*, Hooded Crow) hat drey mal hier gebrütet und zwar hat sich einmal ein Weibchen mit der Rabenkrähe (*Corvus corone*, Carrion crow) gepaart und auf einem großen Baum Junge ausgebrütet. Die Rabenkrähe wurde geschossen, aber im folgenden Jahre brachte die Krähe einen andern Gatten von derselben Art zu ihrem alten Nest; das geschah noch einmal; dann wurde sie aber selbst geschossen. Die Jungen waren verschieden; einige gleichen jener, andere dieser im Gefieder.

*Oedionemus* brütet auf Brachfeldern, und erschrickt oft mit seinem Schreien und ominösen Pfeifen die Reisenden bey Nacht: denn es klingt mehr wie die Stimme eines Menschen als wie die eines Vogels.

Der tauche Bus-Vogel (*Buteo lagopus*) brütet manchmal an Abfärzen. Ein gezeichnetes Weibchen kam im folgenden Jahr mit einem neuen Gatten zurück. Bey starkem Nordostwind bekommt man 3 Gattungen von *Lestrin*, *Larus glaucus*, *minutus*, *Colymbus glacialis*, *Mergulus alle* et *Anas glacialis*.

*Tringa temminckii* et *Gallinula pusilla* wurden geschossen.

Der Sandering (*Calidris arenaria*) zeigt sich im May und September.

Im März werden viele *Scolopax rusticola* geschossen, wenn sie durch irgend einen Umstand verhindert werden, schnell nach Norden zu ziehen.

**E. L. Bennett** stirbt.

September 1836.

**E. 79. J. B. Harvey** fieng in der Bucht von Teignmouth nach einem Südwind vier Stück *Veella limbosa*.



**Vigors**, über einen neuen Vogel zwischen Tinamu und Trappen, mitgebracht von Pentland von den hohen Anden.

**Tinamotis**: Rostrum forte, subrectum, otidis rostro persimile; culmine plano. Alae mediocres, rotundatae; remigibus prima et septima fere aequalibus, brevissimis, tertia et quarta longissimis. Pedes tridactyli; tarsis sublongis fortibus; acrotarsiis reticulatis squamis inferioribus grandibus; digitis longitudine mediocribus, medio caeteris, quae sunt fere aequales, longiore, omnibus membrana utrinque marginatis; acropodiis scutellatis, squamis maximis; ungibus grandibus, planis, dispansis. Cauda brevis, subrotundata.

**T. pentlandii**: corpore cinereo-brunneo sordidoque fulvo fasciato, capite colloque similiter striatis, crisso femoribusque rufis; mento albescente. — Plumulae capitibus colli ventrisque magis albedo, dorsi caudaeque magis fulvo notatae; narum notis maculis simulantibus. Longitudo corporis 15; alae a carpo ad apicem remigis 3 lineae 10; rostri ad frontem  $1\frac{1}{8}$ , ad rectum  $1\frac{1}{8}$ ; tarsi 2; digitorum, ungibus inclusis, medii  $1\frac{1}{8}$ , externorum  $1\frac{1}{4}$ .

**Psittacus augustus**: viridis, capite, collo corporeque subtus splendide purpureis, scyncipite viridi tincto, torque nuchali saturatiore; humeris rectricibusque coccineo notatis, his ad apices purpurascenti-fusco tinctis. Plumulae nuchae corporisque infra nigri ad apices marginatae; interscapulii tectricumque femoris azureo leviter ad apices tinctae. Magnitudo Platycerci Vasaee.

Lebt im zool. Garten und zeichnet sich durch seine prächtige Purpurfarbe auf Kopf, Nacken und Brust aus; Süd-America.

**Ps. guildingii**: capitis fronte albescente, scyncipite genisque flavis, occipite mentoque azureis, nucha viridi; alis viridibus in medio fascia aurantiaco flavo notatis, ad apices nigris; cauda ad basin aurantiaca, deinde fascia viridi in medio lazulina notata, ad apicem flava. —

Plumulae occipitis ad basinflavescentes, deinde azureae, fascia gracili nigro-brunnea; nuchae virides fascia latiore notatae. Remigis primaria ad basin flavae, secundariae aurantiacae; ad apices nigrae; interiorum plumis externis lazulina tinctis, rhachibus nigris. Rectricis supra ad basin flavae, deinde aurantiaco viridi marginatae, postea externe lazulinae, externe nigrae, ad apices aurantiaco-flavae, rhachibus nigris; subtus ad basin aurantiacae, in medio virides, ad apices flavae. Rostrum album. Long. corp.  $17\frac{1}{2}$  unc.; alae a carpo ad apicem remigis 4 lineae 12; tarsi  $\frac{7}{8}$ , caudae 8; mandibulae superioris  $1\frac{1}{2}$ ; inferioris  $1\frac{1}{8}$ .

Gould. Zween Bälge aus Guildings Sammlung von der Insel St. Vincent; wo sie aber lebten, weiß man nicht.

**Tamatia bicincta**: gula et corpore inferne subtus ochraceo fulvis; pectore duabus fasciis nigris transversim striato; lateribus flavido albis nigro maculatis; plumis auricularibus griseis, marginalibus subtus brunnea fusca tinctis; fascia nuchali grisea, corpore summo caudae superne brunneis; tectricibus alarum secundariis ad apicem ochraceo-albis, hoc colore dorso guttato; re-

ctricibusque externis marginalibus. — Long. tot. 8 unc.; rostri  $1\frac{1}{2}$ ; alae  $3\frac{1}{4}$ ; caudae 3; tarsi  $\frac{3}{4}$ .

Habitat Cayenne?

Sieven kannte Linne nur 5', seit dem kamen 11 dazu. Sie leben im wärmeren America und bilden jetzt eine kleine Sippschaft. **Tamatia (Capito)** 9 Species; **Lypornix** 3 Sp.; **Monasa** 3 Sp.; **Chelidoptera** n. 1 Sp. (**Lypornix tenebrosa**) unterscheidet sich durch sehr verlängerte Flügel. Er setzt sich nach Mäntzer auf die höchsten Zweige und fliegt dann über den Wald nach Kerfen, während alle andern sich im Dickicht halten in der Nähe des Bodens. In der Lebensart haben sie große Ähnlichkeit mit den Würgern und Fliegenschäupern, sind aber stumpf und sitzen bewegungslos Stunden lang auf einem dünnen Zweig besessenen, bis ein Kerf vorbeizieht, nach dem sie fliegen und dann wieder auf denselben Zweig zurückkehren, welchen sie monatlang zu ihrem Aufenthalt behalten.

Er zeigte 6 Gattungen **Cursorius** aus dem bärren Africa und Indien. Darunter neu

**C. rufus**: fronte castaneo rufo; occipite griseo, fascia alba cincto, hac supra et infra linea angusta nigra marginata; nucha rufescente; corpore summo rufescente brunneo; gula alba; pectore pallido fulvo, hoc colore in faciam ventralem nigram mergente; abdomine posteriore, crissoque labis; remigibus primariis nigris; secundariis albis; pnymo? rectricibusque caudae ad basin brunneo griseis, harum duabus intermediis nota nigra apicali, externis fere albis, reliquis plus minusve ad apicem albis nec non nigra macula griseum colorem fingente; rostro nigro; digitis nigrescentibus, tarsis? albidis flavis. Long. tot. 9 unc.; rostri  $1\frac{1}{4}$ ; alae  $5\frac{1}{4}$ ; caudae 2; tarsi 3.

Hab. in insulis Oceani Indici.

Ist kleiner als **C. asiaticus**, oben ganz rötlich braun, ohne weißes Querband auf dem Würzel. Nahe verwandt dem vorigen und **C. temminckii**.

Martin legt 2 Stück vom Potto oder Kintajou aus dem Museum vor. Es scheinen 2 verschiedene Gattungen zu sein; die Bälge sind aber so fest, daß man nicht weiß, ob sie die Farbe wechseln wie der Coati. Außer der Verschiedenheit der Färbung sind aber bey dem braunrothen Stück die Ohren länger als beim andern, welches viele Jahre im Garten gelebt hat. Es ist schade, daß man nicht weiß, woher jedes stammt.

Der Name **Caudivolvulus** paßt auf beyde, ist eigentlich fippisch und daher zu unterdrücken.

Eine Gattung soll heißen **Cercoleptes megalotus**; Ohren lang, schmal, gerundet an der Spitze und etwas schlaff; Länge 1" 3", Br. 7", auswendig mit gelblich weißen Haaren ganz bedeckt, innen nur sparsam.

Pelz dicht, kurz und steif.

Die andere Gattung soll heißen **C. brachyotus**. Pelz voll, lind und mäßig lang, Ohren breit, kurz, abgerundet, 1" lang und breit:

1. **C. megalotus**: laete rufus, striga saturatiore, per



totam longitudinem capitis, dorsi medii, caudaeque supra excurrente; lateribus pallidioribus; abdomine: gulaque rufis, striga castanea abdominali; auriculis longis, angustis, rotundatis subpendentibus et externe pilis pallide flavis, indutis, cauda gracili; vellere denso brevi, atque rigido.

2. *C. brachyotus*: vellere denso, molli et longiusculo, griseo flavescenti, at brunneo, undato, hoc colore in capite, summoque dorso, saturatiore; abdomine et gula stramineis auriculis latis, mediocribus et erectis, pilis rarioribus fuscis externe indutis.

S. 84. E. Juller schickt zwei lebendige Bastarde ein von einem Fasan und einer Scheuerhenne (Barn door Hen), welche selbst ein Bastard von einer Henne und einem Fasan ist. Aussehen und Betragen haben sie von beiden Völkern; sie seyen Dreyviertels-Fasane. Im Garten der Gesellschaft hatte man einige Jahr lang einen Bastard vom Fasan und der gemeinen Henne (*Common Fowl*), einen vom Fasan und Silberfasan und einen vom Fasan und Goldfasan. Der Dreyviertels-Fasan ist merkwürdig, weil man geglaubt hat, daß Bastarde von 2 verschiedenen Gattungen unfruchtbar seyen.

Varrell sagt: man kenne noch andere Ausnahmen und eine solche stehe in den *Proceedings* 1831. S. 158 von Fienness, welcher Bastarde von der gemeinen Ente und der Spitzente gezogen habe, die im nächsten Jahr auch Junge hervorbrachten. Varrell habe bey solchen Bastarden sowohl von Hühnern als Enten gefunden, daß die Geschlechtsorgane der Männchen groß, die der Weibchen dagegen klein und etwas unvollkommen seyen; die Kreuzungen mit Canarienvögeln seyen bekannt; am besten werde die Fortpflanzung gelingen, wenn man männliche Bastarde mit Weibchen der ächten Gattung paare.

Vigors sagt: das sey der erste Fall, wo ein Bastardweibchen fruchtbar gewesen sey.

Lieutenant Breton und Capitän Brette schicken Vögel vom Schwänenfluß, worunter Gould zwei neue fand.

*Gallinula ventralis*: gula pectore et inferioribus corporis partibus fusco-cinereis, lateribus albo guttatis, remigibus caudae crissioque nigris; toto corpore superne olivaceo brunneo; alis castaneo tinctis; mandibula superiore olivacea, inferiore ad basin rubra, ad apicem olivacea; pedibus olivaceis. Long. tot. 15 ad 17 unc.; rostri  $1\frac{1}{4}$ ; alae 9; caudae  $3\frac{1}{2}$ ; tarsi  $2\frac{1}{4}$ .

Hab. in Australia apud flumen Cygnorum.

*Oxyura australis* m.: Capite toto colloque nigris; pectore, dorso lateribusque nitide castaneis; remigibus tectricibusque caudae nigrescentibus, uropygio nigricante brunneo inornato; abdomine crissioque brunneo cinereis brunneo transversaliter obscure striatis, rostro pedibusque plumbeis. Differt toto corpore nigricante, obscuris lineis guttisque castaneis notato; partibus inferioribus corporis pallidioribus. Long. tot. 15 unc.; rostri 2; alae 6; caudae 3; tarsi  $1\frac{1}{8}$ .

Hab. Australia.

Haec species typum generis constat, alis brevibus atque concavis reetricibusque caudae rigidis plumisque corporis nitidis.

Gehört zu der Sippe *Oxyura* L. Bonaparte (*Undina* Gould.).

Bisher hatte man noch kein Stück aus Australien von dieser kleinen Gruppe. Das Weibchen hat in der Färbung und Zeichnung sehr viel Ähnlichkeit mit *Temmincks Hydrobates*; nur durch den Schnabel unterschieden.

October 1836.

S. 87. Gray: über die Unterscheidung der Sohlen- und Zehentretenden Fleischfresser.

Er hält die Nacktheit der Sohle für kein gutes Kennzeichen, die Sippen in größere oder kleinere Gruppen zu theilen, wohl aber in Gattungen, Abtheilungen und oft auch um Sippen zu charakterisiren. So könne man die Gattungen der Sippen *Herpestes*, *Mephitis* et *Lutra* sehr gut dadurch kennen.

Die Größe der nackten Stellen hienge von der Wärme der Gegend ab. Marder, welche in Schneeländern leben und mit der ganzen Sohle auftreten, haben dieselbe dennoch ganz behaart, wie die Wolverene, der Panda, die Robben und der Eisbär.

Das ist aber doch nicht immer der Fall: denn der Benu-turing, welcher lebt, wo der Panda, das nackte und warzige Sohlen. Die Nacktheit derselben ist auch nicht bleibend, den derselben Gattung, wie bey den Eichhörnchen und andern Nagthieren: denn bey den grauen Eichhörnchen aus dem Norden der vereinigten Staaten ist die Sohle behaart, bey denen aus dem Süden ganz nackt; auch weichen die Gattungen von *Spermophilus* in der Größe der nackten Stelle sehr von einander ab.

Dann macht er Bemerkungen über die Aenderungen in der Lage und Gestalt der Reißzähne, je nachdem es Milch- oder bleibende Zähne sind.

Der Milch-Reißzahn der Katze, des Hundes, Wisons, Skunks, der Wiveren und aller Sippen, die er hat untersuchen können, hat einen kleinen, innern Entrallappen, während der bleibende einen großen vordern Lappen hat.

Der Kornzahn der Mustelen wechselt oft in der Größe bey derselben Gattung, und die Größe kann daher nicht als Gattungscharacter dienen, besonders da sie sich nach dem Alter ändert.

Er legte nun Thiere aus der Sammlung vor. Darunter zwey aus der Sammlung von Raffles, und daher wahrscheinlich von Sumatra. Großen ist ein neuer *Paradoxurus*, *leucomystax* wegen des großen weißen Schnurbarts.

Das andere eine neue Sippe *Cynogale* zwischen *Paradoxurus* et *Ictides*, von beyden unterschieden durch das lange Gesicht, die zusammengebrückten Lückenähne und den kleinen dreyeckigen Reißzahn. *Cynogale bennettii*.

Aus der Sammlung Kings von Südamerika zwey Füchse, *Canis magellanicus* et *griseus*.

*Sciurus douglasii*; *Lepus longicaudatus*; *californicus* et *douglasii* von Douglas aus Nordamerika.

Drey fliegende Eichhörnchen aus Indien, dem besten

**Lamb:** *Pteromys melanotis*, albiventer, leachi; das letzte von Mellish geschenkt, ist geführt wie *Sciuroptera* in America, aber unterschieden durch den langen und walzigen Schwanz.

**Herpestes brachyurus** von den Moluden, schwarz wie **Herpestes** vom Cap, aber der Schwanz durch die Kürze und Färbung unterschieden.

Die Stünke lassen sich nach der Gestalt der hintern Seiten in drei Untersippen bringen, was er an vier Gattungen zeigt.

**Gould:** über verschiedene Zaunkönige (Wren).

**Troglodytes magellanicus:** Corpore infra griseo fulvo, vinaceo tincto; crisso rufo, supra brunneo; dorso scapulisque striis nigrescentibus obscure ornatis; alis caudaeque rufis, nigro striatis; mandibula superiore nigra, inferiore, nec non pedibus pallide brunneis. Long. tot.  $4\frac{1}{2}$  unc.; rostri  $\frac{1}{2}$ ; alae 2; caudae 2; tarsi  $\frac{3}{4}$ .

Hab. in Fretu magellanico.

Differt a specie *Trog aequinoctialis* Swains. magnitudine majore corporis; rostro minore.

**T. leucogastra:** Corporis parte superiore remigibusque caudae brunneo-rufescentibus olivaceo tinctis; caudae et remigibus secundariis lineis brunneis transversaliter striatis; striga superciliosa, gutture, pectore, abdomineque albis, lateribus, femoribus, crissoque pallide brunneis; mandibula superiore fusca, inferiore subalbida; pedibus brunneis. Long. tot.  $2\frac{3}{4}$  unc.; rostri  $\frac{3}{4}$ ; alae 2; caudae  $1\frac{1}{2}$ ; tarsi  $\frac{1}{2}$ .

Hab. in Mexico, in loco Taumalipas dicto.

**Thryothorus guttatus:** Capite supra brunneo-rubro; striga superciliosa alba lineis quam minimis nigris interrupta; dorso brunneo, plumis longitudinaliter albo striatis; alis albo et brunneo alternatim striatis; remigibus caudae duabus propinquis nigrescentibus; marginibus externis guttis pallide brunneis adspersis, rectricibus duabus externis albo atque brunneo striatis; harum externa ad apicem albo notata; gula et pectore griseo-albis maculis nigris guttatis; abdomine lateribusque albis guttis nigris parvis adspersis; pedibus brunneis; mandibula superiore griseo-alba, inferiore fusco. Long. tot.  $6\frac{1}{4}$  unc.; rostri 1; alae 3; caudae 3; tarsi 1.

Hab. Mexico.

Derselbe über eine neue Sippe in der Gruppe der Zaunkönige.

**Scytalopus:** Rostrum capite brevius, compressum, obtusum leviter recurvum. Nares basales, membrana tectae. Alae concavae, breves, rotundatae, remige prima abbreviata, tertia quarta, quinta et sexta aequalibus. Cauda brevis rotundata (pennis externis brevissimis) laxa. Tarsi elongati atque robusti, antrorsum scutellis tecti; posterius fasciis angustis cincti, squamis serpentum abdominalibus hand dissimilibus; halluc elongato et robusto; ungue elongato; digitum anteriorum medio elongato et gracili.

**Sc. fuscus:** Corpore toto fuliginoso nigro; capitula plumis nonnunquam argenteo-griseis; rostro nigro; pedibus brunneis. Long. tot.  $2\frac{3}{4}$  unc.; rostri  $\frac{1}{4}$ ; alae  $1\frac{7}{8}$ ; caudae  $1\frac{1}{4}$ ; tarsi  $\frac{3}{8}$ .

Hab. in Fretu Magellanico, Chili etc.

Hoc genus ad illud in quo *Troglodytes* verae amplectuntur maximam affinitatem demonstrat.

**Sc. abogularis:** Capite caeruleo-nigro; corpore superiore ferrugineo brunneo, linea transversali nigra; cauda pallide rufo-brunnea; gula, pectore, abdomineque intermedio albis, lateribus et crisso pallido ferrugineis lineae transversali nigra; mandibula superiore nigra brunnea; pedibus brunneis. Long. tot.  $3\frac{3}{4}$  unc.; rostri  $\frac{5}{8}$ ; alae  $1\frac{3}{4}$ ; caudae  $1\frac{1}{2}$ ; tarsi  $\frac{3}{4}$ .

Hab. in Brasilia.

**S. 91. Owen:** über zweien Schädel vom Drang-Utang von Borneo und einen Balg mit dem Schädel eines jungen Drang-Utangs von Sumatra, eingeschickt von Dr. Montgomerie aus Singapore.

Der letztere starb, nachdem er einige Backenzähne bekommen hatte.

Die braunrothe Farbe, der Bau, die Vertheilung und Richtung der Haare stimmt mit dem alten Weibchen von Sumatra überein und hat auch keinen Nagel an dem hinten Damm. Die hintern Backenzähne in jedem Kiefer entsprechen den ersten bleibenden Backenzähnen des alten; die übrigen sind nichts als Milchzähne, nehmlich 8 *Bicuspides*, 4 kleine Eckzähne und 8 Schneidezähne. Dieser Zustand des Gebisses gleicht also dem eines Kindes im 7ten Jahr, woraus man übrigens nicht auf gleiches Alter beim Drang schließen darf: denn beim Menschen dauert der unreife Zustand länger, und daher werden auch ohne Zweifel die Zähne später ausgeschoben.

Von den zweien Schädeln von Borneo weicht einer in Größe und Leisten ab. Der größere gleicht dem des Pongo oder alten Drangs von Borneo im Museum der Chirurgen, und unterscheidet sich in denselben Theilen wie der letztere von dem Schädel des Pongo (der von Sumatra seyn soll) abgebildet in Zool. Trans. I. 380. t. 63., woraus D. vermuthet, daß dieser Schädel einem Drang angehört, als Gattung verschieden von der großen Gattung von Borneo (*Simia wurmbii*).

Der Schädel des großen Drangs von Borneo ist charakterisirt durch die schiefere Ebene der Augenhöhlen und mithin die Geradheit des Schädels zwischen der Stirn und den Schneidezähnen; die äußern Gränzen der Augenhöhlen sind breit und rau, wahrscheinlich wegen der starken Entwicklung der schwierigen Erhöhungen, welche die Seiten des Gesichts bey den alten Männchen dieser Gattung charakterisiren. Die Symphyse des Unterkiefers ist tiefer als bey dem Pongo von Sumatra, dessen Schädel wahrscheinlich von einem Männchen herrührt, nach der Größe und der Entwicklung der Leisten an der Hirnschale zu schließen.

Die Geschlechtsunterschiede zeigen sich am Schädel bey den Affen in der verschiedenen Größe; der des Weibchens ist  $\frac{1}{2}$ .

kleiner; in dem kleinern Leisten und in der kürzeren Symphyse menti beim Weibchen.

Owen betrachtet den kleineren Schädel von Borneo als eine Sattung ebenfalls verschiednen vom großen Pongo (Simia Wurmii) und von dem Drang von Sumatra (S. abelii).

Der Unterschied des kleinern Drangs, der wenigstens um  $\frac{1}{2}$  kleiner seyn muß als die zwey vorigen Drange, beruht zwar nur auf der Vergleichung des Schädels, der jedoch eine vollständige Zahnreihe hat. Er schlägt daher vor, den kleinern Drang von Borneo Simia morio zu nennen, und beschreibt sodann den Schädel folgendermaßen: er sieht aus in Größe und Gestalt als stände er zwischen dem jungen und alten Pongo (S. satyrus); dem widerspricht aber die Vergleichung der Zähne mit den bleibenden im ausgewachsenen Pongo und mit den ausfalligen in dem jungen (S. satyrus), wie auch mit den Keimen der bleibenden Zähne bey dem letztern. Die Zähne von S. morio sind viel größer als die ausfalligen des jungen S. satyrus, und haben zugleich einen andern Größenverhältniß als das ist, welches man bey den permanenten Zähnen des ausgewachsenen findet. So sind die Molares et Bicuspides bey S. morio kleiner, die Eckzähne viel kleiner, während die obern Schneidezähne ziemlich und die untern völlig die Größe von denen des großen Pongo haben.

Man erkennt, daß die Zähne in dem Schädel eines Affen zu den bleibenden gehören, durch den Mangel der Foramina, welche bey einem unreifen Schädel hinter den ausfalligen Zähnen liegen und zu den Höhlen führen, welche die Kronen der bleibenden Zähne enthalten. Das sieht man sehr deutlich bey der Vergleichung von S. morio mit dem jungen S. satyrus, wo sich die ausfallige Reihe findet nebst den ersten bleibenden Molares. Die Milchzähne des jungen Drangs sind außer ihrer geringern Größe mehr aus ihren Höhlen getrieben, von einander entfernt durch das Hervordringen ihrer großen Nachfolger, während die bey Simia morio sehr stecken und dicht aneinander mit Ausnahme des beständigen Raums zwischen den Eck- und Schneidezähnen.

Ich habe verschiedene Schädel von unreifen Drangen aufs neue untersucht, um herauszubringen, ob vielleicht einer davon das Junge von S. morio seyn könnte; aber bey allen waren die Kronen der bleibenden Molares viel zu groß — so groß, daß man deutlich sah, der große Pongo von Wurm oder Abel sey das alte davon. \* Diese unreifen Schädel zeigen auch schon durch die Größe ihrer Augenhöhlen, welche die von S. morio übertreffen, was aus ihnen werden soll: denn die Augen haben wie das Hirn bereits im jungen Pongo ihre volle Größe erreicht.

- \* Die bleibenden Zähne bey dem Pongo von Borneo und Sumatra stimmen in Größe und Gestalt so überein, daß ich nicht im Stand bin, zu sagen, zu welchem von beyden die unreifen Drange gehören. Rede ich von unausgewachsenen Stücken des großen Pongo, so nenne ich sie S. satyrus; vergleiche ich S. morio mit dem ausgewachsenen Pongo, so meine ich den von Borneo mit Naheigkeiten an den Backen (S. wurmii). Sind Wurmii et Abellii verschieden, so ist S. satyrus ein Synonym für beyde.

Daß der Schädel von S. morio ausgewachsen ist, beweist der kleine Raum zwischen den Temporal-Leisten des Scheitels, welcher von der großen Fläche, den der Musculus crotaphytes einnimmt, veruracht wird; ferner die Verwachsung der Zwischenkiefer-Nähe: auch sind die Zähne schon stark abgekaut und die Pfeil- und Lambdanah ver wachsen, ob schon die Interparietal- und Lambdoidal-Rämme fehlen.

Die Hirschale bey S. morio ist so groß wie beim Pongo, und zeigt mithin ein Hirn an, eben so völlig entwickelt wie bey dem letztern, während die Kiefer verhältnismäßig kleiner sind, so daß in S. morio der Schädel viel menschlicher aussieht, weil er sich über den Augenhöhlen erhebt, und gleich dem des Pongo's einen gewölbtesten Scheitel hat als der Chimpansee, und ihm auch die vorpringenden Augenbrauenleisten fehlen, welche den africanischen Drang charakterisiren.

Uebrigens sind dieses bey S. morio die Anhänge der Leisten, welche den Schädel des ausgewachsenen Pongo so auszeichnen.

Diejenigen, welche am äußern Winkel des Stirnbeins anfangen, gehen rückwärts, aufwärts und etwas gegen einander, ohne sich jedoch zu vereinigen; sie werden allmählich schmaler und sind jenseits der Gränznaht nicht mehr höher als die Schädelfläche; man erkennt sie dann nur noch an einer rauhen Linie, welche parallel zur Pfeilnaht geht, sich allmählich auswärts biegt, wieder höher wird und in die Lambdoidal-Leisten übergeht: auf diese Weise umschreiben sie den Ursprung der Temporal-Muskeln. Die Lambdoidal- und Mastoidalleisten sind breiter und stärker als beim Chimpansee, aber schwächer als beim Pongo. Das Hinterhaupt ist fast glatt und gewölbt, ohne die Mittelreisse und die Muskeleinbrüche des Pongo, bey welchem das große Gewicht des Gesichts, starke Muskeln am Hinterhaupt nöthig sind.

Die Schlüsselbeine stoßen bey S. morio an's Stirnbein wie bey Troglodytes niger; das findet sich aber auch manchmal bey S. satyrus, und zwar bald rechts, bald links.

Das Additamentum suturae lambdoidalis findet sich bey S. morio an beyden Seiten, und man erkennt deutlich die Lambdanah; das übrige ist verwachsen.

Beim S. morio ist das Hinterhauptloch nicht so weit hinten als beim Pongo, aber weiter als beim Chimpansee. Die Ebene desselben ist auch nicht so schief wie beim Pongo. Die Gelenkköpfe dafelbst sind vorn soweit von einander als beim Chimpansee. Die Foramina condyloidea anteriora sind jederseits doppelt wie beim Pongo; die Foramina carotidea et jugularia öffnen sich in derselben Vertiefung; stehen aber weiter auseinander als beim Chimpansee: das Felsenbein ist wie beim Pongo kleiner als beim Chimpansee, und die Gelenkfläche für den Unterkiefer größer. Die andern Charaktere am Schädel: grund wie beim Pongo; der enge Gehörgang bey beyden deutet auf eine kleinere Muschel als beim Chimpansee.

Die Zwischenkiefer sind bey S. morio größer als bey dem letztern. Das Nasenbein ist einzelner schmaler, dreieckiger Knochen; beim Chimpansee sind es zwey. Die starke Abreibung der meisten Zähne, besonders der Schneidezähne bey S. morio, deutet auf harte Nahrung: wahrscheinlich zert er

damit die faserige Keisel der Cocosnuß ab; vielleicht nagt er gar die Schale durch.

Länge des Schädels von den Schneidezähnen bis zum Hinterhauptloch von *S. morio* 7" 10"; bey *S. wurmbii* 10" 6"; Höhe bis zu den Gelenkköpfen des Hinterhaupts 3" 7" und 4" 6". Querdurchmesser 4" 8" und 5" 4" ic.

S. 97. *Strickland*, Vögel, die er in Kleinasien im Winter 1835. u. Frühjahr 1836. gefunden hat. Um Weihnachten brachten Schneestürme große Flüge aus dem Norden in die Bay von Smyrna, und dann folgte 3 Wochen lang Frost, was selten ist unter 38½ Gr. R. Dr. Der April dagegen war sehr schön und brachte viele Sommervögel, und er bedauert nur, daß er nicht den ganzen Sommer dort bleiben konnte.

Zwey oder drey Gattungen Geyer und Adler, hat er bloß gesehen.

*Falco aesalon*, selten.  
*F. tinnunculus*, selten.  
*F. tinnunculoides*, häufig, nistet unter Dächern in Dörfern.  
*Accipiter fringillaria*.  
*Buteo vulgaris*.  
*Circus cyaneus, rufus*.  
*Otus brachyotus*.  
*Ulula stridula*.  
*Bubo maximus*.  
*Noctua nudipes*, gemein.  
*Lanius minor, rufus, collurio*, alle im April.  
*Turdus merula, solitarius*, auf Felsen.  
*T. viscivorus, musicus, illiacus*, alle im Winter.  
*Cinclus aquaticus* oder *pallasii*.  
*Oriolus galbula*, April.  
*Saxicola rubicola*, Winters; *aurea*, im April, sehr selten;  
*oenanthe*, April; *rubetra*, gemein im Winter.  
*Phoenicurus phoeniceus* April; *tithys*, gemein, auf Felsen im Winter.  
*Philomela lusciniæ*, Anfangs April.  
*Salicaria phragmitis*, im December.  
*Curruc cinerea*, April; *melanocephala*, einsam, im Gebüsch des Winters.  
*Sylvia rufa*, November.  
*Sylvia brevirostris* n.: *corpore supra olivaceo-brunneo*, *subtus albidus*; *pedibus nigris*, November. 4¾".  
*Accentor modularis*, selten, Winter.  
*Regulus ignicapillus*, Olivenwälder.  
*Troglodytes europæus*.  
*Motacilla alba, boarula*.  
*Anthus pratensis*, gemein; *aquaticus*, selten.  
*Hirundo rustica*.  
*Alauda arvensis*, um Weihnachten in Menge.  
*A. cristata*, sehr gemein.  
*A. arborea*, gemein.  
*A. calandra*, im Winter.  
*Parus major, caeruleus, lugubris*.  
*Emberiza miliaria*, gemein.  
*E. cia*, auf Felsen.  
*E. cirius*, an Flüssen.  
*E. palustris, caesia*, April; *hortulana*, April.  
*E. cinerea* n.: *Capite viridi-flavescente*; *corpore*

*supra cinerascens*, *subtus albo*, 6. p., in collibus, mense Aprili.

*Pyrgita domestica*, ist hier auch der gemeine Hausperling.

*P. hispaniolensis*, selten, April.  
*Linaria cannabina*, gemein.  
*Carduelis elegans*, gemein.  
*Fringilla coelebs*, sehr gemein.  
*F. montifringilla*, Winters.  
*F. serinus*, Winters in großen Flügen.  
*Coccothraustes chloris*, gemein.  
*Sturnus vulgaris*.  
*Corvus corax, cornix*, gemein; *monedula*, gemein.  
*(C. frugilegus* scheint nicht vorzukommen.)  
*Pica caudata*, gemein.  
*Garrulus melanocephalus*, gemein.  
*Sitta syriaca*, an Felsen.  
*S. europaea*, an Olivenbäumen.  
*Upupa epops*, selten.  
*Alcedo isipda*, gemein.  
*Alcedo rudis*, am Salzwasser, schwebt oft darüber, 10' hoch, und stürzt hinein.  
*Picus martius*, selten; *major*, gemein.  
*Cuculus canorus*, April.  
*Phasianus colchicus*, gemein, am Bosphorus.  
*Francolinus vulgaris*, in Sümpfen.  
*Perdix saxatilis*, häufig.  
*Coturnix dactylisonans*, bleibt im Winter.  
*Columba palumbus, oenas, turtur*, April.  
*Columba cambayensis*, auf den Begräbnisplätzen in Sympressenwäldern; wird geschont.  
*Otis tarda*, heißt bey den Europäern Wild Turkey.  
*O. tetrax*, häufig des Winters auf dem Markt.  
*Oedinemus crepitans*, zweifelhaft.  
*Vanellus cristatus*, im Spätjahr in großen Flügen.  
*Grus cinerea*, Ende April.  
*Ardea egretta*, in Meer Sümpfen.  
*Botaurus stellaris*.  
*Ciconia alba*, häufig in allen Dörfern, wird sehr geschätzt, habe Griechenland verlassen, seit man die Mahomedaner vertreiben.  
*Numenius arquatus*.  
*Scolopax rusticola*, im Winter so häufig, daß man sie in Gärten mitten in der Stadt tödtet.  
*Sc. gallinago, gallinula*, beyde häufig.  
*Tringa variabilis*, gemein; *temminckii*, Winters.  
*Totanus glottis*, selten, Winters.  
*T. calidris*, gemein; *ochropus*, selten.  
*Recurvirostra avocetta*, selten.  
*Rallus aquaticus*.  
*Crex pratensis, porzana*, beyde im Winter.  
*Gallinula chloropus*, im Winter.  
*Fulica atra*, im Winter.  
*Glareola torquata*, selten, April.  
*Podiceps cristatus*, häufig bey Constantinopel; wie alle Wasservögel.  
*Puffinus anglorum*, in Flügen am Bosphorus.  
*Larus ridibundus, argentatus*, beyde bey Constantinopel, ganz zahm.  
*Pelicanus onocrotalus*, bleibt im Winter.

*Phalacrocorax carbo*, häufig bey Constantinopel, setzt sich auf Dächer.

*Ph. pygmaeus*, selten, im Winter.

*Cygnus olor*, im Winter.

*Clangula vulgaris*, im Winter.

*Fuligula ferina*, cristata, beyde im Winter.

*Rhynchaspis clypeata*, Winters.

*Tadorna vulpanser*, Winters; *rutila*, häufig auf dem Markt.

*Querquedula acuta*, crecca, beyde im Winter.

*Anas boschas*, Winters.

*Mareca penelope*, Winters.

*Mergus albellus*, im Winter.

*Canis vulpes*.

Er hat auch einen *Lepus hybridus* Pallas aus Südrussland bekommen.

Eine lebendige Argonauta auf Cephalonien; starb nach einigen Stunden und fiel aus der Schale.

102. Ogilby, über 2 lebende Antilopen im Garten, Koba et Kob unvollständig von Buffon und Daubenton beschrieben.

Pennants Koba (*A. senegalensis*) ist Antilope caama, Denham's Korrigum aus Bornu ist ganz vom Koba verschieden; auch das Weibchen hat Hörner und Thränenbälge, welche dem Koba fehlen; heiße *A. corrigum*. H. Smiths Antilope adenota et forfex sind auch nicht Kob und die Antilope vom Gambia; denn diese haben Thränenbälge.

Er hat in Royle's Flora himalaica einen Fuchs unter dem Namen *Canis himalaicus* beschrieben nach zweien Sommerbälgen im Museum und einem Winterbalg, welchen Royle zu Mussoore bekommen hat; selten in Nepal, aber ziemlich gemein in Doon, Kumaon und in dem westlicheren Theil des Gebirgs, wo ihn die Engländer Hill Fox nennen und wegen seiner schönen Gestalt, der glänzenden und mannichfaltigen Färbung sehr bewundern;  $3\frac{1}{2}$  lang, Schwanz  $1\frac{1}{2}$ , Ohren 4", Höhe 1' 5". Gleich dem europäischen und amerikanischen Fuchs (*Canis vulpes et fulvus*) in den schwarzen Zeichen hinter den Ohren und vorn an allen Füßen. Pelz lang, dick, sehr fein, prächtig glänzend. Grundwolle sehr fein, Stachelhaare dergleichen wie beim Fobel. Die Grundwolle ist auch blau oder braun auf dem Rücken; eben so die untere Hälfte der Stachelhaare, welche sodann etwas härter werden, einen breiten, weißlichgelben Ring haben, an der Spitze braun; daher scheint die ganze Oberseite glänzenbroth; Seiten des Halses, Kehle, Rippen, Weichen rein weiß, ins Bläuliche spielend; Hüften und Schenkel grau gedüpfelt wie bereift. An der Seite des Leibes ganz rauchbraun; Ohren auswendig schwarz, und solch ein Streifen läuft vorn auf den Füßen herunter; Sohlen mit gelblich braunen Haaren bedeckt, die Ballen nackt; Schwanz wie der Leib, Spitze weiß.

104. Gray: über das Betragen eines Guckucks. Das Weibchen nimmt sich bisweilen seines von andern Vögeln ausgebrüteten Jungen an, füttert es und lehrt es fliegen.

Gould legt neue Vögel vor aus Neu-Schwabias.

*Petroica phoenicea* m.: Corpore superne fuliginoso griseo, fronte, naribus, marginibusque anterioribus remigum tertialium albo notatis; remigibus primariis rectricibusque griseo-nigris, harum externis plumis penitus albis, gula fuliginosa; corpore subtus coccineo; crisso albo; rostro pedibusque nigris.

Foem. Corpore toto brunneo, tectricibus alae rufogriseo emarginatis; rectricibus externis albis, corpore subtus rufescenti-griseis; rostro pedibusque nigris. Long. tot.  $5\frac{1}{8}$  unc.; rostri  $\frac{1}{2}$ ; alae  $3\frac{1}{8}$ ; caudae 2; tarsi  $\frac{3}{4}$ .

Hab. Nova Hollandia.

*Amadina castanotis*: corpore superne cinereo-fusco; uropygio albo, tectricibus caudae nigris, albo guttatis; genis castaneo-rufis linea alba ad basin rostri; pectore griseo lineis nigris transversim striato; nota nigra in medio pectoris, abdomine albo, crisso ochraceo, lateribus castaneis albo guttatis; rostro aurantico; pedibus subflavis. Long. tot.  $4\frac{1}{8}$  unc.; alae  $2\frac{1}{8}$ ; caudae  $1\frac{1}{2}$ ; tarsi  $\frac{1}{2}$ .

Hab. Nova Hollandia.

*A. modesta*: Fronte sanguinolenta; corpore superiore fusco; alis albo guttatis; uropygio crissoque alternatim striatis lineis albis atque fuscis; rectricibus nigris, duabus lateralibus externis ad apicem albo notatis, gula nigra; corporis inferiori parte cinereo-albido lineis transversim fuscis striato, abdomine intermedio crissoque albis; rostro nigro, pedibus nigrescentibus. Long. tot.  $4\frac{1}{4}$  unc.; alae  $2\frac{1}{4}$ ; caudae 2; tarsi  $\frac{3}{8}$ .

Hab. in Nova Hollandia.

*A. cincta*: capite toto argentato cinereo; gula nigra; corpore toto pallide castaneo, fascia nigra corporis inferiori partem cingente; tectricibus caudae superioribus et inferioribus albis; cauda nigra, rostro nigro; pedibus brunneis. Long. tot.  $4\frac{1}{2}$  unc.; alae  $2\frac{3}{8}$ ; caudae  $2\frac{1}{4}$ ; tarsi  $\frac{5}{8}$ .

Hab. in Nova Hollandia.

*A. ruficauda* m.: fronte genisque coccineis his albo striatis; corpore superne olivaceo-fusco; tectricibus caudae caudaeque fusco coccineis, illis guttis pallido rubris ornatis; gula corporeque inferne olivaceis, griseis, albo transversim notatis, abdomine intermedio crissoque flavido albis; rostro coccineo, pedibus pallidi brunneis.

Foem., vel mas junior. Corpore toto cinereo fusco, abdomine intermedio albo; canda rufescente-brunnea. Long. tot.  $4\frac{1}{4}$  unc.; alae  $2\frac{3}{8}$ ; caudae  $1\frac{3}{4}$ ; tarsi  $\frac{5}{8}$ .

Hab. in Nova Hollandia.

*Calodera maculata*: Capite supra auricularibus et gula nitide brunneis, scapula pluma cinereo-argentato cincta; fascia nuchali rosacea; corpore superne caudaeque intense brunneis; apicibus plumarum in dorso, uropygio, scapulisque fulvo large guttatis; remigibus albidis; rectricibus flavido-albis, ad apicem notatis; corpore subtus

cinereo; lateribus transversaliter brunneo striatis; rostro pedibus fusco brunneis. Long. tot.  $11\frac{1}{4}$  unc.; rostri  $\frac{1}{4}$ ; alae 6; caudae  $4\frac{3}{4}$ ; tarsi  $1\frac{5}{8}$ .

Hab. in Nova Hollandia.

Differt a *Ptilonorhynchus nuchale* Jard., magnitudine inferiore, nec non maculis superne sparsis.

*Cracticus hypoleucus*: nucha, dorso, tectricibus caudae, crisso, rectricibusque caudae ad basin, albis, reliquis paribus nigris, rostro ad basin plumbeo in nigrum transeunte. Long. tot.  $14\frac{1}{2}$  unc.; rostri 2; alae  $9\frac{3}{4}$ ; caudae  $5\frac{3}{4}$ ; tarsi 2.

Hab. Van Diemens-Land.

Differt a specie *Cracticus Tibicen* appellata, rostro et tarsi brevioribus, aequae as dorsi albo colore.

Hab. in Terra Van Diemen dicta.

*C. fuliginosus*: Corpore toto fuliginoso; remigibus, rectricibusque caudae ad apicem albis, rostro pedibusque nigris. Long. tot. 18 unc.; rostri  $2\frac{1}{2}$ ; alae 10; caudae 7; tarsi  $2\frac{1}{4}$ .

Hab. in Terra Van Diemen dicta.

*Calyptrorhynchus Naso*, mas.: capitisrista, et toto corpore nitide nigris, rectricibus caudae duabus intermediis exceptis; fascia late coccinea cinctis; rostro praegrandi ad basin pallide plumbeo; pedibus caeruleo nigris.

Roem. Differt crista genis corpore superne guttis flavis adpersis; corpore inferiore transversis lineis coccineis atque flavis ornato; fascia caudali coccinea, lineis nigris interrupta, rostro albo. Long. tot. 22 unc.; mensura rostri verticalis,  $2\frac{3}{4}$  unc.; alae 14; caudae  $10\frac{1}{2}$ ; tarsi  $\frac{3}{4}$ .

Hab. in Nova Hollandia ad flumen Cygnorum.

*C. Naso* differt a reliquis generis speciebus rostri magnitudine, sed corporis magnitudine praeter unam omnibus inferiore.

N o v e m b e r 1 8 3 6.

E. 107. E. Mackay, Vice Consul zu Maracaibo über die Lebensart des Vultur papa.

Sie sammeln sich oft zu 300, und fliegen so hoch, daß man sie aus dem Gesicht verliert; erkennen aber doch noch ihren Raub. Ihr Aufenthalt ist in den warmen und trockenen Savannen, und sie gehen nicht über 5 oder 6 Leuten von ihrem Brutplatz weg. Die Eier legen sie in kleine Höhlen auf den Bergen. Entfernt von Wohnungen und Straßen sind sie in Menge bespinnen, sonst aber sammelt der sogenannte König, welcher sich im Gefieder etwas unterscheiden soll, seine Vasallen nicht.

Martin: Neue Rasse, *Felis marmorata*, mitgebracht von Goud aus Java und Sumatra.

Sie ist sehr schön und zuerst erwähnt von Jardine in Naturalists Library mit zwei Abbildungen nach Exemplaren in

Edinburg, aber verwechselt mit *Felis diardi* (Cuv. off. foss. IV. 437), womit sie so wie mit *Felis bengalensis* große Verwandtschaft hat in Färbung und Zeichnung. Vielleicht ist *F. diardi* einerley mit *F. macroscelis*.

*F. marmorata* ist lang 1' 11", Schwanz 1'  $3\frac{3}{8}$ ". Höpfe  $10\frac{1}{2}$ ", Kopf  $5\frac{1}{2}$ " l.

Ist ausgewachsen. Färbung röstig grau, das Brauntöne vorherrschend auf Kopf, Nacken, Rücken, Brust, Schultern und Schenkeln. Auf dem Scheitel zwei schwarze Längszeichnungen, die schwarze Ringe einschließen, und auswendig daran entstehen über den Augen zwei schwarze Linien, welche auf dem Nacken breiter werden und dann zur Schulter gehen. Von den Seiten auf dem Kopfe läuft eine unterbrochene Linie nach dem Rückgrath, vergrößert sich zwischen den Schultern in längliche offene Flecken, welche dann als ein Streifen zur Schwanzwurzel gehen, der sich auf den Hüften in zwei parallele Streifen theilt. Ohren kurz, abgerundet, grau, schwarz an Grund und Spitze. Seiten des Halses, Schultern, Füße voll schwarzer Flecken; die Seiten marmoriert mit schiefen, grauen Längszeichnungen, welche schwarz gestäumt. Bauch schmutzig weiß mit schwarzen Flecken in Querreihen, Schwanz oben grau, unten gelblich grau, marmoriert, mit undeutlichen schwarzen Ringen, Spitze schwarz. Kleiner als *Felis macroscelis*, größer als *F. bengalensis*, steht zwischen beyden.

E. 109. Harvey schießt einen Bitterrochen von Teignmouth. Die Fische fassen ihn am Schwanz und bekommen dann keinen Schlag.

E. Jesse schießt einen Karpfen, 30" lang, Umfang 24, Gewicht 22 Pfund. Solch ein großes Stück ist in England noch nie gesehen worden.

Martin: Anatomie des Koala (*Phascolarctos fuscus*). Junges Männchen, geschenkt vom Capitän Mallard.

Unterscheidet sich vom Wombat durch das Gebiß, welches ganz dem Känguruh gleicht; die Eingeweide dagegen dem Wombat. Hat einen Zügelbeutel und Knochen, zu welchen der Musculus pyramidalis geht. Panniculus carnosus sehr stark; Gallenblase; Magen durch eine Einschnürung in 2 Stücke getheilt; Häute dünn; unten an der Speiseröhre eine dicke Drüse mit vielen Gängen. Blinddarm ungeheuer groß, 4' 2" lang, Dickdarm über 6' 4"; Dünndarm nicht angegeben. Duales Loch geschlossen; Ruthe etwas gespalten, Samenbläschen, Schilddrüsen; Speicheldrüsen groß; Zunge hinten dick, schmal, vorn abgerundet, 2' lang,  $\frac{1}{2}$  breit.

E. Burton: eine Pipra vom Himalaya, die erste Gattung aus dieser Gegend.

*P. squalaria*: capite et cervice supra brunneis; interscapulo, dorso alis et cauda viridescenti-brunneis; hac ad regionem subapicalem brunnea saturatori, sed apice externo albo gracilliter fimbriata; alarum caudaeque pogonibus externis olivaceo leviter tinctis; corpore infra ubique albidio. Mandibula superior fusca, inferior albidio apice fusco. Pedes nigri. Long.  $3\frac{3}{8}$  poll. Alae caudam aequantes.

Hab. apud Montes Himalayenses. In Museo Militari. Chatham.

### 113. G. Bennett: über *Glaucus hexapterygus*.

Am 20. April 1835. wurden mehrere vollkommene und beschädigte Stück unter  $4\frac{1}{2}$  Grad N. B. und  $19\frac{1}{2}$  W. L. bey stillem Wetter Nachmittags um 3 Uhr in einem Schleppnetz gefangen. In einem Glas mit Seewasser wurden sie bald wieder munter, schwammen herum und erregten durch den Glanz ihrer Farbe und die Saftsamkeit ihrer Gestalt die Bewunderung der Beschauer.

Der Rücken, die obere Seite der Flossen- und fingerförmigen Fortsätze, der obere Theil des Kopfes und Schwanzes waren lebhaft purpurn, glänzender, wenn das Thier sich bewegte, matter, wenn es ruhig auf der Oberfläche floß. Der Bauch und die untere Seite der Flossen sind schön perlweiß wie mit Schmelz überzogen.

Die gewöhnliche Länge  $1\frac{3}{4}$ ", bisweilen zwei Linien mehr oder weniger. Der Leib ist fast walzig und endigt allmählich in einen dünnen Schwanz mit sehr zarter Spitze. Kopf kurz mit zwey Paar, sehr kleinen, kegelförmigen Fühlfäden, zweien oben und zweien unten; jederseits 3 Kiemenslossen, gegenüber Anfangs breit und am Ende fingerförmig getheilt (bey *Glaucus octopterygus* 4); die Zahl der fingerförmigen Fortsätze wechselt und in der Mitte sind die längsten; die erste Flosse, welche dem Kopf am nächsten steht, ist breiter und derber als die andern. Der Mund ist mit knöchernen Kiefern bewaffnet; der Leib gallertartig mit einer dünnen und äußerst empfindlichen Haut bedeckt.

Diese Thierchen sind in ihrem Bau sehr zärtlich und gebrechlich, und obgleich viele, ich kann sagen, eine Menge gefangen wurden, so waren doch sehr wenige in einem vollkommenen Zustand; den einen fehlte eine, zwei oder mehr Flossen, und andere waren ganz zerquetscht. Kein einziges von den jetzt und später gefangenen hatte den Silberstreifen auf dem Rücken vom Kopfe zum Schwanzende, welcher auch zu den Flossen und längs der Mitte der Finger sich verzweigen soll. Man fieng in demselben Netz einige Porpiten, welche jenen zur Nahrung dienen.

Es machte mir viel Verdruß zu sehen, welche Ueberdrehung der Tod in der Schönheit dieser artigen Thierchen hervorbrachte, und daß alle Mittel, sie zu erhalten, vergebens waren. In Wermesthogen zogen sich die Zweige der Kiemenslossen sogleich zurück. Die schöne Purpurfarbe verbleichte, und das zarte Perlweiß an der untern Seite des Leibes und der Flossen wurde matt und verschwand. So gieng diese schöne Schnecke in weniger als einer Stunde zu Grunde. Manche andere Weichthiere verlieren auch bald ihre Farbe, behalten aber ihre Gestalt: diese aber ändern beides sehr schnell.

Nimmt man sie in die Hand, so geht das schöne Perlweiß an der Unterseite bald ab, und zugleich erscheint es wie eine kleine durfsichtige Blatter, worin eine Menge Luftblasen sammt den Eingeweiden. Wenn Aufschneiden des Bauchs gebt eine große Menge Luftblasen heraus; vielleicht heißen sie dem Thier oben auf dem Wasser flößen.

Cuviers Abbildung in seinen Mollusken ist ziemlich gut, aber kein Grabstichel kann dem Beschauer die unbeschreibliche Zartheit und Schönheit dieser Schnecke wiedergeben; die fingerförmigen Fortsätze sind übrigens an der Wurzel zuviel ge-

Flis 1838. Heft 3.

trennt; auch ist der After an der rechten Seite gezeichnet, während er in meinen Stücken zur Linken lag, etwas unter der ersten Flosse. Ich halte ihn auch zugleich für das Geschlechtsloch, weil ich in einigen von meinen Stücken einen ziemlich engerang von Dupsen, aussehend wie Eger, herauskommen sah. Eines gab auch aus dieser Oeffnung eine große Menge hellbrauner Flüssigkeit von sich, ohne Zweifel Roth. Nach dem 20sten wurden nur wenig gefangen; am 24ten aber unter  $21\frac{1}{2}$  Grad N. B. 20 W. L. bey fast ruhiger Luft schwamm eine große Menge um's Schiff, und ich konnte mit dem Zugnetz soviel fangen, als ich nur wollte; denn sie schwammen sehr oberflächlich auf dem Wasser. Sie waren alle von derselben Gattung. In ein Glas gesetzt waren sie sehr lebhaft, bewegten sich manchmal herum, jedoch nicht hurtig; und dann ließen sie sich auf dem Wasser flößen, indem sie nur ganz sachte die Flossen bewegten. Dabey zeigten die Seiten des Kopfes, des Rückens, Schwanzes und die Finnen ein hellsilberiges Blau, welches wunderbar schön abfiel gegen das tiefere Blau der oberen Seite und einen ungemein reichen und zierlichen Anblick gewährte, indem es mit dem Perl- oder Silberweiß der untern Seite zusammenfiel. In der Ruhe läßt das Thier oft eine und die andere Flosse fallen; berührte man sie aber, so richteten sie sich sogleich auf, kehrten sich nach dem Rücken, als wenn sie den Gegenstand wegstoßen wollten, womit eine allgemeine Bewegung des ganzen Leibes verbunden war. Berührte man es auf dem Rücken, so schien es daselbst mehr Empfindlichkeit zu zeigen als an irgend einer andern Stelle. Als ich es mitten auf dem Rücken schwach und schnell mit einer Feder berührte, so sank es, als wenn es hinunter gedrückt würde, und warf zugleich Kopf, Schwanz und alle Finnen nach oben, worauf eine allgemeine Krümmung des ganzen Leibes erfolgte, als wenn ihm die sachte Berührung ungeheuren Schmerz verursacht hätte. Ich fand immer jeden Theil von der oberen Fläche des Leibes bey der Berührung sehr empfindlich; es entstand jedesmal eine Bewegung von Umbiegen am ganzen Leibe. Sie haben eine eigene Manier, den Kopf gegen den Schwanz zu schlagen und diesen gegen den Kopf, wenn sie irgend einen unangenehmen Gegenstand entfernen wollen. In diesem Falle scheinen sie von ihrer Starre plötzlich plötzlich aufzuwachen und die größte Thätigkeit in ihren Bewegungen zu zeigen. Werden sie viel gereizt, so werfen sie den Leib gewaltig herum, rollen den Kopf, Schwanz und die Flossen fast rund zusammen, und wieh der plagende Gegenstand nicht entfernt; so strecken sie plötzlich den Leib, rollen sich wieder auf und bleiben eine kurze Zeit wie erschöpft liegen. Hört die Reizung auf, so nimmt es wieder ganz ruhig seine gewöhnliche Lage an, und läßt etwa nur eine oder zwei von den ermüdeten Flossen fallen, je nachdem es sich mehr oder weniger wohl befindet. Wird es nicht beunruhigt, so flößt es ruhig auf dem Wasser fast ohne alle Bewegung außer derjenigen, welche von den wellenförmigen, bisweilen drehenben Bewegungen der Flossen Zweige herkommt.

Eine schöne Kreisbewegung einer Flüssigkeit auf der Rückenseite durch das Verengungsglas zog mich sehr an. Man sieht nemlich durch die halb durfsichtige Membran des Rückens dicht unter der Oberfläche sehr deutlich eine Flüssigkeit nach zwey Richtungen strömen, eine nach unten und eine nach oben [soll wohl bedeuten eine nach hinten und eine nach vorn]; zwey besondere Gefäße aber konnte ich nicht entdecken.



Sie scheinen in ihren Bewegungen sehr träg zu seyn, ob schon sie manchmal flöhend auf dem Wasser sehr eifrig ihre Flossen umher bewegen. Das dauert aber nicht lang; bald lassen sie die Flossen nachlässig herunterhängen, als wären sie von der kurzen Anstrengung, wodurch sie nicht einen Zoll weit gekommen waren, ermüdet, und selbst wenn diese gleichgültigen Geschöpfe sich die Mühe gaben; sich von einer Seite des Glases zur andern zu bewegen; so geschah es auf eine sehr lahme Art, indem sie zuerst mit einer einzigen Fühne steuerten, und dann mit den andern je nach den Umständen.

Ich that einige kleine Exemplare von Porpiten in das Glas, um zu sehen, ob die Gläusen sie angreifen würden: denn vor einiger Zeit war eine dieser Schnecken dicht an einer Porpita und wurde von deren Fühlfäden auf dem Rücken berührt und belästigt; sie ertrug es zwar mit ihrer gewöhnlichen Unge duld, jedoch ohne einen Angriff auf die Porpita zu machen. Endlich faßte sie dieselbe doch zwischen ihre Kiefer, und ich konnte glücklicher Weise durch eine Linse zusehen, wie sie kraß, augenscheinlich mit einer saugenden Bewegung; und dabei flösten alle Flossen herum ganz wie im Zustande der Ruhe. Nie sah ich, daß sie dem Thier zum geringsten Nutzen dienten, weber zum Fangen noch Halten des Raubes, während er aufgefressen wurde. Es scheint sich beim Fangen bloß des Mundes zu bedienen; wenigstens sah ich jetzt und noch andere Mal, daß es sogleich mit dem Munde den Raub faßte und denselben mit ihm allein verschluckt, während er durch eine Art von saugender Bewegung verschluckt wurde. Die Flossenzweige helfen daher wohl bloß bey der Richtung der Bewegung, wober sie sich wenden und schlingen, wie es bemerkt worden istf.

Als die Schnecke die Fühlfäden und fast alles Weiche auf der untern Seite ihres Raubes verzehrt hatte, ließ sie den hornigen Theil fallen und blieb nun nach ihrem Mahl ruhig auf dem Wasser liegen, wober man keine Bewegung sah als das Spiel der Flossenzweige. Die verstümmelten Ueberbleibsel der Porpita sanken auf den Boden.

Bald nachher fieng eine andere Schnecke an, eine andere Porpita anzubeißen; sie kraß aber nur ein wenig, erneuerte aber den Angriff in kurzen Zwischenräumen. Bey Untersuchung der Porpita fand ich die Scheibe von den Fühlfäden und andern weichen Theilen entbloßt; nur ein kleines Stück der weichen Theile hing noch daran. Die Scheibe war nur an derjenigen Stelle etwas beschädigt, wo die Schnecke sie zuerst angepackt hatte.

Kam eines dieser Thiere mit einem andern in Berührung, so zeigte es kein Mißbehagen, rollte sich nicht und zeigte gar keine böse Neigung gegen das andere; oft schwammen sie neben einander her ohne Zeichen von Unzufriedenheit, ob schon die Flossenzweige an einander stießen; selbst wenn man sie an einander brachte, blieben sie ganz ruhig und friedlich.

Befah man den Rücken des Thiers bey starkem Licht, so bemerkte man an jedem Rand eine schwarze Linie, welche sich mitten auf jede Kieme verzweigte; und bisweilen sah man oben auf einer Flosse zwei schwarze Linien, ob schon die gegenüberstehende nur eine zeigte.

Der Rand zwischen der Purpurfarbe des Rückens und

der silberweißen des Bauches zeigte oft ein schönes Goldgrün. Diese Farbenänderungen kamen aber wahrscheinlich vom einfallenden Lichte her.

Diese Thierchen gehen bald zu Grunde: ich konnte keines lang erhalten, ob schon das Wasser oft erneuert wurde. Beim Tode schrumpften die Flossenzweige ein und die Besehung gieng so schnell vor sich, daß der ganze Leib eine gestaltlose Masse wurde, einige Theil bläulich und dann schwärzlich oder bräunlich schwarz. Ich habe selten ein gallertartiges Thier gesehen, das so derb im Wasser war und sich doch so schnell zerlegte, wenn es daraus entfernt wurde. Selbst die schöne Purpurfarbe des Rückens, die silberige des Bauches und das silberige Blau der Seiten verschwanden bald, ja augenblicklich beim Tod, als wenn sie wären weggewaschen worden; die ausgestreckten zarten und schönen Flossen mit ihren Zweigen sieht man nicht mehr; sie schrumpfen auf nichts zusammen.

Nimmt man eines lebendig aus dem Wasser und legt es auf die Hand, so ist es wegen seiner außerordentlichen Zartheit fast in demselben Augenblicke zerstört. Die Flossenzweige fallen ab, und mit der letzten Bewegung verschwindet die Schönheit des Thiers; es verliert gleich die schönen Farben und wird eine eckelhafte Masse.

Aus dem Netz durften sie nicht mit den Fingern genommen, sondern die Maschen, woran sie hingen, mußten ins Wasser getaucht werden, worauf die Thierchen von selbst davon schwammen.

Ungeachtet ihrer Brechlichkeit schienen sie doch ohne Verletzung im Wasser herum; trägt man aber das Glas von einem Ort zum andern, wober das Wasser in Bewegung kommt, so werden sie augenscheinlich unruhig und lassen die Flossen hängen. Was wird also mit ihnen bey stürmischen Wetter? Leben sie vielleicht wie die Eintagsfliegen nur kurze Zeit und gehen dann bey Myriaden zu Grunde?

Wir sahen bloß vom Schiff eine zahllose Menge; wie viele Myriaden muß es also weiter hinaus geben!

Man hat den Schwanz dieses Thiers mit dem der Eidechse verglichen: die Vergleichung ist ganz gut, nicht bloß rücksichtlich der Gestalt, sondern auch der Bewegung, wenn man jenem etwas mehr Biegsamkeit zumißt; manchmal schlägt das Thierchen den Schwanz auf den Rücken, als wenn es etwas abwischen wollte; und ein andermal drehte es den Kopf auf die Seite, auch als wenn es dort einen plagenden Gegenstand verschuchen wollte. Die Bewegung beim Fressen sieht aus wie bey einer Raupe.

Wir sahen keine mehr bis zum 15. May Nachts 10 Uhr unter 24 1/2 Grad N. und 31 W. L. bey einem mäßigen Wind und schönem Wetter. Man fieng viele dieser Schnecken nebst Vesellen u. Porpiten, wovon einige der letztern zum Theil angefressen waren u. von einigen nur die hornige Scheibe übrig war. Daß dieses die Glaci gethan hatten, war nach den früheren Beobachtungen nicht zu bezweifeln; überdies hatten wir früher schon Beweise, daß sie auch bey Nacht herumschwärmten. Später sahen wir keine mehr.

In einigen Fällen sah ich auch, daß selbst die hornige



Scheibe der Porpiten in kleine Stücke zerbitzen war. Das letzte Mal fanden sich auch entlöste Scheiben von Beellen. Außer den Gauen frist sich auch *Janthina fragilis*, welche ähnliche Kiefer hat, Porpiten und Beellen; wir haben sie an der letztern hängend gefangen.

### S. 119. Ogilby: über Vögel in der Sammlung.

#### 1. *Ixalus probaton*.

Ein einziges Fell dieses abweichenden Thiers von Dr. Richardson; es wurde für das Weibchen von *Antelope furcifer* gehalten, was nicht seyn kann. Es ist ein Männchen von der Größe eines Damhirsches; Länge 4' 4 1/2"; Schwanz 5 1/2; Kopf 9 1/4; Ohren 3 3/4. Obgleich das Fell von einem ausgewachsenen Thier ist, wie es die bleibenden und stark abgekauften Schneidezähne beweisen; so hat der Kopf doch keine Hörner, sondern an ihrer Stelle nur 2 kleine nadelnde flache Schuppen, unter welchen sich die Hirnschallknochen noch befinden. Färbung oben gleichförmig blaß röthlich braun; eben so auswendig an den Gliedern; Brust, Bauch am After und innwendig an den Schenkeln graulich weiß; ebenso der untere Theil der Backen, die Lippen, das Kinn; die Kehle aber und die untere Seite des Halses blaß röthlich braun wie der Rücken und die Seiten, oben auf dem Schwanz kurze röthliche Haare wie auf dem Leibe, unten nackt in Gestalt und Länge wie bey reinigen Hirschen; Nase behaart wie bey den Geissen. Das Thier hat große Thränenbälge mit einem runden Loch, Weichen-Poren und zwey Zehen wie die gemeine Antilope (*A. cervicapra*); große Afterklauen und keine Spur von Kniebscheln (*Scopae*) vorn und hinten; paßt daher zu keiner bekannten Gruppe von Wiederkäuern. Daß es kein Hirsch ist mit abgeworfenen Geweihen, beweist der Mangel des Rosenstocks, die Behaarung der Lippen, die zwey Zehen und die Weichen-Poren. Es kann auch kein Schaf und keine Geiß seyn, wie es die Thränenbälge, die Weichen-Poren und die Länge und Gestalt des Schwanzes beweisen, welcher bey den übrigen Gattungen dieser Sippen fast nur ein Höcker ist. Es kann auch nicht das Weibchen von *A. furcifer* seyn, weil dieses Stück ein Männchen ist und überdieß große Afterhufe hat. Man könnte es nur für eine ächte Antilope halten, welche die Hörner durch einen Zufall verloren hat, was wohl möglich ist. Die anderen Charaktere stimmen mit denen der gemeinen indischen Antilope überein, und wenn es wirklich dahin gehört, so kann man es *A. ixalus* nennen, nach dem Namen eines Wiederkäuers in der Sibire.

#### 2. *A. euryceros*.

Von dieser prächtigen, noch unbeschriebenen Gattung haben wir ein Paar Hörner am Fell und ein Paar am Schädel seit langer Zeit, ohne daß man wußte woher; ich glaube aber mit Grund, daß sie aus dem westlichen Africa kommen. Geraden Länge 2' 1 3/4", krumme 2' 7 1/2", Umfang am Grunde 10", Abstand 1, an den Spigen 11. In der Gestalt haben sie einige Ähnlichkeit mit denen von *A. strepsiceros*, eben so gerunzelt, mit einem Grath an der hinteren Fläche; sie machen aber nur eine Spiralförmige statt 2, und ihre Richtung liegt durchaus in der Ebene des Vorderkopfes, während sie beim Kudu mit demselben einen Winkel von 100 Grad machen. Auch der Schädel gleicht dem des Kudus, ist aber breiter und

größer. Die Enden der Hörner haben die Farbe des Essensbeins. Schnauze groß; keine Thränenbälge; ein weißes Querband im Gesicht unter den Augen und zwey weiße Flecken auf jedem Backen. Alle diese Charaktere unterscheiden die natürliche Gruppe, wozu der Kudu gehört, die gegenwärtige Gattung, der Buchhof, die Quib und die schöne von Bennett erwähnte Gattung (*Proceedings* 1833. S. 1 Rhox), welches eine ächte Antilope ist. Ich habe Felle davon bekommen von der Westküste von Africa und werde sie bald beschreiben unter dem Namen von *A. doria*.

3. *A. philantomba*. Zwey Weibchen dieser kleinen Gattung lebten eine Zeitlang im Garten, kamen von Sierra Leone und wurden von Mac Cormick geschenkt. Rendall versicherte mich, daß sie bey den Negeren *Philantomba* hieß. Das größere und ältere Stück hat kleine Hörner 1 1/2" lang, schwach vorwärts gebogen, unten mit 5 oder 6 kleinen Ringen; unterscheidet sich von der Zwergantilope des Caps durch längeren Schwanz und Ohren, die letzteren innwendig mit weißen Haaren. Leib dunkel mausfarben, die Füße ebenso, während sie bey der capischen Gattung sandbroth sind. Da aber auch das Weibchen Hörner hat, so wäre ich sehr geneigt, es für *A. maxwellii* zu halten.

4. *A. sumatrensis* (Camping Outan) wird mit *A. thar* verglichen, um ein Versehen von Friedrich Cuvier zu berichtigen. Sie soll Thränenbälge und Kieferdrüsen haben, wie *A. mergens* und einige andere: sie hat zwar jene, aber keine Spur von den letztern. Das Weibchen soll ferner keine Hörner und nur 2 Zehen haben, das vorgelegte Exemplar ist ein junges Weibchen; hat ziemlich große Hörner und 4 Zehen, also ganz wie das alte Weibchen von *A. thar*.

5. *A. palmata*. Oberst Smith hat ein Paar unvollkommene Hörner beschrieben, blieb aber unentschieden, ob es nicht eine Art des Prongbocks (*A. furcifer*) ist. Das vorliegende vollkommene Paar Hörner mit Haut und Schädel beweist einen Gattungs-Unterschied, aber die Heimath ist ganz verschieden von derjenigen, welche Smith dem Thier anweist. Es kam von Mexico, wo es nach Doctor Coulter ziemlich gemein ist. Die Hörner find 2 oder 3mal größer als die von *A. furcifer*, und statt wie hier, fast parallel zu seyn, gehen sie weit auseinander und haben hakenförmige Enden. Das Gesicht ist auch sehr dunkelbraun; während es bey *A. furcifer* ebenso hellfahl ist, wie die oberen Theile des Leibes.

S. 121. Gray zeigt eine Argonauta mit einer Ocythoe vom Vorgebirg der guten Hoffnung, und sagt, daß er bey Vergleichung mit andern Weichthieren dieses Thier für einen Schmarotzer halte.

1. Das Thier hat in seiner Organisation nichts zur Bildung der Schale und auch keine Haftmuskeln, wie alle andern Cephalothiere, und gleicht in jeder Hinsicht den nackten Cephalopoden.

2. Die Schale stimmt gar nicht mit der Gestalt des Leibes überein, sondern gleicht der von *Carinaria*.

3. Der Leib kann keine kassige Materie abgeben: denn es macht keine Schwidmände, und die Höhle dem Leibe anzu-

sen, wenn er sich vergrößert; auch überzieht es Sand, den man oft unter den Eiern findet, und der die Haut reizen muß, nicht mit Raß, wie andere Schalthiere.

4. Die junge Schale des soeben ausgeschlossenen Thiers, welche während des Wachstums die Spitze der Schale bleibt, ist 10mal größer als die Eier in der oberen Höhle der Argonauta.

5. Er glaubt, daß Poli sich geirrt habe, als er meynete, das Thier im Ey einer Ocythoe mit dem Rudiment einer Schale bedeckt gefunden zu haben: denn alle Weichthiere (Cephalopoden) wie andere sind mit einer gut entwickelten Schale bedeckt, selbst vor der Entwicklung der anderen Organe; und die Figur, welche Poli von dem Rudiment gibt, stimmt nicht mit dem Nucleus in der Spitze der Argonauta überein.

6. Die verschiedenen Gattungen von Argonauta sollen auch von verschiedenen Gattungen Ocythoe bewohnt werden: das zugegeben, so beweist es nur, daß jede dieser Sippen örtliche Gattungen haben. Dasselbe könnte man auch bey den Einsiedler-Krebse finden, ohne daß es bewiese, daß sie die Schalen verfertigen.

7. Schon einige Exemplare von Ocythoe, stehend in ihren Schalen, Quersfurchen haben, welche denen der Schale entsprechen, so sind diese Furchen doch bloß durch den Druck des toten Thiers gegen die Schale entstanden: denn die außerhalb der Schalen gefundenen oder die noch lebendig herausgenommenen haben diese Furchen nicht, und auch nicht die zusammengedrückte Gestalt von der Ausbuchtung der Schale. Einige Exemplare vom Vorgebirg der guten Hoffnung, wovon er eines vorlegte, welche während der Reise auf der Seite in der Schale lagen, hatten die obere Seite glatt und rundlich, die untere flach und gebogen wie die Schale, auf die sie durch ihr eigenes Gewicht drückten: ein anderes Stück dagegen aus dem Mittelmeer war aufrecht mit dem Maul nach oben gepackt, so daß es auf jeder Seite der Schale gleich drückte; daher war es auch an jeder Seite flach und gebogen, wie das Exemplar von Jerussac.

Er bemerkte noch, daß die Gattungen der Schalen schwer zu unterscheiden seyen, die An- oder Abwesenheit der Stacheln oder Ohren auf dem Rücken der Windungen nicht wichtig seyen, da es von allen sogenannten Gattungen Exemplare gebe, welche sie nur auf einer Seite haben.

E. 123. Owen: über zweien Eingeweidwürmer im Magen des Tigers.

Der Magen eines jungen Tigers, welcher an einer Verletzung der Aorta gestorben war, zeigte innenwärtig 5—6 scrophulöse Geschwülste  $\frac{1}{2}$ —2" groß. Beym Wegnehmen des dicken Schleims sah er auf den größten 2—3 Löcher, auf den kleinern nur eines; sie führten zu Höhlen, worin zwey Arten Spulwürmer saßen, einige 1" lang und 1" dick, andere nur 5" lang und  $\frac{1}{2}$ " dick; von jenen nur zwey, von den kleinern eine zahllose Menge.

Von den großen sind die Männchen  $\frac{1}{4}$  kürzer. In beyden Geschlechtern die Enden etwas verbündet; das Mundende stumpf und abgestutzt; bey den Männchen das Schwanzende mehr gebogen und stumpf.

Die Oberfläche des Leibes fein quer gestreift; geschluckt wegen der durchscheinenden weißen Geschlechtsröhren und des gelben Darms. Unter der Lupe die zwey vordern Drittel mit Ringstreifen kleiner rückwärts gerichteter Stacheln bedeckt, welche in 3 Spitzen endigen.

Der Mund von einer angeschwollenen Kreislippe umgeben, bewaffnet mit 6 oder 7 Ringstreifen Stacheln, wie am Leibe.

Die Mundöffnung selbst ist ein senkrechter elliptischer Spalt, jederseits von einer fieserartigen häutigen Falte begrenzt, deren Vorderrand in drey Hornspitzen verlängert ist und über die Lippe hinaus geschoben werden kann.

Die Öffnung des Eyergangs liegt  $\frac{1}{3}$  vom hintern Ende; der After beym Weibchen ist ein Querspal am hintern Ende und an der concaven Seite der Biegung.

Der After des Männchens, von dessen vorderem Theil ein einfaches, schwach gekrümmtes, intromittentes Spiculum hervorgehoben ist, ist umgeben von 8 Papillen, 3 jederseits in einer senkrechten Reihe und zwey an der untern Gränze des Afteres und der männlichen Eichel.

Dieser Wurm hat Ähnlichkeit mit *Strongylus trigonoccephalus*, mit einer *Bursa maris subglobosa*, biloba, multiradiata, ziemlich so, wie die äußern männlichen Organe bey der neuen Gattung sind, nemlich ihre Öffnung umgeben von 8 Höckern, fast wie Strahlen. Aber damit hört die Ähnlichkeit auf: es gibt hier keine kugelige, zweyblappige Scheide für das intromittente Organ; der Mund ist mit einer kreisrunden Lippe umgeben, statt einer dreyeckigen; bey *Str. trig.* ist er nackt, hier aber auf eine so merkwürdige Weise bewaffnet, daß ich das Thier als seine eigene Sippe betrachten muß, *Gnathostoma*.

*Gnathostoma*: Corpus teres, elasticum, utrinque attenuatum. Caput unilabiatum, labio circulari tumido integro; os emissile, processibus corneis maxilliformibus duobus lateralibus denticulatis. Genitale masculum spiculum simplex, ad basin papillis circumdatum.

Gn. spinigerum: capite truncato, corpore seriebus plurimis spinulorum armato.

Der sippische Unterschied wird durch die Anatomie bestätigt: es finden sich Organe, welche man bey den Eingeweidwürmern noch nicht entdeckt hatte; ich meyne vorzüglich einen Speichelapparat, wie er bey den Holothuriern und andern Echinodermen vorkommt. Dieser Apparat besteht aus vier verlängerten geraden blinden Röhren, jede 2" lang in gleichen Abständen um den Anfang des Nahrungskanals; ihr vorderes Ende um den Mund geöffnet, am Grunde der dreyzähligen seitlichen Fortsätze; ihre verschlossene Ende nach hinten gerichtet. Die Wände dieser Speichelröhren zeigen schiefe oder spitzförmig sich kreuzende Fasern; ihr Innhalt ist halb durchsichtig beym frischen Wurm, und durchsichtig bey dem in Weingeist.

Das Vorkommen dieser Speicheldrüsen mit einem Mundapparat, der besser zum Kaen eingerichtet ist, als ein bis jetzt entdeckter bey den Eingeweidwürmern, stimmt mit den Gesetzen überein, welche man hinsichtlich des Speichelapparats bey den höhern Thieren findet; und ist daher sehr wichtig.

**Cloquet** betrachtet die verdickten brüßigen Wände der Speiseröhre beim Spulwurm als eine analoge Absonderung.

Das erste Stück des Nahrungscanals oder der Magen ist 3''' lang, enthält eine milchweiße Substanz und hat hinten eine Einschränkung, worauf der Darm folgt, der mit gelblichem Wey angefüllt ist, gerad und frey zum After läuft. Die Seitenlinien des Leibes bestehen deutlich aus zwey Gefäßen, im Leibe hervorstachend, vorn frey und sehr weit. Die Rücken- und Bauchnervenstränge sind deutlich sichtbar in dem Raume zwischen den Seitengefäßen. Die Muskeelhäute des Leibes sind gut entwickelt und bestehen auswendig u. inwendig aus Längsfasern, welche letztere mit einer Lage dreigliedriger Substanz gefüllt sind.

Die männlichen Organe bestehen aus dem genannten *Spicula*, vorragend aus dem Schwanzende. Die Basis *Spiculi* steht in Verbindung mit einem weiten *Receptaculum* 2''' lang, weiß und durch eine schwache Einschränkung vom Uebrigen der Samenröhre getrennt, welche wie gewöhnlich einfach ist, halb durchsichtig, dünner werdend gegen das blinde Ende, welches in der Mitte des Leibes an die Bauchseite desselben durch Zellgewebe geheftet ist. Ihre Länge ist 10mal die des Leibes.

Die weiblichen Organe beehen aus *Vulva*, *Vagina*, *Uterus bicornis*, *Oviductus* et *Tubi ovarii*.

Von der *Vulva* läuft die *Vagina* fort, zuerst weit, dann schmaler, zuletzt wieder weit beim Eingang in den Uterus und ist über 1'' lang; die zwey *Cornua uteri* 5''' lang,  $\frac{1}{2}$  dick, werden dünner und gehen ohne Schmälerung in die ovarischen Röhren über, welche ungeheuer lang sind, dreysigmal so lang als der Leib; ihre verdünnten Enden hängen nicht an den Leibeswänden. Ihre Bindungen schreien ganz verwirrt um den Darm zu liegen, aber sie bedecken denselben nur als aneinander gefohlene Falten, und man kann sie leicht ohne alle Zerreißung trennen.

December 1836.

**§. 127. F. Debell Bennett:** über *Physeter macrocephalus*, besonders sein Gebiß.

Zwischen den Geschlechtern ist das Mißverhältniß größer als bey andern Walen: das größte Männchen in der Südsee ist 60'; das ausgewachsene Weibchen nur 28 und höchst selten 35.

Wenn der junge männliche Cachelot 34' erreicht hat, so sind die Zähne vollkommen gebildet, obschon nicht eher sichtbar, als bis er 28 überschritten hat. Der gewöhnlich als zahnslos beschriebene Dorsiefer hat jedesfalls eine kurze Reihe von Zähnen, bisweilen im Boden der Höhlen, worin die Zähne des Unterkiefers greifen, gewöhnlich jedoch in den Räumen zwischen den Höhlen [schon durch *Otto Fabricius* bekannt].

Die Länge dieser Zähne ist 3''; sie sind schwach nach hinten gebogen und erheben sich  $\frac{1}{2}$ '' über die weichen Theile, worinn sie tief stecken, indem sie nur schwach an den Knochen angeheftet sind. Die Zahl ist nicht leicht zu bestimmen, weil die ganze Reihe nicht immer sichtbar ist; in zwey Fällen sah ich jedoch acht auf jeder Seite. Sie finden sich bey erwachsenen Walen beyder Geschlechter, und obschon man sie bey

*Ziss* 1838. Heft 3.

jungen Cacheloten äußerlich nicht sieht, so kann man sie doch wahrnehmen, wenn man die weichen Theile vom Kiefer entfernt.

Das Auge ist klein, weit hinten am Kopf, über und zwischen der Brustfinne und dem Winkel des Unterkiefers.

Die Öffnung ist 2'' lang und 1 hoch; die Augenslieder haben keine Wimpern und Knorpel und sind 2'' breit.

Die *Conjunctiva* ist voll Blutgefäße und mit Dehnungen von Schleimgängen bedeckt; am innern Winkel eine Falte oder Spur des dritten Augenlids wie beim Pferde.

Der Augapfel ist nicht größer als bey einem Ochsen  $2\frac{1}{2}$ '' groß, die Hornhaut 1'', der Sehnerv nur so dick wie eine Nabelneder, aber von einer Faserscheide umgeben 4'' im Umfang, und wieder von den Augenmuskeln umgeben; gleich hinter der Hornhaut ist die *Conjunctiva* schwarz, und so findet man es auch nicht selten bey den Negern. Die Linse nicht größer als beim Menschen, fast kugelförmig; das *Tapetum* hinter der Netzhaut gelblich grün; kein Thränenapparat. Geschlechtstheile, Walrathhöhle hat *Sunter* richtig beschrieben.

Ein Fötus, dem Ansehen nach reif aus dem Leibe genommen, war lang 14'', im Umfang 6; er lag im Uterus wie ein gespannter Bogen.

**§. 129.** Reid zeigt einen neuen *Perameles* von Diemenland, wo er gemein seyn soll; findet sich auch im westlichen Australien, wo er bey den Eingebornen *Dalgeit* heißt, bey den Colonisten *Rabbit*, unter welchem Namen *Cummings* ham seiner erwähnt in seinem Werk über Neu-Südwallis; auch *Widdowson* in seinem Bericht über Diemenland; wird aber von keinem beschrieben.

*Perameles lagotis*: griseus, capite, nucha et dorso castaneo lavatis; buccis, lateribus colli, scapulis, lateribus, femoribus extus, caudaeque ad basin, pallide castaneis; mento, gula, pectore, abdomine, extremitatibus intus anticeque, antibrachiis postice, pedibusque supra albidis; antibrachiis externe pallide griseis, femoribus extus posticeque saturate plumbeis; cauda pilis longis albescentibus ad partem basalem inducta, dein pilis nigris tecta, parte apicali alba, pilis longis supra ornata. Velle-re longo molli. Cauda pilis rudis vestita; pilis ad pedes brevissimis. Labio superiore, buccisque, mystacibus longis sparsis. Auriculis longis, ovatis; intus nudis, extus pilis brevissimis brunneis, ad marginem albescentibus indutis, pilis ad bases eos plumbeis, apicibus albis aut castaneis, illis in abdomine omnino albis. Marsupio ventrali magno, mammis novem, in faciem posticam; quarum una centralis est, reliquis circumdata, intervallis aequalibus, gymrumque facientibus, transversim unciam cum quadrante reddentem.

Longit. capitis 5 poll. 3 lin.; corporis 13 poll. caudae 10 p.; auriculae 3 p. 10 l.; antibrachii 4; pedis antici 1 p. 8 l.; tibiae 3 poll. 9 lin.; pedis postici 4 p. 6 lin.; ab auriculae basi usque ad oculum 2; ab oculo usque ad nasum 2 poll. 8 lin.; Latitudo auriculae 1 poll. 9 lin.

Habitat in Australia Occidentali et in Terra Van Diemen.

Der Schädel ist vollkommen, aber die Haut ließ sich nicht ablösen. Schneidezähne  $\frac{5-5}{6}$ , Eckzähne  $\frac{1,1}{1,1}$ , Lückenzähne  $\frac{3-3}{3-3}$ , Backenzähne  $\frac{4-4}{4-4} = 48$ ; Backenzähne viereckig, abgekauft, mit einem Schmelzband quer durch die Mitte. Im westlichen Australien finden sie sich jenseits der Gebirge des Schwanensflusses im District York, fressen große Kerflarven und Baumwurzeln und schaden durch ihr Graben sehr dem Weiskorn und den Potato. Ein gefangenes wurde in wenigen Tagen sehr zahm, war aber reizbar und schühte die geringste Mißhandlung, fraß Brod und hielt es mit den Vorderpfoten. Es war ein Junges, welches aber, nachdem es von der Mutter einige Tage im Beutel getragen worden, leider abhandeln kam.

Sollte man noch mehrere ähnliche Gattungen finden, so wären die Unterschiede hinklinglich zu einer Untersippe, *Macrotis*.

§. 131. Waterhouse zeigt ein zweytes Exemplar von *Myrmecobius*.

Unterscheidet sich von *M. fasciatus* durch weniger verschiedene schwarze und gelbrothe Färbung des Rückens, weil mehr weiße Haare unterstreut sind. Die Bänder sind nicht weiß, sondern gelblich rahmfarben; weichen auch in Zahl und Lage ab. Vom Schwanz anfangen sind die drei ersten deutlich und unterbrochen mit schwarzen, halbso breiten Zwischenräumen, unterstreut mit weißen Haaren und einigen ochergelben. Das vierte ist auch deutlich, läuft aber nicht ununterbrochen quer über den Rücken, sondern stößt an zwei Bänder der andern Seite. Das fünfte und sechste ist ununterbrochen, aber weniger deutlich als die vorigen. Weiter sind die Bänder fast verschossen und zeigen sich nur schwach an den Seiten des Leibes.

Der Hauptunterschied liegt aber in den Zähnen, vier Backenzähne mehr als bey *M. fasciatus*. Alle Zähne 52; in jedem Kiefer 26 und die fünf hintern Backenzähne dicht an einander, also auch in dieser Hinsicht verschieden von dem vorigen.

Es kam von Diemensland; man hat andere an Baumwurzeln (Kharren und Kerse) fressen sehen, welche an solchen Orten häufig sind. Am liebsten sollen sie sich an Orten aufhalten, wo die Weide von Port-Jackson in Menge wächst. Er will es noch nicht benennen.

**Ogilby:** über die wichtigsten Characteres der Wiederkäuer.

Pallas hat richtig bemerkt, daß alle Wiederkäuer, mit Ausnahme der Camele, nur eine Sippe bilden müßten, wenn man bloß auf die Zähne sähe. Man nahm daher zu der unwichtigen Gestalt der Hörner seine Zuflucht, und erst Illiger führte auch die Schnauze und die Thränenbälge ein. Die Sippe der Gemsen (*Antilope*) wurde endlich ein Rumpelkafar für alle Gattungen, welche nicht unter *Bos*, *Oris* et *Capra* paßten, und enthält daher viermal mehr Gattungen als alle Wiederkäuer, ungeachtet der verschiedenen Formen, so daß

kein einziger Character auf alle paßt. Lichtenstein, Blainville, Desmarest und Jamilton Smith suchten abzuheffen, was aber nicht ganz gelang.

Die An- oder Abwesenheit der Hörner, ihre Substanz und Bau, ob hohl oder voll, bleibend oder abfällig; die Gestalt der Oberlippe, ob dünn, wie bey der Geis, oder breit und nackt wie beim Ochsen; die Thränenbälge und Poren zwischen den Zehen sind Characteres, welche Einfluß auf Betragen und Lebensart haben und von denen daher die sippischen Unterschiede vorzüglich abhängen. Nimmt man manchmal einige weniger wichtige Characteres dazu, wie die Drüsen über den Augen und an den Kiefern, die Zahl der Zigen, die Weichen-Poren, so kann man die Sippen streng bestimmen. Von der An- oder Abwesenheit der Hörner bey den Weibchen hängt größtentheils der Verkehr der Geschlechter ab; von der Gestalt der Lippen und der Schnauze, den einzigen Taß- und Greiforganen der Wiederkäuer hängt die Natur des Futters und des Aufenthalts ab, indem sie dadurch Grazer oder Kupper werden (*Grazer* or *Brower*); die Drüsen zwischen den Zehen, welche die Hufe schlüpfrig zu erhalten scheinen, haben Einfluß auf die geographische Verbreitung, indem sie die Gattungen auf reiche Savannen und feuchte Wälder beschränken, oder ihnen gestatten, auf trocknen Bergen herumzustreichen, auf den dürren Karroos und den brennenden Wüsten.

#### Fam. 1. *Camelidae*.

*Pedes subbisulci, subtus callosi, digitis apice solo distinctis, ungulae succenturiatae nullae; cornua nulla; dentes primores supra duo, infra sex.*

##### 2 Genera.

1. *Camelus*, cujus characteres sunt: *Digitis conjuncti, immobiles. Rostrum chilomate instructum, labro fisso. Sinus lachrymales nulli. Fossae interdigitales nullae. Folliculi inguinales nulli. Mammæ quatuor.*

2. *Auchenia*: *Digitis disjuncti, mobiles. Rostrum chilomate instructum, labro fisso. Sinus lachrymales nulli. Fossae interdigitales nullae. Folliculi inguinales nulli. Mammæ duae.*

Sind eine aberrante Gruppe, welche von den andern in den Organen der Ortsbewegung und des Laufens abweicht. Die Thränen-Weichen- und Zehenbälge fehlen.

#### Fam. II. *Cervidae*.

*Pedes bisulci; cornua solida, plerumque decidua, in mare solo, aut in utroque sexu; dentes primores supra nulli, infra octo.*

##### 6 Genera.

1. *Camelopardalis*: *Cornua in utroque sexu, perennia, simplicia, cute obducta. Rhinaria nulla. Sinus lachrymales nulli. Fossae interdigitales parvae. Folliculi inguinales nulli. Mammæ quatuor. Duo species sunt C. aethiopicus et C. capensis.*

2. *Tarandus*: *Cornua in utroque sexu, subpal-*

*mata, decidua. Rhinaria nulla. Sinus lachrymales exigui. Fossae interdigitales parvae. Folliculi inguinales nulli. Mammæ quatuor. Typus est Tarandus rangifer (Cervus Tarandus).*

3. *Alces: Cornua in mare solo, palmata, decidua. Rhinaria nulla. Sinus lachrymales exigui. Fossae interdigitales magnæ. Folliculi inguinales nulli. Mammæ quatuor. Typus est Alces Machlis (Cervus Alces).*

4. *Cervus: Cornua in mare solo, ramosa, decidua. Rhinaria magna. Sinus lachrymales distincti, mobiles. Fossae interdigitales magnæ. Folliculi inguinales nulli. Mammæ quatuor. Typi sunt C. Elaphus et C. Saumer aut Hippelaphus Cuv.*

5. *Caprea: Cornua in mare solo, subramosa, decidua. Rhinaria distincta. Sinus lachrymales nulli. Fossae interdigitales magnæ. Folliculi inguinales nulli. Mammæ quatuor. Typus est C. capreolus.*

6. *Prox: Cornea in mare solo, subramosa, decidua. Rhinaria magna. Sinus lachrymales maximi, mobiles. Sinus duo suborbitales ad basin cornuum, magni, mobiles. Fossae interdigitales magnæ. Folliculi inguinales nulli. Mammæ quatuor. Typus est Prox moschatus (Cervus Muntjac).*

### Fam. III. Moschidae.

*Pedes bisulci; cornua nulla; dentes primores supra nulli, infra octo.*

#### 2 Genera.

1. *Moschus. Rhinaria magna. Sinus lachrymales nulli. Fossae interdigitales nullae. Folliculi inguinales nulli. Mammæ quatuor. Typus est Moschus moschiferus.*

2. *Ixalus? Rhinaria nulla. Sinus lachrymales exigui, distincti. Fossae interdigitales nullae. Folliculi inguinales exigui. Mammæ duæ. Typus est Ixalus Probaton, Proc. Zool. Soc., Part. IV. p. 119.*

*Ixalus* gründet sich erst auf ein einziges Exemplar, und kann vielleicht zu einer andern Familie gehören; unterscheidet sich wenig von den ächten Antilopen. Wenn es aber auch richtig bey den Moschiden steht, so ist doch eine Lücke dazwischen. Vielleicht gehören dahin zwei Sippen, wovon eine wahrscheinlich in den tropischen Wäldern des indischen Archipels und die andere auf dem Hochland von Mexico oder Südamerika lebt. Sie mögen indeßsen folgendermaßen charakterisirt werden.

1. *Hinnulus: Rhinaria magna. Sinus lachrymales distincti. Fossae interdigitales nullae. Folliculi inguinales nulli. Mammæ quatuor.*

2. *Capreolus. Rhinaria nulla. Sinus lachrymales nulli. Fossae interdigitales parvae? Folliculi inguinales? Mammæ duæ.*

Es mag gewagt scheinen, auf diese Weise die Entdeckung von Gattungen vorherzusagen und die Sippencharactere anzugeben,

da wir von ihrem Daseyn noch keine positiven Kenntnisse haben, aber die Analogieen der Natur sprechen dafür. Von der Sippe *Ixalus*, wenn sie sich als eine solche beweiset, habe ich auch die Charactere vorher aufgestellt.

### Fam. IV. Capridae.

*Pedes bisulci; cornua cava; persistentia; rhinaria nulla; dentes primores supra nulli, infra octo.*

#### 7 Genera.

1. *Mazama. Cornua in mare solo. Sinus lachrymales nulli. Fossae interdigitales distinctae. Folliculi inguinales nulli. Mammæ quatuor. Typus est M. furcifer (Antelope furcifer).*

2. *Madoqua. Cornua in mare solo. Sinus lachrymales distincti. Fossae interdigitales distinctae. Folliculi inguinales nulli. Mammæ quatuor. Typus est M. Saltiana (Ant. Saltiana et Hemprichii).*

3. *Antelope. Cornua in mare solo. Sinus lachrymales distincti, mobiles. Fossae interdigitales maximæ. Folliculi inguinales maximi. Mammæ duæ. Typus est A. cervicapra.*

4. *Gazella. Cornua in utroque sexu. Sinus lachrymales distincti, mobiles. Fossae interdigitales maximæ. Folliculi inguinales maximi. Mammæ duæ. Typus est Gazella Dorcas (A. Dorcas).*

5. *Ovis. Cornua in utroque sexu. Sinus lachrymales exigui, immobiles. Fossae interdigitales parvae. Folliculi inguinales nulli. Mammæ duæ. Typus est Ovis Aries.*

6. *Capra. Cornua in utroque sexu. Sinus lachrymales nulli. Fossae interdigitales parvae. Folliculi inguinales nulli. Mammæ duæ. Typus est Capra Hircus. Ad hoc genus pertinent Ovis Tragelaphus et Antilope lanigera aut americana. Auct.*

7. *Ovibos. Cornua in utroque sexu. Sinus lachrymales nulli. Fossae interdigitales? Folliculi inguinales nulli. Mammæ quatuor. Typus Ovibos moschatus.*

### Fam. V. Bovidae.

*Pedes bisulci; cornua cava, persistentia; rhinaria distincta, anda; dentes primores supra nulli, infra octo.*

#### 9 Genera.

1. *Tragulus. Cornua in utroque sexu. Glandulae maxillares oblongae. Fossae interdigitales nullae. Folliculi inguinales nulli. Mammæ quatuor. Typus est T. pygmaeus (Ant. pygmaeus).*

2. *Sylvicapra. Cornua in mare solo. Glandulae maxillares oblongae. Fossae interdigitales parvae. Folliculi inguinales distincti. Mammæ quatuor. Typus S. mergens (Ant. mergens).*

3. *Tragelaphus*. Cornua in mare solo. Sinus lachrymales magni. Fossae interdigitales distinctae. Folliculi inguinales nulli. Mammæ quatuor. Typus est *T. Hippelaphus* (Ant. Picta).

Das Nel-Ghæ und nicht das Saumer-Deer von Indien ist, wie ich anderswo zeigen will, das von Aristoteles unter dem Namen Hippelaphus beschriebene Thier.

4. *Calliope*. Cornua in mare solo. Sinus lachrymales nulli. Fossae interdigitales nullae. Folliculi inguinales distincti. Mammæ quatuor. Typus est *Calliope Strepsiceros* (Ant. Strepsiceros).

5. *Kemas*. Cornua in utroque sexu. Sinus lachrymales nulli. Fossae interdigitales magnae. Folliculi inguinales nulli. Mammæ quatuor. Typus est *Kemas Ghorral* (Ant. Goral).

6. *Capricornis*. Cornua in utroque sexu. Sinus lachrymales magni. Fossae interdigitales distinctae. Folliculi inguinales nulli. Mammæ quatuor. Typus est *C. Thar* (Ant. Thar Hodg.).

7. *Bubalus*. Cornua in utroque sexu. Sinus lachrymales exigui, distincti. Fossae interdigitales magnae. Folliculi inguinales nulli. Mammæ duae. Typus est *Bubalus mauritanicus* (A. Bubalus).

8. *Oryx*. Cornua in utroque sexu. Sinus lachrymales nulli. Fossae interdigitales magnae. Folliculi inguinales nulli. Mammæ quatuor. Species sunt *O. capensis* (A. Oryx), *Leucoryx*, *Leucophaea* etc.

9. *Bos*. Cornua in utroque sexu. Sinus lachrymales nulli. Fossae interdigitales nullae. Folliculi inguinales nulli. Mammæ quatuor. Typus est *Bos taurus*.

Ueber die Gattungen später. Mit Hülfe meines Artfells über Antilope in der Penny Cyclopaedia und Smiths Aufsatz über die Wiederkauer in Griffiths Animal Kingdom wird man leicht die Gattungen zu den Sippen stellen können.

§. 139. Gould zeigt viele Stücke von der Sippe *Strix*, wie sie jetzt beschränkt ist, aus verschiedenen Theilen der Welt vor; darunter drei neue.

1. *Strix castanope*: disco fasciali castaneo, ad marginem saturato et nigro circumdato; corpore supra alis caudaque laete rufo-brunneis, plumis singulis fasciis latis saturate brunneis, dispariter ornatis; capite humerisque maculis sparsis minutis albis; corpore infra flavescenti-brunneo; lateribus colli corporisque guttis nigris sparse ornatis; femoribus tibiisque flavo-brunneis pedibus flavescitibus; rostro flavo fusco. Long. tot. 18 unc.; rostri  $2\frac{1}{4}$ ; alae 15; caudae 7; tarsi  $3\frac{1}{2}$ .

Hab. in Terra Van Diemen.

Ist die größte bekannte Gattung dieser Sippe, wovon die Barn Owl [*Strix flammea*] der Typus ist.

2. *Strix cyclops*: disco fasciali albo, venuste annulo saturate brunneo, circumdato; corpore supra albo; dorso humerisque pallide stramineis, maculis stramineis brun-

neis rectis, frequentibus et retortis; cauda alba fasciis brunneis; interstitiis albis brunneo crebre guttatis, corpore infra albo, maculis brunneis; femoribus tarsisque albis; pedibus flavofuscis; rostro livido. Long. tot. 15 unc.; rostri  $1\frac{3}{4}$ ; alae  $11\frac{1}{4}$ ; caudae  $5\frac{1}{2}$ ; tarsi  $2\frac{3}{4}$ .

Hab. in nova Cambria australi.

Dieses ist eine der schönsten Gattungen der Sippe.

3. *Strix delicatulus*: disco fasciali albo, margine straminea circumdato; corpore supra pallide cano fusco, flavo tincto, notis nigris et albidis intermixtis delicatulis frequentibusque ornato; alis pallide fulvis, fasciis lineisque rectis retortis, pallide brunneis; primariis ad apicem gutta alba notatis; caudae rectricibus quoad colorem remiges fimbriatis at gutta apicali obscuriore; corpore infra albo; pectore lateribusque maculis brunnescentibus sparse notatis; femoribus tibiisque albis; pedibus flavescitibus rostro livido. Long. tot. 14 unc.; rostri  $1\frac{1}{2}$ ; alae 11; caudae 4; tarsi  $2\frac{1}{2}$ .

Hab. in Nova Cambria australi.

Diese Gattung gleicht in mancher Hinsicht der gemeinen Eule (*Strix flammea*) in England, ist aber viel kleiner und hat einen längeren Schnabel.

§. 141. Fr. Cuvier: über Gerboises et Gerbilles (schon gegeben außer der neuen Gattung).

*Alactaga arundinis* aus der Barbarei. Länge 5 Zoll, Schwanz  $5\frac{1}{4}$ ; Ohren 1, fast nackt; Fußwurzel  $22\frac{1}{2}$ . Oben schön graulich gelb, Seiten und Schwanz gelblich, der letztere mit einem schwarzen Busch, dessen Spitze weiß, Bauch und Waden weiß, große Schnurbürste braun, Schneidzähne weiß und ganz.

Gould zeigt alle Gattungen, welche bis jetzt für sein Werk über die Vögel Australiens gemalt sind. Darunter folgende neu:

1. *Ocypterus superciliosus*: facie, gula, pectoreque nigrescenti-griseis; linea supercilii alba ad basin rostri excurrente, summo capite, corpore superiore alisque fuliginosis; abdomine crissoque castaneis; rectricibus griseo-fulgiginosis, ad apicem albescentibus, intermediis duabus exceptis; rostro plumbeo, ad apicem nigro, pedibus plumbeis.

Long. tot. 7 unc.; rostri 1; alae  $4\frac{1}{2}$ ; caudae 3; tarsi  $3\frac{1}{4}$ .

Hab. in Nova Cambria australi.

2. *Vanga cinerea mas.*: capite et nucha nigris loro albo; dorso, humeris et uropygio griseis; tectricibus caudae albis, rectricibus caudae nigris, interne ad apicem albis, duabus intermediis exceptis, secundariis in medio, tectricibus majoribus, gula et corpore subtus, albis; rostro ad basin plumbeo, ad apicem nigro, pedibus nigris.

Long. tot.  $12\frac{1}{2}$  unc.; rostri  $1\frac{3}{4}$ ; alae 6; caudae  $5\frac{3}{8}$ ; tarsi  $1\frac{1}{4}$ .

Hab. in Terra Van Diemen.

8. *V. nigrogularis* mas.: capite, collo et pectore nigris, torque nuchali, pilis, pteromatum striga longitudinali, dorso imo, uropygio, abdomine, crisso, rectricumque lateralium apicibus albis; rectricibus duabus intermedii omnino nigris; rostro ad basin plumbeo in nigrum transeunte; pedibus nigris.

Foem. vel. mas. jun. ? Partibus quae in mare nigris in hoc cinerascanti-brunneis, vitta occipitali fere obsoleta; gula pectoreque fulvo brunneis; partibus reliquis ut in mare adulto.

Long. tot.  $13\frac{1}{4}$  unc.; rostri  $1\frac{3}{4}$ ; alae 7; caudae 6; tarsi  $1\frac{1}{2}$ .

Hab. in Nova Cambria Australi.

### *Struthidea*

Rostrum validum, robustum, tumidum, supra arcuatam, altitudine latitudinem excellentem; gonyde angulato; naribus rotundatis operitis; mandibula inferiore ad basin incrassata et in genas pereunte; alae mediocres, rotundatae; remige primo brevi, quarto et quinto longissimas, remigibus secundariis elongatis et latis; tarsi mediocri longitudine et robusti, antice scutellati, postice plani; digitis subvalidis; pollice medio digito brevior et validiore.

4. *Str. cinerea*: capite, collo, partibusque corporis inferioribus griseis; singulis plumis ad marginem pallidioribus, alis brunneis, rectricibus caudae nigris, metallice viridi nitentibus; rostro pedibusque nigris.

Long. tot.  $11\frac{1}{2}$  unc.; rostri  $\frac{3}{4}$ ; alae  $5\frac{1}{2}$ ; caudae 6; tarsi  $1\frac{3}{4}$ .

5. *Tropidorrhynchus citreogularis*: summo capite, dorso, uropygio, alis, caudaque brunneis, his pallidioribus; pogoniis externis remigum secundariorum olivaceo marginatis; cauda ad apicem grisea; nucha ac lateribus colli albescenti-griseis; mandibula inferiori ad basin notaque nuda pone oculos caeruleis; gula et lateribus pectoris cinereis; abdomine pallide griseo; rostro nigro; pedibus plumbeis.

Long. tot.  $10\frac{1}{4}$  unc.; rostri  $1\frac{1}{4}$ ; alae  $5\frac{1}{4}$ ; caudae  $4\frac{1}{2}$ ; tarsi  $1\frac{1}{4}$ .

Hab. in Nova Cambria Australi.

6. *Meliphaga penicillata*: facie plumisque auricularibus flavidis; pone has penicilla sericea alba oriente; corpore superiore flavescenti-griseo; pogoniis remigum externis laterioribus; corpore subtus pallide brunnescenti-cinereo; rostro pedibusque brunneis.

Long. tot.  $6\frac{1}{2}$  unc.; rostri  $\frac{5}{8}$ ; alae 3; caudae 3; tarsi  $\frac{3}{4}$ .

Hab. in Nova Cambria Australi.

7. *M. sericea*: summo capite, gula, et regione circa oculos nigris; striga frontali alba supra oculos tendente; penicilla pilosa alba, genas auresque tegente; dorso brunnescenti-cinereo, longitudinaliter nigro striato;

corpore subtus albo singulis plumis in medio longitudinaliter nigris; alis brunnescenti-nigris, pogoniis remigum externis, laete flavidis; rectricibus caudae brunneis, pogoniis ad marginem flavescens; rostro pedibusque nigris.

Long. tot.  $6\frac{1}{4}$  unc.; rostri  $\frac{7}{8}$ ; alae  $2\frac{3}{4}$ ; caudae  $2\frac{3}{4}$ ; tarsi  $\frac{3}{4}$ .

Hab. in Nova Cambria Australi.

### *Haematops*

Rostrum capite brevius, leviter arcuatam, acutum, sine denticulo ad apicem; compressiusculum: naribus longitudinalibus et operculo tectis, setis nullis ad rictum; alae mediocres, remige primo brevi, tertio et quarto fere aequalibus et longissimis; cauda mediocri, aequali vel leviter forficata; tarsi mediocries, subvalidi halluce et ungue, digitum medium et unguem aequantibus; digitis externis longitudine paribus; naevi sanguinolenti supra oculos.

8. *H. validirostris*: summo capite splendide nigro, vitta occipitali alba, pone oculos oriente; plumis auricularibus, mento et nucha nigris; summo corpore olivaceo, griseo lavato; uropygio rectricumque pogoniis externis lactioribus; alis brunneis, olivaceo leviter tinctis; gula alba, corpore subtus brunnescenti-griseo; rostro nigro et ad apicem depressiusculo; pedibus carnosus.

Long. tot.  $6\frac{3}{4}$  unc.; rostri  $\frac{3}{4}$ ; alae  $3\frac{1}{2}$ ; caudae 3; tarsi  $\frac{7}{8}$ .

Hab. in Terra Van Diemen.

9. *H. gularis*: summo capite nigro, vitta occipitali alba pone oculos oriente; plumis auricularibus et nucha nigris; dorso et uropygio aurato-olivaceis; alis caudaque brunneis; gula cinerascanti alba, striga per mediam partem tendente; corpore subtus cinerascanti-brunneo; rostro nigro; pedibus pallide brunneis.

Long. tot. 6. unc.; rostri  $\frac{3}{4}$ ; alae  $3\frac{3}{8}$ ; caudae  $2\frac{1}{4}$ ; tarsi  $\frac{7}{8}$ .

Hab. in Nova Cambria Australi.

### *Neomorphia*

Rostrum longitudine caput excellens ad latera compressum, arcuatam, solidum, acutum ad apicem denticulo; nares operatae, in sulco basali, carina mandibulae superioris in pontem tendente; lingua dura, gracilis, ad apicem setosa; anguli oris carunculis carnis pendens conferti; alae —; pedes —; cauda corpus longitudine aequans.

10. *N. acutirostris*: rostro gracili, elongato, arcuato, colore corneo, in plumbeum ad basin transeunte, carunculis laete aurantiacis; corpore toto nigro; cauda large ad apicem alba.

Long. tot.  $16\frac{1}{4}$  unc.; rostri  $3\frac{1}{4}$ ; alae — caudae 7, tarsi.



11. *N. crassirostris*: rostro subarcuato, valido, acuto, corneo colore, in plumbeum ad basin transeunte; corpore nigro; cauda large ad apicem alba.

Long. tot.  $17\frac{1}{2}$  unc.; rostri  $2\frac{1}{2}$ ; alae — ; caudae  $7\frac{1}{2}$ ; tarsi —

12. *Podiceps gularis*: summo capite et nucha intense, nigrescenti-brunneis, olivaceo lavatis; gutture genisque nigris; striga castanea pone oculos oriente et per latera colli excurrente; corpore supra nigrescenti brunneo; tectricibus alae secundariis albo marginatis, hoc colore vittam transversam faciente; collo imo; pectore et corpore subtus argenteo griseis, hoc colore in brunneum ad latera transeunte; rostro et pedibus nigris.

Long. tot. 10 unc.; rostro  $1\frac{1}{2}$ , alae  $4\frac{1}{2}$ ; tarsi  $1\frac{1}{2}$ .  
Hab. in Nova Cambria Australi.

13. *P. nestor*: capite plumis elongatis sericeis albis induto; gutture et occipite nigris; corpore supra intense brunneo, subtus argenteo griseo, ad latera brunneo lavato; rostro nigro ad apicem pallidiore; tarsis olivaceo nigris.

Long. tot. 9 unc.; rostri 1; alae  $4\frac{1}{2}$ ; tarsi  $1\frac{1}{2}$ .

Habit. in terra Van Diemen et in Nova Cambria Australi.

### Calodera.

Rostrum validum, arcuatum, capite brevius, naribus basalibus rotundatis, fere apertis, mandibula superiore ad apicem leviter indentata marginibus sulcatis; margine mandibulae inferioris in sulcum superioris recepto; alae mediocres, remige primo brevissimo; tarsi validi, antroscutellati, pollice cum digito interno conjuncto, hoc ejusque ungue, validis, ad medio digito ungueque, brevioribus; ungues incurvati et acuti; cauda medioeris, penitus aequalis.

Die hieher gehörige Gattung, *C. maculata*, ist oben beschrieben S. 106. [Es ist Hrn. Gould sehr zu raten, die Charactere von jemand anderem machen zu lassen.]

Ende von 1836.

### Neue Wirbelthiere

zu der Fauna von Abyssinen gehörig, entdeckt und beschrieben von Dr. G. Rüppell. Frankfurt, bey Schmeber. 1837. Liefer. XI. Fol. 53—56. Taf. 15—21.

Dieses Heft enthält wieder lauter Fische und zwar nicht weniger als 23, alle neu, wie es sich von selbst versteht, mancfaltig, interessant, genau beschrieben, ohne Zweifel richtig abgebildet und fleißig illuminirt. Wir haben geglaubt, Herr Rüppell wäre schon lange mit seinen Thieren am Ende, da er wirklich unerwartet viel geliefert hat; aber er langt immer noch aus seiner Jagdtasche Neues hervor und erfreut die Naturforscher mit seinen Gaben.

Schon früher hat der Verf. 7 Gattungen von *Balistes* beschrieben, hier folgen mehrere neue: *B. niger* aus dem rothen

Meer; *B. albicaudatus*, *flavimarginatus* et *rivulatus* eben-  
daser.

*Monacanthus pardalis*.

*Tetraodon semistriatus*, *lunaris*, *sordidus*.

Ueberhaupt hat er im rothen Meer gesammelt und meistens abgebildet: *Balistes assassi* (aculeatus), *lineatus*, *viridescens*, *stellatus*, *ceruleus*, *flavimarginatus*, *albicaudatus*, *rivulatus*, *niger*; *M. pardalis*, *pusillus*.

*Diodon punctatus*; *Tetraodon hookenii*, *perspicillaris*, *semistriatus*, *calamara*, *diadematus*, *lunaris*, *sordidus*; *Ostracion cubicus*, *argus*, *cyanurus*, *turritus*.

Von Japan werden hier geliefert: *Scyllium heptagonum*; *Nebrius concolor*; *Carcharias melanopterus*, *albimarginatus*, *obesus*, *acutidens*, *acutus*; *Zygæna mokarran*; *Pristis pectinatus*.

*Torpedo panthera*; *Pastinachus uarnak*; *Myliobatis eeltenke*. Im Ganzen hat er Japan und Rothen beobachtet 17 Gattungen.

*Belone chorum*, *platura*; *Hemiramphus gamberur*, *far*.

*Bagrus thalassius*; *Plotosus anguillaris*.

*Clupea sirm*, *punctata*, *quadrimalculata*, *kowal*; *Engraulis*, *heteroloba*; *Butyrinus glossodontus*.

Der Text ist noch nicht vollendet, und es sind also noch mehr Fische zu erwarten.

### Genera et species Curculionidum

cum *Synonymia hujus familiae*, a C. J. Schöenherr. Lipsiæ, apud Fr. Fleischer. 1837. 8. IV. 1. 600.

Von diesem ungewöhnlich reichhaltigen und in Hinsicht auf die Zahl der Sippen wirklich ungeheuren Werk können wir schon wieder einen Band anzeigen. Die Verfasser müssen ungemein fleißig vorgearbeitet haben, sonst wäre eine solche Schnelligkeit bei der gründlichen Characteristik, genauen Synonymie und vollständigen Beschreibung der Gattungen nicht denkbar; schon ihrer drei daran arbeiten. Die neuen Gattungen nehmen sich werden von Gyllenhal und Boheman beschrieben. Dieser Band beginnt mit Genus 300. *Cratosomus* und geht bis 352. *Mecysmoderes*. Es ist unmöglich und unnötig, den genauern Inhalt anzugeben, weil es doch unseren Lesern nichts nützen würde. Der Verfasser wird aus allen Welttheilen auf's kräftigste unterstützt, und bekommt überall her Exemplare zugesandt. So ist noch nie eine Kertsunft bearbeitet worden. Freilich muß man vor der ungeheuren Zahl von Sippen erschrecken: indessen ist eine solche durchgeführte Schreibung für denjenigen, der sich mit der Kunst genauer beschäftigen will, immerhin sehr nützlich; andere werden schon zusammenzuziehen wissen.



## Kort Underrättelse om Skandinaviska Insekters

allmänna Skada och Nyta i Hushållningen, af G. Dahlbom.  
Lund, Berlin. 1837. 8. 352. 1 T.

Diese Schrift, über den Schaden und Nutzen der Kerfe in der Haushaltung, ist den Landwirthen und Naturforschern bestimmt und mit guter Auswahl und Fleiß bearbeitet. Sie enthält 235 Gattungen, ausführlich beschrieben mit Angabe der Entwicklung, des Nutzens und des Schadens in einzelnen Fällen, voran die Käfer, dann die Schrecken, Wanzen, Falter, Fliegen, Immen, Mücken und Flügellose. Wir haben zwar in Deutschland schon mehrere Werke dieses Inhalts; dennoch wäre es vielleicht verdienstlich, wenn jemand das vorliegende übersehte.

## Insecta lapponica,

descripta a J. W. Zetterstedt. Lipsiae, L. Vofs. 1838.  
Fasc. II. 4. p. 194—283.

Von dieser ungemein gründlichen Arbeit haben wir schon das erste Heft nach Verdienst angezeigt. Die Käfer laufen hier fort von Sippe 120. Apatæ — 154. Endomychus.

Dann folgen Seite 241 die Schrecken in 5 Sippen; S. 253 die Wanzen in 36 Sippen; S. 317 die Immen in 60 Sippen, wovon aber in diesem Hefte nur 14 abgehandelt werden. Aus dieser Angabe sieht man schon, daß das Werk nicht weitläufig wird; auch ist durch den kleinen, aber sehr deutlichen und verschiedenen Druck sowohl dafür gesorgt, als für das leichte Auffinden. Die Schrift enthält überdies vor jeder Junke eine Uebersicht, sowohl der Sippen, als auch der Gebirgshöhen. Sogar sind diejenigen Sippen angegeben, welche in Lappland fehlen. Es ist überhaupt nichts Wünschewerthes in diesem Buche vergessen und alles berücksichtigt, was lange Uebung, vielseitige Beobachtung und glückliches Studium einem Meister in der Wissenschaft an die Hand gibt. Charactere, Synonyme, Abbildungen, Wohnort, Zeit der Erscheinung, alles ist genau angegeben.

## Revue zoologique par la société cuvierienne

publiée par Guérin-Ménéville. Paris, rue de Seine St. Germain, N. 13. 1838. 8. N. 1—3. 48.

In Paris bildet sich oder hat sich vielleicht schon gebildet eine Gesellschaft mit dem Namen Cuvier wie eine linneische und wernerische.

Sie gibt seit dem Jänner monatlich diese Revue heraus unter der Leitung von Guérin, der zugleich das Magazin de Zoologie redigirt. Es ist zu erwarten, daß diese Gesellschaft und ihre Zeitschrift Bestand gewinnt, und dann kann man nach den vorliegenden Heften etwas Vorzügliches erwarten. Sie geben die einschlägigen Verhandlungen der gelehrten Gesellschaften nebst eignen Aufgaben; bis jetzt Beschreibungen von Mergus merganser, Acanthodon et Cryptostemma; zwei Spinnen; Phyllocerus, Lissomus, Helices, Paussus, Trochoideus,

mehrere Käfer aus Guyana. Jedem Hefte sind noch Bücher anzeigen beigegeben, wodurch man den Inhalt der wichtigsten, besonders englischen Werke erfährt.

Der Herausgeber bearbeitet noch ein Dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle in 8 Bänden, wovon bereits 6 erschienen sind, bey jedem Bogen eine Abbildung. Es werden auf jeden Band 80 kommen. 40 Bogen mit so viel illuminirten Abbildungen kosten 14½ Franken; schwarz 7½.

## Gründzüge

der allgemeinen Naturlehre des Menschen von J. R. Bischoff,  
Professor. Wien, bey Gerold 1. 1838. 8. 352.

Wir müssen bedauern, nicht im Stande zu seyn, einen Bericht über dieses Werk zu geben, so wie es denselben verdient. Die Physiologie ist hier nicht nur auf eine eigenthümliche Art geordnet, sondern es wird auch vorzüglich auf die practische Medicin Rücksicht genommen, und zwar auf eine Art, wie man es von einem so geliebten Arzte nicht anders erwarten kann.

Dieser Band enthält die allgemeinen Verhältnisse, das Nöthige aus der Naturlehre, Chemie, Naturgeschichte und Anatomie; sodann die Literatur.

Darauf werden die allgemeinen Eigenschaften der Körper betrachtet, der Begriff des Lebens, die organischen Stoffe und Gewebe, die Systeme des Organismus und die Organe mit Rücksicht auf Gesundheit und Krankheit.

Endlich folgt die eigentliche allgemeine Physiologie S. 101, und zwar der Unterschied von Pflanzen und Thieren und dieser wieder vom Menschen, welcher sodann in seinen somatischen und psychischen Verhältnissen betrachtet wird, sowohl nach den Altern und Geschlechtern, als nach dem Temperament, der Constitution, der Gewohnheit, dem Klima und den verschiedenen Stämmen.

S. 216 folgt die Anthropotomie nach den einzelnen Geweben und Systemen; ebenso die Anthropo-Chemie S. 241 nach den einfachen Stoffen, den entferntesten und nächsten Bestandtheilen, wo besonders der Schleim, das Blut unter allen seinen Verhältnissen, die Lymphe, das Fett usw. geschildert werden. Den Schluß des Werkes macht die Anthropo-Bionomie S. 315: Lebensproceß, Reize, Iritabilität, Sensibilität und Ursprung des Lebens nach verschiedenen Meinungen. Wir zweifeln nicht, daß diese Schrift vorzüglich geeignet ist, um den academischen Vorlesungen zum Grunde gelegt zu werden.

## Das Hirn des Negers

mit dem des Europäers und Orang-Outangs verglichen, von Dr. Fr. Tiedemann, Prof. Heidelberg, bey Winter. 1837.  
4. 84. 6 T.

Ein sehr schönes Werk mit sehr genauen und zahlreichen Untersuchungen, Zerlegungen, Messungen und Abwägungen, wodurch neue Resultate entstanden, verschieden von denen, welche

man bisher gehabt hat, besonders über die Größe und Schwere der verschiedenen Hirne, über die Dicke der Nerven, die Seelenfähigkeiten der Neger nebst Beispielen von ausgezeichneten Talenten unter denselben. Es gibt kaum eine Wissenschaft und kaum ein Geschäft im öffentlichen Leben, worinn sich nicht einige hervorgethan hätten, was bey den Schwierigkeiten, welche ihrer Ausbildung entgegenstehen, ein gutes Zeugnis gibt, daß die Neger nicht hinter den Weißen zurückstehen. Der Verfasser hat mehrere Hundert Schädel der verschiedenen Menschenstämme verglichen und besonders den Raum der Hirnschale ausgemessen, und gefunden, daß er bey allen sehr abweicht. Es ist alles mit Zahlen angegeben, welche dem Verfasser ungemein viel Zeit müssen weggenommen haben. Man wird ihm daher gewiß Dank für diese Mühe wissen, durch welche ein so lang bestittener und für die gerechte Emancipation der Neger so wichtiger Gegenstand einmal, wie es scheint, zur Entscheidung gekommen ist. Wenn aber auch das nicht wäre, so ist doch kein Grund vorhanden und noch weniger ein Recht, die Schwarzen wie Thiere zu behandeln. Zu Verminderung dieser Rohheiten wird gewiß dieses Werk das Seinige beaptragen. Abgebildet sind das Hirn des Negers von oben, der Seite und von unten; ein senkrechter Durchschnitt desselben; das Hirn der Frau eines Bojesemans, des Orang-Outang und des Schimpansee, beyde von oben und unten. Die Windungen zeigen Unterschiede.

### Annotationes anatomicae

de velamentis cerebri et medullae spinalis. Programma, quo festum Academiæ turicensis indicit Fr. Arnold, Prof. Turici, Orell. 1838. 4. 25. T. 1.

Ebenfalls eine schöne und genaue Arbeit, wie sie von diesem geschickten Anatomen nicht anders erwartet werden kann. Er betrachtet zuerst die äußere oder fibröse Haut, sodann die mittlere oder seröse, die innere oder Gefäßhaut und stellt die Theile nach den schönen Zeichnungen von F. Wagner sehr getreu dar; das ganze Hirn, ein senkrechter Durchschnitt, das verlängerte Mark in der Spinnwebenhaut nebst 2 Durchschnitten des Rückenmarks. Diese Schrift war eine würdige Begleitung der Einweihung der neuen Aula, nachdem die Universität ihr erstes Lustum zurückgelegt hatte.

### Disquisitiones anatomicae Psittacorum,

diss. inaug. auct. M. J. Thuet. Turici, apud Orell. 1838. 4. 36. T. 2.

Eine sehr fleißige Abhandlung, welche ein gutes Zeugnis gibt von den Studien, dem wissenschaftlichen Eifer und der Geschäftlichkeit des Verfassers in anatomischen Untersuchungen. Zuerst beschreibt er das Knochenstern des Papageys ganz ausführlich und mit Berücksichtigung aller darüber bekannten Arbeiten; sodann die Muskeln und die Nerven. Abgebildet sind: das Hirn, das Auge, die 3 letzten Kopfnerven nebst ihrem Verlauf und ihr Verhältnis zu den Muskeln, endlich das Armegeflecht nebst dem ganzen Arm mit seinen Muskeln.

## De Cyclopia,

Diss. inaug. auct. Joh. Sch. Schmid. Turici, Orell. 1838. 4. 18. T. 2.

Diese Schrift enthält sehr schöne Abbildungen dieser merkwürdigen Mißbildung eines Kindes nebst der Anatomie der Theile; eine genaue Beschreibung mit einer Erklärung von der Entstehung dieses Uebels, wober andere vorgekommene Fälle gehörig berücksichtigt werden. Die Schrift ist interessant für die Physiologie.

## U e b e r s i c h t

### der gebräuchlichsten Arzneimittel des Alterthums

mit besonderer Rücksicht auf die Werke des Dioscorides und Plinius. Ein pharmacologischer Versuch von Dr. J. Heinrich Diezsch.

(Fortsetzung von Heft II. p. 160.)

### Drittes Capitel.

#### Eyer und andere Stoffe aus der Classe der Vögel.

Jederman kennt die Eyer und ihren Gebrauch zur Nahrung und zur Arznei. In Krankheiten gibt es, wie Plinius sagt, keine andere Speise die so gut nährt, keine die so leicht ertragen werde und die Stelle von Speise und Trank so vertreten könne, als die Eyer. Zum medicinischen Gebrauche dienen nach Galen vorzugsweise die Eyer der Hühner und der Fasanen, weniger gut seien die der Gänse und der Strauße. Celsus erwähnt auch noch die Taubeneyer als Arzneymittel.

Das Eyweiß, welches den Dotter umgibt, ist klar, zäh und klebrig, fast geschmack- und geruchlos, in kaltem Wasser löslich; in der Hitze gerinnt es und verliert seine Löslichkeit. Seine vorherrschenden Bestandtheile sind Eyweißstoff (Albumin), eine eigenthümliche organische Materie und Wasser. Sonst ist das Eyweiß dem Blutwasser sehr ähnlich und enthält nebst einigen Salzen auch eine Spur von Schwefel. Das Eygelb ist angenehm von Geschmack und bildet mit Wasser gemischt eine milchartige Flüssigkeit; es enthält fettes Oel, vielen Eyweißstoff und ein färbendes Princip; außerdem findet sich darin noch eine braune in Weingeist lösliche Substanz, von der Fourcroy glaubt, daß sie Eisen enthalte, einen gallertartigen Stoff und etwas freie Phosphorsäure.<sup>74</sup>

In diätetischer Hinsicht unterscheidet Galen<sup>75</sup> hauptsächlich drei Zubereitungsarten der Eyer: sie werden nemlich entweder bloß erwärmt und bleiben also noch ganz flüssig (ova sorbilia), oder man kocht sie nur so lange, bis sie eine zitternde

<sup>74</sup> Sehr ausführlich hat Jon. Pereira die Bildung und die Bestandtheile der Eyer abgehandelt in seinen Vorlesungen über Materia medica. Leipzig, 1837. S. 161 ff.

<sup>75</sup> De alimentor. facult. Lib. III. cap. 22.

Consistenz annehmen (*ova tremula*), oder endlich man setzt sie so lange der Hitze des siedenden Wassers aus, bis sie vollständig erhärtet sind (*ova cocta*). Die Form von zitternder Consistenz hält er für die zuträglichste und beste von allen, weniger passen seien die ganz weichen Eier, die weniger nahrhaft seien, während die hartgekochten nur schwer verdaut werden könnten. Gebadene Eier hält er für die schlechtesten aller Zubereitungen. Wenn man die Eier kocht, nehmen sie, wie Galen hinsetzt, einen üblen Geruch an, und man weiß jetzt recht gut, daß, während das Eiweiß in der Hitze gerinnt, Hydrothionsäure entsteht, die sich durch den Geruch und das Schwärzen des Silbers zu erkennen gibt.

Vielsältig wurden die Eier in Krankheiten theils innerlich, theils äußerlich angewendet. Gegen Schlangenbiß rühmt Dioscorides den Genuß des rohen Eiweißes. Bey Heiserkeit, Catarrhen, Blutspen und andern entzündlichen Leiden der Luftröhre empfiehlt er ebenfalls Eiweiß, doch etwas erwärmt zu nehmen. Celsus rühmt bey heftigem Husten weiche Eier mit Schwefel (IV. 4). Celsus Aurelianus gab bey Catarrhen Eiweiß mit geröstetem Sesam (Chron. II. 7. p. 143). Bey Stimmlosigkeit ließ er eine Katze aus Eiweiß, Honig, Pistacien usw. gebrauchen (Chron. II. 6. p. 140). Bey störendem Auswurf in der Pleuritis empfiehlt er ebenfalls ein Gemische von Eiweiß und Honig (Morb. acut. II. 18. p. 138). Bey Vergiftung mit Scirander läßt Nicander (Alexipharm. 165) weiche Hühnerer zur Speise geben, Scrib. Largus dagegen (185) weiche Gänseer. — Gegen Diarrhöen soll man nach Dioscorides Eiweiß so für sich gebrauchen, oder auch in Verbindung mit Sumachsaamen und Galläpfeln zusammen geröstet. Celsus empfiehlt bey Diarrhöen rohe Eier in Granatapfel (IV. 19). Bey der Ruhr gebraucht er Eistiere von Eiweiß oder auch von Eiweiß, verdünnt mit einem Decocte von Blumenblättern der Rose (IV. 15). Auch Scribonius Largus empfiehlt Eiweiß in der Ruhr (115) und gegen dieselbe Krankheit läßt Alex. Trallianus Eiweiß mit Butter und Rosenöl in Eistieren bebringen (lib. VIII. cap. 8). Erwärmtes Eiweiß empfiehlt Dioscorides bey gereiztem Zustande der Nieren und Harnblase, ebenso Alex. Trallianus (lib. IX. cap. 5).

Bey Samenflüssen (gonorrhoea) soll man, nach Celsus, den Genuß der Eier meiden, so wie Stärkemehl und die dasselbe reichlich enthaltenden Getreidearten (IV. 21).

Ungemein häufig dienten die Eier in Augenkrankheiten. Dioscorides empfiehlt geröstetes Eiweiß mit Rosenöl und Safran bey Augenschmerzen; auch ließ er bey Entzündungen Wolle in ein Gemische von Eiweiß, Rosenöl, Wein und Honig tauchen und damit die Augen auswachen. Gegen Ophthalmien brauchte Archigenes gar häufig Eiweiß mit verschiedenen Zusätzen (Galen de Comp. med. sec. locos. Lib. IV. p. 454. u. a. m. D.), ebenso Scrib. Largus (24 u. 26). Zumal bey Chemosia bediente sich desselben der Arzt Demofthenes (Oribas. Synops. Lib. 8. cap. 40. p. 181. 6). Celsus brauchte Eiweiß und Eiweiß mit Honigwasser äußerlich bey Augenkrankheiten (VI. 6. p. 350). Bey Verbrennungen gebrauchte Dioscorides das Eiweiß und Scrib. Largus mischte geröstetes Eiweiß zu seinen Brandpflastern (221). Um sich vor Sommerflecken zu schützen, soll man das Gesicht mit Eiweiß

318 1839, Sept. 3.

bestreichen. Zum Verkleben kleiner Wunden benutzte es Celsus (V. 2). Bey Schunden am After läßt er mit gekochten warmen Taubeneyern Bähungen machen (VI. 18. p. 399); auch bey Hämorrhoidalbeschwerden empfiehlt er dergleichen Bähungen aus Eiweiß, Rosenblättern und Traubenfäulen (VI. 18. p. 402). Auch Dioscorides empfiehlt bey Entzündung am After und Condylomen den Gebrauch des Eiweißes mit Steinflee. Bey Geschwüren der weiblichen Genitalien rühmt Celsus die Anwendung einer Salbe aus frischem Schweinefett und Eiweiß, oder auch des Eiweißes mit Rosenpulver gemischt (IV. 20). Noch ist Plinius ungemein reich an Angaben von dem medicinischen Gebrauche der Eier (lib. XXIX. cap. 3).

Man kann die dem Alterthum, in medicinischer und diätetischer Hinsicht wichtigsten Vögel in drey Gruppen theilen, nemlich: a) gesäthigte Hausvögel; b) europäische im freien Zustande lebende; c) africanische und asiatische Vögel. In die erste Gruppe gehören

Der Haushahn und die Henne (Phasianus Galus). Die Stammrage dieser allbekannten Thiere soll in Indien einheimisch seyn. Außer den bereits angeführten Eiern wurden noch andere Theile der Hühner von den Aerzten benutzt; auf die Bißwunden giftiger Schlangen soll man nach Dioscorides ganz frisches, noch warmes Hühnerfleisch legen und dieses öfter wechseln, nicht minder gab man Hühnerchen als ein Antidotum nach dem Biß giftiger Thiere. Die Brüste von jungen und alten Hühnern diente vielsältig in Krankheiten, bey chronischen Fiebern, Engbrüstigkeit, Sicht und langwierigen Blähungsbeschwerden. Den getrockneten und eingesalznen Hühnermagen hielt man für ein vorzügliches Mittel zur Stillung übermäßiger Durchfälle nach genommenen Purgiemitteln.

Das Fett der Hühner wie das der Gänse diente öfter zu wohltuenden Salben, die mit Xylobalsamum, Calamus und anderen gewürzhaften Drogen aromatisirt wurden.

Die Kunst, den Haushahn zu castriren, oder zum Kapauen zu machen, war den Griechen und Römern wohl bekannt; auch liebten sie dessen Hoden zur Speise als eine Delicasse, und jene Kapauen, die nach der Vorschrift des Aristoteles castrirt wurden, lieferten die größten und schmackhaftesten Hoden, die überdem für ein Mittel gegen Epilepsie galten. Räthselhaft ist die Methode, die Hähne durch Brennen der Sporne zu entmannen, wie dieß Columella angibt.<sup>76</sup>

Der Fasan (Phasianus colchicus) hat seinen Namen von dem Flusse Phasis in Mingelien, von woher die Argonauten sie zuerst nach Europa gebracht haben sollen. Die Fasane haben eine rothe Schale und sind unter allen die schmackhaftesten und würden wohl von den Aerzten fleißiger benutzt werden, wenn sie nicht so kostbar wären. Auch das Fleisch des Fasans wird für eines der gesündesten und zuträglichsten gehalten.

Der Pfau (Pavo cristatus) stammt aus dem südlichen Asien. Alexander der Große sah ihn zuerst in Indien,

76 Man vergleiche deshalb Distaner in Bedmanns Beiträgen zur Geschichte der Erfindungen. Bd. 5. S. 485 ff.

und der schöne Vogel gefiel ihm so wohl, daß er bey strenger Strafe verbot einen solchen zu tödten. — **Sorctensius** soll den ersten Pfauen zur Speise geschlachtet haben, die übrigens später als eine Vögelingspeise reicher Römer bekannt genug wurde. (Plin. X. 20.) **M. Aufidius** soll sich zuerst mit dem Mäßen der Pfauen beschäftigt und dadurch ungeheure Summen gewonnen haben. Nach **Galen** und **Paulus** von Aegina ist das Pfauenfleisch hart, säuerlich und schwer zu verdauen.

Die Gans (**Anas Anser**) ist bekannt genug; ihre Eier sind oben schon berührt worden; das Fett wurde von den alten Aerzten vielfältig gebraucht, und **Dioscorides** gibt sehr genau an, wie es zubereitet und gereinigt werden müsse; nicht minder gibt er einige Vorsichtsmaßregeln an (II. 93) wie man dessen Verderbniß verhüten könne. Interessant ist die hier vorkommende Angabe, daß man Fette im Honig vor der Fäulniß bewahren könne. Gänse- und Hühnerfett braucht man besonders zur Heilung aufgesprungenen Lippen, als ein Mittel um die Haut des Gesichtes schön weiß und geschmeidig zu machen. Bey Ohrenschmerz ließ man etwas erwärmtes Gänsefett in das Ohr laufen. (Scrib. Largus 39.)

**Paulus** von Aegina hält das Gänsefleisch für schwer verdaulich, und auch **Galen** lobt dasselbe nicht. Die Römer kannten die Kunst schon, die Gänse so zu füttern, daß sie eine recht große Leber bekommen, welche damals schon, wie noch jetzt, zu den Lederbissen gegährt wurde.

Die Ente (**Anas Boschas**) kommt in ihren Eigenschaften viel mit der Gans überein, scheint aber von den alten Aerzten weniger beachtet worden zu seyn. Was **Plinius** von dem Gebrauche des Blutes, der Galle der Ente usw. sagt, erregt heutzutage kein besonderes Interesse mehr.

Die Haustaube (**Columba Oenas**) ist wegen ihres eben so wohlschmeckenden als leicht verdaulichen Fleisches auch von den alten Aerzten besonders geschätzt worden. Sonderbar ist, daß **Dioscorides** dem Taubenblute eine besondere Kraft bey Hämorrhagien zuschreibt.

Der Papagei (**Psittacus Alexandri**) ist in Ostindien einheimisch, gehörte aber in alten Zeiten schon zu den Stubenvögeln, indem bereits **Plinius** wußte, daß man ihn griechische und lateinische Worte nachzusprechen lehren kann. Die Römer speisten die Papageien, und **Apicius** gibt (VI. 7.) genau an, wie dieser schöne Vogel zubereitet werden soll. In späteren Zeiten hat man Papageienfleisch als ein Mittel gegen die Schwindsuche empfohlen.

Von den europäischen im wilden Zustande lebenden Vögeln sind besonders die folgenden zu nennen:

Der Fischadler oder Weinbrecher (**Falco ossifragus**). **Dioscorides** rühmt den Magen dieses Vogels als ein Mittel, um Blasensteine durch den Harn auszuführen. (Lib. II. cap. 58.)

Der Guckuck (**Cuculus canorus**) wird von **Plinius** zu den schmackhaftesten Vögeln gezählt, und auch Neuere wollen die Richtigkeit dieser Angabe bestätigt gefunden haben; indessen

rechnet man bey uns diesen allbekannten Vogel kaum zu den essbaren, und selbst **Apicius** redete nicht von ihm.

Die Feldlerche (**Alda arvensis**) liefert eine eben so wohlschmeckende, als auch für Gesunde sehr zuträglich Speise. Das gebratene Fleisch der Haubentlerche (**Alda cristata**) rühmt **Dioscorides** als ein Mittel gegen die Milchruhr.

Drosseln (**Turdi**). Man muß hier auf 4 verschiedene Arten aufmerksam machen, nemlich die Zibdroffel oder Rothdroffel (**Turdus iliacus**), die kleinste von allen; die Sangdroffel, auch Weindroffel genannt, weil sie sehr gern Weintrauben frist (**T. musicus**); der Krametsvogel (**T. pilaris**), größer als die beiden vorigen, und die Schnarre oder Misteldroffel (**T. viscivorus**); von diesen hat wohl der Krametsvogel das schmackhafteste Fleisch. — Zu den Zeiten des **Cornelius Nepos** zogen die Römer so viele Drosseln in besondern Vogelbehältern, daß man mit ihrem Kothe die Acker düngen konnte. **Martialis** rühmt sie als die schmackhaftesten von allen Vögeln, und auch **Soratus** meinte, es gebe nichts besseres als eine fette Drossel. — Auch die Amsel oder Schwarzdrossel (**T. merula**) wurde von den Römern in Menge gezogen und sie hat auch gleich dem Krametsvogel ein sehr schmackhaftes Fleisch.

Die Bercagge (**Motacilla ficedula**); im milden und wärmeren Europa, zumal auf Cyprus in Menge lebend, von wo sie wegen ihres schmackhaften Fleisches weit verführt wird. Sie lebt besonders von Feigen, verschmäht aber auch die Weintraube nicht. **Dioscorides** rühmt das Fleisch dieses kleinen Vogels als ein Mittel zur Stärkung der Augen.

Schwalben (**Hirundines**). So oft in medicinischen Schriften Schwalben vorkommen, sind wohl meistens Rauch- oder Feuerschwalben (**H. domestica** s. **rustica**) darunter zu verstehen, obwohl auch andere Arten gemein sind, wie die Hauschwalbe (**Hirundo urtica** s. **agrestis**), die Uferschwalbe (**H. riparia**) und die Mauerchwalbe (**H. apus**). **Dioscorides** schreibt auch den Schwalben die Eigenschaft zu, den Augen besonders zuträglich zu seyn, auch redet er von steinigen Concrementen, die man in dem Magen junger Schwalben finde, und welche eine besondere Heilkraft gegen die Fallsucht besitzen sollen. Als ein Mittel gegen die Bräune hat man ebenfalls die Schwalbe benutzt, und zwar soll gegen dieses Uebel die Uferschwalbe kräftiger seyn als die übrigen Arten. Auch verbrannte Schwalben wandte man vielfältig im Aterthume an, anderer Gebraucharten nicht zu gedenken.

Die Ringtaube oder große Holztaube (**Columba Palumbus**) wurde auch von den Römern in eignen Vogelbehältern gezogen und gemästet, wovon auch **Apicius** redet (**Palumbus altilis**), diese Taube ist eben so schmackhaft als die **Columba livia** **Briss.**, von der, wie man sagt, die bereits oben erwähnte Haustaube abstammt. Das Fleisch dieser Taubenart ist nicht nur eine allseitige Speise, sondern die römischen Aerzte glaubten noch, daß es in verschiedenen Krankheiten specielle Heilkräfte besäße. Auch die Zureltaube (**Columba turture**) ist zu erwähnen, von der aber **Galen** glaubte, daß sie ein schwer verdauliches Fleisch habe.

Die Wachtel (*Tetrao Coturnix*) hat zwar ein eßbares und von Vielen geschätztes Fleisch, allein Galen warnt vor dem Genuße desselben, weil diese Vögel Nieswurzelsamen fressen, dessen Wirkung in das Fleisch übergehe, so daß viele Personen in Athen, Boeotien, Thessalien usw. von dem Genuße der Wachteln erkrankt seyen.

Das Repphuhn oder Feldhuhn (*Tetrao Perdix*) gehört ebenfalls zu den bekannteren eßbaren Vögeln, und bey den Griechen war nicht minder das rothe Repphuhn (*Tetrao rufus*) bekannt, welches im südlichen Europa und im Orient sich vorfindet, auch auf den Inseln des Archipelagus als Meyer-geflügel gehalten wird. Noch ist das Haseihuhn (*Tetrao Bonasia*) zu nennen, Attagus oder Attagen von den Alten genannt, dessen Fleisch Galen bey Krankheiten des Magens und der Nieren zur Speise anrathet; es ist übrigens fast eben so schmachthast als das des gemeinen grauen Repphuhns. Der Uerbach (*Tetrao Uragallus*) hat nach Plinius ein gutes aber hartes Fleisch.

Der Kranich (*Ardea Grus*) gehörte zu den Lieblingsgerichten der Römer, dessen auch Apicius gedenkt, man mästete sie in eigenen Behältnern, wie Plutarch erwähnt, und sie waren eine Zeit lang gleichsam die Modespise der Römer. Die jungen Kraniche (*Vipiones*), zumal der balearischen Inseln, zierten besonders die Tische der Reichen; die meisten kamen aus Aegypten, wo der Vogel am Nil sich in Menge aufhält. Nach Celsus ist sein Fleisch stark nährend, macht aber leicht Verstopfung.

Der Storch (*Ardea Ciconia*) galt zu den Zeiten des Augustus für eine gute Speise und wurde selbst den Kranichen vorgezogen, allein diese Sitte verlor sich bald wieder, so daß in den Schriften des Apicius davon nichts mehr vorkommt, und in der That das Fleisch dieses Vogels ist hart, zähe, von äßem Geschmacke und schwer verdaulich. In späteren Zeiten war der Storch ein wichtiger Artikel für die *Materia medica*.

Der Taucher oder das Wasserhuhn (*Mergus Merganser*) wird von Dioscorides aufgeführt, und zwar soll die Leber dieses den Fischeichen gefährlichen Vogels, wenn sie mit Wasser und Honig zu einigen Löffeln voll genommen wird, die Eigenschaft haben, die stockende Nachgeburt auszuführen. (Diosc. II. 50.)

Von ausländischen Vögeln sind nur folgende zu nennen:

Das Perlhuhn (*Numida meleagris L.*) oder Huhn aus Guinea, ein ungemein schöner afrikanischer Vogel, der zu den Eckerbissen der Römer gehörte, wovon insbesondere Litius Nileusius, ein Schüler des Aristoteles, in den Schriften des Athenäus nähere Nachricht gab. Das Fleisch und die Eier des Perlhuhns sind sehr schmachthast.

Die Flamingo oder Korkorre (*Phaenicopterus ruber*); ein großer schöner Sumpfvogel heißer Gegenden, dessen Zunge nach der Angabe des Apicius der delicatesse und beliebteste Theil war. Die Federn des Flamingo dienten den reichen römischen Schwelgern als Brechmittel, indem sie sich damit den Schlund kitzelten.

Der Strauß (*Struthio camelus L.*) gehörte ebenfalls nach Apicius in die römische Küche, und besonders waren es nach der Angabe desselben die Brust und Flügel, welche man vorzog; auch auf den Tischen der persischen Könige erschien öfters das Straußenfleisch; nicht minder pflegte man die großen Eier zur Speise zuzurichten, wie dieses Ausonius berichtete.

(Beschluß folgt.)

## Schweizerische Zeitschrift.

für Natur- und Heilkunde, von Dr. Chr. Fr. von Pommer, Prof. Greilbronn, bey Dreßler. 1838. 8. III. Heft 1. 168. 1 Taf.

Diese Zeitschrift geht ihren raschen Gang fort, was beweist, daß sie den Besatz findet, welchen sie verdient. Sie enthält immer gediegene und lehrreiche Abhandlungen, meistens von Schweizer Ärzten, für welche sie ein erwünschter Vereinigungspunkt ist und dadurch sowohl einem Bedürfniß der Schweiz abhilft, als auch dem Ausland Beobachtungen mitzutheilen im Stande ist, welche sonst vielleicht noch lang im Dulkte geruht hätten. Es kommt der Jsis nicht zu, über solche Schriften umständlich zu berichten; oder gar ein Urtheil zu fällen; aber die Gegenstände selbst, welche hier verhandelt werden, scheinen mir in jeder Hinsicht der Aufmerksamkeit werth.

Dieses Heft enthält die Verhandlungen der medicinisch-chirurgischen Gesellschaft des Cantons Zürich vom Jahr 1836; darin Bruchstücke aus der Geschichte des Medicinal-Wesens des Cantons Zürich, von Meyer-Hrens S. 6; Zweyter Jahresbericht der medicinischen und pharmaceutischen Gesellschaft von Anbefingen, h. Sigg S. 17; Erster Jahresbericht der medicinischen Gesellschaft von Uster, von Soollenbach 1834; Beytrag zur Diagnostik der Brustkrankheiten von Schmid, Berger und Bezirksarzt Hess S. 47; Beobachtungen über Strephnin von Staub; Neuralgia coeliaca, von Haab; Zerreißung des Uterus, v. Hasner; Asthma thymicum, v. Staub; Umstülpung der Harnblase von Blattmann; Cholelith im südlichen Frankreich und in Italien, von Rahn-Escher und Meyer-Hofmeister; Ruhrpandemie in Graubünden von Thormann; Zerreißung der Aorta, von E. F. Emmert; Medicin im Orient, von Z. Tobler.

## Zur Diagnostik der Lungen und Herzkrankheiten

mittels physikalischer Zeichen, mit besonderer Berücksichtigung der Auscultation und Percussion, von Dr. P. J. Philipp. Berlin, bey Hirschwald. 1836. 8. 388. 1 T.

Dieses scheint uns ein wichtiges, wenigstens vollständiges Werk zu seyn über diese gewissermaßen noch neue Art von Diagnostik. Nach einer Einleitung über die physikalischen Zeichen behandelt der Verfasser die Percussion ausführlich im Allgemeinen und im Besondern die der Brust; sodann die Auscultation der Athmorgane, des Herzens, der Arterien und der Schwannern; die Besichtigung der Brust, die Succussion, Palpation des Thorax, Messung desselben.

In der zweiten Abtheilung S. 199 werden die Krankheiten der Athemorgane betrachtet, wie Pleuritis, Catarrh, Pneumonie, Phthisis; Krankheiten des Herzens, wie Pericarditis, Hypertrophie, Dilatation und Klappen-Krankheiten. Das Buch ist wohl geordnet, und die Schilderungen sind ausführlich und leicht verständlich.

### De neuromate,

diss. inaug. auct. Gottfr. Hasler. Turici, Orell. 1835.  
4. 30. 3 tab.

Diese kleine Schrift enthält sehr schöne Abbildungen des Hirns, des Rückenmarks und des sympathischen Nerven mit Neuromen, nebst den einschlägigen Krankengeschichten und einer historischen, sehr fleißigen Zusammenstellung ähnlicher Fälle. Ist offenbar ein nützlicher Beitrag für die Medicin.

### De Fungo medullari ac hamatodi,

diss. in. auct. J. Dontobel. Turici, Orell. 1837. 4. 10. t. 1.,

erzählt einen Fall von einem vierjährigen Mädchen, welches glücklich durch Erstirpation geheilt worden ist. Das ausgeschnittene Auge wird anatomiert und abgebildet, sowie der Kopf vor und nach der Operation.

### Die häutige Bräune und die Gehirnentzündung,

besonders der Kinder, durch Erfahrungen am Krankenbette erläutert von Dr. A. Bischoff, Professor. Wien, bey Gerold. 1837.  
8. 162.

Die vielseitigen physiologischen und medicinischen Kenntnisse des Verfassers, sowie dessen practische Wirksamkeit sind hinlänglich bekannt und überheben diese Schrift jeder Empfehlung. Sie ist ein besonderer Abdruck aus seinen Grundsätzen der practischen Heilkunde und entwickelt die genannten Krankheiten in wohlgeordneten Abschnitten; das Bild derselben, den Unterschied von ähnlichen, die Ursachen, Ausgänge, die Vorhersage und Behandlung. Dann folgen sehr charakteristische Krankengeschichten der verschiedensten Art, rein und mit Verwickelung. Die Pathologen und die practischen Aerzte werden dieses Werk zu schätzen wissen.

### De staphylomate scleroticæ,

diss. inaug. auct. M. Herschel. Heidelbergæ, 1838.  
4. 47. 1 tab.

In dieser gehaltreichen Schrift wird alles zusammengestellt, was seit den ältesten Zeiten über den Gegenstand beobachtet worden ist; sodann der vorliegende Fall beschrieben, und das Physiologische, sowie das Pathologische desselben untersucht. Sie verdient daher Berücksichtigung in litterarischer, wie pathologischer Rücksicht.



# U f i S.

## Encyclopädische Zeitschrift,

vorzüglich

für Naturgeschichte, vergleichende Anatomie und Physiologie,

von

### D f e n.

---

1 8 3 8.

H e f t IV.

(Zafel III.)

Der Preis von 12 Heften ist 8 Thlr. sächs. oder 14 fl. 24 Kr. rheinisch, und die Zahlung ist ungetheilt zur Leipziger Ostermesse des laufenden Jahres zu leisten.

Man wendet sich an die Buchhandlung Brockhaus zu Leipzig, wohin auch die Beiträge zu schicken sind. Es wird gebeten, dieselben auf Postpapier zu schreiben.

Unfrankirte Bücher mit der Post werden zurückgewiesen.

Eindrucksgebühren in den Text oder Umschlag die Zeile sechs Pfennige.

Von Anticritiken (gegen Ixis-Recensionen) wird eine Quartseite unentgeltlich aufgenommen.

---

Leipzig, bey Brockhaus.

# A n z e i g e n.

## An Freunde der Naturkunde.

Die Unterzeichneten \* haben, von dem Wunsche befeßt, nach ihren Kräften zur Verbreitung naturhistorischer Kenntnisse, besonders in Italien mitzuwirken, ein Project entworfen, welches sie bereits Allerhöchster Behörde unterlegen. Dieses enthält den Vorschlag eines in Mailand zu bildenden, das Studium der Naturgeschichte begünstigenden Vereines. Hierzu würde, ihrer Meynung nach, vorzüglich ein von demselben zu errichtendes Museum der Naturgeschichte, sammt partieller dazu gehöriger Bibliothek beitragen. Zu diesem Endzwecke bieten sie, im Fall dieser naturgeschichtliche Verein mit Allerhöchster Bewilligung ins Leben trete, demselben unentgeltlich zum Unterrichtsgebrauche ihre eigenthümlichen naturhistorischen Sammlungen, so wie alle naturwissenschaftlichen Bücher, worunter sehr viele kostspielige Werke begriffen sind, an. Diese bestehen:

- 1) aus einer Sammlung von 10,000 Stück Mineralien und Gebirgsarten, welche außerdem, daß sie eine der vollständigsten ist, in Rücksicht der Statistik Italiens auch noch verschiedene topographische Sammlungen, nach dessen verschiedenen Provinzen geordnet, enthält.
- 2) Eine beträchtliche Sammlung von Crustaceen und Insecten, worunter 7000 Käferarten.
- 3) Sammlungen von lebenden und fossilen Conchylien, welche sich auf 4000 Arten belaufen.
- 4) Ein Herbarium von 17,000 Pflanzenarten.

Die Sammlungen des einen der Unterzeichneten sind in Mailand aufgestellt, mit selben werden nun die des andern vereinigt, welcher, obwohl Professor an der Universität von Parma, durch Bewilligung seiner Regentia ermächtigt ist, seinen Aufenthalt in jedem Orte zu wählen, wo er zweckmäßige Mittel findet, sich dem Studium der Naturgeschichte mit Erfolg zu widmen.

In Erwartung Allerhöchster Entscheidung rücksichtlich des vorerwähnten Projectes wollen die Gefertigten nichts versäumen, um soviel als von ihnen insbesondere abhängt, zur Verbreitung der naturhist. Kenntnisse in Italien beizutragen.

Gleiche Reizung und wissenschaftliche Richtung hat die Unterzeichneten schon lange in enge Verbindung gebracht, und nun, da sie in verschiedenen Epochen das ganze Italien und besonders dessen nördliche Provinzen im naturhistorischen Bezuge durch-

suchten, haben sie sich entschlossen, sich freundschaftlich zu vereinigen, um es gemeinschaftlich zu versuchen, eine Fauna und Flora von Oberitalien und dessen oryctognostisch-geognostische Beschreibung zu entwerfen.

Wenn diese Arbeit aus Unzulänglichkeit der Gefertigten das Gepräge der Unvollkommenheit trägt, welches man an allen Werken dieser Art mehr oder minder wahrnimmt, so wird man doch darin nicht ihren guten Willen verkennen, und ihr gemeinsames Streben von unermüdetem Eifer begleitet, die naturwissenschaftlichen Kenntnisse allgemeiner in Italien zu verbreiten, und zu gleicher Zeit die Naturproducte dieses schönen Landes, welches, durch seine Lage mehr als andere Länder Europens begünstigt, hiezu einen reichen Erbtheil erhielt, genauer zu erforschen.

Dieses Ziel ihres Strebens allein verfolgend, vereinigen die Unterzeichneten ihre Naturalien Sammlungen, und sind übereingekommen, die rationellen Cataloge derselben durch den Druck bekannt zu machen, und diese werden vorläufig den Prodomus, eines Theils der Fauna und der Flora Oberitaliens, so wie dessen oryctognostisch-geognostische Beschreibung enthalten.

Diese Cataloge umfassen 4 Sectionen, nämlich:

- 1) Botanik. 2) Conchyliologie. 3) Entomologie. 4) Mineralogie.

Der Catalog jeder Section zerfällt in 2 Theile, den systematischen und den beschreibenden.

Der erste enthält die in ihren Sammlungen befindlichen methodisch aufgefaßten Arten mit besonderer Bemerkung der in Italien einheimischen; der zweite Theil die Diagnosen der noch unbeschriebenen Arten, nebst den Beobachtungen und Untersuchungen, welche in unmittelbarem Bezug auf Italiens Naturproducte stehen: demselben sind lithographirte Abbildungen der neuen Entdeckungen beigefügt; ein Theil ergänzt den andern, und alle Cataloge bilden eine zusammenhängende Reihenfolge.

Der Catalog der ersten Section erster Theil, welcher die Aufzählung der disponiblen getrockneten Pflanzen enthält, deren Zahl sich auf 12,000 Arten beläuft, ist bereits im Druck erschienen, so wie das erste Heft der zweiten Section erster Theil, enthaltend die methodische Aufzählung der Land- und Flussschnecken, wovon bey 300 Arten zur Abgabe vorrätbig (der erste Theil dieser Section enthält 3 Hefte), das zweite Heft wird die systematische Eintheilung der fossilen Conchylien umfassen, und als Ergänzung der Conchyliologia subaenaria von Brocchi dienen, das

\* Georg Zan, Prof., und Joseph de Christophori.



dritte Heft endlich die lebenden Meer-Conchylien, geordnet nach  
Cuvier regne animal, Paris 1830.

Der erste Theil der dritten Section zerfällt ebenfalls in  
Abtheilungen. Unter der Presse befindet sich die erste Abthei-  
lung, welche die erste Ordnung der Insecten, die Käfer, systema-  
tisch geordnet (nach dem neuesten Methode in verbesserten  
Werte) ausführt. Mehr als 3000 Arten sind in Doubletten vor-  
rätzig. Die Abtheilungen, welche die andern Insectenordnungen  
enthalten, erscheinen in der Folge.

Der systematische Theil der vierten Section ist ebenfalls  
schon zum Drucke bereit, und zerfällt in 2 Abtheilungen. Die  
erste enthält die Aufzählung der Mineralien, die zweite die sy-  
stematische Eintheilung der besondern topographischen nach Ita-  
liens Provinzen geordneten Sammlungen.

### Preise der Cataloge.

1) Der erste Theil der ersten Section 4 Frks. 50 Cent.  
(1 fl. 43 kr. Conv. M.).

2) Das erste Heft des ersten Theils der zweiten Section  
50 Cent. (12 kr.), der Preis der übrigen Hefte wird im Verhält-  
nisse festgesetzt werden.

3) Die erste Abtheilung des ersten Theils der 3ten Section  
4 Frks. (1 fl. 32 kr.), der Preis der 4ten Section erste Abthei-  
lung ist 4 Fr. 50 Cent. (1 fl. 43 kr.)

Es dient zur Richtschnur, daß bey allen 4 Sectionen der  
Preis des zweyten Theils jedes Catalogs, nämlich des beschrei-  
benden und der lithographischen Tafeln nie höher angeschlagen  
werden wird, als der Preis des ersten Theils desselben.

Die Cataloge werden alle in gleichem Formate, klein 4.,  
gedruckt, mit Ausnahme des Pflanzen-Catalogs, welcher in Folio.  
Die lithographierten Tafeln werden in demselben Formate er-  
scheinen, in welchem die Cataloge der Section, zu der sie ge-  
hören, gedruckt sind.

Alle jene Personen, welche entweder alle Sectionen, oder  
auch nur den ersten sammt zweyten Theil irgend einer Section  
zu erhalten wünschen, sind ersucht, die benestigten Pränumera-  
tionscheine zu unterschreiben, um hiernach die Anzahl der Ab-  
drücke des zweyten Theils jeder Section bestimmen zu können,  
da deren Zahl im genauen Verhältnisse mit den hierauf erhaltenen  
Pränumerationen stehen wird.

Das Namen-Verzeichniß der Pränumeraanten wird dem 2ten  
Theil jeder Section vorgedruckt werden.

Jene Abonnenten, welche auf alle 4 Sectionen der Catalo-  
ge pränumerieren, erhalten 25 Procent Rabatt, welcher ihnen,  
sobald sie den zweyten Theil jeder Section erhalten, berech-  
net wird.

Die unterzeichneten Pränumerationsscheine können an die  
Herausgeber, oder auch an nachbemerkte Buchhandlungen einge-  
sandt werden, welche gefällig auf besondern Ersuchen den Her-  
ausgebern vor dem Erscheinen des zweyten Theils jeder Section

die Anzeige der durch sie erhobenen Pränumeration mittheilen  
werden.

Den Verkauf der Cataloge haben nachfolgende Buchhand-  
lungen in Commission genommen:

Mailand:	P. Dumolard & Sohn.
	Joh. Meiners & —
Modena:	Gem. Vincenzi & Comp.
Parma:	Joh. Ricordi & Comp.
Florenz:	Beroli & Comp.
Padua:	Zambecconi.
Turin:	Joh. Bocca.
Frankfurt a. M.:	Fischer'sche Buchhandlung.
Leipzig:	Wilhelm Barthel.
London:	Joh. B. Bailliere.
Lyon:	Germann & Blanc.
Paris:	H. O. Bertrand.
	Trentzel & Würz.
	H. Schaumburg & Comp.
Wien:	Fried. Walte.

Die Unterzeichneten würden es nicht wagen, für sich allein  
einem so schwierigen und umfassenden Unternehmen, als die Her-  
ausgabe einer Fauna, Flora und der orthognostisch-geognostischen  
Beschreibung Oberitaliens ist, sich zu unterziehen, welches,  
ungeachtet der vielen Materialien, die sie hiezu schon gesammelt  
und fortwährend sammeln, einen höchst ungewissen Erfolg hätte.  
— Sie würden es nicht wagen, in einer ihre Kräfte übersteigen-  
den Laufbahn sich zu versuchen, wenn sie nicht zuversichtlich auf  
die Theilnahme und Mitwirkung aller Naturfreunde zählen wür-  
den, und wenn dieses ihr festes Vertrauen gerechtfertigt und ihre  
wohlgegründeten Hoffnungen sich bethätigen, so würden sie so-  
gar sich schmeicheln, ihre naturhistorischen Forschungen auch auf  
die südlichen Provinzen Italiens und andere wenig durchsuchte  
Länder Europas ausdehnen zu können.

Vorzüglich von der günstigen Aufnahme nachfolgender An-  
zeige, und der Theilnahme, welche sie bey den Naturfreunden  
findet, hängt für die Gelertigten ihre Befähigung ab, das be-  
gonnene Unternehmen glücklich zu Ende zu führen, und die den  
Naturforschern unzulänglich bekannten Provinzen Italiens und  
anderer Staaten genauer untersuchen zu lassen. In der Erfül-  
lung ihrer Wünsche, und in dem davon abhängenden erhebenden  
Bewußtseyn, auf diese Art mittelbar zur Verbreitung genauerer  
Kenntniß von Italiens Naturproducten beitragen zu können,  
würden sie für jede ihrer Bemühungen reichlichen Lohn finden.

Dieses ist das Ziel, das die Unterzeichneten sich vorsetzen  
und zu erreichen streben, und dieses der Beweggrund, daß sie auf  
die unten bemerkte Art ihren großen Doubletten = No-  
rath von Naturgegenständen, welcher noch ungemein durch die  
freundschaftliche Vereinigung ihrer Sammlungen vermehrt wurde,  
den Naturfreunden unter den gewiß für diese vortheilhaf-  
testen Bedingungen und weit entfernt vom Eigennatze, anbieten;  
sie hoffen daher zuversichtlich, daß nachfolgende Anzeige sich all-  
gemeiner Theilnahme erfreuen darf und von allen Naturfreunden  
günstig aufgenommen wird.

(Fortsetzung folgt.)

## A. Allgemeines.

- G. 241 Prinz Max v. Wieds Reise nach Nordamerica.
- 243 Eitenberg, römische Niederlassung bey Meskirch.
- 244 Züricher Alterthümer.
- 245 Sprüngli's Jugendfeste.
- 246 Schreibers Glareanus.
- — Bobriks Logik.
- 247 Sommers Erdkunde und Taschenbuch.
- — Eiselein's Sprüchwörter.
- — Hallische Jahrbücher.

## B. Naturgeschichte.

- — Leopoldinische Verhandlungen.
- 250 Waltl, Unterdonaukreis: Mineralien, Pflanzen, Käfer.
- 273 Germar, Bemerkungen über Salamiten. Taf. III.
- 277 K. Speyer, Lepidopterologische Beyträge; Fühlhörner, Tagfalter, Abendfalter, Nachtfalter, Nebenaugen.

- G. 314 Menetries, Catalog der Thiere vom Caucasuß.
- 320 Zetterstedts lappländische Käfer.
- — Pommers Zeitschrift für Natur- und Heilkunde.

---

## I n f a g.

An Freunde der Naturkunde.

---

## V e r k k r.

---

## E i n g e g a n g e n.

### Bücher.

- G. Pöewig, Chemie der organischen Verbindungen. Zürich bey Schultheß. 1838. 8. Liefer. 1. 304.



1838.

B e f t IV.

## Reise in das innere Nordamerica

in den Jahren 1832, 33 und 34., vom Prinzen Maximilian von Wied. Coblenz bey Hölcher  
1838. 4. Heft 1. 2. 96. L.

**A**us den Schlachten in Frankreich zurückgekehrt reiste der Prinz im Jahr 1815. bekanntlich nach Brasilien, um die dortigen Schätze der Natur zu studieren und zu sammeln. Sein schönes Reisewerk, seine lehrreiche Naturgeschichte nebst den vielen neuen Abbildungen sind der Welt bekannt. Kaum hatte er diese Herausgabe vollendet, so bereitete er sich auf eine neue Reise vor, um auch das Gegenstück der Welt mitzutheilen, nemlich Nordamerica. Wie er von den Ureinwohnern und den Thieren des südlichen Americas ein großes Gemälde entworfen hat, so beginnt er nun auch dasselbe von den Wilden des nördlichen. Wenn gleich schon vieles über diese Völkerstämme geschrieben worden, so kennt man doch noch nicht alle, und von keinem sind vollständige Schilderungen, noch weniger treue, schöne und großartig ausgeführte Abbildungen vorhanden. Das alles wird gegenwärtiges Werk liefern, und hat es zum Theil schon geliefert auf eine so treue und prachtvolle Art, wie noch nichts ähnliches vorhanden ist.

Der Verfasser schildert in lebhaften Farben das Leben und Weben der zahmen und wilden Menschen von Nordamerica, die Gegenden und Orte, den Handel und Wandel, den Anbau des Landes; die Gewerbe, die Bauart der Häuser und Städte, den Verkehr auf den Strömen, Straßen und in den Wäldern, die Physiognomie des Thier- und Pflanzenreichs. Man wird das Werk mit Vergnügen und Belehrung lesen und sich freuen, daß ein Fährte, dem die Wege besser gebahnt sind als jedem andern, dem man von allen Seiten entgegen kommt, um sich ihm zu empfehlen, dem man die Archive öffnet und Schutz gewährt wo er bedarf, einer solchen Aufgabe sich unterzogen hat. Unter den Wilden ist er freilich seinem eignen Schutz überlassen, aber auch da wird es ihm leichter, ZfS 1838. Heft 4.

seinen Zweck zu verfolgen. Mühseeligkeiten und Gefahren hat er jedoch ebenso zu bestehen wie jeder andere; dafür ist aber sein Verdienst und sein Ruhm größer, die Wirkung weiter verbreitet und länger dauernd. Der Prinz hat durch seine Talente, seine Kenntnisse und seine Aufopferungen der Völker- und Naturgeschichte unendlich genügt, und durch sein Beispiel gewiß vieles zu der Achtung beygetragen, in welcher sie gegenwärtig bey den Großen stehen.

Auszüge aus dem reichhaltigen Werke können wir keine mittheilen, ist auch nicht nöthig, da es doch wohl von jedem Freunde der Geschichte der Völkerkunde, der Naturschönheiten und der Naturgeschichte wird gelesen werden.

Das erste Capitel beschreibt die Seereise im May 1832. nach Boston, den Aufenthalt daselbst, das Unabhängigkeitsfest, die Gasthöfe, Charlestown, Cambridge, das Museum, die Fahrt nach New-York und die schöne Ansicht dieser Stadt; das 2te, S. 28, den Aufenthalt daselbst, Philadelphia, Bordentown, den Park des Königs Josephs, Wald-Excursionen; das 3te, S. 43, den Aufenthalt zu Freyburg, die Ansicht des Landes, die deutsche Bevölkerung, die Colonie der mährischen Brüder zu Bethlehem, und Jagd-Excursionen; das 4te, S. 65, die Reise nach dem Berg Pokono und die blauen Berge nach Rauch-Shunk im Polen-District, wo viele Schilderungen der Orte und Gegenden unterwegs vorkommen, nebst Excursionen in naturhistorischer Hinsicht, wobey sowohl die Pflanzen als die Thiere berücksichtigt werden.

Die Kupfertafeln sind wirklich über alle Beschreibung schön und charakteristisch, alle gezeichnet von Ch. Bodmer aus Zürich, der die Reise mitgemacht hat, gestochen von Mar-

tens, Ch. Vogel, Simely, P. Legrand und Hürli-  
mann. Sie theilen sich in Quart- und Folioblätter; von  
diesen 6. Sie enthalten den Leuchthurm von Boston, eine  
Ansicht auf den Dalaware; Bisonheerden und Elstische am  
obern Missouri; Mündung des Forlusses; eine Ansicht der Mo-  
cogebirge; überall mit herrlichem Baumschlag; einen Mönni-  
tari-Indianer in seiner sonderbaren Kleidung vom Kopf bis zu  
den Füßen; einen andern Wilden nackt, aber geschmückt mit  
den Zeichen seiner Kriegsthaten, Opfer der Mandan-Indianer,  
überall mit sprechenden Gesichtszügen.

Es sind Kupferstiche, welche unter Glas und Rahmen  
gebracht zu werden verdienen. Noch nirgends gibt es solche  
treue Abbildungen der Völkersämme, noch nirgends mit sol-  
chem Kunstgeschick und solcher Schönheit dargestellt. Dem  
Werk wird der Beyfall der gebildeten Welt reichlich zu Theil  
werden.

### Römische Niederlassung bey Messkirch,

entdeckt und beschrieben vom Pfarrer Eitenbenz zu Dietingen.  
Constanz. 1836. 8. 53. 5 Taf.

Eine sehr interessante Schrift, nicht bloß wegen der vie-  
len römischen Entdeckungen, 1—2 Stunden westlich von Mes-  
sikirch, sondern auch vorzüglich deshalb, weil in der Gegend die  
auf der peutingerschen Karte an der Straße von Windisch  
nach Regensburg verzeichnete Stadt Samulocenis gelegen ha-  
ben muß. Auch gibt es daseibst noch Simmel- und Saum-  
wiesen und Zell- oder Zeinäcker.

Der Verfasser hat nun entdeckt und zum Theil ausge-  
graben auf der Stelle mit Namen Altstadt, eine Stunde west-  
lich von Messkirch in einem Walde, dicht an der Straße, nach  
seiner Ansicht eine römische Bestung mit einem Pratorium,  
Quästorium; Wohnungen für die Cohorte, ein Krankenhaus,  
die Thore eines Winterlagers. Auf dem Platze fanden sich ei-  
nige Münzen, große Backsteine, Heizungen mit Kohlen und  
Asche, Gefäße aber nicht von samischer Erde, Ziegel, Möhren,  
wahrscheinlich zur Leitung warmer Luft, Hohlziegel, Ziegel mit  
Rändern. Er deutet die verschiedenen Linien auf den Ziegeln  
sehr sinnreich als Cohorten-Zeichen, was spätern Untersuchungen  
zu bewähren aufbehalten bleibt.

Nicht weit davon liegt das Dorf Altheim, welches wahr-  
scheinlich mit der Altstadt einen einzigen Ort ausmachte.

In der Gegend hat auch der Verfasser Sommerlager  
entdeckt, mehrere Straßenzüge und eine Menge Grabhügel,  
worinn man Ringe, Fibulae, Teller von Erz, Arnen und  
Waffen gefunden hat. Die meisten dieser Dinge sind abge-  
bildet, nebst einem Plan der Altstadt und einem Chärtchen  
der Gegend.

### Mittheilungen

der zürcherischen Gesellschaft für vaterländische Alterthümer II.  
1838. 4. 16. 4 Taf.

Neben mehreren gelehrten Gesellschaften, welche in Zürich  
bestehen, namentlich der naturforschenden und medicinischen hat  
sich auch vor einigen Jahren eine antiquarische gebildet oder  
archäologische, welche mit großem Eifer die vielen im Canton  
und der Nachbarschaft vorhandenen celtischen und römischen Al-  
terthümer sammelt, Ausgrabungen veranstaltet, Ausstellungen  
hält und das Wichtigere bekannt macht.

Das vorliegende Heft ist besonders reich und schön aus-  
gestattet. Es enthält die Beschreibung und Abbildungen von  
mehrern römischen Gebäuden, welche kürzlich bey Kloten, das  
vielleicht Claudia geheissen hat, 2 Stunden nördlich von Zürich,  
vermuthlich an der Straße von Bindonissa nach Arbor felix  
gelegen, aufgedeckt worden sind. Diese Aufgrabung wurde mit  
der größten Sorgfalt geleitet, um sowohl die Bauart der Mauern,  
die Einrichtung der Zimmerheizung, der Abzugsräben, die Be-  
stimmung der Zimmer und die Verzierung der Fußböden zu er-  
forschen und abzubilden. Die Beschreibung ist wohlgeordnet mit  
Sachkenntniß und Genauigkeit verfertigt.

Man fand leider außer Ziegeln der 11. und 21. Legion  
keinen Namen. Die Entstehung der Gebäude wird ins 2te  
Jahrhundert gesetzt; der Untergang mit Wahrscheinlichkeit ins  
Jahr 351. Dann folgt die Beschreibung der Gebäude nebst  
einem Plan und einer Seitenansicht mit Angabe der Maaße  
und einer besonders genauen Schilderung aller Einrichtungen,  
die sich auf das Heizen bezogen haben. Es ist wirklich auf-  
fallend, daß die neuern Baumeister den römischen Bau der  
Mauern, und besonders den noch merkwürdigern der Wände  
gar nicht studieren und noch niemand versucht hat, in seinem  
Hause eine römische Heizung anzulegen. Man pfucht immer  
ohne alle Berücksichtigung der physischen Geseze fort, während  
bey den Römern alles auf das genaueste ausgedacht und auf  
das sinnreichste ausgeführt ist. Auch die Mosaikböden, deren  
hier zwey recht artige gefunden worden, und wovon schöne il-  
luminirte Abbildungen gegeben sind, können unmöglich soviel  
Müh und Kosten verursacht haben, daß man sie gegenwärtig  
nicht sollte nachahmen können. Was die Bestimmung der Ge-  
bäude betrifft, so glaubt der Verfasser nach Beurtheilung aller  
Umstände, daß sie eine *Mansio*, mithin öffentliche Gebäude ge-  
wesen seyen zur Wehrbergung reisender Magistrate und auch wohl  
der Imperatoren.

Dann folgt ein Verzeichniß von vielen Gegenständen, be-  
sonders von Münzen, welche zum Theil schon vor 100 Jahren  
daseibst ausgegraben worden sind.

Abgebildet sind verschiedene Gegenstände: ein Silen aus  
Bronze, Becken, Köffel, Haarnadel, Ringe, Schlüssel, Ziegel,  
Heizröhren udl.

Den Alterthumsforschern, den Kunstfreunden, den Bau-  
meistern und überhaupt den Bewohnern des Landes muß diese  
Schrift ein angenehmes Geschenk seyn.

## Die Jugendfeste.

Freundesgabe auf das Jahr 1838. für die Jugend, ihre Eltern, Lehrer und Freunde, von J. Z. Sprüngli, Pfarrer in Thalwil. Zürich bey Schultheß. 204. 12 Taf.

Mit diesem Buch wird ein neues Feld des Lebens eröffnet, ein neuer Zweig der Erziehung zum Grünen gebracht, ein neuer Genuß der Jugend geboten. Ob und wie Jugendfeste bey den Alten begangen wurden, kann uns hier gleichgültig seyn, so wie ihre Wirkung. Sie wurden vergessen und waren nicht mehr in unserem Volk. Der sinnige Verfasser hat sie nicht wieder hervorgerufen, sondern wirklich erfunden für unsere neue Welt, eingerichtet nach unsern Gefühlen und Gewohnheiten und wirklich eingeführt ins Leben, nicht bloß auf dem Papier vorgeschlagen. Nachdem der Verfasser Jahre lang über die Einrichtung solcher Feste gedacht und in seiner Nachbarschaft dafür gewirkt hatte, versammelte er im Sommer 1837. die gesammte Jugend von Dörfern bis in das 17te Jahr auf einer Anhöhe mit passendem Boden. Es waren ihrer nicht weniger als 1340, welche Zahl zu ordnen und zu beschäftigen gewiß nichts geringes gewesen. Sie wurden daher in 5 Abtheilungen gebracht und durch Farben unterschieden. Jede Farbe bekam 10 Spielkreise, so daß 50 solcher Kreise entstanden, jeder von 26—27 Kindern, und so gewählet, daß sich aus jedem Dorfe darunter befanden. 100 Erwachsene aus 40 Männern und 60 Jungfrauen waren als die Leiter der Spiele an die Kreise vertheilt. Ein Spiel dauerte eine halbe Stunde, wurde zehnmal wiederholt, aber immer mit andern Kindern, so daß dieselben den Spielmeistern immer neu waren.

Von den andern Einrichtungen und der mannichfaltigen, aber doch einfachen Organisation, wodurch die schönste Ordnung in dem bunten Gewühl erhalten wurde, hier zu berichten wäre unnöthig.

Der Erfinder dieses Festes ordnete 6 Hauptbeschäftigungen an: Gesang, Gesellschaftspiel, Turnspiel, Waffenspiel, Reigenpiel und Schauspiel. Alles war beschäftigt den ganzen Tag, jedoch mit Unterbrechung durch Ruhezeiten und Mahlzeiten. Zuschauer von Tausenden standen um das Spielfeld, wie man wohl denken kann, wenn man nur die Eltern und Geschwister in Betracht zieht. Schönes Wetter begünstigte den Tag; und Wochen lang sprach man in der ganzen Gegend von diesen fröhlichen und bildenden Spielen, worunter waren: je 4 Ballspiele, Plumpsackspiele, Lauf-, Blinds-, Ziel- und Sprechspiele. Außerdem wurden 20 Lieder und Märsche gesungen oder musiciert.

Alles dieses wird in diesem Büchlein auf eine anmuthige Art beschrieben; Musiknoten sind beigegeben, Scenen abgebildet, so wie die Schemata zur Vertheilung und Aufstellung der Partheien. Dieses Fest wird gewiß Anklang finden, sich weit verbreiten und den Erfinder so wie Ausführer mit allgemeinem Gelingen belohnen, sowie mit dem Bewußtseyn, der Jugend und dem Volk ein neues Mittel zur Freude und Bildung gegeben zu haben.

## Heinrich Poriti Glareanus,

gekrönter Dichter, Philolog und Mathematiker aus dem 16ten Jahrhundert, biographische Mittheilungen von Dr. F. Schreier, Professor. Freyburg bey Gross. 1837. 4. 135.

Eine sehr ausführliche und gründliche Schilderung des sehr bewegten Lebens Glareans und seiner Zeit, worinn man nicht bloß mit einer ausgedehnten Literatur, sondern auch mit dem damals sehr thätigen wissenschaftlichen Verkehr im südlichen Deutschland und Frankreich bekannt gemacht wird. Glarean, geb. 1488. zu Mollis im Canton Glarus, fiel in die Zeit der Reformation, studierte zu Bern und Rottweil, wurde zu Eöln Magister, stand mit Zwingli im Briefwechsel, erhielt vom Kaiser Maximilian den Dichterkranz, schilbert Reuchlins Gegner und Freunde zu Eöln, errichtet an der Universität Basel, wo er mit Erasmus in vertrauter Bekanntschaft war, ein philologisches Pensionat, später ein solches in Paris, vorzüglich für Schweizer, beschäftigt sich viel mit der Reformation, kehrt wieder nach Basel zurück, wird später Professor zu Freyburg, wo er ebenfalls ein Pensionat errichtet; starb 1536.

Nach Erzählung dieser Lebensverhältnisse, woben sein Verkehr mit vielen Gelehrten, besonders Theologen damaliger Zeit, klar vor Augen gelegt wird, folgt eine Würdigung seiner Handlungsweise, seiner literarischen Leistungen und ein genaues, mit Beurtheilungen verbundenes Verzeichniß seiner zahlreichen Schriften. Einen gelehrteren, fleißigern und unparteyischen Biographen hätte der berühmte Glarean nicht finden können. Jeder Gelehrte würde sich freuen, wenn ihm solch ein Monument gesetzt würde.

## Neues practisches System der Logik,

von Prof. Dr. G. Dobriz. Zürich bey Ziegler. 1838.  
8. 1. 1. 347.

Diese Schrift schlägt offenbar einen eigenen Weg für diese so vielen Schicksalen unterworfenen Wissenschaft ein, und darum glauben wir, unsere Leser darauf aufmerksam machen zu müssen, obgleich die Jfis keinen umständlichen Bericht darüber geben kann, da sie eine andere Bestimmung hat.

Der Verfasser gibt in der Einleitung die Erklärung der Logik, ihre Eintheilung und ihr Verhältniß zur übrigen Philosophie; dann wird im ersten Abschnitt die ursprüngliche Ideenlehre abgehandelt, und zwar in 5 Capiteln, die Ideen der Apperception, der Begriffs-Sphäre, der Begründung, des Urtheils und der Widerspruchslösung, welchen Capiteln eine Menge Gegenstände untergeordnet sind, die hier erwoogen werden. Gekentlich kommen alle Systeme zur Darstellung und Beurtheilung, so daß man in dieser Schrift alles finden wird, was über diesen wichtigen Gegenstand seit so vielen Menschenaltern die scharfsinnigsten Köpfe gedacht und bekannt gemacht haben.

## Lehrbuch der Erd- und Staatenkunde,

von J. G. Sommer. Prag bey Salve II. 2. 1837. 8.  
189 — 432.

Wir haben die Einrichtung dieses fleißigen Werks schon früher angezeigt und brauchen daher hier nur zu bemerken, daß dieser Band enthält die Länder: Bayern, Sachsen S. 249; Hannover S. 264; Württemberg S. 282; Baden S. 307; Churheffen S. 325; Großherzogthum Hessen S. 334; Weimar S. 344; Meiningen S. 350; Coburg 355; Altenburg 360; Mecklenburg 363; Oldenburg 375; Nassau 381; Braunschweig 389; Anhalt 397; Schwarzburg 403; Reuß 408; Lippe 412; Waldeck 416; Hohenzollern 418; Liechtenstein 422; Homburg 422; Frankfurt, Lübeck, Hamburg und Bremen 424.

## Taschenbuch

zur Verbreitung geognostischer Kenntnisse für 1838. von demselben, ebd. 331. 311. 6 Tafeln.

Dieses beliebte Taschenbuch gibt jährlich eine gebrängte Uebersicht der merkwürdigsten Reisen, welche man nicht anders als mit Interesse lesen kann; sodann vollständige Auszüge aus einzelnen Reiseverken; hier aus Laborde's Reise zu den Ruinen von Petra in Arabien; Nates Reise nach Neu-Seeland; Wilkisons und Lane's Skizzen aus Aegypten; Roscoe's Streifzüge durch Siscana und Castilien. Die Strahl- und Kupfersteine sind wirklich sehr schön: Ansicht von Petra; der Berg Sinai; die Missions-Station Waimate auf Neu-Seeland; die Gräber der ägyptischen Mameluken Könige; der Paß von Pancorbo in Spanien; das Gicural. Diesem Taschenbuch darf man nicht Glück wünschen: es wird hoffentlich dasselbe schon haben.

## Die Spruchwörter und Sinnreden des deutschen Volks

in alter und neuer Zeit; zum ersten Mal aus den Quellen geschöpft, erläutert und mit Einleitung versehen von J. G. Eiselein. Donaufschingen im literarischen Verlag. 1838. Heft 1. und 2. 8. 268.

Wir machen auf diese reichhaltige Schrift aufmerksam, weil sie alles Hergehörige wohlgeordnet enthält, nebst einschlägigen Stellen aus dem Lateinischen und Griechischen. Der Verfasser hat mit ungemeinem Fleiße die altheutischen Werke ausgelesen in Reim und Prosa, die Hauptwörter alphabetisch geordnet, so daß man über jeden Gegenstand, der einem einfällt, sogleich ein Spruch- oder Sinnwort finden kann. Der Autor steht überall dabei; wo es nöthig ist, sind Erklärungen beigelegt. Die Schrift ist eine Unterhaltung für das Volk und eine Schatzkammer für den Gelehrten.

Da der Verfasser sie alphabetisch geordnet hat, so muß die Handschrift wohl fertig seyn, und man darf daher der baldigen Vollendung entgegen sehen.

## Hallische Jahrbücher

für deutsche Wissenschaft und Kunst, von den Doctoren A. Ruge und Th. G. Termeyer. Leipzig bey Wigand. 1838. klein Folio.

Diese Zeitschrift oder vielmehr Literatur-Zeitung, welche seit dem Jänner dieses Jahres erscheint, läßt sich gut an. Es ist den Herausgebern Ernst um die Sache, und sie scheinen bereits tüchtige Mitarbeiter gefunden zu haben. Der Hauptinhalt besteht in Kritiken, Charakteristiken, Correspondenzen und Uebersichten. In den vor und liegenden Blättern beginnt eine Art Geschichte der Universität Halle von Termeyer, eine Charakteristik von Justinus Kerner durch Dr. Strauß; von Dahlmann durch Fr. Müllau; Critiken von des Chalybius Entwidlung der speculativen Philosophie. Ueber Wapert's Idee der Freyheit, Intelligenz-Blätter liegen bey.

## Verhandlungen

der Kaiserlich Leopoldinisch-carolinischen Academie der Naturforscher. Bonn bey Weber. XVIII 1. 1836. 4. 542 und 53. 40 Tafeln.

Wieder ein Band von vortreflichen Abhandlungen und Abbildungen, welche Deutschland Ehre machen und die Wissenschaft bereichern. Wir bedauern jedesmal, daß das Werk kein ausländisches ist, um unsern Lesern Auszüge daraus mittheilen zu können. Wenn auch solche Werke nicht leicht von Einzelnen angeschafft werden, so kommen sie doch hoffentlich in alle Bibliotheken und in die der gelehrten Gesellschaften, wo sie benutzt werden können.

Dieser Band enthält 13 meistens große Abhandlungen, fast jede mit mehreren Tafeln.

1) C. M. Diesing, Monographie der Gattung *Tristoma*,

mit sehr schönen, vergrößerten Abbildungen Tafel 1. von einer neuen Art, *T. tubiporum*, auf den Kiemen von *Trigla hirundo*. Das Thier hat einen verzweigten Darm wie *Fasciola*, einen ähnlichen Eyerstock und männliche Geschlechtstheile, zwittrhaft. Man kennt jetzt 4 Arten: *Tristoma maculatum* (*diodontis*), *coccineum* (*molae*) et *elongatum* (*hippoglossi*), welche hier ebenfalls characterisirt werden.

2) B. C. Trinius, über das Wesen und die Bedeutung der menschlichen Haare und Zähne S. 17;

ein physiologischer Aufsatz, der aber etwas zu umständlich zu seyn scheint.

8) G. Valentin, über den Verlauf und die letzten Enden der Nerven, S. 51 mit 8 Tafeln.

Ein sehr großer Aufsatz mit feinen Beobachtungen und vielseitigen Betrachtungen, welcher viele neue Aufschlüsse über den Bau und die Bedeutung der Nerven enthält. Die microscopischen Abbildungen sind so zahlreich, daß wir nicht im Stande sind, den Inhalt derselben anzuzeigen. Sie erreichen die Zahl von 86 und sind vom Verfasser selbst gezeichnet.

4) J. J. Brandt, über den Bau der sogenannten Moschusdrüsen des *Sorex moschatus*, S. 241, mit einer Taf.

Man kannte zwar schon diese Drüsen durch die Untersuchungen von Pallas, welche jedoch nicht so ins Einzelne eingegangen und überhaupt nicht ihre Bedeutung gehörig entwickelten, auch von keinen so einzelnen Abbildungen begleitet waren wie hier. Der Verfasser stellt sie in die Bedeutung der Afterdrüsen, obgleich sie hinter dem After im Schwanz liegen. Er bildet die einzelnen Bälge und ihre Oeffnungen ab.

5) H. von Meyer, Beiträge zu Eryon, einem Geschlechte fossiler langschwänziger Krebse, S. 261, mit zwey Tafeln.

Abgebildet sind E. hartmanni, sehr vollständig, et schuberti; beide umständlich beschrieben. E. cuvieri, schlotheimii.

6) H. von Meyer, Abweichungen von der Fünfszahl bey Chiniden, nachgewiesen durch einen vierzähligen Eibairiten und 6zähligen Galeriten, S. 285, mit einer Tafel;

ein interessanter Aufsatz über die von Agassiz angeregte Symmetrie dieser Thiere.

7) A. J. Corda, Anatomie Hydrae fuscae pag. 297 cum tabulis tribus.

Der Verfasser bildet das Thier und seine einzelnen Theile in ungeheurer Größe ab, und hat auch Dinge daran und darinn gefunden, denen man bisher vergebens nachgegangen ist; zuerst einen After, über den man sich seit längerer Zeit gestritten hat. Der Leib schwillt an gewissen Stellen in Warzen an, welche spiralförmig liegen und zum Tasten dienen; innenwiegend sie 4 gelbliche Muskelfasern nach der Länge, welche die Extensores tentaculi zu seyn scheinen; auch Adductores tentaculi sind vorhanden. Die Fühlfäden sind hohl, stehen aber nicht mit der Leibeshöhle in Verbindung; in ihrer eywförmigen Masse liegen braune Körner zerstreut. Die Warzen auf den Extensores tentaculi sind merkwürdig gebaut. Sie stecken in einem Säckchen und endigen in eine Wimper. Dabey sind noch andere Organe, welche der Verfasser Hasta et Sagitta nennt und deren Verhältniß sich ohne Abbildung nicht begreiflich machen läßt. Sie dienen zum Anfassn und scheinen ein Gift zu enthalten: denn die gefangenen Thierchen sterben sogleich. Zwischen je 2 Fühlfäden steht eine Lippe. Der Leib besteht aus 2 zelligen Hautschichten; in der innern hat er Germina gefunden; in der Darmhaut Zotten mit Oeffnungen. Sie verdauen außerordentlich schnell, eine Kerflarve in 4 Minuten; Körner von *Vaucheria globata* gehen unverdaut fort.

Die Abbildungen sind sehr schön.

8) Diesing, helminthologische Beiträge, S. 305, mit einer Tafel.

Juli 1838. Heft 4.

Eine neue Axine, welches Wort der Verfasser in *Heteracanthus* verwandelt. Es fand sich auf den Kiemen von *Esox helone*. Er stellt das Thier zu den Trematoden, und nennt es *Heteracanthus sagittatus*, die frühere Heine aber *H. pedatus*. Er hat gefunden einen Darm, weibliche Theile, Eyerstock, männliche Theile zweifelhafte; Häutchen und Stacheln am Schwanzende.

Ferner wird beschrieben *Tristoma papillosum* und abgebildet.

9) Walfer-Arnott, *Pugillus plantarum Indiae orientalis* p. 319 t. 1.

enthält Charaktere von 126 Gattungen, und zwar dicotyledonischer 30 Familien. Neue Sippen sind: *Rissoa* (*Limonia*); *Moonia* (*similis Bidentii*); *Sykesia* (*Psychotria vaginans* etc.) 357 Zufas von Nees de Solano wightii fig.

10) Lindenberg, Monographie der Riccien 361 mit 19 ill. Tafeln.

Ein ganzes Buch mit einer großen Einleitung über den Bau dieser merkwürdigen Pflanzen, sowie über ihr Wachsthum und ihre Fortpflanzung, reich an eigenen Beobachtungen. Die Familie enthält folgende Sippen: *Riccia*, *Corsinia*, *Oxymitra*, *Sphaerocarpus*. Von den Riccien werden 21 Gattungen beschrieben und abgebildet; von *Corsinien* 1; von *Oxymyriten* 1; von *Sphaerocarpen* 1.

11) Meyen, Beiträge zur Kenntniß der Azollen, S. 505, mit 1 Taf.

Ebenfalls eine sehr genaue und microscopische Untersuchung dieser merkwürdigen Pflanzen, mit deutlichen Abbildungen der so vielfach bestrittenen Fruchtheile.

12) A. Henry, Beitrag zur Kenntniß der Laubknochen, S. 525, mit 2 Taf.

Sehr genaue Zeichnungen der Blätterlage von Knochen unsers Laubholzes.

Dem Band ist angehängt das meteorologische Jahrbuch der Sternwarte zu Jena von Prof. Schrön.

Sehr zahlreiche, mühselige, genaue und musterhafte Beobachtungen.

## Watl, Beiträge

zur nähern naturhistorischen Kenntniß des Unterdonaukreises in Bayern.

(Erste Fortsetzung von 1837. S. 860.)

Wir nähern uns nun auf dem Wege nach Kirchdorf, einem Dorfe, welches 2 1/2 Stunden vom Regen und 15 von Passau entfernt ist, einer der ersten mineralogischen Merkwürdigkeiten, dem sogenannten Pfahl. Dieses mächtige Quarzlager erstreckt sich von Osten gegen Nordwesten, von Kirchdorf über acht Stunden weit, nach der Behauptung anderer kann

man den Pfahl 20 Stunden weit verfolgen. Seine größte Höhe von 120 Fuß ist bey Biechtach. Er zeigt sich auf dem höchsten Rücken der mittlern Granitberge als eine nackte Felsenwand, auch am Weissenstein, einem Berg mit Schloßruinen, umweit dem Markte Regen erscheint er von ansehnlicher Höhe. Sein größter Durchmesser beträgt nie über drey bis vierthalb Lachter. Wahrscheinlich war er vor Zeiten von der Gebirgsmasse ganz eingeschlossen, da aber der Granit durch Verwitterung zerfiel, so erschienen die nackten Wände des Pfahles. Er steht bey March durch den Fluß Regen. Der Quarz, woraus der Pfahl besteht, ist nicht immer von gleicher Beschaffenheit; die colossallischen Massen am Weissenstein sind fast hellweiß, und man braucht diesen Quarz zur Glasfabrication, bey Brackenstein ist er ziegelroth, an den meisten Orten grau und nähert sich dem Hornstein, bey Biechtach enthält er fogar viel Thon. Crystallifizierte Partzien sind selten und die Crystalle stets klein.

Zur Bereitung des Glases wurde er von den Glashütten in der Nähe öfters versucht, er liefert ein sprödes Glas und gibt viel Bodensatz; nur der Kiesbruch am Weissenstein liefert ein reines und gutes Material und wird von den nahen Glashütten geholt.

Der Pfahl ist nach unserer Ansicht nichts anderes als der höchste Berggücken oder Kamm eines sich in die Tiefe erstreckenden Quarzgebirges oder eigentlichen und wahren Urgebirges. Unsere Granitgebirge brecht man ganz unverdienter Weise mit dem Namen Urgebirge, sie sind ja offenbar durch Wasser gebildet, aus Bestandtheilen, die mit Gewalt vorher zertrümmert wurden. Die wahren Urgebirge verloren in späteren Revolutionen vorzüglich durch Wasserkräfte viel von ihrer Höhe und Mächtigkeit, da sie die Masse zu den jetzt sogenannten Ur- und zu andern Gebirgen lieferten, sie wurden von diesen jüngeren Gebilden fast ganz überdeckt und nur hie und da sind noch Spuren der wahren Urgebirge vorhanden, die aus Quarz, Feldspath, Hornblende, Urkalk, Schwefel, Metallen und anderen einfachen Mineralien bestanden.

Oft wegen dieser ange deuteten größern Höhe und Mächtigkeit der frühern Urgebirge waren auch die Flüsse bey weitem breiter und tiefer, wie die Betrachtung der frühern Kinnale so deutlich zeigt, und das in allen Welttheilen. So lange diese Ansicht nicht allgemeine Annahme findet, wird man keine klaren Begriffe über die Entstehung der Pseudo-Urgebirge und über die frühere Gestaltung der Erdoberfläche erlangen. Wächten doch die Geologen sich in unserem Bezirke Ueberzeugung über eine so höchst wichtige Thatsache erhalten. —

Ehe wir von der Besichtigung des Pfahles nach dem merkwürdigen Bergwerke Bodenmais reisen, wollen wir das ganze Gebirge in Hinsicht auf seine Bildung betrachten.

Der Kern des Waldgebirges besteht aus Gneis, welcher die höchsten Gipfel und die tiefsten Thäler bildet, im nördlichen Theile des Waldes sich sehr ausbreitet und dort in Glimmerschiefer übergeht. Der Gneis, der nach unserer Ansicht nur eine durch mehr ruhige Ablagerung aus Wasser entstandene Granitvarietät ist, unterläßt sichbar an vielen Stellen den Granit, ein Zeichen, daß dieses Gebirg nicht auf einmal fertig wurde. Der Granit kommt in großen Massen vor, besteht gewöhnlich aus sogenanntem porphyrtartigen, enthält oft statt des Glim-

mers Hornblende und geht häufig, wie schon erwähnt worden ist, in Spinit über, z. B. bey Schönberg. Im Gneis, befinden sich häufig Gänge oder Stöcke von Quarz, z. B. bey Zwiesel und Rabenstein, gemischt mit Rosenquarz, Albit, Schörl, Tantalit, Beryll und andern Mineralien. Die ferneren Bestandtheile dieses Gebirgszuges sind Diorit und Dioritschiefer, Hornblendegestein, Urdolomit und Granulit. —

Bodenmais ist ein unregelmäßig gebautes Dorf mit 550 Einwohnern, mit einem Vitriolwerk und Bergbau auf Magnetkies. Granit ist die Hauptmasse des Gebirges herum, eine sonderbare Sorte, ist aus lauchgrünem Quarz, olivengrünem Feldspath, etwas Stimmer und Pyropen gebildet; überhaupt findet man den Pyrop hier und um Zwiesel gar häufig in Granit und im sogenannten dunkeln Waldgneis eingemengt. Das Bergwerk befindet sich am sogenannten Silberberg. Dieser Name kann nur von dem Wahne kommen, als fände sich wirklich dieses edle Metall da, was nie der Fall war und noch nicht ist. Der Silberberg ist auf Granit aufgelagert, daher man in tieferen Stellen keine Spuren von Erzen mehr findet und wenig in der Höhe bleiben muß. Der Silberberg besteht aus einer eigenthümlichen Masse, die ein Kenner in jedem Mineralienkabinete als bodenmaiser Mineral sogleich erkennt. Es ist hier Quarz, Feldspath, Stimmer und Kiese auf sonderbare Art zusammen gekittet, besonders ist der blättrige Magnetkies häufig. Das ganze Äußere des Silberberges ist roth von Eisenoxyd, auch findet sich eine Art schlechten Eisenerzes, nemlich mit Eisenoxydhydrat durchdrungenen Quarz, welches man in früherer Zeit auf Eisen verschmolz. Aus dem gewonnenen Magnetkies wird durch Rösten auf bekannte Art Eisenvitriol erzeugt. Außer den schon genannten findet man um Bodenmais noch folgende Mineralien: crystallifizierte, derben und zelligen Schwefelkies, jedoch bey weitem nicht in der Menge, wie den Magnetkies, welcher letztere an der Oberfläche häufig braun anläuft und sich nach und nach besonders in feuchter Luft in Brauneisenstein verwandelt zu können scheint. Sehr schön ist der blau angelaufene Magnetkies. Ferners findet man Amethyst, Siderit, Amazonenstein, Andalusit, derben Apatit, Arsenikkies, Asbest, schwarze blättrige Zinkblende, oft blau angelaufen, x Stimmer, dichten Feldspath, augitartige Hornblende, x Pin-it, x Schörl, Schriftparazit, Vivianit, x gemeinen Beryll in goldlichen Säulen, Brauneisen in Afterscrystallen, Kupferkies, Kupfergrün und Magnetkies, beyde sehr selten, gemeinen Granat, x und derben Dichroit, Traulicht, Tripelit, blättriges Anthophyllit, Faserquarz, x Gyps in Höhlungen des Magnetkies, Hornstein, Spuren von Gold und Silber in den Kiesen, Chalcedon als Ueberzug, Cordierit, Markasit, Epidot, Chlo-rit und viele andere weniger merkwürdige Mineralien, wovon wir in unserer Mineralienkommer stets Vorrath zur Mittheilung bereit hätten. Die meisten dieser und viele andere Mineralien findet man auch zu Passau in der Sammlung des Lyceums, des technischen Gymnasiums und bey dem um Mineralogie und Geognosie sehr verdienten Forstmeister Minneberger. Die geognostischen Mineralien des Kreises findet man von ebendemselben gesammelt im Gebäude der königlichen Kreisregierung in einem Saale aufgestellt.

In Bodenmais findet man die Mineralien der Umgegend in der Sammlung des dortigen Bergmeisters und bey mehreren beyrn Berg- und Hüttenwerk Angestellten. Wir kön-



nen den Silberberg nicht genug betrachten, um über seine Bildung Aufschluß zu erhalten. Wenn wir Stücke gebrochenen Erzes genau betrachten, so finden wir Crystalle von Quarz eingesprengt, bey denen die Crystallform sehr deutlich, aber alle Kanten abgestumpft sind, also offenbar durch Gewalt von feinem Körpern abgebrochen, was die neptunische Bildung dieses Berges außer Zweifel setzt. —

Bodenmais zu verlassen, ohne den ganz nahen 4500 Fuß hohen Arber, einen der drey Culminationspunkte des bayerischen Waldes besucht zu haben, wäre unverzeihlich. Nachdem wir uns an der schönen Aussicht gelabt haben, folgen wir unserem Führer nach Zwiesel, einem ansehnlichen, hübschen und regelmäßig gebauten Marktflecken mit 930 Einwohnern. Es ist uns nicht so fast darum zu thun, die vielen Glashütten in der Nähe zu besuchen, weil wir diese Fabrication schon kennen, sondern vorzüglich die merkwürdigen Mineralien in der Umgegend kennen zu lernen. In der Nähe des Marktes selbst und am rabenstein Quarzbruch findet man den schönen Rosenquarz, stets dorth; mit der Zeit wird er, dem Lichte ausgesetzt, in den Sammlungen blässer; man benutzt ihn als gutes Material zu Glas; ferner Rauhquarz, derb in großen Crystallen. Am rabenstein Quarzbruch kann man deutlich Riesen von Feldspath-crystallen, von ein Paar Schüben in der Länge jedoch ganz verwittert, finden, auch findet man hier sehr deutlich x gemeinen Granat, x Glimmer, x Schörl, x Beryll, Triphylin, ediges, sehr schönes Eisenblau in Attererspitzen, Zipsit, deren Zpsit, gemeinen Quarz und Mithquarz, deren Zpsit in Tafeln, Sibirit, Braumanganerz und anderes. Früher fanden sich in einem nun verschütteten Quarzbruch des Pfarres hart an Zwiesel schöne crystallifizierte Zonalite. An der neuen Straße findet man den eigenthümlichen mit Pyropen versehenen Waldgneis, der sehr dunkel ist. Viele Verdienste in mineralogischer Hinsicht um diese Gegend erwarb sich der nunmehrige Beneficiat F. N. Rechenmacher in Passau.

Nicht weit von Zwiesel kann man noch Urwälder sehen, die noch nie von einer Art berührt wurden; man muß sich aber beeilen, sie zu sehen, da die Glashüttenbesitzer hier die Wälder nicht mehr lange im Urzustande zu lassen gedenken. Stämme, die als höchste Vollendung des Lannens- und Fichtenbaumes anzusehen sind, verkaufen hier zu Tausenden, und höchsten benutzt man sie auf Pottasche. Die Fabrication des Glases wird im bayerischen Walde von 18 Hütten, davon viele nicht gar weit von Zwiesel entfernt sind, in großartigem Style betrieben. Besonders merkwürdig ist die Glashütte zu Ludwigsthal bey Zwiesel, wo man Spiegelgläser von 100 Zoll Höhe und 43 Zoll Breite durch Blasen erzeugt, was man an anderen Orten nur durch den viel theureren Guß zu erreichen im Stande ist.

Die Hütte in Rabenstein ist berühmt durch ihr schönes Fabricat in Crystallwaaren und die neu erbaute Glashütte bey Zwiesel vom Eisgerwald soll schon gute Erzeugnisse von ganzem Crystallglase liefern. Wieviel Holz jährlich in den Glashütten verbräht, d. h. verbrannt wird, davon kann man sich eine Idee machen, wenn man bedenkt, daß jede der größeren Hütten jährlich 3000 Kasser und mehr braucht. Wächtig von einem solchen Holzverbrauch in einem so kleinen Bezirk hat man an keinem andern Orte der Welt ein Beispiel.

Ehe wir von Zwiesel abreisen, wollen wir noch den nur eine halbe Stunde entfernten sogenannten rothen Roth besuchen, wo schon 1580 von einem Grafen von Legenberg ein Maun- und Vitriolwerk errichtet wurde. Es sind in der Nähe große Lager von Eisenties, die aber trotz der Wohlfeilheit des Baumaterials unbenutzt stehen, da der Abfall des Vitriols täglich geringer wird und man nicht einmal das jährliche Erzeugniß von Bodenmais zu verwerten im Stande ist. An die Fabrication der rauchenden Schwefelsäure denkt niemand, und dieses Fabricat muß stets von Böhmen eingeführt werden. Würde man diesen Zweig der Industrie pflegen, so würde sich das Bergwerk in Bodenmais aus seinem Abzehrungsschlummer erholen, und man könnte auch hier an die Benutzung dieser reichen Kieselager denken.

Es wäre gewiß unverzeihlich, wenn wir auf der profanen Poststraße, wo ein Naturforscher nur im Nothfalle reisen soll, nach Passau zurückkehren wollten, ohne zuvor den Rachel und Lusen, welche mit dem Arber die drey Gorpphen unseres Gebirges sind, besucht zu haben. Der Rachel ist 4964 Schuh über die Meeresfläche erhaben, und verdient genaue Untersuchung in Hinsicht auf Erzlager. Der Lusen ist zwar um Vieles niedriger als der Rachel, jedoch durch einige Umstände merkwürdiger. Die Kuppe dieses Berges erscheint von weitem als kahle Wand und besteht wenigstens eine Stunde im Umkreis aus Granitblöcken, die einen Steinhaufen von ungeheurer Umfang vorstelen. Ohne Zweifel ist der Lusen einst viel höher und mit hohen steilen Felsen gekrönt gewesen. Durch Verwitterung fielen diese Gipfel dann und nach zusammen und bildeten so dieses Steinmeer. Im Granit dieser Steinblöcke findet man Quarz und Schörl. Die Aussicht nach den Gegenden der Donau und des Jans ist entzückend und schon dieserwegen wird dieser Weg von Freunden der Naturschönheiten öfters besiegen. Großer Muthes und zufrieden mit dem, was wir gesehen, kehren wir über Grafenau und Schönberg zurück nach Passau. Haben wir nun bisher uns mit der Betrachtung des sogenannten Urgebirges beschäftigt, so könnte uns wohl die Lust kommen, eine jüngere Gebirgsformation, die des Fißokalkes, welche so nahe bey Passau beginnt, zu untersuchen. Zu diesem Zwecke gehen wir nach dem 3 Stunden entfernten Dorfe und Kloster Fürstzell, wohin die schönste Poststraße führt. Nicht weit von hier hart an der Straße, die nach Wilsbosen führt, findet man einen Kalkbruch; im Kalk ist Hornstein in Kugeln und in Stricken, die in Kalk übergehen. Man sieht bey genauer Betrachtung ganz deutlich, daß die Hornsteinmasse ganz flüssig gewesen und sich mit dem Kalk dort, wo sie in Berührung mit einander kamen, innig verbunden habe.

Noch deutlicher kann man die einstige Flüssigkeit dieser grauen Kieselmasse an Wänden sehen, welche auf der Oberfläche eine Menge scharfkantiger Löcher zeigen, die sich nur so in einer flüssigen Masse bilden konnten. Die Ausdehnung des hier anstehenden Kalklagers kennt man nicht; sie ist aber sehr beträchtlich, da in der ganzen weiten Umgegend herum viele Kalkbrüche darin vorhanden sind. Hier findet man in Wäldern und überhaupt nicht gar tief unter der Dammerde Muscheln von außerordentlichen Thieren, die einige Pfunde schwer sind.

Von Fürstzell begeben wir uns nach dem 2 Stunden entfernten Markte Dtenburg. Unweit dem Markte an der

Sträße nach Wischhofen sind die großen Kalkbrüche, die viele Arbeiter beschäftigen. Hier ist das Grab vieler Tausende von Ammoniten, die mehreren Arten angehören. Einige sind ungeheuer groß, zerbrechen aber fast allemal, wenn man sie aus dem Gesteine herauszuschlagen sucht. Außer Ammoniten kommen wenig andere Arten von Muscheln in diesem Kalk vor. Das Kalklager wird von einem feinen Sande bedeckt, worin eine unermessliche Menge von Pectiniten vorkommt.

Bei dem Weiler Kemating ist ein langer Hügel mit Wald bewachsen, ebenfalls aus solchem Sande gebildet, worin Pectiniten, jedoch sehr selten von der Größe eines großen Tellers vorkommen, kleinere sind in Masse vorhanden. Da die Ränder nicht abgestoßen, auch häufig die 2 zusammengehörigen Hälften bespamen sind, so sieht man klar, daß keine gewaltsame Wasserrevolution diese Thiere weiter schwemmte, sondern daß sie hier einst lebten und daß hier Meeresgrund war. Die Bildung dieser Decke ist ohne Zweifel viel jünger als die des Flößfalkes. Auch findet man Haifischzähne, eine Menge anderer versteineter Muscheln, die man in der Sammlung des Lycums und des Forstmeisters Winneberger in Passau bespamen findet. Darunter sind viele noch nicht beschriebene und abgebildete. Das Schwert eines Sägefisches wurde vor ein Paar Jahren von Hr. Nelde in Passau im Bette des Inns bei niedrigem Wasserstand gefunden; es war auf der Oberflache ganz zerfressen und ist wahrscheinlich aus dem ursprünglichen Lager in den Inn gekommen. —

Braunkohlen findet man bei Wildshut umweh dem Städtchen Lauen; und man führt davon jährlich mehrere Ladungen nach Wien; ferner im Leobenberg, der Ruinen eines Schlosses trägt. Er ist eine Stunde von dem Dorfe Zellern und  $4\frac{1}{2}$  Stunden von dem Markte Eggenfelden entfernt. Schatzgräber fanden statt der vermeintlichen Schätze treffliche Braunkohlen, die sich der Kannekohle sehr nähern und genau Untersuchung auf Wichtigkeit des Lagers verdienen. Es wäre von großer Wichtigkeit, wenn man ein bauwürdiges Flöß fände.

Auf der Rückreise nach Passau können wir unmöglich unterlassen, das Schwefelbad von Höhenstadt, nur eine halbe Stunde von Fürstzell gelegen, zu besuchen und dort einige Tage zu verweilen. Das Wasser ist kalt und enthält Schwefelwasserstoff, schwefelsaure Kalk- und Talkerde, kohlenfaures Natrum und eine Spur von Eisen. Beim Graben von Brunnen bekommt man in der ganzen Umgegend öfters Schwefelwasser. In dem nahen Bad von Pilz weg, das nur  $\frac{1}{2}$  Stunde von Höhenstadt entfernt ist und in einem nicht tiefen Thale liegt, quillt das Wasser mit Gewalt an vielen Orten heraus und steigt in Röhren einige Fuß hoch. Ohne Zweifel ist hier ein Lager von Schwefelkies, denn beim Graben von Brunnen und im Schlamm findet man nicht selten Stücke davon. Ueberhaupt wäre es von Interesse, diese ganze Gegend in Hinsicht auf geognostische Merkwürdigkeiten genauer zu untersuchen.

### Aufzählung der merkwürdigen Pflanzen des Kreises.

I. *Classis.* *Chara vulgaris* in klaren Bässern um Deggendorf.

II. *Classis.* *Circaea alpina* im Gebirge. *Veronica longifolia* bei Deggendorf, *scutellata* bei Deggendorf, *Chamaejasme montana* bei Frauenau Edg. Regen, *urticaefolia* auf Bergen bei Passau, *acinifolia* auf magern Aedern bei Passau.

*Gratiola* off. auf feuchten Wiesen bei Burghausen und b. Landau.

*Utricularia vulgaris* in Sümpfen bei Burghausen und Deggendorf.

*Salvia austriaca* auf Wiesen und Hügeln b. Deggendorf.

III. *Classis.* *Valeriana montana* im bayr. Wald.

*Iris germanica* b. Deggendorf und im bayr. Wald, *stibirica* an der Igl,  $\frac{1}{2}$  Stunde b. Passau hinter dem Durchbruch am rechten Ufer des Flusses, *spuria* auf feuchten Wiesen b. Deggendorf.

*Schoenus albus* an sumpfigen Orten bei Arnbach, Bodenmais, Cham und Zwiesel.

*Scirpus cespitosus* auf sumpfigen Wiesen bei Gere, *acicularis* auf den Donauinseln, *setaceus* an überschwemmten Orten b. Cham.

*Eriophorum alpinum* an sumpfigen Orten auf der Kusel, bei Zwiesel, Bodenmais, *vaginatum* im bayerischen Wald. *Nardus stricta* auf trocknen Hügeln bei Passau häufig. *Calamagrostis minima* auf den Donauinseln. *Agrostis interrupta* auf trocknen Plätzen bei Passau. *Arundo epigejos* an dem Donauufer b. Deg., *calamagrostis* b. D. und Passau. *Syntherisma vulgare* auf Hügeln um Deg., Passau u. a. D.

*Panicum dactylon* allenthalben um Passau. *Aira flexuosa* auf trocknen Grasplätzen bei D., Zwiesel und Passau, *montana* b. D., Zwiesel. *Holcus lanatus* b. D., als Futtergras angerühmt, jedoch nur so lang es jung ist dem Vieh angenehm. *Poa aquatica* an Bächen und Weihern b. D., *bulbosa* an Wegen b. Burghausen, *nemoralis* in Wäldungen um Passau.

*Festuca rubra* um Burghausen auf magern Grasplätzen, *decumbens* in Wäldungen um D. *Bromus arvensis* auf Getreidefeldern um Eggenfelden und Partkirchen, *angustifolius* Schrk. auf Wiesen um D., *multiflorus* Hst. an Wegen und Zäunen bei Burghausen und Gere, *asper* in Wäldungen um Burghausen, *sterilis* an Feldwegen um D., *pin-natus* auf trocknen Wiesenplätzen b. Passau, D., Burghausen, *silvaticus*, in Wäldungen und Gebüschen um Passau.

*Avena sativa* um Passau auf Getreidefeldern. *Hordeum arvense* auf Aedern um Burghausen. *Lolium perenne* macht an vielen Orten ganz allein den Rasen, der sich durch sein schönes dunkles Grün empfiehlt. Als Futtergras heißt dieser Loich englisches Raygras, ist aber seiner Empfehlung werth.

*Triticum repens* hier wie allenthalben in Gärten und auf Aedern ein sehr böses Unkraut. *Holosteum umbellatum* auf Aedern b. Burghausen, Cham, D.

IV. *Classis.* *Globularia vulgaris* an den Donauhügeln. *Dipsacus pilosus* an Gräben bei Passau. *Scabiosa ochro-*

leuca auf trocknen Wiesen und Bergen bey Cham und Deggen-  
dorf. *Plantago coronopifolia* auf sandigen Grasplätzen b.  
Deggendorf.

*Galium montanum* im bayr. Wald, glaucum b. D. u.  
Passau, silvaticum in Wäldungen um Cham, Deg. und Pas-  
sau, spurium unter Gesträuchen an benannten Orten, boreale  
auf Waldwiesen b. Passau und Deg., rotundifolium in Wäl-  
dungen bey Cham, Deg., auf der Rußel. Nicht nur in gro-  
ßen Büscheln bepflanzen.

*Trapa natans* in stehenden Wassern b. Niederaltach, Fal-  
kenfels u. a. D.

*Cornus mascula* b. Cham, Oberzell und P. *Sagina*  
*erecta* auf sandigem Boden bey Burghausen.

*Potamogeton pectinatus* b. Deg., densum bey See-  
bach und Zribach, lucens ebenso, pusillum b. Weichselburg.  
*Lycopsis arvensis* b. Cham, Zribach.

V. *Classis.* *Cynoglossum* off. allenthalben, auch um  
Passau. *Anchusa angustifolia* auf Aekern um P. *Myoso-  
tis lappula* um P. *Soldanella montana* um Passau in Wäl-  
dern, j. B. unweit dem Wirthshaus zu Gattern.

*Primula farinosa* b. Zribach, Seebach, Haiming, auri-  
cula b. Zeitlarn und Margarethenberg. *Menyanthes trifol-  
iata* allenthalben auf feuchten Wiesen um P.

*Physalis alkekengi* b. Gottsdorf und Zribach. *Phy-  
teuma orbiculare* b. D., P. u. a. D., nigrum auf Berg-  
wiesen b. P. *Datura stramonium* auf Schutthausen b. Burg-  
hausen und Landau.

*Hyoseyamus scopolia* am Oberhausberg b. P. *Ver-  
basum thapsoides* auf den Hügeln des linken Donauufers b.  
der Fißtadt b. P., lychnitis ebenso. *Chironia centaureum*  
an Hügeln um P.

*Campanula persicifolia* in Wäldungen und Vorhölgern  
bey Burghausen, Cham, D. u. P., barbata auf den Inseln  
des Inn's. *Lonicera nigra* im bayr. Wald b. Cham und  
Unterkrugberg, oerulea im bayr. Wald selten.

*Rhamnus catharticus* bey Passau unweit Aepfeloch,  
auch um Cham, Gern u. a. D. *Viola montana* b. Cham,  
D. u. Zribach, mirabilis ebenso. *Thesium linophyllum* auf  
Anhöhen bey Cham und Zribach.

*Gentiana cruciata* auf trocknen Anhöhen b. D., Lan-  
dau u. P., ciliata auf den Inseln des Inn's, lutea auf dem  
Rachel und b. Zwisel, utriculosa auf trocknen Wiesen um  
Cham, germanica auf Wiesen um Bischofen u. a. D.

*Chenopodium rubrum* an Wassergräben bey Zribach u.  
D., murale ebenso, botrys an Gräben um D. und Hengers-  
berg, valvaria an Schutthausen um P. *Herniaria glabra* auf  
den Inn- und Donauinseln.

*Eryngium campestre* bey D. *Sanicula europaea* b.  
Zwisel u. a. D.

*Pucedanum* off. auf Wiesen b. Straubing, Zribach u.  
D., alsaticum auf Wiesen b. D., silaus auf Wiesen b. Cham,  
Gern u. P.

Juli 1838. Heft 4.

*Sium angustifolium* in Gräben um Zribach und D.,  
repens ebenso, falcaria auf Ängern und Aekern b. Zribach,  
Seebach u. D. *Scandix bulbosa* an Zäunen und Waldrän-  
dern bey J., D., Cham u. P., hirsuta in Bergwäldungen  
b. Cham.

*Myrrhis odorata* um St. Oswald unweit Zwisel. *Atha-  
manta oreoselinum* auf trocknen Wiesen und Hügeln um D.,  
P. u. Zwisel, cervaria um P. *Meum anethifolium* auf den  
Bergwiesen des Aekers und des Rachels.

*Imperatoria ostruthium* auf Bergwiesen im Waldgebir-  
ge. *Selinum silvestre* auf Bergwiesen um D., austriacum  
am linken hohen Donauufer b. P., carvifolium auf feuchten  
Bergwiesen bey D., auf dem Rachel u. a. D., chabraei am  
Rande der Wäldungen b. D. u. J.

*Angelica archangelica* bey Cham und im bayr. Wald  
überhaupt einzeln.

*Laserpitium latifolium* auf Wiesen b. P.; prutheni-  
cum in Wäldungen b. D., siler auf Bergwiesen b. P.

*Conium maculatum* einzeln, fast allenthalben. *Phel-  
landrium aquaticum* in stehenden Wassern b. Zribach, D., P.  
*Cicuta virosa* b. Burghausen, Cham, Kärth, Waldfirchen u.  
D., latifolia ebenso. *Seseli annuum* b. D.

*Oenanthe fistulosa* in Wassergräben b. J. u. D. *Bu-  
pleurum rotundifolium* auf Wiesen b. D. *Caucalis grandiflora*  
auf Aekern b. J., D. u. a. D., leptophylla auf Aekern  
b. Cham.

*Viburnum lantana* allenthalben, die Beeren sind essbar.  
*Sambucus racemosa* auf Hügeln um P., besonders neben  
Wäldungen. *Staphylea pinnata* am rechten Donauufer b.  
D., Gottsdorf u. Falkenfels.

*Tamarix germanica* auf den Inseln der Ffar; die Asche  
soll Glaubersalz enthalten.

*Linum austriacum* auf Wiesen an der Donau und den  
Inseln derselben. *Myosurus minimus* auf feuchten Aekern  
um Cham u. D.

VI. *Classis.* *Peplis portula* auf nassen Stellen bey  
Cham, D. u. J. *Leucojum vernum* auf Wiesen und in  
Obstgärten um B. und P. Verdient als Zierpflanze einge-  
führt zu werden. *Galanthus nivalis* um B. u. P. an einzel-  
nen Orten. Verdient in Gärten gezogen zu werden. *Narcis-  
sus pseudonarcissus* um P. in hügeligen Obstgärten, verdient  
eine Gartenblume zu seyn, heißt bey uns Märzbecher.

*Allium arenarium* am sandigen Boden b. J. u. D.,  
carinatum auf Bergwiesen b. P. und im bayr. Wald, vinea-  
le auf Aekern bey Straßkirchen unweit Straubing, olerace-  
um auf feuchten Wiesen am linken Donauufer b. D. u. Win-  
zer, senescens auf Felsen des rechten Donauufers b. P., an-  
gulosum auf Wiesen des rechten Donauufers b. D. u. Winzer,  
schoenoprasum auf Bergwiesen um P.

*Convallaria multiflora* im bayr. Wald. *Hyacinthus*  
*comosus* auf Feldern b. D. u. Gern, botryoides auf gras-  
igen Hügeln um D. u. G.

*Anthericum ramosum* am linken Donauufer bey P., *Iliso* b. Deg. *Ornithogalum luteum* allenthalben in Obstgärten neben Hecken, *minimum* auf Aedern um D. u. P., *umbellatum* ebenso, in Grasgärten.

*Scilla bifolia* b. D. u. P. in Obstgärten sehr gemein, die Zwiebel sehr tief. Verdient als Zierblume Verbreitung.

*Uvularia amplexifolia* am Ueber u. a. D. *Lilium marginatum* bey Hals unweit P., verdient eine Zierpflanze zu seyn.

*Juncus glaucus* im bayr. Wald, *filiformis* ebenso, *capitatus* im Dettingerforste b. B., *trifidus* am Ueber u. a. D.

*Luzula spadicea* im bayr. Wald. *Triglochin palustre* auf nassen Ufern b. J., D. und Cham.

*Rumex patientia* auf feuchten Wiesen, heißt auch englischer Spinat und kann als solcher genossen werden, *alpinus* bey Zwißel.

VII. *Classis.* *Trientalis europaea*, um Zwißel u. a. D. des bayr. Waldes.

VIII. *Classis.* *Acer pseudoplatanus* im bayr. Wald, *platanoides* seltner. *Erica tetralix* an sumpfigen Orten im bayr. Wald. *Vaccinium uliginosum* b. Zwißel u. a. D., *oxycoccus* ebenso.

*Epilobium montanum* b. Ch. u. D. in Wäldungen, *palustre* an sumpfigen Orten b. D. und im bayr. Wald. *Polygonum amphibium* b. Winger, *hydropiper* in Sümpfen b. Ch. u. D.

IX. *Classis.* *Butomus umbellatus* in Gräben einzeln.

X. *Classis.* *Monotropa hypopythis* in Wäldungen b. B. und im bayr. Wald. *Ledum palustre* im bayr. Wald. *Andromeda polifolia* am Ueberfils und in Scheuered. *Pyrola secunda* im bayr. Wald, *umbellata* in Wäldungen b. Cham, *uniflora* b. D., Ch. u. Scheuered.

*Gypsophila saxifraga* auf Bergen b. D., Seebach u. im bayr. Wald. *Saponaria* off. schon um P., nicht selten. *Dianthus superbus* am rechten Donauufer v. D. bis Hoffkirchen, *plumarius* b. B. u. Gern auf Wiesen. *Scleranthus annuus* um J. an Wegen.

*Chrysosplenium oppositifolium* an schattigen Orten im bayr. Wald, Cham.

*Cucubalus bacciferus* auf Wiesen um D. am rechten Donauufer. *Silene cerastoides* auf bergigen Aedern um P. *Stellaria uliginosa* um Falkenfels, Cham an Quellen und Gräben. *Arenaria rubra* an Zäunen u. Holzschlägen b. B., J., D. u. Ch. *Sedum villosus* b. Passau und im bayr. Wald.

*Spergula pentandra* b. St. Döwalb, *nodosa* b. J. u. D. *subulata* auf Bergwiesen b. Cham.

XI. *Classis.* *Euphorbia falcata* allenthalben um P., *dulcis* auf steinigem Boden bey B. u. P., *verrucosa* auf Wälderplätzen um J., D. u. P., *platyphylos* ebenso, *pilo-*

*sum* um B. selten, *palustris* auf dem Moose bey Plattling. 4—5 Fuß, auch um P.

XII. *Classis.* *Crataegus torminalis* im Böhmerwald, die Früchte essbar, auch dort man sie. *Sorbus aucuparia* im bayr. Wald. *Mespilus chamaemespilus* um Falkenfels und Cham. *Pyrus amelanthier* ebenso. *Spiraea salicifolia* in Vorhölzern um Cham, *aruncus* allenthalben, *filipendula* et *ulmaria*.

*Rosa cinnamomea* in Hecken b. J. u. D., *arvensis* ebenso, *gallica* um Birnbach u. Pfarrkirchen, *pumila* um D. u. im bayr. Wald, *rubiginosa* b. J. u. D., *villosa* ebenso, auch um Gern. *Rubus saxatilis* b. D. und im ganzen bayr. Wald.

*Potentilla supina* an feuchten Orten b. J. u. D., *pi-losa* b. J., D. u. P., *opaca* an sonnigen, sandigen Plätzen.

*Comarum palustre* am Ueber, b. Zwißel, bey J., D. und B.

XIII. *Classis.* *Papaver argemone* auf Aedern b. J. u. D., *dubium* ebenso. *Aconitum napellus* b. P. außerhalb b. Durchbruch, im bayr. Wald allenthalben, *commarum* bey Jarmund in einem Wäldchen.

*Nigella arvensis* auf Aedern b. Straubing, J. u. D. *Thalictrum angustifolium* auf Wiesen um Gern, J. u. D., *aquilegifolium* bey Cham u. P., auch Zwißel.

*Helleborus viridis* auf Wiesen um Barnbach bey P. *Anemone ranunculoides* b. B., J., D. u. P. *Pulsatilla vulgaris* auf trocknen Wiesen b. Landau. *Trollius europ.* überall.

*Ranunculus auricomus* auf Wiesen um J., D., Cham u. P.; *aconitifolius* um Zwißel häufig, *platanifolius* im bayr. Wald. *Adonis aestivalis* in Getreidefeldern um D. u. Landau, *autumnalis* auf Aedern um J. und D.

XIV. *Classis.* *Tencrium botrys* um J. u. D., *scorodonia* ebenso und auch um P., *scordium* b. J. u. D., *chamaedrys* bey B. u. J. *Stachys annua* b. J., D. u. P. *Mentha gentilis* auf den Inseln des Inns, D., Isar u. der Donau. *Melittis melissophyllum* im Neuburgwald b. P., b. D., B. u. J. *Melampyrum nemorosum* b. J., D. und Cham.

*Limosella aquatica* auf überschwemmten Stellen b. D. *Digitalis purpurea* auf Bergen um D., *lutea* allenthalben an Fläßen, ebenso *ambigua*. *Pedicularis sceptrum* im bayrisch. Wald. *Antirrhinum spurium* auf Aedern um J., D. u. P. *Linaria alpina* auf den Inseln der Isar.

XV. *Classis.* *Lunaria rediviva* um Cham. *Iberis amara* auf Aedern b. D., dient auch als Zierpflanze. *Thlaspi montanum* auf Aedern b. P., *perfoliatum* auf Wiesen um J. *Cochlearia* off. um B. u. Wilschhofen, *coronopus* um J. *Erysimum cheiranthoides* auf Aedern um J. *Turritis hirsuta* auf Felsen allenthalben.

*Dentaria enneaphylla* an schattigen Orten b. Cham, Zwißel, in den Donauleiten b. P., *bulbifera* b. Cham und

Zwiesel. *Sisymbrium silvestre* an feuchten Orten um Gern, *J. u. D.*; *amphibium* an Bächen und überschwemmtem Boden an denselben Orten, *arenosum* auf Felsen und Mauern um Falkenfels, *D. u. P.* *Cardamine impatiens* auf Wiesen um *P.*

**XVI. Classis.** *Geranium bohemicum* im bayr. Wald, *dissectum* um *J.*, *D. u. Cham.* *pusillum* ebenso. *Malva alcea* an Bäumen und in Vorhölgern.

**XVII. Classis.** *Polygala chamaebuxus* in d. Gegend v. Straubing. *Spartium scoparium* um Ottenburg u. Simbach. *Genista tinctoria* allenthalben gemein, auf ihr lebt die merkwürdige *Psylla coleoptrata* Klg., *anglica* in Waldungen um Cham u. Kösting. *Ononis hircina* an Wegen, unfruchtbaren Wiesen an v. D.

*Orobos vernus* in Gebüsch, allenthalben, *tuberosus* auf Waldwiesen um *P.*, *niger* b. *D.* *Lathyrus silvestris* an Waldheden b. *J.*, *D. u. Cham.* *palustris* an feuchten Orten um *J. u. D.* *Vicia dumetorum* auf Bergen und in Waldungen um *B. u. P.*, *angustifolia* an Waldrändern um *J.*, *D. u. Cham.* *Cytisus nigricans* allenthalben, *capitatus* im ganzen Donauthal, *supinus* um *B. u. P.* *Galega* off. an feuchten Orten b. Seebach u. D.

*Astragalus cicer* b. *D.*, *glyciphyllus* unter dem Getreid und an den Rändern d. Felder an v. D. *Trifolium rubens* im ganzen bayr. Wald, *medium* in Waldungen u. Gebüsch b. *J.*, *D.*, *P. u. Cham.* *alpestre* b. *J. u. D.* in Waldungen selten, *fragiferum* allenthalben auf Kessern, *spadicum* um *D.*, Cham u. a. D. des bayr. Waldes. *Hippocrepis comosa* auf dünnen Hügeln b. *J. u. D.* *Ornithopus perpusillus* um Burghausen. *Medicago minima* auf Bergen um *P.*

**XVIII. Classis.** *Hypericum humiferum* auf Wiesen, Wälden u. Waldungen b. Gern, *J.*, *D.*, Cham u. *P.*, *du-bium* in Waldungen u. Gern, *D. u. P.*

**XIX. Classis.** *Lapsana pusilla* auf Felsen um Aerebrud u. Cham. *Hieracium dubium* allenthalben, *praemorsum* auf Hügeln b. Jetzbach, *chondrilloides* b. *P.*, Cham u. a. D. auf Felsen, *paludosum* auf sumpfigen Wiesen b. *J.*, *D.*, *P. u. Ch.*

*Sonchus alpinus* im bayr. Wald. *Prenanthes purpurea* im bayr. Wald. *Apargia incana* b. *D.*, *taraxaci* b. Burghausen an der Mz in Gebüsch, *autumnalis* auf Wiesen im bayr. Wald.

*Picris hieracioides* auf Wiesen und in Obstgärten b. *D.* *Scorzonera humilis* um *P.* sehr gemein, so daß an manchen Orten andere Pflanzen davon verdrängt werden. *Hypochaeris maculata* einzeln b. *D.* und Reibach, *radicata* an Wegen b. *D.*, Gern u. *P.*

*Arectium bardana* b. *J.*, *D. u. Ch.* *Carduus acanthoides* allenthalben, *personata* b. Straubing, *decoloratus* bey Eggenfelden, auch im bayr. Wald. *Conyza squarrosa* auf den Inseln des Inn, auch b. *J.*, *D. u. a. D.* *Gnaphalium margaritaceum* b. Zwiesel.

*Artemisia campestris* um *P.* sehr gemein. *Doronicum pardalianches*, im bayr. Wald, *bellidiflorum* um Straubing u. Witterfels. *Cineraria alpina* im bayr. Wald, vorzüglich b. Unterkreuzberg.

*Senecio cruceaeifolius* um Gern, *aquaticus* um *J. u. D.*, *paludosus* an sumpfigen Orten und Bächen um *J. u. D.*, *memorensis* auf Holzschlägen b. *B.*, *D. u. Cham.* *saracenicus* in Waldungen allenthalben, *doria* im nördlichen Theil des Kreises fast überall, *alpinus* am Rachel u. andern Bergen.

*Tussilago alpina* im bayr. Wald, *alba* auf Bergwiesen b. Cham, *spuria* bey Eggenfelden, Detting und Naibach. *Arnica montana* um *P.* sehr häufig, *bellidiastrium* um Burghausen, *austriaca* an feuchten schattigen Orten um Zwiesel.

*Aster salignus* am Ufer der Donau v. D. bis *P.* *Inula oculus christi* auf den Inseln und den Ufern des Inn u. d. Donau b. *P.* *britannica* ebenso, *pulicarius* an Gräben um *D. u. P.*, *salicina* auf trocknen Wiesen u. in Gebüsch b. *D. u. P.* *Achillea ptarmica* allenthalben um *P.*, *J. u. Cham.* *Anthemis tinctoria* auf Kessern um Cham, *J. u. P.*

*Centaurea phrygia* auf Wiesen und Wälden im bayr. Wald, *montana* b. *B.*, *paniculata* am linken Innufer b. *P.* sehr gemein, *scabiosa* Donauleiten b. Deggell. *Echinops sphaerocephalus* auf Schutthäufen des Schlosses von Weidenberg.

**XX. Classis.** *Orchis morio* auf waldigen Bergwiesen, *ustulata* auf Wiesen um Cham, *D. u. P.* *pyramidalis* auf Bergwiesen um Gern, *D. u. P.*, *militaris* ebenso, *sambucina* um *D.*, *P. u.* im bayr. Wald, *viridis* am Rachel u. a. Bergen, *albida* auf trocknen Bergwiesen um *P.*

*Ophrys monorchis* auf sumpfigen Bergwiesen b. *P. u.* im bayr. Wald. *Neottia spiralis* um Gern, *B. u. P.* Pfiesing. *Epipactis ensifolia* b. Jetzbach, *D. u. Cham* selten. *Nidus avis* ebenso u. im bayr. Wald. *Cypripedium calceolus* in Gebüsch um Landau und Pfaffenstadt.

**XX. Classis.** *Zanichellia palustris* an Gräben und Teichen b. Straubing u. *P.* *Carex davalliana* um *B.*, *P. u. D.*, *pulicaris* ebenso, Schreberi allenthalben, *leporina* um Cham u. Frauenau, *vulpinia* allenthalben, *brizoides* in Waldungen um Gern, *D. u. P.*, *elongata* b. *Ch.*, *D. u. P.*, *curta* bey *P.*, *paradoxa* b. *J. u. D.*, *teretiuscula* um *B.* und Kösting, *paniculata* an Ufern b. *B. u. D.*, *alba* an waldigen, bergigen Orten um *P.*, *digitata* ebenso um *B.*, *D. u. P.*, *flava* bey Frauenau u. *P.*, *Michellii* auf Waldwiesen b. *P.*, *panicea* um *D.*, *silvatica* um Gern, *filiformis* um *B.*, *anpullacea* b. Cham u. *D.*

*Amaranthus viridis* in Gärten um Gern. *Myriophyllum spicatum* in stehenden Wässern b. Landau, Straubing, *D. u. P.*, *verticillatum* ebenso. *Arum maculatum* b. *B.* *Ceratophyllum demersum* in Gräben und Teichen b. Landau, *D. u. Straubing.*

*Sagittaria sagittifolia* in stehenden Wässern b. *J.*, Niederaltach, *D.*, Cham u. Etallwang. *Betula nana* im Gebirg. *Pinus pumilio* ebenso. *Typha latifolia* bey Landau,

*St.*, *Ch.* D. u. P. *Xanthium strumarium* an Bäumen bey *S.* *Bryonia alba* ebenso.

**XXII. Classis.** *Salix hoppeana* an den Ufern d. Salz-  
ach u. a. Flüsse, amianiana im bayr. Wald, purpurea an  
nassen Orten d. *S.*, D. u. P., *coruscans* am Hochgebirg  
im bayr. Wald, *arenaria* im bayr. Wald, *bicolor* auf Bergen  
um P., *repens* um B., D. u. P., *incubacea* in Wasser-  
gräben um D., *rosmarinifolia* um B., D. u. P., *aurita*  
ebenso, *aquatica* in Gebüsch auf feuchtem Boden um B.,  
D. u. P. *Hippophaë rhamnoides* auf d. Inseln des Jans  
u. d. Jhar.

*Mercurialis perennis* im bayr. Wald an schattigen Plä-  
tzen. *Hydrochaeris morsus ranae* um St., *S.* u. D. *Tar-*  
*axus baccata* im bayr. Wald, jetzt schon selten, da man diesen  
Baum wegen seiner Anwendung zu Journieren zu sehr ausgieb.

### Verzeichniß der um Passau vorkommenden seltneren Käfer. \*

*Cicindela sinuata*, *transversalis* Zgl. (von *riparia* St.  
ganz verschiednen).

*Dromius quadrillum*, *Aptinus mutilatus*.

*Carabus Scheidleri*, *Linnaei* (nur im bayr. Wald), *au-*  
*ronitens*, *silvestris* im Gebirg, *morbillosus*.

*Calosoma sycophanta*, *Nebria Gyllenhalii*, *Licinus*  
*cassideus*, *Chlaenius Schrankii*, *Oodes helopioides*, *Ama-*  
*ra equestris* Dft., *tibialis* Gyl.

*Patrobus rufipes*, *Platynus scrobiculatus*, *Agonum*  
*impressum*, *Poecilus dimidiatus* (bey Zwisel), *Pterostichus*  
*fasciatus punctatus*, *transversalis* Dft., *Zabrus gibbus*.

*Harpalus rubripes*, *luteicornis* Gyl., *honestus*, *spur-*  
*caticornis* Zgl., *semiviolaceus* Bg., *limbatus* St., *anxius*,  
*saturus*, *Trechus secalis*, *palpalis* Dft. *Biemus areolatus*.  
*Tachys 4 signatus*, *Notaphus major* Gyl., *laticollis* Meg

*Bembidium paludosum*, *striatum*, *Peryphus fascio-*  
*latus* Mg. *rufipes* Ill., *lunatus*, *obsoletus* Dj., *modestus*,  
*decorus*. *Leja doris*, *Sturmii*. *Elaphrus cupreus* Mg.,  
*uliginosus*. Wegen Mangel an Weibern und Pfügen finden  
sich nur sehr wenige Wasserkäfer.

- \* Die mit Echs. bemerkten Käfer sind von Hrn. Dr. Erich-  
son als neu erkannt und werden von demselben bey Ge-  
legenheit beschrieben, weshalb ich deren Beschreibung hier  
unterlasse. Uebrigens gibt es noch mehrere neue Arten,  
die gegenwärtig in den Händen des Hrn. Prof. Gravenhorst  
und Dr. Erichson sind und später in der *Isis* be-  
schrieben werden. Man sieht daraus, wie reich unsere  
deutsche Coleopterenfauna ist und daß noch gar viele Arten,  
wenigstens der 10te Theil der ganzen Fauna noch nicht  
bekannt seyn mögen. Möchten daher die Entomologen  
recht fleißig diese Schätze der Natur sammeln. Die hier  
beschriebenen neuen Arten sind vom Prof. Germar, Dr.  
Erichson u. andern als unbeschrieben erklärt worden;  
daher nicht leicht dadurch die ohnehin verwirrte Synonymie  
vermehrte wird.

*Staphylinus stercorarius*, *impressus*, *variabilis* Gyl.,  
*boops*, *atratus*, *bimaculatus*, *cephalotes*, *bipustulatus*, *ver-*  
*nalis*, *ventralis*, *discoideus*, *quisquiliarius*, *parvicornis*, *te-*  
*nuis*, *corruscus*, *aterrimus*. *Xantholinus lentus*, *lon-*  
*giceps*.

*Paederus orbiculatus*, *subtilis* Dhl., *angustatus*, *lae-*  
*vigatus*, *bicolor*, *filum* Wtl., *scabricollis* Gyl. *Oxyppo-*  
*rus rufus*, *maxillosus*.

*Stenus juno*, *binotatus*, *oculatus*, *proboscideus*, *nig-*  
*ritulus* Gyl., *carbonarius* Gyl. *Oxytelus fracticornis*,  
*crassicornis* Dft., *pallipes*, *sculpturatus*, *cornutus* Gr.,  
*asphaltinus* Wtl., *corticinus*. *Coprophilus rugosus*.

*Eracethus scaber*.

*Anthophagus villosus* Wtl., *testaceus*, *riparius*,  
Dej. *Onalium atrocephalum* Gyl., *ovatum* Gr., *triviale*  
Schüp., *planum*, *deplanatum* Gyl., *sorbi*, *striatum*, *florale*, *oxy-*  
*acanthae*, *pallidum* Gr., *pusillum* Gyl. *Tachinus atricapillus*,  
*melanocephalus*, *pronus* Kn., *atratus* Echs., *analis*, *cer-*  
*nus* Gr. *Tachyporus suturalis*, *analis*, *humeralis*, *pusil-*  
*lus*, *nitidulus*, *funicarius*, *abdominalis*, *globulus* Dhl. *Hy-*  
*pocryptus granulum*.

*Lomechusa emarginata*. *Aleochara obscura*, *rufi-*  
*collis* Wtl., *lugens* Gr., *rufipennis* Dj., *brevipennis*,  
*livida* Dj., *nitida*, *morio*, *opaca*, *moesta*, *funesta*, *reptans*,  
*teres*, *bilineata* Gyl., *longicornis*, *togata* Erichs., *inguin-*  
*ula*, *obfusca*, *pulla* Gyl., *riparia* Erichs. *tachyporoi-*  
*des* Wtl., *linearis*, *exilis* Kn., *athrops* Gr., *longula*,  
*minuta*, *elongatula*, *angustula* Gyl., *incana* Echs., *excava-*  
*ta* Gyl., *atra*, *rostrata* Echs., *intermedia* Echs., *corticina*  
Echs., *humillima* Echs., *fungi*, *lunulata* Pk., *socialis* Pk.,  
*velata* Echs., *suppressa* Echs., *aterrima*, *nana*, *complicans*  
Kby., *pilicornis* Gyl.

*Buprestis affinis*, *lacta*, *viridis*, *angustula*. *Trachys*  
*minuta*. *Aphanisticus pusillus*.

*Elatér linearis*, *assimilis* Gyl., *subaeneus* Df., *ripar-*  
*ius*, *bructeri*, *parvulus*, *minutus*, *asphaltinus* Kn., *ebeni-*  
*us* Germ. *aterrimus*, *ruficollis*, *fasciatus*, *4pustulatus*,  
*quercus* Ol., *var. dimidiatus* St., *fugax*, *nigerrimus* Kn.,  
*Weberi* Wtl., *striatus*, *sputator* Lin., *lapidicola*, *mini-*  
*tissimus* Peir., *vilis* St., *nigrinus* Pk. *Cyphon deflexi-*  
*collis* Müll., *melanurus*.

*Eubria palustris*. *Lycus affinis* Pk. *Cantharis di-*  
*scoidea* Ch. *var. notata* Wtl., *pilosa* Pk., *pallida*, *fusi-*  
*cornis*, *bicolor*, *liturata*, *nigriceps* Wtl., *testacea*, *al-*  
*pina*, *albomarginata* St., *thoracica* Ol., *fulvicollis* Shlg.,  
*elongata* Fal. *Malthinus carbonarius* Wtl., *laetus*  
Wtl., *fuscus* Wl., *brevicollis* Pk., *maurus* Zgl., *flavolus*,  
*biguttatus*, *fasciatus* Ol. *Malachius pulicarius*, *concolor*,  
*fasciatus*, *angustatus* Dhl., *praecustus* Fal. *Dasytes pal-*  
*lipes*, *nigricornis*.

*Hylecoetus dermestoides*. *Xyletinus pectinatus*. *Dor-*  
*catoma dresdene*. *Anobium abietis*, *pusillum* Gyl., *ca-*  
*staneum* Hbst. *Ptinus 6punctatus* Pz., *elegans*, *crenatus*.  
*Scydmaenus elongatus* Kz., *hirticollis*, *scutellaris* Kz.,  
*tarsatus*. *Notoxus mollis*.

*Necrophorus vestigator* Gyl. *Silpha littoralis*, *reti-*

culata, tristis, opaca, dispar Gyl. *Peltis ferruginea*. Ips 4pustulata, 4guttata, abbreviata, ferruginea, 4punctata. *Strongylus luteus*, 4punctatus.

*Nitidula bipustulata*, *pygmaea* Gyl., *subtilis* Wtl., *subrugosa* Gyl., *discolor* Wtl., *dulcamariae* Ill., *obsolleta*, *fusca* Rossi. *Cercus urticae*, *pedicularis*, *sambuci* Mkl. *Micropeplus sulcatus*. Engis humeralis. *Antherophagus nigricornis*.

*Cryptophagus cellaris*, *fumatus*, *rubescens* Ill., *fuscus*, *ferrugineus* Schpl., *rufus* Wtl., *abietis* Pk., *parallelipipedus* Wtl., *excisus* Wtl., *globosus* Wtl. *Elachistus atomus* Gyl., *globulus* Pk. *Ptilium fasciculare*, *pusillum* Gyl., *thoracicum* Wtl., *flavicornis* Wtl.

*Sphaerius acaroides* nov. Genus mihi. *Scaphidium* 4 maculatum. *Leptinus testaceus* Müll. insectum rarissimum, inopia oculorum memorabile. *Catops fuscus*, *elongatus*, *truncatus*. *Dermestes tessellatus*. *Byrrhus gigas*, *ornatus*, *concolor* St., *setosus* Wtl. *Limnichus sericeus*, *versicolor* Wtl.

*Elmis Volkmar*. *Parnus auriculatus*. *Heterocerus pusillus* Gyl. *Hydrophilus piceus*, *seminulum*, *globulus*, *minutissimus*.

*Sphaeridium minutum*, *pygmaeum* Ill. *Sisyphus Schaefferi*. *Copris lunaris*. *Oniticellus pallipes*. *Onthophagus coenobita*. *Aphodius fasciatus* bey Swif., *merdarius*, *scybalarius*, *scrofa*, *tristis* Gyl., *piceus* Gyl., *rufescens*, *bi-maculatus*.

*Trox arenosus* Gyl. *Odontaeus mobilicornis*. *Melolontha solstitialis*, *ruficornis*. *Inosia agricola*. *Hoplia argentea* F. *Trichius hemipterus*. *Cetonia marmorata*. *Tenebrio curvipes*. *Hypophloeus castaneus*. *Eurostrophus bifossulatus* Wtl. *Boletophagus crenatus*. *Anisotoma signatum* Wtl., *orbiculare* Hbst.

*Agathidium orbiculatum* Gyl., *atrum* Pk., *punctatum* Gyl., *punctatum* Wtl., *staphylaeum* Gyl. *Orchesia fasciata* Ill. *Melandrya serrata*. *Cistela sulphurea*. *Ditylus laevis* um Swif.

*Anthicus rufipes* Pk., *monoceros*. *Rhipiphorus paradoxus* um Swif.

*Mordella aculeata*, *pusilla*, *axillaris* Gyl. *Anaspis frontalis*, *rufilabris* St. *Cantharis vesicatoria* b. dem Schloffe Schönburg jährlich in Unzahl. *Meloë scabrosa*. *Necydalis lateralis*, *adusta* Pz., *collaris* Pz., *viridissima*, *scutellaris* Wtl., *lurida*, *ustulata*.

*Anthrabus undulatus* Schh. *Bruchus pisi*, *granarius*, *ambo* valde noxii.

*Rhynchites* *Bacchus*, *cupreus*, *nanus*, *minutus*, *aequatus*, *metallicus* Dj., *pauillum*, *megacephalus* Germ., *nigrocyaneus* Wtl. *Apion viciae*, *pisi*, *loti*, *marchionum*, *onopordi*, *pavidum*, *pallipes* Gyl., *brevirostre* Hbst. *Orchestes decoratus* Germ., *viminalis*, *loniceriae*, *bifasciatus*, *calcar*, *populi*, *ilicis*.

3fis 1838, 4pfe 4.

*Cionus blattariae*, *scrophulariae*, *verbascl*. *Cicopus beccabungae*, *antirrhini*. *Sibinia cinerascens*, *potentillae*, *enucleator* Pz., 5 punctata.

*Ocobitis lythri*. *Falciger quercus*, *chrysanthemi*, *hirtulus* Germ., *atomarius* St., *depressicollis* Gyl., *cochleariae*, *assimilis*, *contractus* Msh., *floralis*, *litura*, *erysimi*, *rugulosus*, *amblyrhynchus*, *castor*, *4cornis* Gyl., *subfasciatus* Gyl., *bruchoides* Hbst. *Anoplus plantaris*.

*Balaninus salicivorus* et var. *pyrrhoceras* Msh. *Dorytomus vorax*, *tortrix*, *tremulae*, *salicinus*, *taeniatus*, *affinis* Pk. *Rhynchaenus acridulus*, *equiseti*.

*Anthonomus druparum*, *ulmi*, *pomorum*, *avarus*. *Ellescus scanicus*, *bipunctatus*. *Tanysphyrus lemnae*. *Pisodes pini*. *Hypera meles*, *murina*, *viciae*, *pollux*. *Bagous lutosus* Gyl., *echinatus* Wtl., *subcarinatus* Schh.

*Merionus obscurus*. *Loborhynchus lavandus* Germ., *ater* Hbst., *geniculatus* Germ., *rugifrons* Gyl., *hirticornis* Hbst. (Simo), *pertusus* Zgl., *porcatus*, *mollicornis* Ahl. *Chlorima viridis*, *graminicola* Mg.

*Polydrusus fulvipes*, *flavipes*, *herbens* Schh., *undatus*, *viridipes* Ulr., *spartii* Kch., *viridicollis*, *viridius* Schh., *prasinus* Ol., *micans*. *Sitona tibialis*, *maculata* Wtl. *Thylacites pilosellus*.

*Cleonis trisulcatus* Hbst., *cinerea*, *marmorata*. *Rhinodes aterrimus*, *duplicatus* Germ., *violaceus*. *Mecinus haemorrhoidalis*. *Baris atriplicis*. *Cossonus ferrugineus* Ol., *linearis*.

*Rhyncolus sculpturatus* Wtl., *chloropus* Gyl., *ferrugineus* Wtl. *Hylurgus angustatus*, *elongatus*, *testaceus*. *Hylesinus fraxini*. *Scolytus intricatus* Kch. *Bostriechus villosus*, *chalcographus*, *bispinus* Mq., *limbatus*, *abietis* Zgl., *pityophagus* Erch., *fuscus* Msh., *dryophagus* Erch., *carinatus* Wtl., *asperatus* Gyl., *Saxsenii* Ritzb.

*Platypus cylindrus*. *Cis hispidus* Pk., *fronticornis* Schh., *glabrielus* Gyl., *nitidus*, *micans*, *festivus* Pz., *punctiger* Wtl., *fagi* Wl., *ater* F. *Latridius fuscus* Gyl., *serratus* Pk., *acuminatus* Pk., *sculptilis* Schpl., *angusticollis* Schpl., *aethiops*, *nigriceps* Wtl., *elongatus* Schpl. *Triphylus bifasciatus*, *fumatus*.

*Monotoma longicollis* Gyl., *picipes* Pk. *Rhizophagus coeruleus* Wtl., *bipustulatus*, *depressus*, *dispar*, *politus* Gyl., *ferrugineus*, *parallellicollis* Gyl.

*Lyctus canaliculatus*. *Silvanus unidentatus*. *Cucujus testaceus*, *crassicornis* Wtl., *duplicatus* Wtl.

*Spondylis buprestoides*. *Prionus coriarius*. *Monochamus sartor*. *Acanthocinus aedilis*, *atomarius*. *Pogonocherus hispidus*.

*Saperda ephippium*, *praeusta* et var. *nigra*, *virescens*. *Callidium rusticum*, *fennicum*, *sanguineum*, *variabile*, *bajulus*, *undatum*, *violaceum*, *luridum*. *Obrium brunneum*. *Clytus arcuatus*, *gazella* F. *Molorehus dimidiatus*.



*Rhagium mordax*. *Pachyta 4maculata*, *6maculata* Lin., *collaris*, *virginica*. *Leptura atra*, *7punctata*, *cruciat* Ol., *rubrotestacea*, *nigripes* Pk., in montibus vicinis, *livida*, *maculicornis*.

*Donacia rustica* Ah., *linearis*, *nigra*, *pallipes* St., *Orsodacne cerasi*. *Auchenia subspinoso*. *Lema melanopa*, *cyaneola*.

*Hispia atra*. *Cassida ferruginea* Marsh., *rubiginosa*, *thoracica*, *sanguinolenta*, *viridula*, *haemisphaerica* Hbst., *nobilis*, *vibex*. *Galleruca alni* valde *perniciosa*, *nigricornis*, *capreae*, *nymphaeae*, *tenella*. *Luperus flavipes*.

*Haltica testacea*, *exoleta*, *transversa* Msh., *pratensis* Pz., *pallidicornis* Wtl., *lurida*, *nitidula*, *femorata* Gyl., *muscorum*, *obscura* Ill., *hyoscyami*, *obesa* Wtl., *salicariae*, *parvula*, *impressa* Wtl.

*Timarcha coriaria*, *tenebricosa*. *Chrysomela sabulicola*, *acaliae* Schk. in montibus vicinis, *aenea*, *cuprea*, *nobilis* Wtl., *cochleariae*, *armoraciae*.

*Eumolpus obscurus*. *Clythra bucephala*, *cyanea*, *longimana*, *4maculata*, *4punctata*. *Cryptocephalus sericeus*, *violaceus*, *coryli*, *marginatus*, *hieroglyphicus*.

*Triplax nigripennis*, *aenea*. *Phalacrus punctatostriatus* Wtl., *ovatus* Ill.

*Coccinella 6pustulata* et var. 4 *plagiata* Wtl., *variabilis*, *impunctata*, 13 *punctata*. *Scymnus frontalis*, *bipunctatus*, *ater*, *dorsalis* Wtl.

*Pselaphus Heisei*. *Arcopagus laevis* Ulr. *Claviger foveolatus*.

Um Passau vorkommende neue Arten von Käfern.

### 1. *Paederus flum* Wl.

*Fuscus*, *valde attenuatus*, *antennis pedibusque rufis*, *abdomine pone elytra coarctato*.

Longitud.  $1\frac{1}{2}$  — 2<sup>'''</sup>.

Palpen von der Farbe der Antennen, die Kolbe dunkelbraun, Fressgängen von der Farbe der Antennen, der Kopf fast wie ein Quadrat, mächtig convex, fein punctiert, der Brustschild eiförmig, glänzend, gegen den Hinterleib zu eine Spur von einer Furche, sehr fein punctiert; Flügeldecken ziemlich rauh und punctiert, die Segmente der Hinterleibsglieder oben hell, alle Theile, außer den erwähnten heller gefärbten, sind dunkelbraun. Dieses Thierchen kann mit keiner andern Art verwechselt werden.

### 2. *Oxytelus asphaltnus* Wl.

*Totus aterrimus*, *nitens*, *thorace et elytris foveolatus*.

Long.  $1\frac{1}{4}$ '''.

Die Fühler ganz schwarz, auch an der Basis, die Fressgängen sehr groß, deutlich an der Spitze halbmondförmig und

mit zwei Haken versehen, hellbraun, nur an der Basis dunkler. Der Kopf ziemlich flach, glänzend, grob punctiert, die Punkte nicht glänzend, der Brustschild gerandet, vorn breit, nach hinten allmählich aber wenig verlaufend, so daß er breiter bleibt als lang; in der Mitte eine starke Furche, die durchaus geht, sonst überall mit tiefen Grübchen versehen, die hie und da zusammenlaufen und eine abgebrochene Furche darstellen. Die Flügeldecken an der Basis und rund herum fein gerandet, mit Grübchen ziemlich häufig versehen; der Hinterleib so lang, wie die vordern Theile zusammen. Die ganze Oberfläche des Käfers schön glänzend. Er ist wie der vorige sehr selten und kann nicht leicht verwechselt werden.

### 3. *Anthophagus villosus* Wl.

*Totus testaceus*, *elytris foveolatus*, *abdominis apice nonnihil obscurato*.

Long.  $1\frac{1}{2}$ '''.

Dem *Anth. obscurus* Gr. ganz gleich, nur anders gefärbt, gröber punctiert und kleiner. Von der Basis der Fühler geht ein Wulst nach oben und zugleich nach der Mitte zu. Augen ganz schwarz. Die Flügeldecken mit einzeln stehenden, ziemlich langen Haaren versehen. Ebenfalls sehr selten. Könnte nur mit dem *testaceus*, aber nicht leicht verwechselt werden, da die Fühler kürzer, der Brustschild anders gebaut, die ganze Oberfläche des Körpers gewölbt und nicht so glänzend ist.

### 4. *Aleochara (Falagria) ruficollis* Wl.

*Capite fere piceo*, *thorace rufescente*, *elytris fuscis*, *pedibus testaceis*.

Long. 1 —  $1\frac{1}{4}$ '''.

Der Kopf dunkelbraun, glänzend, kaum punctiert, die Fühler sehr dick, etwas länger als der Kopf mit dem Brustschild, an der Basis heller, allmählich sehr dick und dunkler werdend. Der Brustschild rothbraun, länger als breit, nach hinten stark auf einmal sich verdünnend, in der Mitte eine tiefe Furche, die weder die Basis noch die Spitze berührt, sonst stark punctiert, etwas rauh erscheinend, doch noch glänzend. Die Flügeldecken misfärmen mäßig gewölbt, dunkelbraun, sehr häufig und fein punctiert, mäßig glänzend, der Hinterleib ziemlich schmal, gegen die Spitze zu dunkler als vorn.

Mit keiner andern Art leicht zu verwechseln und sehr selten.

Anmerk. Die *Al. ruficollis* Dhl. gehört zum Subgenus *Bolitochara* Mannerh., weswegen der gewählte Name um so mehr bleiben kann, weil Namen unbeschriebener Arten keinen Werth haben.

### 5. *Aleochara tachyporoides* Wl.

*Totus fuscus*, *antennis, palpis pedibusque rufis*.

Long.  $1\frac{1}{4}$ '''.

Der Kopf flach ohne Erhabenheiten, ungemein fein punctiert, die Fühler kaum so lang als der Kopf mit dem Brust-



**Schild.** Die einzelnen Fühlerglieder kugelig. Der Brustschild viel breiter als lang, matt, kaum bemerkbar punctiert, mit fahlen Sammethärchen besetzt, gewölbt. Die Flügeldecken kurz, mit sammeten gewölbt, einzeln wie schief eingeflochen, fein punctiert, an der Spitze etwas heller; der Hinterleib sehr lang, gerandet, gewölbt, fein punctiert, die Segmente hinten hellbraun. Von dem Habitus eines schmalen Tachyporus. Seiten.

### 6. *Elater Weberi* Wl.

**Totus niger, flavo-sericeus, elytris punctatostriatis, interstitiis latis glabris.**

**Long. 4 — 4 $\frac{1}{2}$ '''.**

Dieser Elater sieht dem *E. equestris* F. außerordentlich gleich, seine glänzendere Oberfläche, fahlere Sammetbehaarung, die am Brustschild wellenartig erscheint, unterscheiden ihn jedoch sehr gut. Zu Ehren des seel. Sam. Webers, des trefflichen Künstlers in der Insectenabbildung benannt, von dem wir ein Exemplar früher aus Berlin erhielten.

Diese Art ist sehr selten.

### 7. *Cantharis discoida* Ah. var. *notata* Wl.

Unterscheidet sich von der bekannten Art nur dadurch, daß der schwarze Fleck am Brustschild in der Mitte gespalten ist, so daß 2 schwarze Striche erscheinen.

### 8. *Cantharis nigriceps* Wl.

**Tota testacea, capite, thorace et abdomine subtus antennisque nigris.**

**Long. 4 — 4 $\frac{1}{2}$ '''.**

Der Kopf ist mäßig groß, matt, nicht sichtbar punctiert, die Basis der Fühler in einem gemeinschaftlichen tiefen Eindruck der Stirn, in der Mitte oberhalb der Fühlerbasis gerade zwischen den Augen eine rundliche, schüsselförmig vertiefte, ziemlich flache Erhöhung. Nur die ersten 2 Glieder der Fühler braun. Der Brustschild breit, hinten breiter als vorn, der Rand vorn und hinten abgestülpt, vorn mit drei flachen, sehr breiten schüsselförmigen Eindrücken, nicht so blas als die Flügeldecken, das Schildchen ziemlich dunkel. Die Flügeldecken hinten breiter als vorn, stark und dicht punctiert mit Spuren zweier linienförmiger Erhöhungen auf jeder Flügeldecke. Nur die hintern zwey Abschnitte des Hinterleibes blaßgelb, die andern schwarz, am Rande aber hell. Füße blaß. Sehr selten. Kann nicht leicht mit einer andern Art verwechselt werden.

### 9. *Malthinus carbonarius* Wlll.

**Totus fuscus, thorax multo latior quam longus, valde ad latera depressus, nitens, antennis longis.**

**Long. 2 $\frac{1}{4}$  — 2 $\frac{1}{2}$ '''.**

Der Kopf glänzend schwarz, mit feinen fahlen Härchen besetzt, Fühler ganz schwarz, nur die Spitze des Gliedes gelb. Der Thorax ganz glänzend, mit gelbem Rand eingefast, in der Mitte rechts und links eine Erhabenheit in die Quere, die Füh-

geldecken lang, fein runzlig, mit weißen Härchen. Nur dem *M. longipennis* Kz. etwas wenig ähnlich, durch Fühler und Brustschild aber sehr leicht zu unterscheiden.

Ziemlich selten.

### 10. *Malthinus laetus* Wl.

**Totus fuscus, antennarum basi, elytrorum apice et pedum tibiis tarsisque rufis.**

**Long. 2 $\frac{1}{4}$ '''.**

Der Kopf stark punctiert mit schwarzen Haaren, in der Mitte eine leise, breite Längsfurche. Der Brustschild glänzend, gerandet, ziemlich conver, ein Quadrat vorstellend mit deutlichen Ecken. Das Schildchen breit, die Flügeldecken glänzend, grob aber nicht tief punctiert und fein runzlig. Die Spitze lebhaft gelb.

Selten, dem *M. biguttatus* F. ähnlich, durch die Fühlerbasis leicht zu unterscheiden.

### 11. *Malthinus fuscus* Wl.

**Totus fuscus, solummodo apice elytrorum laete rufi, pedibus testaceis.**

**Long. 1 $\frac{1}{2}$  — 2'''.**

Der Kopf breit, gewölbt, punctiert, Fühler dunkelbraun, fast schwarz, der Brustschild glänzend, ungemein fein punctiert, breiter als lang, an den Seiten weit hinuntergebogen, die Ecken noch kennbar, der Rand durchaus heller. Die Flügeldecken blaß, kothfarbig, runzlig, die Spitze lebhaft gelb. Ist nicht leicht mit einer andern Art zu verwechseln.

### 12. *Nitidula subtilis* Wl.

**Tota viridi-aenea, thorace ad latera marginato, elytris subtiliter punctatis.**

Diese Art ist von den meisten Entomologen und auch von Gyllenhal mit der wahren Aenea F., die viel gröber punctiert, sonst aber in den Umrissen ganz ähnlich ist, zusammen geworfen und verwechselt worden. Dieser Käfer ist in Vergleich mit *N. aenea* sehr selten, sehr fein und sehr gedrängt punctiert. Wir halten ihn mit gutem Rechte für eine eigene Art.

### 13. *Nitidula discolor* Wl.

**Transversalis, convexa, thorace fusco, elytris rufis, setis testaceis ornata. Magnitud. Nitid. aeneae.**

Der Kopf breit, schmutzig schwarz, Fühler braun, der Brustschild viel breiter als lang, runzlig oder mit sehr vielen, nicht tiefen breiten Grübchen, die in einander fließen, bedeckt, darüber glänzende, braune, anliegende Borstenhaare, an den Seiten deutlich gerandet, auf den hintern Ecken abgerundet. Die Flügeldecken grob aber nicht eng punctiert, mit anliegenden Borstenhaaren. Unterscheidet sich von allen anderen Arten durch die Gewöltheit, verschiedene Farbe des Brustschildes von der der Flügeldecken usw. sehr leicht; ziemlich selten.

#### 14. *Cryptophagus rufus* Wl.

Transversalis, convexus, totus rufus, thorace confertim punctato, elytris setis brevissimis ornatis.

Long. 1<sup>'''</sup>.

Der Kopf breit, matt, einzeln punctiert, die Fühler hart, neben den Augen am untern Winkel, das erste Glied in keiner Grube, sondern freystehend, eingelenkt, die Mundtheile nach hinten, und schmal zusammengebrängt. Der Brustschild breit, convex, in der Mitte am breitesten, nach hinten mäsig sich verschmälernd, ziemlich grob aber nicht häufig punctiert, der Hinterleib breiter als der Brustschild, die Flügeldecken ein wenig feiner punctiert, matt glänzend, mit sehr feinen blassen Härchen, alle Theile des Körpers braun. Dieses Thierchen hat viele Aehnlichkeit mit einem nicht vollkommen entwickelten *C. fuscus* Kn. ater Pz. Hbst. unterscheidet sich aber durch den breiteren, weniger glänzenden und dichter punctierten Halschild, und durch geringere Wölbung des Körpers, stärkere Behaarung der Flügeldecken und häufigere Punctur derselben.

Er ist sehr selten.

#### 15. *Cryptophagus parallelipipedus* Wl.

Thorace fusco, latitudine abdominis, elytris elongatis, fusco-rufis.

Long. 1 — 1 $\frac{1}{4}$ '''.

Die ungemein dicken, braunen Fühler ziemlich von dem inneren Augenwinkel entfernt sehr nahe an einander frey eingelenkt, der kastanienbraune Kopf glänzend, fein punctiert, der Brustschild länger als breit, ganz parallelipipedisch, wie der Hinterleib, an diesem eng anliegend, glänzend, grob punctiert, ebenso die Flügeldecken, beyde mit anliegenden Härchen nicht dicht bedeckt; Füße braun. Kann mit keiner andern Art verwechselt werden. Sehr selten.

#### 16. *Cryptophagus excisus* Wl.

Parrus, dilatatus, rufus, thorace ad latera exciso. elytris pilis longioribus ornatis.

Long.  $\frac{1}{2}$  —  $\frac{2}{3}$ '''.

Die Fühler hart am innern unteren Augenwinkel weit von einander eingelenkt, dick und braun. Der Kopf breit, mäsig grob punctiert. Der Brustschild viel breiter als lang, mäsig gewölbt, an der vorderen Hälfte ausgerandet, so daß 2 Zäden erscheinen, nach hinten mäsig verlaufend, grob punctiert, die Flügeldecken eben so grob punctiert, langhaarig. Diese Art unterscheidet sich von allen andern, mit ausgerandetem Brustschild versehenen durch Kleinheit, große Gedrungtheit des Körpers und feinere Punctierung. Ist sehr selten.

#### 17. *Cryptophagus globosus* Wl.

Ovatus, aterrimus, nitens, antennis pedibusque caetaneis.

Long.  $\frac{2}{3}$ '''.

Der Kopf glänzend, sehr fein punctiert, die Fühlerbasen

von einander entfernt, die ersten drey Glieder größer als die folgenden, die letzten drey Glieder dunkel. Der Brustschild breit, vorn viel enger als hinten, stark gewölbt, sehr glänzend und sehr fein einzeln punctiert. Der Hinterleib breiter als der Brustschild sehr gewölbt, die Flügeldecken sehr glänzend, sehr einzeln punctiert.

Diese Art unterscheidet sich sehr leicht von den bekannten, und ist nicht leicht zu verwechseln. Sehr selten.

#### 18. *Ptilium thoracicum* Wl.

Totum nigrum, convexus, latus, thorace nitente, magnitudine fere abdominis.

Magnit. totalis unius puncti.

Der Kopf glänzend, nicht sichtbar punctiert, die Fühler mit einzelnen langen Haaren besiedert, der Brustschild ausgezeichnet entwickelt, fast so lang wie der Hinterleib, breiter als dieser, stärker punctiert, glänzend, die Flügeldecken matt, grob punctiert, hinten breiter als der Hinterleib, Füße braun. Die ganze Oberfläche der Flügeldecke sammetartig, mit Härchen überzogen und dadurch wie durch glänzenderen Brustschild, von dem grobhaarigen *Pt. fasciculare*, dem es sonst sehr ähnlich ist, leicht zu unterscheiden.

#### 19. *Ptilium flavicorne* Wl.

Totum nigrum, antennarum base pedibusque testaceis.

Praecedente dimidio majus.

Der Kopf glänzend, kaum sichtbar punctiert. Die Fühler nur an der Spitze dunkel. Der Brustschild mäsig groß, glänzend, sehr fein punctiert, die Flügeldecken rauh, sammetartig behaart, hinten an dem Körper fast aufliegend und anschließend.

Neßt dem vorhergehenden selten.

#### 20. *Sphaerius* Wl., *acutoides* Wl.

Ephistemus? Westwood

Dieses Thierchen ist von der Größe eines Schripunctes, und daher können die Gattungscharactere nicht detaillirt beschrieben werden. Die Fühler sind ungemein dünn und enden in eine dicke Kolbe, die mit drey sehr langen Borstenhaaren besetzt ist. Die Palpen sind ebenso gebaut, nur viel kürzer. Der Gesamthabitus erinnert an ein Agathidium, der Bau des Brustschildes entfernt es aber wieder gänzlich. Der Bau der Palpen mit dem kugligen Knopf oder letztem Gliede charakterisirt dieses neue Geschlecht hinlänglich.

Aufschreibung.

Ovatus, nigerrimus, nitens, abdomine convexiore quam thorax.

Der Kopf klein, glänzend, der Brustschild nach vorn sehr stark geneigt, sehr breit, verhältnißmäsig gegen den Hinterleib nicht groß, gegen die Basis zu sich erweiternd, ohne sichtbare

**Punctierung.** Der Hinterleib sehr gewölbt, kuglig, vorn von der Breite des Brustschildes gegen die Mitte zu am dicksten, sehr glänzend, nicht sichtbar punctiert. Lebt auf nassem Boden neben ganz kleinen laufenden Quellen zwischen dem Gras und ist nicht selten, jedoch schwer zu finden. Auch in der Gegend von Wolfrathshausen bey München.

## 21. *Byrrhus setosus* Wl.

**Globosus, totus niger, thorace punctato, elytris forte punctato striatis.**

Long.  $1\frac{1}{2}$ '''.

Der Kopf sehr dicht punctiert, der Brustschild dicht punctiert, sehr breit, nach hinten sich allmählich erweiternd, der Hinterleib fast kugelig, doch nach hinten zu spitz verlaufend, sehr hoch, punctiert-gestreift, die einzelnen Punkte wie kleine Köcher, die Zwischenräume glatt, mit einzeln stehenden Borsten, die sich leicht abreiben.

Dieser Käfer lebt hier und an andern Orten Deutschlands, jedoch sehr selten. Dem Habitus nach dem setiger III. ganz ähnlich und mit abgeriebenen Exemplaren dieser Art leicht zu verwechseln, wenn man die Punctstreifen übersieht.

## 22. *Limnichus versicolor* Wl.

**Niger, pilis albis flavisque in plagis ordinatis ornatus.**

Diese ausgezeichnet schöne Art ist noch einmal so groß, als *L. sericeus* Dfr., sonst in der Gestalt ähnlich. Der Brustschild sehr breit, gegen das Schildchen zu an beiden Seiten ausgeschnitten, so daß hart am Schildchen eine Art von Sattel erscheint. Die ganze Oberfläche des Käfers ist mit hart aufliegenden Borstenhaaren bedeckt. Eine Parthie weißer, einen Fleck bildend, ist auf jeder Schulter; in der Mitte der Flügeldecken sind überall zwei solche, an unterbrochene Binden erinnernd, und an der Spitze ist noch einer. Die andern Haare sind sahlgelb. Sie reiben sich sehr leicht ab. Der Käfer ist an einer nassen Stelle bey Passau sehr gemein gewesen, verliert sich aber immer mehr, weil eben darauf ein Fahrweg ist, der jetzt mehr als sonst benutzt wird.

## Einige Bemerkungen über Calamiten

von Prof. Germar in Halle, vorgetragen in der Versammlung der deutschen Naturforscher zu Prag 1837. Taf. III.

Die Calamiten werden ziemlich allgemein für eine Gattung der Equisetaceen angesehen, ja Göppert zweifelt sogar, ob sie wesentlich von den Equisetiten zu trennen wären (S. Germars Lehrb. d. ges. Mineral. 2. Ausgabe S. 433). Es scheint aber, daß man unter die Gattung *Calamites* mehrere Arten stellt, die gar nicht dahin gehören, und daß unsere ganze Kenntniß dieser Pflanzen noch sehr unvollständig ist. Cotta fand seine Vermuthung, daß die innere Structur seiner *Calamitea* die Structur von *Calamites* sey, durch mehrere Exemplare

bestätigt, an welchen außer der innern auch sehr deutlich Spuren der äußern Structur vorhanden waren, und Göppert erkannte die ähnliche innere Structur bey den *Piperaceen*. Bevor indessen nicht die äußern Formen der von ihm beobachteten *Calamitea* genauer die Identität mit *Calamiten* darthun, möchte daraus nur zu folgern seyn, daß es calamitenähnliche Pflanzen gibt, welche die Structur von *Piper* besitzen. Vergleicht man die Merkmale der Calamiten der Grauwacke mit denen des Steinkohlengebirges, und selbst jede derselben wieder unter sich; so stößt man auf so mannfaltige Abweichungen, daß man nicht mehr weiß, was man als eigentliche Calamiten betrachten und wie man die Gattungsmerkmale festsetzen soll; und auf der andern Seite wird die Unterscheidung mancher Arten wieder so unsicher, es erscheinen so viele Uebergänge, daß man über den Werth und die Unveränderlichkeit einzelner Merkmale sehr ungewiß wird. Es dürfte daher für jetzt am zweckmäßigsten seyn, die einzelnen Arten genau ins Auge zu fassen und sie an ihrem Fundorten in möglichst großen und zahlreichen Exemplaren zu untersuchen, und in dieser Ansicht möchten nachstehende Bemerkungen einiges Interesse gewähren.

In dem Schieferthone der Steinkohlenlager von Wettin und Löbzin sind nur zwei Arten von Calamiten in einiger Menge vorhanden, von denen ich den einen für *Calamites listii* Brongn., den andern für *C. alternans* Sternb. halte. Von dem letztern, der von *C. dubius* Brongn. Hist. d. vég. foss. p. 130 tab. 18, f. 1—3. vielleicht nicht verschieden ist, kommen mitunter ausgezeichnete Exemplare vor. Dieser *Calamit* zeichnet sich durch alternierende dünne Streifen, mit einem Knötchen oder Grübchen an der Wurzel und ungleich weit von einander absteigende Gelenke aus. Das Alterniren der Streifen ist jedoch nicht überall sichtbar, sondern gar oft scheint ein Streifen unmittelbar aus einem Gelenke in das andere überzugehen. Besonders interessant ist das gegen 2 Fuß lange, gegen 3 Zoll breite Exemplar, von dem das untere abgebrochene Drittel auf Tafel 3. Fig. 1. abgebildet ist. Es enthält 30 Glieder, die sich je neun, als zu einer besondern Abtheilung gehörig vertheilen lassen.

Von diesen neun Gliedern ist das erste das längste, die folgenden verkürzen sich allmählich und das neunte ist das kürzeste. Auf der Nacht des neunten Gliedes, theilweise auch etwas unter derselben stehen Narben, durchschnittlich vier auf jeder Seite, also acht oder neun auf dem ganzen Gelenke, und in gleicher horizontaler Entfernung von einander. Diese Narbenstellung und Verfüzung der Glieder kehrt in dem vorliegenden Exemplare viermal wieder und wurde bey allen bis jetzt beobachteten Exemplaren erkannt. Bey einem großen Exemplar von ohngefähr anderthalb Fuß Länge und neun Zoll Breite war nur einmal die Narbenstellung, wohl aber zweymal die progressive Abnahme der Größe der Glieder sichtbar. Nach oben hin verschmälert sich die ganze Pflanze etwas, aber doch wenig.

Es kann kaum einem Zweifel unterworfen seyn, daß diese neungliedrige Abtheilung und Narbenstellung mit dem periodischen Leben der Pflanze in Verbindung steht und durch sie bedingt wird, und kaum kann man anders mutmaßen, als daß sie das Product des jährlichen Wachstums der Pflanze ist. Ja man möchte fast noch weiter gehen und jedes Glied für ein

ein Monatsproduct halten, wo dann ein dreymonatlicher Winter keine Ansetzung von Gliedern gestattet hätte. Die Narben könnte man für die zurückgelassenen Eindrücke von abgehenden Aesten, oder für die Fructificationen-Narben halten. Gegen die erste Meynung scheint mir aber ihre geringe Größe, ihre regelmäßige Stellung, ihr Erscheinen als Schlußacte des jährlichen Wachsthum's und auch das centrale Zusammenlaufen der einzelnen Streifen der Glieder an ihnen zu sprechen. Sie ähneln im letzten den Narben des *C. cruciatus* Brongn., den ich als *C. alternans* (Act. nov. Acad. Caes. Leop. XV. Pars II. p. 225) beschrieb, und schon damals auf die wesentliche Abweichung von den andern Calamiten aufmerksam machte. Aber ihre ganz andere Stellung bey dem *C. cruciatus*, wo sie im Quincunx stehen und auf jeder Gelenknabe sichtbar werden, zeigen auf eine sehr wesentliche Verschiedenheit beyder Pflanzen hin. Bey dem *C. ramosus* erscheinen die Narben ungleich größer, sehr einzeln, kaum symmetrisch vertheilt, und möchten hier von abgehenden Aesten herrühren; aber wir haben es hier wahrscheinlich ebenfalls mit einer ganz andern Pflanze zu thun.

Mir ist es höchst wahrscheinlich, daß diese Narben zurückgelassene Eindrücke von anstehenden Fructificationen waren, welche am Schlußse des jährlichen Wachsthum's zum Vorschein kamen; daß die Spitze des Calamiten stumpf gerundet war und im nächsten Jahr der aus dem Gipfel sich entwickelnde neue Trieb diese Narben auf die Seite drängte. Dadurch ergäbe sich, wenigstens in Betreff des Wachsthum's und der Blüthenstellung einige Aehnlichkeit mit manchen Arten von *Cactus*. Daher mag es auch kommen, daß wir von den Endspitzen der meisten Calamiten keine Exemplare finden. Folzig kann aber der Stamm nicht gewesen seyn, denn man bemerkt oft wellenförmige Biegungen einzelner Streifen, ja sogar in Bogen gekrümmte Stämme, wo die Streifen nicht geriffelt sind, die an einem hölzigen Stamm nicht vorkommen könnten, und auch die oft mangelnde Alternierung der Streifen mag in Verschiedenheiten ihren Grund haben. Ueberdies führt fast jeder platt gedrückte Calamit entweder auf einer oder auch auf der entgegengesetzten Seite einen unregelmäßigen, nicht gestreiften Längswulst, den kaum für etwas anders als für eine durch das Zerdrücken herausgepreßte Marksubstanz ansprechen mag.

In dem abgebildeten Exemplare, das diesen Längswulst auf beyden Seiten hat, verläuft sich dieser Längswulst nach oben in mehrere schmälere, oft unterbrochene Längsfalten. Dieß Verhalten läßt sich aus der von *H. Cotta* beobachteten innern Structur erklären, wornach der Stamm innenwärtig hohl (oder mit Marksubstanz ausgefüllt) war, und die innere Höhlung ähnliche Falten oder Streifen hatte, wie die äußere Fläche.

Für eine junge Sprosse eines Calamiten halte ich das auf Taf. III. Fig. 2. abgebildete Exemplar, ohne jedoch die Bestimmung der Art näher angeben zu können. Es sind einige Exemplare davon gefunden, die keine Abweichungen von einander zeigen. Das Ganze erscheint als eine eiförmige Masse, an der Spitze mit langen, linienförmigen, nach oben convergirenden Blättern besetzt. Man bemerkt an dem untern Theile die Anlage zu einer Gliederung und mehrere Längsfalten, nirgends aber die Spur eines fortsetzenden Stieles. Diese Masse ist gleichfalls platt gedrückt und so fest auf der Unterseite mit dem Gestein verwachsen, daß sie sich nicht auslösen läßt, doch

fand sich ein anderes auslösbare's Exemplar, wo jedoch die einzelnen Theile besser mit einander verwachsen waren und keine so scharfen Umrisse darboten. Unter allen bey *Wettin* und *Lebeis* vorkommenden Pflanzen kenne ich keine, von welcher diese knospenförmigen Körper herrühren könnten, als von den Calamiten.

Auch die Blätter der Calamiten glaube ich gefunden zu haben, und bilde die zwey instructivsten Stücke Taf. III. Fig. 3. 4. ab. Sie sind nicht, wie bey *Equisetum* und bey dem *C. arenaceus* durch eine gemeinschaftliche Scheide verbunden, sondern sehr schmal, fast linienförmig, einnervig, an der Wurzel mit einem Knötchen versehen, haben ziemlich die Länge der Glieder, und entspringen jedes einzeln aus den längst bekannten Knötchen, welche die Gelenke ringförmig umgeben, wenn nicht diese Knötchen, die man überhaupt bey den Calamiten seltener als ihre Eindrücke findet, die Wurzelknötchen der Blätter selbst sind. Sie sitzen wahrscheinlich an der Wurzel der Längsstreifen, und jeder Längstreif trug an seiner Wurzel ein Blatt.

Daß man dieselben so sehr selten findet, liegt in der Art, wie wir die Calamiten verfeinert finden. Bey weitem bey den meisten Calamiten haben wir es mit Steinkernen zu thun; ihre Haut ist in Kohle verwandelt und mußte die Blätter mit in die Kohlenmasse aufnehmen, oder die ganz dünnen Blätter legten sich an die Längsfalten an und bleiben bey dem platt gedrückten Stamme nicht mehr unterscheidbar. Fast nur da, wo der Calamit einen so starken Druck erlitt, daß sein Stamm fast gar keinen körperlichen Durchmesser mehr darbietet, wo mithin die Längsfalten ganz ausgeglättet sind, oder wo seine Substanz ganz in der umgebenden Steinmasse verschwand, blieben die Blätter, die keiner weitem Ausdehnung fähig waren und nicht in den vollständigen Verwesungsproceß mit eingingen, als Abdrücke noch sichtbar. Es konnten mithin nur besonders günstige Zufälle die Erhaltung dieser Blätter vermitteln. Auch scheinen die Blätter mit dem Stamme nicht sehr fest verwachsen und leicht dem Abfallen unterworfen gewesen zu seyn, vielleicht, daß der Stamm nur an seinen obern Trieben, vielleicht, daß er nur im Sommer Blätter führte.

Auf dem in Fig. 3. abgebildeten Exemplare ist jede Spur des Stammes verschwunden, aber die Blätter sind sehr deutlich vorhanden, auf dem Exemplare, das Fig. 4. gibt, ist noch der Stamm, jedoch ganz platt, ohne deutlich erkennbare Längsfalten, mithin ganz platt gedrückt wahrnehmbar. Das kleine Stückchen linker Hand mit vier schief stehenden Blättern gehört der Oberseite, alles übrige der entgegengesetzten Seite an, und die ganze Dicke des Stammes beträgt in diesem Exemplare kaum mehr als die Dicke einer Pergamentfaser. Nach oben hin sieht man, wie die Stammsubstanz ohne scharfe Abgränzung sich in die Steinmasse verläuft.

Es ist kaum zu verkennen, daß die Stellung und Form der Blätter sehr lebhaft an die *Asterophylliten* erinnert, und *Göppert* äußerte gegen mich die Ansicht, daß diese Stücke nicht von Calamiten, sondern von großen *Asterophylliten* stammen, ja daß wahrscheinlich der *C. listii* Auct. kein Calamit, sondern ein *Asterophyllit* sey. Ohne bis jetzt nachweisen zu können, von welcher Art die hier abgebildeten Blätter stammen, scheinen mir doch die deutlichen Wurzelknötchen, ihre ganze

Stellung, ihre Entfernung an der Wurzel von einander und ihre Aehnlichkeit mit den Blättern in Fig. 2. Gründe für ihre Unterscheidung von den Blättern der Astrophylliten und für ihre Vereinigung mit den Salaminiten zu geben.

## Lepidopterologische Beiträge

von Dr. Adolf Speyer in Krefen.

### Zur Kenntniß der Fühler (Antennae).

Kein Zweig der Zoologie hat durch die Untersuchungen und Entdeckungen der neuesten Zeit einen so ungeheuern Umfang erhalten als die Entomologie. Aller Orten entfallen Sammler und Sammlungen, aus den Sammlern werden Beobachter und Entdecker, — nirgends ist es leichter zu entdecken als hier. Der Reichthum an Arten scheint unermesslich; man kann wohl ohne Uebertreibung gegen 80000 \* bereits in den verschiedenen Museen Europas vorhandene annehmen, und doch zeigt die Masse neu aufgefundenen Species in den am besten durchforschten Ländern in jedem Jahre, wieviel noch zu entdecken übrig ist. Dabei ist durch die zahlreichen Varietäten, die als eigene Arten betrachtet wurden, durch die große Aehnlichkeit wirklich verschiedener Arten, die man vereinigte, durch die Schwierigkeit früherer, oft unzulängliche und dunkle Beschreibungen richtig zu deuten, hauptsächlich aber durch den unverzeihlichen Leichtsinne schon bekannte und benannte Arten willkürlich mit neuen Namen zu versehen, eine so gränzenlose Verwirrung der Synonymie entstanden, daß zur Aufklärung derselben allein bändereiche Werke geschrieben werden könnten. Als notwendige Folge dieser Verhältnisse muß es betrachtet werden, wenn jetzt das Hauptstreben der besten entomologischen Schriftsteller darauf gerichtet ist, durch genaue Beschreibungen und sorgfältige Abbildungen die Rechte der einzelnen Arten zu begründen und fest zu stellen, Varietät und Art streng zu trennen, älteren, schon unter mehreren Namen beschriebenen Arten den des Entdeckers zurückzugeben, nur wirklich Neues neu zu benennen, die Synonymen genau zu ordnen. Es muß dieß der erste Schritt seyn, da nur so ein sicherer Grund gewonnen und allgemeine Verständigung herbeigeführt werden kann. Auch ist die Erfüllung dieser Forderung, und wenn nur bey einer einzelnen Ordnung etwas einigermaßen Vollständiges geleistet werden soll, schon eine so mühsame und langwierige, daß man es dem entomologischen Schriftsteller kaum verzeihen kann, wenn sein Werk in anderer Hinsicht manches zu wünschen übrig läßt. Dieß gilt vorzüglich im Falle der Lepidopterologie.

Die Verdienste der neuern lepidopterologischen Schriftsteller, eines Hübner, Freyer, Boisduval u. a., bestehen hauptsächlich in Bestimmung alter und Bekanntmachung

neu entdeckter Arten und ihrer ersten Stände, sowie im Ordnen ihrer Synonyme.

In der neuern Zeit hat ein in dieser Beziehung classisches Werk seine Vollendung erreicht: die Schmetterlinge von Europa, von Ochsenheimer und Treitschke. Durch dieß Werk ist die europäische Schmetterlingskunde ein geordnetes Ganzes geworden; durch seine sorgfältige und reiche Synonymie ist in diesem Bereiche die frühere Verwirrung größtentheils beseitigt worden. Aber gerade an diesem Werke treten auch die Mängel unserer lepidopterologischen Kenntnisse recht deutlich hervor.

Das in demselben aufgestellte System ist jetzt fast allgemein angenommen worden, wenigstens unter den vorhandenen und bekannt gemachten als das vorzüglichste anerkannt. Daß es unvollkommen und lückenhaft seyn und bleiben muß, da es nur europäische Schmetterlingskunde umfaßt und selbst von diesen nur einen großen Theil, von dem wieder ein bedeutender Theil seiner Entwicklungsgeschichte nach unbekannt ist — das bedarf keiner Entschuldigung, es ist eine unvermeidliche, in der Natur der Sache selbst begründete Unvollkommenheit. Aber ein zweyter Hauptgrund derselben ist nicht hierin zu suchen, er liegt in der Vernachlässigung der accuraten Untersuchung der kleinern Theile des Schmetterlingskörpers. Man bildete die Gattungen (Genera) nach einer ziemlich oberflächlichen Betrachtung des Habitus des vollkommenen Insects, der äußern Gestalt seiner Raupen, ihrer Lebensart und Verwandlung. So wurden allerdings meist natürliche Zusammenstellungen errichtet, wenigstens da, wo auffallendere Verschiedenheit der Gruppen Statt fand. Aber um zu erkennen, wie sich selbst dann noch die Vernachlässigung der feinern Theile rächte, braucht man nur die aufgestellten Gattungs-*Merkmale* zu betrachten. Hier müssen sehr häufig Flügelgestalt, auch wohl nur Farbe und Zeichnung, fast allein zur Characterisierung des Genus dienen, und da diese so oft bey wirklich natürlichen Gruppen nicht übereinstimmend und scharf begränzt genug sind, um darnach mit Sicherheit trennen zu können; so wird der Character der Gattung vage und unbestimmt, und ein Hauptvortheil alles Systematisirens überhaupt, Erleichterung der Uebersicht und des Auffindens unbekannter Arten, geht fast ganz verloren.

Gewiß ist es, daß die Aufstellung in der Natur begründeter Gattungen und die scharfe Characterisierung derselben, auch durch das Zuhilfenehmen der genauesten Untersuchung unterstützt, ihre großen Schwierigkeiten behält und immer viel zu wünschen übrig lassen wird. Aber es würde ungleich lichter in der Schmetterlingskunde aussehen, wenn man die Rücksicht hierauf weniger vernachlässigte. Die meisten übrigen Ordnungen der Insecten sind in dieser Hinsicht der Lepidopterologie voraus.

Die Nachteile, welche für das System aus diesem Umstande hervorgingen, sind aber nicht die einzigen, ja nicht einmal die hauptsächlichsten. Zur Begründung eines genügenden Systems der Schmetterlinge, selbst nur der europäischen, ist es wegen der großen Lücke in der Kenntniß der Arten und ihrer Verwandlungsgeschichte, die bey der täglich wachsenden Zahl neuer Entdeckungen fortwährende Aenderungen nöthig ma-

\* Nach Burmeisters Schätzung (Handb. der Entomologie 1. Bd. S. 642). Dagegen nehmen Latreille und MacLeay 100,000 an, eine Anzahl, die jetzt, nachdem 5 Jahre seit Burmeisters Berechnung verstrichen sind, vielleicht die richtigere seyn mag.

ohnen würden, wohl noch nicht an der Zeit. Aber bringender nöthig macht eine Abhilfe dieser Uebelstände schon jetzt die bedenkliche Verwirrung, die aus den oberflächlichen Angaben über die Beschaffenheit der kleinen Theile des Schmetterlingskörpers in der Terminologie derselben entspringen ist. Dieß gilt besonders in Betreff der Fühler (Antennae). Kein anderer einzelner Theil ist durch seine vielfach wechselnde Gestalt so beklüftet als Anhaltspunkt zur Unterscheidung der Gattung, des Geschlechtes (sexus), ja zuweilen der Art selbst zu dienen, als dieser. Die Verschiedenheit der Fühler kann in einzelnen Fällen noch als Merkmal zur Unterscheidung von übrigens höchst ähnlichen Arten dienen (In den unter folgenden speciellen Angaben wird man hierzu mehrere Belege finden. Bey *Cidaria suffumata* und *picata*, von denen Treitschke (Schmetterl. v. Eur. 6. Bd. 2. Abth. S. 194) es unentschieden läßt, ob sie nicht vielleicht als Varietäten derselben Art vereinigt werden müßten, sind die Fühler gänzlich verschieden geformt. Das gleiche findet sich bey andern nahe verwandten Arten, z. B. *Hadena adusta* und *thalassina*, *idea*, *incanata*, *biseta* und *scutellata* u. a.). Eben so lassen sich oft allein durch die Fühler die verschiedenen Geschlechter mit Sicherheit trennen, besonders bey den Nachtschmetterlingen. Schlägt man aber in lepidopterologischen Schriften nach; so findet man, daß die eine einer Art gekämmte Fühler beylegt, während eine andere sie gezähnt, eine dritte gekerbt nennt. Bey den Tagsschmetterlingen werden die Ausdrücke tellerförmige, kolbige, knopfförmige usw. Fühler nicht selten promiscue gebraucht.

In einem und demselben Werke heißt bey diesem Schmetterlinge ein Fühler gekämmt, dessen ganz gleiche Beschaffenheit, bey einem andern gezähnt oder gekerbt, bey einem dritten fein behaart oder gesiedert genannt wird. Auf eine genauere Angabe der Beschaffenheit, bis auf diese epitheta, die leider oft weder necessaria noch ornatia sind, läßt man sich selten ein. Ich halte mich hier wie im Folgenden an das Däsenheimer-Treitschke'sche Werk, da es am vollständigsten den Vorrath unseres jetzigen Wissens in der europäischen Schmetterlingskunde enthält, allgemein bekannt und verbreitet ist und ich meine Untersuchungen fast lediglich auf europäische Schmetterlinge beschränken mußte.

Um zu dem Gesagten Belege zu finden vergleiche man z. B. die Angaben über die generische Beschaffenheit der Fühler bey den Gattungen *Melitaea* und *Argynnis* (Bd. 4. S. 13 und 14). Hier heißt es von *Melitaea*: „die Fühler haben eine eiförmige, flachgedrückte, stumpfe Keule,“ von *Argynnis*, „die Fühler sind geknopft, die Kolbe ist zusammengedrückt, scheibenförmig.“ Man sollte hiernach eine Verschiedenheit der Fühler beyder Gattungen vermuthen, sie sind aber in der That bey beyden ganz gleich, nur durch ein Spitzchen auf dem Ende der Kolbe bey *Argynnis*, welches den *Melitaea*-Arten abgeht, verschieden.

Ferner — Bd. 5. 2. S. 348 — werden die Fühler des Mannes von *Xanthia fusca* — S. 350 die von *ferruginea*, „sein gekämmt“ genannt; ebenso die von *Citrigo*, S. 369, dagegen die von *Orthosia macilenta*, S. 215, „schwach gekämmt,“ die von *Xanth. aurago*, S. 364, und die der folgenden Arten, *Cerago* etc. „sein gezähnt“ — in der That sind aber alle von wesentlich gleicher Beschaffenheit. Um nicht

unnöthig Raum zu verschwenden, begnüge ich mich mit diesen Beyspielen, zu denen sich eine Menge ähnliche hinzufügen ließen, und erwähne nur noch der Verwirrung, die hierin bey den Spannern (*Geometrae* Linn.) herrscht. Seit Linné ist man gewohnt, die Namen derjenigen Spanner, die im männlichen Geschlechte gekämmte Fühler besitzen, auf *aria*, die übrigen auf *ata* endigen zu lassen, und hat sogar verschiedene Arten mit demselben, nur durch diese Endigungen verschiedenen Namen belegt, z. B. *Prunaria* und *Prunata*. Hätte man von Anfang an auf die Beschaffenheit der Fühler genauer geachtet und sich darüber verständig, was gekämmt und ungekämmt Fühler genannt werden müßte, so wäre hieraus kein besonderer Nachtheil entstanden; obgleich es immer mißlich war, da die Gründe zwischen gekämmten und gezähnten Fühlern bey den unmerklichen Uebergängen der einen Form in die andere nicht in allen Fällen streng zu ziehen ist. Dieß ist aber so wenig hier als bey den übrigen Abtheilungen geschehn, und damit der Namenconfusion Thür und Thor aufgeschlossen.

Am ärgsten ist dieß bey *Hübner*, der z. B. die bekannte *Crataegata* in *Crataegaria* umtauscht, obgleich auch nicht eine Spur von Kammzähnen bey dieser Art zu bemerken ist. \* Aber auch bey Treitschke herrscht hier Verwirrung und Inconsequenz. Von vielen nur einige auffallende Beyspiele. In seinem ersten Genus, *Ennomos*, ändert er nach Hübners Vorgange die ältern Namen *Notata*, *Litürata*, *Emarginata* und einige andere in *aria*, *Notaria* etc., und nennt ihre Fühler schwach gekämmt, obgleich sich bey allen nur schwache Zähne oder gar nur seine Härchen vorfinden. Im Gen. *Fidonia* geschieht Gleiches mit *Hepararia*, *Conspicuaria*, *Immoraria*, — dagegen die ähnlichen Fühler von *Cabera sylvestrata* u. a., wie der Name zeigt, nicht als gekämmt angesehen werden. Der *Larentia badia* am männlichen Geschlecht eigenthümlich gestaltete Fühler werden fadenförmig genannt usw.

Am meisten ist es die Behaarung der Fühler, die mit der wirklich gekämmten Form verwechselt wird; bey einigen Zünlern werden nur behaarte Fühler sogar „breit gesiedert“ genannt, z. B. *Herceyna strigularis*, *palliolalis*. Ich bemerke nochmals ausdrücklich, daß ich weit entfernt bin, durch Aufzählung dieser Mängel den Verdiensten eines Werks, das sich den vollen Anspruch auf den Dank des entomologischen Publicums erworben hat, nahe treten zu wollen; ich wollte nur gerade an einem ausgezeichneten Werke zeigen, was der Lepidopterologie jetzt vor Allem Noth thut: die feinere Untersuchung der Theile des Schmetterlingskörpers mehr zu beachten, die Loupe häufiger zur Hand zu nehmen.

Ich habe von dieser Ansicht ausgehend im Folgenden die Resultate von Untersuchungen über die Beschaffenheit der Fühler, und über das Vorkommen der Nebenaugen bey einer nicht unbeträchtlichen Anzahl europäischer Schmetterlinge niedergelegt.

Es scheint mir zweckdienlich, die einzelnen wichtigeren Theile

\* Freylich nach Linné's Beyspiel bey *Sambucaria*, deren Fühler in beyden Geschlechtern denen von *Crataegata* durchaus ähnlich sind.



des Schmetterlingskörpers, jeden für sich, durch alle die verschiedenen Formen seines Vorkommens zu verfolgen, um auf diese Art ein möglichst vollständiges Bild desselben erhalten, ein Schema entwerfen zu können, welches, von dem Einfachsten ausgehend, die mannichfaltig wechselnden, mehr entwickelten und zusammengefügten Formen, der Natur möglichst gleichlaufend, nach ihrer Analogie zusammengestellt umfasse. Hieraus würde sich eine entsprechende Terminologie von selbst ergeben. Zur Realisirung eines umfassenden, auf alle bekannten Arten sich ausdehnenden Planes solcher Art gehören indefs Mittel, die nur wenigen zu Gebote stehen. Ich mußte mich darauf beschränken, einen Beytrag dazu zu geben, da mir nur wenig über 700 europäische Schmetterlingsarten zu einer genauern Untersuchung bis jetzt zu Gebote standen. Wenn ich daher die Ergebnisse derselben zuerst im Allgemeinen zusammenstellte und auf eine naturgemäße Art den Grund zu einer accuraten Terminologie zu legen suchte, — so soll und kann dieß nicht geschehen, um ein vollständiges und für die Zukunft ausreichendes Schema zu liefern, sondern nur um die Uebersicht zu erleichtern und im Einzelnen hernach kürzer seyn zu können.

Daß ich mich nirgends auf fremde Angaben verlassen, sondern jeden angeführten Schmetterling selbst unter der Loupe gehabt habe, versteht sich von selbst. Noch bemerke ich, daß ich ein 4 bis 6mal (im Durchmesser) vergrößertes Glas fast überall für meinen Zweck zureichend fand und mich nur eines solchen bediente.

Die großen Lücken, die ich der Unvollständigkeit meiner Sammlung wegen lassen mußte, hoffe ich einigermaßen in nicht allzulanger Zeit ausfüllen zu können.

### 1. Der Fühler im Allgemeinen.

Fast bey keinem Schmetterlinge fehlen die Fühler. Die einzige mit bekannte Ausnahme hievon machen die überhaupt aller articulierten Gliedmaßen entbehrenden \* madenförmigen Weiber mehrerer Arten der Gattung *Psyche* Schrank, welche Schenkeimer als *Fem. B.* derselben zusammengestellt hat. Sonst sind sie überall deutlich und verhältnißmäßig groß.

Sie entspringen ganz allgemein auf derselben Stelle, auf der Stirn, mit geringen Unterschieden mehr dicht über, oder mehr zwischen, oder etwas vor den Augen. Diese nicht erheblichen Verschiedenheiten hängen von dem Verhältniß der einzelnen Theile des Kopfs, vorzüglich der Augen, zu einander ab. Sie geben hin und wieder Anhaltspunkte zur Bestimmung der Verwandtschaft der Abtheilungen.

Die Länge des Fühlers im Verhältniß zu der des ganzen Körpers ist höchst verschieden. Bey einigen Spinnern (*Gen. Hepiolus*) erreichen sie kaum den sechsten bis achten Theil derselben; bey mehreren Schaben (*Tinea* Linn.; *Gen. Adela* Latr.) findet das umgekehrte Verhältniß Statt. Im Durchschnitt kann man die halbe Körperlänge als gewöhnliche Länge der Fühler annehmen.

Nicht immer in geradem Verhältniß zur Länge des ganzen Fühlers steht die Anzahl seiner Glieder. Als Minimum derselben fand ich 17 bis 20 bey *Psyche* und *Hepiolus*-Arten, als Maximum weit über 100 bey der Gattung *Adela*. Ich hoffe Anfangs durch Brachtung der Gliederzahl ersprießliche Vorteile für die systematische Anordnung zu erhalten, fand aber sehr bald, daß in dieser Beziehung wenig davon zu erwarten wäre, indem nichts einem so willkürlichen Wechsel unterworfen ist als dieß Verhältniß. Ganz nahe verwandte Arten zeigen darinn bedeutende Unterschiede, und wieder sehr entfernte eine ganz gleiche Zahl. Man braucht nur einige der unten aufgeführten Gattungen nach ihren einzelnen Arten zu vergleichen, um hievon augenblicklich überzeugt zu werden; z. B. das *G. Argynnis*, wo *Latonia* mit 20, *Niobe* mit 44 gliederigen Fühlern vorkommen usw. Mehr Gewinn verspricht die Zählung der Glieder für die Unterscheidung nahe verwandter Arten zu liefern (So zähle ich bey *Acronycta Psi* einige Glieder mehr als bey *Acr. tridens*; bey *Larentia cassata* mas beträchtlich mehr, als bey *L. plagiata* fem.; doch möchte ich wegen der gleich anzugebenden Umstände hierauf kein zu großes Gewicht legen).

In der Regel stimmen freylich die nächst verwandten Arten auch in der Anzahl ihrer Fühlerglieder überein, und im Gegentheile ist dieß nicht durchaus bey den beyden Geschlechtern derselben Art der Fall. Letzteres findet jedoch nur Ausnahmeweise Statt, z. B. bey *Hep. humuli*. Außerdem ist die Zählung der von Schuppen usw. bedeckten Glieder, besonders bey kleinen Arten, oder großer Menge der Glieder, ein mißliches Geschäft und leicht Irrthum dabey möglich. Ich habe mich deshalb in der Regel, wo weniger auf eine ganz genaue Bestimmung ankam, auf eine obgefährte Angabe derselben beschränkt, und kann dessen ungeachtet auch, wo ich eine bestimmte Zahl gegeben habe, nicht durchaus dafür einstehen, ob sich nicht hin und wieder im Irrthum um ein oder ein Paar Glieder eingeschlichen hat. Bedeutendere Irrungen wird man indessen nicht leicht finden.

In der Regel ist der Fühler mit Schüppchen besetzt, die eine ähnliche Beschaffenheit wie an den übrigen Körperteilen besitzen. Am dichtesten stehen sie am Wurzelgliede, welches sie von allen Seiten umgeben, dann auf der obern und äußern Fläche (Rückseite) des Schafts. Dagegen ist die untere und innere Fläche (Bauchseite) desselben gewöhnlich theilweise oder ganz von ihnen entbloß. Manche Schmetterlings-Fühler entbehren die Beschuppung ganz, z. B. die von *Papilio machaon*, *Saturnia carpinii* u. a.; andere, wie die vieler Schaben, sind durchaus damit bedeckt. Bey einigen Spinnern und Mikrolepidopteren stehen die Schüppchen am Ursprünge der einzelnen Glieder, besonders gegen die Fühler Spitze, etwas vom Schaft ab, wodurch der Fühler das Ansehen eines gezähnten erhält. Meistens ist nur der Schaft, nicht aber seine Seitenverlängerungen, wo solche vorhanden sind, mit Schuppen bedeckt; Ausnahmen sind jedoch nicht selten. So sind die Kammdrüsen von *Eupr. russula*, *Ecn. dolabraria* u. a. auf der Rückseite beschuppt.

Außer den Schüppchen besteht die Bekleidung des Fühlers in Säcken und feinen Borsten. Sie kommen den meisten Schmetterlingsfühlern zu, nur den Tagfalterlingen

\* Sie besitzen dennoch, wie mich die Untersuchung lebender Thiere lehrt, Spuren der Füße, die sie gerne bewegen, aber nicht zum Fortbewegen brauchen können.

fehlen sie ganz, oder sind nur mikroskopisch sichtbar, wie bey *Lyc. Betulae*. In den beyden andern Familien fehlen sie nur ausnahmsweise, sind bey *Manne* stets beträchtlicher entwickelt als bey *Weibe*, und werden dadurch als Merkmal zur Unterscheidung des Geschlechts wichtig.

Neuerst kurze, feine, dichtstehende, auch durch die Lupe nur wie ein feiner Flaum erscheinende Härchen bedecken, dem bloßen Auge unsichtbar, bey den meisten Schmetterlingen die von Schüppchen entblößten Stellen des Fühlers.

Diesen mikroskopischen Flaum habe ich, da er fast überall vorhanden ist, in den unten folgenden speciellen Angaben meistens nicht erwähnt. Bey manchen Fühlern macht er fast die einzige Behaarung aus, z. B. bey den *Cucullia*-Arten, bey *Kymatophora flavicornis* u. a.

Aber nicht selten verlängern sich diese Härchen in stärkerem oder geringerem Maasse, werden dann auch oft dem bloßen Auge sichtbar. Der Fühler ist dann behaart (*Ant. pilosa, suppilosa*). Die Behaarung kommt immer nur an den von Schuppen entblößten Stellen vor, also an der Bauchseite des Schaftes. Ueberhaupt schließen sich Beschuppung und Behaarung gegenseitig aus, daher die Rückseite nie mit Haaren besetzt ist.

Bey den einfach borsten- oder fadenförmigen Fühlern, wenn sie nicht ringsum von Schuppen bedeckt sind, trägt in der Regel (besonders bey *Gen. Lihosia*, den Eulen usw.) jedes Glied des Schaftes beyderseits ein stärkeres, abstehendes, einzelnes Borstchen. Die Borstchen, dem bloßen Auge meistens sichtbar, entspringt von der Seite, auch wohl mehr von der untern Fläche jedes Gliedes, da wo die Beschuppung der Rückseite aufhört. Die Borstchen werden gewöhnlich gegen die Spitze des Fühlers deutlicher, fehlen auch wohl den untern Gliedern ganz. In der ganz regelmäßigen Stellung, wo immer von jedem Glied ein Paar abgeht, besetzt sie meistens nur das männliche Geschlecht. Beym weiblichen dagegen, wo sie noch viel häufiger vorkommen und oft bis auf den mikroskopischen Flaum die einzige Behaarung ausmachen, besetzt in der Regel entweder jede Seite eines Gliedes, oder auch nur die äußere deren 2, wovon gewöhnlich eines kleiner ist als das andere. Beym männlichen Geschlechte ist oft ein behaarter Fühler zugleich mit einzelnen Borstchen besetzt, die sich dann durch ihre größere Stärke und Stellung auszeichnen.

Überall da, wo sich Verlängerungen, Auswüchse an einem Fühlergliede finden, drängen sich die Härchen um den Vorsprung zusammen und beschranken sich oft allein auf ihn. So sind bey *Manne* männlichen Fühler die Kammzähne stets mit feinen Haaren besetzt, ebenso die Zähne, meistens auch die Blättchen des gebühteren Fühlers, — während der Schaft selbst häufig unbehaart bleibt. An der Spitze der Zähne männlicher Fühler bilden verlängerte Haare zuweilen Büschel oder Pinsel (*fasciculi, penicilli*), insbesondere bey *Spannern* und *Zünslern*, z. B. *Fidonia immoraria*, *defoliaria*; *Idaea scutulata*, *remutata*, *Hermia barbalis*. Beym Weibe sind die Zähne und Kammzähne fast immer unbehaart bis auf ein gerades Borstchen an der Spitze. Ein solches Endborstchen findet sich häufig auch bey *Manne*.

Gestalt die cylindrische Form des Fühlers nur insofern verloren, daß jedes Glied ein wenig angeschwollen, in der Mitte oder oben dicker als am Ueppigen erscheint; so treten auch hier die Härchen gegen den erhabenen Theil mehr zusammen. In vielen Fällen zeigen sie dann eine ganz eigenthümliche regelmäßige Anordnung, welche sich noch deutlicher an den prismatischen Fühlern der Schwärmer entwickelt. Jedes Glied ist nehmlich hier auf jeder Seite mit 2 Querreihen von Härchen besetzt, welche nach der Bauchseite des Schaftes divergieren, gegen die Rückseite in einem spitzen Winkel zusammenstoßen, in dessen Scheitel das oben erwähnte einzelne Borstchen steht, welches aber nur ausnahmsweise durch größere Länge bemerklich wird. Gegen die Fühler Spitze wird diese Art von Behaarung kürzer oder hört ganz auf, und dann treten die einzelnen Borstchen, wo sie vorhanden sind, deutlich hervor. Betrachtet man den Fühler von der Rückseite oder Bauchseite aus, so scheint jedes Glied desselben mit einem oder zwey seitwärts abstehenden, pinselförmigen Haarbüscheln besetzt, und nur bey der Betrachtung von der Seite unter Vergrößerung erkennt man die wahre Anordnung. Sie kommt einzig dem männlichen Geschlechte zu, und findet sich außer bey *prismatischen* Fühlern, bey dem gezähnten und unterwärts gekerbten mehrerer Spinner und Eulen, am häufigsten aber unter letzterer Horde, da wo sich der Fühler zugleich der gezähnten und prismatischen Form annähert. Ich werde so behaarte Fühler gebartet (*ant. barbatae*) \* nennen. Als Beispiele sehr deutlich gebarteter Fühler können dienen die *Smerinthus*-Arten, *Pygaza ducephala*, *Had. adusta*, *Xanth. rufina*, *Xylina exoleta*. Uebergänge von dieser regelmäßigen Stellung der Furchen zu der unregelmäßigen des gewöhnlichen behaarten Fühlers sind ebenfalls nicht selten.

Das Wurzelglied ist bey vielen Schmetterlingen mit einem Kranze mehr oder weniger langen, abstehenden, steifer Härchen umgeben, die von seinem untern Ende entspringen, an der äußern Seite länger und stärker, zuweilen hier allein vorhanden sind, und in manchen Fällen ein abstehendes Pinselchen bilden, wie bey der Gattung *Hesperia*, bey *Crocallis pennaria* und andere.

An der äußersten Spitze des Fühlers führen viele Dämmerungsschmetterlinge, am deutlichsten die meisten *Seiden* ein pinselförmiges Büschel feiner Borstchen, welches auf dem kleinsten, spitzen Endgliede aufsteht. Bey *Ach. atropos* endet der Fühler in eine ziemlich lange, beyderseits federartig behaarte Borste.

Als Grundform der dem mannfachsten Wechsel unterworfenen Gestaltung des Fühlers im Ganzen, wie jedes einzelnen Gliedes für sich, tritt bey den Schmetterlingen, wie bey den Insekten überhaupt, die einfach cylindrische hervor. — Beym fadenförmigen Fühler (*ant. filiformis*), wo sie am reinsten vorkommt, weicht nur das Wurzelglied, wenigstens durch größere Dicke, ab. Durchaus fadenförmige Fühler sind inbeffen bey den Schmetterlingen nicht häufig; in den meisten Fällen verdünnt sich der Schaft doch ein wenig gegen die Spitze, und

\* Man könnte sie auch, vielleicht bezeichnender, gewimpert oder doppelt gewimpert (*ant. duplicato-ciliatae*) nennen.



geht so in den borstenförmigen (ant. setacea) über, welcher eigentlich das deutlichere, allmähliche und gleichmäßige Dünnerwerden eines cylindrischen Fühlers von der Wurzel bis zur Spitze bezeichnen soll. Ein borstenförmiger Fühler bildet daher einen sehr dünnen, langen Keel. Ein strenger Unterschied zwischen faden- und borstenförmigem Fühler ist in der Natur nicht vorhanden. Beide Formen kommen fast allein bey den Nachschmetterlingen vor.

Bei den beyden übrigen Familien verdickt sich der Schaft gegen die Spitze, so daß das Wurzelglied nicht den stärksten Theil des Fühlers ausmacht. Entweder verdickt sich der Fühler von der Wurzel an gleichförmig bis zur Spitze und stellt das Umgekehrte des borstenförmigen, einen verkehrten Keel vor; oder er erreicht schon vor der Spitze seine größte Stärke und nimmt zuletzt wieder an Dike ab, so daß das letzte Drittel oder Viertel eine spindelförmige Gestalt gewinnt; oder er läuft allmählich in eine abgerundete Kolbe aus; oder endlich nur die letzten Glieder bilden eine dide Kolbe, während der übrige Schaft fadenförmig bleibt. Bei allen diesen, vielfach in einander übergehenden Arten von Anschwellungen ist es eigen thümlich, daß die Verdickung nie plötzlich, mit einem bestimmten Gliede beginnt, sondern stets so, daß der dünnere Theil faust und ohne scharfe Gränze in den dickern übergeht; dieß macht die Angabe über die Anzahl von Gliedern, welche zu der Anschwellung, z. B. bey den Kolben der Tagfaltermettelingsföhler, betragen, mißlich. Bei allen diesen Verdickungen kann man als Regel annehmen, daß die Föhlerglieder, welche sie constituiren, das an Länge verlieren, was sie an Breite gewinnen, so daß die Glieder an den Kolben weit enger zusammengebrängt stehen, als am übrigen Theile des Schaftes.

Eine kaum merkbliche Abweichung von der Cylindrerform zeigen viele Föhler darin, daß sie von beyden Seiten etwas abgeflacht, zusammengedrückt sind, so daß der quere Durchmesser des Gliedes dem senkrechten an Länge nachsteht. Seltener wird diese Eigenheit auffallend, und verdient dann die Bezeichnung: zusammengebrückter Föhler (ant. compressa), z. B. bey *Kymat. floricornis*, *Kym. Xanthoceros* u. a. Der Föhler erscheint hier von der Seite angesehen breit, von oben oder unten schmal. Die Breite wächst bis gegen die Mitte des Föhlers, wo sie oft die des (cylindrisch bleibenden) Wurzelgliedes übertrifft und nimmt gegen die Spitze wieder ab. Die einzelnen Glieder des zusammengebrückten Föhlers sind viel breiter als lang.

Der prismatische Föhler entspricht so ziemlich einem dreyseitigen Prisma. Die Rückseite bleibt gewölbt, die beyden Seiten sind flach und vereinigen sich unten in einer scharfen Kante. Schneidet man den Föhler der Quere nach durch, so zeigt die Durchschnittsfläche den Sector eines Kreises, dessen Bogen die Rückseite bildet.

Prismatische Föhler kommen bey vielen Schmetterlern (*Sphinx* Linn.), weniger deutlich bey vielen Eulen (*Noctua* Linn.) vor.

Bei den Dämmerungs- und noch mehr bey den Nachschmetterlingen entstehen die häufigsten und stärksten Abweichungen von der einfach cylindrischen Form durch Ausdehnung, Verlängerung der einzelnen Föhlerglieder, entweder um am gewöhn-

lichsten nach beyden Seiten, oder nur nach unten; aufwärts steigende Verlängerungen kommen nicht vor.

Die seitlichen Verlängerungen der Föhlerglieder beginnen mit unmerklich stärkerem Anschwellen jedes Gliedes gegen sein Ende, oder in der Mitte, ohne eine bestimmte Spitze zu bilden. Sie sind sehr häufig, z. B. bey vielen Eulen männlichen Geschlechts, *Had. dentina*, *Phlog. meticulosa* etc. Die Abweichung von der einfachen Borstenform ist so gering, daß sie kaum eine eigene Bezeichnung verdient, obgleich man diese Föhler oft gekerbt, schwach gezähnt u. s. w. genannt findet. Durch merkliche Seitenverlängerungen, die sich zuspitzen, geht diese Form in die des gezähnten Föhlers (ant. dentata, subdentata) über. Der gezähnte Föhler ist durch keine bestimmte Gränze von dem gekämmten, bey welchem die Seitenverlängerungen nur länger sind, geschieden. Doch kann man allenfalls folgende Unterschiede festsetzen. Beim gezähnten Föhler überrreffen die seitlichen Fortsätze (Zähne) an Länge nicht die Dike des Schaftes, sitzen mit breiter Basis auf und spizen sich rasch nach oben zu, z. B. bey *Not. ziczac* fem., *Eupr. caja* fem., *Orth. instabilis*, *Orth. gothica* fem.

Beim gekämmten Föhler (ant. pectinata) \* dagegen haben die Seitenfortsätze (Kammzähne) eine cylindrische Form, und überrreffen an Länge den Durchmesser des Schaftes. Sowohl beim gezähnten als gekämmten Föhler entstehen die Fortsätze fast immer unterhalb der Mittellinie der äußern und innern Seite des Schaftes, also mehr von der Bauchseite. Von der Rückseite entspringen sie einzig bey den Gattungen *Saturnia* und *Aglaia* Ochsenh. Von jeder Seite eines Gliedes geht in der Regel nur ein Fortsatz aus; Ausnahmen hiervon machen wiederum die oben genannten Gattungen, wenige *Spanner* und *Jünsler*. Höchst selten führt nur die eine Seite des Schaftes Verlängerungen, wie bey *Adela masculella* mas. Eigentlich sollte man nur diese Form gekämmt, die gewöhnliche doppelt gekämmt nennen. Nur ihr beschränktes Vorkommen entschuldigt die gewöhnliche Bezeichnung. Sehr gewöhnlich sind aber die Fortsätze an der innern Seite des Föhlers länger als an der äußern, besonders gegen die Wurzel des Föhlers.

Die Kammzähne sind zwar bey lebenden Thieren einiger Bewegung fähig, indem sie bey vielen Schmetterlingen mehr oder weniger zusammengeneigt und ausgebreitet werden können, doch sind sie nicht durch ein Gelenk mit dem Schaft verbunden. Sie sind fast überall aus einem Stücke bestehende Fortsätze des Schaftes, nur bey *Hermia barbalis* scheinen sie aus 2 bis 3 durch Gelenke verbundenen Theilen zu bestehen. Die Kammzähne geben unter einem, mehr oder weniger einem rechten sich nähernden, spitzen Winkel vom Schaft ab. Die Abweichung wird um so größer, je mehr sie sich vorwärts richten, was häufig im Tode geschieht; eine Richtung nach rückwärts findet nicht Statt. Zugleich neigen sich die beyden Kammreihen nach unten mehr oder weniger gegen einander, selten gehen sie ganz horizontal auseinander; noch seltener die-

\* Er wird auch oft gefiedert (*plumosa*) genannt, besonders wo die Seitenfortsätze sehr lang sind. Eine solche Verschiedenheit bloß hinsichtlich der Größe rechtfertigt aber keine besondere Bezeichnung.

gen sie sich nach oben, und nur wo sie mehr von der Rückseite des Schaftes entspringen. Die einzelnen Kammzähne laufen einander parallel. An Länge nehmen sie gegen die Spitze des Fühlers ab, oder hören auf, 'ehe sie diese erreichen; gegen die Mitte des Fühlers, seltner schon gegen die Wurzel sind sie am längsten. Das Wurzelglied selbst bleibt ohne Auswuchs.

Die Fortsätze der Glieder an der Bauchseite des Schaftes bilden, im Gegensatz zu den seitlichen, eine einfache Reihe von senkrecht abwärts gerichteten Vorsprüngen. Auch sie fangen von fast unmerklichen Graden an. Das Glied verlängert sich fast in seiner ganzen Dicke ein wenig nach abwärts, so daß der Schaft oberflächlich betrachtet nur zusammengebrückt zu seyn scheint. Genauer von der Seite angesehen erkennt man die feinen Einschnitte zwischen den Gliedern, welche die Fortsätze trennen, und wodurch sich diese Form von dem bloß zusammengebrückten Fühler, bey dem die Glieder in ihrer ganzen Breite zusammenstoßen, unterscheidet. Bey deutlicherer Ausbildung dieser Form erkennt man den Bau sogleich.

Ich will diese Form durch unterwärts gekerbt (ant. *subtus crenata*, *subcrenata*) bezeichnen. Die Größe der Fortsätze und der Zwischendäume, die sie trennen, wechseln vielfach. Unterwärts gekerbt sind unter anderen die männlichen Fühler von *Notodonta Camelinea*, *Pyg. bucephala*, *Mam. Pisi*, *Xanth. Citrigo*, *Gnoph. punctulata*, *Acid. brumata*, *candidata*, die weiblichen von *Mis. oxyacanthae*, *Aspilates vespertaria*.

Die Fortsätze sind theils unregelmäßig behaart, theils gebartet. Sehr selten finden sie sich an einem zugleich gekämmten Fühler, wie bey *Had. leucophaea mas*.

Aus dem unterwärts gekerbten geht durch stärkere Entwicke- lung der geblättrte Fühler (ant. *lamellata*) hervor, wo sich jedes Glied abwärts in einen breiten, quer gestellten abgerundeten Fortsatz verlängert, welcher meist am Ende breiter ist als an seiner Wurzel.

So bey *Sesia apiformis mas*, *Coss. ligniperda*, *Mis. oxyacanthae mas* (während bey'm Weibc dieser Art die Fühler nur unterwärts gekerbt sind). Die Blättchen sind meist fein behaart; über der Mitte des Schaftes erreichen sie ihre größte Länge.

Außer diesen allgemeineren, häufig wiederkehrenden Abänderungen der Fühlerform zeigen sich noch einzeln besondere, weniger unter eine allgemeine Regel zu bringende, hauptsächlich bey Nachtschmetterlingen. Dahin gehören die knotenartigen Verdickungen der Fühler bey'm Genus *Hermia*, die eigenthümliche Fühlerbeschaffenheit bey einigen *Tortrix*-Arten, bey'm Gen. *Phycis* u. a.

Das Verhältniß der einzelnen Fühlerglieder zu einander hinsichtlich ihrer Größe ist ein verschiedenes. In der Regel ist das Wurzelglied länger und dicker als die zunächst folgenden, die dann gegen die Mitte allmählich etwas an Länge zunehmen, gegen die Spitze wieder sich verkürzen. Wo keine auffallende Verschiedenheit in der Dicke an einzelnen Theilen des Schaftes vorhanden ist, da pflegt auch die Länge der Glieder mehr gleichförmig zu seyn. An verdickten Stellen verkürzen sich, wie oben angegeben, die Glieder. Bey'm zusammengebrückten und prismatischen Fühler sind sie viel breiter als

lang, sonst meist länger als breit oder ziemlich von gleicher Breite und Länge.

Ich gehe nun zur speciellen Aufführung der untersuchten Arten über, indem ich der von Dreitschke am Schluß der „Schmetterlinge von Europa“ aufgestellten Ordnung und seinen Benennungen folge. Nur da, wo eine hinreichend scheinende Anzahl von Arten einer Gattung untersucht wurde und sich bey deren Fühlern Uebereinstimmung genug fand, wurden ihre Eigenthümlichkeiten generisch zusammengefaßt. Wo dieß nicht der Fall war, wie besonders bey den meisten auf die Spinner folgenden Gattungen, wurden die einzelnen Arten gesondert aufgeführt. Wo mir nur das eine Geschlecht einer Art zu Gebote stand, ist dieß angegeben.

Ohne Zweifel wird dadurch, daß, wie es geschah, die Beschaffenheit der Fühler einer jeden von mir untersuchten Schmetterlingsart genau angegeben ist, vieles Bekannte wiederholt und manches gesagt, was bey einer auch nur oberflächlichen Betrachtung leicht in die Augen fällt. Vielleicht hätte ich nur das herausheben sollen, was neu ist, oder worüber wenigstens in den lepidopterologischen Schriften sich keine oder unrichtige Angaben finden. Aber die Auswahl wurde schwer bey der Ungenauigkeit und Nachlässigkeit, mit welcher von den meisten Autoren die Fühler überhaupt abgehandelt sind. Dagegen wurde durch die systematische Aufzählung der Wortheil erreicht, daß die nachfolgenden Blätter als ein fortlaufender Commentar, als eine Reihe von Zusätzen und Berichtigungen hinsichtlich der Fühlerbeschaffenheit zu einem Werke dienen können, das in so vieler Hände ist, zu den erwähnten „Schmetterlingen von Europa.“

## I. Tagsschmetterlinge.

Die etwas steifen Fühler verdicken sich gegen die Spitze. Gewöhnlich bildet das Ende des Fühlers allein eine stärkere oder schwächere Kolbe, während der übrige und größte Theil des Schaftes fadenförmig bleibt; seltner verdickt sich der Fühler schon von der Mitte an allmählich, und die äußeren Glieder werden dann meist wieder dünner, so daß eine fast spindelförmige Kolbe entsteht. Am seltensten nimmt der Fühler von der Wurzel bis zur Spitze allmählich und gleichmäßig an Stärke zu, und bildet so einen sehr dünnen, langen verkehrten Ke- gel. Die einzelnen Glieder sind einfach cylindrisch, ohne Seitenverlängerungen; bey wenigen Arten wird jedes Gelenk durch eine geringe Anschwellung bezeichnet, wie bey'm *G. Papilio*. Das Wurzelglied ist von den übrigen kaum verschieden. Die Glieder wachsen an Länge bis zur Mitte des Schaftes, an der verdickten Spitze sind sie am kürzesten. Bis auf die verdickte Stelle sind sie überall länger als dick. Ihre Anzahl schwelt zwischen 26 und 50. Zum größten Theile sind sie mit Schuppen be- deckt, nur die Bauchseite ganz oder stellenweise entblößt. Aus- nahmen machen wieder *Pap. machaon* und *Podalirius* mit nackten Fühlern. Behaarung fehlt, doch finden sich bey *Lyc. betulae* mikroskopische Borstchen. Im Mittel beträgt die Länge des Fühlers zwey Drittel von der des ganzen Körpers. Ihre Wurzel befindet sich theils zwischen dem oberen Rande der Augen, theils dicht darüber. — Die Fühler sind bey den beyden Geschlechtern gleich.

Anmerkung. Die hauptsächlichsten, besonders generischen

Unterschiede der Tagfalterlingsfühler liefert die Beschaffenheit ihrer Kolben. Ich habe daher deren Größenvverhältnisse, Bau, Anzahl der sie bildenden Glieder usw. überall berücksichtigt. Die Angabe über letztern Punkt wird erschwert durch den oben erwähnten Umstand, daß die Anschwellung nicht plötzlich mit einem bestimmten Gliede anfängt, weshalb man oft nicht recht weiß, ob ein Glied schon zur Kolbe gehört, oder nicht. Ich habe immer erst von da an gezählt, wo die Glieder sich auffallender zu verdicken beginnen.

### Genus *Melitaea*.

Die Fühler von mittler Länge, fadenförmig, mit verkehrt eiförmiger, von den 9 bis 12 Endgliedern zusammengefügter Kolbe, deren Breite mehr als die Hälfte ihrer Länge beträgt. \* Die Kolbe macht ohngefähr ein Fünftel der ganzen Fühlerlänge aus. Der Fühler besteht aus einigen und dreißig Gliedern.

Untersuchte Arten: *Cinxia*, *Trivia*, *Athalia*.

### Gen. *Argynnis*.

Von *Melitaea* nur dadurch verschieden, daß das Endglied der Kolbe ein kleines, kegelförmiges Spitzchen bildet. Die Kolbe nimmt höchstens ein Sechstel der Fühlerlänge ein.

Selene und Euphrosyne: 33 Glieder; die Fühler fast von der Länge des Körpers. — *Latonia*: 30 Glieder. — *Niobe*, *Adippe*, *Aglaia*: 44 Glieder. — *Paphia*: 40 Glieder.

### Gen. *Euploea*.

Die Fühler bilden allmählich eine dünne, den untern Theil an Dicke um wenig mehr als das Doppelte übertreffende, fast cylindrische Kolbe. Sie bleiben etwas unter mittler Länge.

*Chrysippus*: 40 Glieder.

### Gen. *Vanessa*.

Die Fühler etwas über mittellang, fadenförmig mit länglich-rundt Kolbe, deren Länge das Doppelte bis Dreifache ihrer Dicke beträgt. Die Anzahl der Glieder zwischen 30 und 40; davon kommen ohngefähr 11 auf die ein Sechstel der Fühlerlänge einnehmende Kolbe.

Bey *Cardui* sitzt das Endglied als ein kegelförmiges Spitzchen auf der dicken Kolbe auf; die Fühler sind bey dieser Art wie bey *Atalanta*, *Jo*, *Antiopa*, *Urticae*, 38 gliederig; bey *Polychloros* und *C. album* 36, bey *Prorsa* (und *Levana*) 30 gliederig.

### Gen. *Apatura*.

Fühler lang, stark, ohngefähr 40 gliederig; mit 13 bis 14

\* D. h. im getrockneten Zustande. Durch das Trocknen verändern die Kolben der Fühler von *Melitaea*, *Argynnis* u. a. ihre ursprüngliche Form insofern, daß sie flacher und breiter erscheinen als im Leben des Schmetterlings. Da man indessen genöthigt ist, die meisten Untersuchungen an getrockneten Exemplaren anzustellen, so habe ich mich auch hier, um keine Ungleichförmigkeit eintreten zu lassen, nur an diese gehalten.

gliederiger Kolbe, die 4 bis 5mal so lang als dick ist und fast ein Fünftel der Fühlerlänge einnimmt.

*Iris*.

### Gen. *Hipparchia*.

Die Fühler geben bey dieser Gattung wenig übereinstimmende Merkmale. Meist sind sie dünn und von mittler Länge oder darunter. Sie verdicken sich theils wenig und allmählich, theils plötzlich und stark, doch ist die Kolbe höchstens halb so dick als lang.

*Proserpina*: F. 36 gliederig, mit länglich-rundt, 11 gliederiger, ein Sechstel der Fühlerlänge einnehmender Kolbe. — *Semele*: Fühler 44 gliederig, Kolbe kurz, stark, eiförmig, 14 gliederig. —

*Maera*, *Megaera*, *Hiera*: F. 36 bis 38 gliederig, Kolbe kurz, verkehrt eiförmig, 11 gliederig. —

*Galatea*: F. stark, 46 gliederig, von der Mitte an allmählich und wenig sich verdickend, zuletzt zugespitzt. —

Bey den übrigen Arten läuft der Fühler ziemlich allmählich in eine dünne Keule aus, deren Dicke höchstens ein Viertel ihrer Länge beträgt. Dahin gehören: *Hyperanthus*, *Janira*, *Egeria*, *Tithonus*, *Oedipus* mit 38 bis 40 Gliedern; *Pamphilus*, *Davus*, *Hero*, *Arcania*, *Medusa* mit 28 bis 31 Gliedern; *Ligea* und *Medea* mit 44 Gliedern.

### Gen. *Lycaena*.

Fühler dünn, fadenförmig, Kolbe fast cylindrisch, stumpf, 14 bis 16 gliederig, ein Drittel bis ein Viertel der Fühlerlänge einnehmend (Ausnahmen von dieser Beschaffenheit machen *Lucina*, *Betulae* und *Quereus*). Sie sind von mittlerer Länge oder darunter, entspringen dicht über den Augen, weniger zwischen denselben, als bey den übrigen Gattungen.

*Arion*, *Acis*, *Cyllarus*, *Damon*, *Corydon*, *Argiolus*, *Alexis*, *Aegon*, *Amyntas*, *Hylas*, *Virgaureae*, *Phlaeas*, *Chryseis*, *Rubi* (29 Glieder), *Ilcis* mit 30 bis 36 Gliedern. —

*Lucina*: Kolbe dick, fast halb so breit als lang, 12 gliederig. *Fühler*, 39 gliederig.

*Quereus*: die Fühler 34 gliederig, verdicken sich, ohngefähr von der Mitte an, allmählich nach oben.

*Betulae*: F. 43 gliederig, von der Wurzel bis zur Spitze gleichmäßig sich verdickend und stumpf endigend.

### Gen. *Papilio*.

Fühler kaum mehr als halb so lang als der Körper, mit einigen und dreißig, ein wenig zusammengebrückten und in den Gelenken angeschwollenen Gliedern, enigden in eine verkehrt eiförmige Kolbe, die über 5mal so lang als dick ist. Sie sind ganz von Schuppen entblößt.

*Machaon*, *Podalirius*.

### Gen. *Doritis*.

Fühler unter halber Körperlänge; das letzte Drittel bildet

eine starke, stumpfe Kolbe, deren Endglied ein feines, kurzes Spitzchen bildet.

#### Apollo 30 Glieder.

##### Gen. Pontia.

Fühler dünn, fadenförmig (bis auf *Crataegi*), 28 bis 36 gliederig, endigen in eine 8 bis 11gliederige Kolbe. Sie sind von mittler Länge oder darunter.

Bey *Brassicæ* (36 Glieder), *Rapæ* (28 Glieder), *Napi*, ist die Kolbe dünn, stumpf, 8 bis 9gliederig.

Bey *Daphnicæ* (31 Glieder), *Cardamines* (28 Glieder) und *Sinapis* (28 Glieder), dicker, eiförmig, 10 bis 11gliederig; bey *Sinapis* die 2e Hälfte kegelförmig.

*Crataegi* hat von der Wurzel an sich verdickende, in eine dünne Kolbe auslaufende Fühler, deren Glieder in den Gelenken ein wenig angeschwollen sind; 31 Glieder.

##### Gen. Colias.

Die beyden Familien, welche nach *Dshenheimer* diese Gattung bilden, möchten wohl als besondere Genera zu trennen seyn, da ihr ganzer Bau, die Flügelgestalt und der Kopf insbesondere, charakteristische Verschiedenheiten zeigt. Dieß bestätigt sich bey den Fühlern. Ich konnte nur *Hyalæ* und *Rhamni* untersuchen; ohne Zweifel stimmt aber die ganze Fam. A. mit *Hyalæ* überein.

*Hyalæ*. Fühler fadenförmig, 28gliederig, kaum halb so lang als der Körper, mit länglicher, fast cylindrischer, 9gliederiger Kolbe, die wie abgeschnitten endigt, indem das letzte Glied von vorn eingebrückt ist. Eben so führt jedes Kolbenglied an der innern Seite ein rundliches Grübchen.

*Rhamni*. Die Fühler, unter halber Körperlänge, verdicken sich von der Wurzel an und bilden eine verkehrt kegelförmige, abwärts gebogene Keule. Eindrücke sind nicht zu bemerken.

##### Gen. Hesperia.

Fühler halb so lang als der Körper, 27 bis 37gliederig, fadenförmig, mit spindelförmiger, am Ende mehr oder weniger nach außen gebogener, 14 bis 19gliederiger Kolbe, die ohngefähr ein Drittel des Fühlers einnimmt. An der äußern Seite der Fühlerwurzel ein langes, absteigendes Borstenbüschel.

*Malvarum* 33 Glieder. Kolbe 18gliederig. — *Tages* 37 Gl. Kolbe 19gliederig. — *Alveolus* 31 Gl. Kolbe 15gl. — *Paniscus* 27 Gl. Kolbe 14gl. — *Linea* 31 Gl. Kolbe 17gl. — *Lineola*, ebenso. — *Actæon* 29 Gl., Kolbe 15gl. — *Sylvanus* hat eine 18gliederige, starke Kolbe, deren Endglieder ein spitziges, zurückgebogenes Häkchen bilden. Ebenso *Comma* mit 15gliederiger Kolbe.

## II. Dämmerungschmetterlinge.

Die Fühler sind stark, verdicken sich von der Wurzel an allmählich, erreichen über der Mitte meistens ihre größte Stärke und laufen von da mehr oder weniger spitz zu; seltener endigen sie stumpf. Zuweilen sind sie fast fadenförmig. Die

Rückseite ist mit Schuppen bedeckt, die Bauchseite nackt. Das Wurzelglied ist kurz und unter den Kopfschuppen versteckt. Die einzelnen Glieder sind breiter, oder wenigstens eben so breit als lang. Ihre Anzahl beträgt 35 bis 60. Die Fühler sind bey den beyden Geschlechtern, die Gattung *Zygaena* ausgenommen, immer deutlich verschieden.

##### Gen. Atychia.

Die Fühler ohngefähr um ein Drittel kürzer als der Körper, ihre Glieder gleichlang und breit; sie entspringen über den Augen, verdicken sich nach oben und endigen keulenförmig. Beym Manne führen sie an der Bauchseite 2 Reihen nach unten gerichteter, kurzer, am Ende etwas verdickter, sonst, wie gewöhnlich, fadenförmiger und fein behaarter Kammzähne, die in ein borstenförmiges Spitzchen endigen. An dem aus den 9 letzten Gliedern bestehenden kolbigen Ende des Fühlers fehlen sie. Der weibliche Fühler entbehrt sie ganz, und ist nur an der Kolbe unterwärts schwach gezähnt.

*Statives*, 55 Glieder.

##### Gen. Zygaena.

Ursprung und Länge der Fühler wie bey *Atychia*. Sie sind stark, verdicken sich allmählich in eine am Ende stumpfe oder zugespitzte, etwas nach außen gebogene Kolbe. Beym Manne sind sie nur ein wenig stärker als beym Weibe. Die Glieder etwas breiter als lang.

*Minos*, 36 Gl. — *Meliloti*, 35 Gl. — *Filipendulae*, 42 Glieder.

##### Gen. Sesia.

Die Fühler entspringen zwischen dem obern Theile der Augen, und erreichen nicht zwey Drittel der Körperlänge. Sie verdicken sich allmählich und spizen sich am Ende wieder scharf zu. Das letzte, etwas absteigende, kleine, kegelförmige Glied trägt meistens ein Büschel feiner Borsten. Die männlichen Fühler sind entweder geblättert, die Blätter breit, fein behaart (*apiformis*); oder nur ganz schwach unterwärts gefeibt, und fein behaart (eigentlich undeutlich gebartet), wie bey *tipuliformis*, oder gekämmt, wie bey *hyalæformis*. Bey dieser Art sind die Kammzähne kurz, wie gewöhnlich fein behaart und fadenförmig, zusammengeneigt, verlieren sich gegen die Spitze des Fühlers, welche eine aus den letzten 6 bis 7 Gliedern bestehende, zugespitzte, fein behaarte Kolbe bildet, deren Endglied kein Borstenbüschel trägt. Auch dem Weibe fehlt es. Die weiblichen Fühler ohne Vorsprünge und Behaarung.

*Apiformis*, 57 Glieder. — *Tipuliformis*, 44 Glieder. — *Hyalæformis*. —

Bey den nun folgenden Gattungen entspringen die Fühler, durch die breite Stiele getrennt, über den Augen. Bey den Männern sind sie prismatisch, die flachen Seiten deutlich gebartet und unten durch eine scharfe Kante getrennt. Die äußersten Glieder des Fühlers sind dünn, zugespitzt und zurückgeboogen, das letzte nadelförmig, mit einigen feinen Härchen (außer bey *Smerinthus*). Die weiblichen Fühler unterscheiden sich durch den Mangel der Behaarung, auch sind sie weniger deutlich, oder gar nicht prismatisch.

### Gen. *Macroglossa*.

Die Fühler stark, bilden eine dicke Keule, mit kurzem, feinem, stark zurückgebogenem Endhäkchen, das aus den 6 letzten Gliedern besteht.

*Bombyliiformis*, 48 Glieder. — *Stellatarum*, 48 Gl.

### Gen. *Deilephila* und *Sphinx*.

Die Fühler erreichen kaum über ein Drittel der Körperlänge oder bleiben darunter, verbiegen sich weniger auffallend nach oben, bleiben zuweilen fast fadenförmig, wie bey *Sph. ligustri* fem. Das Endhäkchen bildet sich weniger auffallend bey *Deil. porcellus*, *Elpenor*, *Sphinx pinastri*, *ligustri*, 55 bis 60 Glieder.

*Deil. Elpenor*, 60 Glieder. — *Porcellus*, 56 Gl. — *Galii* und *Euphorbiae*, 53 Glieder.

*Sph. pinastri* und *ligustri*, 56 Gl. — *Convolvuli*, 60 Gl. Bey *Pinastri* endigen die Fühler in eine dünne, mit Haaren oder dünnen Schuppen besetzte Borste.

### Gen. *Acherontia*.

Fühler bey beiden Geschlechtern prismatisch, nur an der Wurzel dünner, sonst gleichstark, erreichen noch nicht den vierten Theil der Körperlänge. Die hakenförmige Spitze endigt in eine lange, beiderseits federartig behaarte Borste.

*Atropos*, 42 Glieder.

### Gen. *Smerinthus*.

Die Fühler nach oben kaum verdickt, am Ende etwas zugespitzt und zurückgebogen, doch ohne einen deutlichen Haken zu bilden und ohne Haarbüschel an der Spitze. Die Glieder sind ziemlich gleich lang und breit, bey dem Manne stark gebartet, bey *ocellata* stumpf gezähnt. 40 bis 50 Glieder.

## III. Nachschmetterlinge.

Die Form der Fühler ist, abgesehen von den häufig vorkommenden Seitenverlängerungen der Glieder, die borsten- oder fadenförmige, mit wenigen Ausnahmen. Diese sind die zusammengebrückten Fühler im Gen. *Kymatophora* und mehrerer Spanner, dann die männlichen Fühler im G. *Brephos*. Sonst ist überall das Wurzelglied (oder auch die beyden ersten Glieder) das dickste von allen und etwas gewöhnlich um das Doppelte länger als die folgenden. Es entpringt fast immer über den Augen. Die beyden Geschlechter sind, wo nicht an der Gestalt des Schaftes, so doch an seiner Behaarung zu unterscheiden.

### 1. Spinner.

Die Fühler kürzer als der halbe Körper, bey dem Manne gekämmt, geblättert, gezähnt oder einfach. Ausnahmen in bezug der Hinsicht machen das Gen. *Lithosia*, einige Arten der G. *Euprepia* und *Psyche*. Die Anzahl der Glieder übersteigt nicht 60.

### Gen. *Saturnia*.

Die Länge der Fühler übersteigt nicht ein Drittel der

Körperlänge. Sie sind nackt, dreißig gekämmt. Die Kammzähne entspringen von der Rückseite des Schaftes, 4 von jedem Gliede, das eine Paar etwas höher, das andere etwas tiefer. Beym Manne sind sie sehr lang, zu beyden Seiten ausgebreitet und etwas aufwärts gebogen, bey dem Weibe sehr kurz, nackt, zum Theil bloße Zähne.

*Spini*, 26 Glieder. Der weibliche Fühler an der innern Seite mit kürzern Kammzähnen als an der äußern; von den beyden Paaren jedes Gliedes überhaupt das höher entspringende viel kürzer als das tiefere.

*Carpini*, 25 Glieder. Die untern Kammzähne bey dem Manne etwas länger als die höher entspringenden, mit einem schiefen Haarbüschel an der Spitze. Die Kammzähne des weiblichen Fühlers noch kürzer als bey *Spini*, die höher entspringenden bloße Zähne.

### Gen. *Aglia*.

Wie *Saturnia*. Das Weib an jedem Gliede nur mit einem scharfen Zahne, mit einem Börstchen am Ende. Bey dem Manne sind die Fühler fast halb so lang als der Körper. Von den beyden Paaren der Kammzähne jedes Gliedes ist das obere, vom Ende des einen Gliedes entspringende, viel kürzer und dünner, als das ganz dicht darunter, aber schon vom Anfange des folgenden Gliedes, entspringende, tiefere. Letzteres ist kolbig, mit 2 gabelförmig gestellten Endbörstchen.

*Tau*, 41 Glieder.

### Gen. *Harpyia*.

Die Fühler von einem Drittel der Körperlänge, mit 2 Reihen (wie gewöhnlich von der Bauchseite entspringender), stark zusammengeneigter; bey dem Manne länger, bey dem Weibe kürzer und zugespitzter Kammzähne. Bey *Fagi* mas die 16 Endglieder ungekämmt, bey dem Weibe der ganze Fühler.

*Vinula*, 50 Glieder. — *Bifida*, *Furcula*, 44 Glieder. — *Fagi*, 50 Glieder.

### Gen. *Notodonta*.

Fühler bey dem Manne gekämmt (außer *Camelina*), die Kammreihen mehr oder weniger, doch nie stark, zusammengelegt, werden gegen die Spitzen viel kürzer oder hören auf, ohne sie zu erreichen. Die weiblichen Fühler schwächer gekämmt, gezähnt oder einfach; im letztern Fall mit einzelnen, sehr kleinen Börstchen und Härchen.

Bey *Ziczac*, *Dromedarius*, *Tritophus*, *Tremula* sind die männlichen Fühler kurz gekämmt, die Kämme gegen die Wurzel länger, gegen die Spitze allmählich abnehmend und diese nicht erreichend; die weiblichen Fühler von *Ziczac* (45 Glieder) gezähnt, von *Dromedarius* (52 Gl.) und *Tremula* (gegen 60 Gl.) einfach, fadenförmig.

Bey *Dictaea* und *Dictaeoides* (45 Gl.) sind die Kammreihen mittellang, mehr zusammengeneigt und laufen bis zur Spitze; bey dem Weibe kurz, nackt, zugespitzt.

Bey *Dodonaea* und *Chaonia* (53 Gl.) sind die männ-

ischen Fühler wie bey *Dictaea*; die weiblichen wie bey *Tremula*.

**Palpina:** Fühler ziemlich lang, bis zur Spitze gekämmt; Kammzähne zusammengeneigt, mit dünnen, unbehaarten, mit einem geraden Wölkchen versehenen Enden. Weibliche Fühler ebenso, nur die Kammzähne viel kürzer und unbehaart. 41 Glieder.

**Camelina.** Die männlichen Fühler unterwärts stark gekerbt, die Verästelungen gekerbt; die weiblichen sehr schwach gekerbt mit mikroskopischen Furchen. 40 Glieder.

#### Gen. *Cossus*.

**Ligniperda.** Fühler über 3mal kürzer als der Körper, geblättert; die Kamellen nackt, beim Manne breit, abgerundet, beim Weibe kürzer und schmaler. 60 Gl.

**Aesculi.** Mann: Fühler sehr kurz, bis zur Hälfte gekämmt, Kammzähne wenig geneigt, lang, etwas kolbig, und wie der Schaft, unterwärts mit feinem Wollenhaar bekleidet; die äußere Hälfte ungekämmt, die Glieder derselben unregelmäßig rundlich, abgeplattet, wie beim Weibe. Die Fühler des Weibes kaum von einem Fünftel der Körperlänge, in der Wurzelhälfte mit dichter Wolle bekleidet, die Spitze fast schnurformig. 40 Glieder.

#### Gen. *Hepiolus*.

Fühler kaum länger als der Kopf, entspringen zwischen den Augen; bey beyden Geschlechtern gleichgeformt.

**Humuli.** Fühler nackt, faden- oder fast schnurformig, nur mit einzelnen, kurzen Härchen besetzt; die beyden ersten Glieder verdickt; beim Weibe 20gliedrig, beim Manne 18 gliedrig.

**Sylvinus.** Fühler oberwärts beschuppt, geblättert; die Blättchen schmal, sehr fein und kurz behaart. 21 Gl.

#### Gen. *Lithosia*.

Fühler um ein Drittel kürzer als der Körper, ihre Glieder länger als breit. Die Behaarung besteht aus deutlichen einzelnen Wölkchen und mehr oder weniger deutlichen, feinen, ziemlich dichtstehenden Härchen auf der Bauchseite des Schaftes. Letztere sind beim Weibe kürzer, oder fehlen fast ganz; von den Wölkchen stehen nicht, wie beim Manne, nur 2 an jedem Gliede, sondern 3 bis 4; auch sind sie schwächer.

**Quadra,** 54 Glieder. — **Griseola, Complana, Luridcola, Eborina, Depressa, Aureola, Helveola,** 40 bis 50 Gl. Der Mann von *Helveola* hat zahnförmige Vorsprünge der Glieder, welche lange, vorwärts gekrümmte Borsten und einzelne behaarte, kegelförmige Spigchen tragen.

Beim *Rosea* (37 Glieder) und *Irrorea* (33 Gl.) sind die Glieder oben deutlicher angeschwollen, Wölkchen und Behaarung stark. Beides sehr schwach bey *Rubricollis* (39 Glieder).

#### Gen. *Psyches*.

**Pulla.** Mann: Fühler etwas länger als der halbe Kör-

per, ihre einzelnen Glieder viel länger als dick, gekämmt; Kammzähne etwas geneigt, fadenförmig, fein behaart. 19 Glieder.

**Plumella:** wie *Pulla*.

**Nitidella?** Mann: wie *Pulla* Weib mit äußerst kurzen, nackten, fast schnurformigen Fühlern.

**Hirsutella?** Mann: wie *Pulla*; das Wurzelglied lang behaart, dick; Kammzähne lang, geneigt, am Ende spitz, gegen 30gliedrig. Weib fühllos.

**Pseudobombycilla.** Mann: Fühler fast so lang als der Körper, schwach unterwärts gekerbt; absteigend, etwas büschelig behaart, über 30gliedrig. Die Glieder nicht viel länger als dick, die beyden ersten verdickt.

Weib: Fühler über 3mal kürzer als der Körper, die Wurzelglieder ebenfalls verdickt, sonst fadenförmig, nackt.

#### Gen. *Liparis* und *Orgyia*.

Die Fühler bey beyden Geschlechtern mit 2 Reihen stark zusammengeneigter Kammzähne, welche nur an der äußersten Spitze des Schaftes aufhören (außer bey *Lip. auriflua*). Die Kammzähne beim Manne sehr lang, am Ende einerseits mit einem Spigchen, anderseits mit einem oder zwey ziemlich langen, scharfen, rückwärts gerichteten Wölkchen. Die Kammzähne des Weibes sehr kurz, unbehaart, am Ende mit einem oder zwey geraden Wölkchen. *Org. gonostigma* hat nur scharf gezähnte, auf der Rückseite lang behaarte Fühler.

Eine Endborste: *Monacha, Salicis*, 45 Gl.

Gabelförmig gestellte Endborsten: *Auriflua*, 37 Gl.,

*Org. pubibunda, Fascelina*, 45 Gl., *Antiqua*, 29 Glieder.

*Org. coryli.* Diese Art wird wohl schwerlich ihren jetzigen Platz behalten können, da sie sich durch zu wesentliche Eigenheiten von den übrigen Arten des *G. Orgyia* trennt. Ihre Fühler sind von halber Körperlänge, 50gliedrig; beim Manne mit 2 Reihen zusammengeneigter, mittellanger, etwas kolbiger, mit einem geraden Endborsten versehenen Kammzähne. Die weiblichen Fühler einfach fadenförmig, mit einzelnen, kurzen Wölkchen.

#### Gen. *Pygæra*.

Die Fühler höchstens von einem Drittel der Körperlänge, bis zur Spitze gekämmt, die Kammzähne stark zusammengeneigt, beim Manne in der Wurzelhälfte größer, ziemlich lang, beim Weibe kurz, nackt.

**Reclusa,** 36 Gl. — **Cartula,** 43 Gl.

**Bucephala** (die, wie auch *Daphne* zugibt, vom *G. Pygæra* getrennt werden mußte) hat im männlichen Geschlechte stark unterwärts gekerbte Fühler, deren Vorsprünge sehr stark gebuchtet sind, fast wie bey *Smer. ocellata* mas; ihre Spitze bleibt einfach borstenförmig. Die weiblichen Fühler einfach fadenförmig. 45 Gl.

#### Gen. *Gastropacha*.

Fühler über dem vordern Theile der Augen eingelenkt,

bey beyden Geschlechtern mit 2 stark zusammengeneigten, bis zur Spitze hinaufgehenden Kammerreihen, die beim Weibe kürzer sind.

**Betulifolia**, 34 Glieder. Kämme beim Manne mittellang, beim Weibe sehr kurz, nackt. — **Quercifolia**, 45 Kämme bey beyden Geschlechtern mittellang. — **Potatoria**, 60 Gl., Kammerzähne des Mannes sehr lang, beim Weibe kurz, bey beyden oben folbig, mit einer vorwärts gerichteten Endborste. **Rubi**, **Qercus**, 57 — 58 Gl., Kämme des Mannes wie bey **Potat.**; etwas länger, des Weibes sehr kurz, stark, fadenförmig. — **Populi**, Kämme des Mannes fadenförmig, des Weibes sehr kurz, 52 Gl.; ähnlich bey **Lanestris** (52 Gl.). — **Crataegi** (ohngefähr 40 Gl.), **Neustria** (ohngefähr 35 Gl.). Bey **Neustria** mas sind die Kammerzähne folbig.

Bey **Processionea** sind die Fühler mehr älter dem hinteren Rande der Augen eingelenkt, fast halb so lang als der Körper, beim Manne mit 2 Reihen mäßig zusammengelegter, fadenförmiger Kämme, die sich gegen die scharfe Fühler Spitze mehr, als bey den übrigen Arten verkürzen.

### Gen. *Euprepia*.

Die Fühler entweder einfach borsten- oder fadenförmig, bey beyden Geschlechtern und mit einzelnen schwachen Borstchen (bey **Fuliginosa** mas außerdem mit feinen Härchen) besetzt — so bey **Jacobaeae** (41 Gl.), **Hera**, **Dominula** (50 — 52 Gl.), **Fuliginosa** (37 Gl.) — oder, beim Manne, mit 2 zusammengeneigten Reihen kaum mittellanger, mit einem geraden Endborstchen versehenen Kammerzähne; beim Weibe gezähnt, die Zähne mit abwärts gerichteten Endborstchen, — bey **Caja** (57 Gl.), **Plantaginis** und **Russula** (44 Gl.), **Menthastri**, **Lubricipeda**, **Mendica** (44 Gl.). Die Kämme von **Russula m.** sind auf der Rückseite beschuppt.

## 2. C u l e n.

Die Fühler stets über den Augen eingelenkt, länger als der dritte Theil des Körpers, im Mittel etwas mehr als halb so lang als dieser. Die Dicke der einzelnen Glieder übertrifft fast immer deren Länge, oder ist ihr gleich. Die Anzahl der Glieder beträgt nicht unter 50 (die Gen. **Anarta** und **Anthophila** ausgenommen). Die männlichen Fühler sind borstenförmig, zusammengedrückt, unterwärts gekerbt, gezähnt oder gekämmt, sehr selten geklättert; häufig zeigen sie durch eine auf der Mitte der Bauchseite herablaufende, erhabene Längslinie eine Annäherung zur prismatischen Form. Die einfach borstenförmigen Fühler sind entweder nur mit einzelnen Borstchen versehen oder fein behaart. Die gezähnten, unterwärts gekerbten und die etwas prismatischen Fühler, — wenn sie durch geringe Verdickungen der Glieder an ihrem obern Ende den gezähnten sich nähern, — sind meistens gebartet. Sehr selten sind gekämmte Fühler, außerdem noch unterwärts gekerbt, wie bey **Had. leucophaea**. Die weiblichen Fühler sind meistens einfach borstenförmig; gezähnt bey gekämmten Fühlern des Mannes, selten gekämmt, zusammengedrückt oder unterwärts gekerbt. Ihre Behaarung besteht fast immer nur aus einzelnen Borstchen.

Anmerkung. Die Zählung der Glieder ist bey den Fühlern 1838. Heft 4.

lern der Culen so schwer, daß Irrthum um einige Glieder kaum zu vermeiden ist. Man darf daher die angegebenen Zahlen bey den einzelnen Arten nur als die ohngefähre Menge derselben ansehen. Ein Gleiches gilt für die folgenden Horden.

### Gen. *Acronycta*.

Fühler unter mittler Länge, bey beyden Geschlechtern einfach borstenförmig, mit kaum sichtbaren einzelnen Borstchen, besonders gegen die Spitze.

**Leporina**, 55 Glieder, — **Aceris**, 60 Glieder, — **Megacephala**, 64 Gl., — **Alni**, 65 Gl., — **Ligustri**, 64 Gl., — **Tridens**, 55 Gl., — **Psi**, 60 Gl., — **Rumicis**, 56 Gl. —

### Gen. *Diphthera*.

**Orion**. Fühler unter mittler Länge, beim Manne ganz kurz und fein behaart. Die Borstchen fehlen beyden Geschlechtern fast ganz. Ohngefähr 50 Gl.

### Gen. *Kymatophora*.

Die Fühler nur an der Wurzel cylindrisch, dann zusammengedrückt, so daß sie im mittlern Theile am breitesten erscheinen. Gegen die Spitze werden sie schmaler, ohne die zusammengedrückte Form ganz zu verlieren. Die schmale Rückseite und der cylindrische Wurzeltheil sind beschuppt, der größere übrige Theil nackt, nur mit dem mikroskopischen Flaume bedeckt. Die weiblichen Fühler sind weniger stark zusammengedrückt als die männlichen, nähern sich der Cylindrerform mehr an.

**Flavicornis**, 60 Gl. — **Xanthoceros**, 70 Gl. — **Or**, 60 Glieder.

Bey **Fluctuosa** mas sind die Fühler unter mittler Länge, der Schaft etwas zusammengedrückt, doch weniger stark als bey den vorigen Arten, in der Mitte dünner als an der Wurzel, gegen die Spitze ziemlich cylindrisch; oben mit Schuppen bedeckt, unten kurz und fein behaart. 55 Gl. Beim Weibe sind sie fast einfach borstenförmig, mit kaum sichtbaren Borstchen gegen die Spitze. Ebenso bey **Bipuncta**.

### Gen. *Episema*.

**Caeruleocephala**. Fühler mittellang, beim Manne mit 2 Reihen zusammengeneigter, mittellanger Kammerzähne; beim Weibe nur gezähnt.. 53 Gl.

### Gen. *Agrotis*.

Fühler über mittellang, wenigstens 70 gliederig; beim Manne bis zur Hälfte oder bis zum letzten Drittel kurz gekämmt oder stark gezähnt; die Zähne gebartet. Das letzte Drittel nur mit einzelnen Borstchen, wie der weibliche Fühler.

Fühler gekämmt: **Suffusa**, **Segetum** (70 Gl.).

Fühler gezähnt: **Obeliscus** (72 Gl.), **Exclamationis** (78 Glieder).

**Tenebrosa** mas hat bis fast zur Spitze gekämmte Fühler.  
19\*



ler von mittler Länge, 57 Glieder. Die Kammerzähne mittellang, zusammengeneigt.

### Gen. *Amphipyra*.

Fühler mittellang, bey beyden Geschlechtern nur mit einzelnen schwachen Börstchen.

*Tragopogonis*, 70 Gl. — *Pyramidea*, 68 Gl.

*Typica* fem. hat einfache Fühler, fast ohne Börstchen und Härchen.

### Gen. *Noctua*.

Fühler mittellang, bey dem Manne mit kurzer und feiner Behaarung, die gegen die Spitze abnimmt, an welcher schwache Börstchen sichtbar werden. Der weibliche Fühler nur mit einzelnen Börstchen.

*C. nigrum*, *Plecta*, 50 bis 60 Glieder. —

Bey *Augur* mas sind die Fühler mit kürzern Haaren, und deutlichen Börstchen dazwischen, versehen.

### Gen. *Triphaena*.

Fühler mittellang, einfach borstenförmig, mit schwachen Börstchen; ohngefähr 70gliederig.

*Comes*, *Pronuba*, *Fimbria*.

### Gen. *Hadena*.

Fühler mittellang oder ein wenig darüber, bey dem Manne (bis auf die Arten mit gekämmten Fühlern), etwas prismatisch und deutlich gefeibt, oder mehr unregelmäßig behaart, bis gegen die nur mit einzelnen Fühlerglieder in der Mitte ein wenig verdickt, und nähern sich dadurch der stumpf gezähnten Form; bey *Adusta* sind sie wirklich gezähnt und zugleich unterwärts gefeibt. Bey dieser Art, sowie bey *Protea* sind die Fühler deutlich gebartet, bey den übrigen ist die der Bartform eigenthümliche Stellung der Härchen weniger bemerklich. Der weibliche Fühler ist wie gewöhnlich nur mit einzelnen Börstchen besetzt.

*Dentina*, 60 Glieder. — *Glaucæ*, ohngefähr 65 Gl. — *Adusta*, 72 Gl. — *Thalassinæ*, gegen 70 Gl. — *Protea*, 60 Gl. — *Genistæ*. — *Couversgens*, 58 Gl. — *Atriplicis*, fem., 66 Gl.

*Popularis*. Fühler des Mannes bis zur Spitze gekämmt; Kammerzähne mittellang, zusammengeneigt, mit einem kleinen, geraden Endbörstchen. 58 Gl.

*Leucophaea*. Fühler des Mannes, wie bey *Popularis*, gekämmt, Kammerzähne kürzer, reichen nicht ganz bis zur Spitze. Dabey ist der Schaft stark unterwärts gefeibt. Die weiblichen Fühler schwach gezähnt. 62 Gl.

### Gen. *Phlogophræ*.

*Meticulosa*. Fühler wie bey den *Hadena*-Arten, *Dentina* etc., geformt und gebartet. Einige und 60 Gl.

*Lucipara* fem. Gewöhnliche Fühler.

### Gen. *Misela*.

*Oxyacanthæ*. Fühler des Mannes geflügelert; die Blättchen stark, abgerundet, kurz, behaart. Die Fühler des Weibes nur unterwärts gefeibt. Gegen 70 Gl.

*Aprilina*. Fühler wie bey *Had. dentina* etc. Gegen 70 Glieder.

### Gen. *Polia*.

*Dysodea*. Fühler des Weibes mit schwachen, einzelnen Börstchen. Einige und 50 Gl.

*Flavicincta*. Fühler des Mannes stumpf gezähnt und stark gebartet. 60 bis 70 Gl.

*Saliceti*. Fühler des Mannes gekämmt, bis auf das letzte, nur mit einzelnen Börstchen besetzte Drittel. Die Kammerzähne kurz, wenig zusammengeneigt. Einige und 50 Gl.

*Tincta*. Fühler des Weibes mit einzelnen Börstchen. Gegen 70 Gl.

*Nebulosa*. Fühler des Mannes unterwärts gefeibt, mit sehr kurzen, nicht deutlich bartförmig gestellten Härchen, aber starken, einzelnen Börstchen zwischen denselben. Weib gewöhnlich.

### Gen. *Apamea*.

*Nictitans*. Fühler des Weibes mit einzelnen Börstchen; 50 und einige Gl. —

*Didyma*. Mann: Fühler sehr schwach unterwärts gefeibt, mit einzelnen Börstchen und kürzern Haaren dazwischen. Weib: wie *Nictitans* fem.

*Latruncula*. Die männlichen Fühler unterwärts deutlich gefeibt und fein behaart; 50 Gl. — *Strigilis*, wie *Latr.*, weniger deutlich gefeibt.

*Basilinea*. Fühler wie bey *Had. Dentina* etc.; 60 und einige Gl. — *Infesta*. Weib: Fühler nur mit einzelnen Börstchen.

### Gen. *Mamestra*.

*Pisi*. Fühler des Mannes unterwärts gefeibt und gebartet, des Weibes mit deutlichen einzelnen Börstchen. 50 und einige Glieder.

*Brassicæ*. Fühler wie bey *Had. Dentina* etc.; 50 u. einige Glieder.

### Gen. *Mythimæ*.

*Texta*. Fühler des Weibes mit deutlichen, einzelnen Börstchen. Gegen 70 Gl.

### Gen. *Calpe*.

*Libatrix*. Fühler unter mittler Länge, gekämmt. Die Kammerzähne beginnen etwas von der Wurzel entfernt und verkürzen sich gegen die Spitze zu bloßen Zähnen. Bey dem Manne sind sie kurz, fast borstenförmig, mit einer vorwärts gerichteten Endborste, bey dem Weibe äußerst kurz, nackt, mit starken Endborsten. 50 Gl.



**Gen. Orthosia.**

**Instabilis.** Fühler des Mannes stark gezähnt, die Zähne behaart, oder eigentlich gebartet; des Weibes schwächer gezähnt, mit deutlichen Börstchen. 50 und einige Gl.

**Opima, wie Instabilis. — Rubricosa fem.;** wie **Instabilis** fem.; gegen 60 Gl.

**Munda.** Fühler des Mannes kurz gekämmt, gegen die Spitze nur gezähnt; die Behaarung der kaum geneigten Kammzähne bildet am Ende ein Büschel. 70 Glieder.

**Stabilis.** Fühler des Mannes gekämmt; Kammzähne kaum geneigt, mit Endbörstchen, reichen nicht ganz bis zur Fühlerspitze. Fühler des Weibes scharf gezähnt, mit deutlichen Börstchen und kurzen, feinen Härchen.

**Gothica fem., wie Stabilis f.** 65 Gl. — **Cruda** wie **Stabilis**; weibliche Fühler stumpf gezähnt. — **Miniosa** wie **Stabilis**, Kammzähne ohne Endbörstchen.

**Ypsilön.** Mann: Fühler mit einzelnen schwachen Börstchen und kurzen Härchen dazwischen. Weib nur mit erstern.

**Litura f.** Fühler mit deutlichen einzelnen Börstchen. —

**Macilenta.** Fühler des Mannes unterwärts gefeibt, mit ganz kurzen, kaum bemerklichen Zähnen, lang gebartet; des Weibes nur mit einzelnen, deutlichen Börstchen. 57 Gl.

**Lota.** Mann: Fühler unterwärts gefeibt und stark gebartet; Weib: nur mit starken, einzelnen Börstchen. Ohngefähr 60 Gl.

**Gen. Caradrina.**

**Cubicularis.** Fühler des Mannes ganz kurz und fein behaart, mit schwachen Börstchen; des Weibes nur mit letztern. Gegen 60 Gl.

**Trilinea.** Fühler des Mannes sehr kurz gekämmt, die Spitze ungekämmt; die Kammzähne nicht geneigt, fein und kurz behaart. Fühler des Weibes gewöhnlich. 69 Gl.

**Gen. Leucania.**

**Pallens.** Fühler des Mannes mit starken einzelnen Börstchen und deutlicher Behaarung dazwischen. Derselbe gegen die Spitze abnehmend: des Weibes nur mit einzelnen Börstchen. 60 und einige Glieder. — **Impura fem.** und **Comma fem.** wie **Pallens** fem.

**Gen. Xanthia.**

**Ochroleuca.** Fühler des Mannes wie bei **Car. Trilinea**, die Kammzähne etwas stärker behaart. Fühler des Weibes unterwärts schwach gefeibt, mit einzelnen Börstchen und mikroc. Behaarung. 65 Gl.

Bei den folgenden Arten dieser Gattung sind die Fühler über mittellang, mit kaum merklichen kleinen Zähnen, unterwärts gefeibt und gebartet; sie gleichen denen von **Orth. macilenta**. Die Fühler der Weiber führen, wie gewöhnlich, nur einzelne Börstchen.

**Rufina.** Fühler sehr deutlich und lang gebartet. 76 Gl.

— **Ferruginea. — Aurago**, 60 Gl. — **Citrägo**, 70 Gl. **Cerago**, 70 Gl.

**Gen. Cosmia.**

**Trapezina.** Fühler des Mannes unterwärts schwach gefeibt, mit deutlichen einzelnen Börstchen und ganz kurzer, feiner Behaarung dazwischen. Fühler des Weibes mit einzelnen Börstchen, 62 Gl. — **Retusa fem.** wie **Trap. fem.**; die Börstchen lang; 53 Gl.

**Subtusa fem.** Fühler einfach borstenförmig, mit einzelnen Börstchen und sehr kurzer, feiner Behaarung.

**G. Cerastis.**

**Vaccinii.** Fühler des Mannes mit einzelnen Börstchen und kürzerer Behaarung dazwischen; letztere fehlt dem Weib. 61 Glieder.

**Rubiginea, wie Vaccinii;** die einzelnen Glieder ein wenig angeschwollen, die Behaarung mehr bartförmig. — **Satellitia, wie Vaccinii fem.;** gegen 70 Gl.

**Gen. Xylina.**

**Exoleta, Vesperta, Conformis, Rhizolitha, Petrificata, Oculata:** Fühler des Mannes stark, deutlich gebartet, im letzten Drittel fast nur mit einzelnen Börstchen. Fühler des Weibes nur mit letztern. Gegen 70 Gl.

**Putris.** Schaft und Behaarung schwächer, sonst wie bei den vorigen. Gegen 60 Gl.

**Rurea.** Fühler des Mannes mit einzelnen, schwachen Börstchen, und sehr kurzer, feiner Behaarung; letztere fehlt dem Weib. 61 Gl.

**Polyodon, wie Rurea.** Die Behaarung deutlicher; 72 Gl. — **Lateritia, wie Polyodon.**

**G. Cleophana.**

**Pinastri fem.** Fühler mit schwachen, einzelnen Börstchen. 60 Glieder.

**Linariae.** Fühler des Mannes gezähnt; die Zähne springen sowohl nach beiden Seiten, als nach unten vor, wo sie sich in der Mittellinie zu einer scharfen Kante vereinigen. Sie sind stark gebartet. 55 Gl.

**Gen. Asteroscopus.**

**Cassinia.** Fühler des Mannes gekämmt, bis zur Spitze; Kammzähne kurz, zusammengeneigt. Fühler des Weibes kurz gezähnt. 58 Gl.

**Gen. Cucullia.**

Fühler stark, fast einfach borstenförmig, nur mit dem mikroskopischen Flaume bedeckt, und mit einzelnen, ganz schwachen Börstchen gegen die Spitze; bei beiden Geschlechtern gleich.

**Umbratica, Chamomillae, Scrophulariae;** 82 Gl. — **Lactucae.**

**Gen. *Plusia*.**

Fühler schwach, mit 1'einen Börstchen, und, beim Manne, ganz kurzer, feiner Behaarung.

**Chrysis**, 62 Gl. — **Jota** — **Gamma**.

**Gen. *Anarta*.**

**Myrtili**. Fühler des Mannes unterwärts gekerbt, fein und kurz behaart, mit einzelnen kleinen Börstchen. Fühler des Weibes allein mit letztem. 57 Gl.

**Heliaca**. Fühler fadenförmig, beim Manne äußerst kurz und fein behaart, beim Weibe fast ganz mit Schuppen bekleidet, nur gegen die Spitze an der Bauchseite nackt. 33 Gl.

**Gen. *Heliothis*.**

**Marginata** fem. Fühler schwach, mit den gewöhnlichen einzelnen Börstchen. Längsfahr 70 Gl.

**Gen. *Anthophila*.**

**Aenea**. Fühler fast fadenförmig, bei beiden Geschlechtern fein behaart, beim Weibe schwächer. Die Glieder länger als dick. 37 Gl.

**Gen. *Mania*.**

**Maura**. Fühler des Weibes mit den gewöhnlichen Börstchen. 73 Gl.

**Gen. *Catocala*.**

Fühler beim Manne stark gebartet, gegen die Spitze nur mit einzelnen Börstchen; letztere allein beim Weibe. 80 bis 85 Glieder.

**Fraxini**. — **Nupta**. — **Promissa**.

**Gen. *Brephos*.**

Fühler des Mannes stark, an der Wurzel (das dicke Wurzelglied selbst ausgenommen) etwas dünner. Jedes Glied ist im Gelenke dünner, im übrigen Theile dicker, und hier mit dichten, kurzen abgestuften Haaren, fast borstenförmig bedeckt, welche, nach beiden Seiten vorspringend, dem Fühler das täuschende Ansehen geben, als ob er gezähnt wäre. Fühler des Weibes einfach fadenförmig, schwach, in der Wurzelhälfte rings beschuppt, gegen die Spitze mit einigen ganz kurzen Härchen am Ende jedes Gliedes. 50 Gl. **Parthenias**.

**Gen. *Euclidia*.**

**Glyphica**. Fühlerglieder länger als dick; beim Manne sehr schwach unterwärts gekerbt, fein behaart; beim Weibe fast einfach fadenförmig, in der Wurzelhälfte rings beschuppt, gegen die Spitze mit äußerst kurzen Börstchen. 56 Gl.

**My**. Wie **Glyphica**. Die Fühler beim Manne etwas deutlicher gekerbt und behaart.

**Gen. *Platypteryx*.**

Diese merkwürdige Sippe, die sich als vollkommenes Insekt den Spannern, als Raupe den Spinnern anschließt, ent-

fernt sich in jeder Hinsicht, und so auch in der Beschaffenheit der Fühler zu sehr von den Eulen, um nicht eine gänzliche Sonderung von ihnen zu verlangen. Die Fühler sind denen der Spanner durchaus analog, halb so lang als der Körper oder länger, ihre Glieder nicht so dick als lang, auf der Rückseite beschuppt, auf der Bauchseite nackt; beim Manne gekämmt, die Kammreihen gegen einander geneigt; beim Weibe kürzer, gekämmt, unterwärts gekerbt, oder fast einfach fadenförmig,

**Spinula**. Fühler des Mannes bis zur Spitze sehr kurz gekämmt; des Weibes: schwach, unterwärts gekerbt. 40 Gl.

**Falcula**. Fühler des Mannes mittellang, des Weibes kurz, gekämmt, die äußerste Spitze ohne Kammzähne. 40 Gl.

**Unguicula**. Kammzähne des Mannes mittellang, lassen das letzte Viertel des Schaftes frey; der weibliche Fühler fast einfach fadenförmig. 40 Gl.

**Lacertula**. Kammzähne des Mannes kurz, oberwärts beschuppt, reichen bis zur Spitze; die des Weibes nur kürzer, nackt, zugespitzt. 35 Gl.

**3. Spanner.**

Fühler von halber Körperlänge oder darüber, 30 bis 70 gliederig; die einzelnen Glieder meistens länger als breit, oder gleich lang und breit.

Die männlichen Fühler gekämmt, gezähnt, unterwärts gekerbt, zusammengedrückt oder einfach fadenförmig, im letztern Falle doch durch größere Stärke und die Behaarung von den weiblichen unterschieden. Gebartete Fühler kommen nicht vor. Die weiblichen Fühler sind meistens einfach fadenförmig, oder gezähnt, selten gekämmt, mit wenig oder keiner Behaarung, dagegen in größerem Umfange, als bei den Eulen, von Schuppen bedeckt. Wo einzelne Börstchen vorkommen, sind sie schwächer und kürzer als bei jenen, entspringen näher beysammen, an der Bauchseite des Schaftes, und sind nach unten gerichtet.

**Gen. *Ennomos*.**

**Flexularia** fem. Fühler mit einzelnen Börstchen und ganz kurzer Behaarung. 49 Gl.

**Adpersaria** fem. Äußerst kurze, einzelne Börstchen. 40 Glieder.

**Notataria**, **Signaria**, **Lituraria**. Fühler beim Manne schwach gezähnt, die Zähne behaart. Fühler des Weibes nur mit kaum sichtbaren Börstchen. 47—50 Gl.

**Emarginaria**. Fühler werden gegen die Spitze sehr dünn, sind beim Manne fein behaart; beim Weibe ohne Härchen. 40 Glieder.

**Advenaria**. Fühler des Mannes bis fast zur Spitze gekämmt; Kammzähne zusammengeneigt, mittellang, mit einem vorwärts gerichteten Endbörstchen. Die weiblichen Fühler nur mit einem Paar Börstchen und einigen kürzern Härchen an jedem Gliede. 38 Gl.

**Parallelaria**. Wie **Advenaria**, nur die Kammzähne ohne Endbörstchen; die Härchen der weiblichen Fühler schwächer.

**Dolabraria.** Die männlichen Fühler gekämmt, die Kammzähne mittellang, zusammengelegt, etwas kolbig, oberwärts beschuppt, erreichen nicht die Fühler Spitze. Die weiblichen Fühler ganz schwach gezähnt. 52 Gl.

**Crataegata.** Fühler zusammengebrückt, beim Manne bedeutender, beim Weibe weniger; die schmale Rückseite beschuppt, der übrige Theil nur mit mikroskopischem Flaume bedekt. 62 Gl.

**Prunaria.** Fühler des Mannes gekämmt, Kammzähne mittellang, zusammengelegt, mit schwachen Endborstchen, erreichen nicht ganz die Spitze. Fühler des Weibes nur mit kurzen einzelnen Borstchen.

**Syringaria.** Fühler bey beyden Geschlechtern bis zur Spitze gekämmt; Kammzähne beim Manne ziemlich lang, zusammengelegt, mit 1 bis 2 vorwärts gerichteten Endborstchen; beim Weibe kurz, nackt mit gabelförmig gestellten Endborsten. 42 Glieder.

**Lunaria, Ilunaria, Illustraria.** Fühler des Mannes bis zur Spitze gekämmt, Kammzähne zusammengelegt, kaum mittellang, mit einem vorwärts gerichteten Endborstchen; die der innern Reihe schwach beschuppt. Fühler des Weibes gezähnt, Zähne spitz, vorwärts gerichtet, mit Endborstchen.

**Angularia, Erosaria, Tiliaria, Alniaria.** Fühler des Mannes gekämmt bis zur Spitze, Kammzähne mittellang, stark zusammengelegt, oberwärts beschuppt, mit kurzen Endborsten; ihre Länge nimmt gegen die Fühler Spitze nur wenig ab. Die weiblichen Fühler stark gezähnt, die Zähne vorwärts gerichtet, spitz wie kurze Kammzähne.

**Dentaria fem.** Fühler unten sehr kurz gezähnt. Gegen 70 Glieder.

**Gen. Acaena.**

**Sambucaria.** Fühler bey beyden Geschlechtern fast ohne Behaarung, nur mit ganz schwachen Borstchen gegen die Spitze; beim Weibe einfach borstenförmig, beim Manne ein wenig stärker, etwas zusammengebrückt.

**Gen. Ellopia.**

**Margaritaria.** Fühler des Mannes gekämmt, Kammzähne unten mittellang, mäßig geneigt, mit ganz kurzen Endborstchen, reichen nicht ganz bis zur Spitze. Fühler des Weibes nur mit kurzen, einzelnen Borstchen. Gegen 50 Gl.

**Fasciaria.** Fühler des Mannes bis zur Spitze gekämmt, Kammzähne über mittellang, mäßig geneigt, mit vorwärts gerichteten, an der äußern Kammreihe gabelförmigen Endborsten. Fühler des Weibes nur mit einzelnen kurzen Borstchen. Gegen 50 Glieder.

**Gen. Geometra.**

**Papilionaria fem.** Fühler nur mit sehr kleinen, einzelnen Borstchen. Gegen 60 Gl.

**Putataria, Aeruginaria.** Fühler des Mannes mit etwas längerem Wurzelgliede als gewöhnlich, bis etwas über die Hälfte

gekämmt, Kammzähne lang, kolbig; die 2te Hälfte, beim Weibe der ganze Fühler, einfach fadenförmig.

**Aestivaria.** Fühler des Mannes stark gezähnt (oder ganz kurz gekämmt), Zähne nach unten gerichtet, behaart, verlieren sich gegen die Spitze. Fühler des Weibes nur mit sehr kleinen einzelnen Borstchen. Gegen 60 Gl.

**Cytisaria.** Mann: Fühler gekämmt, Kammzähne kurz, kolbig, verlieren sich gegen die Spitze. Weib: Fühler sehr kurz gezähnt. 61 Gl.

**Bajularia fem.** Fühler fadenförmig, mit kaum sichtbaren, einzelnen Borstchen und mikroskopischer Behaarung.

**Gen. Aspilates.**

**Purpuraria.** Mann: Fühler gekämmt; Kammzähne zusammengelegt, ziemlich lang, reichen nicht bis zur Spitze. Wurzelglied etwas länger als gewöhnlich. Weib: Fühler fein behaart. 27 Gl.

**Gilvaria.** Mann: Fühler bis zur Spitze gekämmt; Kammzähne stark geneigt, beschuppt. 48 Gl.

**Vespertaria.** Weib: Fühler unterwärts gekerbt, kurz und fein behaart.

**Palumbaria.** Mann: Fühler nicht ganz bis zur Spitze gekämmt; Kammzähne kurz, geneigt, mit geraden Endborstchen. Weib: Fühler mit einzelnen, kurzen Borstchen und sehr kurzer, feiner Behaarung.

**Lineolata.** Weib: Fühler ganz kurz und fein behaart, mit kaum sichtbaren einzelnen Borstchen. 41 Gl.

**Gen. Crocallis.**

**Elinguaria.** Weib: Fühler schwach gezähnt. 62 Gl.

**Pennaria.** Mann: Fühler gekämmt, Kammzähne wenig geneigt, sehr lang, fein, am Ende etwas dünner und nackt, mit einem kleinen Borstchen. Sie nehmen bis zur Fühler Spitze nur wenig an Länge ab. Weib: Fühler gekämmt, Kammz. sehr kurz, auch etwas behaart, an der Wurzel und Spitze des Fühlers kaum merklich. Ein abstehendes Haarpinselchen an der Fühlerwurzel bey beyden Geschlechtern. 52 Gl.

**Gen. Gnophos.**

**Obscurata.** Mann: Fühler unterwärts stark gekerbt, nur mit mikroskopischer Behaarung. Weib: Fühler fast einfach fadenförmig.

**Punctulata.** Mann: Fühler unterwärts schwach gekerbt, mit ziemlich langen seit- und abwärts gerichteten Haaren bis zur Spitze. Weib: Fühler nur mit ganz kurzen, einzelnen Borstchen. 42 Gl.

**Gen. Boarmia.**

**Cinctaria.** Mann: Fühler gekämmt, das letzte Dritte ausgenommen; Kammzähne mittellang, beschuppt, wenig geneigt. Von jedem Gliede entspringt dicht unter dem eigentlichen Kammzahn noch ein viel kürzerer, nackter, borstenförmiger, also im Ganzen 4 von jedem Gliede. Weib: Fühler nur mit kurzen, einzelnen Borstchen. 50 Gl.

**Crepuscularia.** Mann: Fühler unterwärts gekerbt und jedes Glied jederseits mit 2 kurzen Spitzchen, welche ziemlich lange, abstehende Haarpinsel tragen. Weib: Fühler mit ganz kurzen einzelnen Börstchen. 52 Gl.

**Consortaria.** Mann: Fühler gekämmt bis auf ein Fünftel vom Ende; Kammzähne geneigt, lang, zugespitzt, beschuppt. 52 Glieder.

**Abietaria.** Weib: wie *Cinctaria* fem. 53 Gl.

**Repandaria.** Mann: Fühler gekämmt bis auf  $\frac{1}{2}$  vom Ende; Kammz. mäßig geneigt, kurz, mit kleinen Endbörstchen. 52 Glieder.

**Rhomboidaria.** Mann: gekämmt, Kammz. wenig geneigt, mittellang; das letzte Sechstel des Schaftes ungekämmt. Schaft breit beschuppt. Weib: wie *Cinctaria* f. 56 Gl.

**Sociaria.** Mann: wie *Repandaria* m., Kammz. aber etwas beschuppt, ohne Endbörstchen, lassen ein Siebentel des Schaftes frey.

**Secundaria.** Mann: Fühler gekämmt, nur die äußerste Spitze frey. Kammz. lang, fast borstförmig, wenig geneigt, mit 2 kleinen, gabelförmig gestellten Endbörstchen, Schaft breit beschuppt. Weib: wie *Cinctaria* f. etc. 50 Gl.

**Lichenaria.** Mann: Fühler gekämmt, bis zur Spitze; Kammz. beschuppt, mittellang, geneigt, ihre Enden nach und spitz, vorwärts gerichtet. Die weiblichen Fühler ebenfalls mit diesen letzten Spitzchen, die hier nur auf kurzen Zähnen sitzen. 37 Glieder.

**Viduaria.** Mann: Fühler gekämmt, das letzte Sechstel frey; Kammz. mittellang, wenig geneigt, oben etwas beschuppt. Weib wie *Cinctaria* etc. 40 Gl.

**Glabraria.** Mann: F. gekämmt, das letzte Viertel frey; Kammz. etwas geneigt, kurz. Weib: wie *Cinctaria* etc. 44 Glieder.

### Gen. *Amphidasis*.

**Betularia.** Mann: Fühler bis auf das letzte Viertel des Schaftes gekämmt; Kammz. mittellang, kaum geneigt. Weib: Fühler an der Bauchseite kaum merklich gezähnt. 57 Gl.

**Prodromaria.** Mann: Fühler bis zur Spitze gekämmt; Kammz. ziemlich lang, kaum geneigt. Weib: Fühler kurz, aber scharf, gezähnt. 53 Gl.

**Hirtaria.** Mann: Fühler gekämmt, mit freyer Spitze; Kammz. geneigt, lang, zugespitzt. 41 Gl.

**Pilosaria.** Mann: Fühler bis zur Spitze gekämmt; Kammz. etwas geneigt, mittellang, dünn. Weib: Fühler fast einfach fadenförmig, wie gewöhnlich. Dhngefähr 40 Gl.

### Gen. *Fidonia*.

**Hepararia.** Fühler des Mannes schwach unterwärts gekerbt, fein und kurz behaart. Einige und 30 Gl.

**Conspicuararia.** Weib: Fühler scharf, kurz gezähnt. 42 Glieder.

**Pinetaria.** Mann: Fühler gekämmt, mit freyer Wurzel und Spitze; Kammzähne sehr kurz. Weib: Fühler scharf, kurz, gezähnt (und mit den gewöhnlichen mikroskopischen Börstchen und Härchen).

**Piniaria.** Mann: Fühler bis zur Spitze gekämmt; Kammzähne lang, dünn, mäßig geneigt. Weib: Fühler wie bey *Atomaria* fem.

**Atomaria.** Mann: Fühler gekämmt, nur die äußerste Spitze frey; Kammzähne lang, etwas geneigt, dünn, rings beschuppt. Weib: Fühler gewöhnlich (d. h. fadenförmig, mit mikroskopischen, kaum sichtbaren einzelnen Börstchen und Härchen). 30 Gl.

**Clathrata.** Wie *Hepararia*. Gegen 50 Gl.

**Immoraria.** Mann: Fühler unterwärts gekerbt, mit ziemlich langen, abstehenden, pinselförmigen Haaren. Weib gewöhnlich. Gegen 50 Gl.

**Wavaria** wie *Pinetaria*. 50 Gl.

**Pulveraria.** Weib: Fühler kurz, aber scharf gezähnt, mit feinen Börstchen. 43 Gl.

Bei den nun folgenden Arten dieser Gattung (die durch die Flügellosigkeit ihrer Weiber, Bau, Verwandlungsgeschichte und Erscheinungszeit unter sich eng verbunden und von den übrigen geschieden, ein eigenes Genus zu bilden verdienten), sind die männlichen Fühler gezähnt oder kurz gekämmt, die Zähne oder Kammz. mit Haarpinseln an der Spitze, die um so länger sind, je kürzer der Vorprung, auf dem sie sitzen, und umgekehrt. Die Haarpinsel stehen seitwärts vom Schaft ab, und lassen diesen stark gekämmt erscheinen. Die Fühler der Weiber sind einfach fadenförmig, oder ein wenig gezähnt.

**Defoliaria.** Mann: F. sehr kurz gekämmt, mit langen Haarpinseln. Weib: F. fadenförmig, fast ganz beschuppt. Ueber 50 Glieder.

**Aurantaria.** Mann: F. mit längern Kammz. und kürzern Haarpinseln als *Defoliaria*. F. des Weibes schwach gezähnt. 40 Gl.

**Progemmaria.** Wie *Aurant*; Haarpinsel kurz.

**Rupicaprararia** wie *Progemmaria*.

**Leucophaearia** wie *Aurantaria*; Kammz. etwas kürzer. 45 Glieder.

**Aescularia.** Mann: F. kurz gezähnt, die Haarpinsel sehr lang. Dhngefähr 50 Gl.

### Gen. *Chesias*.

**Spartata.** Mann: F. zusammengebrückt und unterwärts gekerbt, fein und kurz behaart. Weib: F. fast fadenförmig, kaum merklich unterwärts gekerbt. Gegen 50 Gl.

**Obliquata** fem. wie *Spartata* fem.

**Variata.** Mann: F. ziemlich stark (ein wenig zusammengebrückt), sehr fein und kurz behaart. Weib: F. gewöhnlich geformt. 50 Gl.

**Juniperata** wie *Variata*. 54 Gl.

### Gen. Cabera.

**Pusaria, Exanthemaria.** Mann: F. gekämmt bis auf das letzte Viertel; Kammzähne mittellang, geneigt, mit vorwärts gerichteten Endborstchen. Weib: nur mit ziemlich langen, einzelnen Borstchen. 40 Gl.

**Sylvestrata.** Mann: F. unterwärts gekerbt, ziemlich lang, etwas büschelig, behaart. Weib gewöhnlich. Ohngefähr 50 Gl.

**Pendularia, Punctaria, Trilineararia.** Mann: F. bis etwas über die Hälfte gekämmt, die 2te Hälfte fadenförmig; Kammz. kurz, geneigt. Weib: gewöhnlich. Pendul. 42 Gl., Punct. u. Trilin. 50 Gl.

### Gen. Acidalia.

**Ochrearia.** Mann: F. bis zur Spitze gekämmt (stark gezähnt); Kammz. sehr kurz, spitz, an jedem Gliede zwey Paar, ein längeres und ein kürzeres; alle mit einem langen, dünnen, wie eine einfache Borste aussehenden Haarbüschel an der Spitze. Weib: F. gewöhnlich, dünn. Ueber 40 Gl.

**Decolorata.** Mann: F. sehr kurz und fein behaart. 47 Glieder.

**Luteata.** Mann: F. kurz und fein behaart. 38 Gl.

**Candidata.** Mann: F. bis zur Spitze unterwärts stark gekerbt und ziemlich lang behaart. Weib: F. unterwärts schwach gekerbt, mit sehr kurzer Behaarung.

**Brumata.** Mann: F. unterwärts deutlich gekerbt, mit ziemlich langer, absteigender, pinselförmiger Behaarung. Weib: gewöhnlich. 39 Gl.

**Dilutata.** Mann: wie *Brumata*, nur etwas schwächer gekerbt und behaart. Weib: gewöhnlich. 42 Gl.

**Bilineata.** Mann: F. kurz und fein behaart. Weib: F. gewöhnlich.

**Hexapterata.** Mann: F. etwas zusammengebrückt, nur mit mikrosk. Flaume bedeckt. Weib: gewöhnlich. 50 Gl.

**Dubitata.** Weib: gewöhnlich.

**Certata.** W.: gewöhnlich. 70 Gl.

**Scabraria.** Mann: F. bis zur Sp. gekämmt; Kammz. kurz, fadenförmig, geneigt. Weib: F. gewöhnlich.

**Elatata.** Mann: F. stark, ein wenig zusammengebrückt, nur mit mikrosk. Flaume. Weib: F. unterwärts kaum merklich gekerbt.

**Blandiata.** Mann: F. fein behaart.

**Undulata.** Mann: F. nur mikrosk. behaart.

### Gen. Larentia.

**Mensuraria, Bipunctaria** (58 Gl.). Mann: F. gekämmt; Kammz. geneigt, kurz, mit geraden Endborstchen, erreichen die Spitze nicht. Weib: F. nur mit ziemlich deutlichen, einzelnen Borstchen.

**Badiata.** Mann: F. unterwärts deutlich gekerbt, fein behaart. Weib: gewöhnlich. 56 Gl.

**Plagiata** (64 Gl.), **Cassata** (78 Gl.). F. ziemlich stark, borstenförmig, kaum merklich behaart; beim Manne etwas deutlicher.

**Psittacata.** F. fast einfach fadenförmig bey beyden Geschlechtern. 57 Gl.

Die folgenden nahe verwandten Arten dieser Gattung haben im männl. Geschlechte etwas stärkere, fein behaarte, im weibl. dünnere, kaum merklich behaarte Fühler.

**Rectangulata** 37 Gl., **Cydoniata, Subumbrata, Innodata, Hospitata** 36 Gl., **Exiguata, Debiliata.**

### Gen. Cidaria.

**Ferrugaria.** Mann: F. bis auf das letzte Viertel gekämmt, Kammz. kurz, geneigt. Weib: gewöhnlich.

**Ocellata.** Mann: F. zusammengebrückt, kurz und fein behaart. 48 Gl.

**Galiata** f. F. gewöhnlich. Einige u. 50 Gl.

**Olivaria.** Mann: F. gekämmt, an der Spitze nur gezähnt; Kammz. sehr kurz, geneigt. Weib: gewöhnlich. 40 Gl.

**Miaria** wie *Oliv.*, die Kammz. etwas länger.

**Populata.** Mann: F. etwas zusammengebrückt, sehr kurz, fein behaart. Weib: F. gewöhnlich.

**Chenopodiata.** Mann: F. unterwärts ganz schwach gekerbt mit mikrosk. Behaarung und kaum merklichen einzelnen Borstchen gegen die Spitze.

**Pyraliata.** Mann: F. ein wenig zusammengebrückt. Behaarung wie bey *Chenopodiata*.

**Achatinata.** Mann: F. gezähnt und unterwärts gekerbt, kurz und fein behaart. Weib: gewöhnlich. Ohngefähr 50 Gl.

**Moeniaria** wie *Lar. Mensuraria*. 49 Gl.

**Fulvata.** Weib: F. gewöhnlich. 50 Gl.

**Russata.** Mann: F. ganz kurz und fein behaart. Weib: gewöhnlich. 47 Gl.

**Derivata.** Mann: F. etwas zusammengebrückt, mit mikrosk. Flaume. Weib: gewöhnlich.

**Suffumata.** Mann: F. stark unterwärts gekerbt, mit absteigender, pinselförmiger Behaarung. 54 Gl.

**Picata.** Mann: F. wie bey *Chenopodiata* (also von *Suffumata* ganz verschieden).

**Prunata.** Mann: F. etwas breitgedrückt, mit mikrosk. flaum. Weib: gewöhnlich. 53 Gl.

**Ruptata.** Weib: gewöhnlich.

**Montanaria.** Mann: F. gekämmt und unterwärts gekerbt; Kammz. kurz, geneigt, reichen nicht bis zur Spitze. Weib: gewöhnlich. 43 Gl.

**Alchemillata** (44 Gl.), **Hastata** (über 50 Gl.), **Tristata** (einige und 40 Gl.), F. des Mannes etwas stärker, mikrosk. behaart; des Weibes gewöhnlich.

### Gen. Zerene.

**Fluctuaria.** Mann: Fühler gekämmt; Kammz. kurz,

geneigt, 4 an jedem Gliede, das eine Paar sehr klein, borstenförmig, mehr an der Bauchseite des Schaftes stehend. Weib: gewöhnlich. 40 Gl.

**Adustata.** Mann: F. ziemlich stark, mit kurzer, feiner Behaarung. 45 Gl.

**Marginata.** Mann: F. schwach unterwärts gekerbt, fein behaart. 41 Gl. Weib: gewöhnliche F.

**Maculata.** Mann: F. wie bey **Chenopodiata**. Weib: gewöhnliche F.

**Grossulariata.** Mann: F. unterwärts gekerbt, kurz u. etwas hüfelig behaart. Weib: F. mit ziemlich deutlichen einzelnen Borstchen. 57 Gl.

### Gen. *Idaea*.

**Vibicaria.** Mann: F. gekämmt, Kamms. mittellang, mäßig geneigt, fadenförmig, dünn. Weib: gewöhnliche F.

**Remutata.** F. des Mannes schwach unterwärts gekerbt, mit absteigender, pinselförmiger Behaarung. Weib: gewöhnlich. Dhngefädr 50 Gl.

**Aversata.** Mann: F. kaum merklich unterwärts gekerbt, kurz behaart. Weib: gewöhnlich. 47 Gl.

**Incanata.** Mann: F. fein gezähnt, mit pinselförmiger Behaarung. Weib: F. ganz schwach gezähnt. 42 Gl.

**Ornata.** Mann: F. stark unterwärts gekerbt, pinselförmig, lang behaart. Weib: Fühler kurz behaart. 48 Glieder.

### **Bisetata.** Wie **Aversata**.

**Scutulata.** Mann: F. sehr dünn, stark gezähnt, jeder Zahn mit einem langen, dünnen Haarpinsel an der Spitze (von **Incanata** und noch mehr von **Bisetata** verschieden). Weib: gewöhnliche Fühler. —

Den Schluß dieser Abhandlung, die Untersuchung der Zünsler, Widler, Schaben und Geißchen enthaltend, muß ich noch zurückhalten, da ich jetzt im Stande bin, die erste Abfassung desselben durch zahlreiche Nachträge zu vervollständigen.

### Ueber das Vorkommen der Nebenaugen (Ocelli).

Auch auf das Vorhandenseyn oder den Mangel der Nebenaugen (Ocelli, Stemmata) haben bisher die systematischen Schriften über Lepidopterologie weniger als billig Rücksicht genommen, und es scheint fast unbekannt zu seyn, daß sie auch außer den Zögänen, Sesien und verwandten Gattungen noch sehr vielen Schmetterlingen zukommen. Dennoch geben Daseyn oder Mangel und Beschaffenheit derselben häufig sehr beachtenswerthe Winke über die Verwandtschaft der Arten und Gattungen. Ich habe sämtliche oben bey Betrachtung der Fühler aufgeführte Arten zugleich in Hinsicht ihrer Nebenaugen untersucht, und theile das Ergebnis als einen Beyptrag zur Kenntniß derselben bey den Schmetterlingen mit.

Was die Untersuchung der Nebenaugen bey den Schmet-

terlingen besonders erschwert, ist ihre versteckte Lage hinter der Fühlerwurzel, wo sie von Kopfschuppen und Haaren rings umgeben sind. Wenn man bey manchen Schmetterlingen die Kopfschuppen entfernt, so entdeckt man nicht selten, auf der Stelle, wo die Nebenaugen stehen müßten, eine kleine, rundliche Erhabenheit, wie es scheint, ein unausgebildetes Nebenaugen (z. B. bey **Lithosia quadra**); so daß vielleicht bey vielen oder allen nicht mit deutlichen, von Schuppen entblößten Stellen versehenen Arten, wenigstens Spuren derselben vorhanden sind, die natürlich zum Sehen nicht dienen können.

Die vollkommenen Nebenaugen, deren bey den Schmetterlingen stets nur zwey vorkommen, liegen hinter der Fühlerwurzel und über dem obersten Rande der großen Augen, meistens näher an letztern, dicht über der Stelle, wo der Rand derselben eine Art vorspringenden Winkel macht, welcher jedoch nicht bey allen Schmetterlingen vorhanden ist. Nur die kleine Stelle, die sie selbst einnehmen, ist gewöhnlich von Schuppen und Haaren entblößt und wo sie sehr klein und die Behaarung des Kopfes stark ist, wie bey **Euprepia caya** u. a., kostet es einige Mühe, die Nebenaugen aufzufinden, ohne die sie verdeckende Haare zu entfernen. Doch ist dieß jedesmal möglich, wenn man den Fühler etwas aufwärts und vorwärts zieht und die Loupe zu Hülfe nimmt. Bey günstigen Verhältnissen sieht man die Nebenaugen ohne Vergrößerung ganz deutlich, wie bey den Sesien, bey **Euprepia Jacobaea**, **Russula** u. a. Sie erscheinen als halbkugelige, vollkommen durchsichtige, meistens hellweiße oder weingelbe Körper, die wie glänzende Tröpfchen auf einer mehr oder weniger vortretenden, häufig tief schwarz gefärbten Erhabenheit sitzen. Diese geringen Unterschiede in der Färbung abgerechnet, macht sich fast nur in der Größe der Nebenaugen eine Verschiedenheit bemerklich. Im Allgemeinen, doch nicht ohne Ausnahmen, sind die einfachen Augen größer, wo die zusammengesetzten klein, kleiner oder ganz fehlend, wo diese groß sind.

Den Tagsschmetterlingen fehlen die Nebenaugen ganz, ebenso den Gattungen **Macroglossa**, **Deilephila**, **Sphinx**, **Acherontia** und **Smerinthus** unter den Dämmerungsschmetterlingen. Bey **Atychia** und **Zygaena** sind sie ziemlich deutlich, noch mehr bey **Sesia**, wo sie ohne Vergrößerung sichtbar sind.

Bey den Spinnern (Gen. **Saturnia** bis **Euprepia Ochsenh.**) kann man im Allgemeinen den Mangel, bey den Eulen (G. **Acronycta** bis **Platypteryx**) das Vorhandenseyn der Nebenaugen als charakteristisch ansehen. Von erstern besitzen nur Nebenaugen: **Orgyia Coryti**, die auch außerdem viel den Eulen Analoges hat, früher von Ochsenheimer ihnen zugesellt war, und jedenfalls nicht natürlich mit den übrigen, enge verbundenen Arten der Gattung **Orgyia** vereinigt ist; — dann mehrere Arten des G. **Psyche**, wie **Pseudobombicylla** und **Tricketrella**; endlich das ganze G. **Euprepia**. Was die Saatträger betrifft, so erscheint ihre Versegung unter die Spinner nur gezwungen und unnatürlich, während sie nach Gestalt und Lebensart der Raupen wie der Schmetterlinge sich so nahe an die Schaben, besonders die Gattung **Adela Treitschke**, anschließen, daß fast lediglich durch die Flügellosigkeit der Weiber ein Unterschied von beider begründet wird. Beym G. **Euprepia** ist es auffallend, daß alle von mir untersuchten (oben bey

Angabe der Fühlerbeschaffenheit aufgeführten) Arten derselben mit Nebenaugen versehen sind, während sie eben so standhaft dem *G. Lithosia*, welches dem *G. Euprepia*, zwar nicht in Schenker's System, aber gewiss in der Natur, am nächsten steht, fehlen. Gerade die dünnleibigen, am Tage fliegenden Euprepia: *Jacobaea*, *Russula*, *Plantaginis*, *Hera*, *Dominula*, besitzen außerordentlich deutliche Nebenaugen, welche denen der Sesien an Größe nichts nachgeben, wogegen die unter den Lithosien ihnen am meisten gleichenden, breitflügeligen Arten, wie *Eborina*, *Irrorea*, keine Spur davon zeigen. Die dickleibigen, nächtlichen Euprepia-Arten, *Caja*, *Fulgiosa*, *Mendica* und die verwandten, haben sehr kleine, unter der dichten und langen Kopfbehaarung fast verborgene Nebenaugen, welche ohne Entfernung jener nur bei günstiger Beleuchtung sichtbar sind.

Die Dellen der Eulen sind meistens klein, doch ziemlich leicht mit der Loupe zu finden. Sie sitzen, bei getrockneten Exemplaren, als hellweiße Tröpfchen auf einer schwarzen Erhabenheit. Von ansehnlicher Größe finden sie sich bei den Gattungen *Anarta*, *Anthophila* und *Euclidia*. Gänzlich fehlen sie der Gattung *Platypteryx*, die nicht hierher gehört, und bei *Brephos Parthenias*. *Episema caruleocephala*, ein Mittheilung von Spinner und Eule, scheint keine Nebenaugen zu besitzen, und bei den nächstverwandten Arten des *G. Kymatophora*, *Flavicornis*, *Xanthoceros*, *Or*, *Fluctuosa* kommen sie nur undeutlich, nach Entfernung der sie verdeckenden Haare, zum Vorschein. Mit Ausnahme dieser wenigen Fälle kommen allen Eulen Nebenaugen zu.

Sämmtliche Spanner (*G. Ennomos* bis *Idaea Tr.*) sind gleich dem *G. Platypteryx* ohne Nebenaugen. Die einzige, merkwürdige Ausnahme macht *Ennomos flexularia*, mit ganz deutlichen, wie bei den Eulen beschaffenen Nebenaugen.

Bei den nun folgenden Forder, Fünflern, Wicflern, Schaben und Geißeln scheint Dasen oder Mangel der Nebenaugen mit größerer Willkürlichkeit zu wechseln. Doch habe ich bis jetzt eine zu geringe Anzahl dieser Mikrolepidopteren untersucht, um mehr als einzelne Bemerkungen darüber geben zu können.

Unter den Fünflern finden sich Nebenaugen im *G. Herminia* (*Tarsicrinalis*, *Barbalis*), *Hypena* (*Proboscidalis*, *Obesalis*, *Rostralis*), *Scopula* (*Prunalis*, *Sticticalis*, *Olivalis*), *Botys* (*Foricalis*, *Hyalinalis*, *Verticalis*), und besonders groß und deutlich bei *Ennychia* (*Octomaculalis*, *Anginalis*). Sie fehlen bei *Pyrallis Pinguinalis*, *Hereyna Palliolalis* und *Strigularis*, sind undeutlich bei *Pyrasta*, *Purpuralis* und *Cespitalis*. Im *G. Nymphula* scheinen sie zum Theil zu fehlen (*Lemoalis*), theils sind sie vorhanden (*Potamogalis*).

Den Wicflern fehlen sie nur ausnahmsweise, wie dem *G. Heterogenea*. Der Velen sind sie aber sehr klein und undeutlich, wie bey *Teras Ferruginea*, *Asperana*, *Literana*. Groß sind sie bei *Penthina Variegana*, *Roborana* und den Nächstverwandten; ferner bei *Tortr. Lecheana*. Im *G. Halias* fehlen sie bey *Quercana*, während die sonst so ähnliche *Prasinana* sie besitzt.

Den Schaben scheinen die Nebenaugen größtentheils zu mangeln. Wo sie vorkommen, z. B. bei *Tinea Pellionella*, *Chilo Aquilellus*, *Phycis Achinella* und *Carnella*, *Rhino-*

*sia Fissella*, *Adela Anderschella* und vielen Andern, sind sie stets klein, meistens schwer aufzufinden.

Der Gattung *Alucita* fehlen sie, sind aber bei *Orneo-des Hexadactylus*, obgleich klein, vorhanden.

### Catalogue raisonnée

des objets de Zoologie recueillis dans un voyage au Caucase et jusqu'aux frontières actuelles de la Perse, entrepris par Ordre de S. M. l'Empereur; par E. Ménétries, conservateur du Musée zoologique. Pétersbourg, 1832. 4. 271 u. 29.

Der Verfasser machte im Jahr 1829 mit einer wissenschaftlichen Commission seine Reise nach Petigorsk (Wäder am Caucasus), um mit dem Herr unter General Emmanuel über den Caucasus nach dem Elbruz zu gehen. Nach einem Monat war aber das Herr wieder zurück, nehmlich am 21. July. Die Reisenden hatten daher sehr wenig Zeit, und durften sich überdies sehr wenig vom Herr entfernen wegen der feindlichen Circassier. Am 15. August verließen sie mit dem General Engelhardt Petigorsk und giengen durch die Kabarda nach Groznia am Fuße des Caucasus. Am Erak schloß er viele Wasservögel, meist gleich denen im südlichen Frankreich. Am Ende Octobers verließen sie Groznia mit einer Begleitung von Soldaten und giengen längs dem Caucasus nach Caspium und von da nach einiger Zeit ans caspische Meer, wober es aber sehr langsam gieng, theils wegen der schlechten Wege, theils wegen der Schwierigkeit Pferde zu bekommen. Sie hatten zwar keine Lebensgefahre mehr vor den Einwohnern, wurden jedoch von den Tataren schlecht aufgenommen. Von Ruby bis Baku, wo sie am 9. December ankamen, mußten sie auf jeder Station einige Stunden auf Pferde warten. Von Kaspium bis Baku haben sie kein Fenster, keinen Ofen, keinen Stuhl und keinen Tisch mehr gesehen. Die Provinz Daghestan ist begränzt nördlich vom Flusse Sulak, östlich vom caspischen Meere und westlich von einer Hügelreihe, wodurch ein Thal gebildet wird bis Derbent. Das Land besteht aus Anschwemmungen, ist sehr dürr und enthält fast nur Brackwasser. Es finden sich daselbst viele Antilopen, Pterocles, *Cursorius*, *Otis tetrax*, Heuschrecken usw. Während des Winters kommen eine Menge Wasservögel ans caspische Meer, aber nur in wenig Gattungen. Am 27. April verließen sie Baku und reisten längs dem caspischen Meer nach Salian am Kur (Cyrus), wo der Boden besser wurde und besonders viele Kerse lieferte; auch fand man daselbst viele Störarten. Sie kamen am 1. May an und am 17. in Lenkoran durch reiche Gegenden voll Weinberge, Bäume, Nachtigallen und Schafale. Lenkoran, am Meer, ist von Reisfeldern umgeben. Es gibt daselbst viele *Emys caspica*. Am 30. reisten sie nach dem Gebirge Talyche, an den Gräzen von Persien, es besteht unten aus Porphyre und dann 3000' hoch aus Sandstein, und ist fast ganz mit Wäldern bedekt. Am 26. Juny waren sie wieder in Lenkoran, wo sie aber wegen der Cholera nicht bleiben konnten. Am 7. July giengen sie zu Schiff nach Baku, das sie am 10. erreichten und am 19. verließen. Unterwegs brachen sie eine Kiste und mußten 60 Werst weit schiden, um eine andere zu bekommen. Am 26. waren sie in Ruby, von wo sie das Gebirg Schabad besuchten und daselbst viele Kerse gleich denen auf dem Elbruz fanden; von da wieder über Ruby zurück



nach Derbent, wo sie 14 Tage blieben; von da nach Petigorsk, welches sie am 8. October verließen und erst am 19. December in Petersburg ankamen, weil sie durch die vielen Cholera-Quarantainen aufgehalten wurden.

Bei dieser Reise voll Beschwerden, Gefahren und Aufenthalt muß man sich über den großen Reichthum wundern, welchen der Verfasser an Thieren zusammen gebracht habe. Er theilt sie in die des Caucasus, des caspischen Meeres und in die der Steppen vom Kur bis Lenkoran und endlich in die des Gebirges Talyche. Der Hundert wird überall genau angegeben, was sehr verdienstlich ist; besonders, da die früheren Naturforscher häufig den Wohnort nur nach der Aussage der Kaufleute bestimmt haben. Dann werden die Verhältnisse des Caucasus und der anderen Gegenden kurz angegeben. Der Verfasser hat überall, wo es nöthig war, die Gattungen charakterisirt und beschrieben, auch ihre Verhältnisse in Bezug auf Lebensart, Menge und dergl. angegeben. Am reichsten ist natürlicher Weise die Classe der Reife.

Bei einer solchen Reise kann man unmöglich viele Säugethiere bekommen; übrigens gibt es auch nicht viele.

#### Ney Fledermäuse.

*Erinaceus europæus, auritus; Talpa europæa; Ursus arctos; Meles vulgaris.*

*Mustela vulgaris, foina; Lutra vulgaris.*

*Canis aureus*, sehr gemein bey Lenkoran, kommt des Nachts aus den Wäldern, hält sich in den Steppen am Meer, kommt nah an die Wohnungen, um auf Geflügel zu lauern, fürchtet den Hund, schreut wie ein weinender Knabe und läßt sich leicht in Schlingen fangen. Im Caucasus scheint er zu fehlen; Herden von 4—500 gibt es keine mehr.

*Canis vulpes, melanotus*, eine Menge Pelze auf den Märkten von Kislar, sollen vom Gebirge Rubj kommen; heißen Kas-tan. Auch kauft man daseibst Pelze von *Canis corsac*.

*Canis lupus*, der Pelz 6—8 Rubel.

*Hyæna vulgaris*, auf dem Gebirg Talyche.

*Felis tigris*, bey Lenkoran, ein Weibchen geschossen 5' 2" lang, Widerrist 2' 2½", unterscheidet sich nicht vom bengalischen. Jährlich wird etwa einer geschossen. Im Caucasus scheinen keine vorzukommen, aber in Georgien. Die meisten Felle der Art kommen von den Märkten von Derbent, Kislar und Rijnj Novgorod, auch von *Felis leopardus*, die aber aus Sibirien geschickt werden.

*Felis catus, cervaria*, Pelze zu Baku, sollen vom Caucasus kommen.

*Phoca vitulina s. canina*, die einzige im caspischen Meer, aber in Menge.

*Sciurus vulgaris* selten.

*Spermophilus musicus* n.: *Cinereo-canescens, vertice dorsoque subfusco-undulatis, subtus dilute flavicans, regione oculos et os ambiente, gula, latere exterioreque pedum albis; cauda abbreviata, deplanata, subtus sulva, pilis longis subrigidis*. Etwas kleiner als das Ziesel, Schwanz viel kürzer. Auf dem höchsten Caucasus in Erzhöhlen, zahlreich.

*Dipus jaculus*, nur bey Baku, nicht häufig, auch bey den Wäldern des Caucasus.

*Cricetus nigricans*, fast wie der gemeine, auf dem Caucasus.

*Mus sylvaticus*, gemein auf dem Caucasus.

*Mus messicus*, häufig in den Steppen am Caucasus.

*Myoxus dryas*, bey Groznaia.

*Arvicola socialis*, sehr gemein auf dem Talyche in Erzhöhlen, macht ein Nest aus Gras, mit 8—10 Jungen.

*Lepus timidus*, gemein im Caucasus, weiß am ewigen Schnee.

Keine andere Gattung.

*Cervus elaphus*, auf dem Caucasus.

*Cervus capreolus*. Der sogenannte *Capreolus pygargus* auf dem Talyche hat nur unten etwas rauhere Geweihe, der Pelz dunkler.

*Antilope subgutturosa*, persisch Ditan, sehr gemein, besonders des Winters in den weiten Steppen des caspischen Meeres von Baku bis an den Kur in kleinen Rudeln. 150 Schritt vom Jäger bleiben sie stehen. Das Fleisch sehr gut; zu Baku das Stück 3 Rubel, die Hörner eben so viel. Leicht zu jähmen, Weibchen ohne Hörner.

*Capra agagrus*, nicht selten auf den Alpen des Caucasus; des Winters steigt sie nicht tiefer als 1000'.

Der Urochs findet sich nicht mehr im Caucasus, was aber vor 80 Jahren noch ziemlich gemein. [Der General Rossen hat ihn beinahe seitdem daseibst entdeckt.]

Dagegen hält man zu Lenkoran eine Art des gemeinen Eschen, welchen man mit 100 Rubel bezahlt, während der letztere nur 30—40 gilt. Er ist kleiner, meist braun, aber geschädelt, Hörner größer, auf dem Widerrist ein Fetzbüchel. Er ist unermüdbar und man soll ihn noch wild finden im Gebirge bey Rerisch in Persien, 80 Werst von Lenkoran.

Man braucht auch Büffel bey Rubj und Lenkoran in der Nähe der Sümpfe.

Auf dem Talyche und Caucasus ungeheure Herden von Schafen mit Fetzschwänzen; Fleisch gut, Wolle schlecht.

Man hält Camels und Dromedare in den Steppen am caspischen Meer.

Pferde am Caucasus häßlich, aber sehr brauchbar; in Persien sehr schön; werden aber auch sehr gepflegt und selbst auf der Wade bedeckt; der persische Herr kriegt und besorgt sie selbst, obschon er eine Menge Diener hat.

Die Esel klein.

Die Vögel sind viel zahlreicher und gehen von Nr. 30 bis 205.

*Turdus roseus*, im May am Kur und am caspischen Meer in großen Flügen auf Hecken, wo man sie leicht tödten kann. Die Weibchen sehen aus wie ein weiblicher Staar, fressen Heuschrecken und Käfer, schlafen in Felsenlöchern.

Neu sind: *Saxicola saltator; Sylvia familiaris, icterops; Anthus rupestris; Alauda bimaculata; Emberiza granatavora, caspia*.

*Phasianus colchicus*, gemein am Teret und Sulaf, selbst auf dem Gebirg Wehtau bey Petigorsk; im Herbst geht er in die Steppen, wird mit Pferden gehegt und dann mit der Peitsche erschlagen.

*Pterocles caspius; Charadrius intermedius; Anas angustirostris*.

Unter den ausgezeichneten hat der Verfasser gefunden: *Cathartes percnopterus; Pyrrhula erythrina; Pyrrhocorax*



graculus; Caprimulgus europæus; Merops apiaster, superciliosus; Cuculus canorus; Columba livia, turtur; Otis tarda, tetraz; Ardea virgo, cinerea, purpurea, egretta, nycticorax.

Phenicopterus ruber, sehr gemein bey Waku und Lenkora an Salzpfannen, frisst kleine Fische, entfernt sich vom Jäger 100 Schritt und bleibt dann ohne Furcht; fliegt ungern auf. Geduldet soll er tanzen und auf einem Beine hüpfen lernen.

Platalea leucorhodia; Ciconia nigra, alba; Ibis falcinellus; Glareola torquata; Hæmatopus ostrægus; Cursorius isabellinus; Oedienemus crepitans; Himantopus melanopterus; Podiceps caspicus; Pelecanus onocrotalus; Carbo cormoranus; Sterna caspia, hirundo, nigra; Larus canus, tridactylus, ichthyæctus; Cygnus ferus; Anser albifrons, ruficollis.

Uebrigens sind die Vögel mit den unserigen übereinstimmend.

S. 59. Fische. Am meisten neue wurden an den jetzigen persischen Gränzen gefunden. Sie laufen von Nr. 206 bis 245.

Testudo ibera, gemein in den Obstgärten von Waku, nähret sich nur von Pflanzen.

Emys caspia gleicht sehr der Emys europæa, wird aber über 1' lang; E. europæa im Caucasus 2—3000' hoch.

Lacerta agilis, viridis, quinquevittata n., stirpium, laurentii; Podarcus velox, variabilis, irritans n.

Ophiops n.: nares in apice canni rostralis; palpebra inferior nulla; superioris tantummodo rudimenta; palatum nullum; squamæ supra carinatae, subtus imbricatae, collare nullum; pori sub femoribus; cauda verticillata.

O. elegans, vielleicht Gymnodactylus caspius, Eichwald Zool. III. 181, je 11 Schenkelporen; 6" lang; grünlich-grau mit einem helleren Seitenstreifen und vielen schwarzen Querstreifen, nebst rothen Punkten; gehört zu den Scincoiden und ist ziemlich gemein auf dem Boden bey Waku.

Scincus bivittatus n.; Stellio vulgaris; Uromastix fasciata h.; Pseudopus pallasi, fischeri n.; Anguis fragilis; Cyclops vermicularis.

Trigonopsis iberus; Coluber natrix, persa, collaris n., dione? alpestris? caucasicus, scutatus, ponticus, hydrys, ravergieri n., ocellatus, reticulatus n., vermiculatus n., nebulosus n.

Pelias chersæa (berus); Trigoniceps halys.

Rana variabilis? vespertina; Bufo caucasicus; Hyla arborea.

#### S. 74. Fische.

Die Thiere des caspischen Meeres gleichen denen des schwarzen; es gibt aber darinn keine nackten Schnecken und nur eine einzige Coralline. Es hat überhaupt keine eigenthümlichen Thiere. Merkwürdig ist es, daß alle Fische, mit Ausnahme einiger Gobius, auch im süßen Wasser vorkommen und selbst die Wasserkräfer; vielleicht weil sein Wasser nicht so salzig ist, wie bey andern Meeren. Fischgattungen gibt es sehr wenige und fast nur aus den Sippen Acipenser, Perca, Salmo, Cyprinus, Silurus et Gobius, die auch meistens in der Wolga, Neva, dem baltischen Meer und dem Laboga-See vorkommen.

In den Bächen 8000' hoch findet man die kleine Forelle (Salmo alpinus?), dieselbe wie in den Pyrenäen; 6000' hoch Cyprinus barbus, höchstens 1' lang, und Silurus glanis 1½'

Die Störarten steigen höchstens 4—500' hoch, selbst in den großen Flüssen Kur und Terek; im Winter gehen sie ins Meer und kommen im Frühjahr zurück, um zu laichen, wo sie in großer Menge an den Mündungen gefangen werden. Caviar allein bekommt man jährlich mehrere 1000 Tonnen. Die Stör und der Weiss vermehren mit den Wasservögeln die Zahl der Fische. Fische sind gleichsam der Hay des caspischen Meers. Zu Sallane am Kur, 40 Werst vom Meer, ist eine Fischerey an einen hebräischen Indianer verpachtet, jährlich für 260,000 Rubel und dabey soll er über eine halbe Million gewinnen. Vor 15 Jahren habe man daselbst an einem Tag 20,000 Stör gefangen; jetzt selten 4000; außer Acipenser stellatus et ruthenus werden alle über 4' lang; A. güldenstedtii 7'.

Von den Stören, welche man im Frühjahr fängt, sind ¾ Weibchen mit 50—60 Pfd. Krogen; es gibt mit 80.

Die Zahl der Fische geht von Nr. 246—283. Es sind.

Acipenser güldenstedtii, huso, stellatus, ruthenus, schypa.

Salmo salar, hucho?, alpinus (erythræus), fario; Esox lucius.

Barbus communis, chalybeatus; Tinca vulgaris; Gobius fluviatilis; Abramis brama, laskyr; Leuciscus lacustris, erythrophthalmus, vulgaris; Cyprinus carpio, dobula, orfus, rutilus, cephalus, nasus, aspius, grislagine, alburnus, cultratus, chalcoides (clupeoides).

Silurus glanis; Gadus lota; Gobius macrocephalus, batrachocephalus; Acerina cernua, tanaicensis; Perca fluviatilis; Lucioperca sandra.

S. 90. Käfer; sehr zahlreich; laufen von Nr. 284 bis 1154. Neu darunter:

Cicindela caspia, monticola, sturmii; Cymindis andrææ; Brachinus quadrinotatus; Dytiscus angustatus; Procrustes talychensis; Carabus sobrius, sculpturatus, gemmellatus, castaneipennis, prasinus, tamsii, riedelii, biebersteinii, stevenii; Nebria caucasica, faldermanni; Chlönus pubescens, flavipes; Dinodes viridis; Badister anchora; Tristonychus caspius; Anchomenus collaris; Agonum chalconotum; Feronia umbrata, caucasica, crassipes, caspia, anchoreta, deplanata, variabilis, nivicola, montivaga.

Pelorus rugosus; Zabrus gibbosus, rufomarginatus, morio, elongatus; Amara morio, cordicollis, propinqua; Acinopus lævigatus; Harpalus coerulescens, convexiticollis, læviceps, ruficrus, elegantulus, fuscicornis, faber; Stenolophus dimidiatus, morio; Bembidium pallidulum, apicale, bisignatum, depressum, fraxator, combustum, dimidiatum, persicum; lividipenne, testaceipenne.

Dytiscus lineolatus; Colymbetes ruficeps; Gyrinus caspius.

Staphylinus sericeicollis, quadraticeps, chalybeipennis, protensus, nigritarsis, vicinus, ochripennis, rotundicollis, picimanus; Aleochara flavomaculata, apicalis; Emus ruficornis.

Buprestis fritillula, repanda, glabrata, vetusta, gibbula, subfasciata, cupressens; Elater saginatus, pasticus, alpestris, caucasicus, crenicollis, monticola, sobrius, circumductus, anchoreta; Drapetes caucasicus.

Cantharis rufimana, fetida, pygmæa, vitticollis; Malachius vittatus, angustatus, terminatus; Dasytes chalybeus.

*Pinus quadrisignatus*; *Ptilinus grandicollis*, *aspericollis*;  
*Anobium variegatum*; *Trichodes corallinus*.

*Silpha costata*, *striola*, *intricata*; *Catops pallidus*.

*Hister velox*, *incrassatus*, *parallelus*, *subvirescens*;

*Hololepta castanea*; *Parnus caspius*.

*Onthophagus urus*, *quadridentatus*, *viridis*, *subviolaceus*, *cruciatus*, *subæneus*, *atramentarius*, *histeroides*;  
*Aphodius caspius*, *elongatus*; *Geotrupes inermis*; *Anomala splendida*; *Amphicoma ochraceipennis*; *Trichius subcostatus*; *Cetonia hieroglyphica*, *seniculus*.

*Pimelia cursor*; *Tentyria striatopunctata*; *Tagenia picea*; *Hedyphanes quadratocollis*; *Blaps tæniolata*, *ominosa*, *deplanata*, *scabriuscula*, *subalpina*, *luctuosa*, *confusa*;  
*Heliophilus iners*, *crenulatus*; *Opatrum saginatum*; *Diaperis picta*; *Cistela subalpina*; *Rhipiphorus sulcatus*; *Mylabris caspia*, *aulica*, *alpina*; *Zonitis rubida*; *Apalus? sexmaculatus*; *Oedemera axillaris*.

Curculioniden eine Menge, meist von Schönherer bestimmt.

*Cis caucasicus*; *Nemazoma caucasicum*; *Parandra caspia*; *Saperda maculosa*, *argentina*, *compacta*; *Callidium femorale*, *timidum*; *Clytus lugubris*; *Pachyta alpina*; *Lep-tura imberbis*, *bisignata*, *attenuata*?

*Clythra valeriana*; *Cryptocephalus rubi*.

*Coccinella maritima*.

Es sind noch mehrere neue aufgeführt, aber von Man-nerheim, Summel, G. Sischer und Saldermann be-stimmt.

E. 241. Falter. Laufen von Nr. 1155 bis 1292.  
Darunter neu:

*Colias thisoa*; *Pieris menestho*; *Argynnis alexandra*;  
*Satyrus hylata*, *teneates*; *Zygæna bitorquata*, *fraxini*, *sco-viczii*; *Chelonia caucasica*, *rivularis*; *Lithosia aurata*;  
*Urapteryx persica*.

E. 264. Schalthiere. Laufen von Nr. 1293 bis 1307 und sind:

*Helix pomatia*, *hortensis*, *fruticum*, *alpina* n.; *Paludina vivipara*, *Cyclostoma elegans*; *Nerita fluviatilis*; *Bulimus radiatus*? *Limæus palustris*.

*Anodonta cygnea*; *Unio rostrata*; *Mytilus polymorphus*;  
*Cardium rusticum*; *Glycymeris læviscula*; *Hypanis plicata*.

Das caspische Meer ist sehr arm daran und scheint kaum mehr als die genannten zu enthalten.

Dann folgt die geographische Vertheilung der genannten Thiere in Tabellen von S. 1 bis 33. Ein Register erleichtert das Auffuchen.

Aus dieser Anzeige wird man sehen, daß durch diese Reise die Zoologie sehr bereichert worden ist, und der Verfasser überhaupt seine kurz zugemessene Zeit auf einem so weiten Raum gut angewendet hat.

### Insecta lapponica,

descripta a J. W. Zetterstedt. Lipsiæ, L. Vols. 1838.  
Fasc. III. 4. p. 386—576.

Von diesem sehr wichtigen, reichhaltigen und gründlich bearbeiteten Werke haben wir schon mehrmals zu sprechen Gelegenheit gehabt, worüber wir uns nicht wenig freuen: denn es ist ein Muster vom Fleiß im Sammeln, von der Gewandtheit im Bestimmen, von dem Talent im Ordnen der Sippen und Gattungen und von der zweckmäßigen Einrichtung des Buchs. Dieses Heft geht von 15) *Banchus* bis zu 60) *Bombus*, das Ende der Immen.


Dann folgen die Mücken bis zur Sippe 33) *Sargus*, so daß also das Werk sehr schnell seiner Vollendung entgegen eilt.

### Schweizerische Zeitschrift

für Natur- und Heilkunde, von Dr. Chr. Fr. von Pommer, Prof. Heilbronn, bey Drechsler. 1838. 8. III. Heft 2. 163. 1 Taf.

Die früheren Hefte dieser Zeitschrift haben wir nach Ver-dienst angezeigt. Das gegenwärtige scheint nicht weniger inter-essant zu seyn. Es enthält die Verhandlungen der medicinisch-ärztlichen Gesellschaft des Cantons Zürich im May 1837 und sodann Abhandlungen über die Zweckmäßigkeit der Brez-tonneauschen Impfstöhen von Schmid und Meyer; Hoff-meister; ein neues Instrument zur Besthaltung des Augapfels von Brunner in Winterthur; Geschichte des Züricher Heb-ammen-Vereins von Meyer; Ahrens; ärztlicher Jahresbericht der Gesellschaft in Meilen von Billeter; Besichte aus dem Krankenhaus zu Neuenburg von Castella; über die Influenza in Zürich von Zundel; Uterin-Polyp von Castella; Wasser-sucht des Sperma von Toggenburg; künstliche Frühgeburt von Spöndli; kranke Arme von Locher; Balber; Mine-ralwasser von Gonten, von A. Stein.

Fig. 1. *Chelonicus*



*Cerataites*

Fig. 2.




Fig. 3.  
Blätter





Fig. 4.







S f i S.

## Encyclopädische Zeitschrift,

vorzüglich

für Naturgeschichte, vergleichende Anatomie und Physiologie,

von

D f e n.

1 8 3 8.

S e f t V.

(Tafel IV.)

Der Preis von 12 Heften ist 8 Thlr. sächs. oder 14 fl. 24 Kr. rheinisch, und die Zahlung ist ungetheilt zur Leipziger Ostermesse des laufenden Jahres zu leisten.

Man wendet sich an die Buchhandlung Brochhaus zu Leipzig, wohin auch die Beiträge zu schicken sind. Es wird gebeten, dieselben auf Postpapier zu schreiben.

Unfrankirte Bücher mit der Post werden zurückgewiesen.

Einschickgebühren in den Text oder Umschlag die Zeile sechs Pfennige.

Von Anticritiken (gegen Fests-Receptionen) wird eine Quartseite unentgeltlich aufgenommen.

Leipzig, bey Brochhaus.

# A n z e i g e n.

---

## An Freunde der Naturkunde.

(Fortsetzung.)

### Naturhistorischer Actien-Verein auf Naturalien ohne Vorausbezahlung

Jede Actie im Betrag von 100 Francs (38 fl. 20 fr. G. M.) zu bezahlen, nach Erhaltung der selbstgewählten Gegenstände im Werthe der Actie.

Der einzige Zweck dieses Vereins von Naturfreunden, zu welchem die Directoren der Naturaliencabinete, Naturforscher und alle der Naturgeschichte Beflissenen eingeladen werden, beizutreten, ist mit allgemeinerer Verbreitung des Studiums der Naturgeschichte in Italien und damit verbundener genauerer Untersuchung dieses und anderer wenig naturhistorisch-durchforschter Länder Europas; auch besondere Vortheile für jeden, der Naturaliensammlungen besitzt oder anzulegen wünscht, zu vereinigen.

1) Jede Actie beträgt jährlich 100 Francs (38 fl. 20 fr.), und der Actionär ist verpflichtet, einen gleichen Betrag durch drey nach einander folgende Jahre zu erlegen.

2) Die Actionäre sind aber zu keiner Vorausbezahlung verpflichtet; nur dann, wenn sie die von ihnen selbst gewählten Gegenstände aus den Catalogen der Unterzeichneten erhalten haben, leisten sie die Bezahlung des Betrages, zu dessen Erlegung sie sich durch Unterschiebung des Actienscheins verbindlich gemacht (Die Art der Geldüberföndung wird selbst stets bey Ablieferung der Gegenstände bekannt gemacht werden.).

Den Actionären wird daher der ganze Betrag der genommenen Actien in Naturgegenständen vergütet. In den systematischen Catalogen ist der Werth der bereits vorrätigen bemerkt: sie haben daraus freye Wahl; von diesem Werthe, obwohl er

schon geringer angefetzt ist, als in den Verzeichnissen der Naturalienhändler üblich, wird man dennoch zu Gunsten der Actionärs den dritten Theil dieses festgesetzten Werthes nachlassen.

3) Jene Personen, welche eine geringere Anzahl von Gegenständen zu erhalten wünschen, können eine halbe Actie nehmen, im Betrage von 50 Frs. (19 fl. 10 fr.) mit gleicher Verpflichtung, diesen Betrag durch drey nach einander folgende Jahre ohne Vorausbezahlung jedoch zu erlegen. — Sie leisten die Zahlung nach Erhaltung der gewählten Gegenstände, und zu ihren Gunsten wird der vierte Theil von dem in den Catalogen festgesetzten Werthe nachgelassen.

4) Die Gegenstände, welche den Actionären angeboten werden, sind: Mineralien, Felsarten, lebende und fossile Meer-, Land- und Flußconchylien, Käfer, getrocknete Pflanzen und Samen. — Die Cataloge der Unterzeichneten enthalten in den obervähnten 4 Sectionen derselben die Aufzählung der abgebbaren Gegenstände.

Die Actionärs können sich die Cataloge durch obbemerkte Buchhandlungen verschaffen, welchen die Unterzeichneten den Verkauf derselben überlassen; sie haben sich jedoch die Wertheilung der am Ende jedes Jahrs zu erscheinenden Supplemente vorbehalten. Diese Supplemente enthalten die Anzeige der disponiblen, während dem laufenden Jahre acquirierten Gegenstände, und werden seiner Zeit den Actionären unentgeltlich zur Auswahl der Gegenstände mitgetheilt werden.

5) Wer zwey Actien nimmt, kann um den Betrag des vierten Theils, und wer drey Actien besitzt, für den Betrag des dritten Theils derselben im Tausche Naturgegenstände geben. Um diesen Tausch zu bewerkstelligen, ist nöthig, daß den Unterzeichneten die Tauschverzeichnisse eingefandt werden, welche die Anzeige der Namen, die Zahl jeder Art und deren Werth enthalten, um hiernach die Auswahl zu treffen.

6) Jeder Theilnehmer am Vereine hat das Recht, aus obbemerkten Catalogen die Gegenstände auszuwählen, welche er wünscht, und die nach den in denselben bestimmten Preisen dem Betrage seiner genommenen Actien gleichkommen; und zu seinem Vortheile hat die obbemerkte Verminderung des Werthes der ge-

wählten Gegenstände statt. Es versteht sich jedoch, daß in den Desideratenverzeichnissen, außer der Befügung einer größeren Anzahl von Gegenständen für den verminderten Werth, man außerdem noch eine Anzahl von Gegenständen, welche das Doppelte des Werthes seiner Actien betragen, bemerken müsse, damit im Falle vieler Nachfragen irgend eine Art nicht mehr vorrätzig, durch eine andere, vom Actionär selbst angezeigte, ersetzt werden könne.

7) Obwohl die Actionäre in den Catalogen der Unterzeichneten, die nun bekannt gemacht werden, eine hinlängliche Auswahl zu treffen finden werden, so können dieselben doch noch besser in den folgenden Jahren befriedigt werden, da man die durch die Actien eingegangenen Beträge zum Behufe naturhistorischer Reisen verwenden wird, um die den Actionären erwünschten Gegenstände sammeln zu lassen. Diese Reisen werden, außer dem Hauptzwecke, die zu Italien gehörigen, und die denselben nachfolgenden Landstriche und Inseln genau in naturhistorischer Hinsicht zu durchforschen, auch außerdem nach dem Verlangen der Actionäre eingeleitet werden; daher denselben immer vorläufig bekannt gemacht werden wird, in welchen Gegenständen man Naturgegenstände sammeln läßt.

8) Man bemerkt für jene Personen, welche Actien auf solche Sectionen der Naturgeschichte wünschen, von welchen gegenwärtig keine Vorräthe vorhanden, daß die Unterzeichneten alle Sorge

haben werden, durch Reisen und ihre ausgebreiteten Verbindungen, deren Wünsche in der Folge zu befriedigen, wenn sie nur vorläufig davon unterrichtet werden.

9) Endlich bittet man alle Naturfreunde, welche diesen Actienverein begünstigen und beitreten wollen, sich sobald als möglich hinsichtlich ihres eigenen Vortheils für die Actien zu unterzeichnen, da man bey der ersten Vertheilung der Gegenstände den Vorzug jenen Theilnehmern geben muß, welche früher die Actien nehmen.

Dieser naturhistorische Actienverein, welcher, außer obbemerktem Zwecke, vorzüglich allen jenen Naturfreunden, welche Sammlungen besitzen, die Hervollständigung derselben durch selbst gewählte und wohl bestimmte Gegenstände erleichtert, und denen, welche solche anlegen wollen, hiezu die Mittel an die Hand gibt, ist an und für sich einzig in seiner Art. Die Unterzeichneten hoffen daher mit Zuversicht, daß ihr Unternehmen sich allgemeiner Theilnahme der Naturfreunde erfreuen wird, und daß man es nicht in die Kategorie jener Unternehmungen verweisen wird, wo, wenn auch vorausgehend, die Ungewißheit bleibt, wann und welche Gegenstände man als Ersatz erhält. Die beygefügte Actiensteine, mit der Unterschrift der Theilnehmer und der Bemerkung der verlangten Theilungen versehen, können ohne Unterschied an den einen oder den andern der Unterzeichneten nach Mailand adressiert werden.

Georg Jan, Prof.

(Contr. S. Romano Nro. 520.)

Joseph de Cristofori.

Contrada del Durino Nro. 428.

Im December 1837. ist leider der thätige und ohne alles Privat-Interesse wirkende Cristofori nach seiner Reise durch Deutschland und Ausland gestorben; soviel wir aber hören, wird Jan das Geschäft fortsetzen.



## E i n l a d u n g.

Nachdem die im verfloffenen Jahre in Prag versammelten deutschen Naturforscher und Aerzte zu ihrem nächsten Versammlungsorte die Universitätsstadt Freiburg gewählt und darauf Se. Königl. Hoheit unser Durchlauchtigster Großherzog die allerhöchste Genehmigung in den gnädigsten Ausdrücken ertheilt haben, daß die Versammlung in diesem Jahre dahier stattfinden kann; beehrt sich hiemit nun die diesjährige Geschäftsführung, sowohl Deutschlands Naturforscher und Aerzte, wie auch die des Auslandes pflichtschuldigst und freundlichst einzuladen.

Die Sitzungen werden statutenmäßig am 18. September d. Z. beginnen. Es können nach §. 6. der Statuten nur diejenigen daran Theil nehmen, welche sich wissenschaftlich mit Natur- und Heilkunde beschäftigen, und nach §. 3. und 7. nur die als stimmbfähige Mitglieder betrachtet werden, welche Schriftsteller im naturwissenschaftlichen und ärztlichen Fache sind.

Die Geschäftsführung bemerkt hieby noch, daß folgende Sectionen gebildet werden sollen:

- 1) Für Physik, Astronomie und Geographie. — Provisorischer Vorstand: Herr Geh. Rath und Prof. Dr. Bucherer.
- 2) Für Chemie und Pharmacie. — Provisorischer Vorstand: Hr. Prof. D. Fromberg.
- 3) Für Mineralogie und Geognosie. — Provisor. Vorstand: Hr. Bergath Dr. Walchuer in Karlsruhe.

- 4) Für Botanik. — Provisor. Vorstand: Hr. Professor Dr. Verleb.
- 5) Für Zoologie, Anatomie und Physiologie. — Provis. Vorstand: Hr. Prof. Dr. Leuckart.
- 6) Für Medicin. — Provis. Vorstand: Hr. Hofr. und Prof. Dr. Baumgärtner.
- 7) Für Landwirthschaft. — Provis. Vorstand: Hr. Geh. Rath v. Falkenstein.

Die verehrten Herren, welche an der Versammlung Theil zu nehmen gesonnen sind, werden ersucht, davon den unterzeichneten Geschäftsführer baldmöglichst in Kenntniß zu setzen und denselben ihre Wünsche in Bezug auf etwa zu haltende Vorträge, und zwar in den allgemeinen, wie in den Sections-Sitzungen, zu denen sie sich bestimmen wollen, eben so auch in Hinsicht auf Logies, in portofreien Briefen mitzutheilen.

Freiburg den 18ten Jun. 1838.

Im Namen der Geschäftsführung:

Professor Dr. Leuckart.

Zweiter Geschäftsführer der 16ten Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte.

## A. Allgemeines.

- 321. Bücher von Trentowski, Groos.
- 332. Auszüge aus Asiatic. Transact. I — III.  
Moorecroft, Purit: Schaf. — Caschemitz-Biege, Pferd  
Kiang; Ricus indica.
- 333. Johnston, Handel von Ceylon; Voluta gravis, Perl-  
bänke.
- 334. Low, weiße Elephanten.
- 336. Hardwicke, Schaf-Fresser.

## B. Naturgeschichte.

- — Sykes, wilder Hund Golsun.
- 338. Steuat, Perlfischerei.
- 342. Sykes, Bombyx paphia.
- 345. Wiener Annalen. II. 1. Lepidosiren.
- 347. Bücher von Perdy, Gloder, Fromberg, Nürnberg.
- 351. Hammerichmidt, helminthologische Beyträge; Sper-  
matozoen. Taf. IV.

## C. Zoologie.

- 360. Büttner, zoologische Bemerkungen.
- 371. Bücher von Schönher, J. Fischer, Kröyer, Bulletin de  
Moscou, Freyer.
- 375. Auszüge aus Brewsters phil. Magazine XII.  
Kennedy, Lebensart verschiedener Inmen.
- 378. Falconer, verfeinerter Affe.
- 379. Ogilby, Conilurus et Dipus aus Neuholland.  
Neely, über Otus brachyotus.
- 380. Auszüge aus Jamesons philos. Journal XXIII — XXV.  
Wight, über den Gummiguttibaum.
- 381. J. Shaw, Entwicklung des Reichs der Salmen.
- 384. Walck, über Entstehung der Perlen.

## D. Medicin.

- 388. Frey's Markschwamm.
- 389. Hierbach, Arzneimittel des Alterthums, Euche.
- 400. Pommers Zeitschrift für Natur- u. Heilkunde. III. 3.

## U m s c h l a g.

Griffiori und Zang Naturalien-Tausch.  
Versammlung der Naturforscher zu Freiburg.  
Taf. IV. S. 351 Eingeweidwürmer und Spermatozoen.

## Eingegangen:

### In Büchern.

- Eversmann Lacertae imperii rossici. 4. 30. 4 tab. color.  
(e no. Mém. III.).
- Idem addenda ad Pallasii Zoographiam. 1835. 8. 32.
- Idem Libellulinae inter Wolgam et Montes uralenses. 8. 16.  
2 tab. ill. (e Bulletin mosc. IX.).
- D. Geer, die Käfer der Schweiz. Neuchâtel. 1837. 2. 1. 4. 96.
- C. Voewig, Chemie der organischen Verbindungen. Zürich bey  
Schulthess. 1838. I. 8. 304.
- Berghaus, allgemeine Länder- und Völkerkunde. Stuttgart  
bey Hoffmann. III. 1838. 8. 586. 1 Tafel.
- A. Lewald, Handbuch für Reisende am Rhein. Ebenenda. 8.  
164 1 Karte.
- Winkelmanss Reisekarte von Tyrol. Ebenenda.
- Hofman-Hang, De usu conservarum in oeconomia natu-  
rae. Hafniae. 1838. 8. 27. 1 tab. color.
- Freyfelder, Studien im Gebiete der Heilwissenschaft. Stutt-  
gart bey Hallberger. Bd. 1. 1838. 8. 310. 1 Taf.
- Bronn, Lethaea geognostica. Stuttgart bey Schweizerbart.  
Hef. 9. 1838. 8g. 49 — 60.
- S. Kröyer, de danske Osterbanker, Kjöbenhavn. Trier. 1837. 8.  
168. 2 T.
- Derselbe, Danmarks Fiske, Kjöbenhavn, Trier. 1838. 8. 1. Hef.  
288, mit Holzschnitten.
- Derselbe, Grönlands Amphipoder, Kjöbenhavn. 1838. 4. 98. 4 T.
- Freyer's neuere Beyträge zur Schmetterlingskunde. Hef. 41—  
44. Taf. 241 — 264. ill. Augsburg. 1837.
- Graf Caspar Sternberg und Profess. v. Krombholz,  
Bericht über die Versammlung deutscher Naturforscher und  
Ärzte in Prag im . . . 1837. Prag bey Haase. 1838.  
4. 235 u. 26.
- Was verlangen die Bürgerlichen? Zürich. Vereinsverlag 1838.  
8. 27.
- Meyer-Ahrens, Geschichte des zürcherischen Medicinalwe-  
sens. Zürich. 1838. 8. 98.
- M. D. Lessing, Handbuch der Geschichte der Medicin. Berlin  
bey Hirschwald. I. 1833. 8. 567.
- G. Combe, das Wesen des Menschen und sein Verhältniß zur Au-  
ßenwelt, übers. v. Hirschfeld. Bremen d. Heyse. 1838. 8. 422.
- Brandt, Beschreibung der Schirmquallen von Mertens. Leipzig  
bey F. Voß 1838. 4. 178. 31 Taf. ill.
- Sturm's Fauna. 13. Käfer. 1838. 128. Taf. 259 — 271.  
Dessen Flora I. Hef. 72 — 74. III. Hef. 17. Pilze.
- Düböis, ornitholog. Gallerie. Aachen bey Mayer. S. 9 — 15.  
1836 — 1838. 2. 49 — 84. ill.
- Geognostische Karte von Sachsen. Sectio 10. Dresden.  
J. Held, Diss. de metrophlebitide puerperali. Vindobonae.  
1838. 8. 823.



1838.

B e f t V.

## Grundlage der univervellen Philosophie

von Bronislauſ Ferd. Trentowſki, Dr. philoſ., ehemaliger Lehrer am Gymnaſium zu Siczeyn in Polen.  
Carlsruhe und Grezburg, bey Herder.  
Paris, chez A. Jelowicki, Rue des Marais. 1837. 8. xvi. 339.

Diese interessante Schrift beginnt mit einer Einleitung, deren erster Theil eine historische Uebersicht, deren anderer Theil eine psychologische Grundvoraussetzung enthält.

Die historische Uebersicht umfaßt die neuere Philosophie von Leibniz an, um die Nothwendigkeit des vorliegenden eigenthümlichen Versuches darzutun. — Sinnlichkeit und Vernunft sind die beiden unmittelbar gewissen Erkenntnisquellen. Die Sinnlichkeit erzeugt die Empirie und damit den Realismus; die Vernunft erzeugt die Metaphysik und damit den Idealismus. Jedes ernste Erkennen geht aber von einem einzigen Princip aus, daher die Scheidung der alterthümlichen, wie der neuern philosophischen Systeme in realistische (materialistische, physische) und idealistische (spiritualistische, metaphysische).

Leibniz bildete ein idealistisches System, Locke ein realistisches. Die Wissenschaft blieb entzweit. Kant versuchte die Vereinigung, aber sein System war nur eine Erfahrungsphilosophie, ein Realismus. Fichte stellte ihm seinen Idealismus entgegen. Hiemit war der erste Kreislauf vollendet, mit dem Gewinne der Systematik. Aber die Kluft zwischen Realismus und Idealismus war nur enger, nicht ausgefüllt worden. Diese Ausfüllung übernahm Schelling. Er ist daher der erste wahre Philosoph Deutschlands.

Schellings Anschauung ist zwar eine totale, aber nur formelle Erkenntnisquelle, erreicht das Subject-Object nur auf formelle Weise. Es regte sich also das Streben, auch das wesentliche Subject-Objective zu entdecken. Damit nahm die Philosophie die heutige Richtung; sie wurde zur Naturphilosophie (Schelling's, Steffen's, Wagner's, Eschenmayer's, Dauber's, Schubert's, Dier's).

Paris 1838. Heft 5.

Diesen stellte sich Hegel entgegen „der letzte große Philosoph der heutigen Zeit.“ Er faßte das Wesentliche des Subject-Objectiven von der spirituellen Seite auf, während es die Naturphilosophen von der materiellen Seite aufgefaßt hatten. Hiemit ist der zweite Kreislauf vollendet, aber mit dem Gewinne, daß die Totalität überhaupt, das Subject-Objective, das Absolute gesucht wird. Aber die Philosophie ist doch noch zerissen. Diese Entzweiung fordert neue Vereinigung. J. Fr. v. Meyer in Frankfurt und Troplér in Bern haben die Vereinigung vergeblich versucht.

Der Verfasser führt also den Beruf, sich folgende Aufgabe zu stellen (pag. 36):

„Man muß die Subject-Objectivität der Natur-philosophen mit der Subject-Objectivität Hegels vereinigen, und so den Realismus und „den Idealismus, so wie sie heute erscheinen, „nochmals in Eins verschmelzen.“

Diese Verschmelzung nennt er „Univervelle Philosophie,“ deren Grundlegung die vorliegende Schrift enthalten soll.

Nach Bestimmung dieses Zweckes enthält der zweite Theil der Einleitung die kurze Angabe der psychologischen Hülfsmittel.

Das Wesen, welches zum Menschen wird, und in ihm zum Selbstbewußtsein kommt, vermag alles zu erkennen; denn es ist das Göttliche, die Wahrheit selbst, das univervelle All. Eine und Ganze, Gott. Alle Wissenschaften sind daher nur Eine, die Philosophie, die Erkenntnis der einen Wahrheit selbst. Alle Wissenschaften haben nur insofern Gültigkeit, insofern sie als einzelne Momente in einem philosophischen Systeme aufgestellt werden.

Zur Erkenntnis der Wahrheit ist uns die Receptivität (Sinnlichkeit) und Spontaneität (Vernunft) unentbehrlich. Aber Erkenntnis der Wahrheit selbst erlangt nur der, welcher sich zur Vereinigung jener beiden Kräfte, d. h. zur Selbstständigkeit durcharbeitet. Die Wahrheit existiert nur als der unendlich und ewig gegenwärtige, und in vollkommener Harmonie mit sich selbst immer wirkende Gott, nur in ihrer unbedingten Ganzheit, d. h. nur im System. Man muß sie also zu diesem Systeme machen. Die bisherigen Systeme sind nur Producte der receptiven oder der spontanen Erkenntnis, nicht aber der selbstständigen. Diese soll jetzt ihren Anfang nehmen. Man muß aber die Einsichtigkeit der receptiven und spontanen Erkenntnis kennen lernen, oder sich für beide ein Kriterium aufstellen. —

Hiermit ist die Einleitung geschlossen. Es folgen die drei Abschnitte: 1) Kriterium der Erfahrung, 2) Kriterium der Vernunft, 3) Wahrnehmung.

Damit dem Leser Material und Form obiger Zweckausführung leichter vor Augen stehe, setz Referent das von dem Verfasser selbst gelieferte „Orientierungsblatt“ hin.

### Wahrheit = Erkenntnis.

	I. (+)	II. (-)	III. (+)	
	Empirie.	Metaphysik.	Philosophie.	
Montag + a	Substanz	Kausalität	Congruenz	Quantität.
Dienstag - a	Objectivität	Subjectivität	Conjunctivität	
Mittwoch + a	Realität	Idealität	Wirklichkeit	
Donnerstag + b	Notwendigkeit	Apodikticität	Freiheit	Qualität.
Freitag - b	Positivität	Negativität	Limitation	
Samstag + b	Einzelheit	Duplicität	Triunität	
Sonntag +	a b An sich	Weg sich	Für sich.	Relation.

„Die drei Säulen stellen drei Gestalten der ewigen Wahrheit und der ewigen Erkenntnis dar. Die Wochentage rufen die Tage der Schöpfung immer frisch hervor. Der letzte Tag ist der Tag der Ruhe. Es sind drei beharrende Wochen Gottes und sieben Tage seiner unaussprechlichen dreieinigen Offenbarung. Die Zahlen Drei und Sieben sind nicht umsonst heilig und geheimnisvoll.“

Das Material besteht aus den drei subjectiven Kategorien, der Empirie, der Metaphysik und der Philosophie (nach den drei psychologischen Vermögen der Sinnlichkeit, Vernunft und „Selbstständigkeit“ gebildet), und aus den drei objectiven, der Quantität, Qualität und Relation. Die letztere ist die Vereinigung der beiden ersteren. Von diesen hat aber jede drei Momente, das erste ist das Wesentliche, das zweite das Formelle (oder Logische), das dritte das Wesentlich-Formelle.

So bilden sich die sieben perpendiculären Categorien-Abtheilungen, und nach den drei subjectiven Categorien geordnet, die einundzwanzig Grundbegriffe der universellen Philosophie. Die horizontalen Categorienlinien bilden den Zusammenhang, daß die philosophische Categorien stets die Einheit der empirischen und metaphysischen Categorien auf derselben Linie darstellt. 3. B. die „Conjunctivität“ die Einheit der Objectivität und Subjectivität.

Die einfach-schöne und sichere Zeichnung der äußeren Systems-Form entspricht völlig dem Zwecke einer „Grundlage.“ Die drei Abschnitte enthalten nun demgemäß folgende Hauptgedanken:

- 1) Das Kriterium der Erfahrung ergibt das Resultat, daß ihr zwar alle die Categorien der ersten Columnne zukommen, aber dafür diejenigen der zweiten völlig abgeben. Sie erkennt nur den Körper der Wahrheit, nicht deren Seele. Sie erkennt das universelle All, aber nicht als universelles Eine, also auch nicht als universelles Ganze. Sie faßt die Wahrheit als Unendlichkeit, nicht als Ewigkeit, also auch nicht als Allgegenwart auf, also sie erkennt nicht Gott. Sie gibt uns also nur Kenntnisse, nicht Begriffe.
- 2) Das Kriterium der Vernunft ergibt, daß ihr zwar alle Categorien der zweiten Columnne zukommen, aber dafür diejenigen der ersten völlig abgeben. Sie erkennt nur die Seele der Schöpfung, nicht den Körper. Sie erkennt das universelle Eine, nicht das universelle All, also auch nicht das universelle Ganze. Sie faßt die Wahrheit als Ewigkeit, nicht als Unendlichkeit, also auch nicht als Allgegenwart auf, also sie erkennt nicht Gott. Sie gibt uns also nur Begriffe, nicht Kenntnisse.
- 3) Die Wahrnehmung ist die dritte vollkommene Erkenntnisquelle, dem Erkenntnisvermögen der Selbstständigkeit angemessen. Sie enthält die vollständige und sich gegenseitig ergänzende Vereinigung der Erfahrungs- und Vernunftergebnisse. Sie erkennt das universelle Ganze, die Allgegenwart, die Gottheit, und gibt Erkenntnisse.

Das ganze System enthält drei Theile: 1) die wesentliche, 2) die formelle, 3) die wesentlich-formelle Philosophie.

- 1) Die wesentliche enthält: a) die Philosophie der Natur (An sich der Wahrheit); b) des Geistes (Weg sich); c) der Erscheinung (Für sich).
- 2) Die formelle enthält: a) die Philosophie des Wortes (universelle Grammatik); b) des Denkens (Logik); c) des Wortes und Denkens auf einmal, oder in der wirklichen Form, d. h. die Mathesis und Aesthetik.
- 3) Die wesentlich-formelle, die Phänomenologie der Wahrheit, enthält: a) Kritik der Erfahrung (Philosophie des Empirischen); b) Kritik der Vernunft (Philosophie des Metaphysischen); c) Gottes-

wort der Wahrnehmung (Philosophie des Philosophischen).

Die wesentliche formelle Philosophie ist die Begründung des philosophischen Systems, daher ist sie zugleich Schluß und Anfang der Philosophie.

„Dieses System eint also in sich nicht nur die Subject-Objectivität der Naturphilosophen mit der Subject-Objectivität Hegels, sondern auch die ganze Empirie mit der ganzen Metaphysik, und erreicht so die Conjectivität als solche. Es faßt also die lebendige Wahrheit nicht nur in ihrer Blüthe, sondern auch in ihrer Wurzel auf, leistet folglich vielmehr, als es in seiner Einleitung versprach, ja mehr noch, als daß es auf der ewigen Milchstraße der Erkenntniß bloß einen Schritt weiter fort-„schreite.“ (pag. 333.)

Referent hielt sich durch die männlich entschlossene Eigenthümlichkeit der Schrift verpflichtet, dem Leser Zweck, Materie und Form dieses Versuchs in ausführlicher Treue vorzulegen. Weniger getreu läßt sich die innere Kraft, die Energie der Darstellung, in einem kurzen Abrisse darstellen. Das, was man logische Beweisart nennt, findet sich natürlich nicht darin, das widersteht der ganzen Ansicht des Verfassers. Er sagt darüber selbst (p. 314): „Die wahre Philosophie hat für alle ihre einzelnen Momente, welche sie aufstellt, keine einzelnen Beweise, sondern für alle zusammen bloß einen einzigen Beweis, und dieser ist die Erkenntniß des Ganzen.“ (p. 315) „Das Einzelne läßt sich nur formell, nie aber wesentlich beweisen.“ — Dem gemäß findet man nur die Grundbegriffe in kurzen Explicationen aufgestellt, an bildreichen Beispielen der Wissenschaft und des Lebens anschaulich gemacht, und dann die Kategorien der beiden ersten Abtheilungen durch einfache Combination zur jedesmaligen dritten Kategorie umgewandelt. Für die „Grundlage“ mochte das auch immerhin genügen. Dagegen in einer systematischen Ausführung würde der Verf. doch seine eigene Methode (pag. 317: „weder bloß analytisch, noch bloß synthetisch, sondern beides zugleich, oder genetisch“) in Anwendung zu bringen haben. Die bloße Combination ist, um es anschaulich auszudrücken, zu mechanisch, um das Gefühl einer genetisch gebildeten Ueberzeugung zu schaffen. Es müßte sich gleichsam eine chemisch-organische Wickelbarkeit der beiden jedesmaligen Begriffe auf einander darstellen, um die Entstehung der jedesmaligen dritten Kategorie mit klarer Einsicht auffassen zu machen.

Doch, wie gesagt, die Spredigkeit der bloßen Combination ist für die „Grundlage“ um so zulässiger, als einerseits eine so klare Crystalform der Grundzeichnung daraus hervorgeht, und andererseits der Verfasser die spröden Gedankenformen mit den Blumenwinden einer erhabenen Dichtersprache zu umkleiden gewußt hat. Ref. würde den Ausdruck wählen: es sind Hegelsche Begriffe in Jean Paulscher Sprache. Für Jean Paul hegt auch der Verfasser eine besondere Vorliebe und citirt öfters Stellen aus ihm. Daher sagt er auch selbst (p. 321): „Der Styl der wahren Philosophie ist die lebendige Gottesprache, eint daher in sich alle Style der Sprache der Menschheit. Er ist das All, das Eine, und das Ganze aller möglichen Style. Dichterisch und metaphysisch, trocken und empirisch

ist ihm eins, wie die Sache forbert.“ Um dem Leser eine Probe der blühenden Sprache zu geben, wählt Ref. die Apodicticität, d. h. die Vernunft, indem sie gebietet: „Es muß so seyn, und es ist so.“ — (pag. 166) „Die Schöpfung tritt hier auf als die geoffenbarte Vernünftigkeit, die sich selbst entrollende und verlesende Apodicticität, der aus der Unenlichkeit von Schlüssen bestehende und die Ewigkeit hindurch in immer neuen Schlüssen fortlaufende Schluß, als der allmächtige, erhabene und impotente göttliche Sorites. Sie rollt ohne Anfang und Ende immer fort. Ihre Vergangenheit ist ein aufgeschürmter Berg von schweigenden Prämissen und ihre Gegenwart ein sprechender Schluß, der aber augenblicklich verflummt, sich in den letzten Untersatz verwandelt, und so die Zukunft gebärt. Die Willkür athmet überall in ihr, gehorcht jedoch dem unsichtbaren Finger des Sennmüssens. Es ist die thronende Geistesconsequenz, die weiße Vorlesung, ist ein unermessliches, negartig-labyrinthisches, wunderbares Gesecht, worin nur die rothen Fäden der Gottesregierung deutlich hervorleuchten und lesbar sind. Alle Dinge sind die flimmernden Schlüsse, und der Mensch ist der selbstbewusste Sorites, auf dem Gipfel seiner Allmacht. Er habe nur vor der Thätigkeit keine Scheu, und er wird die Weisheit aus sich selbst ergießen.“ —

Diese Sprache schreibt aber ein Pole, der vor fünf Jahren fast noch gar nicht Deutsch verstand. Danach messe man die Geisteskraft neben dem innern Gehalte der tiefen Gemüthlichkeit. Die hoffnungslose Sehnsucht nach dem geliebten Vaterlande klingt an so vielen Stellen durch; dennoch vermag sie nicht das wissenschaftlich hohe Ziel zu verblüthen und nicht den wogenden Strom der fremden Sprache von den blühenden Ufern der Dichtergabe abzulenken. Man muß das Leben in jenen nordischen Ebenen kennen, man muß es als Eingeborne kennen, um seine Gemüthlichkeit zu verstehen und die Macht der Vaterlandsgefühle zu messen, die daraus hervorgeht. Die rauhe schmutzige Natur bringt die Menschen näher aneinander und öffnet das Gemüth an unzähligen Stellen für die Eindrücke der wahren Geselligkeit, wie es die reichgeschmückte südliche Natur nicht kann. Diese Grundlage des polnischen Geisteslebens bildet einen fruchtbaren Boden für die Philosophie. Er kann einst eine allgemeinhistorische Bedeutung für ihre Fortbildung erhalten. Die morgenländische und die abendländische Weltanschauung können sich dort vielleicht zu einer Harmonie vereinigen, wie sie in einer andern Nationalität nicht erschienen ist. Glücklich für Polen, wenn es dieses geistige Gut zum welthistorischen Erbsaße seiner andern Güter erhielt. Auch Athens Philosophie blühte nach dem peloponnesischen Kriege, neben Philipp und Alexander von Macedonien. Wenn aber eine reine Saat das Gedeihen und den Werth der Erndte bedingt, so ist es unstreitig der Verf. des vorliegenden Werkes, der für seinem Vaterlande gewähren kann. Schon aus diesem Grunde wäre die Schrift eine höchst interessante Erscheinung. Aber sie nimmt auch jedenfalls eine ehrenvolle Stelle unter den Producten deutscher Philosophie ein, der sie den Ursprung, das historische Bewußtseyn und die Sprache verdankt.

E. B.

## Der unverwesliche Leib

als das Organ des Geistes und der Sitz der Seelen-Störungen. Eine anthropologische Rhapsodie von Fr. Groos. Heidelberg, bey Karl Groos. 1837. 8. 80 S.

Der Verf. dieser kleinen, aber beachtungswerthen Schrift, dirigirender Arzt der Irrenanstalt zu Heidelberg, gewohnt von Zeit zu Zeit dem Publicum Rechenschaft von seinen Ansichten und Beobachtungen im Gebiete der Psychik und Psychiatrik abzulegen, thut dieß schon seit mehreren Jahren in einer fortlaufenden Reihe kleiner, einzelne Abtheilungen dieser Wissenschaften behandelnder Schriften. Der Faden einer psychologischen Haupt- und leitenden Grund-Idee zieht sich unverkennbar durch sie sämmtlich hindurch. Dem besonnenen Schachspieler gleich verfolgt der Verf. zwar seinen festen und eigenthümlichen Plan, Zug für Zug, ohne jedoch den Plan und die Züge des Gegners dabey jemals aus den Augen zu verlieren. Die späteren Knüpfen sich fast immer an den Inhalt der früheren Schriften an, vervollständigen und berichtigen denselben oder suchen ihn, wo es nöthig und thunlich ist, gegen etwanige gemachte Einwendungen möglichst zu rechtfertigen. In dieser seiner neuesten Schrift aber finden sich einige der gewichtigsten Frage- und Lösungspunkte der Psychologie so bündig erörtert und auf eine so scharfe und entscheidende Spitze von denselben gestellt, daß eine bestimmtere Ausgleichung der annoch entgegen gestellten Ansichten nicht mehr schwierig und sehr fern zu seyn scheint.

Wie wünschten allerdings, daß der Verf. einen den Inhalt richtiger bezeichnenden Titel für diese Schrift gewählt haben möchte, weil wir befürchten, daß der Ausdruck des „**unverweslichen Menschen-Leibs**“ leicht Mißverständniß erzeugen und Erwartungen bey vielen Lesern anregen dürfte, welche sich dennoch beim Lesen des Büchleins selbst nicht ganz befriedigt finden werden und vielleicht nie völlig befriedigt werden können.

Der Verf. tritt zuvörderst einer nur kürzlich angesprochenen, allerdings auffallenden und merkwürdigen Behauptung Blumröders: „der Glaube an persönliche Unsterblichkeit gefährde den Adel der Seele und strebe mit demselben sogar in feindlichem Widerspruch“; aus welcher die Immoralität des Glaubens an Unsterblichkeit folgen würde, bestimmt und mit tüftlichen Gründen entgegen. Diese Gründe aber werden ohnfehlbar in dem Gemüthe eines Jeden, der sich selbst einigermaßen klar geworden ist, vollen Anklang finden.

Wenn er sodann — hauptsächlich gegen Dr. Möller — die Priorität seiner Darstellung der (relativen) Verschiedenheit von Leib, Seele und Geist, als drey eigentlichen Urfactoren und Haupt-Bestandtheilen des menschlichen Wesens, als früher erkannt und nachgewiesen, für sich in Anspruch nimmt; so dankt uns dennoch, daß die philosophische Unterscheidung und Trennung dieser Begriffe, — so oft auch, selbst noch bis auf die neuere Zeit, der sehr wesentliche Unterschied von Seele und Geist, noch immer verkannt oder mißverstanden werden mag, — doch im Grunde nichts weniger als neu, sondern schon uralte sey. Das sinnlich-animalische Princip im Menschen, das sich zu dem höheren Geist, wie das niedere Thier zu dem höheren Menschen verhält und dem Verf., wie auch uns, als das Organ erscheint, welches das geistige Menschen-Leben mit dem

somatischen zur lebendigen Einheit verknüpft und beides innig mit einander verbindet, — diese — Substanz oder Potenz? — die er hier mit dem, wie uns scheint, nicht glücklich gewählten Ausdruck: „**des unverweslichen Menschen-Leibes**“ belegt und dann wieder: den Urtypus, die Urform, den elementarischen Urkeim des menschlichen Individuums\* nennt, ist wohl schwerlich, dem Wesen nach, von dem Begriffe der Platonischen *Ψυχή* bedeutend verschieden; so wenig als sich der höhere Menschengeist oder das überfinnliche, in der gesammten Menschheit überhaupt waltende und lebende Vernunft-Princip, — dieser eigentliche Gott in dem Menschen — von dem *νοῦς* der griechischen Sprache und Philosophie unterscheidet. Der Sinn des griechischen *πνεῦμα* hingegen, welches zur gewöhnlichen Bezeichnung des Geistes und der Geisteslehre (Pneumatologie) dient, enthält den Nebenbegriff des Athmens und Hauches (spiritus), sonach auch den der materiellen Bewegung und des physischen Lebens, aber nicht den des reinen Denkens an sich; obgleich auch der geistige Act des Denkens als intensive Bewegung betrachtet werden muß und namentlich von der Hegel'schen Schule so genommen wird. Ist aber die genauere Unterscheidung von Seele und Geist nichts weniger als neu oder dem Verf. eigenthümlich; so tragen doch seine früheren und hier wieder von neuem aus diesem Unterschiede abgeleiteten Folgerungen und die praktische Anwendung, welche er davon auf die höchsten Angelegenheiten des denkenden Menschen und auf die Psychiatrik insbesondere macht, unverkennbar den Stempel der Originalität und Wahrheit und erhalten durch ihre Consequenz für jeden gebildeten Denker ein bedeutendes Interesse. Ob aber Gegenstände, wie die nachstehenden: Beschaffenheit des eigentlichen Bandes (copula) zwischen Materie und Geist und der Zusammenhang oder die innere Einheit derselben; — ursprüngliche oder successivo gewordene Freiheit und Selbstständigkeit des Denk- und Willens-Actes im Menschen; — absolut oder relativ Böses im Menschen; — Sitz und Grund-Ursache der Seelen- und Geistes-Störungen; — die Theorie des positiven und willkürlichen Strafrechts und der Criminal-Justiz, vom philosophischen Stand- und Gesichtspunct aus; — und vor allem endlich: positive Gewißheit persönlicher Unsterblichkeit und einer vergeltenden Fortdauer in einem anderen Leben nach dem Erdentod, — ob diese der Metaphysik und philosophischen Speculation angehörenden Gegenstände, welche in der neueren Zeit von Seiten der Wissenschaft in Beziehung auf das Leben mehr als jemals untersucht

\* In einem gleichzeitig erschienenen, trefflichen Werke: — der historischen Entwicklung der speculativen Philosophie von Kant bis Hegel von G. M. Chalybäus. Dresden, 1837. 8. — findet sich nachfolgende bemerkenswerthe Stelle, welche den Urkeim des Bildungs-Triebes, welchen der Verf. hier bloß auf das Wesen des Menschen bezieht, auf das Universum und die ganze Schöpfung überträgt: „wie in jedem einzelnen Keime, so wirkt die Natur auch im großen Ganzen. — Wie dort im Keime des Eies eine blindwirkende Kraft, ein Trieb angenommen wurde, der, gleich als ob er seine Bestimmung kannte, sich zur Wirklichkeit organisierte; so ist auch hier im Ganzen eine Natur vor der Natur, d. i. ein Trieb vor der Gestalt, ein Gesetz vor der Ausföhrung, eine Möglichkeit vor der Wirklichkeit, „also eine natura naturans vor der natura naturata.“

und besprochen worden sind, von irgend einem Denker und Forscher jemals mit mathematischer Bestimmtheit und apodiktischer Evidenz ausgemessen, philosophisch ergründet und dadurch zur Potenz des reinen und absoluten Wissens in uns erhoben werden dürfen, möchten wir schier bezweifeln. Zu aller Zeit werden jedoch wiederholt fortgesetzte Untersuchungen dieser Gegenstände nothwendig bleiben, das Interesse gebildeter Menschen für sich in Anspruch nehmen, dem Ziel reinerer Wahrheit und höherer Gewisheit immer näher führen und dadurch nicht bloß den sittlich-intellektuellen Fortschritt der Menschheit überhaupt fördern und diese höher veredeln, sondern auch die äußere und materielle Wohlfahrt des Menschenlebens verhältnißmäßig höher steigern. —

Seitdem der kön. preuß. Minister von Aneillon in einem bereits vor mehreren Jahren erschienenen, anerkannt classischem Werke: zur Vermittelung der *Extremes*, diefe als das höhere Princip aller wissenschaftlichen Forschung aufgestellt und es der feinigsten auf eine musterhafte Weise nach mehreren Richtungen hin zum Grunde gelegt hat; ist es immer mehr als der universellste Standpunkt und als die umfassendste Aufgabe für Wissenschaft und Leben anerkannt und von denkenden Männern mehrseitig in Anwendung gebracht worden. Die Wichtigkeit und Wohlthätigkeit dieses in der Körper- und Geistes-Welt gleiche Anerkennung gebietenden Gesetzes der Vermittelung leuchtet dem gesunden Menschenverstand zwar schon von selbst ein. Auch läßt sich gar nicht verkennen, daß dasselbe ohnfeindlich als das Grundprincip der positiven christlichen Lehre angesehen werden müsse, wenn anders der Ausdruck der heiligen Schrift: „es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen“, d. i. zwischen der höchsten Vernunft des absoluten Geistes und der sinnlichen Anschauung und der endlichen Vernunft im Menschen, Wahrheit und zwar eine unbedingte und allgemeine Wahrheit ist.

Die praktische Anwendung dieses Princips im wirklichen und äußeren Menschenleben findet jedoch nicht selten bedeutende Schwierigkeiten, die sich im Laufe der Zeiten mit dem fortschreitenden Gange der Dinge zwar ohnfeindlich vermindern, vielleicht aber niemals ganz und vollkommen aufheben lassen werden. —

Wir wissen nicht, ob der Hr. und Dr. Möller zuerst oder allein dieses Princip zur Bestimmung und Berichtigung der Theorie der Psychiatrie, als z. B. der Bestimmung des eigentlichen Sitzes und der Ursache der Geistesstörungen zu benutzen versucht und in Anwendung gebracht haben. Daß es von ihnen aber nicht ohne realen Gewinn für eine nach Theorie und Praxis zu den ausgezeichnetesten Wohlthaten der neueren Aera gehörenden Wissenschaft geschehen sey, liegt unzweifelhaft am Tage. Die im Denken und Handeln der Menschen vorwaltende und überwiegende Einseitigkeit sehen beyde als den Krebsgeschwaben unserer Zeit in aller und jeder Beziehung, in wissenschaftlicher, sittlicher und politischer Beziehung an. Diese Einseitigkeit wollen sie vor allen Dingen möglichst entfernt und verbannt sehen, wenn es in der That und Wahrheit immer heller und besser in der Welt und mit den Menschen werden soll. Wer konnte und wollte die Wahrheit dieser Behauptung im Allgemeinen leugnen? — Wer das Bestreben nach harmonischer Einheit in Sinn und That überhaupt mißbilligen? — Dennoch aber will uns bedünken, daß ein Verlangen, jede Einseitigkeit zu entfernen, gewissermaßen selbst als ein einseitiges angesehen

Jah 1838, Heft 5.

werden könne oder vielmehr müsse; einseitig um bewilligen, weil ja jedes menschliche Bestreben, — sey es ideell oder reell, — stets seine bestimmte Grenze und Schranke in einem mit Nothwendigkeit gegebenen Gegensatz neben sich oder in einem Höheren über sich findet, und vermöge dieser Beschränkung neben oder über sich den nothwendigen Charakter der Einseitigkeit durchaus nicht verleugnen oder ganz aufgeben kann. —

Bekanntlich ruft jeder positive Satz im denkenden Geiste mit Nothwendigkeit seinen Gegensatz hervor. Wir sind und fühlen uns gezwungen, von zwey direct sich entgegensetzenden Behauptungen nur die eine als ganz wahr anzuerkennen, und müssen die andere mit Nothwendigkeit als Irrthum ansehen und für unwahr halten. Dieß ist das dualistische Gesetz des Widerspruchs, das sich im Gebiete der Intelligenz und des Verstandes ohne Ausnahme von uns allgemeine Anerkennung erzwingt; — ein Gesetz, das in der Sinnen- und materiellen Welt in einer untergeordneten Potenz als Polaritätsgesetz austritt, im Reiche der Organismen insbesondere in einer höheren Potenz als Geschlechts-Differenz nach einer manichäisch modificirten Stufenfolge wiederholt, die sich in der Zeugung, Ehe und Begattung zur ursprünglichen Einheit und Indifferenz schöpferisch angleicht. Wahrheit aber, die ausschließend dem Gebiete des Geistes angehört, wohnt für uns in keinem Extrem ganz (absolut); wohl aber findet sich auf jeder Seite immer etwas (relativ) Wahres. Nur durch Vergleichung und Ausgleichung beyder Seiten, wenn sie von einem höheren Standpunkt aus unternommen wird oder durch gegenseitige Durchdringung und Wechselwirkung derselben, erzeugt sich derjenige Grad von Realität menschlicher Erkenntniß, welcher sich der absoluten Gewisheit möglichst nähert. Völlig erreichen wird er dieselbe aber nie. Dieß ist um bewilligen unmöglich, weil der menschliche Geist sich keine Wahrheit zu denken vermag, welche deren Gegensatz so vollkommen einschloße, daß sie ihn gänzlich absorbirte oder vernichtete.

Der Mensch vermag dieß eben so wenig, als er den Begriff des reinen oder absoluten Geistes ohne irgend eine äußere Kraft-Außerung oder ohne materielles Substrat festzuhalten und zu erfassen vermag. Absolute Wahrheit aber ist reiner Geist. Dasselbe muß aller und jeder Schranken, auch der ideellen Beschränkung selbst durch ihren Gegensatz entbehren; oder sie darf gar nicht sagen wollen, daß sie wahrhaft absolut sey. Hieraus aber folgt unabweisprechlich, daß das Loos und die Bestimmung des Menschen ewig nur Wahrscheinlichkeit, — nur relative Wahrheit, nie absolute sey oder werden könne.

Reine Wahrheit ist nur in Gott, ist vielmehr die Gottheit, die Alles im Allen bleibt (*ἐν καὶ πᾶν*) selbst. Einseitigkeit, Abhängigkeit und Subjectivität menschlichen Strebens, Denkens und Thuns ist ein allgemeines Gesetz der Menschen-Natur. Vergeblich bleibt Verlangen und Erwartung, der Mensch solle und werde sich jemals dieser Schranke von Subjectivität und Einseitigkeit völlig entziehen. In dieser Welt gegenseitiger Anregung und fortwährenden Kampfes würde ohne einen gewissen Grad von Einseitigkeit nicht nur keine Selbstständigkeit und Freyheit des individuellen Menschen mehr denkbar seyn; sondern auch physische und moralische Existenz und die Möglichkeit des Lebens selbst problematisch werden. Und nur aus diesem Grunde erlaube ich mir die obige Anforder-

zung, sich jeder Einseitigkeit möglichst zu entziehen, selbst ein einseitiges und unmögliches zu nennen; was jedoch dem scharfsichtigen Verfasser selbst in diesem Umfang gewiß nicht in den Sinn gekommen ist. Nur dann, wenn Gedanke und That, Streben und Forschen des Menschen die von Vernunft und Pflicht deutlich genug bezeichnete Grenze auch nur um ein Haar überschreitet, wird diese Ueberschreitung stets und ohne Ausnahme den allgemeineren Fortschritt hemmen und demselben nachtheilig und zerstörend werden. Einseitigkeit ist und bleibt zwar das Loos des Menschen; aber Einseitigkeit ist nicht die Bestimmung der Menschheit. Der Mensch soll vielmehr dieselbe ununterbrochen in und außer sich bekämpfen. Dieser Kampf ist im Grunde aber nichts anderes als das ununterbrochene Bestreben der Vermittelung der Extreme und Gegensätze zur Eintheilung, — ununterbrochene Ausgleichung des Ungleichen. In besonderer Beziehung auf das äußere und gesellige Leben und die gesetzgebende und vollziehende Gewalt im Staate heißt diese Vermittelung der Gegensätze **Gerechtigkeit**.

In einer Zeit, wo Parteygeist, Egoismus und Einseitigkeit sich in der Wissenschaft wie im Leben offenkundig zu schroff ausprägen, so daß am Ende die Menschheit in zwei feindliche Hälften zu zerfallen droht, denen jeder die möglichst unbeschränkte Herrschaft, die Fülle äußerer Güter und des Besizes, die an den Reichtum geknüpft und durch denselben vermittelten Genüsse und die Mittel und Künste des Gewinns und Erwerbs vielleicht noch höher stehn und mehr gelten, als die ewige Wahrheit selbst, die freilich nicht immer im Sinne des Menschen nicht allen und nicht überall nützt; — wo man entweder zu viel oder zu wenig, — alles oder nichts glaubt, — alles wissen will und erklären und begreifen zu können wähnt, oder mit allzugroßer Genügsamkeit die Realität des Wissens nur auf dasjenige, was zu des Leibes Nahrung und Nothdurft gehört, beschränkt, — hier alles Selbstdenken und selbstständiges Prüfen und Forschen lieber ganz verhorrescieren möchte, dort die Thatfachen der Geschichte selbst zur leeren Nothje und subjectiven Idee ohne objectiven Gehalt sublimiert; wo man folglich den Extremen offenbar mehr zubüdt als gut, recht und vernünftig ist, und wo nun diese, sehr begreiflicher Weise, statt näher zusammenzurücken und sich endlich in der Indifferenz zu versöhnen und auszulösen, immer mehr auseinander weichen, so daß der verbünntere Faden am Ende reissen muß, — in einem solchen Zeitraum wird das besonnene Bestreben denkender Menschen ungemein wohlthuend, welche mit Ernst an den Werth und das Wohlthätige eines versöhnlichen Prinzips im Leben wie im Wissen mahnen und mit unabweisbaren, aus den Tiefen der Speculation, wie aus der Quelle gesunden Menschenverstandes, und den belehrenden Warnungen und dem Gericht der Menschen-Geschichte selbst erholten Gründen, die Zeitgenossen davon zu überzeugen suchen, daß nie in hartnäckiger Verfolgung einseitiger Interessen oder im starren Festhalten vorgefaßter Meinungen, welche über lang oder kurz jedem Theil verderblich werden müßten; sondern nur in dem friedlichen Einheitspunkt streitender Gegensätze und in Erhaltung und Beförderung des Gleichgewichts, — als des bezeichnendsten Symbols höheren Rechts, — daß mit einem Wort in der goldenen Mitte, — man möge sie nie mit Mittelmäßigkeit verwechseln — Wahrheit und Leben, Friede und Recht verhältnismäßig am sichersten zu finden sey, und daß dieser nach den beyden Hauptrichtungen alles Seyns und Daseyns, — nach innen und außen, — all-

mählich fortschreitende Zustand durch menschliche Bestrebungen wohl gefördert, wie verögert, nie aber im Ganzen verhindert werden könne.

Dieses wissenschaftliche und ächt constitutionelle Streben nach der rechten und gerechten Mitte, — denn der Wissenschaft nützt ein constitutionelles Princip nicht minder als der Politik, — glaubt Ref. in den sämtlichen Schriften des Verf. und dieser plyphologischen Rhapsodie insbesondere deutlich erkannt zu haben und sie deshalb jedem Freund der Wissenschaft, Wahrheit und Humanität gewissenhaft anempfehlen zu können. Die Förderung der Humanität aber in ihrem ganzen Umfang und nach allen ihren so verschiedenen Richtungen und Beziehungen ist oder sollte wenigstens immer Hauptzweck und das letzte Ziel alles menschlichen Forschens, Wissens und Bestrebens seyn und bleiben.

A. M. Tauscher.

## Transactions

of the royal asiatic society of Great Britain and Ireland.  
London Parbury. 4.

Dieses Werk enthält eine große Menge Abhandlungen über ganz Ostindien und China aus allen Fächern: Geschichte, Geographie, Landesbeschaffenheit, Sitten, Handel, Krankheiten, Kunstgegenstände, Philosophie, Sprachen, Inschriften, Beobachtungen des Barometers in sehr verschiedenen Gegenden, meteorologische Register und hin und wieder etwas Naturhistorisches.

Band I. 1827. 640. 11. Tafeln meist mit orientalischen, besonders chineßischen Schriften.

S. 49. W. Moorcroft, über das Purik-Schaf von Katak.

Es wird nicht größer als ein starkes Lamm von fünf oder sechs Monaten, steht aber in Menge und Feinheit der Wolle und in Schmackhaftigkeit des Fleisches keinem andern nach. Des Nachts kommt es unter Dach, des Tages nährt es sich von kätlichen Kräutern der Granitfelsen. Angebaut wird Weizen, Gerste und Lucerne, welche aber nur 2 Monate stehn und dann die Stoppen von Kühen, Ziegen und Eseln so abgefressen werden, daß man bald keine Spur mehr sieht. Das Schaf wird so zahm wie ein Hund, steckt den Kopf in die Häfen, sucht die Wollfamen auf, leckt den Thee aus den Tassen und nimmt Brod oder Wehl aus den Händen. Die Weiber bleibsel des schwarzen Thees, der hier sehr viel gebraucht wird, werden ihm zur Beute. Des Winters füttert man sie mit Heu von Lucerne und sammelt den Dung sorgfältig. Es wirft des Jahres zwey Lämmer und wird zwey Mal geschoren; Wolle 3 Pfd., gibt gute Shawl. Man könnte es vortheilhaft in Europa einführen, weil es mit dem schlechtesten Futter füttsel nimmt.

Aus Casmere kommen bräunliche Shawls mit hirschartigen Haaren, welche eine von den zahllosen Arten der wilden Ziegen liefert, die auf den Bergen wohnen, besonders der

Provinz Changhai und Khoten. Der Preis ist sehr hoch, weil die Ziege nicht gezähmt ist, obgleich es leicht geschehen könnte. Sie trägt jedoch wenig Wolle.

In den östlichen Theilen des Himalayas an der chinesischen Gränze gibt es ein wildes Pferd, *Equus kiang*, näher dem Esel verwandt als dem Pferde, aber verschieden vom Gurchar von Sina, welcher viel schöner und lebhafter ist, als der gemeine Esel.

S. 119. G. H. Nöthden, über den Banyanbaum (*Ficus indica*), wovon die Griechen und Römer reden und der den Begleitern Alexanders so wunderbar aufgefallen ist. Theophrast erwähnt seiner zuerst unter dem Namen der indischen Feige, Lib. I. cap. 12., Lib. IV. cap. 5., und beschreibt schon seine wunderbaren Wurzeln. Sein Schatten bedeckt 2 Stadien, was ganz richtig ist; denn ein Stadium beträgt 600'. Plinius hat aus Theophrast geschöpft. D. Curtius, Strabo, Arrian sprechen auch davon; Diodorus Siculus scheint aber unter dem großen indischen Baum die Fächer-Palme zu verstehen.

S. 282. W. Ainslie, über die Elephantiasis in Indien.

S. 343. Gerard, über das Thal des Setleyflusses im Himalaya; Höhen u.dgl.

S. 543. St. Johnston, über den Handel von Ceylon.

Chank ist *Voluta gravis*. Die Hauptbank gehört der englischen Regierung und liegt an der Nordwestküste von Ceylon, etwas nördlich von der Insel Manar. Die Taucher holen sie gewöhnlich  $3\frac{1}{2}$  Faden tief. Ihre Menge ist so groß, daß die Regierung die Fischerei während eines Jahres für 60,000 ceylonische Dollar verpachtet. Eine Menge dieser Schalen werden nach allen Theilen Indiens, vorzüglich nach Bengalen verführt, wo sie in Ringe von verschiedener Größe gesägt und von den indischen Weibern als Bierath an Armen, Füßen, Beinen und Fingern getragen werden. Sie stehen auch bey den Hindus in religiösem Ansehen, und werden daher in ihren Tempeln und bey ihren Feyerlichkeiten gebraucht.

Perlschalen werden sogar mit Gold aufgewogen. Da sie nicht so tief liegen wie die Perlmuscheln, so gewinnen die Taucher mehr davon.

Die vorzüglichste Perlbank, welche der englischen Regierung gehört, liegt längst der Westküste von Ceylon, etwas südlich von der Insel Manar. Die ostind. Compagnie hat eine Chank-Fischerei zu Killekarre und eine Perlscherei zu Tuticoreen, beyde an der Südküste von Indien, Ceylon gegenüber. Als die Mahomedaner dieselben betrieben, fanden sie unter einer Aufsicht, was sehr vortheilhaft war. Sie wurden seit den ältesten Zeiten betrieben, und ich halte Killekarre für das Colchis am Periphus des erithräischen Meeres, wo auch die Perlscherei erwähnt wird. — Er spricht noch von dem Anbau des Reises, des Indigos, von der Chaya-Wurzel (*Oldenlandia* und *Bellata*) zum Rothfärben, der Palmyra (*Borassus flabelliformis*), der Kokosnuß, Areca-Nuß, dem Sappan, Zinnet und dem Elephanten.

Band II. 1830. S. 579 und 127 mit vielen Tafeln, meist Bögen vorstellend, ausgeschnitten in Tempeln.

S. 52. W. Ainslie, über die Pocken, ihre Einimpfung und die der Kuhpocken in Indien.

77. J. Hodgson, Landwirtschaft in Carnatic der indischen Halbinsel.

371. B. Dorn, Beschreibung eines alten arabischen Himmelsglobus.

Das Uebrige besteht in Beschreibungen und Abbildungen von Bildern im Tempel von Ellora und in vielen Untersuchungen über Sprachen, Ruinen, Sitten, Geographie usw. Darunter auch eine Abhandl. von W. Humboldt über die Verwandtschaft der orientalischen Sprachen.

Bd. III. 1836. S. 588 und 98 mit vielen Abbildungen.

S. 185. J. Low, über die weißen Elephanten.

Manche haben die Wirklichkeit der weißen Elephanten bezweifelt und geglaubt, die Könige von Siam ließen sie färben, um den Fremden etwas Sonderbares zu zeigen. Die Sache ist aber ganz richtig; in den Ställen des Königs von Siam sind wirklich solche Elephanten, welche man wohl weiß nennen kann, obgleich sie eben nicht rein weiß sind. Crawford sagt: er habe 6 dergleichen in den Ställen des Königs gesehen, mehr als man je vorher beziffert hatte: sie fallen zwar etwas ins Fleischarbene, aber doch nähern sie sich mehr der weißen Farbe als ich erwartet habe. Uebrigens waren sie so groß wie die andern, stark und gesund. Ihre Seltenheit ist Ursache ihres hohen Werths. Man hat daseibst auch einen weißen Affen, *Mission to Siam* p. 96.

In Hindostan habe ich nie einen weißen Elephanten bemerkt.

Ob sie eine eigene Gattung ausmachen, bleibt unentschieden. Im indischen Archipelag findet sich der weiße Büffel, ein sehr kräftiges Thier und eine vom schwarzen Büffel verschiedene Gattung. Die Malayen halten sein Fleisch für ungesund. Kennball sagt in seiner Geschichte des wilden Schaffs, daß bey allen Thieren manchmal weiße Stücke vorkommen, so bey Ochsen, Hirschen, Raben, Spaken, und selbst bey den Negern. Deym weißen Büffel ist es aber wohl kein kranklicher Zustand.

Nach dem eigenen Geständniß der Siamesen gibt es keine ganze Heerden von weißen Elephanten, sondern es werden dergleichen nach langen Zeiträumen einzelne unter den gemeinen oder schwarzen gefangen, in den Provinzen Cambaya und Laos, und daher Könige der Herde genannt.

Unter den weißen Elephanten, welche 1823. in des Königs Stall stunden, war einer ein Weibchen.

Die Neu- und Goldgier der Siamesen hätte sie gewiß angetrieben, diese Art zu vermehren, wenn sie nicht für heilig gehalten würde, und man daher fürchterliches Unglück über das Land zu bringen glaubte, wenn man sie unter einander bespringen ließe. Der Duihoch Stand in der Nachbarschaft der Pinzg Wallis-Insel zieht sich seine Elephanten selbst.



Die Verehrung gegen die weißen Elephanten ergibt sich am besten aus der Art, wie man sie behandelt. Demjenigen, welcher von Cambapa gebracht wurde, schickte der König von Siam Hofleute entgegen, um ihm bey seinem Eintritt in seiner Majestät Land Glück zu wünschen. Dann wurde er begrüßt von einer Deputation der Vornehmen der Stadt Dan Houla-man. Die nächste Station war Sala Kru, dann Phihang-Ding, wo der Gouverneur seinen Glückwunschs-Besuch machte; dann kam wieder eine Stadt, dann Baphong, wo der Gouverneur dasselbe that. Nun machte er noch 3 Tagereisen, und dann kam der König dem heiligen Thier selbst entgegen. Er hält sich daher selbst für niedriger als den Elephanten. Von da wurde er in die Hauptstadt Bangkok geführt und Johann ein prächtiges Fest im Freyen vor dem Palast gegeben.

Alle drey Monat widerfährt ihm an einem bestimmten Tag die Verehrung der Frommen. Die höchsten Priester leiten die Cerimonien und sprechen eigens dazu eingerichtete Gebete aus den Wallbüchern. Sie bestehen vorzüglich in Wünschen für ein langes Leben dieses Elephantenkönigs, und während der Zeit sprengen die Priester Weihwasser auf seinen Leib.

Der neu angekommene Elephant wird von den Priestern geweiht und kommt dann in den Elephanten-Stall, wo er eigens für ihn erhobenen Steuern ernährt wird, und nur herauskommt zur nothwendigen Bewegung oder zu Processionen.

Der glückliche Jäger darf eine gewisse Menge Geld neh-men von einem Haufen Gold und einem Haufen Silber.

Man sagt, der König reite nie auf einem weißen Elephanten, weil der Rang von beyden gleich sey. Ich besitze aber ein chinesisches Gemälde, in welchem ein Söke auf einem reitet.

W. Jones beschreibt die 8 Götzen, welche die 8 Viertel der Welt bewachen, als geboren auf Elephanten.

Unter den sieben Kostbarkeiten, welche dem Barommachak gehören, befand sich der berühmte Diamant-Elephant.

Dem König Phra-Sawat träumte, es fälle ihm eine Lustblume in die Hand. Sein Wahrsager sagte ihm, er soll in den Wald gehen, um eine Prinzessin zu suchen. Er fand und heirathete sie; er wurde aber am andern Tage von einem Jäger getödtet und von seinem Schwiegervater mit heiligem Del wieder lebendig gemacht. Nun suchte er auch, mit solchem Del versehen, seine Frau, fand aber einen weißen Elephanten, welcher so leben von einem Schwarzen getödtet worden war. Er machte ihn durch das Del wieder lebendig, gewann einen Sieg und ritt dann darauf zu einem Tempel.

Nach Maurice bezeichnen Männer auf Elephanten die Fortschritt Crishnas durch die Thebaide und Aethiopien. Nach Wilford strömte der Nil aus den Tempeln eines großen weißen Elephanten, welchen Crishna nach einem Kampf von 6 Tagen erschlug; aus dem Kopf sprang eine schöne Vafsha.

Wiswa, der Sohn von Kamadeva, sah im Himala einen großen, weißen Elephanten mit 4 Haazähnen; er erschlug ihn, und dann sprang aus dem Leibe eine schöne Jungfrau, nachdem sie vorher das Ansehen einer riesenhafteu Kafscha angenommen hatte.

Gesonchoris, Hauptmann der Elephanten, eroberte die

Welt. Nach Manethon bestand die 5. Dynastie von Aegypten aus Königs-Elephanten.

Es gibt unter den Menschen in diesen Ländern Albino, in Siam, Pegu und Patani; ich sah einen solchen Malaper auf der Insel Pinang oder Prinz von Wallis-Insel. Er war keineswegs schwächlich, weder an Leib noch an Geist, 40 Jahre alt, 5 1/2' lang. Seine Haut glich der eines rothhaarigen Europäers; er hatte bläuliche Augen, silberweißes Haar und kurzes Gesicht; war Schullehrer, hatte Kinder gleich den Malapern, aber zwey ebenfals weiße Schwestern.

Man hält diesen Zustand auch hier für einen Mangel in der Organisation.

S. 379. General-Major Hardwicke, über die Schafesser in Hindostan, mit einer Tafel in Folio.

Es gibt wenige, welche es aus Charlatanerie thun. Es sind kleine Schafe von Daab, wovon das Viertel nur 8—9 Pfund wiegt. Zuerst faßt er die Haut des Rückens mit den Zähnen und wirft das Schaf hinter sich; dann kniet er nieder, reißt ihm mit den Zähnen den Bauch auf, schafft die Därme heraus, saugt das Blut und sieht sich dann um, ob ihm Befall geläufig werde. Dann schält er mit den Zähnen das Fell ab, frisst alles Fleisch auf, und fragt sodann, ob er noch eines verzehren soll. Gewöhnlich verschlingt er zwey hinter einander.

S. 405. Oberstleutnant Sykes, Beschreibung des wilden Hundes der westlichen Ghats. 1 ill. T.

Die einzige Beschreibung eines wilden Hundes von Ceylon hat Vosmaer gegeben. Die gegenwärtige ist größer und hat einen buschigen Schwanz.

Der Dhole von Ostindien und Südafrika gleicht dem halb gezähmten Dingo von Neuholland, hat aber keinen buschigen Schwanz, aber eine hellrothe Farbe wie der der Ghats. Der Dingo hat einen langen Kopf wie ein Fuchs und gleicht sonst dem Schäferhund, welchen man für denjenigen hält, der dem wilden am nächsten steht. Der Dingo ist 2 1/2' lang, 2' hoch, hat Stachel- und Wollhaare und ist dunkel gelbbraun, unten heller.

Der meinige heißt Colsun (Canis deccanensis) und einer wurde an der Quelle des Bhima in den westlichen Ghats im Mai 1828, erschlagen, weil er sich an einem Hirsch ganz voll gefressen hatte und daher nicht fliehen konnte. Der Kopf ist lang und schmal, ebenso der Leib; die Glieder dagegen sehr stark, nebst den Beinen, Hals lang. Der Ausdruck des Gesichts glich einem verdrießlichen Pariah-Hund; Iris braun, Schloch rund, Ohren groß, aufrecht, oben breit, mit etwas abgerundeten Spitzen, innwendig weißlich behaart; der hintere Rand ist doppelt, wie beim Haushund. Vorn 5 Zehen und hinter dem Handgelenk ein horniger Fortsatz wie beim Schakal und bey manchen Hunden; Klauen kurz, stark und schwarz. Färbung glänzend roth, unten etwas heller, Schwanzspitze schwarz; der Pelz besteht aus Stachel- und Wollhaaren, die letztern sehr kurz und nicht kraus.

Kopf bis zwischen die Ohren 7 3/4" lang, 3 1/2" breit; von den Ohren bis zur Schwanzwurzel 26", wovon der Hals 8,



Schienbein  $10\frac{1}{2}$ , Behen 2, Schwanz 11; ganze Länge sammt dem Schwanz  $3' 8\frac{3}{4}''$ , Höhe  $17''$ .

Sie sind sehr selten.

Die Einwohner kennen wohl diesen Hund in ihrem Buschwerk, wissen aber wenig von seiner Lebensart; er jage in großen Rudeln den Tiger, lasse den Harn auf den Schwanz und spritze ihn dem Tiger in die Augen, wodurch dieser geblendet und endlich überwunden würde.

Daß sie in Rudeln von etwa 10 Stück gehen und jagen, haben auch zweien meiner Jäger gesehen. Er findet sich auch in dem Gebüsch auf den Hügeln bey Gittur im südlichen Lande der Mahratten. Bey Kirgarh hat man auch ein Rudel hinter einem wilden Büffel her gesehen. Auch findet er sich in den Gebirgen Nilagiris. Der Hauptmann Dakes hatte einen lange Zeit, konnte ihn aber nicht zähmen.

Th. Baber setzt hinzu: Williamson hat ihn beschrieben in seinen *Oriental Field sports*; er ist auch häufig an der Westküste von Indien und im District von Malaghat immer in Rudeln von 30—60 Stück, und oft wurden uns Ueberbleibsel von Schweinen und Firschen gebracht, welche von ihm getödtet worden. Die Eingebornen halten es für eine Thatfache, daß sie Tiger und Chitas tödten. Sie finden sich wirklich in den Nilagiris, aber nur in den westlichen Theilen. Mir selbst folgten sie einmal zwischen dem Fuß Paicitra und Nabadibot, 9 englische Meilen weit, und hätte ich nicht mehrmals meine Pistolen abgefeuert, so hätten sie mir gewis einige Hunde geraubt. Ich bekam einige mal Junge, konnte sie aber nur 3—4 Wochen erhalten, weil sie zu wild und scheu waren. Sie fraßen nur bey Nacht und dann sehr viel. Ihre Klauen sind nicht wie beim Wolf und Schakal gebildet, sondern mehr wie bey den Katzen; daher greifen sie die Augen an und reißen sie aus.

H. Bowler fügt bey:

Der Golsun ist auch gemein in dem District von Hyderabad und in den meisten Theilen von Deccan, auch längs der maldiven Gegend von Ellur und Rajamahendri, in Ganjam und an der östlichen oder Coromandel-Küste. In Hindostan heißt er Tangali Cutta, in Telugu Naxvi Euca; beydes bedeutet wilder Hund. Sie jagen in Rudeln und sind ziemlich schnell. Auf einer Reise in Ganjam sah ich eine Antilope durch das Gesträuch hüpfen, dicht verfolgt von einem Duzend dieser wilden Hunde; sie sprang endlich in Wasser und die Hunde wurden durch Schießen vertrieben.

Der Major Perw schoß zwey im District Rajamahendri und gab mir davon folgende Beschreibung.

Färbung röthlich braun; Haar etwas länger als beim Pariah-Hund; Schwanz buschig mehr wie bey Schakal als Hund; Ohren mehr rund als bey den Hunden, ziemlich wie bey den Katzen; Füße auffallend rund. Diese Thiere sind kaum so hoch als ein Schakal, aber in allen Theilen stärker und schwere.

S. 437. H. Burney, über die lackirten und japanierten Waren von Awa.

Zise 1838. Heft 5.

Es ist kein Lack dabey, sondern die schön rothe Farbe wird durch die Burniesen aus Zinnober gemacht, welchen die chinesischen Caravannen von Yun nan einführen. Das Hauptmaterial dabey ist der burniesische Firniß Theet esse, wörtlich Holzöl. Es muß sehr viel in der Gegend geben, weil das Pfd. nur 5 Pence kostet. Es gibt ganz reines, das schwarz färbt, und gemeines, das mit Zinnober roth färbt; es sey ein Viertel Wachs darunter; unter dem Schlechtesten die Hälfte. Das Verfahren wird umständlich beschrieben, aber von welchem Baum der Saft kommt, erfährt man nicht.

452. Hauptmann J. Stuart zu Colombo, Bericht über die Perlschiffferey an der Nordwest-Küste von Ceylon mit einer Charte.

Die Einwohner glauben, die Auster regneten aus den Wolken, vielleicht, weil in den östlichen Gegenden der Länd von gewissen Fischen durch die Ausbünstung in die Höhe genommen wird und mit dem Regen wieder herunterfällt, theils, weil man solch eine Wirkung den Wasserhosen zuschreibt. Lassen wir diese zum Theil lächerlichen Meynungen: ich will nur die erste Erscheinung der Perlmuscheln berühren, wenn man sie in ungeheuren Klumpen im Meer herumschwimmen sieht. Die einzelnen so klein, daß sie jeder für nichts anders als Fischlaich ansehen würde. In diesem Zustand sind sie das Spiel der Winde und der Strömungen um die Küsten von Ceylon, bis sie größer werden und sinken: dann hängen sie sich mit einem Bart gleich dem der Wiesenschnecken an Felsen, welche meistens Corallfelsen sind, oder klumpenweise an einander. Als man ein Stück Holz, welches vor 6 Wochen an einen Anker gebunden wurde, herauszog, so war es schon mit Perlmuscheln bedeckt, fast so groß wie ein Schilling.

Die feinsten Perlen sollen von einer Bank bey Chilaw kommen; aber die Muscheln erlangen selten ihre Vollkommenheit an andern Banken als an denen zu Krippo.

Die Corallenbänke liegen 6—8 englische Meilen von der Küste und sind den strengen Nussonwinden und Strömungen ausgesetzt; die bey Krippo am wenigsten.

Die 3 letzten Fischereyen an den Krippobänken waren in einer Tiefe von  $5\frac{1}{2}$  bis 7 Faden, westlich und südwestlich beschützt durch einen Sand- und Corallrücken von der nördlichen Spitze einer Insel mit Namen Caradivan zwischen Grad 8 und 9 N. B. unter 80 D. L. Greenwich, welcher siewärts nur 2 oder 3 Faden tief ist, gegen die Muschelbänke aber plötzlich 7 Faden tief wird, wodurch diese gegen die Wuth der südwestlichen Nusson geschützt werden. Die Corallenbänke nördlich den Muscheln sind an vielen Stellen fast so hoch als das Wasser, und schützen daher sehr gegen die Strömungen während der Nordostnusson, welche wehen vom November bis zum Hornung. Die südwestlichen wehen vom April bis zum September.

So liegen die Perlmuscheln sicher in tiefem Wasser, hängend an den Corallen, bis ihre Bartfasern schwach werden und abreißen; dann findet man sie ausgewachsen auf dem sandigen Boden in der Nähe der Corallenlagen.  $\frac{1}{2}$  der bey der letzten Fischerey aufgehobenen Muscheln kamen von einer solchen Lagerstätte.

Einer der verständigsten Taucher gab mir das Alter der Muschel, wenn sie vom Felsen abfällt, auf  $6\frac{1}{2}$  Jahr an. Er

glaubt nicht, daß sie sich nach Belieben ablösen können; einmal abgerissen oder kann sie sich auf dem Sande bewegen, das Schloß voran.

Die besten Perlen findet man in dem fleischreichsten Theile der Muschel nah am Schloß; sie finden sich aber auch in allen Theilen und hängen an der Schale. Ich habe 67 Perlen von verschiedener Größe in einer Muschel gesehen. Nicht jede enthält Perlen und sie sind überhaupt selten in denjenigen, welche man als die schönsten zum Essen auswählt, was für die Meinung stimmt, daß die Perlen durch Krankheit hervorgebracht werden. Daher ist man auch selten solche Muscheln, weil man sie für ungesund hält. Zerschneidet man eine Perle, so sieht man, daß sie aus Schalen besteht wie eine Zwiebel, und aus der nämlichen Materie wie die Schale.

Wer gewohnt ist, die Perlmuscheln als einen Schatz zu betrachten, wird erstaunen, wenn er hört, daß man zu Aripoo einen Korb voll wohlfeiler kaufen kann, als ebensoviel Aupsten zu Feuerham oder Gelester. Was müssen daher die für eine Vorstellung von der Sache gehabt haben, welche die Compagnie der Perlfischerei veranlaßten, Taucherglocken aus England hierher zu senden?

Ehe der Bart reißt, sind die Muscheln in ungeheuern Klumpen beisammen: ein Taucher, welcher anzeigen wollte, wie dick sie auf der Bank liegen, legte seine Hand an das Kinn; ein verständiger Taucher aber schätzte die Muschelbänke nicht höher als 18" und sagte, man sehe oft große mit Muscheln bedeckte Felsblöcke auf dem Meeresboden für Muschelhaufen an.

Man glaubt, sie erreichen in 7 Jahren ihre Vollkommenheit und sterben sodann bald. Man hat solche Muscheln, wie es in Europa mit den Aupsten geschieht, auf besseren und geschätzteren Boden gebracht, aber ohne Vortheil. Ich nahm einmal einige von Aripoo nach Colombo mit, aber obgleich ich das Wasser oft wechselte, waren sie doch am andern Tag todt.

Die Boote der Perlfischer halten 8—15 Tonnen und haben kein Verdeck; die Schnäbel sind sehr lang; ein Boot 40' lang, hat auf dem Boden nicht mehr als 28. Sie haben keinen Kiel, aber einen Mast und ein schlechtes Seegel. Sie verlassen den Strand mit dem Landwind um Mitternacht und haben bis zur Bank 9—12 Meilen. Dasselbst liegt ein Garbschiff von der Regierung vor Anker auf dem Muschelgrund, neben das sie sich auch vor Anker legen bis halb 7 Uhr, wo sodann der Inspector das Signal zum Tauchen gibt. Bei günstigem Wetter hört der Landwind mit Sonnenaufgang auf, und das Wasser ist um 9 oder 10 Uhr ganz ruhig.

Um 12 Uhr gibt das Regierungsschiff durch einen Kanonenschuß das Zeichen zum Aufhören; und dann erhebt sich ein angenehmer Seewind, mit welchem die Boote nach dem Lande laufen.

Wird der Wind unterbrochen, so bedient man sich der Ruder; manchmal muß deshalb das Fischen aufgegeben werden.

Die Mannschaft besteht aus einem Vindal oder Meister, aus 10 Tauchern und 13 andern Männern, welche das Boot regieren und die Taucher während des Fischens bedienen. Man hat nur 5 Tauchersteine, weil die Taucher sich ablösen. Solch ein Stein wiegt 15—20 Pfund nach der Größe des Tauchers.

Starke Männer hängen noch 4—8 Pfd. Steine an den Gürtel, um sich auf dem Boden zu halten, bis sie ihr Netz voll haben. Der Taucherstein hat die Gestalt eines Tannzapfens (Pine) und hängt an einem doppelten Seile. Das Netz ist aus Cocosnuß-Garn gemacht, 18" tief, bereift an einen Reif, 18" weit, an einem einzigen Seil. Der Taucher zieht sich ganz aus bis auf eine kleine Umhüllung, verrichtet sein Gebet, springt dann ins Wasser und schwimmt zu seinem Stein, welchen seine Begleiter über die Seite des Boats herunter gelassen haben. Dann streckt er seinen rechten Fuß über die Zehen zwischen das doppelte Seil des Steines, welches über eine von der Seite des Boats vorspringenden Stange läuft. Er hält sich über dem Wasser an dem Seil, langt daran auf und ab, wodurch er den Stein heben oder senken kann, bis er ihm paßt. Dann stellt er den linken Fuß auf den Reif des Netzes und drückt ihn gegen den Stein, während er das Seil in der Hand behält. Seine Begleiter tragen Sorge, daß die Seile ohne Verwicklung aus dem Boote laufen.

Dann streckt er sich, schöpft Luft, drückt die Naslöcher mit Daumen und Fingern zusammen, läßt sodann das über die Stange geworfene Seil durch die Hand gleitsen und fährt so schnell hinunter als der Stein sinkt. Auf dem Boden angekommen, läßt er den Stein los. Dieser wird sogleich von den Dienern heraufgezogen und zu einem wiederholten Tauchen bereit gemacht. Er fängt sogleich an, sein Netz zu füllen, wobei er bisweilen über einen Raum von 8—10 Faden kriechen und eine Minute unter Wasser bleiben muß. Will er herauf, so zuckt er an dem Seile des Netzes, was seine Gehäusen sogleich fühlen und es so schnell als möglich heraufziehen. Der Taucher bleibt an dem Netze so lange, bis es so weit vom Boden fern ist, daß es nicht mehr umstürzen kann; dann haspelt er sich selbst am Seile herauf, während es seine Gehäusen ebenfalls an sich ziehen. Hat dadurch sein Leib einen Trieb nach Oben bekommen, so verläßt er das Seil, legt die Hände an die Schenkel, taucht plötzlich herauf, schwimmt zu seinem Stein, und während das Netz in das Boot gelenkt wird, ist er schon wieder fertig unterzutauken. Ein einzelner Taucher kann des Tags 1—4000 Muscheln herausschaffen.

Sie blieben selten über eine Minute unter Wasser: die gewöhnlichste Dauer ist von 53—57 Sekunden. Fordert man sie auf, so lange als möglich zu bleiben, so kann man 84—87 Sekunden zählen. Sie werden zum Auftauchen gewarnt durch ein singendes Geräusch in den Ohren und endlich durch eine Empfindung, ähnlich dem Schlucken.

Viele Taucher wagen sich nicht eher unter Wasser, als bis der Hayschiffbeschwörer am Strande ist und das Maul dieser Fische gebannt hat; andere haben von ihren Priestern geschriebene Schutzettel, welche sie in geölte Leinwand wickeln und damit tauchen. Es gibt auch darunter Katholiken, welche aber zufrieden sind, wenn ihre Priester für sie beten.

Der Taucher wird von der Regierung bezahlt und darf täglich von jedem Boot 10 Muscheln für sich untersuchen.

Ein Hayschiffbeschwörer sagte mir, er habe das Geheimniß von seinem Vater bekommen und niemand habe es außer seiner Familie; wenn er es jemandem mittheilte, so würde er die Kraft selbst verlieren. Als ein Hayschiff sich am Schiffe zeigte,

sagte ich ihm, er soll ihm das Maul bangen: das könnte er wohl, antwortete er, aber das wäre nicht recht; sein Geschäft sey bloß, ihn fortzuschicken. Nach einigen Tagen zeigte sich ein Haufschiff auf dem Muschelboden und verursachte Angst: ich ließ sogleich den Beschröber kommen und stellte ihn zu Rede, daß er denselben zu einer solchen ungeliebten Zeit hätte herbeschwimmen lassen. Er antwortete, daß ich ihn oft aufgefordert hätte, er möchte einen kommen lassen: das hätte er nun nach meinem Wunsch gethan.

Einmal sah ich einen von einem Hay gebissenen Mann. Man schnitt einem Walsfisch den Speck ab und hakte denselben ins Schiff. Dabei ist es nöthig, daß jemand ins Meer gelassen wird, welcher einen Haken in den Speck steckt. Der Mann stand mit einem Fuß in der Seite des Wals und streckte den andern ins Meer. Ein Gehilfe im Schiff sah einen Hay kommen und nach dem Fische schnappen. Er warf sogleich seinen Spaten, womit der Speck zerhackt wird, dem Ungeheuer auf den Hals und trennte fast den Kopf ab. Ein Kiefer hatte den Fuß sehr verwundet, von den Zähnen des andern aber waren nur schwache Eindrücke in der Haut. Das thut übrigens die Haken nur, wenn sie Hunger haben, sonst sind sie furchtsam, und schon der Räum auf den Schiffen macht, daß sie sich selten an einen Taucher wagen.

Die Muschelbänke werden untersucht im November, wenn der Südwestliche Muffon aufhört und der nordwestliche beginnt. Man braucht dazu ein Schiff von der Regierung, zwei Seegelboote und 8 Fischerboote, 1 Tauchstein und 2 Taucher, welche Muster von den Muscheln heraushehlen. Werden sie für gut gehalten, so erfolgt das Sammeln im nächsten März, wann der Nordostmuffon in den Südwestmuffon umschlägt.

Seit dem Jahre 1814 hat man keinen einzigen beträchtlichen Fang gemacht. Einige hoben den Grund auf heftige Winde und Strömungen, andere auf falsche Berichte der Untersuchungstaucher, während Boote von der gegenüber liegenden Küste Muschelbänke plünderten; noch andere schoben es auf die zu ausgeübte Fischerei in früheren Zeiten; die Eingebornen auf gesträubte Fische und auf den Mangel des Regens zur gehörigen Zeit, welchen sie für das Gedeihen der Muscheln für nöthig halten.

Um das Plündern zu verhüten, hält die Regierung ein Schiff über den Bänken zur Sammelzeit, und um sichere Berichte zu erhalten, ließ sie Taucherglocken kommen, damit Europäer untersuchen könnten.

Ich glaube nicht, daß die Winde und Strömungen Ursache sind, sondern die Unwissenheit der Fischer, welche nicht einmal ihre Boote regieren können. Wenn auch die Untersucher eine gute Bank gefunden haben, so können sie sie doch sehr leicht verfehlen und auf eine schlechte kommen, wenn sie im März wieder dahin wollen: wenigstens zieht man oft junge Auktern herauf, während man  $\frac{1}{2}$  Jahr vorher alte bekommen hatte. Mit Compaß und Sonden richtet man nichts aus und selbst nicht mit astronomischen Beobachtungen, da die Perlbänke weit vom Lande liegen und dieses sehr niedrig ist, ohne hervorragende Gegenstände; so kann nur Talent, Eifer und Geschicklichkeit mit der Zeit eine Verbesserung in der Perlschifferei hervorbringen.

E. 541. W. H. Sykes, über den Kollisur-Seidenwurm von Decan.

Bei meinen letzten Untersuchungen des Theiles von Decan, welcher zwischen dem Bina und Meta-Mola liegt, fand ich die Gespinne des Seidenwurms, welchen die Maratten Kollisura nennen. Dieses Kest ist wegen seines starken Seidensdens wichtig für die Manufacturen.

Dr. Norburgh hat die Seidenwürmer Tuffeh (Bhugi von Birbhum) und Arinbi von Bengalen beschrieben (Linn. Trans. VII.). Aber ich kann leider nicht bestimmen, ob der meinige einerley ist mit dem Tuffeh, weil Norburgh die Raupe beschreibt, die ich nicht gesehen, doch die Puppe, die er nicht gesehen. Die Motten aber Bhugi und Kollisura sind sich in manchen Punkten sehr ähnlich, zeigen jedoch auch Unterschiede, die vielleicht Gattungswert haben, woran jedoch nicht viel liegt. Das Wichtigste ist, daß man ein so schätzbares Kest an der Westküste von Indien fand. Die Eyer sind schmutzig weiß, oval, etwas zusammengeedrückt, derb und mit zwey braunen, parallelen Linien nach der Länge gezeichnet.

Die Motten können die Eyer gleich nach dem Ausschließen aus ihrem Gespinne von sich geben ohne alle Paarung. Sie entwickeln sich aber nicht, sind  $\frac{2}{10}$  lang und bilden ein zusammengeedrücktes Oval; sie wechseln in der Zahl von 1—200 und werden binnen 4—6 Tagen gelegt. Eine legte 130, eine andere 196 und hatte noch 16 im Unterleibe.

Das erste Ey wird von den Larven, welche mit starken, krummen Krallen bewaffnet sind, ergriffen; das zweite hat unten etwas röthliche, kleeartige Materie, wodurch es mittelst einer besondern Bewegung des Hinterleibes an das vordere gehängt wird und so fort. So wie sich der Eyerklumpen vergrößert, wird er mittelst der Larven und Klauen gegen das Sternum geschoben, wovon der Hinterleib und die Hinterfüße mithelfen. Dann stirbt das Thier und bleibt als Decke über den Eyer liegen. Von diesem Vorgange war ich Zeuge; aber eine andere Motte sah ich viele Eyer legen, ohne daß sie sich darum bekümmerte. Liegen die Eyer an einem dünnen Zweig, so kann ihnen die Decke wenig nützen, weil sie leicht durch den Wind abgeschüttelt wird. Ist Instinct dabei im Spiele, so geschieht es vielleicht, um die Eyer vor Räubern zu verbergen. Nach einigen Tagen wird der Eindruck an ihren Seiten größer, sinkt ein, so daß das Ey die Gestalt einer biconcaven Linse erhält, der Umfang noch immer durch die zwey parallelen Linien bezeichnet. Ich hatte Hunderte von Eyer in verschiedenen Jahren Monate lang, woraus aber nie eine Raupe kam. Nach Baber schliessen sie in 10—15 Tagen aus, je nach der Wärme der Luft, werden in einem Monate reif und  $2\frac{1}{2}$ —3" l.; die vorherrschende Farbe blaß oder mergelgrün.

Die Puppe ist 1 Zoll lang, oval, das eine Ende stumpf, das andere etwas zugespitzt; der Hinterleib dunkelbraun, glatt, lederig, besteht aus 9 Ringeln, jedes mit 2 Luftschlären (nämlich eines jeder Seite). Die Ringel schoben sich in einander, wie ein Fernrohr. Der Vorderleib ist mit einer starken, lederigen Hülle aus verschiedenen Stücken bedeckt, welche auf dem Rücken bis an das 5te Ringel, auf dem Banchu nur bis ans erste reicht. Man sieht die Augen und die Flügel durch. Reizt man die Puppe, so schlägt sie mit dem Bauche hin und her.

Das Gespinnst ist länglich, 1 —  $1\frac{1}{4}$ " lang und sieht aus wie eine sehr zähe, gegerbte Haut und hängt durch eine lange Schnur sehr fest an einem Zweige. Das Gespinnst der Männchen ist kleiner als das der Weibchen. Das Thier soll eine unbestimmte Zeit im Puppenstande bleiben, von 3 Monaten bis zu 2 Jahren. Es entwickelt sich im Gespinnste selbst, gibt aus dem Munde einen Saft von sich, welcher den Theil des Gespinnstes an der Schnur ausfüllt, wodurch ein Loch entsteht, das die Motte herausläßt. Die Auflösungskraft dieses Saftes ist auffallend; das Gespinnst, so hart wie ein Stück Holz, wird weich und löcherig wie nasses Filz- oder Papier. Bisweilen wird jedoch das Loch nicht groß genug.

Die Gliege ist sehr schön, selbst prächtig. Sie starben mir binnen 7 Tagen, und im wilden Zustande wohl auch nach dem Legen der Eier, was binnen einer Woche geschieht; sie fraßen nichts. Norburghs Bhugie-Motte hatte kein Maul und ich konnte selbst mit dem Vergrößerungsglase keine Saugorgane entdecken; es fand sich aber ein Durchgang zum Magen, in welchen ich eine feine Nadel stecken konnte. Ohne Zweifel kommt daraus der Saft zum Aufweichen des Gespinnstes. Die Motte nimmt daher wohl überhaupt nie Nahrung zu sich, und hat nichts anderes zu thun, als Eier zu legen.

**Kopf:** rundlich, kaum vorspringend über den vordern Rand des ersten Flügel-Paares.

**Augen:** groß und dunkelbraun.

**Fühlhörner:** zweikämmig, lanzettförmig, bey dem Männchen sehr breit, bey dem Weibchen sehr dünn.

**Palpen:** vier, die untern aufsteigend, dicht mit Haaren bedeckt; die obern vorspringend, krumm und haarlos.

**Maul:** ohne Saugorgane.

**Halb oder Brust:** oval, ganz mit feinen, langen, pomeranzenbraunen Haaren bedeckt.

**Bauch:** länglich oval, besteht aus 9 Ringeln (Norburgh gibt nur 7 an), einschließlich die hintere Spitze; alles dicht mit feinen, langen pomeranzenbraunen Haaren bedeckt. Bey dem Weibchen reicht der Bauch etwas über den Rand der hintern Flügel hinaus; bey dem Männchen ist er viel kürzer.

**Füße:** die zwey vordern Paare etwas länger als die hintern. Die Hüften (coxa) des ersten Paares  $\frac{3}{20}$ " lang, etwas zusammengedrückt; bewegen sich dicht an den Palpen; die Hüften der hintern Füße liegen am Leibe und sind unbeweglich. Schenkel  $\frac{3}{10}$ " lang, zusammengedrückt. Schienbein ebensolang, aber rund. Tarsus  $\frac{5}{20}$ ", 5gliedrig; die Glieder an den Enden länger als die mittleren. Die zwey Klauen krumm und spitzig, womit sie sich selbst an den Seiten eines Glases festhalten können; vielleicht kommt dieses auch von einer klebrigen Materie am Fuße her. Alle Füße dicht bedeckt mit steifen röthlichbraunen Haaren.

**Flügel:** wagrecht, mit schönen weißlichen Streifen, nach der Richtung der Nerven. Die vordern rahmenfarben oder pomeranzenbraun, dunkler an den äußern Rändern als am Bauchrand; der vordere Rand etwas conver, mit einem bläulichgrauen Streifen begrenzt, welcher quer über den Thorax geht; der hintere Rand etwas concav, geziert mit einem breiten Saum, dessen

äußerer Rand graulich ist, mattgrün oder gelblichbraun; die Mitte weißlich, der innere Rand tief carminroth; der innere Rand des Flügels gerad.

In der Mitte eines jeden Flügels ist ein sehr hervorsteckendes Auge; die Pupille, wie durchsichtiger Glimmer, umgeben mit einer Iris, von der Farbe des hintern Flägelrandes und einem schmalen, schwarzen Ringe; das äußere Segment aber der Iris hat verschiedene Farben, gemischt mit Bräunlich-gelb, mit Ausnahme des Schwarzen am äußern Ring, das weiter hervorsticht als an der innern Seite.

Die hintern Flügel gleichen ganz den vordern in Färbung und Verzierung; ihr hinterer Rand aber ist conver. Flügel und Leib sind dicht mit steifen, feinen Haaren bedeckt. Die Färbung bey dem Weibchen wechselt in Rosenfarben und Dunkelbraun; bey dem Männchen fast braunroth, oder hell castanienbraun.

Ein Vortheil bey der Zucht des *Koli-urra* besteht darin, daß er verschiedenes frisst, *Sagwan* (*Tectona grandis*), *Bor* (*Zizyphus jujuba*), *Afana* (*Terminalia alata glabra*) und *Zut* (*Morus indica*).

Man benutzt indessen im westlichen Indien diese Seide nicht, obschon das Kerf allgemein bekannt ist und die Maratten ein Sprichwort haben, daß ein Mensch, der sich selbst in Schwierigkeiten verwickelt, einem *Koli-urra* gleich sey, verschlossen in seiner Zelle. Man schneidet aus dem Gespinnste Streifen oder Riemen zum Anbinden, welche dauerhafter sind als die von Leder.

Ein einziger Faden dieser Seide trägt 198 Gran.

Der Leib des Männchens ist  $\frac{1}{3}$  kürzer als des Weibchens; Füße kürzer, Fühlhörner oval oder breit-lanzettförmig; Flügel nicht so groß, die Grundfarbe viel dunkler; die Flügelweite des Weibchens 7", des Männchens 5 $\frac{1}{2}$ ". Ein Männchen lebte 6 Tage, ohne zu fressen; es gab täglich ziemlich viel bräunlich-weiße Flüssigkeit von sich, welche unangenehm roch.

Daß der *Koli-urra* nicht Norburghs *Arinbi* ist, beweist Artinsons Beobachtung: das Gespinnst des letztern ist lind und weiß, und der Faden so zart, daß man ihn nicht abwinden kann.

**Cramers Bombyx paphia** (*Papilionis exotiques* tab. A. 148) gleicht sehr dem weiblichen *Koli-urra*; er verweilt auch auf *Seba* IV. tab. 23. f. 5. 6. und auf *Drury* II. 402 t. 5. f. 1. *Bombyx myletta*.

Folgende Beschreibung von F. W. Hope:

*Bombyx paphia*.

B. alis patentibus falcatis concoloribus flavis: strigis rufis oculoque fenestrato.

Habitat in Asia in India Orientali.

Alae omnes flavae, anticae falcatae strigis duabus violaceo-rubris anteriore undata. Ocellus (antice) annulo exteriori nigro, secundo roseo, tertio albedo, quarto flavo caenoso, quinto aurantio, maculae fenestrata, linea fusca obliqua per medium disci currente, postice paullo differt, annulo exteriori nigerrimo, secundo aurantio, tertio caenoso, quartoque flavo.

Die braune Linie an den Vorderflügeln theilt die *Macula fenestrata* schief laufend fast in gleiche Theile. In den Hinterflügeln läuft die braune Linie schief über den vordern Rand der Scheibe.

Abgebildet sind die Eyer, das Gespinnst, die Puppe und der weibliche Falter.

## Annalen

des Wiener Museums der Naturgeschichte, herausgegeben von der Direction desselben. Wien bey Rohrmann. 1837. II. 1. 4. 187. 11 Tafeln.

Dieses Heft enthält wieder sehr gebiegene Aufsätze, welche ein schönes Beyspiel geben von der ungemeinen Regsamkeit der Wiener Naturforscher, so wie von dem Reichthum seltener und wichtiger Gegenstände des kaiserlichen Naturalien-Cabinetts. Diese Schriften stellen sich mit Ehren an die ersten Gesellschaftsschriften von Europa, und gehören zu denjenigen, welche am meisten die Naturgeschichte befördern und zwar nach allen Richtungen hin.

**F. Unger**, welcher früher in Tropol ganz verlassen stand, ist nun nach Wien berufen, wo er für seinen Forschungsgeist Anregung und Hülfsmittel aller Art findet. Er liefert hier eine Abhandlung über die Erystallbildungen in den Pflanzengelen mit einer Tafel, und Beiträge zur Kenntniß der parasitischen Pflanzen mit nicht weniger als 6 Tafeln, lauter microscopische und anatomische Darstellungen mit großer Mühe entworfen, klar und deutlich gezeichnet und musterhaft lithographiert. Die abgebildeten Pflanzen sind: *Balanophora*, *Pilostyles*, *Rafflesia*, *Hydnora*, *Monotropa*, *Orobanche*, *Cuscuta*, *Viscum*, *Scybalium*, *Langsdorffia*, *Brugmansia*, *Cynomorium*, *Hedera*, *Helosis*.

**G. Bentham**, de *leguminosarum generibus commentationes* p. 61.

Ein sehr großer und reichhaltiger Aufsatz mit einer Menge Pflanzen, die sowohl sipplich als der Gattung nach charakterisiert und beschrieben sind; darunter sehr viel Neues. Seit *Decanbolus Prodrum* ist die Zahl dieser Familie auf das Doppelte gestiegen, und davon stand dem Verfasser der größte Theil der neuen Entdeckungen zu Gebote.

Die neuen Sippen sind: *Spadostyles* (Pultenaea), *Leptosema*, *Diplostropis*, *Cyclobolium*, *Corytholobium*, *Centrolobium* (Nissolia), *Callisemaea*, *Discolobium*, *Phellocarpus* (Pterocarpus), *Commilobium*, *Vexillaria*, *Platysema*, *Hardenbergia*, *Bionia*, *Cleobulia*, *Cratylia*.

Vor jeder Tribus oder Subtribus ist eine Classification der Sippen:

*Eupodalyrieae*, *Pultenaeae*, *Mirbelieae*, *Sophoreae*, *Dalbergieae*, *Phaseoleae*, *Genisteae*.

**S. 142. F. Hechel**, ichtthyologische Beyträge zu den Familien der Cottoiden, Scorpaenoiden, Gobioiden und Epprioiden. T. 8. 9.

Jlris 1838. Heft 5.

Lauter neue Gattungen, charakterisirt und genauer beschrieben:

*Cottus poecilopus*, *microstomus*, *gracilis*; *Gobius quagga*, *semilunaris*; *Abramis melanops*; *Carassius humilis*, *bucephalus*; *Scorpaenopsis* n. *nesogallica*, *neglecta*; *Trachydermus* n. *fasciatus*, *richardsonii*:

Abgebildet sind: *Cottus poecilopus*, *microstomus*; *Gobius semilunaris*; *Trachydermus fasciatus*; *Abramis melanops*; *Carassius humilis*; *Gobius quagga*.

**S. 165. F. Natterer**: *Lepidosiren paradoxa*, eine neue Gattung aus der Familie der sichähnlichen Reptilien Taf. 10.

Dieses höchst merkwürdige, von Natterer in Brasilien entdeckte und von Hisinger bey der Versammlung der Naturforscher zu Jena (Jlris 1837. 379) bereits erwähnte Thier wird hier abgebildet und ausführlicher beschrieben. Der Verfasser erhielt 2 getödtete Exemplare, eines aus einem Wassergebirge in der Nähe von Borda am Madeiraflusse, das andere aus einem Sumpfe am linken Ufer des Amazonenstroms, oberhalb Villanova in einer Gegend mit Namen Cararaugu. Das eine maß 3' 9", das andere 1' 10". Die Einwohner nennen es *Caramura*.

Das Thier gleicht in der Gestalt auffallend einem Kalb, auch der Schwanz von einer häutigen Masse gesäumt; der ganze Leib aber ziegelartig mit weichen rundlichen Schuppen bedeckt, viel vollkommener als bey *Caecilia* [nach der Abbildung nicht geringelt].

Der Kopf dick, ziemlich stumpf, geht unmittelbar in den Leib über; das Maul mäßig, die Lippen sehr dick und die Naslöcher als Querspalten unter der Oberlippe, über den Zähnen. Von diesen im Zwischenspiele zwey kleine, kegelförmige; dahinter zwey sehr breite, wie bey den Säugthieren, mit dem Kieferende verwachsen, und mit zwey Längsfurchen, so daß jeder wie 3 Schneidezähne aussieht. Diese zwey großen Zähne finden sich eben so vorn im Unterkiefer. Keine Gaumenzähne; Zunge kurz, oval, unten stark angewachsen; Augen sehr klein, an den Seiten im vordern Drittel des Kopfes, mit der Haut bedeckt.

Hinter dem Kopf jederseits ein senkrechter Kiemenspalt und dicht dahinter ein bandförmiger, zugespitzter, schuppenloser Faden 2" lang als Vorderfuß. Schwanz zusammengedrückt,  $\frac{1}{2}$  der Leibeslänge; auch die lange Flossenhaut nach der Abbildung geschuppt. After rund, sonderbarer Weise mehr auf der linken Seite; etwas davor und nahe besammen die Hinterfüße ganz gleich den vordern.

Eine bisher bey keinem Lurch bemerkte Eigenthümlichkeit ist hier das Auftreten von Schleimcandeln in der Haut, welche der Seitenlinie entsprechen und ähnliche Mündungen haben. Sie beginnen vorn an der Schnauze, bilden jederseits zwey wellenförmige Linien über und unter dem Auge; senken einige Zweige ab, vereinigen sich gegen das Hinterhaupt und laufen dann als Seitenlinie fort [sieht aus wie bey *Chimaera*].

Die Grundfarbe ist braungrau. Es scheinen kurze Rippen, ein Schultergerüst und ein Becken vorhanden zu seyn; jederseits vier gezähnte Kiemenbögen; Kehlfloss häufig, Brustfloss

sehr kurz mit zwey langen, blasenförmigen Lungen bis zum After, Herz weit vorn, Darm gleichdick, mit einer Spiralklappe wie bey den Hagen; Eyerstöcke groß und länglich (Sind es Kooegensacke oder freye Eyerstöcke wie bey den Fröschen?). Harnblase länglich oval. Keine Ueberbleibsel von Nahrung.

Das Thier ist sehr selten und kaum bey den Einwohnern bekannt. Es soll einen Laut von sich geben wie eine Kage, und Pflanzen fressen, namentlich Wurzeln der Mandioca-Wurzel.

*Corpus anguillaeforme, totum squamatum; Pedes quatuor, valde distantes; adactyli.*

Es schließt sich zunächst an *Amphiuma*.

Abgebildet ist das ganze Thier  $\frac{2}{3}$  der Größe; Kopf von vorn mit Gebiß und Naslöchern; After mit Hinterfüßen; eine Schuppe einfach und vergrößert. Länge 5 $\frac{1}{2}$  Zoll, Breite 4.

Das Thier hat durch die Beschuppung und besonders die Gestalt der Schuppen auffallende Ähnlichkeit mit den Fischen, durch die Gestalt und Lage der Naslöcher unter der Schnauze mit den Hagen, durch die Schleimcanäle aber und vor allem durch die plattenartigen, mittels Längsfurchen scheinbar in mehrere getrennten Zähne dermaßen mit Chinaacra, daß man in die größte Verlegenheit über den Platz dieses Thiers kommt und der Wunsch zu einer baldigen Zerlegung lebhaft erregt wird. Der Verlauf der Nasengänge muß nach unsrer Definition der Lurche die Sache entscheiden, und wir bitten daher den Prof. Th. Bischoff zu Heidelberg, welcher die Zerlegung anstellen wird, darauf vorzüglich zu achten. D.

S. 171. *Sitzinger*, über *Palaeosaurus*, eine neue Gattung vorweltlicher Reptilien, und die Stellung dieser Thiere im System überhaupt, Taf. 11. Eine sehr genaue Beschreibung dieser versteinernten Knochen und eine sehr gründliche kritische und philosophische Entwicklung der Classifications-Principien im Thierreich und insbesondere bey den Lurchen, welche gewiß vieles zu deren wichtigen Stellung bestragen werden.

Aus dieser Uebersicht wird man hinlänglich die Wichtigkeit dieses neuen Hefes erkennen, sowie die gründlichen und wissenschaftlichen Forschungen der Wiener Naturforscher.

## Allgemeine Naturgeschichte

als philosophische und Humanitäts-Wissenschaft für Naturforscher, Philosophen und das höher gebildete Publicum, bearbeitet von M. Perty, Prof. Bern bey Fischer. Liefer. 3. 1838. 240.

Die zwey vorigen Lieferungen, welche das Allgemeine und Philosophische enthalten, haben wir schon nach Verdienst angezeigt. Gegenwärtig fängt das Besondere an, und zwar die Mineralogie, welcher wieder das Allgemeine vorangeht. Dann werden die einzelnen Mineralien nach ihren Familien aufgeführt und characterisirt, vollständiger und gedrängter, wie es uns scheint, als nöthig wäre.

Es wird in dieser Lieferung die ganze Mineralogie voll-

endet und noch das Organische angefangen, dem wieder allgemeine Betrachtungen vorausgeschickt sind, über das Leben, den Begriff des Organismus, die Entstehung desselben, *generatio aequivoca*. Unterschiede der organischen Reiche, Begriff von Sippe und Gattung, Zahl, Parallelismus.

S. 213 beginnt das Pflanzenreich mit der Anatomie desselben. Daß alles mit philosophischem und physiologischem Sinn aufgefaßt und mit vollständiger Berücksichtigung der Literatur bearbeitet ist, wurde schon früher bemerkt und bedarf daher hier keiner Wiederholung.

## Mineralogische Jahreshefte

von C. F. Glöckner, Heft 5. Rürberg bey Schrag. 1837. 8. 410.

Diese Hefte sind eine wahre Wohlthat für den Mineralogen, indem der Verf. alle möglichen Entdeckungen, welche in einem Jahre gemacht worden, mit der größten Sorgfalt auführt und vollständig schildert; daher denn auch diese Hefte von Jahr zu Jahr dicker, vollständiger und lehrreicher werden. Das vorliegende enthält alle Mineralien, welche im Jahr 1835 entdeckt wurden, wohl geordnet und mit ihrer ganzen Geschichte; jede neue Gebirgsart, jede Berichtigung, Aufklärung usw. Diese große Masse ist in eine systematische, zusammenhängende Darstellung vereinigt und kritisch beleuchtet, ohne Vorurtheil und Anmaßung, auch ohne Härte, obgleich diese Zurückhaltung dem Verfasser oft schwer fallen muß bey den vielen abgeschmackten Folgerungen, welche man überall aus dem ungeordneten Haufen von oberflächlichen Beobachtungen, oft auch nur aus einer einzigen ziehen sieht. Es gibt gegenwärtig keine streitvollere und lärmendere Wissenschaft als die Geologie, weil man in keiner auf so vereinzelte und so sehr auf der Oberfläche liegende Beobachtungen allgemeine Schlüsse zieht, welche das ungeheure Ganze über einen Leisten schlagen sollen. Zur Schlichtung dieses Wirrwar tragen diese Hefte offenbar vieles bey, und es ist daher nicht zu zweifeln, daß sie bey dem Publicum Beyfall finden werden.

Die Schrift in 8 Capitel getheilt. Voran die neueste Geschichte überhaupt, mit Angabe der Werke und selbst der Seitenzahlen bey den meisten, was beweist, daß der Verfasser sie wirklich selbst in Händen gehabt und mit Einsicht benutzt hat. S. 32 folgen kurze necrologische Notizen.

S. 35 folgt ein Verzeichniß der neuesten Literatur, nach Rubriken geordnet, mit vollständigen Titeln und meistens einer kurzen Andeutung des Inhalts.

S. 57. Die Entdeckungen in der Crystallographie; Sonometer, künstliche Crystallbildung usw.

S. 69. Physische Mineralogie; Härte, Licht und Wärme-Eigenschaften usw.

S. 92. Chemische Mineralogie; Bestandtheile, Isomorphismus usw.

S. 115. Besondere Dryptognose; Ausführung aller neuen

Mineralien und aller neuen Beobachtungen über bekannte, nach den Familien geordnet.

S. 222. Geognosie; voran die Geologie, Veränderungen der Erdoberfläche, Vulcane, Erdbeben, Erhebungen usw.; Aufnahme der Wärme, Electricität, Schichtung, Umwandlung, Gänge usw.

In der besondern Geognosie S. 261 werden die einzelnen Gebirgsarten wieder nach ihren Familien geordnet und betrachtet. Dieses ist ein besonders reichhaltiger und ungeachtet seiner Gebrängtheit weitläufiger Abschnitt.

Den Schluß machen die Verfeinerungen, S. 387.

Möge dem Verfasser Zeit, Geduld und Kraft bleiben, sich dieser jährlich wiederkehrenden ungeheuren Arbeit zu unterziehen. Es ist ein Opfer, welches er der Wissenschaft bringt, wenn auch das Publicum es nicht gehörig schätzen und daher nicht verdienen sollte. Es wird gewiß von vielen mit Dank aufgenommen, besonders von solchen, welche mit der Wissenschaft fortschreiten wollen, was wegen der gar zu großen Masse fast nur durch ein solches Buch möglich ist.

Einen großen unverzeihlichen Fehler hat das Buch, nemlich das Fehlen des Registers. Wie kann man ein Sammelwerk ohne einen Wegweiser in die Welt schicken? Es sollte wenigstens ein Register der Autoren und der Mineralnamen haben. Man kann zwar sagen, ein solches werde nach mehreren Heften folgen; allein soll man denn mehrere Jahre die Hefte liegen lassen, bis das Register kommt? Solche Werke werden am meisten bey ihrer Erscheinung gelesen und dann auf das Brett gestellt, bis man sie gelegentlich braucht.

### Geognostische Beschreibung

des Schönbergs bey Freyburg im Breisgau, von G. Frommherz, Professor. Freyburg bey Grosse. 1837. 4. 36.  
1 Tafel illum.

Der Schönberg ist allerdings wegen seiner Gestalt, seiner Absonderung vom Schwarzwald und daher wegen der fast grenzenlosen Aussicht auf denselben ins Breisgau, die Ortenau und das Elsaß, einer der schönsten im Lande; er war auch seit einer langen Reihe von Jahren als ein wilder botanischer Garten berühmt, indem sich darauf die seltensten Pflanzen und selbst Holzarten finden, die kaum sonst in der Gegend vorkommen. In mineralogischer Hinsicht wurde er aber nicht so geschätzt, wie er es verdiente: denn man glaubte in ihm nichts weiter zu finden, als einen großen Ke gel von Sandstein und Muschelkalk. Es blieb dem Verfasser vorbehalten, ihn auch in dieser Hinsicht zu Ehren zu bringen, indem er eine Menge Schätze aus denselben zu graben verstand. Er enthält nicht bloß die meisten secundären Gebirgsarten, sondern sogar vulcanische Massen, ob schon ihr eigentlicher Stod der 3 Stunden davon entlegene, ganz einzeln aus der Rheinebene sich auf 500' erhebende Kaiserstuhl ist. Der Verfasser fand also daran das Triasgebilde von Alberti, den bunten Sandstein, den Muschelkalk mit der Anhydrit-Gruppe, den eigentlichen Muschelkalk und den Dolomit mit verschie-

denen Verfeinerungen, namentlich auch Eoceriten und Plagiostomen, vorzüglich aber Mphoriten; den Keuper-Sandstein mit dem bunten Mergel und Gyps; ferner die Jura-Formationen oder Dolith-Gebilde, den Lias mit vielen Verfeinerungen, worunter auch Pontaciniten und Belemniten; den Eisen-Keuperstein auch voll Verfeinerungen, dann den Haupt-Keuperstein, desgleichen voll Verfeinerungen, welche überall aufgeführt werden; den Drorbothon und der Corallenkalk.

Die tertiäre Ablagerung, besonders das Kalt-Conglomerat ist sehr mächtig und bildet den Kopf des Bergs auf dem Haupt-Keuperstein. Endlich zeigen sich vulcanische Conglomerate an der Südseite des Bergs, vorzüglich Dolerittrümmer mit Augiten.

Den Schluß machen allgemeine Betrachtungen über die Bildung dieses nun doppelt merkwürdig genordenen Berges. Die Tafel stellt einen gefärbten Durchschnitt des Berges vor.

### Natur- und gewerbwissenschaftliche Berichte

oder Darstellung der neuesten Physik und Technologie in aphoristischer Form von Hofrath Dr. J. C. Nürnberg get. Kempten bey Danneheimer. 1837. 418. Taschenformat.

Diese Berichte sind nach und nach im Morgenblatt erschienen und mit allgemeiner Theilnahme aufgenommen worden. Sie haben die Absicht, von allen neuen Entdeckungen in der Astronomie, Physik und Technologie eine Uebersicht zu geben, und zwar in einer jedermann verständlichen Sprache. Diese Schrift wird daher viel dazu beitragen, die genannten Kenntnisse zu verbreiten und viele Menschen in Stand setzen, ihnen bisher verborgene Wirkungen zu begreifen, dieselben im täglichen Leben zu benutzen oder sich wenigstens vor Schaden zu hüten. Die Gegenstände, worüber der Verfasser sich verbreitet, sind sehr mannichfaltig und daher geeignet, einem großen Publicum zuzufügen, besonders da der Vortrag nicht cathedermäßig ist, sondern die Form der Unterhaltung hat. Einen großen Fehler dürfen wir jedoch nicht verhehlen, und um so weniger, da es nur eine Vergeßlichkeit des Verfassers ist. Es fehlt nemlich der Schrift jede Art von Wegweiser, Register und Uebersicht, so daß man weder weiß, was das Buch enthält, noch wo es steht, und man daher gezwungen ist, so oft man etwas wissen möchte, das ganze Buch mit Zeitverlust zu durchblättern und den Inhalt der Capitel durchzulesen. Man hat übrigens schon so oft gegen diese Nachlässigkeit vieler Schriftsteller zu eifern Gelegenheit gehabt, daß man anfangen muß, gegen den Einzelnen nachsichtig zu seyn und sich in Geduld zu fügen.

Der erste Bericht behandelt die Magnete, artesischen Brunnen, Selbstentzündung des Kohlenpulvers, Kernenbochte, Gummi elasticum, aplanatisches Ferngläser, gefärbten Schnee, und spricht über den Kreislauf der Natur.

Der zweyte, S. 17, über die aplanatischen Fernröhre und die Luftkeine; der dritte über Magnete, Dampfmaschinen und Dampfsschiffe; der 4te, Seite 46, über Eisenbahnen, Sprengung



von Felsen unter Wasser, Erdgloßen, Microscope, Feuer mit Hämmer zu lösen.

Der fünfte, S. 61, über Dampfmaschinen, Stahlbereitung usw.; und auf diese Weise werden in 22 Berichten noch eine Menge Gegenstände behandelt, welche wir unmöglich anführen können.

## 1. Helminthologische Beyträge

von Dr. Sammerschmidt zu Wien. Tafel IV.

**Vorwort.** Mein verehrter Freund, Herr Dr. Sammerschmidt in Wien, übersandte mir die beyden nachfolgenden Abhandlungen, um sie bey der Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte in Bonn im Sept. 1835. der zoologisch-physiologischen Section vorzulegen.\* Dieß geschah, wie die Berichte jener Versammlung darthun. —

Ich hatte schon früher mit meinem theuern, unvergesslichen Freunde Mehlis den Plan gemacht, gemeinschaftlich und mit Unterstützung anderer Helminthologen bestweise „**Helminthologische Untersuchungen**“ erscheinen zu lassen. Mehlis starb, und wenn ich auch nach dessen zu frühem Tode zu der Herausgabe solcher Hefte noch Lust hatte, so wurde doch dieselbe vereitelt.

Auch die Untersuchungen meines Freundes Sammerschmidt sollten darinn ihren Platz finden. Sie wurden deshalb nicht gleich veröffentlicht. Später, ich muß es gestehen, dachte ich, mit ganz anderen Untersuchungen beschäftigt, nicht mehr daran, und so blieben, da mich Freund Sammerschmidt selbst nicht mehr daran erinnerte, diese interessanten Beobachtungen so lange bey mir liegen. Sie sind es aber auch jetzt noch werth, daß sie bekannt werden, und deshalb theile ich sie hier, mit einigen wenigen Bemerkungen von mir versehen, den Naturforschern mit, überzeugt, daß der Dr. Dr. Sammerschmidt nichts dagegen haben wird. —

Zum Schlusse bemerke ich noch, daß in neuerer Zeit namentlich Hr. v. Siebold viele Untersuchungen über die Sammenthiere von wirbellosen Thieren, auch von Insecten in Müllers Archiv für Anatomie u. mitgetheilt hat.

Leuckart, Dr.

Obgleich der vielen Entdeckungen, die im Gebiete der Helminthologie seit Jahren gemacht wurden, gelang es mir doch noch ein neues, bisher unbeachtetes Feld der Naturforschung für diesen Zweig der Naturgeschichte aufzudecken.

Meine seit Jahren betriebenen anatomischen Untersuchungen der Insecten, vorzugsweise der ersten Stände derselben, und mehrere Versuche, die ich voriges Jahr über die Chylification in dem Darmcanal der Insecten anstellte, führten mich auf die Entdeckung verschiedener Eingeweidwürmer.

Nachdem ich nun im Verlaufe dieses Jahres folgende Genera von Insecten untersuchte, als: *Melolontha*, *Cetonia*, *Aesalus*, *Lucanus*, *Dytiscus*, *Hydrophilus*, *Amara*, *Cara-*

*bus*, *Procrustes*, *Agonum*, *Harpalus*, *Elatér*, *Buprestis*, *Cantharis*, *Silpha*, *Dermestes*, *Allecula*, *Aphodius*, *Scarabaeus*, *Trichius*, *Tenebrio*, *Diaperis*, *Hister*, *Opatrum*, *Meloe*, *Cleonis*, *Bostrychus*, *Saperda*, *Cerambyx*, *Cassida*, *Chrysomela*, *Coccinella*, *Blatta*, *Forficula*, *Mantia*, *Acheata*, *Gryllus*, *Locusta*, *Libellula*, *Ranatra*, *Tipula*, *Musca*, *Cimex*, *Papilio*, *Noctua*, *Tinea*, *Bombyx*: habe ich darinn folgende neue Helminthen entdeckt:

- a. *Oxyuris*. 10 neue Species, hiervon sind 4 Species abgebildet in der vorkommenden Taf.
- . *Filaria*. 3 neue Species.
- c. *Filarina*. 2 dergleichen, wovon *Filarina vitrea* abgebildet ist.
- d. *Trichosoma*. 1 Species.
- e. *Anguillina*. 3 neue Species, wovon *Ang. monilis* abgebildet ist.
- f. *Distoma*. 1 Species.
- g. *Clepsidrina*. 11 neue Species; hiervon sind 4 Species abgebildet.
- h. *Rhizinia*. 8 neue Species, hiervon 2 Species abgebildet.
- i. *Pyxinia*. 3 neue Species, hiervon *Pyx. rubecula* abgebildet.
- k. *Bullulina*. 3 neue Species. Abbildung.
- l. *Gregarina*. 9 neue Species.
- m. } 3 neue noch zweifelhafte Genera mit 8 neuen Species.
- n. }
- o. }

Es sind demnach 14 Genera mit 62 neuen Specien bereits von mir aufgefunden,\* und ich hoffe diese Ausbeute binnen Kurzem noch bedeutender zu vermehren. Ich werde mich beeilen, die Abbildungen aller dieser neuen Species anfertigen zu lassen, um diese Bereicherung der Helminthologie bald ehestens veröffentlichen zu können. Ueber die Genauigkeit meiner Untersuchungen glaube ich, mich auf meinen Freund Dr. Diesing berufen zu können, der die meisten dieser neuen Species lebend bey mir untersuchte. —

### 1. *Oxyuris*.

Ich war so glücklich, im Verlaufe des Jahres 1834—1835. die Gattung *Oxyuris* in verschiedenen Insecten aufzufinden, und mir schien diese Entdeckung für die Naturgeschichte um so interessanter, als bisher die Gattung *Oxyuris* nur in den Eingeweiden der Säugethiere gefunden wurde. — Nun habe ich heuer bey meinen anatomischen Untersuchungen der Insecten zehn neue Arten von *Oxyuris* entdeckt, wovon ich hiemit vorläufig die Abbildungen von vier Haupt-Species mitzutheilen so frey bin. — Es wäre auffallend, wenn diese Gattung von Eingeweidwürmern bloß in Säugethiern und mit Ueberspringung aller andern höhern Thierklassen nur wieder in den Insecten vorkommen sollte — es ist eben so interessant,



daß einer der höchst organisierten Eingeweidwürmer sich auch in einer so niedrig organisierten Thierklasse, wie die Insekten sind, aufhält, und endlich, daß diese Gattung der Eingeweidwürmer nicht sowohl in vollkommenen Insekten als vielmehr im Larvenzustande der Insekten in denselben gefunden werden. — Ich hoffe, daß diese Mittheilungen der hochachtlichen Gesellschaft nicht unvollkommen seyn werden, und glaube, mir erlauben zu dürfen, zwei dieser neuen auf der Tafel abgebildeten *Oxyuris*-Arten meinen lieben Freunden Dr. Leuckart und Dr. Diesing zu Ehren zu benennen. —

### *Oxyuris Leuckarti.* \*

Tab. IV. fig. a. b.

Ich habe diesen durch seine Größe ausgezeichneten Eingeweidwurm am 10. Mai 1835, in der Larve der *Melolontha aprilianna* gefunden. Länge 2 bis 3 Linien. Farbe weiß. Eingeweid durchscheinend. Schwanzspitze sehr kurz, etwas nach einwärts gekrümmt. Fig. a. stellt den Wurm in seiner natürlichen Größe, b. vergrößert dar. Fig. b. zeigt in 1. den Schlund, 2. Magen, 3 bis 4 Darm, welcher bey 5. eine Anschwellung hat und sich in die Cloake 6. endet. Zu beyden Seiten des Schlundes treten 2 Fäden (Muskeln? Nerven?) bis gegen den Magengrund herab. In der Mitte des Körpers tritt bey 3 die Vulva heraus. Der zweyhörnige Uterus windet sich mit Eiern erfüllt nach auf- und abwärts beynähe die ganze Länge des Körpers einnehmend (9—9). Die Eierschöcke sieht man bey 10 und 11, wo sie sich untern Darm herumwinden. An der obern Seite des Körpers zeigen sich bey 12 einige gelblich gefärbte Körperchen, die entweder Drüsen oder Muskeln zu seyn scheinen. Durch die Kürze der Schwanzspitze 13 unterscheidet sich diese Species wesentlich von den von mir bereits entdeckten *Oxyuris*-Arten, insbesondere von der später aufgeführten *Oxyuris Diesingi* Fig. a. b. c. —

*Oxyuris Leuckarti* habe ich vorzüglich im Blinddarm der *Melolontha aprilianna* gefunden; oft 10 bis 12 Stück zusammen, während ich *Oxyuris Diesingi* größtentheils nur einzeln, höchstens zu 4 Stück im Darm der *Blatta* angetroffen habe. Die Männchen sind auch bey den in den Insekten vorkommenden *Oxyuris*-Arten äußerst selten. Obwohl ich mehrere Hundert Exemplare dieser beyden Species untersucht, so habe ich doch von *Oxyuris Leuckarti* noch kein Männchen auffinden können, von *Oxyuris Diesingi* erst zwey.

### *Oxyuris gracilis.*

Fig. c. d. e. f.

Diese *Oxyuris* unterscheidet sich von der vorhergehenden

\* So sehr ich den guten Willen und die Freundschaft des Herrn Dr. Hammer Schmidt zu schätzen weiß; so muß ich doch die mir hier erzeigte Ehre ablehnen, da ich von dem auch an anderen Orten öffentlich ausgesprochenen Grundsätze ausgehe, daß man keinen Schmarogertbiere in den Namen von Gelehrten anhängen soll, indem dieß durchaus nicht delicat ist, und mancher auch denken könnte, daß mir J. B. diese *Oxyuris* einmal abgegangen sey. — (Man vergl. J. B. das, was ich in den Feidelsberg. Jahrbüchern 1830. Nr. 38. S. 597 und 598 über Namensgebung bemerkt habe). —

Leuckart.

318 1838. Heft 5.

Art nicht nur durch den bedeutenden Größen-Unterschied ( $\frac{1}{2}$  Linien) sondern auch durch den verhältnismäßig viel längeren Schlund, gestreckten Körperbau und die doppelt gekrümmte Schwanzspitze. Fig. 1. bis 2. zeigt uns den Schlund, 3. den Magen, 4. 5. den Darm, 6. die Anschwellung von der Cloake. 7. Uterus. 8. Eierschöcke. 9. 10. die Schwanzspitze. — Ich fand diese Species nur in einzelnen Exemplaren selten 2, 3 in dem Blinddarm von *Melolontha fullo*-Larven.

### *Oxyuris depressa.*

Fig. d. e.

In der Larve der *Cetonia marmorata* entdeckte ich dieses kleine Thierchen, und zwar ebenfalls in dem Blinddarm, konnte jedoch nur einiger weniger Exemplare habhaft werden. Es scheint zwar, daß dieses Thier noch nicht vollständig ausgebildet ist, da bey ihm, abgesehen von seiner Kleinheit (es hat kaum die Größe von  $\frac{1}{4}$  Wiener Linie), die Eierschöcke noch gar nicht sichtbar waren; indessen weicht es so sehr von dem Baue anderer *Oxyuris*-Arten ab, daß es wohl süglich als eine selbstständige Species aufgeführt werden kann. Es ist verhältnismäßig doppelt so breit wie die vorige Species, während es um die Hälfte kleiner ist; der Schlund geht viel länger herab; der Magen nimmt die ganze Breite des Körpers ein und die Schwanzspitze ist doppelt so lang, wie bey der vorigen, beträgt beynähe das Drittel der eigenen Körperlänge, und ist sanft nach auswärts gebogen. An der ganzen Oberfläche des Körpers sind sanfte Einschnürungen bemerkbar, welche wahrscheinlich durch Ringmuskeln entstehen; das Thierchen ist ziemlich munter. Fig. e. natürliche Größe. Fig. d. vergrößert, 1—2. Schlund. 3. Magen. 4—6. Darm. 7. Schwanzspitze. 8—9. die Einschnürungen. dem ganzen Körper entlang. — Ich fand auch noch kleinere Exemplare zu  $\frac{1}{2}$ stel Wiener Linie.

### *Oxyuris Diesingi.*

Fig. a. b. c.

So wie sich die vorigen Species schon bey einer oberflächlichen Untersuchung auffallend unterscheiden, so ist dieß auch der Fall bey den gegenwärtigen. Die Größe des Thieres beträgt vom Kopfe bis zur Schwanzspitze  $\frac{1}{2}$  bis 1 Wiener Linie. Die bey einem Thiere vorgenommene Messung zeigte von der Kopfspitze 1 bis zum After 6 eine Länge von  $200^{\mu}$ . Vom After 6 bis zur Schwanzspitze 11  $200^{\mu}$ , also die ganze Länge  $1000^{\mu}$  oder  $\frac{1}{2}$  Wiener Linie. Die größte Breite zeigte bey 7 bis 8  $200^{\mu}$  — bey ganz mit Eiern erfüllten Thieren  $\frac{1}{2}$ stel Wiener Linie. Der äußern Körperbildung nach nähert sich diese *Oxyuris*-Art der vorigen. Die Schwanzspitze ist jedoch um vieles länger (sie beträgt beynähe die Hälfte der eigentlichen Körperlänge) und ist wie bey *Oxyuris gracilis* doppelt gekrümmt. Die Bildung des Schlundes und Magens ist der von *Oxyuris Leuckarti* ähnlich. Die Hauteinschnürungen sind nur bis in die Nähe des Magens deutlich. Ich entdeckte dieses Thier zuerst im Octob. 1834. im Dünndarm von *Blatta orientalis* — wo ich zwey, höchstens 4 Stück in einem Darm auffand. — Die Bewegung des Thieres ist sehr munter, vorzugsweise krümmt es die Schwanzspitze nach einwärts und schnell sich dann wieder aus. — Es legte sehr häufig im Wasser Eier, größtentheils aber erfolgte nach einiger Zeit, wenn

es im Wasser lag, ein Prolapsus, wo dann der Uterus heraustrat und die gliederartigen Einschnürungen der Oberhaut sichtbar wurden. Die ausgezeitigten Eyer lassen einen dotterartigen, graugelblichen, runden Körper durchschimmern. — Der Dotter besteht aus äußerst garten Bläschen.

Fig. c. stellt einen Theil des Uterus vor mit den darin befindlichen Eiern, 2 worinn der dotterartige Körper 3 sichtbar ist. — Die ganze Länge des ovalen Eies beträgt  $\frac{200}{100}$ '''', die Breite  $\frac{200}{100}$ ''''. — Bey einigen Exemplaren war der dotterähnliche Körper ganz rund und hatte im Durchmesser  $\frac{200}{100}$ '''', bey einigen war er etwas in die Länge gezogen, und maß in der Länge  $\frac{200}{100}$ '''', in der Breite  $\frac{200}{100}$ ''''. — In einigen Eiern fand ich im dotterartigen Körper noch ein einzelnes großes Bläschen. — Fig. a. zeigt den Wurm in natürlicher Größe. Fig. b. vergrößert. —

Dem Männchen fehlt die Schwanzspitze ganz, der Körper endigt einwärts gekrümmt fast wie bey *Cucullanus elegans*, auch die männlichen Geschlechtstheile haben mit *Cuc. elegans* große Aehnlichkeit.

### *Clepsidrina polymorpha.*

Fig. a. — w.

Dieser Eingeweidwurm findet sich im Darm der *Tenebrio molitor*-Larve in großer Quantität. Ich habe oft viele Hundert Exemplare in einem und demselben Darm gefunden. Die natürliche Größe variiert von  $\frac{3}{2}$ ''' zu  $\frac{1}{2}$ ''''. Farbe weiß. Die das Genus *Clepsidrina* charakterisirenden 3 Haupteinschnürungen, und respective die hierdurch entstehenden Abschnitte des Körpers verhalten sich folgendermaßen gegen einander:

Fig. a. u. d.: der Kopfteil von 1 bis zur Einschnürung mißt  $\frac{10}{200}$ ''''. Der Vorderkörper von 2 bis 3 mißt in der Länge  $\frac{200}{200}$ ''''. Der Mittelkörper 3 bis 4 mißt  $\frac{200}{200}$ ''''. Der Hinterkörper 4 bis 5  $\frac{25-30}{200}$ '''', so daß die ganze Körperlänge im natürlichen Zustande ungefähr  $\frac{75-80}{200}$ ''' oder  $\frac{3}{2}$ ''' mißt. — Aber nicht nur diese Größe, sondern auch die Gestalt dieses Thierchens überhaupt unterliegt den mannichfaltigsten Abänderungen. — Ich habe lange Zeit das Thierchen nicht lebendig haben werden können, immer war es bereits todt, sobald ich es unter das Mikroskop brachte — wo es mir dann blasenartig aufgetrieben in der Gestalt von Fig. a. b. c. d. erschien. — Die aus einer körnigen Masse bestehenden inneren Theile waren gewöhnlich an einer Seite des Körpers angeheftet und die Haut blasenartig aufgetrieben; ich bemerkte, daß, sobald die Thierchen aus dem eigentlichen Chylus des sie ernährenden Darmes herausgenommen und ins Wasser gebracht wurden, sie fast augenblicklich sterben und eine gestreckte Gestalt annehmen. — Endlich gelang es mir, einen ganzen Darm aus dem *Tenebrio molitor* heraus zu präparieren — ich legte ihn zwischen 2 Glasplatten und konnte nun meine neuen Eingeweidwürmchen recht deutlich im lebenden Zustande beobachten. — Sie nahmen in ihren Bewegungen die verschiedensten Gestalten an, wie die Fig. e bis s zeigen — sind ziemlich schnell, obgleich ihre Bewegung schleppend erscheint. — Die innere Bildung zeigt wenig Organisation und scheint bloß aus einem

Darm zu bestehen, der 2 bis 3 eine bedeutende Einschnürung hat, in welchem sich äußerst feine Moleculen der Bewegung des Thieres folgend auf- und abwärts bewegen. —

Eine Circulation oder ein Ueberströmen dieser Moleculen aus dem Vorderkörper in den Hinterkörper konnte ich noch nicht wahrnehmen, höchstens dürfte dieses Ueberströmen sich nur auf einzelne Moleculen beschränken. Die Bestimmung der in dem Vorder- und Hinterkörper sichtbaren Flecken 6 und 7 ist mir noch nicht klar. — Sie scheinen der innern Organisation anzugehören, bewegen sich mit dem Körper auf- und abwärts, und sind besonders bey einem auf das Thier ausgeübten Drucke als leichte, runde Flecke sichtbar. —

Die durch die Fig. t. u. v. w. abgebildeten Formen scheinen noch unausgebildeten Thieren anzugehören. —

### *Clepsidrina conoidea.*

Fig. a. — e.

Ich traf dieses Thierchen in dem Darne von *Forficula auricularia* — Kopfteil und Mittelkörper sind bey diesem Eingeweidwurm um die Hälfte kleiner als bey der vorigen Art, — die Einschnürung des Mittelkörpers ist nur an der obern Seite, bey 3 sehr deutlich, bey 4 jedoch nur sehr schwach ausgesprochen, die Form des Vorderkörpers fast kegelförmig. — Fig. d. e. f. fand ich in der Larve von *Forficula auricularia*. — Fig. a. b. c. im vollkommenen Insect. — Ich kann nicht glauben, daß das Thier a. b. c. die Gregarina des Herrn Leon Dufour seyn sollte — es scheint mir, daß die Gregarina *forficulae* entweder ein unausgebildetes Thier ist, oder einer anderen Art angehöre.

### *Clepsidrina ovata.*

Fig. a. b.

Dieser Eingeweidwurm findet sich im Dünndarm der *Amara cuprea* einer Carabiceen-Art; ganze Länge  $\frac{1}{2}$  Wiener Linie. Kopfteil  $\frac{200}{200}$ '''', Fig. b. 1. 2., Vorderkörper 2. 3. mißt  $\frac{17}{200}$ '''', Mittelkörper  $\frac{200}{200}$ ''' 4—5, Hinterkörper 5—7 mißt  $\frac{200}{200}$ '''', also zusammen  $\frac{200}{200}$ ''' oder  $\frac{2}{200}$ ''''. Die größte Breite bey 3—3 und 6—6 beträgt  $\frac{200}{200}$ ''' oder  $\frac{1}{200}$ ''' B. Linie.

### *Clepsidrina tenuis.*

Fig. a. b. c.

Ich entdeckte diesen beynahe runden, fadenartigen Eingeweidwurm in der Larve von *Allecula morio*. — Die ganze Länge circa  $\frac{1}{2}$ ''''. — Kopfteil von 1—2 Fig. b. =  $\frac{200}{200}$ '''', Vorderkörper 2—4  $\frac{200}{200}$ '''', Mittelkörper 4—5 mißt  $\frac{200}{200}$ '''', Hinterkörper 5—7 maß  $\frac{200}{200}$ '''', zusammen  $\frac{200}{200}$ ''' oder  $\frac{1}{2}$ ''''. Breite fast durchaus gleich  $\frac{200}{200}$ ''' oder  $\frac{1}{200}$ '''.

### *Rhizinia curvata.*

Fig. a. b.

In der Larve von *Cetonia aurata* fand ich nebst einer Species von *Clepsidrina* auch diesen Eingeweidwurm. — Die

Größe wechselte von  $\frac{70}{200}$  auf  $\frac{150}{200}$ , also von  $\frac{1}{3}$  bis zu  $\frac{3}{4}$ ". Der Kopfteil mißt  $\frac{10-25}{200}$ , die eigentliche Körperlänge von 2 bis 3 —  $\frac{65-125}{200}$ ". Die Breite an dem obern Theil des Körpers beträgt  $\frac{10-14}{200}$ ", der Körper läuft gegen abwärts spitzig zu, und krümmt sich nach einwärts. In der Gesellschaft dieses Thierchens fand ich noch eine Gregarina Fig. c. — Ob letzteres Thier nicht vielleicht eine primäre Form sey, werden weitere Beobachtungen zeigen. —

### *Rhizinia oblongata.*

Fig. a.

Im Dünndarm von *Opatrum sabulosum* — ich fand es nicht in großer Anzahl befallen, oft nur einzelne Exemplare. Der Kopfteil 1 — 2 mißt in der Länge  $\frac{20}{200}$ " von 2 — 4 die Körperlänge  $\frac{100}{200}$  —  $\frac{230}{200}$ ", somit beträgt die ganze Länge des Thieres  $\frac{105-125}{200}$ " oder  $\frac{1}{2}$  —  $\frac{3}{4}$ ". — Die Breite des Kopfteils beträgt  $\frac{20}{200}$ ", die des Körpers bey 5,  $\frac{18-20}{200}$ "; bey 3  $\frac{20}{200}$ ". — Die wurzelförmige Gestalt dieses Eingeweidewurmes bestimmte mich, das Genus *Rhizinia* aufzustellen, wovon diese Species als der Hauptrepräsentant erscheint, und wovon ich nun bereits 8 Species entdeckte.

### *Pyxinia rubecula.*

Fig. a — g.

Im Darm von *Dermestes vulpinus* kommt dieser Eingeweidewurm vor, der eine höhere Organisation zeigt als die Gattung *Clepsidrina* und *Rhizinia*; ich fand deren zu 8 — 10 Stück in ein und demselben Darm. Die ganze Länge beträgt  $\frac{1}{2}$  —  $\frac{1}{4}$ " vom Kopfe bis zum Anfang des Hinterkörpers  $\frac{12-15}{200}$  nehmlich von 1 bis 4, von 4 bis zum Körperende 8 —  $\frac{35-40}{200}$ ". — Die Breite des Körpers bey 5 beträgt  $\frac{20}{200}$ , also  $\frac{1}{25}$ ". — Die Bildung der Saugmündung erinnert an die *Caryophyllen*.

Das Thier ist braunröthlich gefärbt. — Der Kopfteil kann beynähe ganz in den Vorderkörper eingezogen werden. — Der Einschnitt zwischen dem Vorder- und Hinterkörper sehr deutlich — der Hinterkörper ist um das dreifache länger als der Vorderkörper, während bey *Clepsidrina* die Länge des Vorder- und Hinterkörpers beynähe gleich ist, und bey *Rhizinia* dagegen der Körper ohne alle Einschnürung das 8 — 10fache des Kopfteiles beträgt.

### *Bullina tipulae.* \*

Fig. a. b. c.

Dieser blasenartige, im Durchmesser  $\frac{1}{4}$ " große Eingeweidewurm hält sich in den Larven der *Tipula pectinicornis* auf,

\* Die Genera *Clepsidrina*, *Rhizinia*, *Pyxinia* u. *Bullina* scheinen der Classe der Trematoden anzugehören, und theils den Distomen, theils den Monostomen verwandt zu seyn, vielleicht selbst diesen Geschlechtern einverleibt werden zu können.

Leuckart.

und zwar nicht in den Eingeweiden, sondern außen in der Körperhöhle an den in den Magen einmündenden Speicheldrüsen. — Ich fand dieses blasenartige Thier in der *Tipula-Larve* zu 2 — 5 Stück, doch ganz bewegungslos. — Auch bey einigen *Dytiscus-Arten* fand ich einen ganz ähnlichen Eingeweidewurm, jedoch außen im Fettkörper.

### *Filarina vitrea.*

Fig. a. b.

Diese unter die Nematoideen gehörige Gattung von Eingeweidewürmern, dessen Länge  $\frac{70}{200}$ " oder circa  $\frac{1}{4}$ " und dessen Breite  $\frac{2}{25}$  Wiener Linie beträgt, findet sich in dem Dünndarme von *Trichius hemipterus*. Ich fand in einem trächtigen Weibchen eines *Trichius hemipterus* nur 3 Stück. — Leider habe ich meine Untersuchungen über dieses Thier, so wie die beyden folgenden noch nicht vervollständigen können, um die innere Organisation kennen zu lernen; jedenfalls bildet das Thier eine selbstständige Gattung; wovon ich bisher zwey Species entdeckte.

### *Anguillina monilis.* \*\*

Fig. a.

Ich fand dieses  $\frac{1}{2}$  bis 1" lange Eingeweidewürmchen in dem Dünndarm von *Aphodius conspurcatus*. Ausgezeichnet sind die 2 Reihen Punkte, die sich perlschnurartig der Länge des ganzen Thieres entlang herabziehen; ich fand in einem *Aphodius* bloß 2 Exemplare. —

## 2. Ueber die Spermatozoen der Insecten.

Von demselben.

Tafel IV.

Die bisher beobachteten und beschriebenen Spermatozoen sind so klein, daß sie im eigentlichen Sinne des Wortes den Beobachtungen der Naturforscher entweichen. \*\*\*

Ich habe mich schon oft überzeugt, daß die größten und schärfsten Vergrößerungen des Microscops kaum hinreichen, um bey den Sp. der Säugethiere und Fische nur die dunkeln Umrisse eines sich bewegenden Wesens zu erkennen. — Dagegen

\* Wodurch möchte wohl das hier abgebildete Genus *Bullina* von der Fig. c. *Gregarina* generisch verschieden seyn? Leuckart.

\*\* Gut wäre es gewesen, wenn der Verfasser wenigstens eine Charakteristik der von ihm aufgeführten Genera gegeben hätte. Leuckart.

\*\*\* So arg ist's doch nicht. Ich habe z. B. durch ein gutes plößliches Microscop bey meinem Freunde Germack im Herbst 1834. die Samenthierchen von einem Salamander nicht allein sehr deutlich sehen, sondern auch an dem Körper derselben schon damals Härchen oder Wimperchen entdecken können. Leuckart.

scheint die Dehnung der Insecten berufen zu seyn, uns über das Wesen der Spermatozoen nähere Aufschlüsse zu geben, denn gerade bey den Insecten habe ich bisher die größten Spermatozoen gefunden.

Vorzugsweise in den Samengefäßen der Schmetterlinge habe ich Spermatozoen gefunden von  $\frac{1}{6}''$ ,  $\frac{1}{4}''$ ,  $\frac{1}{3}''$ , ja sogar von  $\frac{2}{3}''$  Wiener Linie; von einigen betrug die Breite schon  $\frac{1}{12}''$ , und ich konnte z. B. bey den im Ductus spermaticus der *Noctua puella* gefundenen Spermatozoen Fig. i. k. m. am stumpfen Körperende schon deutlich die innere Organisation eines Darmes erkennen. —

Da die Spermatozoen der Insecten um vieles größer sind als bey andern Thieren, so wird hiedurch schon die Beobachtung derselben um vieles erleichtert, und ich glaube, die Herrn Naturforscher auf vieles Umstand um so mehr aufmerksam machen zu müssen, als wir hiedurch vielleicht zu einigen befriedigenderen Resultaten über eine Thierclassen gelangen können, die noch so sehr im Dunkel ruht. —

Eigentliche Cephaluroideen habe ich bey den Insecten noch nicht auffinden können, sondern durchgehends nur Uroideen. Einige derselben haben die Form eines in die Runde gelegten Fadens wie bey Fig. a.; oft liegt aber das eine Ende des Körpers frey wie bey Fig. b. c. f. g., während der andere Theil des Körpers zwey-, dreyfach in die Runde gewunden ist, so daß es die Form einer Schlinge hat. So lange das Thier in der Lage bleibt, wie bey Fig. i. oder f. 2., hat es fast ganz die Gestalt der Cephaluroideen, und man könnte bennähe verleitet werden, es dafür anzusehen, da man das andere Ende des Körpers gar nicht sieht, so lange es in die Runde gewunden bleibt — erst wenn sich die ganze Rundung aufrichtet, und dann plötzlich auswickelt, wie bey Fig. e. h., was besonders dann geschieht, wenn die Samenmasse mit Wasser sehr verdünnt wird, sieht man, daß der scheinbare (die Schlinge bildende) Kopftheil, nichts anderes als der in mehreren Windungen zusammengerollte Körper ist.

Bisher habe ich unter den Spermatozoen der Insecten 3 Haupt-Genera gefunden:

1. Solche, die im natürlichen Zustande eine schlingenartige Form haben und sich dann im todtten Zustande aufrichten oder plötzlich auswickeln: *Pagiura*.
2. Solche, die eine spiralförmige Form haben und wovon das eine Körperende stumpf, das andere aber zugespitzt ist: *Spirulura*.

3. Solche, die lockenartig zu 3 u. 4. in andere gewunden, zu beyden Enden spitz auslaufen: *Cincinnatiura*. \*

Diese sämtlichen Hauptformen gehören zu den Uroideen.

\* Ob diese drey Genera bestehen bleiben können, fragt sich sehr. Das Gen. *Pagiura* scheint in seiner Form mit dem Gen. *Cincinnatiura* sehr übereinzustimmen. Die verschiedene Art der Verschlingung bey beyden kann gewiß zu keiner solchen Trennung in zwey Geschlechter einen genügenden Grund geben.

4. *Pagiura* Fig. a. b. c. d. e. aus den Samengefäßen von *Ranatra linearis* bey 305facher Vergrößerung.

Natürliche Länge  $\frac{1}{2}$  bis  $\frac{3}{8}$  Wiener Linie.

— Breite  $\frac{2}{1000}$  bis  $\frac{1}{1000}''$ .

Im lebenden Zustande wie bey a., sobald es absterbt, schnellst es sich plötzlich der ganzen Länge nach aus — und fährt mit großer Schnelligkeit auseinander, wo es dann in einer gestreckten und unbeweglichen Lage, wie bey d. u. e. bleibt. — Es stirbt fast augenblicklich, wie es ins Wasser kommt.

5. *Pagiura* Fig. 1. 2. g. h., aus den Samengefäßen von *Cleonis glauca*. Ganze Länge des gestreckten Thieres  $\frac{1}{16}''$ . — Sobald das Thier ins Wasser kommt, schnellst es sich plötzlich auf die 3fache Länge auf. Es stirbt benähe augenblicklich im Wasser. So lange es die Form von Fig. 1. hat, gleicht es fast den Cephaluroideen bey Menschen und Kaninchen.

6. *Spirulura* Fig. i. k. l. m. aus dem Vas deferens von *Noctua puella*. Die natürliche Länge  $\frac{1}{3}$  bis  $\frac{2}{5}''$ .

Breite in der Mitte des Körpers  $\frac{1}{100}$  bis  $\frac{1}{130}''$ .

— am stumpfen Ende bey m.  $\frac{1}{120}''$ .

Das stumpfe Ende m. läßt einen dunkleren Körper fast wie einen Darm durchschinen. Das Thier bewegt sich schlangenartig, windet sich spiralförmig und lebte durch einige Stunden im Wasser.

7. *Spirulura* Fig. n. aus den Samengefäßen von *Tinea pellionella*.

Natürliche L.  $\frac{1}{3}''$ , Breite  $\frac{1}{120}''$ .

Auch fanden sich darunter viel kleinere Exempl. zu  $\frac{1}{12}''$ .

8. *Spirulura* im Ductus spermaticus von *Papilio rhamni*.

Natürliche L.  $\frac{1}{2}$  bis  $\frac{1}{4}''$ , Fig. o. p. g.

9. *Cincinnatiura* Fig. r. s. aus Duct. sperm. von *Omasus leucophthalmus*.

Länge  $\frac{1}{2}$  —  $\frac{3}{4}''$ . Breite  $\frac{1}{100}''$ . Die Windungen betragen im Durchmesser  $\frac{1}{45}''$ .

Dr. Sammerschmidt.

## Zoologische Bemerkungen

von J. G. Büttner, Pastor zu Schled in Gurland.  
März 1837.

Da Ihre Naturgeschichte sich nicht, wie es gewöhnlich der Fall ist, auf trockene Beschreibung der Form beschränkt, sondern auch die Geschichte, das Leben und Weben der Thiere liefert, soweit Beobachtungen darüber vorhanden sind; so halte ich jeden für verpflichtet, Ihnen an die Hand zu gehen und Materialien zu liefern, soviel er vermag. Ich will Ihnen daher von meinen Beobachtungen diejenigen in möglichster Kürze mittheilen, wovon ich glaube, daß sie für Ihre Naturgeschichte von Interesse seyn können.

1) *Astacus fluviatilis* erlangt bey uns nicht selten eine Länge von 5—6 Zoll und eine Breite von  $1\frac{3}{4}$ ; die Schenken  $3\frac{1}{2}$  lang,  $1\frac{1}{2}$  breit.

2) *Hippobosca*. Rittet, geht, fährt man durch einen Wald, wo Glende fliehen, so ist einem der Nacken in kurzer Zeit voll Hipp. (von den Jägern Glendefliege genannt), welche in die Haare unter den Hut kriechen und einen unangenehmen Kitzel erregen. Sie sind kleiner als Hipp. equina und größer als Hipp. hirundinis, aber viel mehr behaart und braun. Die Glende kommen oft aus dem Walde heraus, stürzen sich ins Wasser und schwimmen ins Weite hinein in die Dörfer, daß sie von naheeliegenden Fischerbauern geholt und erschlagen werden, was dann Prozesse mit den Förstern veranlaßt. Wahrscheinlich suchen sie dieser Fliegen los zu werden.

3) *Oestrus*. Im Glendestande fand ich einen *Oestrus* 8 Linien lang, 4 breit, schwarz, mit gelb grauen Haaren bedeckt, besonders an den Rändern des Kopfes, der Brust und der Bauchringe. Wahrscheinlich auf das Gieud angewiesen.

4) *Cecidomyia destructor*. Folgende Feinde des Getreides habe ich hier beobachtet:

a. *Dilophus femoratus* Meig., vernichtet in manchen Jahren allen zu früh gesäeten Roggen: die 4 Lin. lange Made frisst das Mark aus der Staupe, ehe sich das dritte Blatt entwickelt hat; die Staupe wird roth und fällt um, was die Landwirthe auf die heiße Sonne schieben. Die Made verwandelt sich im Halme zur Puppe. In der Stube erschien die Fliege im October.

b. Um dieselbe Zeit und auf dieselbe Art greift noch eine kleine Fliegenmade den Roggen an, aber es gelang mir nicht, sie zur Veranblung zu bringen. Sie war dicker und hatte tiefere Einschnitte als die des *Dilophus*.

c. Im Frühlinge wurden wieder eine Menge Roggenhalme von Fliegenmaden getödtet. Ich erwartete eine zweyte Generation von *Dilophus*, erhielt aber eine *Oscinis*, der *O. lineata* sehr ähnlich.

d. *Noctua segetum* ist ein gefährlicher Feind, der selbst in diesem jetzt vergangenen Herbst viele Tausend Morgen gänzlich weggefressen hat. Glücklicherweise erscheint er nur etwa alle 10 Jahre und wird durch scharfes Eggen mit eisernen Eggen wahrscheinlich getödtet. Von 50 Maden, welche ich nach dem Eggen auflesen ließ, blieb nicht eine am Leben; alle bekamen einen schwarzen Fleck, der sich ausbreitete und den Tod brachte, wahrscheinlich war das der Fleck, an welchem die Zinken der Egge die Made gefaßt hatten.

e. *Elater segetis* verheert zwar nicht so sichtbar, aber noch viel nachtheiliger als jene die Saat; erstens weil er viel öfter in Menge erscheint, ztens mehrere Jahre dauert, ztens fast jede Frucht verdirbt, die in den Acker gesät wird. Im Herbst frisst er die jungen Stauden unbedacht, im Frühlinge beißt er eine Menge Stauden und später Halme an der Erde weg, ebenso im nächsten Jahre Gerstenhalme, und endlich frisst er die garten Kartoffelkeime weg. Wahrscheinlich ist es nicht bloß die Made des *E. segetis*, sondern die mehrerer in der Erde lebender *Elater*-Arten, als *E. obscurus*, *testaceus* etc.

NB. Wir hoffen jetzt auf ein Mittel gekommen zu seyn, wodurch wir die Zahl dieser Feinde verringern werden. Nehmlich jemand, der ungegerbte Thierhäute mit der Fleischseite auf die Erde gelegt hatte, fand eine Unzahl Elater an den Häuten nagend.

f. Eine Schmetterlingsmade fraß in einem Jahr die Körner aus den Roggenähren.

### 5) Gerstenfeinde.

a. Eine *Haltica* vernichtet bisweilen die ersten Blätter der keimenden Pflanzen.

b. *Oscinis lineata* vernichtet sehr oft große Felder und thut fast jährlich großen Schaden.

NB. Ihr Feind ist ein *Ichneumon*, der bisweilen  $\frac{1}{2}$  der Maden tödtet.

c. Eine *Elater*made frisst bisweilen in die Halme und frißt die Körner aus den Ähren.

d. *Elater segetis*? biß 1835.  $\frac{1}{4}$  der Gerstenhalme an der Erde weg.

e. Eine Fliegenmade von der Größe eines Flohes frisst die Körner in den Ähren hohl.

### 6) Haferfeinde.

a. Die Haferstübsaat wird sehr oft von einer ganz kleinen, 1 Lin. langen Fliegenmade gänzlich vernichtet. So wie der Haferkeim aus der Erde kommt, legt die Fliege ihr Ei, und ehe das dritte Blatt sich entfaltet, hat die Made das Mark ausgefressen. Die Fliege kommt im May aus der Puppe und ist so groß wie ein Floh, schwarz.

b. Von einer Schmetterlingsmade werden die Körner in der Ähre gefressen.

7) In unsern Speichern gibt es keine Insecten, welche das Korn angreifen, weil wir es dörrten; 6—10' hoch schütten wir das Getreide und lassen es ohne Gefahr Jahre lang liegen.

8) Es scheint mir, daß es ein Hauptgeschäft der Insecten ist, alles Kranke und Todte schnell zur Verwesung zu bringen, damit neues Leben Raum und Nahrung achalte: denn an die gesunden und starken Gewächse macht sich nicht leicht ein Insect; aber an die kranken gleich: das gilt besonders für die Insecten, welche im Stamme und in der Rinde der Bäume leben. Wenn hier, was in allen dürrten Jahren geschieht, ein Strich Waldes abbrennt, so erscheinen in den beschädigten absterbenden Bäumen

1) Rindenschäler (*Bostrychus*, *Hylesinus*), unterhöhln die Rinde, daß sie locker wird, so daß, wenn die Sprechte diese an mehreren Stellen durchhacken, sie abfällt;

2) dann kommen die Holzböcke, Linne's *Cerambyx*; leben erst vom weichen Rindensplint und bringen dann in den Holzplint. Ist die Rinde gelöst, so machen die Bohrkäfer, *Apate* und *Lymexylon*, von außen bis zur Mitte des Kerns runde Löcher.

3) Ist der Baum mehr im Absterben, dann finden sich *Buprestis*, und endlich

4) wenn er ganz weich ist, *Elatér* und *Lucanus*. Dieser Gang gilt besonders für die Nadelhölzer. In Laubbäumen erscheinen sie mehr gleichzeitig. Es leben in:

*Pinus sylvestris*: *Bostrychus typographus*, *Hylesinus piniperda*, *Cucujus caeruleus*, *Apate*? *Lamia aedilis*, *sutor* (der größte). *Spondyl. buprestoides*, *Callidium rusticum*, *fasciatum*, *bajulus*, *striatum*, *undatum*, *Calopus serraticornis*; *Dircaea laevigata*, *Buprestis mariana*, *rustica*, *8guttata*, *tarda*; *Elatér sanguineus*.

In *Pinus abies*: *Bostrychus 8dactylus* (Hyles. *piniperda*), *Apate*, vielleicht dieselbe des *Pinus sylvestris*, *Lamia sutor*, die kleinere; *Leptura marginata*, *Buprestis chrysostigma*, *morio*, *quadripunctata*; *Dendrophagus crenatus*; *Prionus depisarius*.

*Quercus pedunculata*. In der dicken Rinde selbst: *Buprestis biguttata*, *affinis*; *Bostrychus pygmaeus*; *Apate*? *Anobium rufipes*, *tessellatum*; *Pyrochroa coccinea*; *Moliorchus abbreviatus*, *Clytus detritus*, *arcuatus*; *Callidium fennicum*; *Rhagium mordax*; *Leptura attenuata*; *Buprestis affinis*, *Trichius eremita*, *spunctata*.

*Betula alba*. *Bostrychus scolytus*; *Apate limbata*; *Lymexylon dermestoides*; *Lamia varia*; *Mordella fasciata*; *Clytus harniensis*; *Dircaea 4maculata*; *Upis cembraeoides*.

*Populus tremula*. *Bostrychus monographus*, *Melasis spondylioides*; *Cucujus depressus*; *Leptura thoracica*, *varicornis*; *Rhipiphorus fennicus*; *Buprestis aenea*, *conspersa*.

*Fraxinus excelsior*; *Bostrychus crenatus*.

In *Tilia*, *Acer*, *Juniperus*, *Taxus*, *Pyrus*, *Crataegus*, *Sorbus*, *Elyonimus*, *Cornus*, *Lonicera* habe ich keine Rinden- und Holzesser gefunden.

Wünschen Sie hierüber Auskunft, so stehe ich zu Diensten. Meine Kenntniß erstreckt sich besonders auf Waldb-Insekten.

In unsern großen, an manchen Stellen undurchdringlichen Wäldern geht das Lagerholz nicht aus, und mit dem Lagerholze gehen auch viele Insektenarten nicht aus; aber sehr oft haben die letzteren doch nicht genug absterbende oder umgefallene Bäume. Dessen ungeachtet habe ich immer und alle Jahre ganz vergebens in den gesunden Stämmen nach Rinden- und Holzbewohnern gesucht. Selbst die Stämme, die ganz an der Gränze des Ausbrandes stehen, bleiben ganz verschont, ja, wenn die eine Seite des Baumes verbrannt ist und diese voller Maden steckt, so sind sie wohl bis zur gesunden Hälfte, aber nie in diese hineingegangen. Es ist also die Erscheinung des *Bostrychus*, *Hylesinus* etc. nicht die Ursache des Absterbens der Bäume, sondern nur eine Folge desselben. Doch eine Ausnahme machen die Markfresser *Saperda* und *Sesia*. Diese habe ich oft dem Anschein nach in ganz gesunden Bäumen gefunden, z. B. *Saperda carcharias* in jungen Eichen (*Populus tremula*), ganze Waldstücke verderbend, indem das Ausfressen des Markes die Kernsäule verursacht, welche alle großen Stämme zum Gebrauche untauglich macht.

Ueber folgenden Grundsatz habe ich starken Streit mit vielen Entomologen. Nämlich ich halte dafür, daß bey dem Bestimmen der Species nicht bloß die Form, sondern auch die Lebensart entscheiden müsse. Mehrere ganz ähnlich gebildete Käfer führen eine völlig verschiedene Lebensart, z. B. *Chrysomela armoraciae*.

1) Eine lebt auf *Cochlearia armoracia*, erscheint alle 4—5 Jahre in meinem Garten, sitzt ganz zerstreut auf den Blättern.

2) Eine zweite lebt auf *Brassica*, erschien in 30 Jahren hier auf dem Lande nur einmal, dagegen ist sie in der Stadt Windau jährlich, zieht 2—3 Mann hoch in völlig geschlossenen Gliedern von 12—20, so daß das zweite Glied in dem Zwischenraum geht, den das erste Glied gelassen hat, das Blatt abschälend.

3) Eine dritte lebt auf *Veronica beccabunga* alljährlich in großer Menge, aber nur auf dieser Pflanze.

4) Eine vierte lebt auf Sumpfpflanzen, alljährlich in großer Menge, ist kleiner als Nr. 3.

Aus dem Genus *Haltica* Geoffroy, Linne's *Chrys. saltatoriae* sind eine Menge blaugrüne ohne Auszeichnung, die auf ganz verschiedenen Gewächsen zu finden sind.

1) Auf Birkeln zu Tausenden 2 Lin. lang, blau, stark, nach vorn verjüngt.

2) Dicht dabei, auf Haseln zu Tausenden, etwas kleiner, graulich, gleich breit.

3) Auf Weiden zu Tausenden wie Nr. 1., aber viel kleiner.

4) Auf *Pinus sylvestris* halb so groß als Nr. 3.

5) Auf Kohl Chr. *oleracea*.

6) Auf *Epilobium angustifolium*; blau, etwas größer als Nr. 4.

Alle diese bleiben sich in Farbe, Größe, Aufenthalt und Form gleich.

Diesen Grundsatz, daß solche Abweichungen bey der Bestimmung der Arten entscheiden müssen, verwerfen viele Entomologen ganz, und behaupten, alle diese Käfer müssen für eine Species gehalten werden, weil man keine Abweichung in den beständigen Merkmalen finde. Ich, der Sammler, kann mich nicht zu ihnen schlagen.

Sie nehmen an, daß wohl ein *Tabanus* die Kühe zum wilden Rennen bringe. Das habe ich nicht gefunden. Meine Kühe kommen sehr oft bedeckt von *Tabanus bovinus*, *taranus* etc. aus dem Walde: das bringt jüngere Kühe wohl zum Trotz aber nie zum Galopieren, und die alten Kühe treiben den *Tabanus* mit dem Kopf und Schweife weg. Erscheint aber ein *Oestrus*, so nehmen sie erst die Stellung des Horchens an und dann heben sie den Schweif in die Höhe, ohne mit demselben um sich zu schlagen, und setzen sich dann in wilden Galopp. Ich habe die laufenden Thiere oft beobachtet, aber durchaus nichts auf dem Rücken sitzen sehen. Wahrscheinlich läßt der *Oestrus* seine Eier auf den Rücken der Thiere fallen, und das Summen ist den Kindern so schreckhaft.

## Amphibien.

Mehrere Jäger, Bauern u. behaupten, Schlangen von 3—4 Klafter Länge und 4—5" im Durchmesser dick gesehen zu haben. Alle Nachrichten stimmen darin überein.

1) Sie sind in der Nähe der Sümpfe, Seen und Flüsse, 2) blaugrau, 3) greifen nie den Menschen an, so daß alle Anzeigen dafür sprechen, daß es Wasserschlangen (*Coluber natix*) sind. Obgleich man von sehr vielen Seiten und Orten die bestimmten Anzeigen erhält, so ist doch noch keine von einem Naturforscher beobachtet oder gefangen worden. Die größte *Natrix*, die ich gesehen habe, möchte etwa 5' lang gewesen seyn und über 2" dick. Die größte *Coluber berus* hielt zwei rüßige Eilen.

*Coluber berus et prester* habe ich in einander übergehend gefunden, nemlich was die Farbe betrifft. *Berus* erscheint am häufigsten hell stahlblau und auch braunroth mit schwarzer Zeichnung, geht über aus hell- in dunkelstahlblau; schwärzlich, mit Abzeichen; schwarz ohne Abzeichen; schwarz mit kreideweissen Flecken in den Winkeln. Ihr Biß bringt bey uns starke Geschwulst und 4—6 wöchentliche Unfähigkeit zum Arbeiten hervor: allein 1836. starb ein Mädchen, das in den Fuß gebissen war, nach 2 Stunden. Die Füße sind ihm nicht geschwollen, wohl aber der Kopf und die Brust.

Die Nachrichten der Waldbewohner über eine kreideweisse Schlange sind sehr übereinstimmend; 6—7 Zoll lang und Fedeckels dick. So wie über eine höchst giftige, kleine dunkelrothe, glänzende Schlange, deren Biß das Vieh augenblicklich tödtet. Diese beyden, nemlich die weisse und diese kleine giftige sind noch nicht von Naturforschern gefangen worden. Das fällt aber dem nicht auf, der weiß, wie diese Thiere den Nachstellungen des Menschen entgehen. Ich habe sie in meiner Gegend mit großem Eifer gesucht und verfolgt, habe aber nur *Coluber berus*, *chersea prester*, *Natrix* und *Anguis fragilis* gefangen, und dennoch wurde mir ein Paar *Coluber austriacus* gebracht, welche in meinem Jagdbrevier im Winter aus der Erde gegraben wurden. In mehr als 40 Jahren war sie nicht nur mir, sondern auch allen Bewohnern dieser Gegend entgangen; kein Bauer und kein Jäger kannte sie.

*Rana esculenta*. In landwirthschaftlichen Schriften wird darüber gestritten, ob er den Fischeichen schädlich ist. In allen, die ich sezierte, fand ich junge Fische, in einem sogar 12 junge Karpfen.

## Vögel.

*Aquila*. Er legt zwey Eyer und hat doch nur ein Junges. Höchstwahrscheinlich frisst das größere Junge das kleinere auf: denn gefressen findet man es. Er bringt seinen Jungen vom *Charadrius apricarius* an bis zum Auerhahn alle Landvögel.

*Lanius minor* erscheint 10 Sommer gar nicht; dann ist er mehrere Sommer hinter einander auf allen Dornbüschen zu finden.

*Corvus cornix* ist fortwährend der Bewohner Kurlands: dennoch zieht eine zahllose Menge im Herbst über die russische

Hehrung nach Preußen. 1802 fuhr ich 2 $\frac{1}{2}$  Tag auf der Hehrung, und von der Morgenämmerung bis zur Abendämmerung sah ich ununterbrochen diese Krähen so ziehen, daß immer mehrere Hundert am Horizont waren. In unserer Gegenwart stiegen sie die Bauern mit Regen.

*Corvus fragilegus* sondert sich bey'm Brüten ganz von jener ab und nimmt in großen Schwärmen Besitz von Heinen, in welchen sie jährlich ihr Wochenbette aufschlagen. Drey solcher Plätze kenne ich hier in Kurland, von denen sie Besitz genommen haben. An diesen Plätzen sollen sie bestimmt am 3. März erscheinen. Außer diesen Plätzen sieht man sie im Sommer gar nicht, im Herbst und Frühlinge bisweilen, aber nur wenige, und im Winter sieht man keine.

*NB. Corvus cornix* et *monedula* sind große Feinde der Feldfrüchte, was im Winter sichtbar wird: denn sie zerstören oft ganze Getreidehaufen, Heimen, und tragen die Aehren auseinander.

*Picus major* lebt in der Regel einzeln, aber im Jahre 1808. sah ich im July am Ostseestrande etwa 100 besammten, von denen kleine Jüge von 5—6 nach Süden flogen. Ein Freund von mir hatte im März eine ähnliche Menge an einigen besammten stehenden alten Eichen gesehen.

*Tetrao coturnix* kommt viele Jahre hinter einander gar nicht, dann wieder mehrere Jahre regelmäßig.

*Alauda cristata* bleibt Winters und Sommers hier, aber nur an bebauten Orten.

*Alauda arvensis* erscheint in den ersten Tagen des März.

*Fringilla spinus* frisst Blattläuse, sonst keine Insekten.

*Hirundo*. Nicht nur Fischer und unzuverlässige Menschen haben gesehen, Schwärmen bey'm Fischen unter dem Eise hervorziehen; sondern der Sohn eines Arztes hat von einer Fischerey im Winter eine Schwalbe nach Hause, einem kleinen Städtchen gebracht, wo eine Menge gebildeter Menschen Zeugen gewesen sind vom Aufleben der Schwalbe. Leider wußte keiner die Species anzugeben.

*Loxia curvirostra* brütet bey uns nicht im Winter, sondern im May.

## Zugvögel.

Wenn *Loxia enucleator*, *Ampelis garrulus*, *Fringilla linaria* vom Norden zu uns kommen, so ist in der Regel der Winter mild. Was treibt sie her?

1) Höchst merkwürdig ist, daß viele Zugvögel an bestimmten Tagen erscheinen, *Corvus fragilegus* am 3ten März, die Nachtigall am 4. Mai, so daß sie überhaupt sich nicht nach der Witterung, sondern dem Kalender richten und die Witterung wenig Einfluß hat. Wir mögen Winter haben oder nicht, vor Anfang des März (a. St.) erscheinen die Zugvögel höchst selten, nemlich die zuerst erscheinenden, als die Lerche, der Staar, Kibitz, Brachvogel. Die später ankommenden erscheinen viel regelmäßiger. Sie ganz und immer zu bemerken, wann sie angekommen sind, gebören Angaben von vielen



Seiten: denn es gibt geschützte Stellen, wo sie 8 und mehr Tage früher sich einsinden, wenn die Witterung zu tauh ist.

2) Die Duna soll die Gränze machen, welche von den Störchen nicht überschritten wird. Bey uns herrscht der graue Haie, dort der weiße vor. Viele Jahre hat es gedauert, ehe die Nehe über die Duna giengen. Jetzt sollen sie sich dort auch finden.

### Säugthiere.

Der Biber ist bey uns gänzlich ausgerottet, und meine Vorstellungen, dieses nützliche Thier zu zähmen und dadurch größern Nutzen von ihm zu ziehen, werden nur verlacht und verspottet. Größtentheils hat er hier nur in Gruben gelebt, doch auch Häuser gebaut von Bäumen oder von Strauch. Meines Küsters Großvater ist auf solche Strauchhütte hinaufgestiegen, um den Biber herauszutreiben, was ihm aber bemähe theurer zu stehen gekommen ist: denn als der Fuß durch das Strauchwerk durchbricht, haut der Biber ihm die Hosen, Stiefel und den Strumpf durch, und nur durch schnelles Ausziehen hat er den Fuß gerettet. Sie haben hier nicht bloß an Flüsssen, sondern auch in Sümpfen gelebt und sich von Weidenstrauch genährt.

*Lepus variabilis* unterscheidet sich vom grauen dadurch,

1) daß er sich nicht leicht mit demselben begattet, so daß man selten Blendlinge findet, obgleich sie in den Wäldern vermengt leben;

2) daß er die Felder nie besucht und nicht vom Roggen, sondern nur von Weiden- und Espenstrauch lebt;

3) daß, wenn er gejagt wird, er nicht gerade und weit fortzieht, sondern durch Zickzacklauf den Hunden zu entgehen sucht, zum wenigsten mehr als der graue.

Das Elend hat sich seit 1796. wieder bey uns eingefunden (früher war es durch Wölfe und eine Seuche ausgerottet). Dieses harmlose Thier kommt nie auf die Felder und Schläge, waidet aber in den Wäldern sehr oft mit dem zahmen Vieh zusammen und läßt sich dann von den Hirtenmädchen weit fortreiben. Seine Hauptnahrung sind Espen und Weiden. Da es über Sümpfe weggeht, in welchen Pferde und Rinder stecken bleiben, so würde es sich sehr zum Hausthiere eignen; allein auch dieser mein Vorschlag wird verlacht.

Den 7ten April. Es ist bey uns tiefer Winter, die Erde mit hohem Schnee bedeckt, die Flüsse mit einer festen Eiskecke überzogen: dennoch langten die Staare, Tauben, Lerchen den 12. März an und die Bachstelzen den 30. März, die Störche den 2. April; also keineswegs die Witterung, sondern der Stand der Sonne hat sie fortgetrieben. Am 13. April ist bey uns noch tiefer Winter und alles mit 2' tiefen Schnee bedeckt. Die Zugvögel sind wieder völlig verschwunden.

Erkundungstrieb der Kohlmeisen. Ich hängte im Winter Licht-Enden und Ballnuschalen mit Hanffamen gefüllt an Fuß lange Fäden vor mein Fenster außerhalb auf. Anfanglich hängten die Meisen sich an die Licht-Enden und Ballnuschalen an und ließen sich mit schwingen; das wurde ihnen aber bald zu ästig, und nun zogen sie beyde Speisen an der Schnur in die

Höhe, wie der abgerichtete Reissig in der Stube, hielten mit dem Fuße die Speisen fest und fraßen mit aller Gemächlichkeit. Ein altes Männchen that noch etwas Auffallendes; es nahm nemlich die Speisen, wenn es solche aufgezogen hatte, in den Schnabel und drehte sich auf dem Hölzchen, woran die Speisen gebunden waren, um, so daß, wenn es satt war, es die Lichtenden etc. fallen ließ und die Schnur aufgewunden und also immer kürzer wurde, so daß sie zuletzt ganz an das Hölzchen herankam und die Meise nicht mehr zu ziehen, sondern nur die Speise aufzuheben hatte: das machte diese Meise so oft, als ich den Faden zurückgewunden und verlängert hatte. Nie hab' ich gesehen, daß sie die Speise, sich zum Nachtheil, auf die andere Seite zurückgehoben hätte.

### Beweis von Ueberlegung eines Hundes.

Der hiesige Förster wohnt im Gehofe Schloß 2 Treppen hoch. Von dessen Wohnung bis zum Hundezwinger sind 200 Schritt. Am einem Wintermorgen wird an des Försters Thiere gekragt, der Förster öffnet: da tritt ein Jagdhund herein und legt ein eben geborenes, noch lebendes Junges (Hündchen) vor seine Füße, kehrt sich um und geht zur Thüre hinaus. Der Förster, der sich nicht erklären kann, was den Hund zu solcher Handlung bewogen, geht nach dem Zwinger und findet, daß die Hündin geworfen hat, aber mit allen Jungen gestorben ist, mit Ausnahme des einzigen, welches der Hund zu ihm gebracht hat. Bey diesem Hunde ist also das Mitleiden größer gewesen als der Widerwille, den sonst männliche Hunde vor eben Geworfenen haben.

Am 29ten Jänner 1838.

### 1) *Gasterosteus aculeatus*:

Klettert, wenn auch nicht auf Bäume wie der Kletterfisch; so doch an steilen Rasenwänden in die Höhe, wie ich es öfters selbst erfahren habe. Z. B. an dem Rande eines kleinen Baches ließ ich Lehm graben und den obern sandigen Rasen nach dem Bache hin aufeinander legen, wodurch ein fast senkrechter Wall nach der Bachseite hin entstand. Nach einem starken Regen, der die Lehmkuhle mit Wasser gefüllt hatte, so daß dieses über den Wall wegfloß, war die Lehmkuhle voller *Gast. acul.* Um zu versuchen, wie lange dieser arme Feind der Karpfenbrut in freyer Luft lebt, warf ich etwa 100 auf einen Aker. Nach 24 Stunden lebten alle und waren ganz munter.

NB. Es war im September, wohl bey sonnigem Wetter, aber doch feuchter Luft.

### 2) *Salmo salar* laicht bey uns im Noorb.

3) In meinen Teichen erfriert der Karpfen- und Karauschen-Laich, auch wenn das Wasser nicht mit Eis überzogen und das Thermometer nicht auf 0 herabgesunken ist. Diese Empfindlichkeit des Laiches scheint nur in folgenden Umständen zu liegen. Diese Fische legen ihren Laich an ganz seichter Stellen auf Gräser, die sie bey dem Laichen niederdrücken, so, daß wenn die Gräser sich aufheben, der größte Theil des Laiches die Luft berührt, oder doch ganz dicht an der Oberfläche des Wassers zu liegen kommt. Nur dieser entwickelt sich, wenn die Witterung günstig ist; der tiefer hinabgesunkene entwickelt sich nicht; jene erreicht aber der Frost ganz leicht, und darum erscheint keine Brut.



4) *Rana temporaria* ist ein arger Feind der Fischbrut. Er setzt seinen Laich da ab, wo später die Karpfen und Karauschen den übrigen absehen, und die früher auskommen den jungen Frösche bleiben da, bis die Fische laichen, und fallen dann gleich über den Fischlaich her, den sie von den Grashalmen wegnehmen, diese von unten nach oben durchsuchend. Sind sie mit dem Laich fertig, so fallen sie über die jungen Karauschen von 1 bis 2 Zoll Länge her und saugen ihnen das Fleisch von den Gräten. Ich bemerkte in meinem Teich Skelete von 2 Zoll langen Karauschen. Als ich mich nach der Ursache forschend umsah, bemerkte ich, daß auf einem Klumpen von solchen kleinen Fröschen ein gelber Fleck hervorschimmerte. Ich trieb die Frösche weg und fand eine kleine Karausche, von der die Frösche das Fleisch von den Rippen weggefressen hatten. Die Karausche lebte wohl noch, war aber zu matt, um sich aufzurichten zu können. Als ich weiter suchte, fand ich noch an ein Paar Stellen ebendasselbe. Unbegreiflich ist es mir, wie die scheißen waffenlosen Thiere sich eines so viel größeren und stärkeren Thieres sollten bemächtigen können. Es ist also möglich, daß unter den Karauschen eine Gattung geherrscht hat, welche sie matt machte. Aber auch alsdann bleibt es räthselhaft, wie die kleinen Frösche mit ihren weichen Speisewerkzeugen durch die Schuppe und die Haut der Karauschen durchkönnen.

NB. Diese Feinde schaffe ich leicht aus den Teichen dadurch, daß ich, wenn die Frösche laichen, den Teich hoch aufstecke und, wenn sie abgelaicht haben, den Teich so weit ablaufen lasse, daß der Fischlaich im Trocknen bleibt und vertrocknet.

5) In meinem vorigen Briefe beschrieb ich Ihnen unsere Kornfeinde. Dieses Frühjahr (1837.) hat sich ein neuer dazu gestellt, der dieses Jahr wahrscheinlich bey unsern Bauern Hungernoth verursachen wird.

Im April fieng der Roggen an von meinem Felde zu schwinden. Als ich ihn untersuchte, fand ich ganz kleine Fliegenmaden in den jungen Sprossen. Aus diesen entwickelte sich im Mai eine kleine braune Fliege, die mir bisher nie vorgekommen ist. Meine Augen sind zu schwach, um eine strenge Untersuchung anstellen zu können. So viel ich aber sehen kann, scheint es mir eine *Oscinis* zu seyn.

6) *Percia fluviatilis* erlangt bey uns eine Größe von 5 ja 10 Pfd., doch nie in Strömen sondern nur in Seen.

7) *Silurus glanis* wurde in einem See 180 Pfund, und noch einige Pfd. drüber, gefangen; doch die von 120 Pfd., gehören schon zu den seltenen.

Woher so sehr viel Abweichung in der Lebensart der Thiere, frage ich mich selbst oft. Ist es climatischer Unterschied? Oder sind es andere Thiere, von denen die deutschen Schriftsteller sprechen? Ich bin geneigt, das Letztere für richtig zu halten. Hier meine Beobachtung, indem ich Ihre Naturgeschichte ansehe.

NB. In meiner Sammlung sind nur kurländische Insekten.

8) Ich habe 11 Arten *Orchestes*. Ihre Körperform und der Käfer Lebensart ist so übereinstimmend, daß ich durchaus glauben muß: alle diese Käfer führen auch als Maden die Lebensart, welche Sie gleich vorn anführen, nemlich zwischen Jms 1838 Heft 5.

den Blatthäuten, wo ich 3 Arten gefunden: *viminalis* in Eichenblättern, *populi* in *Salix pentandra*-Blättern und nur in dieser Weide; verdrängt in meinem Garten jährlich die Blätter dieser Weide, ohne die andern anzugehen.

9) Der Pfeifer hat eine zu abweichende Lebensart, als daß er ein wirklicher *Orchestes* wäre. Er ist bey uns nicht.

10) *Rhynchaenus druparum* ist hier in großer Menge, lebt aber nur auf *Prunus padus* und kommt nie auf Obst-Bäume.

11) *Rhynchites betuleti* ist hier in großer Menge, lebt besonders auf Birken, rollt aber auch Birnblätter sehr häufig, doch auf Wein geht er nie.

12) *Rhynchites cupreus* lebt hier in großer Menge, aber ausschließlich auf *Sorbus aucuparia*, nie auf Zwetschken.

13) *Rhynchites alliariae* ist auch in Menge, läßt aber die Obstbäume unberührt.

14) *Apion frumentarium* ist in Menge in der Nähe unserer Speicher, dringt aber nie in sie hinein; wahrscheinlich, weil unser Korn geblüht ist.

15) *Anthribus latirostris* habe ich gezogen aus einem weichen, weißen Made, die im abgestorbenen Eichenholz lebte. Im Holze lebt auch wohl die des *A. albinus*.

16) *Bruchus pisi* kam ein Mal in meine Wirthschaft durch ausländische Saat von *Vicia faba*, allein die Käfer hatten wieder in dieselbe Bohne ihre Eier gelegt, und ich fand so Gelegenheit, sie alle zu tödten. Allein von derselben Saat hatte ein rigaischer Gärtner nach vielen Orten geschickt, und doch höre ich gar keine Klage über den *Bruchus*. Es muß denn doch das Klima ihm zu kalt seyn.

17) Ein anderer Feind, dem Anscheine nach eine *Curculio*-Made, greift unsere Erbsen in den Schoten sehr an; es ist mir aber nicht gelungen, das Insekt zu erzihen.

18) Daß die *Halticae* ihre Eier auf die Blätter der Gewächse legen, habe ich nie gefunden, obschon sie in meiner Wirthschaft großen Schaden thun.

19) *Ptinus fur* ist der einzige Käfer, der bisweilen unsere Speicher und Sammeteyen angreift. Wahrscheinlich leben ihre Maden in der Erde.

20) *Molœrus abbreviatus*. Die Made lebt im toden Eichen- und Eichenholz ziemlich häufig, und ich habe gegen 50 erzogen.

21) *Rhagium inquisitor* lebt als Made und Käfer unter der lockern Rinde aller abgestorbenen Baumarten, Nadel- wie Laubholz. Das macht mich glauben, daß er mehr vom Raube als Holze lebt. Eben so *R. indagator*. Dagegen lebt *R. mordax* nur im Eichenholze.

Wir haben einen für die lebende Welt vernichtenden Winter. Die Erde ist nur mit etwa 2 Zoll hohem Schnee be-

deckt, und es friert seit dem 21. Decbr. fast ununterbrochen 15 bis 20°. Die Eisdecke der Gewässer ist mehr als zwei Fuß dick. Alle Stromschnellen, die Waldströme, sind fest gefroren; die Erde ist geborsten und steht von den Wurzeln und Stämmen großer Bäume einige Zoll ab; eine mir fremde Erscheinung. Wie der Einfluß solchen Frostes seyn wird, muß sich im Frühling zeigen.

### Genera et species Curculionidum

cum *Synonymia hujus familiæ*, a C. J. Schöenherr. Lipsiæ, apud Fr. Fleischer. 1838. 8. IV. 2. 601.

Schon wieder ein Band von diesem trefflichen Werk, welches ein langes, der Wissenschaft gewidmetes Leben krönt und worauf der Verfasser mit Freude zurückblicken kann, da er überall die Anerkennung wahrnehmen muß, welche seiner Arbeit entgegen kommt. Auch hier haben Gyllenhal und Boheman die neuen Gattungen beschrieben. Die Sippen laufen von 353. *Zygops* bis 404. *Trophothorus*, und der Band schließt mit einem Register der Sippen und Gattungen beider Abtheilungen. Es wäre sehr zu wünschen, daß am Ende des Werks ein einziges Register folgte mit den Sippen allein und Gattungen allein, weil es sonst unmöglich ist, die letztern zu finden: denn wer kann wissen, unter welche Sippe diese oder jene Gattung gestellt ist. Bis jetzt haben die Verfasser nicht weniger als 4089 Gattungen Käufelkäfer beschrieben. Gewiß eine Arbeit, welche viele Jahre Zeit fordert, rastlose Ausdauer und ein ungemeines Gedächtnis in der Vergleichung der Charaktere. Wir wünschen den Verfassern Gesundheit, damit sie dieses Werk zu einem gedeihlichen Ende führen können.

### Abbildungen

zur Berichtigung und Ergänzung der Schmetterlingskunde, besonders der *Microlepidopterozoologie* von F. Fischer, Adler von Möslertamm. Leipzig bey Hinrichs. 1838. 4. Heft 9. 5 Tafeln ill.

Das Heft enthält wieder sehr schöne Abbildungen, und darunter die ganze Entwicklung der *Psyche graminella* mit der vergrößerten Raupe, Puppe, Fliege und der Blätterhülle; die einzelnen Theile vergrößert von verschiedenen Seiten. Das Weibchen gleicht völlig einer Made und hat nicht einmal Brustfüße. Ueber die Art der Paarung ist man noch immer nicht im Reinen, weil das Weibchen immer den Kopf an der Mündung der Hülle hat und sich darin nicht umkehren kann.

Von folgenden sind bloß die Fliegen abgebildet, aber von verschiedenen Seiten und mit kritischen Bemerkungen begleitet, sowie mit genauen Beschreibungen:

*Lithosia complana*, *lurideola* (*plumbeola*), *kühlweirii*; *Tortrix piceana* (*oparana* fem.), *americana* (*congenerana* et *pyrastrana*), *decretana*, *xylosteania*.

Dann folgen Beobachtungen von Tischer über den Raupenzustand von *Ornix anseripennella* (*Hemerobiella*).

Der Verfasser wohnt nun in Wien, Vorstadt Hundsturm, Johannastraße Nr. 154., wo er bey den reichen Sammlungen und bey den vielen Freunden der Naturgeschichte noch mehr zu leisten im Stande seyn wird.

### Groenlands Amfipoder

beskrevne af H. Kroeyer. Kjøbenhavn. 1838. 4. 98. 4. T.

Solche Werke sollten wirklich nicht in dänischer Sprache geschrieben werden, wo sie doch ein gar zu kleines Publicum haben. Es ist um den Patriotismus eine schöne Sache: allein wo er vergeblich angewendet wird, verdient er offenbar kein Lob. Will man in keiner andern lebenden Sprache schreiben, so muß man sich zur lateinischen bequemen.

Dieses Buch enthält so viele vortreffliche Beobachtungen und so deutliche Abbildungen mit allen einzelnen Theilen besonders zerlegt, daß man recht herzlich bedauern muß, daß sie für die Wissenschaft sogut wie zu Grunde gehen. Man kann nun einmal den andern Völkern nicht zumuthen, Sprachen zu lernen, worin so wenig erscheint: hat ja doch jetzt jeder Gelehrte wenigstens 6—7 Sprachen zu verstehen. Sollte er noch Dänisch lernen, so müßte er sich ebensovohl auch an das Schwedische, Polnische und Russische wenden, was doch den Leuten zuviel zugemuthet ist. Wenigstens sollten solche Schriftsteller selbst Auszüge ihrer Arbeiten für auswärtige Zeitschriften machen: denn es ist unmöglich, Uebersetzer zu finden, welche sich einem solchen Geschäft unterziehen könnten. Es gibt doch wohl keinen nordischen Schriftsteller, der nicht deutsch und französisch verstände. Die Isis zählt gern das bestimmte Honorar für den Bogen.

Der Verfasser beschreibt hier:

*Lysianassa vahlii*, *lagena* fig., *appendiculosa* fig., *Gammarus sabini* fig., *loricatus* fig., *pinguis* fig., *locusta*.

*Amphithoe carinata* fig., *hystrix* fig., *serra* fig., *pauopla* fig., *bicuspis* fig., *inermis* fig., *crenulata* fig., *lacviuscula* fig.

*Ischyrocerus anguipes* fig.

*Metoecus medusarum* fig.

*Themisto arctica* fig., *crassicornis* fig.

*Lestrigonus exulans* fig.

*Hyperia obliqua* fig.

*Praniza reinhardtii* fig.

*Jaera nivalis* fig.

*Bopyrus hippolytes* fig.

*Calanus hyperboreus* fig.

Dann folgt eine Uebersicht der grönländischen Krebs.

## De danske Oesters banker

et Bidrag til Kundskab om Danmarks Fiskerier, af H. Kroeyer.  
Kjøbenhavn. 1837. 8. 168. 2 Tab.

Mit diesem Werke ist es etwas anderes. Obgleich es wissenschaftlich behandelt ist, so hat es doch mehr ein practisches Streben, und dient vorzüglich dazu, die Austerbänke zu pflanzen, zu vermehren, zu schützen, die Austern zu sammeln u. s. w. Diesen Zweck würde es nicht erreichen, wenn es nicht in dänischer Sprache geschrieben wäre.

Zuerst behandelt der Verfasser die Naturgeschichte der Auster, und besonders die günstigen Umstände für ihr Gedeihen. Dann werden die Bänke selbst, der Fang und der Handel geschildert, die flachliegenden an den Küsten von Skagen, und vorzüglich die an Schleswig. Den Beschluß machen historische Nachrichten über den Fang der Auster.

Abgebildet sind verschiedene Instrumente, und dabey ist noch eine Karte von Jütland, Schleswig und Holstein mit der Angabe der Lage der Bänke. Gewiß eine nützliche Schrift, welche zur Aufnahme der Austerfischerey vieles beytragen wird.

## Bulletin

de la société impériale des Naturalistes de Moscou. Année  
1837. N. IV. 8. 64. 2 Tab.

Die Gesellschaft zu Moskau zeichnet sich immer durch ihre Thätigkeit aus und bereichert jährlich die Wissenschaft mit neuen Entdeckungen. Dieses Heft enthält eine Classification der Melanosomen von G. Fischer von Waldheim, nebst Beschreibung neuer Gattungen.

S. 19. Notiz über die saure Beschaffenheit des Blutes von R. Hermann.

S. 23. Ueber die neue Säure im Holzessig, von R. Schlippe.

S. 27. Ein russischer Aufsatz.

S. 33. Reflections sur l'alimentation des sources par P. Einbrodt.

S. 62. Extrait des Protocols des séances de la société.

Die Tafeln\* enthalten Sternodes Karelini; Tenebrio caspicus; Akis otoes; Pimelia intermedia; Acapha Wiedmanni; Brachyscelis muricatus. Sie sind schwarz.

## Neuere Beyträge

zur Schmetterlingskunde mit Abbildungen nach der Natur. Herausgegeben von F. v. E. Augsburg. 1837. Heft 41 - 44. Taf. 241 - 246. ill.

Diese Abbildungen werden von Heft zu Heft hübscher und die Raupen nehmen sich vorzüglich gut aus auf den treu gemalten Pflanzen. Wir erlauben uns nur eine Bemerkung.

Der Verfasser stellt die Schmetterlinge meistens in schiefer Richtung, bald rechts, bald links, ohne Zweifel, um die Tafeln zierlicher und malerischer zu machen. Den letztern Zweck bey naturhistorischen Gegenständen zu verfolgen, scheint uns nicht rathsam, theils, weil das Malerische eine gewisse Entfernung des Auges fordert, um in seiner Wahrheit zu erscheinen, während das Naturhistorische in größter Nähe alle Theile zeigen muß; theils, weil bey verschiedener Stellung der Figuren nicht dieselben Theile erscheinen und mithin die Vergleichung erschwert oder gar unmöglich wird. Naturhistorische Figuren müssen, wo möglich, in gleicher Richtung neben einander stehen und immer dieselben Theile zeigen. Solche Gleichförmigkeit ist freylich nicht schön; allein dazu hat man die Figuren nicht und hängt sie auch nicht an die Wand. Der Verfasser fängt nun auch an, die untere Fläche der Flügel einerseits darzustellen, was sehr vortheilhaft ist. Damit man aber bey dem ersten Blick die Oberseite von der untern unterscheiden könne, wäre zu wünschen, daß diese abgezeichneten Flügel etwas vom Leibe abgerückt würden, wie es Eiper gemacht hat. Der Verfasser hat überall, wo es möglich war, Raupe, Puppe und Gespinnst abgebildet nebst Männchen und Weibchen, kurz die ganze Entwicklung, und oft die Raupen in verschiedener Stellung. Gut wäre es, wenn bisweilen einzelne Theile vergrößert würden, z. B. der Kopf.

Diese Hefte enthalten:

Papilio aglaia; Bombyx argentina; Noctua nigrocincta, saturata, ramosa, crepuscularia.

P. cynthia; Bombyx taraxaci; Noct. lino-grisea, xanthographa, macilentia; Geometra repandaria.

P. apollinus; B. verbasci; N. simplex, scriptura, acuta, hilaris, serrata, daubii, insueta, incarnata, texta; Geometra cremiaria, leucophaearia; var.

P. cerisyi; B. luctuosa, polymita, janthina, lunata, dentinosa, dos; Geometra abietaria.

Man darf sich freuen, daß ein so genaues und schönes Werk so rasch erscheint und mithin beweist, daß sich der Verf. demselben mit Leib und Seele widmet.

## The London and Edinburgh

Philosophical Magazine and Journal of science by D. Brewster, R. Taylor, R. Phillips.

Band XII. Nr. 71 — 76, Jänner — May 1838.

Nr. 71. Jänner 1831.

S. 14. A. Kennedy, Beobachtungen über die Deconomie verschiedener Timmen im Garten zu Clapton.

Ich habe im verfloffenen Frühjahr und Sommer folgende Timmen beobachtet, welche theils in den Pfoften, theils im Strohdach eines Sommerhauses nisteten.

## Fam. Diplolepidae.

- 1) *Cratomus megacephalus*.

## Fam. Sapygidae.

- 2) *Sapyga quadriguttata* F.

## Fam. Crabronidae.

- 3) *Trypoxylon figulus* Lat.

- 4) — *clavicerum* St. F.

- 5) *Crabro spinipectus* Shuck.

- 6) *Stigma troglodytes* Van L.

- 7) *Diodontus insignis* —

- 8) — *gracilis*.

- 9) — *corniger* Shuck.

- 10) *Pemphredon lugubris* F.

- 11) — *morio* Van L.

- 12) — *unicolor* Lat.

- 13) *Psen atratum* Pz.

## Fam. Vespidae.

- 14) *Odynerus quadratus* Don.

- 15) — *bidens* L.

## Fam. Andrenidae.

- 16) *Hylaeus signatus* Pz.

## Fam. Apidae.

- 17) *Chelostoma florissomnis* L.

- 18) *Osmia bicornis* L.

- 19) — *spinulosa* K.

- 20) *Heriades campanularum* K.

- 1) *Cratomus megacephalus*,

Ich habe 4 oder 5 davon an den Pfoften gesehen, aber kein Geschlecht bemerkt.

- 2) *Sapyga quadriguttata*.

Haushalt unbekannt; 2 aber flogen um die Pfoften; Männchen viel seltener als Weibchen.

3) *Trypoxylon figulus*.

Trägt Spinnen für seine Jungen ein, sowohl in Höhlen der Pfoften, als in das Stroh des Daches. Beim Aufschlagen des letztern fand ich mehrere Stellen mit Spinnen angefüllt, durch Scheidwände aus Thon von einander getrennt. Zwischen je 2 Zellen war ein Raum von  $\frac{1}{2}$ ", so daß jede 2 Scheidwände hatte; in jeder ein Ey, klebend am Bauch einer Spinne auf dem Boden der Zelle. Die Timme trägt bisweilen so dicke Spinnen ein, daß sie dieselben kaum in das Loch zwingen kann. Wenn das Weibchen abwesend war, kam oft das Männchen, kroch ein und steckte die Füßhörner aus, als wenn es Schmarogkerse abhalten wollte. Einmal verdeckte ich die Höhle mit der Hand, daß das Weibchen nicht hinein konnte; es flog mehreremal weg und kam endlich mit dem Männchen zurück, als wenn es seine Wegnung über die Verstopfung des Nestes vernehmen wollte. Die Zahl der Spinnen in einer Zelle wechselte nach der Größe; von kleinen oft 12 und mehr, von sehr großen nur 2. Die Timme beschränkt sich nicht auf einerley Gattung. Das Weibchen macht ein schnurrendes Geräusch, wann es die Scheidwände von Thon verfertigt. Ich glaube, der Haushalt dieses Kerfs ist früher noch nicht gehörig beobachtet worden.

3) *Trypoxylon clavicerum*.

Verhält sich wie die vorige, vergräbt aber nur sehr kleine Spinnen und läßt keinen Raum zwischen den Zellen.

5) *Crabro spinipectus*.

Das Männchen war gemein um die Pfoften, ich konnte aber das Weibchen nicht bemerken.

6) *Stigma troglodytes*.

Ich habe 4 oder 5 Weibchen gefangen und nur ein Männchen.

Am 22ten July sah ich ein Weibchen ins Stroh gehen mit dem Raube im Maul, und fand beim Aufschlagen des Halms eine Menge kleiner Kerfs, welche die Larven von einem Thrips zu seyn schienen. Es waren wenigstens ihrer 50 in einer Zelle. Ich fand 2 Zellen, von einander durch Scheidwände getrennt aus Schabeln von der innern Seite des Strohes aneinander gekittet. Ich bemerkte auch ein Weibchen, welches in ein Loch eines Pfoffens gieng. Der Haushalt dieses Kerfs war noch nicht bekannt.

7) *Diodontus insignis*.

Die Männchen gemein um das Sommerhaus während des ganzen July, aber kein Weibchen.

8. *Diodontus gracilis*.

Curtis Brit. Entomol. Taf. 496.

Das Weibchen fütterte seine Jungen mit Blattläusen, welche es von den Blättern der Eibe holte. Es machte die Zellen in Stroh und Scheidwände von demselben Stoff wie das folgende. Ich sah kein Männchen.

9) *Diodontus corniger*.

Ich fang das erste Männchen am 8ten July, das Weib-

chen am 8ten. Die letztern sind ziemlich gemein gegen das Ende des Monats; Männchen aber habe ich nur 6—7 gefangen. Das Weibchen versorgt die Jungen mit Blattläusen, und scheint dieselben aus den Löchern von andern Kerfen zu holen. Ich habe es oft in Löcher der Pflösten gehen und mit Blattläusen herauskommen sehen zu seiner eignen Höhle. Es trägt eine nach der andern im Maul; sonderbarer Weise aber lief es aus seiner Höhle gerade am Pflösten hin; kommt es aber mit einer Blattlaus zurück, so fliegt es, obgleich seine Höhle  $\frac{1}{2}$  Schuh entfernt ist, ein Stück fort und dann erst hinein. Das Loch, wo es die Blattläuse holte, war von keinem Kerk bewohnt. Die Scheidwände bestanden aus einer feineren, durchsichtigen Substanz, überlegt mit kleinen Holzfasern. Das Weibchen verschloß die Oeffnung der Höhle mit demselben Stoff. Darauf gieng es in eine andere Höhle und kehrte zurück mit kleinen Holzfasern, welche es darüber strich; und dieses wurde beim Trocknen hart und fest.

#### 10) *Pemphredon lugubris*.

Bohnt in Holz und wirft das Sägmehl heraus. Es sieht mürbes Holz vor und trägt Blattläuse in die Zellen.

#### 11) *Pemphredon morio*.

Ich meyne, ich hätte dieses Kerk am Sommerhause gefangen, bin aber nicht ganz sicher.

#### 12) *Pemphredon unicolor*.

Curtis Brit. Entomol. Taf. 632.

Sein Haushalt scheint bekannt. Es trägt Blattläuse ein.

#### 13) *Psen atratum*.

War in die'm Jahr sehr häufig, trägt Blattläuse ins Stroh; ich habe in einer Zelle an 100 gezählt; die Scheidwände bestehen aus Schabiel von der innern Seite des Halses zusammengeklebt. Das Ey ist weiß, halb durchsichtig und hängt am Wauche einer Blattlaus am Boden der Zelle. Die Männchen erschienen erst Anfangs July und flogen zu Tausenden um das Strohbach und die Sträucher; sie verschwanden am Ende des Monats. Die Weibchen wurden erst zahlreich gegen den 10ten.

#### 14) *Odynerus quadratus*.

Trägt kleine, dünne Raupen ein mit 16 Füßen; 6 an der Brust, 8 am Bauch und 2 am After. Beim Aufschneiden eines Loches in den Pflösten, worin das Weibchen Raub getragen hatte, fand ich eine 4" lange Höhle, parallel mit den Seiten des Pflöstens, getrennt in 3 oder 4 Zellen durch Scheidwände von Thon. In jeder Zelle ungefähr 10 Raupen, dicht aufeinander gepackt, nebst einem langen, weißen Ey, klebend an der Seite der Zelle, nahe am Boden. Das Kerk zeigte sich zuerst Anfangs Juny und war häufig durch den ganzen Monat.

#### 15) *Odynerus bidens*.

Anfangs July bohrte ein Weibchen in einen Pflösten, und nach 2 Tagen fieng ich es mit einem Raube, welcher die Larve einer *Chrysomela* zu seyn schien. Beim Öffnen am Ende July fand ich eine 2" tiefe Höhle, in 3 Zellen getheilt  
3. Heft 5.

durch Thon. In der ersten war eine Puppe, in den 2 untern eine Larve. In jeder Zelle waren Ueberbleibsel von Larven und in einer eine kleine Mücke, ganz unverletzt.

#### 16) *Hylaeus signatus*.

Ich sah ein Weibchen ins Stroh gehen, und fand beim Aufschließen auf dem Boden ziemlich viel süße Substanz, die ich für Honig halte. Er roch gerade wie die Blätter von *Verbena triphylla*; merkwürdig, daß ich auch viele Kerfe gefangen habe, welche eben so rochen, besonders beim Zerquetschen. Sie könnert aber diesen Geruch nicht wohl von dieser Pflanze bekommen haben, weil keine im Garten war.

#### 17) *Chelostoma florissomni*.

Am 5ten Juny bohrte eines in einen Pflösten und warf das Sägmehl mit den Hinterbeinen heraus. Am 6ten war es fertig, und fieng an, Blüthenstaub und Honig zu sammeln, um seine Eier darein zu legen. Ich sah es auch, kleine Thonballen im Maul herbeibringen zu den Scheidwänden. Es sind gewöhnlich 8—10 Zellen in einem Gange fast ganz mit Blüthenstaub u. angefüllt; das lange, weiße und halb durchsichtige Ey liegt oben darauf. Die Männchen flogen um die Pflösten herum.

#### 18) *Osmia bicornis*.

Scheint dieselbe Oeconomie zu haben, zeigt sich zu derselben Zeit. Die Männchen aber etwas früher als die Weibchen.

#### 19) *Osmia spinulosa*.

Macht einen Teig von Blüthenstaub u.; wie *Osmia bicornis*, aber die Scheidwände sind grün und scheinen aus Thon und dem Gewebe von Blättern zu bestehen, unter einander geknetet.

#### 20. *Heriades campanularum*.

Habe ich gefangen, während es sich auf die Pflösten setzte, aber nichts von seinen Geschäften beobachtet.

§. 84. *Falconer und Cautley*. Noch eine fossile Gattung von Affen aus den Erwaik-Dügelu Taf. 1. 2. Aus *Journal of the Asiatic Society of Bengal* VI. 354.

In Bd. 5. S. 735 der genannten Zeitschrift haben Baker und Durand die Entdeckung eines fossilen Affen bekannt gemacht und abgebildet. Es war die rechte Hälfte des Oberkiefers von einem großen Thier. Nach der letzten Regenzeit fanden wir ein Sprungbein ganz wie bey *Semnopithecus entellus* oder *Langoor*, mithin von einem andern Affen als der von Baker und Durand. Später bekamen wir auch Unterkiefer von 2 Gattungen, ebenfalls kleiner als Bakers; mit Backenzähnen, 2 mittlern Schneidezähnen und einem Eckzahn; steckten in Sandstein und waren von alten Thieren; Zähne abgekauft. Uebrigens größer als bey *Semnopithecus entellus* et *Pithecus rhesus*, aber dem ersteren ähnlich. Unterkiefer bey einem 5' 3" lang, bey'm andern 4; scheinen ausgeforschte Gattungen zu seyn.

Man kennt jetzt über 150 lebende Affen und diese dreier versäuernten, welche sich fanden mit Knochen von Camelen, Antilope, *Antiloptherium posterogonium* n.; die 2 ersteren

noch lebend. In den Gewässen finden sich auch versteinert *Crocodylus biporcatus* et *Leptorhynchus gangeticus*, welche jetzt noch überall häufig in den Flüssen Indiens leben; dabei aber auch *Megalochelys sivalensis* n., eine Schildkröte von ungeheurer Größe, welche sich zu den anderen verhält wie *Iguanodon* et *Megalosaurus* zu den Eidechsen. Wir haben von dieser ungeheuren Schildkröte Knochen und Schalenstücke größer als die Knochen vom Nashorn. Hier sind also bey einander Knochen von allen Altern in derselben Formation bis zur Kreide, alle gleichzeitig mit Affen.

Sie fanden noch einen Eckzahn von einem Affen, der größer ist als bey dem Drang-Utang auf Sumatra des Doctor Clarke Abels, welcher  $7\frac{1}{2}$  hoch war. *Asiat. Res.* XV. 498. (*Phil. Mag. and Annals* n. s. I. 219).

#### Nr. 72. Jänner 1838.

E. 95. Ogilby, über ein neues Nagthier aus Australien. Neu-Holland hat bekanntlich außer dem Hund, der wahrscheinlich eingeführt worden, 2—3 Gattungen von Mäusen und *Hydromys*, fast nichts als Beutelhiiere, die sich überdies anderwärts nicht finden. Er beschreibt zwei Gattungen neue Nagthiere. *Conilurus* hat Aehnlichkeit mit einem kleinen Kaninchen, aber einen langen Schwanz; es trägt bey Sidney den Namen *Native Rabbit*, scheint sich aber jetzt nicht mehr in den bewohnten Gegenden von Neu-Südwallis zu finden, dagegen häufig am Ufer des Darlings.

Major Mitchell hat daselbst oft große Haufen von kleinen Zweigen gefunden, welche 2—3 Karren voll gegeben hätten und so künstlich und fest durcheinander gewoben waren, daß man kein Stück ausziehen konnte, ohne das ganze Gebäude zu verrücken. Anfangs glaubte man, die Eingebornen hätten diese Haufen gesammelt zu Feuerzweigen; aber ihre Regelmäßigkeit und Bestigkeit reizten zu genauerer Untersuchung, und so fand es sich beym Aufbrechen derselben, daß sie das Werk dieses Thierleins waren, dessen Instinct es veranlaßt, eine Verschanzung gegen die Angriffe des dortigen Hundes zu errichten.

Auch beschrieb er eine achte Springmaus (*Dipus*) aus den Mittelbeben von Neu-Holland bey der Vereinigung des Flusses Murray und Murrumbidgee. Unterscheidet sich von den asiatischen und africanischen durch nur 4 Zehen an den Hinterfüßen, 3 längeren und einen kleinen Daumen hoch oben.

E. 104. Neely, über *Otus brachyotus* in Irland. Ist viel seltener als *Otus vulgaris*, hat sehr kurze Ohrfedern, fliehet bey Tag und wandert, und hat noch andere Eigenthümlichkeiten. Sie bewohnt die Kaninchen-Höhlen am Strande, erscheint regelmäßig im Herbst, sitzt an den Ausgängen und läuft bey Gefahr hinein, also ziemlich wie *Strix cucularia* in America.

Nr. 73. Hornung 1838. Nichts für uns.

Nr. 74. März 1838. ebenfalls.

Nr. 75. April 1838. ebenf.

Nr. 76. May 1838. ebenf.

Nr. 77. Juny 1838. ebenf.

#### The Edinburgh new phil. Journal,

by Prof. Jameson. 8.

#### Band XXIII. Nr. 46. April bis October 1837.

E. 252. Connell. Zerlegung der Schuppen des fossilen *Savals* von Caen in der Normandie.

Sonst nichts für unsern Zweck.

#### Band XXIV. Nr. 47. Octob. 1837. — Jänner 1838.

E. 106. R. Wight, über den Baum, welcher das käufliche Gummi-Gutt liefert.

Prof. Graham zu Edinburgh hält den Baum nicht, wie Walker Arnott und ich, für *Xanthochymus ovalifolius*; sondern für *Garcinia morella*. Arnott hält ihn nun für *G. zeylonica*, was nicht seyn kann. Freylich ist *G. m.* keine ächte *Garcinia*. Murray hält ihn für *Stalagmitis cambogioides*, was auch nicht mit meiner Pflanze übereinstimmt. Ich halte ihn für eine eigene Sippe, zu welcher auch *G. elliptica* gehört.

Es gibt aber zweyerley Gummigutt; eines kommt aus Siam, Cambogia und China, das andere und schlechtere von Ceylon. Meine Substanz ist die bessere, mit einer schönen, hellen Farbe und glasigem Bruch; die von Ceylon ist dunkler und hat braune Flecken, und der Baum, welcher sie liefert, ist selten; nur an einer einzigen Stelle in einem alten holländischen Garten nicht weit von Negombo. Es ist nicht möglich, daß ein so seltener Baum all das Gummigutt liefern kann, welches diese Insel hervorbringt.

Die Holländer brachten zuerst im 17ten Jahrhundert Gummigutt aus China; nachher vertrieben sie die Portugiesen von Ceylon und schafften wahrheichtlich den Baum dorthin, wo er erst vor zwey Jahren von Walker bemerkt wurde und zwar in einem holländischen Garten, ein Beweis, daß er eingeführt wurde.

Graham sagt, es sey weder ein *Xanthochymus*, noch eine *Garcinia*, noch eine *Stalagmitis*; sondern eine neue Sippe, weil die Staubfäden in eine einzige 4eckige Säule vereinigt sind; die Staubbeutel einfächerig, öffnen sich an der Spitze mit einer Calyptra, während sie bey allen andern Guttiferen zweyfächerig sind und sich der Länge nach spalten. Es mag Gärtners *Mangostana* (*Garcinia*) *morella* seyn, denn ich kenne diese Pflanze nicht; allein dann ist sie nicht einheimisch auf Ceylon. Ihr Saft mag auch für Gummigutt gehalten werden, wie der von *Garcinia pictoria*. Eine andere Gattung dieser neuen Sippe wächst auf Malabar. Vor allem muß der Baum der Alten: *Arbor indica gummiguttam fundens*, genau bestimmt werden.

Dazu setzt Graham: er habe indeffen die Sache genauer untersucht und im *Companion to the Botanical Magazine* II. 193. mitgetheilt. Ich bekam mein Pflanzeng-Exemplar von der Frau Walker aus Ceylon. Ich halte auch nicht dafür, daß sie allein Gummigutt hervorbringt; das, was ich aber davon habe, ist vortreflich. Soviel ist

gewiß: außer *Xanthochymus ovalifolius* gibt es auf Ceylon noch eine andere Pflanze, welche Gummigutt hervorbringt. Auch weiß ich jetzt, daß der Saft von *Xanth. ovalifol.* kein gutes Gummigutt ist. Meine Pflanze gleicht vollkommen der von Gärtner abgebildeten Frucht von *Mangostana morella*; ob sie einheimisch ist auf Ceylon, weiß ich nicht. Borneo, Singapoer und Rangoon liefern Gummigutt so gut wie Siam. *Murray's Stalagmitis cambogioides* war ein zusammengefließtes Exemplar.

Später S. 229. trägt Graham nach: Ich habe in dessen von Walter einen Brief bekommen, worinn er schreibt: Wir fanden auf Ceylon den Gummigutt-Baum in verschiednen Wäldern, weit von allen Wohnungen, was beweist, daß er dort einheimisch ist; er ist jedoch nicht häufig. Ich hatte nur die männliche Blume und die Frucht, keine weibliche Blume. Die Frau Walter versichert mich nun, daß der Baum dioecisch sey, die weibliche Blume wie die männliche weiß und etwas größer. Es ist *Hebradendron cambogioides*.

S. 165. Versuche über die Entwicklung des Laichs der Salmen, von J. Shaw zu Drumlanrig in Dumfriesshire.

Bey meiner frühern Abhandlung wurde eingewendet, daß der Laich, welchen ich aus dem Nitz genommen habe, nicht sicher vom Salmen gewesen sey, weil noch andere Fische dort wären. Ich stellte daher aufs neue Versuche an und bewachte auch die Salmen auf, welche den Roggen gelegt hatten; eben so von Zeit zu Zeit Exemplare von den Jungen; auch um zu beweisen, daß die Jungen Salmen im ersten Jahre nicht ziehen, sondern 2 Jahre lang im Flusse bleiben. Auch bin ich noch der Meinung, daß der Parr ein junger Salm ist.

Ich legte mein Wasserbeden aufs Trockne, theils um alle jungen Salme zu entfernen, theils auch, um es so einzurichten, daß keine Ueberschwemmung eindringen konnte. Ich hatte 3 Wasserbeden oder Dämpfel, 2 tief, voll Kies. Sie bekamen einen kleinen Zufluß von Quellwasser, worinn viele Wasserlarven waren. Ein Dämpfel 25' lang, 18 breit; ein anderer 22 lang, 18 breit; der dritte 50' lang, 30 breit; alle von einander getrennt, nur durch Röhren verbunden mit einem Drahtgitter verschlossen, die Löcher  $\frac{1}{8}$ " weit. Sie waren von einem Wall umgeben gegen Ueberschwemmung des 11' tiefer liegenden Nitzes. Es konnte kein Fisch aus einem Dämpfel in den andern kommen. Ich fieng sobann am 4ten Jänner 1837. mit einem großen Netz ein Männchen und Weibchen vom Salm gerade im Laichen, und zwar beyde auf einmal. Vorher hatte ich eine kleine Rinne neben dem Fluß gemacht 2" tief. Darcin legte ich nun das Weibchen und drückte eine Menge Laich aus; dann das Männchen, und drückte den Milch aus, welcher mit dem dünnen Strömchen über die Eier lief. Dann trug ich den Laich in einen Dämpfel und legte ihn dahin, wo das Wasser einströmte. Seine Temperatur war 35°, die des Flusses 33°, die der Atmosphäre 36. Die alten Salmen hob ich auf.

Am 23. Hornung, 50 Tage nach der Befruchtung, zeigte sich der Embryo und bewegte sich etwas im Ey; Temperatur des Wassers 36, der Luft 38.

Am 28ten April, 114 Tage nach der Befruchtung, waren die Jungen aus dem Ey, aber noch nicht den Tag vorher;

Temperatur des Wassers 44. Länge  $\frac{5}{8}$ ", Färbung bläulich, oder wie Pfirsichblüthen, Kopf sehr groß; Beutel am obern Theile des Leibes kegelförmig,  $\frac{3}{8}$ " lang, röthlich und durchsichtig, wie Johannisbeeren. Ich konnte früher die Eier oft in die Hand nehmen ohne Schaden, aber der Embryo bewegte sich stärker darinn, wahrscheinlich wegen der Wärme der Hand.

Am 24. May, 27 Tage nach dem Ausschließen, hatten sie den Dotter verbraucht; aber nach einigen Tagen waren, bis auf ein einziges, alle todt, was mir mehrmals begegnete, wahrscheinlich vom Abfluge des Schlammes, wenn im Dämpfel nicht Kies genug war.

Am 20ten April, 106 Tage nach der Befruchtung, bey 41° Temperatur des Wassers that ich 4 Eier in einen Kibel, hing ihn in das Fenster meines Schlafzimmers und leitete reines Quellwasser hinein. Die Temperatur der Luft war 47, das Wasser im Kibel 45; bey Nacht aber höher, und daher schlossen die Jungen in 36 Stunden aus, die im Dämpfel aber erst am 28ten April. Zu dieser Zeit waren die Fischlein ganz durchsichtig, die Brustklossen in schneller Bewegung, wenn auch die Thierchen an derselben Stelle blieben.

Am 24ten May, 39 Tage nach der Geburt, war der Dotter bey denen im Kibel verschwunden und die charakteristischen Querstreifen des Parris wurden sichtbar. Länge 1", vollkommen munter; da ich sie aber nicht zu ernähren wußte, so that ich sie in den Dämpfel, wo sie mit den andern zu Grunde giengen.

Ein anderer Versuch fiel glücklicher aus. Die alten Fische waren eben so gefangen worden und aufbewahrt. Das Männchen 16 Pfd., das Weibchen 8. Die Eier kamen in den Dämpfel am 27ten Jänner 1837., Temperatur des Wassers 40, des Flusses 36.

Am 21ten März, 54 Tage nach der Befruchtung, war der Embryo sichtbar.

Am 7ten May, 101 Tag nach der Befruchtung, waren die Jungen aus dem Ey. Temperatur des Wassers 43, der Luft 45.

Am 16ten May, 10 Tage alt, Länge 10", noch mit Dotter; am 24ten Juny, 48 Tage alt, Länge 12", ohne Dotter, Gestalt regelmäßig; am 7ten July, 2 Monat alt, 15", hat die Gestalt des reifen Fisches und zeigt schon Spuren von Querstreifen [8 in der Abbildung].

Am 7ten September, 4 Monat alt,  $2\frac{1}{2}$ " lang, die Querstreifen deutlich [14 in der Abbildung], und die Gestalt ganz wie beym alten.

Am 7ten November, 6 Monat alt,  $3\frac{1}{4}$ ", schon ziemlich kräftig und die Querstreifen sehr deutlich [11 in der Abbildung], Kiemenbedeck ganz wie beym ausgewachsenen Salm. Mit dem gleich alten Parr aus dem Flusse verglichen, zeigte sich kein Unterschied. Sie befanden sich alle wohl, fraßen kleine Würmer und Maben, welche ich während des Sommers ihnen verschafft habe. Ganz so verhielt es sich mit denen im dritten Dämpfel, die Fischlein waren aber größer, bey einem Alter von 6 Monaten, um 1". Beyde Familien anfsammen betragen ungefähr 100 Stück.

Die Parr zu derselben Zeit aus dem Flusse waren dunkler, wahrscheinlich wegen des unreinen Wassers; deshalb ist auch ihre Färbung aus verschiedenen Flüssen verschieden. Das Wasser in den Dämpfeln war im Winter selten unter 40, im Sommer über 60, im Fluß mehr veränderlich.

Die Farbenänderung dieser Fische unter gewissen Umständen ist merkwürdig. Bei den öfteren Besuchen der Fischlein in den Dämpfeln, wo sie meistens an einer besondern Stelle blieben, fand ich, daß sie immer eine Färbung, entsprechend der des Bodens, hatten. Gingen sie an eine andere Stelle; so nahmen sie nach wenigen Minuten allmählich die Farbe derselben an. Daher setzte ich einen Fisch in eine große irdene, weiße Schüssel und einen in eine schwarze. Nach 4 Minuten nahm jeder eine Farbe an fast wie die der Schüsseln; dann vertauschte ich die Fische und dann wurde der weißliche schwärzlich und umgekehrt. Dann setzte ich beide in eine Schüssel, worin sie gegen einander sehr abstachen, aber nur kurze Zeit. So ließ ich sie im weißen Wasser, bis sie hell waren, bedeckte es mit einer dicken Matte, und schon nach einigen Minuten waren sie dunkel; nach dem Aufdecken wurden sie gleich wieder hell. Das geschieht bey bedecktem wie bey hellem Himmel.

Ich glaube nun hinlänglich bewiesen zu haben, daß der junge Salm nicht in demselben Jahre ins Meer geht, in welchem er ausgeschlüpft.

Fischen ich noch nicht alle Naturforscher überzeugt haben mag, daß sie einerley sind mit dem Parr; so haben meine Untersuchungen doch den Nutzen, daß ich den Irrthum über das Wachsthum des letztern berichtigt habe, welchen sowohl der Naturforscher als der Geseßgeber hegte. Die Meynung, daß der Salm schon im ersten Jahre ins Meer gehe, hat ein Schlachten unter diesem Fisch hervorgebracht in einem Alter, worin der Geseßgeber ihn schützen sollte. Kein Fisch schnappt so leicht nach der Fliege wie dieser, und jeder Knabe kann des Tages 8—10 Duzend tödten. Läuft daher ein Fluß durch einen vortheilhaften Landstrich, so ist die Verheerung der Jungen über alle Maßen unberechenbar. Die Geseßgebung schützt zwar den jungen Salm einen Monat lang, nemlich für die kurze Zeit, wo er noch bleibt, nachdem er sein Aukleid angezogen; für die zwey ersten Jahre seiner Existenz aber ist er ganz vogelfrey.

Noch habe ich etwas zu bemerken über die frühere Weise der männlichen Organe des Parrs, worüber es schwer ist, Research zu geben. Im Bienenstock sehen wir ein großes Uebergewicht der Männchen. Die Königin ist über alle Maßen productiv und paart sich mit allen Männchen, um die Gesellschaft zu vermehren. Der Roogen des weiblichen Salms ist sehr reichlich, und wenn auch viel Milch vor der Zeit des Laichens fortfließt, so kann man annehmen, daß der Roogen von mehreren Milchmännern Vortheil ziehe. Man kann wohl sagen, die männlichen Parr bleiben nur deshalb im Strom, um die fortchwimmenden Eier zu verschlingen, was sie allerdings thun; allein daneben können jedoch viele befruchtet werden. Mir ist es vor der Hand genug, daß ich Gelegenheit hatte, die Thatfachen festzustellen.

der Wasserfälle des Schitawati in Canara in Ostindien, im Hornung 1837.

Das Ufer ist sehr schön von Pflanzen, außer wo die *Bambusa arundinacea* vorherrscht.

Die Thierwärter, Wegweiser und Soldaten erzählten uns, daß es eine Menge wilder Thiere gebe, und aus amtlichen Berichten erfuhrten wir, daß im vorigen Jahre im Districte Nagar, oberhalb der Ghat, 92 Menschen und 901 Stück Vieh getrieben wurden; Belohnungen wurden gegeben für 106 Tigerfelle, 136 Ghit, 4 Wölfe, 26 Bären. In manchen Wäldern gibt es viele wilde Ochsen und Sambar. Wir stiegen auf den letztern. Nach seiner Größe und dunklen Farbe halte ich ihn für *Cervus Aristotelis* von Bengalen, und nicht für *Cervus equinus*, der nach Sykes häufig ist in Osthan. Seine Gemeiße, welche wir zu Honawar (verdorben Dnnoce) in Händen halten, sind sehr groß und schwer. In den Wäldern sahen wir viele Truppen von Affen (*S. entellus*) mit einander spielen.

Die Gebirgsart ist meistens Glimmereschiefer und Hornblende. Im Gebüsch der glänzende, schwarze und scharlachrothe *Phoenicornis princeps*; in den Gärten Betelnußbäume und Pfeffer darüber geschlungen. Einer von den Wasserfällen ist wenigstens 1000 Schuh hoch. Wir hörten sehr weit einen *Buceros* schreien und sahen ihn endlich; sein großes Horn dient als Stimmbojen.

Band XXV. Nr. 48. Hornung — April 1833.

Enthält nichts für uns.

## Ueber Perlen,

ihre Entstehungsweise und künstliche Erzeugung,  
von Dr. med. Walz in Passau.

Es gibt wirklich wenig Materien im Gebiete der Zoologie, über welche ein solches Dunkel gehüllt ist, als die Natur der Perle. Man hat über ihre Entstehungsweise die ungereimtesten Meynungen oder Hypothesen aufgestellt, z. B. daß die Perle dann erzeugt wird, wenn ein Bohrwurm die Schale des Muschelthieres ganz durchbohrt hat, so daß das Thier gezwungen wird, dem weiteren Eindringen des Feindes Schranken zu setzen und das Loch mit der Perlenmaterie zu schließen. Dr. Eberhard, in seiner Abhandlung von dem Ursprung der Perle, Halle 1751, glaubt, die Perlen wären verhärtete Eier, die im Thier durch irgend eine Störung des normalen Processes zurückgeblieben wären. Es wäre verlorne Mühe, alle ungereimten und falschen Hypothesen hier anführen zu wollen, und gehe foglich zur richtigen Erklärungsart über, die schon Reaumur in den Memoiren der kön. franz. Academie der Wissenschaften vom Jahre 1717 gab. Da dieser große Naturforscher die Natur selbst fragte und beobachtete, so war es für ihn nicht schwer, sie zu belauschen und die Wahrheit zu erfahren. Er fand durch Untersuchung, daß sowohl die Schale des unteruchten Schalthieres (*Pinna marina*) als die von demselben erzeugten Perlen aus



lauter übereinander liegenden Blättern bestehen, und daß diese dadurch entstehen, daß Gefäße zu ihnen führen, welche den dazu nöthigen Saft enthalten. Wird ein solches Gefäß von der gar zu großen Menge des Saftes, oder durch Erschütterung zerissen, so tritt der Saft aus, verhärtet und gibt den ersten Kern zu der Perle, die durch Abfluß des Perlenstoffes sich immer vergrößert.

Da in der Itz, welche bey Passau sich für die Donau ergießt, und in vielen andern kleinen Bächen Perlenmuscheln sich finden, die von jeher geachtet wurden und deren Perlen seit mehreren Jahrhunderten berühmt sind; so unterließ ich nicht, Beobachtungen über die Perlenzeugung zu machen. Die Perlen sind von zweyerley Art, a) braun und ohne Schimmer und Durchscheinheit, rund, platt, länglich usw.: diese heißen bey'm gemeinen Volk unreife (obwohl sie niemals anders werden), weil die Leute glauben, es entsündeten daraus die brauchbaren weißen Perlen. Diese braunen Perlen sind bey weitem nicht so selten als die weißen, und es treffen auf eine solche im Durchschnitt wohl 20 braune. Jede Perle besteht aus concentrischen Schalen, und zeigt im Innern einen runden Kern, gewöhnlich von der Größe des Nüttig- oder Kohlsamens, der sich leicht von dem Ueberzug trennen läßt. b) die einzig brauchbaren sind die weißen mit dem bekannten Perlmutterglanz. Diese kann man wieder eintheilen in runde und in nicht runde. Erstere haben Werth, letztere nur sehr wenig. Die Materie, welche den Perlmutterglanz hervorbringt, ist noch nicht chemisch ausgeschieden worden. Einige Naturforscher erklären den Perlmutterglanz durch die eigne Lagerung der Schichten des kohlens. Kalkes und thierischen Leimes, woraus die Perle besteht; die Kamellen der Perle sollen nemlich aus parallelen Fasern von Leim und kohlens. Kalk bestehen und letztere den Schimmer verursachen. Diese Ansicht ist grundfalsch, denn die Häutchen der Perlen, die man nach der Behandlung mit Salpetersäure leicht unter dem Microscop untersuchen kann, zeigen keine Fasern, sondern ein marmorirtes Gefüge, nemlich lichte Stellen mit dunklern gekrümmten Linien dicht besetzt. Daß die angeführte Erklärungsweise nicht ausreicht, beweiset auch der Umstand, daß eine Perle in verdünntem Scheidwasser an dem Orte ober der Seite, wo sie Glanz hat, fast gar nicht, dort aber, wo sie ganz braun und glanzlos ist, so angegriffen wird, daß man den Leim wie eine dicke Haut abgießen kann; dieß wäre nicht möglich, wenn der Glanz von Kalk herrühren würde. Eine braune Perle verhält sich zu einer edlen, wie der leicht verbrennbare Kohlenstoff der Holzkohle zum schwer verbrennbaren des Diamantes.

Die runden Perlen entstehen und finden sich stets, wie ich beobachtete, in dem Mantel, und, da sie eine kugelige Erhabenheit durch die Ausdehnung des Mantels machen, so ist es keine Kunst, durch Aufwängung der Muschelschalen bey'm lebenden Thiere mittelst einer eigenen Zange das Vorhandenseyn einer Perle zu erkennen. Ist die Erhabenheit klein, so schließt man auf eine kleine Perle, und, da es Schade wäre, dieß in ihrem Wachstume zu stören, so sammelt man eigens diese fruchtbaren Muscheln und hegt sie in separaten Arten. Leider ist aber der Perlendiebstahl über alle Gränzen gestiegen, so daß die vpm Staate angestellten Perlensucher auf wenig Bezirke beschränkt sind, und besonders haben die französischen Soldaten die Itz von Perlenmuscheln so sehr entvölkert, daß die regelmäßige Fischen in ihr gar nicht mehr betrieben wird. Alle Behauptungen, daß die Perlen frey im Thier liegen, sind grundfalsch. Die

meisten irrigen Ansichten rühren von den Perlensüchern her, die im Durchschnitt Leute ohne alle Bildung und naturhistorische Kenntnisse, nemlich Bauern, oder Fischer, oder Tagelöhner sind und die Perlensicherey als Nebenfache betreiben, da sie zu wenig einträgt, als daß man davon leben könnte. Diesen Leuten ist es darum zu thun, das Monopol zu bewahren, und so streuen sie den neugierigen Trägern absichtlich Sand in die Augen. Man kann aus keinem, wie ich aus Erfahrung weiß, ein wahres Wort herausbringen.

Die zweite Sorte der weißen Perlen sind die nicht runden, welche sowohl im Mantel als an der Schale entstehen. Letztere hängen durch einen Stiel an der Schale und sitzen meistens in einer ordentlichen Höhlung. Die Ursache ihrer Entstehung ist meistens ein Druck durch Steine oder andere Körper auf die Schale wirkend, oder ein Sprung der Schale. Es ist eine Thatsache, daß man solche Perlenmuscheln an irgend einer Einbuchtung, einem Höcker oder unregelmäßigen Bau erkennt. Diejenigen Muscheln, die Perlen im Mantel haben, haben kein solches Zeichen, oder es ist nur zufällig. Die Vergrößerung der an der Schale sitzenden Perlen möchte sehr schwer zu erklären seyn.

Der Unterschied der europäischen Perlen, die von *Unio margaritifera* fast ausschließlich herkommen, von den orientalischen besteht in der geringeren oder ganz fehlenden Durchsichtigkeit, und eben deswegen sind sie auch billiger. Dennoch kostet eine Perle von Erbengröße im Durchschnitt einen Dukaten; eine von der Größe zweyer Erbsen zwey Karolins usw.

Die Bäche und Flüssen, in denen bey uns die Perlenmuschel lebt, haben ein braunes Wasser, dessen Natur noch nicht aufgeklärt ist, und finden sich nur im Ur- und Uebergangsgewässern. Es ist merkwürdig, daß das Thier doch soviel kohlens. Kalk in diesem kalkarmen Wasser findet als es braucht. Es wäre sehr interessant, zu erfahren, ob auch die Perlenmuscheln anderer Länder einen solchen Wohnort haben.

Ueber künstliche Perlenzeugung mittelst der Muscheln ist schon viel gedacht, versucht, und einiges auch geschrieben worden. Hat man so lange gesucht, Gold zu machen, warum sollte man nicht auch Perlen zu erzeugen versucht haben. So findet sich in Dinglers polytechnischem Journal 16. Bd. Jahr 1825. S. 360 ein sehr merkwürdiger Aufsatz von J. Ed. Gray aus den *Annals of Philos.* January 1825. p. 27, übersetzt von Dr. J. B. Fischer aus München, der leider zu früh für die Wissenschaften in Brüssel starb. Gray sagt hier: Als ich vor einiger Zeit die Muscheln im brittischen Museum untersuchte, beobachtete ich ein Exemplar von *Barbula* (*Appius* *Leache*, *Mytilus* L.) *plicata* mit mehreren sehr reinen, regelmäßig gebildeten, halbkreisförmigen Perlen von ungemein schönem Wasser, und fand auch mehrere Bruchstücke der nämlichen Muschel mit ähnlichen Perlen; und bey aufmerkamer Untersuchung einer derselben, die in die Quere zerbrochen war, bemerkte ich, daß sie aus einem dicken Ueberzug von mehreren concentrischen Platten über ein Stück Perlenmutter gebildet war, das in eine flach gewölbte Form roh zugeschiffen war. Bey Untersuchung der anderen Perlen zeigte es sich, daß sie alle nach dem nämlichen Plane gebildet waren. Aus einer oder 2 Stellen, wo die Perle zerstört oder ausge schnitten worden war, fand sich auf der Innenseite der Muschel eine zirkelförmige Höhlung mit flachem

Grunde, was deutlich beweiset, daß diese Perlenmutterstücke eingebracht seyn mußten, als die Muscheln jünger und dünner waren. Gray versuchte nun selbst, Perlmutterstücke in Form einer Perle gedreht, in Muschelhütere einzubringen. Wir wollen ihn selbst hören: Seit diesen Beobachtungen machte ich den Versuch, einige ähnliche Perlmutterstücke (aus der Schale der Meerperlenmuschel verfertigt) in die Muschel von *Anodon cygneus* und *Unio pictorum* zu bringen, die ich wieder in ihre natürliche Lage versetzte, und ich habe Hoffnung, daß einige Personen, die mehr Gelegenheit haben, diese Versuche mit *Unio margaritifer* wiederholen werden. Ich fand die Einbringung der Grundstücke der Perle mit sehr wenig Schwierigkeit verbunden; denn es ist bloß nothwendig, daß die Schalen der Muschel sich in mäßiger Weite zu öffnen gezwungen werden, und daß die Grundlage zwischen dem Mantel und die Muschel eingebracht werde, indem man den Mantel an einer Stelle lüftet. Von 30 — 40 Grundlagen waren nur eine oder 2 wieder ausgestoßen, bey allen aber die Grundlage in den hinten Abhang der Muschel gebracht worden. Natürlich muß das Thier getödtet werden; wenn man sehen will, wie es mit dem Perle stehe. —

Ein Unbekannter gibt in der *Encycl. britannica* folgenden Verfahren der künstlichen Perlenzeugung an: die Muschel wird mit großer Vorsicht geöffnet, um Verletzung zu vermeiden, ein kleiner Theil der äußern Oberfläche der Muschel abgekratzt und hier ein fugeleiges Stück Perlmutter von der Größe eines Schrotkorns angebracht. Dies dient als Kern, um den sich die Perle bildet. Diese Methode ist nicht ausführbar, da man die Grundlage nicht befestigen kann. —

In Krünich Encyclopädie Band 108 S. 552 wird erwähnt, daß die Chinesen Schnüre von künstlichen Perlmutterperlen in die geöffnerten Schalen der Perlmuscheln legen, wodurch sie mit Perlmutterglanz überzogen und als echte verkauft werden. —

Ferner hat Herr Gray im Novemberhefte der *Annals of Philosophy* 1826. S. 389 bekannt gemacht, daß er in der Sammlung des Collegiums der Wundärzte einige Perlen in der *Barbula plicata* aus China gefunden habe, die mittelst eines Stückes Silberdrath, der zwischen dem Mantel und der Muschel eingebracht und unter rechten Winkeln gebogen war, gebildet wurden; die Perlen waren schön.

Da die Preise unserer Flussperlen so bedeutend sind, daß ein Stück von der Größe einer Erbse mit 5 Gulden bezahlt wird, und da hier bey Passau die schönste Gelegenheit sich darbietet, Versuche zu machen; so suchte ich bey der königl. Regierung von Niederbayern um die Erlaubniß nach, Versuche zur künstlichen Perlenzeugung in der Isis machen zu dürfen, was auch ohne Anstand bewilligt wurde. Da die Muscheln vor Diebstahl nicht sicher sind, so mußte ich eine Stelle in der Nähe eines Aufsehers wählen, und nachdem ich eine passende gefunden, ließ ich sie mit bedeutenden Unkosten von den großen Steinen, die am Grunde lagen, reinigen, Sand hineinbringen und einen Steinbaum vormachen, damit die Muscheln nicht das Weite suchen können; denn sie bewegen sich im Sande mit Hilfe ihres großen weit ausstreckbaren Muskels, den man Fuß nennt, sehr leicht, und ändern ihren Ort, wenn er ihnen nicht zusagt; wobey sie Furchen im Sande hinterlassen. Ich nahm nun im Sommer 1837 Hundert Stück Muscheln, bohr-

te jede auf der meist erhabenen Stelle der Schale mittelst eines Trepanns, der eigens dazu gefertigt wurde, wodurch eine erbsengroße Oeffnung entstand, brachte braune Perlen, und in andere aus Perlmutter gedrehte Perlen hinein, schloß die Oeffnung mit einem aus Perlmutter gemachten Deckel und versah die verwundete Stelle mit einem Kitt, der sehr haltbar und hart ist, so daß kein Wasser eindringen konnte. Im heurigen Sommer, also 1838, sah ich nach und bemerkte, nachdem ich einige Muscheln mittelst heißen Wassers getödtet hatte, bald, daß alle unsere Hoffnung zu Wasser geworden sey und daß des Menschen Unternehmungen meist eitel sind. Die Muschel hatte sich gegen den Druck des fremden Körpers zu schützen gesucht, es war entweder eine breite Haut von Kalk über die Stelle, wo die Perle lag, oder die Perle war von einer solchen braunen, gasrigen Kalkhaut umgeben und theilweise mit ihr auch verwachsen. Von einem perlmutterartigen Ueberzug war keine Spur. zu bemerken und unter diesen Umständen auch nicht zu erwarten. Ich hatte gehofft, daß der zwischen dem Mantel und der Schale befindliche Schleim und Saft die eingebrachte Perle mit Perlmuttermaterie und Glanz überziehen würde, ersah aber, daß er dazu durchaus untauglich sey. Wenn also auch in der *Barbula plicata* die Perlenzeugung auf die von Gray angegebene Art in China so leicht vor sich geht, was wir zu bezweifeln Ursache haben, da doch irgend eine Täuschung möglich ist; so bin ich überzeugt, daß der Versuch auf die angegebene Art, in *Unio margaritifer* Perlen zu erzeugen, nie gelingen werde. Eine Vergrößerung eingebrachter Kunstperlen ist nur in dem einzigen Falle möglich, wenn sie mit den Organen in Berührung kommen, welche den zur Vergrößerung der Schale nöthigen Saft führen, also z. B., wenn man sie zwischen die Lamellen des Mantels bringen könnte, was jedoch unmöglich ist.

Eine andere Art wäre die, sie mit der noch im Wachsthum begriffenen Schale besonders in der Nähe der Insertion des Mantels in Verbindung zu bringen, was bey einer gewissen Construction der Kunstperlen leicht ausführbar ist, und worüber ich noch mehrere Versuche anstellen werde, deren Resultat später in der Isis angezeigt werden wird.

## De Fungo medullari oculi.

Dis. inaug. auct. B. C. Frey. Turici. 1838. 4. 30. 2 Taf.

Es wird hier ein interessanter Fall erzählt, anatomisiert und sehr schön abgebildet. Der fleißige Verfasser schickt zugleich die Literatur voraus, nebst einer Darstellung der Symptome, der Ursachen, der Behandlung, und schildert endlich den anatomischen Befund, worin er viele Gesichtlichkeit an den Tag legt. Diese Schrift ist ein interessanter Beytrag für dieses schreckliche Uebel, und wird gewiß mit Beyfall aufgenommen werden.

## U e b e r s i c h t

### der gebräuchlichsten Arzneimitteln des Alterthums

mit besonderer Rücksicht auf die Werke des Dioscorides und Plinius.  
Ein pharmacologischer Versuch von Dr. F. Heinrich Dierbach.

(Beischluß von Heft III. p. 238.)

### Viertes Capitel.

Arznei- und Nahrungsmittel aus der Classe der Reptilien,  
Amphibien oder Lurche.

Es sind hier zuerst die Schildkröten oder Chelonii zu erwähnen, von denen Dioscorides nur ganz kurz, Plinius aber etwas ausführlicher redet. Man ordnet diese Thiere gewöhnlich in drei Gruppen, nemlich in solche, die sich auf dem trocknen Lande aufhalten (*Tertudo Brongn.*) und solche, die im süßen Wasser leben (*Emys Brongn.*) und endlich in solche, die an und im Meere vorkommen (*Chelonia Brongn.*). Es sind folgende Arten zu erwähnen:

Die griechische Schildkröte (*Testudo graeca L.*), die *T. terrestris* der Officinen, ist die gemeinste Art in den Ländern, welche das mittelländische Meer bespielt. Dr. Schläpfer in Trogen <sup>77</sup> nennt sie die mosaische Schildkröte, er fand sie häufig im mittleren und unteren Italien an den Mündungen der in das Meer fließenden Flüsse; in Rom sah er Haufen derselben zum Verkauf in den Gassen aufgeschichtet, um sie als Speise zu benutzen. Tiedemann vergleicht das Fleisch mit dem der Hühner, dem Geschmacke nach.

Die Sumpfschildkröte (*Testudo lutaria L.* oder *T. palustris* der Officinen), sie findet sich gemein in Sardinien und an einigen Orten im südlichen Frankreich, wo man sie selbst als ein Hausthier in den Gärten zieht, um durch sie die Insecten vertilgen zu lassen. Ihr fast schwarzes Fleisch wird in der Provence gegessen.

Die gemeine Flusschildkröte (*Testudo orbicularis L.* oder *T. europaea Schneid.*), im südlichen und östlichen Europa einheimisch und in Sümpfen oder Morästen lebend. Schläpfer sah sie in Ober-Italien und bemerkt, daß sie in Wien gegessen werde. Von ihrem Fleische bereitete man besonders die viel besprochenen Schildkrötenbrühen und Suppen, als ein Mittel gegen Lungen- und Brustkrankheiten, Auszehrung und hektische Fieber, wovon bereits Amatus Lusitanus redet in seinen Commentarien zu den Werken des Dioscorides, jedoch nur beiläufig in dem Abschnitte von den Krebsen. Plinius rühmt Schildkrötenbrühen gegen Lähmung und Gicht.

Die grüne oder Riesen-Schildkröte (*Testudo mydas* oder *T. viridis Schneid.*), die *T. marina* der Officinen; sie lebt bios von Seetang und ähnlichen Vegetabilien, daher ihr ausnehmend schwachhaftes, gar nicht thranartiges Fleisch. Schläpfer nennt sie die große Meereschildkröte und sagt, sie werde zuweilen, jedoch selten, in Italien durch Harpunen und Nege

gefangen, so erhielt er eine 116 Pfund schwere von Triest, die ungefähr 30 Pfd. thranartiges gelbes Fett gab. *Testudo coriacea* hingegen, welche kleiner ist, wird häufig in Neapel gefangen, und ziert, wie die vorige, mit ihrem schwachhaften Fleische die Tafel der Vornehmen.

Es ist auffallend, daß von dem Genuße des Schildkrötenfleisches bey den alten Aerzten überall nichts vorkommt, und auch Apicius erwähnt es nicht. — Dioscorides rühmt den innern Gebrauch des Blutes der Laubschildkröte gegen Epilepsie und das der Seeschildkröte mit Wein usw. als Antidotum gegen den Biß giftiger Thiere.

Aus der Gruppe der Frösche oder Batrachier sind nur wenige Arten anzuführen, und zwar:

Der gemeine Wasserfrosch (*Rana esculenta*). Die Alten hielten die Frösche für ein Antidotum gegen den Biß giftiger Schlangen, und ließen deshalb Froschbrühe, mit Salz und Del zubereitet, innerlich nehmen; auch bey chronischen Vereitungen rühmten sie dieses Mittel, wie man denn auch in spätern Zeiten sehr häufig gegen auszehrende Krankheiten Froschschenkel essen oder die Brühe derselben trinken ließ. Aetrigens ist das Fleisch der Frösche weiß, wässrig, reich an Gallert, enthält aber wenig Faserstoff, und wie es scheint kein Demagog, dabey aber leicht verdaulich.

Der Laubfrosch (*Rana arborea* oder *Hyla viridis Laurenti*) ist, wie schon Valerius Cordus ganz richtig bemerkt hat, der grüne Frosch des Dioscorides und Galens. Ein Decoct dieses Frosches mit Wasser und Essig gemischt, brauchte man als Mundwasser gegen Zahnuweh; und dem Wunde schrieb man die Eigenschaft zu, das Wachsrum auszerrieren Haare verbinden zu können, wenn man die betreffende Stelle damit bestreiche.

Der Molch oder Salamander (*Salamandra terrestris Laurenti* oder *Lacerta salamandra L.*). Der Salamander, sagt Dioscorides, ist eine träge Eidechsenart mit bunter Haut, von der man mit Unrecht glaubte, daß sie im Feuer nicht verbrenne. Sie hat eine beizende scharfe Eigenschaft, und man setzt sie deshalb Arzneimitteln zur Entfernung des Auszuges zu, ebenso wie die Canthariden. Zu diesem Gebrauche benutzte man den Salamander in Sionig auf, nachdem man vorher die Eingeweide herausgenommen, sowie die Füße und den Kopf abgeschnitten hat.

Aus den Gruppen der Eidechsen oder Saurier sind die nachstehenden zu nennen.

Die drengelige Schlangen-Eidechse (*Seps tridactylus Daud.* oder *Zygus tridactyla Spreng.*). In Afrika und im südlichen Europa einheimisch, der Leib ist schlangenförmig, mit dachziegelförmigen Schuppen und bronzefarbig gestreift. Kopf mit Platten. Die 4 Füße sehr kurz, dünn, klein, und mit drei Zehen versehen. Dieß ist nach Sprengel *Seps Dioscoridis*, ein Reptil, das man innerlich mit Wein als Antidotum gegen seinen eignen Biß gebraucht. — Sprengel sagt, es sey kein Zweifel, daß der Biß dieses Thieres giftig sey, zumal in Sardinien, wo es Cicigna heiße und nicht selten das Rindvieh verlege; dagegen behaupten Andere, *Seps tridactylus*,

sey ganz unschuldig, wegen der Biß von *Seps pentadactylus Daud.* oder *Anguis quadrupes L.* für sehr gefährlich gehalten werde.

Der Meersting (*Scincus officinalis Daud.* oder *Lacerta scincus L.*), auch öfters Land-Crocodil (*Crocodilus terrestris*) genannt; in seinen Arabien, Aegypten usw. einheimisch. *Dioscorides* scheint von mehreren Arten von Meerstingen Nachricht gehabt zu haben, denn er sagt, man finde dieses Thier in Aegypten, einen andern *Scincus* in Indien und noch einen andern am rothen Meere. Diesen setzt er noch einen vierten hinzu, der in dem mauritanischen Ebnen gefunden werde, und den *Sprengel* als *Scincus algiriensis* bezeichnet. Ueberdem hat man die Ansicht geäußert, der von *Dioscorides* beschriebene *Scincus* sey nicht der von *Plinius* bezeichnete, letzterer sey vielmehr eine große Art von *Monitor*. Die Meerstingen, welche man noch bis auf den heutigen Tag in den Apotheken finden kann, wurden eingesalzen und in Kresse oder andere aromatische Kräuter eingewickelt verschickt. — *Meißner* hat eine chemische Analyse des Meersting gelieft; er fand als vorherrschende Bestandtheile Gallert, Mucus, Erweichstoff, phosphorsaure Salze, und was man nicht übersehen darf, auch Demazom, das also keineswegs allen Amphibien mangelt, wie *Tiedemann* anzunehmen geneigt ist.

*Dioscorides* rühmt den junckst um die Nieren gelegenen Theil des Thieres zu einer Drachme mit Wein getrunken, als ein Mittel den Geschlechtstriebe aufzuregen, welcher jedoch durch den Gebrauch eines Decoctes von Linsen oder auch von Salatsamen wieder unterdrückt werden könne. Sonst machte der *Scincus* einen Bestandteil mehrerer im Alterthum berühmter Compositionen aus; so kam er zu dem Antidotum des *Andromachus*, zu dem Antidotum *Mithridatis* usw.<sup>78</sup>

*Plinius* hielt den Kopf und die Füße für die wirksamsten Theile des Thieres.<sup>79</sup>

Die Dorneibische (*Lacerta stellio L.*), in der Levante einheimisch, darf nicht ganz übergangen werden, da die alten Pharmacographen, wie Herr *Cloquet* sagt, von diesem Reptil jene Drogue ableiten, die man *Cordylea* nannte, als Cosmeticum in den Officinen aufbewahrt wurde und nichts anderes ist, als der Kopf einer orientalischen Eibische. Die Herren *Mirat* und *Leuz* meinen, dieses seltene Medicament komme von *Lacerta monitor*. *Sprengel* ist geneigt es von *Lacerta mello* abzuleiten, die sich in der Nähe der ägyptischen Pyramiden findet, wo sie zwischen Felsen und in Höhlen lebt; der Kopf derselben soll, nach *Galens* Zeugniß, von den Frauenzimmern als ein kostbares Mittel benutzt werden, dem Gesichte eine feine und glänzende Haut zu verschaffen. Noch macht *Sprengel* auf *Lacerta nilotica* und einige verwandte kleine Arten aufmerksam, welche die Jener, nach dem Zeugnisse des Gastronomen *Archestratus*, zumal gebraten gern gegessen hätten. Auch *Dioscorides* redet von dem Gebrauche des Kopfes eines

Land-Crocodils als eines Cosmeticum für Frauen, er setzt noch hinzu, der beste sey der ganz weiße, zerreibliche, wie Stärkemehl leichte, der im Wasser leicht zerlege usw. Man soll diese Drogue öfters mit Saurenkoth, dem man noch Reis zumischte, und noch auf andere Weise verflücht haben.

Das Chamäleon (*Lacerta chamaeleon L.* oder *Chamaeleo vulgaris Br.*) wird ebenfalls von *Dioscorides* berührt; er schreibt dem Blute dieses africanischen Reptils die Eigenschaft zu, das Wachsstum der Haare zu hindern, wenn man die Haut damit bestreicht.

Gemeine Eibischen (*Lacertae vulgares*). Von diesen bekannten Amphibien sind viele Arten durch ganz Europa verbreitet, die, wenigstens von den älteren Zoologen und Aerzten, nicht genau unterschieden worden sind, obgleich sie, wie *Joh. Gleditsch*, *Schneider*<sup>80</sup> recht schön gezeichnet hat, in ihren physischen, sowohl als medicinischen Eigenschaften wesentlich von einander abweichen. Selbst *Plinius* machte schon auf diesen Umstand aufmerksam, und hält die ganz grünen Eibischen zum medicinischen Gebrauche für die besten, worunter wahrscheinlich die in Italien gewöhnliche *Lacerta smaragdina Meissn.* zu verstehen ist; sonst sind da gemein *L. tiliguerta Merrem.*, *L. variegata* und *bistriata Schnz* usw. Dießseits der Alpen hat man meistens *Lacerta agilis L.* angewendet; aber auch diese umschließt drei Arten, nemlich *Lacerta ocellata*, *L. stirpium* und *L. agilis Daud.*

*Cälius Aurelianus* berichtet, daß in Africa die Eibischen zur Speise dienen, und auch anderwärts findet man angemerkt, daß diese Amphibien wie Fische oder auch auf andere Art zubereitet, insbesondere aber mit Gewürzen zum Nachtische gegeben wurden;<sup>81</sup> wie denn auch *Plinius* als Mittel gegen Leidenweh grüne Eibischen, denen man Kopf und Füße abgeschnitten hat, zur Speise empfiehlt; gegen dasselbe Uebel empfiehlt er noch ein verwandtes Reptil, den *Stellio transmarinus* vom Thiere sollen die Eingeweide ausgenommen, der Kopf abgeschnitten und das übrige dann in Wein gekocht werden, welche Brühe der Kranke trinken muß (lib. 30. cap. 60).

*Dioscorides* redet nur von dem äußern Gebrauche der Eibischen: auf Stichwunden vom Scorpion soll man frisches Eibischfleisch legen; auch Wunden, Hühneraugen und dergl. soll man damit entfernen können. Etwas von der Leber in den hohlen Zahn gelegt, stille das Zahnweh usw. *Plinius* weiß noch viel mehr von den Heilkräften dieser Amphibien zu sagen.

In neuen Zeiten hat man sie gegen Syphilis, Ausschlag, Krebs, bössartige Krätze, Pellagra, Scropheln usw. empfohlen. *Carminati* wendete besonders die grünen Eibischen an, die er, nachdem der Kopf und die Füße abgeschnitten und das Eingeweide herausgenommen war, Morgens roh essen ließ und glückliche Curen damit verrichtete. Otto fand Eibischen mit Zucker eingemacht noch gegenwärtig in Italien gegen Hautkrankheiten im Gebrauche. *Segur* berichtet, daß in America die Eibischen

78 *Galē de Antidotis* 2. 897 u. 911.

79 Ueber den *Scincus officinalis*, seine medicinische Anwendung und die verschiedenen früher gebrauchten Stingen überhaupt, siehe man die schöne Abhandlung des Hrn. Dr. Brandt in dem Archiv für Pharmacie Bd. 30. S. 257 ff., dann Geisger's Magazin für Pharmacie Bd. 30. S. 253.

80 *Amphibiorum virtutis medicatae defensio inchoata. Dissertatio*, praeside Hermann Argentorati. 1787.

81 Man sehe P. *Carminati* therapeutische Abhandlungen Bd. 1. Wien, 1789. S. 108 ff.

als specifisch gegen die Elephantiasis betrachtet werden, und klagt über die Nerzte seines Vaterlandes, welche seiner Mittheilung nicht die mindeste Aufmerksamkeit geschenkt haben.<sup>82</sup>

Die Familie der Schlangen oder Ophidii ist ein wichtiger Artikel in der Materia medica der alten Nerzte; doch kommt nur die Gruppe der Vipern vorzugsweise in Betracht, die man ihrerseits in zwei Sectionen bringen kann, in die giftigen, d. h. deren Biß gefäßliche Folgen nach sich zu ziehen pflegt, oder die eigentlichen Vipern (Vipera), und in die unschädlichen, deren Biß solche Nachtheile nicht bringt, oder die Nattern (Coluber).

Es sind deshalb anzuführen:

Die ägyptische Viper<sup>83</sup> (Vipera haje Daudin., Coluber haje L., Vipera aegyptiaca Laeepède, Aspis des Dioscorides), deren Vaterland schon durch ihren Namen angedeutet ist. Curvier sagt, daß die Alten sie an ihren Tempeln als Beschützerin der Fester abzubilden pflegten. Sie hat das Ansehen unserer gemeinen Viper (V. berus), aber ihr Gift soll viel gefährlicher seyn, obgleich ihr Stich so fein ist, daß man ihn kaum sehen kann, ein Umstand, den auch Dioscorides anführt; dabei fließt aus der winzigen Wunde nur wenig, aber schwarzes Blut; der Verwundete erblaßt und zuckt, und bald erfolgt ein fast schmerzloser Tod. Zu den Zeiten des Galens soll man diese Schlange zur Hinzurichtung der Verbrecher benutzt haben; sie ist, wie man sagt, die Schlange, womit die ägyptische Herrscherin Cleopatra sich tödtete, um der Schmach zu entgehen, die ihr Octavian zugebracht hatte. Ein treuer Diener brachte ihr, unter Blumen versteckt, die giftige Viper, durch deren Biß sie nach wenigen Minuten ohne Schmerz verstarb.

Nach Sæsselquist ist es diese Viper, die man zu den Zeiten des Nero zur Bereitung des Theriacs verwendete, und die später noch getrocknet in Menge durch die Venetianer in den Handel gebracht wurde. Noch bis auf den heutigen Tag findet man in allen Apotheken den Theriac, der, obgleich sehr verschieden von dem, den die alten Nerzte benutzten, doch noch immer, wie ein berühmter Schriftsteller sich ausdrückt, eine pharmaceutische Mißgeburt ist. Die primitive Absicht bey dem Gebrauche dieser Mischung war, sie als ein Mittel gegen den Biß giftiger Thiere zu benutzen, dessen schlimmen Folgen er vorbeugen sollte: sein Hauptbestandtheil waren die Vipern, und besonders sollte er sich gegen den Vipernbiß wirksam erweisen, woraus man sieht, daß homöopathische Grundsätze schon sehr alt sind. Galen berichtet, daß man Thiere absichtlich von Vipern beißen ließ, und ihnen dann Theriac gab, um so sich von der Güte des Mittels bestimmt zu überzeugen. Einer der frühesten griechischen Schriftsteller, die von dem Gebrauche der Vipern als Mittel gegen den Vipernbiß reden, ist Nicander, der sie jedoch nicht innerlich gab, sondern aus gekochtem Vipernfleisch eine Salbe bereiten ließ, die noch Hirschmaß, Rosenöl, Divonöl

usw. enthielt, und womit die Gebissenen sich den ganzen Körper einreiben mußten.<sup>84</sup> Uebrigens soll dieß Verfahren nicht bloß vor den Folgen des Vipernbisses schützen, sondern überhaupt gegen alle animalischen Gifte nützlich seyn, wie denn der Name Theriac selbst von diesem Umstande abzuleiten ist.

Am berühmtesten ist der Theriac des Andromachus aus Kreta geworden. Dieser war Leibarzt des Kaisers Nero und beschrieb die Bereitungsart des Wundermittels, das man bald fast gegen alle Krankheiten benutzte, in elegischem Versmaße, und Galen hat sie seinem Buche von Gegengiften ganz einverleibt. Bei den römischen Kaisern war dieser Theriac so berühmt, daß Antonin ihn täglich gebrauchte, und in seinem Palast jährlich verfertigen ließ. Auch in der Composition des Andromachus waren die Vipern die Hauptsache, was sehr lange unverändert so blieb,<sup>85</sup> bis man später die Vipern ganz weggießt; und heutzutage legt man nur auf den Splümgchalt dieser Lattwerge einigen Werth. Da man nicht immer frische Vipern haben konnte, so bereitete man aus dem Fleische dieser Reptilien unter mancherlei Zusätzen eine Masse oder Teig, der sich aufbewahren ließ, und mittelst dessen zu jeder Zeit Theriac bereitet werden konnte. Dieß sind die Trochisci theriaci oder Pastilli theriacales, wie sie sich bis noch vor wenigen Jahrhunderten in den Pharmacopöen erhielten. Nach Plinius werden sie folgendermaßen bereitet: Man schneidet von dem Körper der Vipern 4 Finger breit unten und oben ab, nimmt die Eingeweide heraus und kocht den übrigen Körper in einem Topfe unter Zusatz von etwas Dill vollkommen weich, nimmt dann die Gräthen (spinae) heraus und mischt die gehörige Menge seines Weizenmehl (similago) hinzu, worauf man die Masse zu Pastillen formt und diese im Schatten trocknet.<sup>86</sup> Da man in späteren Zeiten auch europäische Vipern zum Theriac nahm, so findet man bei den alten Nerzten sehr genaue Vorschriften, wann, wo und wie diese Reptilien gefangen, aufbewahrt und zubereitet werden sollen, dessen specielle Erörterung zu viel Raum einnehmen würde. Man gefiel sich in jenen Zeiten, Compositionen aufzustellen, die eine recht große Menge von Drogen enthielten, allein schon Plinius tadelt mit Recht diese Sitte, namentlich in Hinsicht des Theriacs als verschwenderisch und unpassend.<sup>87</sup> Merkwürdig ist die Theriaca antiochi, deren Composition auf die Schwelle eines Tempels des Aesculap in gebundener Rede eingegraben war, sie enthält verhältnißmäßig nur wenige Drogen, und unter diesen weder Vipern noch Opium.<sup>88</sup>

84 Nicandri Theriaca p. 98 — 114.

85 Solae viperae magnae hujus antidoti (Theriaceae) basis sunt, heißt es noch in Horstii pharmacopoea catholica p. 339.

86 Plin. lib. 29. cap. 4. Man sehe auch Pauli Aeginetae opera p. 437. Nicolai Alexandrini medici liber de compositione medicamentorum. Venetii 1543. Cap. 901. Nach Deutschland wurden diese Vipern-Pastillen aus Italien eingeführt. Man sehe Pharmacop. Argentoratensis anni 1725. pag. 204.

87 Theriaca vocatur excogitata compositio luxuriae. Fit ex rebus externis, cum tot remedia dederit natura quae singula sufficient. Lib. 29. cap. 1.

88 Plin. lib. 20. cap. 24.

82 Richter, Arzneimittellehre. Supplement C. 19. — Das Gesichtliche dieses Mittels und seinen Gebrauch gegen Syphilis und Krebs erörterte Hünke. Man sehe Caspers Repertorium Bd. 24. S. 137.

83 Coluber vipera L. gehört wohl hierher, da er in seiner Materia medica Aegypten als Vaterland angibt.

3tes 1838. Heft 5.

Im Abenlande wurde, wie man sagt, durch die Kreuzzüge der Thierac *Andromachus* eingeführt, und zugleich mit ihm die Sitte, dieses für die damalige Zeit so äußerst wichtige Medicament nur unter der speciellen Aufsicht der Obrigkeit bereiten zu lassen. Diese Gewohnheit erhielt sich sehr lange namentlich in Belgien und in Frankreich; in Paris wurde noch im Jahre 1787 der Thierac mit seltsamen pomphaften Ceremonien öffentlich bereitet.<sup>89</sup> Noch im Jahre 1816 sahen die Herren *Soppe* und *Hornschuch* in Venedig die Verfertigung des Thieracs in großer Quantität und auf öffentlicher Straße. In einer ziemlich schmalen Gasse waren an jeder Seite 16 große Mörtel aufgestellt und jeder mit einem Stöcker versehen, der eine eigene Art bunter Uniform trug, die so ziemlich jener der Harlequins gleich kam. Das Stoßen geschah nach dem Tacte, mit einem Gesänge begleitet, dann erfolgte ebenso das Durchsieben ufw.<sup>90</sup> Hofrath *Dr. Ruppis* in Gotha sagt, in den italienischen Apotheken stehe auf dem Gemäuer der Apothekeneinfassung ein eignes im antiken Styl geformtes Geschütz, gewöhnlich von Holz und plump geschnitten, mit der Aufschrift *Theriaco*, bisweilen finde man zwei solche Gefäße, dann stehe auf dem einen *Mithridato* oder auch *Andromacho*. In Unteritalien ist die Bereitung des Thieracs ein Privilegium der Correctiensaualt in Neapel, und jeder Apotheker der Städte ist verpflichtet jährlich 2 Pfund, ein Apotheker auf dem Lande aber ein Pfund aus dieser Anstalt zu nehmen.<sup>91</sup> Nach *Schläpfer* besteht das Aushängeschild vieler Apotheken in Italien aus ausgeflopfen Wipern und einem großen Gefäß mit der Ueberschrift: „*Theriaca Andromachi*“; Wipern und Thierac (setzt er hinzu) spielen dort noch eine Hauptrolle.

Gegen den knolligen Ausfuss (*Elephantiasis*) galt im Alterthum Wipernfleisch als ein Hauptmittel; die Kranken mußten diese Reptilien gekocht essen, wie ein anderes Fleischgericht, oder sie bedienten sich auch der schon oben angeführten und immer vorzüglich zu habenden Wipern-Pastillen.<sup>92</sup> Auch *Archigenes* von Apamea, der zu Trajans Zeiten in Rom lebte, empfiehlt gegen den Ausfuss vorzugsweise das Wipernfleisch, und *Musa*, der zu den Zeiten des Kaisers August lebte, empfiehlt es gegen schlimme Geschwüre, wahrscheinlich herpetischer oder leproser Art.

Die orientalische oder gehörnte Wiper (*Vipera cerastes Daud.* oder Coluber *cerastes L.*) zeichnet sich, worauf schon der Name hinweist, durch zwei über den Augen stehende Hörnchen aus; sie bewohnt die krummen Sandwüsten von Aegypten, Arabien und Srien, und findet sich überhaupt, nach *Bruce*, durch den ganzen Orient. Sie wird nur 13 bis 14 Zoll lang und ist, wie *Blumenbach* sagt, allerdings giftig. Nach *Dioscorides* verursacht der Biß dieser Schlange

Geschwulst, Härte und das Erscheinen von Pusteln an der verwundeten Stelle; es erscheint da eine bald schwarze, bald gelbliche Sauche und der ganze Körper nimmt eine dunkelgelbe Farbe an, und die Verwundeten sterben unter Ohnmachten und Convulsionen. Nach *Sprengel*<sup>93</sup> gehört auch die *Haemorrhoides des Dioscorides* zu dieser Schlange, obgleich die nach Verwundungen durch dieselben entstehenden Symptome ganz verschieden angegeben sind. Dieß ist um so mehr zu beachten, als an einem andern Orte die *Haemorrhoides des Nicander* für die Kupferschlange (*Coluber lebeatus*) gehalten wird. (Geschichte der Med. 3. Aufl. Bd. 1. S. 606.) *Sprengel* hält ferner (a. a. O. S. 207) die gehörnte Wiper für eine der dem Aesculap geheiligten Schlangen, und setzt hinzu, daß ihr Biß unschädlich sey, was, wie man leicht bemerkt, mit den bereits gegebenen Nachrichten nicht gut übereinstimmt.

Gemeine europäische Wiper (*Vipera berus Daud.* oder Coluber *berus L.*). Sie heißt auch Kreuzotter und Kupferschlange und kommt vorzüglich im südlichen Europa, zumal in Italien und dem südlichen Frankreich vor, aber auch, wiewohl seltener, in Deutschland. Was öfters dafür ausgegeben wurde, scheint zu einer andern Species zu gehören. Nach der Annahme einiger Zoologen ist die *Vipera berus Daud.* synonym mit *Vipera cherssea Cuv.* und mit Coluber *berus Laurenti*, aber nicht mit Coluber *berus L.*

*Sontana*, der sehr zahlreiche Versuche mit der Wiper zur Ermittlung der Folgen ihres Bisses angestellt hat, beschreibt die Symptome, welche durch die Verwundung von dieser Schlange zu folgen pflegen, auf nachstehende Weise: Es entsteht Schmerz in dem verletzten Theile, welcher wenige Minuten nach dem Bisse beginnt, durch Druck vermehrt wird und sich über das ganze Glied ausbreitet. Es entsteht eine Geschwulst, welche im Anfange eine kasse, dann eine rothe Farbe zeigt, zuletzt aber livid wird und ein brandartiges Ansehen annimmt. Die Härte wird bedeutend, es treten Ohnmachten ein, der Puls wird häufig, klein und unregelmäßig, die Respiration schwierig; kalte Schweiß, Erbrechen mit großer Schmerzhaftigkeit des Magens erfolgen und die Haut nimmt eine gelbe Farbe an. Das Sehvermögen wird gestört, Convulsionen und Delirien treten auf. Aus der Wunde ergießt sich schwarzes, dann mit Eiter vermishtes Blut; sie selbst wird zuletzt, wenn der Tod droht, brandig. —

Die Symptome, welche *Dioscorides* von dem Wipernbisse aufzählt, stimmen im Ganzen mit den eben angegebenen gut überein. Auch die Behandlungsart des Wipernbisses im Alterthum ist von der jetzt üblichen Methode kaum wesentlich verschieden. Nach den neuesten Angaben von *Pereira* besteht die lokale Behandlung hauptsächlich in der Anbringung eines Druckes um das Glied, welches man entweder mit einer festen Binde umschlingt, oder auf welches man einen Schröpfkopf applicirt. Wo ein Druck nicht anzubringen ist, könne man sich der Kauterien zur Zerstörung des Giftes bedienen, und bei großer Geschwulst des verletzten Theiles könne man zu Scarificationen seine Zuflucht nehmen.<sup>94</sup> *Celsus* sagt von der Behandlung des Bisses giftiger Schlangen: *Imprimis super vul-*

89 *Waldbinger medic. Journal.* Bd. 18. S. 42.

90 Tagebuch einer Reise nach den Küsten des adriatischen Meeres. Regensburg, 1818. S. 138.

91 *Allgem. med. Zeitung* 1831. S. 404. Die ursprüngliche Formeln für die *Theriaca Andromachi senioris* Galeni dicta findet man bei *Galien* de Antidotis 1. p. 875; die des jüngern *Andromachus* Ib. 877. Die *Theriaca Mithridatis* Ibid. 2. 912.

92 *Arctaeus de Curatione morb. diuturn.* Lib. 2. cap. 13. p. 135. *Coel. Aurelian.* Chron. 4. 1. p. 286.

93 *Commentationes zum Dioscorides* Bd. 2. S. 634.

94 *Vorlesungen über Materia medica* S. 171.

ous in membrum deligandum est; non tamen nimium vehementer, ne torpeat: dein venenum extrahendum est. Id cucurbitula optime facit, neque alienum est, ante scalpello circa vulnus incidere etc. (Lib. V. cap. 27. 3.) In neuern Zeiten will man beobachtet haben, daß das schwefelsaure Chinin specifisch die Folgen des Vipernbisses entferne, was jedoch noch der Bestätigung bedarf.

Obgleich die Vipern durch ihren Biß schädlich werden, so dienten sie doch in alten, wie in neuen Zeiten als Speise. Plinius berichtet dieß von mehreren Völkerschäften und insbesondere von den Bewohnern des Berges Aetha (lib. 7. cap. 2). Schläpfer sagt, in Italien werden unter den Schlangen die Vipern und noch einige unschädliche Rattennarten, z. B. Coluber viridiflavus, 4lineatus, zuweilen gegessen, meistens aber in die Apotheken verwiesen und dort noch sehr häufig zu Krautbrühen und Viperngallen benutzt. Dioscorides sagt (lib. 2. cap. 18): Gefochtes Vipernfleisch als Speise genommen, sey den Augen zuträglich, nütze in nervösen Leiden und vertreibe die Kröpfe, ja dieses Mittel soll überhaupt der Gesundheit zuträglich seyn und ein langes Leben sichern. Kein Wunder also, daß die Aertze große Dinge von den Vipernbrühen erwarteten, und deren Gebrauch dauert in Italien und Frankreich noch fort bis auf den heutigen Tag. In Italien benutzt man übrigens nicht bloß Vipera berus, sondern auch V. redi, die übrigens nur eine Varietät der gemeinen Vt seyn soll; ferner Vipera aspis und V. cherssea. In chronischen Krankheiten ist die Vipernbrühe von den heutigen Aertzten Rom's noch sehr geschätzt. Man läßt etwa 2—2½ Unzen des frischen Vipernfleischs (vom getrockneten mehr) auf 6—8 Unzen Wasser rückstand kochen und allein oder mit Kräuterkzusätzen vermischt täglich gebrauchen. Dieses Decoct leistet, nach der Versicherung des Dr. Morichini, bey Lähmungen und chronischen Hautübeln sehr gute Dienste.<sup>95</sup> Die französischen Drogisten beziehen ihre Vipern aus Poitou, Evonnais und Languedoc; sie erhalten sie lebendig in Gläsern, Schachteln oder kleinen durchlöcherten Tonnen, und mit Kleie belegt. So erhalten sie sich Jahre lang ohne alle Nahrung, werden aber dabey schwach und kaum mehr gefährlich. Uebrigens bezieht Frankreich, nach der Versicherung des Dr. Moreau de Jonnes, jährlich noch für 50,000 Franken an Vipern aus Italien. Man benutzt die Vipernbrühen jetzt als ein Restitutum in Consumptionskrankheiten, bey Marasmus senilis, der Lungenwindfucht usw. In Frankreich hat man auch eine Vipern-Gallerte (gelée de vipère), die ungefähr so gebraucht wird, wie in Deutschland die Gelatina helicis und ähnliche Bereitungen.

Dioscorides rühmt das Vipernfett in Verbindung mit attischem Honig, Del usw. gegen verschiedene Augenkrankheiten. Auch in den deutschen Pharmacopöen fand die Axungia viperarum eine Stelle, namentlich noch in der Pharmacop. Wirtembergica vom Jahre 1760.

Mit Uebergangung einer großen Zahl, zumal älterer Schriften über den medicinischen Gebrauch, mögen hier nur folgende eine Stelle finden:

*Theophil. Conrad. Christian. Storr, Stuttgartianus*

Dissert. de curis Viperinis, praeside Oettinger. Tübingae, 1768.

*Giuseppe Profferio, Cenzo medico sull' uso della Vipera, e sopra un suo straordinario effetto. Torino, 1822.*

Der Verf. empfiehlt sehr den Gebrauch der Vipernbrühen gegen mehrere Krankheiten, jenes ungewöhnliche Symptom, von dem der Titel der Schrift meldet, ist ein eigenthümlicher Durst. Man sehe Allgemeine medicinische Annalen 1823. S. 813.

*Joannes Flak de Raggamb, Hungarus Zoliensis de Vipera bero. Pest, 1827, 18 S. 8.*

Die illyrische Viper oder der Sandkriecher (*Vipera ammodytes* Daud., *Coluber ammodytes* L., *C. aspis* Gmelin, *Vipera illyrica* Aldrovandi). Sie ist vorzugsweise im südlichen Europa zu Hause und dient in Spanien als officinelle Art.<sup>96</sup> In Steyermark ist sie, nach der Angabe des Hofmedicus Subernalath v. Vest, die häufigste in den Kalkklippen; ihr Biß verursacht heftige Entzündung, sie ist fast so gezeichnet wie die gemeine Viper und auf der Nase mit einer Warze versehen. Man hält sie für den Kenchros des Dioscorides und anderer griechischer Schriftsteller, die den Biß dieser Schlange als sehr gefährlich darstellen.

Schwedische oder rothe Viper (*Vipera cherssea* Daud.) ist mehr dießseits der Alpen und im nördlichen Europa einheimisch; sie wird auch Kreuzotter oder Feuerotter genannt und ist den griechischen und römischen Aertzten kaum bekannt. In Deutschland ist sie häufiger als die gemeine Viper und auf sie dürften daher größtentheils die Unglücksfälle zu beziehen seyn, die man bey uns als Folgen des Schlangenbisses wahrnahm. Nach Herrn Dr. Lenz sind diese Vipern häufig 2 Fuß lang, die Grundfarbe der Oberseite des Körpers ist weiß, mit schwarzer Kopfzeichnung und schwarzem Zickzackstreif über den Rücken hin, oder graubraun mit schwarzer Zeichnung. Mitten auf dem Kopfe steht ein großer Wirbelschild und dahinter zwey gewöhnlich kleinere Hinterhauptsschilder. Interessant ist die Beobachtung des Hrn. Dr. L., daß der Buffard (*Falco buteo*) als der natürliche Feind und Vertilger der Vipern gelten darf.

Die schwarze oder englische Viper (*Vipera prester*) kommt ebenfalls in Deutschland vor, namentlich fand man sie im Württembergischen und in Steyermark. Sie ist, wie Herr v. Vest sagt, sanfter Natur, greift den Menschen nie ungerne an, und ihr Gift ist das gelindeste. Sprengel dagegen nennt sie eine gefährliche Schlange und hält sie für den Dipsas des Dioscorides, welcher Name von dem unschönen Durste herrührt, den die von dieser Schlange Verwundeten empfinden sollen.

Von den Rattern sind nur wenige zu nennen, und zwar:

Die Ringelnatter oder die Wasserschlange, Hehnatter, Steinotter usw. (*Coluber natrix* L.), eine sehr verbreitete Schlange, die sehr verschieden gezeichnet vorkommt. Dr. Schläpfer, der diese Sache sehr ausführlich erörtert, nimmt drey Varietäten der Natrix an, die sich durch verschiedene

<sup>95</sup> Carus, Analecten für Naturwissenschaft und Heilkunde. Dresden, 1829. S. 104. 108.

<sup>96</sup> Loeffling iter in Hispaniam pag. 68 et 98. der deutsch. Uebersetzung.



Merkmale, zumal durch die Beschaffenheit des Halsbandes, unterscheiden. Die gemeine (*Natrix vulgaris*) hat ein im Nacken zusammengehendes Halsband, und hinter diesem einen halbmondförmigen schwarzen Flecken. Die gewürfelte (*Natrix tessellatus*) hat ein nicht zusammengehendes Halsband, mit einem dreieckigen Flecken hinter diesem. Die schwarze (*Natrix niger*) hat ein oben nicht zusammengehendes Halsband und hinter ihm einen halbmondförmigen schwarzen Flecken.

Verwandt ist die rothe Natter (*Coluber austriacus Gmelin* oder *C. laevis Lacepède*); sie ist etwas kleiner als die gemeine, flinker, gelbbraun, zuweilen mehr röthlich. Angegriffen beißt sie, daß es blutet, aber ohne alle nachtheiligen Folgen. Die Ringelnatter selbst in ein unschädliches Thier, das man ganz unsorgfältig in die Hände nehmen kann, demungeachtet führt sie die *Dioscorides* unter den Giftschlangen auf, und spricht von den schlimmen Folgen ihres Bisses. Die alten Aerzte scheinen überhaupt alle Schlangen ohne Unterschied für giftig gehalten zu haben, wie denn selbst die friebliche harmlose Blindschleiche (*Anguis fragilis L.*) unter den Namen *Skytale* und *Amphisbaena* in einer Reihe mit den giftigen Vipern steht.

Von den Nattern sammelte man besonders die im Frühjahr abgestreiften Häute (*Anguim senecta*); man brauchte sie mit Wein gekocht bey Ohrenschmerzen zum Eingießen in das leidende Ohr; bey Zahnschmerz ließ man mit dieser Abkochung den Mund ausspülen. Auch bey Augenübeln benutzte man noch die Vipernhäute. *Plinius* weiß noch sehr Vieles von den medicinischen Tugenden der Schlangenhäute zu berichten.

Die Schlange des Aesculapius oder die Baken-  
[Schlange von Epidaurus] (*Coluber aesculapii Sk., non Linn.*). Sie spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte der ältesten griechischen Medicin, eine Sache, die allem Ansehen nach von den Aegyptern auf die Griechen überging. <sup>97</sup> Der heiligen Schlangen (*Drakontes*), welche die Griechen in den Tempeln des Aesculaps hielten und verehrten, waren mehrere, aber alle waren unschädlich, nicht giftig, und dabei künstlich gezähmt.

Die Schlangen waren vorzugsweise dem Aesculap geweiht, und alle Göttern, Mützen und andere Denkmale des Alterthums, die auf diese medicinische Gottheit Bezug haben, sind gewöhnlich mit diesem Zeichen geziert. Die Frage, welche Deutung diesem Symbole zu geben sey, wurde im Alterthume, wie noch heutzutage, verschieden beantwortet. *Iustus Pompeius* glaubte, die Schlangen stünden darum unter der Obhut des Aesculaps, weil sie sehr wachsame Thiere seyen, und Wachsamkeit bey der Pflege der Kranken ganz besonders erfordert werde. <sup>98</sup> *Plinius* meinte, die Schlangen gehörten dem Aescu-

lap an, weil sie selbst mehrere vortreffliche Heilmittel lieferten. In neueren Zeiten erklärte *Griech* <sup>99</sup> den mit einer Schlange umwundenen Stab des Aesculaps für ein Symbol der Klugheit u. s. w. — Solcher Deutungen existiren noch manche, und sie scheinen hauptsächlich von dem Umstande abzuhängen, welche Idee man sich von dem Aesculap selbst machte, in welcher Erwartung sich sehr scharfsinnige Köpfe versucht haben. Nur suchten sie außerordentlich fern, was ungenau nahe lag. Das Alterthum verehrt in dem Aesculap nichts anderes, als — die Heilkraft der Natur, und wenn der kranke Grieche in diesem Sinne sein Gebet in dem Tempel des Aesculaps verrichtete, so wendete er sich an den wahren Ort, von dem nur allein Heil und Gesundheit zu erwarten ist. Nach dieser Grund-Idee erklären sich alle Symbole des Aesculaps deutlich und leicht. Die Schlangen sind ein Zeichen der Verjüngung, eines neuen froheren Lebens, indem sie im Frühjahr ihre alten Häute abstreifen und neu geschmückt wieder erscheinen. Diese Ansicht hatten die Aegyptier schon im höchsten Alterthum, und später hat *Macrobios* sie wieder geäußert, und sie dürfte wohl die allein richtige und wahre sein. Nach überstandenen heftigen, zumal fieberhaften Krankheiten sieht man nicht selten die Genesenden gleichsam sich verjüngen, froher und kräftiger werden, als sie es vorher gewesen sind. Die Krankheit selbst wird ein Mittel zur Gesundheit! <sup>100</sup>

### Schweizerische Zeitschrift

für Natur- und Heilkunde, von Dr. Chr. Fr. von Pommer, Prof. Heilbronn, bey Dreßler. 1838. III. Heft 2.

Dieses neu erschienene Heft dieser gehaltreichen und nützlichen Zeitschrift enthält die Verhandlungen der medicinischen Gesellschaft des Cantons Zürich im October 1837.

Ueber die Influenza von Zweifel; über die Kali-Seife gegen die Kräfte von Schräml; die indische Cholera von Meyer-Hoffmeister und Muralt; Menschenblattern von Leiz; Creosot von Labarpe; Verletzungen des Auges von Diebold; Sterblichkeit in Cairo von Tit. Tobler.

Das Heft hat ein vollständiges Register über den ganzen Band.

aegroti maxima est. Man sehe *Vicentii Chartarii* Imagines Deorum qui ab antiquis colebantur, una cum eorum declaratione etc. Moguntiae, 1687. p. 38.

<sup>99</sup> Versuch einer allegorischen Erklärung der bekanntesten griechischen und römischen Götter. Altenburg, 1801. S. 118. Besonders ist nachzuweisen Sider: Die Hieroglyphen in dem Mythos des Aesculap. Meiningen, 1819.

<sup>100</sup> Diesen Gegenstand habe ich schon früher berührt in der Flora mythologica p. 170 ff., er verdient aber bis in alle Einzelheiten näher verfolgt und beleuchtet zu werden.

<sup>97</sup> Coluber Idolum wird noch heutzutage auf der Westküste von Africa göttlich verehrt, sie ist sehr zahm und frist giftige Schlangen.

<sup>98</sup> In Aesculapii tutela est Draco (anguis) quod vigilantissimum sit animal, quae res ad tuendam valetudinem









# S f i s.

## Encyclopädische Zeitschrift,

vorzüglich

für Naturgeschichte, vergleichende Anatomie und Physiologie,

von

### D e n.

1 8 3 8.

H e f t VI.

Der Preis von 12 Heften ist 8 Thlr. sächs. oder 14 fl. 24 Kr. rheinisch, und die Zahlung ist ungetheilt zur Leipziger Ostermesse des laufenden Jahres zu leisten.

Man wendet sich an die Buchhandlung Brockhaus zu Leipzig, wohin auch die Beiträge zu schicken sind. Es wie gebeten, dieselben auf Postpapier zu schreiben.

Unfrankirte Bücher mit der Post werden zurückgewiesen.

Einschlaggebühren in den Text oder Umschlag die Zeile sechs Pfennige.

Von Anticritiken (gegen Fälsch-Recensionen) wird eine Quartseite unentgeltlich aufgenommen.

Leipzig, bey Brockhaus.



0 <i>Erodium punctatum</i> K.	12	<i>Dices fasciata</i> W.	24	<i>Heterophaga ovata</i> Dj.	15	<i>Trochilus laevigatus</i> F.	18
- costatus K.	15	0 <i>Nemognatha chrysomelina</i>	18	<i>Heteronychus ascanius</i> —	30	<i>Trogosita aenea</i> F.	18
<i>Zophosis plana</i>	20	20 <i>Zonitis adusta</i> W.	18	<i>Hister fossor</i> Dj.	21	12 <i>Uroplata mucronata</i> Ol.	21
- convexa W.	12	20 <i>Lyttinia Menetriesii</i> Wtl.	20	- <i>gagatinus</i> —	12	12 <i>Zophobas tridentatus</i> D.	21
- 4lineata Ol.	18	12 <i>Meloe carbonaria</i> W.	20	- <i>semipunctatus</i> F.	12		
- deplanata W.	18	- <i>rugulosa</i> Mhm.	15	- <i>striolatus</i> Dj.	12		
<i>Melancrus pygmaeus</i> W.	15	0 <i>Falciger echii</i>	2	2 <i>Jalodis cyanitarsis</i> Dj.	24	<i>Coleoptera brasiliensis.</i>	
- hegeleicus W.	18	18 <i>Tanymeus modestus</i> v. Hd.	10	0 <i>Oryctes Boas</i> F.	48	20 <i>Acanthosoma caliginosus</i> D.	20
<i>Pimelia coronata</i> Ol. 1 1/2 fl.	18	0 <i>Sitona viridiventris</i> Dhl.	6	5 <i>Pezodotus speciosus</i> Dj.	48	- <i>depressus</i> F.	21
- aculeata K.	24	0 <i>Hypera fasciculata</i> Hbst.	0	0 <i>Schizonychia cervina</i> —	20	20 <i>Acrocinus accentifer</i> Ol.	30
- granosa Wtl.	24	0 - <i>plantaginis</i>	6	- <i>incerta</i> —	20	20 <i>Alurnus limbatus</i> Latr.	36
- comata Dj.	24	0 - <i>tamaricis</i> H.	6	- <i>senegalensis</i> —	24	20 <i>Ameris Dufrenoyi</i> Kirb.	18
0 - hispida	12	0 - <i>retusa</i> F.	12	12 <i>Selenophorus ochropus</i> —	24	- <i>Ynca</i> Schh.	14
0 - crinita Klg.	24	24 <i>Sibina vestita</i> W.	15	- <i>exaratus</i> —	20	12 <i>Areoda Leachii</i> MacL.]	12
- <i>derasa</i> Klg.	24	24 <i>Bagous inconspicuos</i> W.	12	12 <i>Sphenoptera diversa</i> —	20	<i>Attelabus auratus</i> Wtl.	8
- <i>speciosa</i> W.	24	24 <i>Cleonis hieroglyphica</i> Ol.	9	- <i>neglecta</i> —	18	15 <i>Brentus bidentatus</i> F.	15
- <i>canescens</i> K.	24	- <i>quadricollis</i> Schh.	15	15 <i>Sternocera interrupta</i> F. 1 fl.	18	- <i>mandibularis</i> D.	15
0 - <i>grandis</i> Klg.	24	- <i>cylindrica</i> Klg.	12	- <i>castanea</i> F. 1 fl.	20	20 <i>Camaria distorta</i> —	20
<i>Eurychora opatroides</i> Dj.	18	- <i>candida</i> Ol.	15	12 <i>Tetromus tagenoides</i> Dj.	15	<i>Calandra sulcipennis</i>	28
<i>Akis hispida</i> H.	18	<i>Lixus dorsalis</i> Dj.	15	15 <i>Thalophilus lineata</i> —	18	- <i>Cassida chalconota</i> Perty	9
<i>Adesmia laconosa</i> Klg. 1 fl.	15	- <i>teuicollis</i> W.	6	- <i>polita</i> —	18	- <i>cornigera</i> F.	9
- <i>cancellata</i> Klg. 1 fl.	15	0 - <i>filiformis</i> F.	8	6 <i>Trigonostoma gilvipes</i> —	18	- <i>gibba</i> F.	9
- <i>dilatata</i> 1 fl.	15	0 - <i>pictus</i> W.	15	- <i>cinerarium</i> —	24	- <i>thalassina</i> St.	9
0 <i>Composoda angustata</i> F.	15	0 - <i>anguineus</i> F.	8			- <i>gibbosa</i> St.	9
0 <i>Tentyria eurypterus</i> Kolk.	15	<i>Calandra exigua</i> Wtl.	12	<i>Coleoptera cayennensis.</i>		- <i>inaequalis</i> F.	9
- <i>Heilich</i> Bess.	15	0 <i>Silvanus 6 dentatus</i>	8	12 <i>Acrocinus longimanus</i> F. 3 fl.	10	- <i>auromaculata</i> St.	9
<i>Tentyria semipunctata</i> Klg.	24	24 <i>Polyarthron aegypt.</i> Dj. 2 fl.	15	8 <i>Anomala scutellaris</i> Dj.	15	- <i>nodosa</i> D.	9
- <i>elongata</i> W.	30	30 <i>Clytus lunatus</i> W.	15	15 <i>Brentus anchorago</i> F.	10	6 <i>pustulata</i> F.	9
<i>Heteropinus costatus</i> W.	30	15 <i>Leptura bicolor</i> Klg.	15	15 <i>Calandra hemiptera</i> F.	15	- <i>normalis</i> Germ.	9
0 <i>Polyscopus costatus</i> Wtl.	20	- <i>pharaon.</i> K.	15	- <i>palmarum</i>	21	- <i>suturalis</i> D.	9
<i>Scaurus aegyptiacus</i> Sieb.	20	0 <i>Callidium bajulus</i>	2	- <i>atrata</i> Dj.	18	- <i>basalis</i> Germ.	9
0 - <i>abbrev.</i> K.	20	0 - <i>strepens</i>	30	18 <i>Callichroma equestre</i> F.	18	- <i>terminata</i> St.	9
<i>Scaphium tuberculatum</i> Klg.	20	15 <i>Cassida rufescens</i> Wtl.	12	12 <i>Camptocerus aeneipennis</i> Dj.	18	- <i>tenella</i> Kl.	9
<i>Blaps sulcata</i> F.	15	12 <i>Galleruca bivittata</i> F.	12	12 <i>Cleogonus rubetra</i>	40	- <i>circumcincta</i> St.	9
- <i>costulata</i> W.	12	12 <i>Galleruca abdominalis</i> F.	12	12 <i>Chlorida festiva</i> F.	18	12 <i>Ceraspis dorsalis</i> Klg.	9
<i>Notocorax corvinus</i> Wtl.	36	12 <i>Clythra parallelepipedata</i> W.	15	15 <i>Chalcopledius striatus</i> F.	18	18 <i>Chaeeridium nigrum</i> D.	18
<i>Scelerosis castanea</i> v. Heyd.	36	10 - <i>venustula</i> W.	15	15 <i>Coelosternus ochratus</i> Lac.	14	14 <i>Chalcopledius porcatius</i>	18
<i>Opatrum strigosum</i> Dj.	10	9 <i>Cryptoccephala maculic.</i> W.	12	15 - <i>asperatus</i> Dj.	18	14 <i>Chasmodia emarginata</i> F.	21
0 - <i>fuscum</i> Dj.	12	0 <i>Coccinella chrysomelina</i>	9	12 <i>Conotrachelus</i>	18	18 <i>Chrysosthes angularis</i> Schh.	21
- <i>sericeum</i> W.	12	0 - <i>punctata</i>	9	9 <i>notatus</i> Dj.	4	4 <i>Coccinella sanguinea</i> F.	4
- <i>orientale</i> F.	12	0 - <i>melanoptera</i> v. Heyd.	9	- <i>sanguinolentus</i> Bug.	20	18 <i>Chrysomela crucifera</i> D.	0
- <i>contract.</i> W.	12	<i>Coleoptera senegalensis.</i>	18	10 <i>Cratonychus guyanensis</i> Dj.	20	- <i>dissecta</i> Germ.	8
- <i>costatum</i> Wtl.	12	9 <i>Acmaeodera polita</i> Klg.	18	18 <i>Erotilus giganteus</i> F.	18	18 <i>Chrysoprasus ventralis</i> Germ.	15
0 - <i>pulchellum</i> K.	9	10 <i>Adesmia variolaris</i> F.	36	18 <i>Euchroma gigantea</i> —	42	18 <i>Coelosternus cylindricornis</i> D.	18
- <i>elongatum</i> W.	10	15 <i>Amphistorus encaustus</i> Dj.	36	18 <i>Goniadera angustata</i> Dj.	27	18 <i>Colaspis testacea</i> F.	8
<i>Crypticus pictus</i> Klg.	10	9 <i>Anthaxia troglodytes</i> Dj.	21	18 <i>Iphthius gigas</i> F.	27	- <i>tibialis</i> Germ.	8
0 <i>Phylan punctatus</i> Dj.	10	6 <i>Anaemeris stigmatica</i> —	18	36 <i>Mallodon spinibarbe</i> F.	20	- <i>laeta</i> St.	20
0 <i>Uloma ovata</i> H.	6	12 <i>Anthia sulcata</i> F. 1 fl.	40	18 <i>Macraspis chrysis</i> Latr.	36	18 <i>Colobotheca poecila</i> D.	20
0 - <i>ferruginea</i> F.	24	0 - <i>nimrod</i> F. 1 fl.	24	21 <i>Megaderus stigma</i> F.	27	- <i>varia</i> —	24
<i>Upis villosa</i> Dj.	24	15 <i>Apate monacha</i> F.	40	18 <i>Microdonta litigiosa</i> F.	56	18 <i>Conotrachelus litigiosus</i> —	18
0 <i>Calcar elongatus</i> Hbst.	24	24 <i>Brachinus equestris</i> Dj.	24	18 <i>Odontota perplexa</i> Dj.	18	18 <i>Coprobatus smaragdulus</i> F.	12
<i>Phaleria bimaculata</i> W.	10	12 <i>Ceroplesis aestuans</i> Ol.	35	- <i>sanguinicollis</i>	15	18 <i>Cyphus cultricolis</i> Germ.	18
0 <i>Cossyphus Hofmannsegg.</i> H.	12	12 <i>Chrysocrocha dives</i> Dj.	48	18 <i>Oncoceph. sanguinicollis</i> Dj.	15	- <i>histicrossus</i> Germ.	15
<i>Cistela tenella</i> K.	12	24 <i>Cetonia interrupta</i> F.	20	18 <i>Oxymerus lineatus</i> Ill.	18	- <i>perlepidus</i> Schh.	18
<i>Anthicus sauleti</i> Wtl.	24	15 <i>rosida</i> Schh.	20	18 <i>Passalus grandis</i> Dj.	24	- <i>gibber</i> F.	10
- <i>superbus</i> W.	15	15 <i>Colaspis senegalensis</i> Dj.	18	- <i>cephalotes</i> —	20	18 <i>Dasytes lineatus</i> F.	9
<i>Cerocomma Hemprichii</i> Klg.	15	15 <i>Diplotagtha gagates</i> F.	27	18 <i>Leachii</i> M. L.	20	18 <i>Dionychus parallelogram</i> F.	35
<i>Mylabris Dejeanii</i> Schh.	15	15 <i>Elater striato-punctatus</i> Dj.	12	18 - <i>sobrinus</i> Dj.	18	18 <i>Dorymerus anceps</i> Schh.	18
- <i>taeniata</i> W.	15	15 <i>Epicauta Duxantii</i> Duf.	12	18 <i>Phytotribus unicolor</i> Bug.	18	18 <i>Doryphora prasina</i> D.]	12
- <i>alternans</i> W.	15	15 <i>xanthopus</i> Dj.	20	18 <i>Piazorus compactus</i> Dj.	21	- <i>Dejeanii</i> G.	16
- <i>flavipes</i> W.	15	15 <i>Episcapha interrupta</i> Schh.	18	- <i>plagiatus</i> Germ.	18	16 <i>Elater porcatius</i> F.	16
- <i>apicalis</i> W.	15	15 <i>Eumolpus senegalensis</i> Dj.	20	- <i>geminatus</i> G.	18	- <i>plagiatus</i> Germ.	12
- <i>menthae</i> K.	15	15 <i>Galleruca foveicollis</i> —	18	18 <i>Pyrophorus phosphoreus</i> F.	14	- <i>geminatus</i> G.	18
- <i>flavicornis</i> W.	15	15 <i>Gnathocera africana</i> —	30	18 <i>Rhina barbirostris</i> F.	14	15 <i>Endyus albicinctus</i> D.	15
- <i>pectinata</i> W.	15	15 <i>Gymnopleurus fulgidus</i> Ol.	18	18 <i>Taenites cayennensis</i> Dj.	30	- <i>epibippium</i> —	15
- <i>angustata</i> K.	15	15 - <i>micans</i> Dj.	18	18 <i>Trachyderes cayennensis</i> Dj.	32	15 <i>Enteles triangularis</i> Schh.	15
- <i>20punctata</i> K.	15				30	15 <i>Entimus imperialis</i> F.	30
- <i>sisymbrii</i> Klg.	15				14	- <i>nobilis</i> F.	14
						18 <i>Epitragus aeneus</i> F.	18

(Fortsetzung folgt.)

## L i n g e g a n g e n :

- S. 401 Bücher von Berghaus und Fernald.
- 403 Inhalt der Linnæan Transactions XVII.
- 404 Jarrell: Stimmorgan von *Cygnus buccinator*. Drey neue *Leuciscus*.
- 405 Guilbing: *Naticina et Dentalium*.
- 407 Westwood: *Diopsis*.
- 411 Haliday und Walker: Immen und Mücken aus Südamerika.
- 412 Stutchbury: *Chamaeleo cristatus*.
- 413 Westwood: *Characteres der Embia*.
- 414 Garner: Nervensystem der Schalthiere.
- — Nees: ostindische Solanæen.
- 415 Royle: über *Lycium dioscoridis*.
- — Alph. de Candolle: *Myrsineen*.
- — Hamilton: Commentar über *Hortus malabaricus* IV.
- 449 Waltl: Käfer der Türkei.

## U m f a s s.

Dr. Jos. Waltl's Insecten-Verzeichniß.

## In Büchern.

- H. Schreiber, Freiburg und seine Umgebungen. Freiburg bey Herder. 1838. 8. S. 444, 9 Stahlstiche. 1 Karte und Plan der Stadt.
- Derselbe, Taschenbuch für Geschichte und Alterthum in Süddeutschland. Freiburg bey Emmerling. 1838. 392.
- Perleb, *Clavis familiarum regni vegetabilis*. Friburgi apud Emmerling. 1838. 4. 94.
- Derselbe, Geschichte des Freiburger Naturalien-Cabinet's. 1838. 4. 94.
- Prof. Werber, die Heilquellen von Petersthal am Fuße des Kniebis im Großherzogthum Baden. Freiburg bey Emmerling. 1838. 8. 226. 1 Taf.
- Schwörer, Bericht über die chirurgisch-ophthalmol. Klinik. Freiburg bey Herder. 1838. 4. 82.
- Frommherz, die Turaformationen des Breisgaus. Carlsruhe bey Groos. 1838. 4. 51. 2 Charten.
- Bieheler, Freiburgs Genius an die Naturforscher. Eine Fest-Gilde. Bey Groos. 1838. 8. 16.
- A. Tschudi, die Blasenwürmer. Freiburg bey Wagner. 1837. 4. 76. 2 Tafeln.
- Gschricht, anatomische Untersuchung über die *Clitoraealls*. Kopenhagen. 1838. 4. 18. 4 Taf.
- Guérin, *Revue zoologique*. Paris. 1838. No. 8. 8. 161 — 192.
- G. Schultze, systematisches Lehrbuch der vergleichenden Anatomie. Berlin bey Reimer. 1838. 8. I. 299.
- H. F. Zäger, anat. Unters. des *Orycteropus capensis*. Stuttgart bey Ehrhard. 1837. 4. 22. 1 Taf.
- M. M. Jacobovic: *Morbus tsümör*. Pesthini. 1837. 8. 56.
- Hofser, Verzeichniß der in Württemberg vorkommenden Käfer. 1838. 8. 34.

# S i s.

1838.

H e f t VI.

## Allgemeine Länder- und Völkerkunde,

nebst einem Abriss der physicalischen Erdbeschreibung. Ein Lehr- und Hausbuch für alle Stände von Dr. S. Berghaus,  
Prof. in Berlin. Stuttgart bey C. Hoffmann III. 1838. 8. 586.

Von diesem reichhaltigen und ungemein fleißig bearbeiteten Werke haben wir schon mehrmals gesprochen und auf seinen Werth aufmerksam gemacht. Wir brauchen daher hier nur den Inhalt anzugeben und dabei anzuzeigen, daß die physicalische Erdbeschreibung hiemit geschlossen ist. Dieser Band enthält nun die Verhältnisse der organischen Wesen zur Erde, und zwar in einer Vollständigkeit, wie sie vielleicht für solch ein Werk nicht nöthig wäre; jedoch wird man mit der Art der Bearbeitung, der Anordnung und der Auswahl gewiß zufrieden seyn. Voran geht die Pflanzengeographie in großer Ausführlichkeit sowohl nach ihrer Geschichte als nach ihren Veränderungen in Bezug auf die Höhen, die Zonen usw.; dann werden die wichtigen Culturpflanzen herausgehoben und wirklich mit einer erfreulichen Vollständigkeit dargestellt.

Auf gleiche Weise wird die Verbreitung der Thiere von Seite 289 an behandelt und zwar nach den einzelnen Classen mit besonderer Berücksichtigung der Säugethiere. Dann werden die wichtigen Handelsgegenstände herausgehoben, wie Corallen, Perlen, Austern, Fische usw.; Pelzhandel, Walfischfang, Haus- thiere udl.

S. 517 folgt das Mineralreich, Geschichte der Berg- werke und zunächst der Metalle nebst ihrer Verbreitung, Edel- steine udl.

Wir glauben nicht, daß man hier etwas vermissen wird, worüber man Aufschluß zu haben wünscht; überdies sind die Gegenstände gehörig geschieden und lassen sich daher leicht auffinden.

Die sonderbare Neuerung, daß u der Doppellaute in si zu verwandeln, kommt zwar in manchen neuern Schriften vor, ist uns aber nie so aufgefallen wie in diesem Werke, weil es  
Jhs 1838. Hft 6.

wirklich dadurch verunstaltet wird. Was kann abscheulicher aus- sehen als: Europa, neil, besucht, Deutschland usw.? ja wie finden sogar Räume, Fäulniß, Säugethiere, nicht etwa als Druckfehler, weil diese Schreibart überall vorkommt. Was soll man dazu sagen! Das ist fast eben so arg als Stuttgart zu schreiben.

## H a n d b u c h

für Reisende am Rhein, im Taunus, in dem Rhege- und  
Moselthal von A. Lewald. Eben. 1838. 8. 164.

Eine kleine Schrift, nebst einer Charte von C. Winc- selmann, die man leicht einstecken kann. Es scheint Alles bemerkt zu seyn, was gesehen zu werden verdient, zuerst nach der Reihe vom Ursprung des Rheins an bis nach Köln; dann folgt S. 65 eine kurze Beschreibung der Orte nach dem Al- phabet mit besonderer Angabe der Merkwürdigkeiten, Gasthöfe usw. Die Charte ist reinlich gestochen und scheint alles Wich- tigere zu enthalten.

Ebenda selbst ist auch eine recht hübsche und brauchbare Reisekarte für Tyrol erschienen, welches jetzt mit Recht fleißi- ger besucht wird als früher.

# S n n h a l t

von the Transactions of the Linnean Society of London.  
Vol. XVII. 1—4. 1835—1837. 4. tab. 29.

- 1) W. Narrell, Stimmorgan eines neuen wilden Schwanes (*Cygnus buccinator*). S. 1.
- 2) Derselbe, drey brittische Gattungen von *Leuciscus*.  
Seite 5.
- 3) David Don, über *Tropaeolum pentaphyllum*.  
S. 11.
- 4) W. Buckland, Uebereinstimmung des Baues des  
Faulthiers mit seiner Lebensart. S. 17.
- 5) L. Guilding, über *Naticina* et *Dentalium*. S. 29.
- 6) Ch. Gottfried Nees von Esenbeck, Monographie  
der indischen Solaneen. S. 37.
- 7) J. F. Koyle, über das *Lycium* des *Dioscorides*.  
S. 83.
- 8) A. von Decandolle, Durchmusterung der Myrsi-  
neen. S. 95.
- 9) D. Don, über die Verschiedenheit der Aestivation  
bey Chinarartigen Pflanzen. S. 139.
- 10) Derselbe, Zusätze zu *Tropaeolum pentaphyl-  
lum*. S. 145.
- 11) J. Hamilton, Commentar über den *Hortus ma-  
labaricus* IV. S. 147.
- 12) Ch. Daubeny, Auswahl der Nahrungstoffe durch  
die Pflanzen. S. 253.
- 13) G. Bentham, Musterung der Hydrophyllaeen.  
S. 267.
- 14) Westwood, Gattungen von *Diopsis*. S. 283.
- 15) P. P. Ring, Insecten von der Magellansstraße.  
S. 315.
- 16) E. Stutchbury, neues Chamäleon. S. 361.
- 17) G. Bentham, über *Hosackia* und die america-  
nischen *Loti*. S. 363.
- 18) Westwood, über *Embia*, verwandt den Termi-  
ten. S. 369.
- 19) Th. Taylor, de *Marchantia*. S. 375.
- 20) F. W. Hope, neue Spinnenfamilie (*Dolichosce-  
lia*). S. 397.
- 21) G. Bentham, über die *Eriogoneen*. S. 401.
- 22) J. Woods, über die Gattungen von *Fedla*.  
S. 421.
- 23) D. Don, über die brittischen Farren. S. 435.
- 24) Derselbe, fünf neue *Pinus*. S. 439.
- 25) A. B. Lambert, Galläpfel an einer Eiche vom  
rothen Meer. S. 445.

Bemerkungen über die Genspflanze der heiligen Schrift.  
S. 449.

- 26) Ch. Babington, neue brittische und europäische  
Pflanzen. S. 451.
- 27) W. Valentine, Entwickelung der *Theca* und die  
Geschlechter der Moose. S. 465.
- 28) N. Garner, Nervensystem der Schalthiere. S. 485.
- 29) D. Don, indische Gentianeen. S. 503.
- 30) E. Forster, über *Esula major germanica*.  
S. 533.
- 31) J. Sabine, neue brittische Rose. S. 539.
- 32) Westwood, neue *Diopsis*. S. 543.
- 33) R. Schomburgk, über Schmaroher-Drachsen.  
S. 551.
- 34) Protocoll. S. 553.

Verzeichniß von Geschenken und dergleichen. S. 571.

## Linn. Transactions XVII. I. 1834. 145. 8. T.

Auszüge aus den zoologischen Abhandlungen.

S. 1. W. Narrell, Beschreibung des Stimmorgans  
eines neuen Schwans, *Cygnus buccinator* Richardson.

Es ist der gemeinste Schwan in den Pelzländern von  
Nordamerica, heißt daselbst Trompeter und liefert die meisten  
Schwanenbälge der Hudsonsbay-Gesellschaft. Er braucht sechs  
Jahre, bis er ausgewachsen ist, und dann ist er größer als der  
wilde Schwan; Schnabel größer und ganz schwarz ohne alles  
Gelb; dritte Schwungfeder die längste, Schwanzfedern 24,  
Fähre schwarz. Die Luftröhre läuft auch durch das Brustbein,  
aber anders als beim wilden und bey Bewicks Schwan. Die  
Lafel stellt die Luftröhre vor.

S. 5. Derselbe, Beschreibung von 3 brittischen Süß-  
wasserfischen L. 2.

*Leuciscus lancastriensis*; Grayning: elongatus,  
pinna dorsali supra pinnas ventrales posita, caudali pro-  
funde biloba; capitis lateribus supra subparallelis; ore  
parvo; dorso lateribusque superne subrufescenti-isabellini-  
nis, inferne ventrequae argenteis.

Der Grayning hat viel Aehnlichkeit mit dem *Dace* (*Leu-  
ciscus vulgaris*), ist aber schlanker, Länge zur Höhe wie 5:1,  
beim *Dace* wie 4:1. Die obern Theile des ersten sind  
dunkelbraun mit bläulichrothem Schein und streng von dem  
untern hellern Theil getrennt. Iris gelblich weiß, so wie die  
Flossen; der *Dace* oben gelblich grün mit blauem Schein.

Grayning D 9. P 17. V 10. A 11. C 19.

*Dace* - 12. - 15. - 9. - 12. - 19.

Findet sich in den Flüssen Mersey, Alt, nebst dem *Dace*;



Lebensart wie bey der Forelle, werden nicht leicht über  $\frac{1}{2}$  Pfd. schwer, sind aber schwächer als der Dace. Der größte 9 Zoll lang.

Ein anderer aus den Bächen von Knowsley, welche in den Alt fließen, ist ebenfalls neu und fast ganz blau; gehört in die Abtheilung des Red-eye, Bleak et Minnow.

*Leuciscus caeruleus*; Azurine: ovato lanceolatus, pinna dorsali pone pinnas ventrales posita; dorso plumbeo, ventre argenteo, pinnis albis. B. 3. D. 10. P. 16. V. 9. A. 12. C. 19.

Länge zur Höhe wie 7:2 wie bey dem Red-eye, unterscheidet sich aber durch den silberweißen Bauch, der bey dem Red-eye glänzend goldgelb ist; dort sind die Flossen weiß, hier roth. Lebensart wie bey dem Karpfen; die größten nur 1 Pfd.

In der Thematik fieng ich ein einziges Mal *Cyprinus dohula*, sonst nicht in England; gehört auch in die Abtheilung von *Leuciscus lancastriensis*. War ein junger Mätkner, nur  $6\frac{1}{2}$  3. lang, oben dunkelblau, unten silberweiß, untere Flossen blaß gelbroth, obere braun. Er hat Ähnlichkeit mit dem Roach, ist aber nicht so hoch und dunkler. D. 9. P. 16. V. 9. A. 10. C. 20.

Abgebildet sind: *Leuciscus lancastriensis* et *caeruleus*, aber nicht illuminiert.

S. 17. W. Buchland. Ueber den zweckmäßigen Bau des Faultiers in Bezug auf seine Lebensart.

Sein Bau wurde oft für unvollkommen gehalten, was aber nicht der Fall ist, wenn man ihn mit seiner Lebensart vergleicht. Seine langen Vorderarme passen ganz gut zum Klettern und zum Erlangen der letzten Knospen usw. Mehrere Beispiele werden angeführt von ihrer Geschicklichkeit und Stärke.

S. 29. F. Guilding. Bemerkung über *Naticina* et *Dentalium*.

Die Naticinen unterscheiden sich von den Neriten. Sie sind blind, ihr Deckel hat keine Anhängel, ihre unbrauchbaren Fühlfäden sind schwach und rückwärts gerichtet, und der Kopf hat einen breiten Schleyer, dessen Spitze zum Fühlen dient; sie gleichen eher den Bullen, welche aber Augen haben auf einer Scheibe des Kopfs. Die Neriten haben vorragende Augen, vorpringende Fühlfäden und der Deckel hat Anhängel zur besseren Befestigung an den Fuß.

1) *Natica*: Character der Schale. Typus: *N. canrena*.

2) *Naticina*: Animal coecum; cucullatum. Caput absconditum. parvulum, papilliforme. Os subius, cartilagineum, proboscideiforme, intra caput retractile. Mandibulae binae, aequales, corneae, marginibus denticulatis. Tentacula spuria, longa, debilia, subdepressa, retractilia, apicibus recurvis; basi tecta, et membrana supra caput connexa. Cucullus latus, corpus testamque antice tegens, marginibus antice pedi connexus: dum pascit animal, detrahens Pallium tenue, continuum, latera testae protegens. Operculum corneum, simplex, spira antica interna, cicatrice parvula. Musculus opercularis lateralis,

contractus. Musculus adhaesionis ventralis latus, cartilagineus, candidus. Pes valde contractilis et mutabilis, latus, magnus, subdiaphanus, antice cucullum recipiens. Solea simplex, marginibus tenuibus. Anus pallio absconditus, sinister? Branchiae subdorsales.

a) Umbilico clauso: *N. mamilla*.

b) Unb. aperto: *N. lactea*. India occidentalis.

### *Dentalium*

wurde erst durch die Untersuchungen von Deshayes an seinen rechten Ort gestellt; er hatte aber nur Exemplare in Brantwein. Ich bekam ein lebendiges, aber nur  $\frac{1}{2}$  lang. Was Deshayes für Leber hält, halte ich für Kiemen. Diese Organe sind tief eingeschnitten wie ein Kamm; die vielen verlängerten, kolbenförmigen und vorwärtsliegenden Organe möchte ich Fühlfäden nennen; an ihren Enden scheinen sie Saugnapfe zu haben. Ob die converse Seite wirklich der Rücken ist, kann ich nicht bestimmen; meine Exemplare rutschten auf der Seite fort. Sie bewegen sich geschwind genug durch plötzlich unterbrochene Schritte; gestört ziehen sie sich schnell in die Schale zurück. Nach einiger Zeit wird die Cloake vorgeschoben, die Fühlfäden in Bewegung ge'et und der wurmförmige, sehr geschäftige Fuß ausgestreckt, um den Weg zu untersuchen. Will das Thier einen Schritt machen, so wird der mit seinen Füßlein umgebene Fuß in seiner ganzen Länge herausgestoßen, die anliegenden Flügel plötzlich ausgebreitet, die Basis des Fußes stark zusammengezogen, wodurch die Schale vorwärts format, während die flügelartigen Ausbreitungen offen im Sande liegen und machen, daß die Spitze des Fußes von ihrem vorgeschobenen Haltspunkte nichts verliert.

Bei frischen Exemplaren bekommt man die hintere Spitze oft ganz erhalten und sehr fein mit der Spaltöffnung, welche meistens abgerieben oder abgebrochen wird, besonders bey den todtten.

Der Spalt ist nicht immer auf der Rückenseite; bey meinen Exemplaren seitlich, oder an der Bauchseite. In der Apertura analis ähnelt die Schale der Fissurella, und die Fissura apicalis mahnt an die Rima marginalis posterior der Smarginula.

Sowerby fig. 9. (Gen. of Shells) gehört nicht zu *Dentalium*; die geschlossene Mübung und die hornigen Verbindungsbänder sind sehr sonderbar. Ich habe unter Meeresschnecken viele Exemplare eines Thieres (*Oikodomicus Guilding*) heraufgezogen, welche den Dentalien ähnlicher sind. Die Korbre ist glasartig, durchsichtig und etwas gebogen, nicht hart kalkartig. Das Thier ist nicht daran angewachsen, sondern der Nereis verwandt und sehr beweglich.

*Dentalium*: Animal arenicolum, valde elongatum, testae figuram exhibens, dorso arcuato. Corpus antice truncatum, postice mollius, subdiaphanum, musculis lateribus elongatis. Caput anticum, absconditum. Tentacula cervicalia, numerosa, elongata, subcapitata, apicibus suctorii? Pallium tumidum, plicatum, pedis basin tegens. Branchiae duae, pectiniformes, abdominales? Pes terminalis, magnus, extensus, subcylindricus, subattenuatus. Vermiformis, contractilis, subcanaliculatus: lobis pc-

taliformibus, medio caulem amplectentibus, et (dum serpit animal inter arenulas) inter utrumque passum subito et fortiter deflexis. Anus terminalis, nonnunquam appendiculis ut (primo observante D. Sowerby) in *D. fissura* instructus. Testa symmetrica, testacea, tubo spiniformis, leviter arcuata, versus apicem sensim attenuata, raro tumida, antice truncata; concavitate ventrali utrinque aperta: foramine antico magno, circulari, saepius simpliciter: foramine postico minori, saepissime in recentibus fissurato. Rima contracta. Operculum nullum. Genus sic dividendum: forsitan hae divisiones mox in subgenera plurima erigendae, at (incolis invisitis) monente Ovidio: „Eximia est virtus praestare silentio rebus.“

### I. Testa apice simplici.

a) Testa longitudinaliter striata vel costata. Dent. elephanthinum Linn., Desh.

b) Testa laevigata. Dent. entalis Linn., Desh.

c) Testa apice tubifera. Dent. Sowerbyi Guild.

### II. Testa apice fissurata.

a) Testa longitudinaliter striata vel costata. Dent. striatum Born, Desh. Dent. semistriolatum Guild.

b) Testa laevigata. Dent. eburneum Linn., Desh.

c) Testa transverse plicatula. Dent. circumdatum Sow. Gen. f. 5.

III. Apertura contracta, apice bifissurata. Dent. coarctatum Lam. Desh.

IV. Testa margine incrassata, apice simplici. Dent. strangulatum Desh.

1) *D. semistriolatum* Guild. *D. lacteum*, abdomine diaphano pallido, branchiis? lividis. Testa niveo-vitrea, apice acuta fusca; antice laevigata, postice longitudinaliter creberrimeque striolata. Longit. testae  $1\frac{3}{12}$  unc. Diam.  $\frac{1}{12}$ .

Var.  $\beta$ . fig. 6. testa candido pulchre undulato cincta. Habitat in arenosis Oceani Caribaei.

2) *D. Sowerbyi*. Animal ignotum. Testa parvula sublaevigata, transversim indistincte subplicatula, apice tubifera. Habitat semel cum praecedente. Long. testae  $1\frac{3}{24}$  unc. Testa quasi postice tubo duplicato, nec monstrosa.

Abgebildet ist von *D. semistriolatum* nichts anderes, als das Thier in der Schale mit ausgebreiteten, keulenförmigen Fühlfäden (16 sichtbar), und der Fuß mit seinen 2 Flügeln, gleich Blumenblättern gestellt, besonders. Für die Kenntniß des Thieres selbst ist weiter nichts gewonnen.

§. 283. J. D. Westwood, über die Mückenlippe *Diopsis* (Linn. Trans. XVII. 2. 1835, 283) Z. 9. u. 28. ill.

Der unsterbliche Linne endigte seine zoologische Laufbahn mit der Dissertation über *Paussus* et *Diopsis* 1775. Von der ersten Sippe habe ich im Band 16 gesprochen; von der

letzteren nun hier. Gar sonderbar ist die seitliche Verlängerung des Kopfes, die Hörner, manchmal so lang als der ganze Leib, an deren Ende die Augen stehen und kurz davor die Fühlförner. Diese Hörner sind auch gegliedert und unbeweglich. Zu Linne's Zeiten kannte man kein Kerf mit solchem Bau; seitdem hat aber Fabricius eine ähnliche Sippe unter dem Namen *Aclias* aufgestellt, abgebildet in Guérins Magazin der Entomologie, wo aber die Fühlförner im Gesichte stehen, so wie den Wiedemanns *Plagiocephalus* et *Zygotricha* aus Brasilien, denen auch *Trigouosoma* verwandt ist. Auch *Xenos*, *Stylops* et *Halictophagus* haben die Augen auf kurzen Stielen; nicht so *Elenchus Curtis*, obgleich zu derselben Ordnung der Strophipteren gehörig. Einige männliche Hefie haben auch 2 kurzgestielte überzählige Augen zwischen den Seiztenaugen.

Degeer bildet 3 WanzenGattungen ab mit Augensielen (III. t. 34. f. 17. 24. 25.) alle aus Surinam. Fig. 17. 18. ist *Cimex lineola* L., humilis Drury, *Largus punctatus* Hahn, *Euryopthalmus puncticolis* Laporte; eben so *Astemma cornuta* Serville (Encyclop. 10. 323) von Cayenne.

Unter den Crustaceen hat Leach den Krebsen mit gestielten Augen den Namen *Podopthalmia* gegeben. Diese Augensiele sind aber beweglich, mit Ausnahme von *Achaeus* et *Leptopodia*, welchen *Latreillia* nahe verwandt ist (Roux crustacés t. 22.). Dazu kommen noch *Gonoplax*, *Gelasimus* et *Macrophthalmus*.

Unter den Stomapoda, wohin *Squilla* gehört, haben besonders *Lucifer* et *Podopsis* sehr lange Stiele (Thompson Zool. Ref.) und *Stylophthalmia*.

Unter den Entomostraca haben nur die 3 Sippen der Branchiopoden gestielte Augen.

Unter den Spinnen *Phoroncidia aculeata* mit 8 Augen, aus Malabar (Zool. Journ. Nr. 20.), nahe verwandt der *Acrosoma Perty* und *Epeira curvicauda* Vauthier.

Selbst unter den Wirbelthieren bey *Squalus zygaena*. Bey *Diopsis* finden sich noch überdies 4—6 Stacheln an den Seiten der Brust und dem Ende des Schildchens, wie bey *Stratiomys* und bey einem *Sargus* aus Java.

Nun wird der Sippencharacter ausführlich gegeben. Fühlförner Gliederig mit langer Borste; Rüssel groß, häutig, geknickt; Vorderfüße zum Kauen, Sehen Gliederig, mit großen Ballen.

Sie finden sich bloß zwischen den Tropen, in Africa, Ostindien und Nordamerika, welche letztere vielleicht zu einer anderen Sippe gehört.

Sie haben Aehnlichkeit mit Ameisen und Schlupfwespen; Verwandtschaften zweifelhaft, zu *Sepedon*, *Calobata*, aber der Bau der Greifwerkzeuge abweichend.

Folgen nun die Gattungen mit ausführlicher Beschreibung, wovon wir nur die Characteres mittheilen.

**Sectio I.**  *Alis fascia abbreviata paullo ante apicem.*

**Species 1.**  *Diopsis ichneumonea* Linn.

Capite rufescenti, cornubus oculiferis ferrugineis, nigro, spinis flavis, alis ante apicem macula nigra, abdomine segmentis duobus (tribus ?) ultimis nigris. Longit. corp. e figuris Linnaeanis lin. 4 vel 5.

Habitat in Africa aequinoctiali ?

2) *D. wiedemanni* m.: Capite medioque abdominis rufescentibus, thorace nigro, spinis 2 scutellaribus et 4 thoracis flavidis, alis fuscescentibus in medio obscurioribus, macula ante apicem sublunari. Long. corp. lin. 4. Habitat in Guinea Africae.

3. *D. erythrocephala* Klug. Mss.: Capite laete ochraceo, pedunculis oculiferis obscurioribus, thorace nigro, pedibus anticis pallide luteis, tibiis tarsisque fuscis, alis pallide fuscescentibus, macula ante apicem transversa. Long. corp. lin.  $3\frac{1}{2}$ . Expans. alar. lin.  $5\frac{1}{2}$ . Habit. ad Promontorium bonae Spei. D. Lichtenstein.

4. *D. collaris* m.: Rufo-testacea, thorace (nisi collari rufo) nigro, alis macula transversa ante apicem posita, femoribus 4 posticis inermibus. Long. corporis lin.  $3\frac{1}{4}$ . Expansio alarum lin. 6. Habitat in Senegallia Africae.

5. *D. arabica* m.: Capite pallide fulvo, pedunculis oculiferis obscurioribus, thorace nigro, collari luteo-fuscescentibus anticis posticisque fuscescentibus. Long. corp. lin. 3. Hab. in Arabia deserta. D. Ehrenberg.

6. *D. pallida* m. L.  $3\frac{1}{2}$ '''.

7. *D. nigra* Illiger: Nigra, alis fascia ante apicem lineari fusca. Long. corp. lin. 3. Habit. in Sierra Leona.

## Sectio II. Alis macula terminali.

8. *D. apicalis* Dalm: Rubra, abdomine concolori immaculato, thorace nigro nitido, alis in summo apice puncto fusco. Long. corp. lin.  $3\frac{1}{2}$  Wied.;  $3\frac{3}{4}$ , sec. fig. Dalm. Habit. in Sierra Leona.

9. *D. tenuipes* m.: Long. lin. 3. Expans. alar. lin.  $5\frac{1}{2}$ . Hab. in Senegallia. D. Buquet.

10. *D. indica* m. Ferruginea, oculis, thorace toto abdomine postice alarum macula apicali spinisque scutellaribus nigris. Long. corp. e fig. Donov. lin. 4. Expans. alar. lin. 6. Hab. in Bengaliam. D. Fichtel.

11. *D. assimilis* m. Rufescenti-ochracea, abdominis apice saturate fusco, thorace nigro, collari piceo, alis macula apicali nigra, femoribus spinisque scutellaribus ochraceis. Long. corp. lin.  $3\frac{1}{2}$ . Expans. alar. lin. 6. Habit. —

12. *D. abdominalis* m., tunc vixit, aber  $4\frac{1}{2}$  l.

13. *D. fumipennis* m. Capite thorace toto abdomineque postice nigris, hoc antice saturate ferrugineo, femoribus anticis gracilioribus, alis infumatis macula magna terminali nigra. Long. corp. lin. 3. Expans. alar. lin.  $5\frac{1}{2}$ . Hab. in Senegallia ?

3 fig 1838. Sept 6.

Sp. 14. *D. trentepohlii* Westerm. Capite thorace spinisque scutellaribus nigris, pedunculis oculiferis fuscis; abdomine obscure ferrugineo, nitido, basi nigricante; pedibus rufescentibus, tibiis anticis et posticis fuscis ♀. lin.  $3\frac{1}{2}$ . Exp. alar. lin. 6. Hab. in Guinea.

15. *D. punctiger* m. Long. corp. lin.  $3\frac{1}{2}$ . Exp. alar. lin. 6. Hab. in Africa occidentali.

Sectio III. Alae immaculae (facies subtus et apex femorum 4 posticorum plerumque inermia).

Sp. 16. *D. signata* Dalm: pallide testacea, thorace fusco cinereo opaco, abdomine ferrugineo, maculis lateralibus (vel potius fasciis) lacteis, tibiis posticis infuscatis, annulo pallido; collari rufo-testaceo, scutello testaceo. Long. variat. Hab. in Sierra Leona. Afzelius.

17. *D. fasciata* G. R. Gray. Capite pedibusque luteo-fulvis, tibiis posticis albo-annulatis, abdomine ferrugineo fasciis albis, collari scutelloque cum thorace concoloribus nigro-cinereis. Long. corp. ♂ lin.  $2\frac{1}{3}$  ♀ fere lin. 3. Exp. alar. ♂ ? lin.  $3\frac{3}{4}$ , ♀ ? lin. 5. Hab. — ?

18. *D. concolor* m.: thorace abdomineque concoloribus serie pallide luteo-fuscescenti indutis, hoc opaco cinereo tenue trifasciato, pedibus ochraceis tibiis posticis in medio pallido-annulatis. Long. corp. lin.  $3\frac{1}{2}$ . Expans. alar. lin. 6. Hab. in Africa occidentali.

19. *D. macrophthalma* Dalm.: testacea, thorace atropaceo, abdomine sordide-testaceo, cornubus oculiferis dimidio corpore longioribus. Long. (e fig. Dalm.) lin.  $3\frac{1}{2}$ . Hab. in Sierra Leona. Afzelius.

20. *D. thoracica* m.: testacea, thorace atro nitido, scutello testaceo, cornubus oculiferis sordidis valde elongatis, femoribus posticis apice spinigeris, facie utrinque spinosa, alis immaculatis. Long. corp. lin.  $3\frac{1}{2}$ . Expans. alar. lin.  $7\frac{1}{2}$ . Long. sing. oculi pedunc. lin. 3. Hab. in Africa occidentali.

21. *D. atricapillus* Guérin. Capite thoraceque nigris, pedunculis oculiferis thorace longioribus, fuscis; abdomine elongato vix clavato, fulvo; pedibus fulvis, femoribus anticis haud dilatatis; alis hyalinis immaculatis, apice vix vel tenuissime infumato; femoribus 4 posticis ad apicem inermibus. Long. corp. fere 3 lin. Hab. — ?

22. *D. longicornis* Macquart. D'un fauve rougeâtre. Face à ligne transversale brune. Dilatations du front longues de  $2\frac{1}{2}$  lignes. Yeux noirs. Thorax noir, écusson et pointes sous les ailes fauves. Premier segment de l'abdomen noirâtre. Cuisses antérieures non renflées. Ailes un peu brunâtres. ♂. Long. corp.  $3\frac{1}{2}$ . Hab. in Guinea et Senegallia.

23. *D. obscura* m.: nigra, abdomine postice pedibus fusco rufescentibus, tibiis posticis fuscis in medio annulo pallido. Long. corp. lin.  $2\frac{1}{4}$ . Exp. alar. lin.  $3\frac{1}{4}$ . Hab. in Sierra Leona. Afzelius.

Sp. 24. *D. confusa* Wied.

Sectio IV. Alae fasciis integris.

Sp. 25. *D. dalmanni* Wied. Ferruginosa, alis fuscatis limbo fasciatis. Long. corp. lin. 3. Habitat in Java. Wied.

26. *D. meigenii*. Nigra, pedunculis oculiferis, spinisque scutellaribus fuscis; abdomine ad basin fasciis duabus (postica interrupta) argenteis; alis macula parva centrali fasciae angusta fusciscentibus. Long. corp. lin.  $2\frac{3}{4}$  —  $3\frac{1}{4}$ . Exp. alar. lin.  $4\frac{1}{4}$  — 5. Hab. in Guinea Africae.

27. *D. neesii*. Capite rufescenti; thorace obscure nigricanti; scutello pallidiori; abdominis basi rufo, apiceque; alis 3-fasciatis. Long. corp. lin.  $2\frac{3}{4}$ . Exp. alar. lin.  $4\frac{1}{2}$ . Hab. —? Japonia?

28. *D. ornata*. Atra, capite abdomine pedibusque piceo-nigricantibus, oculis ferrugineis pedunculis oculiferis capite paullo longioribus, femoribus anticis dilatatis, posticis quatuor ad apicem spiniferis; abdomine dilatato clavato; alis 4-fasciatis, fascia prima angusta et ad partem 3am longitudinis alarum sita, 2da latissima medium alarum occupanti; 3tia angusta et 4ta apicali. Long. corp. 3 lin. Hab. —?

29. *D. circularis*. Noir; dilatations du front brunes. Genoux et tarses antérieures et intermédiaires fauves. Ailes à grande tache discoidale brune arrondie, entourée d'un cercle hyalin. Long. corp.  $3\frac{1}{2}$  lin. Hab. in India orientali. Macquart. Dipt. Nr. 486.

30. *D. sykesii* Gray. Nigra abdomine in medio pedunculis oculiferis piceis, pedibus fulvescentibus, alis fuscis hyalino-fasciatis. Long. corp. lin.  $3\frac{1}{4}$  —  $3\frac{3}{4}$ . Exp. alar. lin. 6. Hab. in India Orientali.

31. *D. brevicornis* Say. Nigra obscura, antennis pedibusque ferrugineo-flavidis, alis fascia apiceque fusciscentibus, pedunculis oculiferis brevissimis. L. corp. l.  $2\frac{1}{4}$ . ♀ Wied. 3/10. Say, American Entomology III. t. 52. Hab. in Pennsylvania.

#### Heft III. 1836.

S. 315. Saliday und Fr. Walker Beschreibung von Kerfen, welche Capitán P. King von der Küste St. Paul in Brasilien an bis Balparaiso mitgebracht hat.

Die Gattungen haben ihren Character und eine ausführlichere Beschreibung.

Die Immen von Saliday.

*Gen. Ichneumon xanthorrhoeus, plebejus, patricius. Cryptus praelatus, imperialis, bellicosus. Pimpla sponso. Ophion fugitivus, luteus. Eucania laevigata. Chrysis coerulans.*

*Xylocopa morio. Megachile susurrans, squalens. Coelioxys praetextata. Ancylosceles ursinus. Melipona favosa, ruficrus. Trigona amalthea. Bombus cayennensis, nigripes. Halictus rubellus, metallicus. Andrena cyaneensis. Colletes occidentalis.*

*Polistes cyanea, ignobilis, multipictus, biguttatus, apicalis, actaeon. Odgyneris vespiformis, labiatus, humeralis. Eumenes merula. Sphex latreillii. Pompilus gravesii, bilunatus, ferruginipennis, heros, kingii. Scolia quadrimaculata, argentea. Myrmecodes scoliaeformis.*

*Myrmosa dimidiata. Mutilla derasa. Labidus latreillii. Atta hystrix, quadriglumis. Myrmica —? Ponera tarsata. Formica strenua, castanea, maculata.*

Die Mücken von Fr. Walker.

*Culex molestus. Chironomus antarcticus, lateralis. Gonomyia antarctica, variegata. Tipula gracilipes, pictipennis. Sciophila antarctica. Leia nubilipennis. Platyura insolita. Plecia collaris, maura. Bibio antarctici. Tabanus latus. Pangonia cornuta. Tabanus varipes, albohirtus, tritus. Xylophagus vittatus. Midas notospilus. Anthrax erythrocephala.*

*Asilus vetustus, macrotelus, mucidus. Empis antarctica, fulva. Cyphomyia costalis. Paragus scutellaris. Baeccha inornata.*

*Pipiza costalis, longicornis, sericea.*

*Syrphus 8-maculatus. Helophilus chilensis. Syrphus unicolor, basalis, iridipennis, tarsalis, tibicen.*

*Ornidia obesa. Eristalis lateralis. Chironmya vittata. Medeterus antarcticus. Psilopus equestris. Stomoxys humeralis. Tachina inornata, nervosa, pyrrhopyga, piceiventris, trifasciata, albifrons, chrysocephala, basalis, maura. Sarcophaga lateralis, plinthopyga, chlorogaster, vittata, varia, nigrocyanea, lambens.*

*Musca chilensis, purpurascens, ochricornis, tibialis. Anthomyia chalybea, anthracina, cyanea, immaculata. Lonchoea obscura. Tephritis 5-fasciata, mellea, unicolor. Sciomyia bicolor, fulvipennis. Tetanocera costalis. Gymnopa nitida.*

S. 361. F. Stutchbury, Beschreibung eines neuen Chamaeleons. Taf. 10.

*Ch. cristatus*: Superciliari occipitalique carina elevata et crenulata, caudae anteriori parte dorsique apophysibus elongatis cristam dorsalem constituentibus: squamis fere rotundis subaequalibus.

Färbung aschgrau, mit einem dunkleren Flecken auf dem vordern und oberen Theile des Leibes, welcher nach unten 2 oder 3 Bänder abgibt; Hintertheil des Leibes mit hochgelben und dunkeln Strichen, netzartig gezeichnet; Rand des Rückenhamms und Schwanz dunkel gestreift. Länge 9" 3<sup>mm</sup>, Höhe vom vordern Stachelfortsatz des Rückens bis zum Brustbein 2", Kopf 1" 9<sup>mm</sup>, Rumpf 3, Schwanz 4" 2<sup>mm</sup>; der Rückenhamm läuft darauf 1" 5<sup>mm</sup> weit, Stachelfortsätze 8<sup>mm</sup>, Zahl derselben auf dem Rücken 16, auf dem Schwanz 8. Die Eigenthümlichkeit dieses Chamaeleons besteht darin, daß es einen Rückenhamm hat mit Stachelfortsätzen wie die Basilisken.

Es kam vom Flusse Gaboon an der Westküste des heißen Africas nebst Chamaeleon dilepas und dem folgenden Thier.

*Caecilia squalostoma*: Länge 16", Umfang 8<sup>mm</sup>; walzig, dunkel olivengrün, voll gelblicher fast verfließender Dufsen; Leibestringel 140 — 144, wovon ungefähr 12 gegen den Schwanz den Leib nicht umgeben: Schnauze vorragend mit ei-

ner schwachen Erhöhung, etwa 1<sup>u</sup> unter und hinter den Naslöchern; Augen nicht deutlich.

Im Falle es von *Caecilia tentaculata* verschieden ist, habe ich ihm den obigen Namen gegeben.

§. 369. Westwood, Characteres der *Embia*, verwandt den weißen Ameisen (Termes) Taf. 11.

Diese 3 hier aufgeführten Gattungen sind selten, jede aus einem andern Welttheile; alle haben die vorderen Fußwurzel sonderbar gebaut und weiße Striche auf den Flügeln.

In dem großen Werke über Aegypten hat Savigny 2 schöne Figuren von einem Thiere gegeben, wie Termes, aber leider ohne Beschreibung. Latreille nannte es *Embia* in Cuviers Règne animal. 256, und sagt, es finde sich in Africa und dem südlichen Europa; worauf sich das letztere gründet, weiß ich nicht, und auch nicht, daß es flügellose gebe.

*Embia*: Corpus elongatum; Thorax elongatus; Alae abdomine haud longiores; Femora antica et postica dilatata; Tarsorum anticorum articulus primus dilatatus.

Sect. I. Palpi maxillares 5-articulati; Antennae thorace breviores, articulus subus 20.

Subgenus 1. *Embia*: Antennae 15-articulatae; Alae nervo tertio interno cum quarto nervis transversis connexo, hoc trifido.

1) *E. Savignyi*: fig. 1. a — h. Long. 4½ lin. Exp. alar. 8½ lin.

Descript. de l'Egypte: Neuroptera t. 2. f. 9.

Subgen. 2. *Oligotoma*; Antennae 11 — articulatae, articulo ultimo apice submammillato; Alae nervo tertio interno cum quarto nervis transversis haud connexo, hoc bifido.

2) *O. Saundersii*: Lutescenti fuscescens, incisuris abdominalibus dilutioribus, alis pallide fusciscentibus, vittis 5 angustissimis albis longitudinalibus inter nervos longitudinalibus positis. Long. 3¼ lin. Exp. alar. 5¼. Bengalia fig. 2. a — f.

Sect. II. Subgen. 3. *Olyntha Gray*. Palpi maxillares 4 — articulati; Antennae corporis fere longitudine, articulus 32; Alae nervo quarto interno trifido.

3. *O. brasiliensis*. Piceo-niger, prothorace supra femoribusque 4 anticis ochreis, antennarum articulus 10 ultimis albis, alis piceis, vittis albis inter nervos longitudinales, nervisque transversis tenuiter albo-marginatis. Long. 7½ lin. Exp. alar. 11½. Brasilia. fig. 3. a — g. Gray in Griffiths animal Kingdom. t. 72. f. 2.

397. F. W. Hope, neuer Kurf zwischen Gonyleptes et Phalangium. Tab. 16.

*Dolichoscelis*: Mandibulae chelatae; Palpi unguiculati, spinosi; pedes inaequales, postici longissimi, praecedentibus haud remoti, gehört in die Abtheilung von Phalangium.

*D. haworthii*: flava; capite, cornu utrinque oculi-

gero erecto, pedibus posticis longissimis. L. corp. 3¼ lin. Lat. 2½. Brasilia. fig. 1 — 5.

Die Hinterfüße sind nach der Abbildung über 7<sup>u</sup> lang, die vorderen 1½, die 2 mittleren 3.

Heft IV. 1837.

§. 485. R. Garner: über das Nervensystem der Mollusken. Taf. 24 — 27.

Eine umständliche Abhandlung, welche bis §. 501 läuft, aber ohne die Abbildungen nicht ausgezogen werden kann.

Das Nervensystem ist abgebildet von *Phallusia intestinalis*; *Ostrea edulis*, *Mactra stultorum*, *Modiola vulgaris*, *Pecten maximus*, *Pholas dactylus*, *Mya truncata*.

*Chiton fascicularis*, *marmoratus*, *Patella vulgaris*, *Scyllaea pelagica*, *Eolidia papillosa*, *Paludina vivipara*, *Janthina fragilis*, *Turbo littoreus*, *Bulla aperta*, *Neritina canalis*, *Carocola albi-glabris*, *Bulimus haemastomus*, *Buccinum undatum*, *Oliva*, *Natica glauca*, *Planorbis*, *Purpura patula*, *Columbella mercatoria*, *Mitra*, *Sepia officinalis*.

Ende aller zoologischen Abhandlungen.

Linn. Transactions XVII. 1834 — 1837.

Heft I. 1834. 4. 145. 8 Tafeln.

Auszüge der botanischen Abhandlungen.

§. 11. D. Don, Bemerkungen über *Tropeolum pentaphyllum*.

Wächst am Plata-Strom und blühte zu Edinburgh. Der Verf. macht eine neue Sippe daraus, *Chymocarpus*, und setzt dazu *Tr. quinatum*.

§. 37. Chr. G. Nees v. Esenbeck, Monographie der ostindischen Solaneen.

Ein großer Auffatz mit den Characteren der Sippen und Gattungen in lateinischer Sprache, der bis §. 82 läuft.

*Solanum fistulosum*, incertum, rubrum, spirale, membranaceum, laeve, denticulatum, bigeminatum, neesianum, crassipetalum, decemfidum, macrodon, lysimachioides, verbascifolium, auriculatum, giganteum, vagum, melongena, heteracanthum, vightii, harbisetum, ferox, torsum, indicum, jacquini, procumbens, sarmentosum, trilobatum, pubescens, tuberosum, calycinum.

2) *Lycopersicon esculentum*, humboldtii.

3) *Capsicum grossum*, frutescens, fastigiatum, chamaecerasus.

4) *Physalis somnifera*, peruviana, pubescens, minima, angulata, indica.

5) *Anisodus luridus*.

6) *Datura alba*, fastuosa, trapezia, ferox, stramonium, tatula.

7) *Nicotiana tabacum*.

8) *Hyoscyamus niger*.

### Verbascinae.

- 1) *Verbascum thapsus, indicum.*
- 2) *Celsia coromandelina, viscosa.*
- 3) *Isanthera permollis.*

§. 83. J. F. Royle, über *Lycium Dioscoridis*.  
Diejenige Art, welche in Kleinasien und Griechenland wächst, scheint *Rhamnus infectorius* zu seyn; die indische dagegen *Berberis aristata*, vielleicht auch *B. lycium*.

§. 95. Alph. de Candolle, Musterung der Myrsineen. Taf. 4—8.

Ebenfalls ein großer Aufsat, der bis S. 138 läuft und ausführliche Charaktere der Sippen und der neuen Gattungen enthält.

### Tribus I. Aegicereae.

- 1) *Aegiceras.*

### Tr. II. Ardisiaeae.

2) *Wallenia, Weigelia, Conomorpha, Cybianthus, Myrsine* (43 Species), *Badula, Oncostemum, Ardisia* (91 Species), *Embelia, Choripetalum.*

### Tr. III. Maescae.

- 12) *Maesa.*

Abgebildet sind mit dem Strauß: *Maesa ovata, Badula sieberi, Ardisia odontophylla, icara, nerifolia.*

139. D. Don, über die Verschiedenheiten der Ausblü-  
hung (Aestivatio) in verschiedenen Pflanzen, welche früher zu *Cinchona* gerechnet wurden.

*Cinchona, Cosmibuena, Lasionema, Exostema, Hymenodictyon, Luculia, Pinckneya.*

### Heft II. 1835.

§. 147. Fr. Hamilton (Buchanan): Ein Commen-  
tar über den 4ten Theil von Rheedes *Hortus malabaricus*.  
Gelesen im November und November 1826.

Wir haben alle die vortrefflichen Aufsätze seiner Zeit in der Isis mitgetheilt, und zwar ganz vollständig. Dasselbe ge-  
schieht auch hier. Sie sind daher als eine wirkliche Ueberset-  
zung und als ein eignes Werk zu betrachten, welches in Deutsch-  
land fast gar nicht bekannt und benutzt worden ist, obschon  
man es als die wichtigste und nützlichste Arbeit in der Botanik  
betrachten muß. Die frühern Aufsätze stehen in der Isis  
XV. 1824. Litt. Anz. 297. (I.); XIX. 1826. Litt. Anz. 1. (II.);  
XXI. 1828. 180. (III.).

### 1. Mao s. Mau p. 1. tab. 1 u. 2.

Das Wort „Mange“ ist der malayische Name dieses  
Baumes und wurde eingeführt von Garcias ab Horto, Aco-  
sta u. a. Sie wendeten aber unrichtig den Namen *Mangra*  
oder *Manga* auf die Frucht an, und nannten den Baum *Man-  
giera*, obschon Rumph ihn richtig *Manga* nannte. Auch ist  
sein Vornehme domestica unnißer Weise in *indica* verwandelt  
worden, welcher Name auf alle Gattungen paßt. Der San-  
scrit Name *Amra*, verdorben im gangetischen Indien in *Am*,  
ist die Quelle des Wortes *Ambo* der Brahmanen auf Malabar.  
Folgende Beschreibung Rheedes ist ein Versehen.

*Folia bina, terna, aut quaterna simul ex eodem pe-  
diculo ramulis inhaerent.*

Das hieß in Linne's Sprache: *Folia composita, var*

unrichtig ist. Ein anderer Fehler hinsichtlich der Staubfäden  
verleitete Linne, den Baum in die Classe *Pentandria* zu setzen.  
Rheede sagt: *Flores — quinque intus albicantibus fi-  
bris, flavescentibus apicibus dotatis — praediti.*

Aber unter Hundert Blumen hat nur ein Staubfaden ein-  
nen Beutel, und ich habe nie eine gesehen, worinn alle 5 Staub-  
fäden Beutel gehabt hätten.

### 2. Ada Maram p. 5 tab. 3 u. 4.

*Maram* bedeutet Baum; daher ist der malabarische Na-  
me *Ada* oder *Saros*. Nach Rheede wächst er in den Wä-  
ldern von Malabar; nach meinen Beobachtungen aber wurde er  
überall angepflanzt und mit Sorgfalt in der Nachbarschaft der  
Dörfer oder in Gärten gezogen; wahrscheinlich eingeführt aus  
dem großen oceanischen Archipelag, wo er wild vorzukommen  
scheint: denn ich halte ihn für Rumph's *Catappa sylvestris*  
(sich meinen Commentar über *Herb. amb.* I. 175. Isis 1824).

*Ada* übrigens und *Saros* sind wohl malabarische Wor-  
te, woraus man folgern könnte, daß der Baum dort einheimisch  
se; aber der Name *Jibe* welchen ihm die Brahmanen in Ma-  
labar geben, gehört auch dieser Gegend an; auch scheint es kei-  
nen sanscritischen Namen dafür zu geben, woraus man schlie-  
ßen muß, daß es ein ausländischer, später eingeführter Baum  
ist. Auf jeden Fall verhält es sich so im Norden von Indien,  
weil der Baum *Budam* oder *Mandelbaum* heißt, weil seine  
Kerne wie Mandeln aussehen: darum haben ihn Nieuhoff, Ray  
und Plukenet *Amygdalus indica* genannt (*Alm.* 28). Später  
hat der letztere wegen der eingebildeten Ähnlichkeit seiner Frucht  
mit der von seiner *Prunifera fago similis arbor Gummi  
Elemi fundens, figura et magnitudine Olivae ex insula  
barbadensi* (*Alm.* 306; *Phyt.* t. 217. fig. 4.) der *Ada Ma-  
ram* für nahe verwandt mit seiner Pflanze (*Mantissa* 156)  
angesehen, welche sicherlich nicht der *Ada Maram* ist, und auch  
nicht *Amyris elemifera* der Neuren. Bringt er *Gummi  
elemi* hervor, so wird er auch zu derselben natürlichen Ordnung  
gehören: denn keine Pflanze von den Combretaceen bringt rie-  
chende Harze hervor.

Wahrscheinlich meynt der ältere Burmann diesen Baum  
unter seiner *Arbor indica, amara, nucleis amygdali facie,  
Katappas Lusitanis, Samandara Zeylonensibus*, wie ich zei-  
gen werde, wann ich von Hagam (*Hort. mal.* VI. 37.)  
handle.

Rumph beschreibt 2 verwandte Gattungen (*Herb. amb.*  
I. 175), die *Catappa domest. et sylvestris*, und in seinem  
Appendix (176) bemerkt er ihre große Verwandtschaft mit *Ada  
Maram*; ich denke mit seiner *Catappa sylvestris*. Linne füh-  
rte sie in seiner *Mantissa* unter dem uneigentlichen Namen  
*Terminalia catappa* auf (sich meinen Comment. über *Herb.*  
*amb.* I. 175); eben so die späteren; aber der spezifische Cha-  
racter ist nicht richtig. Der Rand der Blätter von *Ada Ma-  
ram* und von *Catappa domest.* ist ganz; bey jenem sind sie  
aber *pubescentia*, bey diesem *glabra*.

### 3. Panem Palka s. Panam Palca p. 9. Taf. 5.

Nach Commelyn kannte Joh. Bauhin diesen Baum, sein  
Bruder aber soll seine Frucht für die einer Palme angesehen  
haben. Plukenet nennt ihn *Nux myristica, spuria* (*Alm.*

265); der ältere Burmann, nach Hermann *Nux myristica*, *oblonga*, *malabarica* (Thes. zeyl. 172). Linne setzte ihn unter dem Namen *Myristica fructu inodoro* (Flor. zeyl. 583) unter seine *Anhilatae*, hat aber Rheedes Abbildung der weiblichen Blüthe nicht recht gefasst; die männlichen hat dieser nicht beschrieben.

Thunberg nannte ihn *Myristica tomentosa* (1782); Lamarck *Myrist. malab.* (Enc. Méth. IV. 388) und unterschied ihn von *Nux myrist.* mas des Rumph, womit ihn Burmann vermischt hatte (Herb. amb. II. 25), obgleich Rumph selbst Unterschiede genug angegeben hatte, und Burmann führte überdies Rumphs Pflanze unter Hermanns Namen *Nux zeyl.*, *Moschatae rotundae similis*, *oblonga* (Thes. zeyl. 172), welche wahrscheinlich *M. philippensis* des Lamarck ist.

Ob Gärtner Lamarcks Pflanze in den *Mém. de l'Acad. dem.* 1788. gesehen hat, weiß ich nicht; er beschrieb aber in demselben Jahr, auch Thunbergs Angabe übersehend, die Frucht von *Panem Palca* unter dem Namen *M. dactyloides* (De Seminibus I. 195 T. 41. f. 2.)

Willdenow stellte Thunbergs Namen *M. tomentosa* her (Spec. plant. IV. 388), fiel aber in Burmanns Fehler, indem er Rumphs *Nux myrist.* mas für dieselbe hielt. Welche von beyden er meinte, weiß ich nicht. That Thunberg dasselbe, so muß man seinen Namen fahren lassen.

#### 4. *Samstravadi* s. *Samstravari* seu *Caipa Tsjambu* pag. 11 tab. 6.

Der zweyte Name auf der Tafel ist ein Irrthum; der dritte zeigt an, daß der Baum eine *Eugenia* ist, wofür ihn auch Commelin nimmt: aber die Brahmannen nennen ihn *Sada Pali*, was nach Rheede bedeutet *Frugifera arbor*. Der gemeine malabarische Sippennamen ist nicht *Vadi*, wie Burmann meynt (Flora ind. 115). *Samstravadi* ist ein Wort, weil die folgende Pflanze den Gattungsnamen *Tsjeria* vor sich hat. Jussieu hatte daher unrecht, die Sippe *Stravadium* zu nennen, nur das halbe Wort.

Plukenet (Mantissa 137) vermuthet, *Samstravadi* sey seine *Nuciperunifera arbor*, *foliis densioribus*, *subtus argenteis floribus in praelongam spicam dispositis*, *fructu tetragono*.

Obgleich beyde verwandt, so zeigt sich doch schon in Rheedes Worten der Unterschied: *Folia superne colore atro-viridi splendentia*, *inferne viridi dilutiore*.

Linne (Flor. zeyl. 191) folgte der Anordnung der Sibbu und nannte Rheedes Pflanze *Eugenia foliis crenatis*, *ovatis ovatis*, *racemo longissimo*, welche in Spec. plant. ed. I., und in Burmanns Flora ind. 115 zur *E. racemosa* wurde; dazu kam aber Rumphs *Butonica sylvestris alba* (Herb. amb. III. 181 t. 116), wie sie Burmann nennt, Rumph aber *B. terrestris alba*, welche ganz verschieden ist vom *Samstravadi*. Willdenow ließ die Synonyme, wie er sie fand (II. 966). Lamarck nannte sie auch *E. racemosa* (Enc. méth. III. 197), bemerkt aber ihre Verwandtschaft zu *Barringtonia* oder *Butonica*; obgleich er aber richtig *B. terrestris alba* meinte, so fiel er doch in den andern Fehler, indem er sie *B. syl-*  
33ie 1838. Heft 6.

*vestris (terrestris) rubra Rumph.* (Herb. amb. III. 181 t. 115) nannte, weil die europäischen Botaniker meinten, Rheedes zwey *Samstravadi* müßten Rumphs zwey *Butonicae* seyn, während er doch *Samstravadi* gar nicht beschrieben und seine Pflanze *B. sylv.* genannt hat, eben so wenig Rheede die *B. terrestris rubra* anführt. Lamarck sah Exemplare von seiner Pflanze, und nach der Beschreibung des Kelches war es offenbar Rheedes *Samstravadi*. Ob aber Willdenow in seinen Exemplaren *Samstravadi* oder *terr. alba* hatte, läßt sich nicht beurtheilen.

Jussieu hat zuerst einige Aufklärung in *Samstravadi* gebracht, indem er es von *Eugenia* getrennt und zu *Butonica Rumph et Lamarck* gebracht hat, Forsters und des jüngern Linnes *Barringtonia*, Sonnerats *Commersonia*, welche Linne in die Sippe *Mammea* unter die Guttiferen gestellt hat. Jussieu hätte besser gethan, Rumphs Sippe bestehen zu lassen und nicht bloß seine drey *Butonicae*, sondern auch Rheedes zwey *Samstravadi* hineinzu thun; allein er glaubte, *Tsjeria Samstravadi* und die *But. terrestris* bildeten eine von *Butonica* verschiedene Sippe und nannte sie *Stravadium* (Genera plant. 361).

Korburgh (Hort. Bengal. 58) bringt in dieselbe Sippe Rumphs *Butonicae* und Rheedes *Samstravadi*, und nennt die gegenwärtige Pflanze *Barringtonia racemosa*, führt aber Rheedes nicht an, vielleicht abgesehen durch dessen Worte: *Arbor est vastae magnitudinis caudice crasso*, da doch die Pflanze, welche Korburgh und ich kennen, nur ein kleiner Baum ist; aber deshalb kann ich ihn nicht für eine verschiedene Gattung halten.

Bei meiner Rückkehr aus Ava schickte ich nach England Exemplare und Zeichnungen vom *Samstravadi*, auch Exemplare aus dem eigentlichen Indien.

Aus Rücksicht auf Jussieu stellte ich sie in dessen zweyte Abtheilung der Myrten: allein sie möchte wohl besser stehen in der zweyten Abtheilung der *Guajacaceae*, wie folgende Beschreibung zeigt. In Ava heißt sie *Klin gri*; das erste Wort bezeichnet die Sippe, das zweyte groß.

*a. Arbuscula pulchra. Folia sparsa, apices versus ramulorum congesta, basi obtusa ovata, acuta, ultra pedem longa, costata, venis reticulata, nuda, serrata, petiolata.*

*Racemi longissimi, penduli. Flores ex albidio rubicundi, magni, speciosi, calycibus coloratis, striatis.*

*Calyx foliolis concavis obtusis 2 - seu 3 natis, persistens, intus disco integro mellifero ad basin vestitus. Petala 4 seu 5 patentia, obtusa, concava, obliqua Filamenta plurima filiformia, petalis longiora, basi coacta in anulum discum calycis cingens.*

*Antherae parvae. Germen inferum turbinatum. Stylus longitudine staminum filiformis. Stigma simplex. Bacca molliuscula, tetragono-ovata, calyce coronata, obsolete quadrisulca, unilocularis. Semen unicum, oblongum, magnum. Perispermum forma seminis magnum. Embryo centralis, ovalis, dum non germinaverit absque partium distinctione indivisus.*

5) *Tsjeria s. Sjeria Samstravadi* [p. 15. T. 7.

heißt bey den Brahmanen Gove-sada-pali, die zwey letzteren Wörter sipplich; sollte mithin Gove Sada pali geschrieben werden.

Ungeachtet der größten Verwandtschaft dieser Gattung mit der vorigen konnte doch Commelyn kaum eine Aehnlichkeit mit *Eugenia* finden, worin er Recht hatte, Ray aber stellte sie dazu. Plukenet, vorsichtiger, nannte sie *Nucipomifera arbor orientalis castaneae equinae foliis, fructu longo corticoso crasso, tetragono, summo apice (Pomi in modum) umbilicato, nucleum nudum angulosum includente* (Alm. 266), woben er ganz überseh, daß hier die Blätter einfach sind und die der Roskastanie zusammengesetzt.

Obgleich weder Rumph noch sein Herausgeber Burmann keine Gattung von *But. terrestris* für einetley hielten mit *Tsjeria Samstravadi*, und obgleich Linne in der Flora zeyl. 190 die letztere allein anführte mit den Synonymen von Ray und Plukenet für seine *Eugenia foliis coronatis, pedunculis terminantibus, pomis oblongis acutangulis*; so führte er doch in *Spec. plantar.* (copiert durch den jüngern Burmann Flor. ind. 114) als Synonym mit *Tsjeria Samstravadi* die *B. terr. rubra* ein und setzte zu *Eugenia* den Gattungsnamen *acutangula*. So Willdenow (II. 996); Lamarck aber bemerkte, wie ich glaube, daß die Frucht von *B. terr. rubra*, wie sie Rumph abbildet (Herb. amb. III. 115), keine große Aehnlichkeit mit der von *Tsjeria Samstravadi* habe, welche an den Enden zu sehr verdünnt ist, verwarf daher dieses Citat und betrachtete die *B. terr. alba* (Herb. amb. III. Taf. 116) als *Tsjeria Samstravadi*, indem die Früchte beyder Pflanzen bey Rheede und Rumph sehr ähnlich abgebildet sind. Indessen muß ich bemerken, daß Rheedes *Tsjeria Samstravadi* die *Fl. purpureos* hat und er sie in Trauben abbildet, während Rumph von seiner *B. terr. alba* sagt: *Petiolis (pedunculis communibus) insident capitula viridia sese in bina ternave crassa petala (calicis lacinias) aperientia, in quorum centro quatuor alia alba et extensa conspiciuntur petala, restans floris pars in medio repleta est albis staminibus ad basin rubescens, antheras fuscas gerentibus*.

Dann stellt er die Blumen und Früchte nicht bloß in Aehren vor, sondern sagt auch: *Pomula sessilia, quum priora (id est fructus Butonicae terrestris rubrae) ex pedunculo (pedicello) dependant*.

Demnach ist sicherlich *Tsjeria Samstr.* von *B. terr. alba* verschieden. Es scheint auch wirklich, daß Rheede weder eine *B. terr.* noch Rumph eine *Samstravadi* beschrieben habe, wie es sich aus dem vorigen ergibt, und aus der Gestalt der Blätter.

Diese Unbestimmtheit der Meinungen unter den Botanikern hat ohne Zweifel Vorurtheil abgehalten, Rumph und Rheede zu seiner *Barringtonia acutangula* zu citiren, obgleich ich sie für *Tsjeria Samstravadi* halte und ich Exemplare mit Rorburghs Namen nach England geschickt habe aus Ava, wo sie Kiin ngach (klein) heißt; seitdem habe ich Exemplare unter Jussieus Namen, *Stravadium acutangulum*, an die Bibliothek des indischen Hauses zu London geschickt. Im gangetischen

Indien, wo es einer der gemeinsten Bäume ist, heißt er Hjal oder Hijal.

*Arbor magnitudine mediocris. Rami petiolorum cicatricibus exasperati. Folia sparsa, ramulorum apices versus approximata, obovata, apice nunc obtusa tunc acuta, basi cuneata, nitida, nuda, costata, venis reticulata, utrinque viridia. Petiolus brevissimus, supra planus, glaber, non stipulaceus.*

*Racemus terminalis, simplicissimus, pendulus, foliis longior, nudus, glaber.*

*Flores sparsi, parvi, filamentis coccineis rubentes.*

*Calyx superus, lacinii erectis obtusis aequalibus 4 — seu 5partitis. Petala saepius quatuor revoluta, oblonga, basi cohaerentia, ad staminum columnam adnata. Filamenta plurima, longissima, filiformia, basi coalita. Antherae parvae, subrotundae. Germen inferum, tetragonum. Stylus longitudine et figura staminum simplex. Stigma indivisum.*

*Bacca sicca, oblonga, tetragona, calyce coronata. Semen unicum, maximum, oblongum, circinatum.*

Ich habe den Bau des Samens nicht angeführt, weil ich Gärtners Werk noch nicht gesehen hatte, als ich die Beschreibung in Ava machte.

6. *Malla Katou Tsjambou, seu Catu Tsjambu*, p. 17. tab. 8.

Commelyn betrachtet sie als eine *Eugenia*, nahe verwandt der *E. jambos malaccensis*, während die Brahmanen zu iren scheinen, indem sie die Pflanze *Mal Ambetti* (montana *Mangifera foemina*) nennen. Zwar stellt die Figur die Pflanze weniger ähnlich einer *E.* vor als sie sollte, weil die Blätter aussehen, als wenn sie wechselten, was jedoch die Beschreibung widerlegt: *Folia geminata brevibus petiolis decussato ramulis inhaerent*.

In Bezug auf die Blätter könnte es mithin eine *Eugenia* seyn, aber die Blume ist in 5 oder 6 Theile gespalten, welche letztere Zahl die richtige zu seyn scheint, weil der Griffel 3theilig ist; überdies scheinen einige Individuen bloß weiblich zu seyn; wenigstens erwähnt Rheede der Staubfäden nicht. Welche Umstände vertragen sich mithin nicht mit *E. Plukenet* war so unglücklich wie Commelyn, indem er seine Pflanze verglich mit seiner *Arbor indica Pyri densioribus et subrotundis foliis, fructu Nucis Moschatae magnitudine summo vertice coronato*, welche wahrscheinlich eine *Gardenia* ist und ganz verschieden von *Malla Katou Tsiambou*.

Der ältere Burmann hält sie (Herb. amb. I. 128) für *Jambosa sylv. alba*, welche er wieder als eine Abart oder vielmehr als die weibliche Pflanze betrachtet von *Malacca Schambu*, d. h. *Eug. jambos*. Wahrscheinlich sind beyde Meinungen unrichtig: denn *Eug. jamb.* hat keine männlichen, bloß weibliche Blüten, noch ist *Jambosa sylv. alba* dieselbe mit *Malacca Schambu*, wie ich schon gezeigt habe in *Linn. Transact.* (XIII. 18. p. 482. Isis 1824 p. 297). Es könnte indessen *Malla Katou Tsiambou*, wie Burmann anderswo



meint (Thes. zeyl. 125), seine Jamb. sylv. et mont. fructu Cerasi magnitudine seyn, welche Maharatambola der Ceilonesen ist; es kann aber nicht Rumphs Jamb. sylv. parvifolia seyn (Herb. amb. I. 129, II. t. 40.), womit sie Burmann verbindet, weil dieses eine ächte *Eugenia* ist mit Zwitterblüthen. Die *Malla Katou Tsianbou* oder die *Maharatambola* kann ich nicht zu derselben Sippe stellen, weil sie zweyhäufige Blumen hat, Endrispen und einen 3spaltigen Griffel, ohngeachtet der Auctorität von Linne (Flora zeyl. 501). Sie scheint wirklich mehr Ähnlichkeit mit *Gorfers Scopolia* zu haben, wie sie in der Enc. méth. beschrieben ist (VII. 14. Illustr. generum t. 860.).

7. *Katou Tsjeroc* s. *Cattu Tsjeru* s. *Cattu Cheru*, p. 13 tab. 9.

Katou und Rana, die specifischen Namen bey dem Volk und bey den Gelehrten in Malabar, bedeuten etwas Wildes oder Uncultiviertes, weil eine Gattung, die um die Kornfelder gepflanzt und p. 20 beschrieben ist, als der Prototyp der Sippe *Tsjeroc* oder *Cheru*, wie sie bey dem gemeinen Volk heißt und *Bibo* bey den Gelehrten, angesehen wird. Es scheint, daß wegen großer Verwandtschaft zwischen diesem Baum und dem *Anacardium occidentale* die Eingebornen von Indien nach Clusius (Enc. méth. suppl. I. 753) dem letztern den Namen *Bybo* gaben, offenbar einetley mit *Bibo* der Brahmanen.

Commonyn wagte es nicht, diesen Baum mit irgend einer ihm bekannten Pflanze zu vergleichen, und Plukenet citierte ihn nur zaudernd für seine *Prunifera arbor* seu *nuciprunifera folio dodrantali longitudine, laevi mollitie praedito* (Alm. 306; Phyt. t. 218 f. 1), eine westindische Pflanze, welche ich bey neueren Schriftstellern nicht finden kann, wenn es nicht *Achras sapota* ist, welche nach dem *Hortus kewensis* (II. 312) *Bully-tree* heißt; wenn es dieselbe ist, welche nach Plukenet auf Barbados *Bully-bay* heißt. Ist dieses der Fall, so kann die westindische Pflanze keine Verwandtschaft mit *Tsjeroc* haben.

Lamarck hielt *Tsjeroc* für eine *Mangifera* und nannte sie *M. racemosa* (Enc. méth. suppl. III. 584), woran Poiret zweifelt. Dieses ist meines Wissens die einzige Kunde, welche die neueren Botaniker von diesem Baum genommen haben, bis ich 1797. Ehatigang besuchte und 1800. Mysore. Bey meiner Rückkehr von dem erstern Land gab ich dem Doctor Korburch junge Pflanzen, und von dem letztern zeigte ich ihm Exemplare, welche nachher an J. C. Smith kamen unter dem Namen *Holigarna vernix*; Korburch aber nannte sie *H. longifolia* (Hort. beng. 22). Meine Pflanze scheint *Rheedes Tsjeroc* oder *Bibo* zu seyn ohne vorgehängten Gattungsnamen, und sie unterscheidet sich von *Kattu Tsjeru* oder *Rana Bibo*, wovon er eine Figur gab, durch kürzere Trauben, nicht am Ende der Zweige, sondern an den Seiten, und auch durch einen sonderbaren kleinen, zahnartigen Fortsatz an jeder Seite des *Petiolus*. Korburch beschreibt eine andere Gattung aus Sisset, wovon ich Exemplare dem indischen Haus gab. Diese Sippe, ausgezeichnet durch ihren ädigen Saft, der als Jerniß gebraucht wird, kann ich zu keiner Familie von Jusseu bringen. Sie steht dem *Rhus* näher als irgend einer innerlichen Sippe, hat aber *Germen inferum*; und scheint deshalb, so

wie durch ihren caustischen Saft, nahe verwandt dem *Raf* von Japan (Kämpfer, Amoen. 793) und der *Arbor vernicis Rumph.* (Herb. amb. II. 259 t. 86.), welche Lamarck (Enc. méth. I. 350) *Terminalia vernix* nennt. Ich würde auch nicht zweifeln, daß sie zu derselben Sippe gehört, wenn Rumph nicht sagte: *Flores plurimis staminibus rubris referti*, wodurch sich, wenn richtig, ein wesentlicher Unterschied zwischen seiner Pflanze und den beyden anderen, *Bibo* et *Terminalia* ergäbe. Die zwey letzteren haben wirklich keine Verwandtschaft, weil die Zahl der Griffel und die Lage des Fruchtknotens den *Bibo* ganz deutlich von *Mangifera* unterscheidet. Hier die Beschreibung von der Pflanze aus Mysore.

*Holigarna longifolia*. Hort. bengal. 22.

*Tsjeroc* seu *Bibo*. Hort. malab. IV. 20.

*Cheru* *Taulavac*.

*Biba* *Concanae*. Buchanans Mysore III. 186.

*Holigarna carnatae*.

Habitat in Indiae sylvis montosis, humidis.

*Arbor verniciflua, succo caustico, venenato, recente albo seu hyalino, exsicato nigricante scatens. Rami cicatricibus obovatis exasperati. Folia alterna, apices versus ramulorum conferta, oblonga, cuneata, acuminata, margine revoluta integerrima, costata, venis reticulata, glabra, junioribus tamen subtus pubescentibus. Petiolus semiteris, brevissimus, denticulo subulato patente utrinque apicem versus instructus, non stipulaceus.*

*Racemi infrafoliacei, sparsi, simplicissimi, adscendentes, folio breviores, undique pilis ferrugineis tecti. Flores dioeci, pedicellati, parvi, sparsi, vel aliquando fasciculati, albi. Squamae in racemo et pedicellis vagae.*

*Masculini floris calyx minimus, quinquelobus. Petala quinque, ungue lato fere coalita, intus barbata, calyci inserta. Filamenta quinque petalis alterna et longiora patentia. Antherae cordatae.*

*Foeminei floris calyx brevissimus, cyathiformis, fundo setosus, ore obsolete quinquangularis. Petala quinque, linearia, intus villosa, ungue lato subcoalita, calyci inserta. Filamenta quinque, subulata, brevissima, perigyna, petalis alterna. Antherae simplices, nescio an fertiles? Germen magnum, inferum, compressum. Styli tres, erecti. Stigmata crassa.*

*Drupa compressa, monosperma.*

8. *Tani* p. 23 t. 10.

Im Dialect Hindwi kann ich den Namen *Gottinga* nicht finden, welchen die Brahmanen von Malabar diesem Baume geben sollen. Nach Rheede rechnet das Volk von Malabar diese Pflanze zum Prototyp der Sippe *Tani*, was jedoch sehr unnatürlich ist, da sie keine Verwandtschaft zu der folgenden hat, welche auch *Tani* heißt, mit einem Gattungsnamen davor. So wie ich die Malabaren verstand, nennt man die Frucht *Tani*, denn der Baum heißt *Tani Cai Maram* (*Tani fructu arbor*), Buchanans Mysore II. 342.

Caspas Wäuhins Pflanze (*Fructus in insula St. Mariae, pyra majora referens latus muculentum*), womit Commelyn denselben vergleicht, kann damit kaum einerley seyn wegen der Größe der Frucht und ihres Schleims, und ist eher ein *Mabolo* oder *Diospyros* als ein *Myrobalanus*, obgleich Plukenet sie für eine *Syalita* (*Dillenia*) hält, wiewohl letztere er übrigens mit der Brodfrucht (*Artocarpus*) vermenget (*Mantissa* 124).

In seinem Index erwähnt er *Tani*, aber ohne Seitenzahl; ich kann es nicht finden.

Commelyn nannte nachher den *Tani* einen *Prunus*, verführt durch Ray und Büttmann (*Thes. zeyl.* 197): der letztere hatte es noch schlimmer gemacht; denn er verwechselte ihn mit *Dematha* der Ceylonesen, welches *Gmelina asiatica* ist, wie Linne (*Flor. zeyl.* 230) richtig bemerkt, indem er Büttmanns Synonyme verwirft. Gärtner hielt *Tani* für seine *Myrobalanus bellirica* (II. 90 t. 97. *ubi errore Bellirina dicitur*), und gewiß sind die Früchte beider Pflanzen sich sehr ähnlich; aber die Form des Samens und das Fach sind verschieden, in der bey Nöbbe rund, in der bey Gärtner eckig.

Ob bey letztere mit Recht seine Pflanze für die *Myrobalanus bellirica* von Blackwell und Weynhus hält, kann ich nicht sagen, weil ich die'se Schriftsteller nicht vergleichen kann: er erklärt aber Blackwells *Figue* für schlecht, oder mit andern Worten, daß sie seiner Pflanze nicht ganz gleiche. Poiret (*Enc. méth.* VII. 576) weiß nicht, ob Gärtner *Tani* richtig für seine *Myrobalanus bellirica* citiert, und im Supplement (III. 707) spricht er seinen Zweifel noch stärker aus.

Norburgh führt *Tani* nicht für *Terminalia bellirica* an (*Hort. beng.* 33), welchen Namen Willdenow nicht hat; jedoch vermute ich, daß Norburghs Pflanze Willdenows *Terminalia cheb.* sey, weil er ihr *Folia obovato oblonga* gibt, während Norburghs *Chebula* (einerley mit der von Rebus) *Folia ovata* hat. *Tani* hat *Folia obovata*, und mag deshalb Willdenows *cheb.* seyn. In diesem Fall kann *Tani* weder *M. cheb.*, noch *M. bell.* von Gärtner seyn; die erstere nicht wegen des Unterschiedes in der Gestalt der Früchte, die letztere nicht nach den angegebenen Gründen. Außerdem haben die Blumen von *T. bellirica* Retzii, welche im Hindwi-Dialect Bahara heißt, einen abentheuerlichen, Menschenkoth ähnlichen Geruch, während Nöbbe sagt: *Flores suavolentes*.

In den Wäldern von Südbindien (Buchanans *Mysore I.* 183) fand ich einen Baum mit Namen *Tani* im Dialect von Carnata, und *Tani Cai Marain* in dem von Malabar, so daß ich wenig Zweifel habe, daß es Nöbbes *Tani* sey, obgleich ich den Geruch der Blumen nicht aufgeschrieven habe, wodurch er sich vorzüglich von *Term. bell.* unterscheidet. Exemplare davon bekam J. E. Smith unter dem Namen *Terminalia seu Myrobalanus Tani*. Hier die Beschreibung.

*Arbor magna, ligno firmo, albidio, non resinoso, durabili. Ramuli sulco e petiolo utrinque decurrente angulati, surculis novis pubescentibus nudis. Folia decidua, subopposita, apices versus ramulorum conferta, obovata, aliquando acuta, saepius cum acumine obsoleto obtusa, margine cartilagineo integerrima, costata, venosissima, coriacea, eglandulosa; juniora pubescentia, adulta utrinque glabra. Petiolus compressiusculus, marginatus, glaber,*

*supra medium glandula, aetate saepe evanida, utrinque instructus, brevis, non stipulaceus. Spicae infra foliaceae vel axillares; petiolo longiores, pubescentes, laxae, nudae, solitariae. Flores sparsi: superiores masculini; inferiores in eadem spica hermaphroditi.*

*Drupa subcarnosa, angulis quinque obsoletis obovato. Nux semine esculento monosperma.*

Unter den Exemplaren, welche ich dem indischen Hause gegeben habe, sind mehrere Varietäten von *Term. bell.*, welche ich kaum von *Tani* anders unterscheiden kann als durch den Geruch der Blumen: denn es gibt große Unterschiede in der Gestalt der Blätter und ihrem Glaume, in der Gestalt der Nuß und des Samens, in der An- und Abwesenheit der Drüsen bey denjenigen Blumen, welche jederman zu *Bahara* rechnete, unter welchem Namen die Pflanze mit sinkenden Blumen im Hindwi-Dialect bekannt ist.

An einigen Orten unterschied man die *Bahara* in zwey Arten, in die große und kleine, nach dem Unterschiede in der Größe der Frucht. Die Blumen mit der kleinen Frucht sinken nicht so sehr wie die mit der größern *Drupa*, und nähern sich mithin dem *Tani*; aber von diesem ist die Frucht so groß, wie die der großen *Bahara* oder Gärtners *Badamia*, während die Frucht der kleinen *Bahara* derjenigen gleicht, welche aus Gärtners Taf. 97. durch einen Fehler des Kupferstechers *Bellirina* heißt. Ueberhaupt bedürfen diese Pflanzen noch fernerer Untersuchung. Ich werde indessen die Frucht der großen und kleinen *Bahara* beschreiben; die erste aus Domboko, die letzte aus Duriapur, beyde etwas verschieden von Gärtners *Figur*; ich glaube aber, daß diese Früchte sich bey demselben Baume sehr ändern.

#### *Bahara major.*

*Drupa Juglandis integrae magnitudine obovata, sessilis, umbilicata, junior pubescens, carnosa, obsolete pentagona, subaequilatera. Caro crassa, succo flavo satens. Nux crassa, dura, circinata, cavitate quoque circinata. Semen forma cavitatis. Integumentum crassum, membranaecum. Perispermum nullum. Cotyledones crassae, conduplicatae; una alteram amplectente; ut in gemma obovata, et minime circumactae ut in Terminalium pluribus.*

#### *Bahara minor.*

*Drupa magnitudine nucis Moschatae obovata, obsolete pentagona, subaequalis, carnosa, umbilicata. Caro crassa, succo aequo satens. Nux crassa, dura, circinata, cavitate obsolete trigona, sed minime lobata ut in Gaertneri figura. Semen forma cavitatis. Perispermum nullum. Cotyledones crassae, conduplicatae; in uno fructu una alteram fovente; in altero, ut in Gaertneri fere figura, se invicem intersepiuntibus.*

#### 9. *Tsjem Tani*, p. 25. tab. 11.

Das Volk in Malabar stellt diesen Baum in dieselbe Sippe wie die vorige *Terminalia*, und die Brahmanen ihren nicht weniger, indem sie denselben *Morij* nennen, d. h. Pfeffer;

aus keinem andern Grunde, als weil er etwas aromatisch ist. Commelyn classificiert ihn nicht, was auch Ray hätte thun sollen, statt ihn *Myxa pyriformis*, *ossiculo trispermo* zu nennen, durch welchen Irrthum er den Plukenet verleitet, denselben mit *Prunus Sebestena similis americana* von Hermann zu vergleichen (Alm. 306), was wahrlich keine Verbesserung ist.

Linne betrachtete ihn mit Recht als eine eigene Sippe und nannte ihn *Rumphia amboinensis*. So Burmann (Flora ind. 16) und Willdenow (I. 187). Zussien stellt ihn zu dem zu den Zerebinthaceen, und zweifelt, ob er nicht eher zu den Sapinden gehöre. Poiret nimmt die erstere Meinung an (Enc. suppl. VI. 352). Da sich der Baum nicht auf Amboina findet, so hat ihn Lamarck *Rumphia tiliaefolia* genannt (Tabl. 96. Illustr. gen. t. 25.); so Poiret.

10. *Mal Naregam s. Nara Maram, s. Catu Tsjeru Naregam*, p. 27 t. 12.

Naregam, ein sippisches Wort für ziemlich viel Pflanzen, scheint einetley mit Narenggi, welches man in den angestrichenen Dialecten für Pflanzen aus der Sippe *Citrus* braucht, obgleich Limbo, offenbar einetley mit Nimba der Brahmanen auf Malabar, gewöhnlicher ist; übrigens gibt man diese Namen auch andern Pflanzen, welche wenig Verwandtschaft mit *Citrus* haben, wie es hier der Fall ist. Der Gattungsname *Mal* bedeutet Berg, und *Rana* der Brahmanen bedeutet wild; daher übersetzen es die Holländer richtig mit wilden Citronen. Ueber *Nara* und *Nani* weiß ich nichts zu sagen, außer daß sie eine sippische Bedeutung zu haben scheinen: der Gattungsname oben auf der Platte besteht aus 2 Wörtern, *Catu* (*sylvestris*) und *Tsjeru*, also verwandt mit *Tsjeru* auf Platte 9. Diese Namen auf der Platte scheinen aber durch Versehen angewendet worden zu seyn, weil sie nicht im Texte stehen, und wurden dagegen der Pflanze auf der Platte 14 gegeben, was zu allerley Mißgriffen geführt hat.

Von den obigen Vergleichen ist keine glücklich: indessen waren Hermann und Commelyn damit zufrieden, und nannten die Pflanze *Malus Limonia pumila sylvestris zeylanica*. Plukenet verglich sie mit *Coru* und hielt sie für *Coru Indorum Mali aureae foliis, floribus albis; Parenco ruttee Malabarorum* (Mantissa 57), und bemerkte richtig, daß sie mehr Verwandtschaft mit *Prunus* habe als mit *Malus*, wozu man damals *Citrus* stellte.

Der ältere Burmann setzt diese Pflanze zu seiner *Limonia Malus sylvestris zeyl. fructu pumilo*: da er aber auch *Limouellus Rumph.* (Herb. amb. II. 107 t. 29.) und *Malus aurantia, fructu Limonis pusillo acidissimo Sloane* dabei anführt; so meynt er ohne Zweifel diejenige Gattung von *Citrus*, welche die Engländer *Lime* nennen und die keine Ähnlichkeit hat mit *Mal Naregam*. Diese letztere gleicht übrigens sehr Hermanns *Limones pumili zeylanici sylvestris, Delighaha zeylonensis* (Thes. zeyl. 143 t. 65. f. 1.), welche Linne unter seinen *Plantae barbarae annihillatae* ließ (Flora zeyl. 606). Der jüngere Burmann führt die *Catu Tsjeru Naregam* und seines Waters *Limonia Malus s. z. fr. p.* für seine *Limonia acidissima* an; aber dazu citirt er, da die von ihm gemeinte Pflanze gesädete Blätter hat, Rheedes 1838, Heft 6.

des Taf. 14., welche *Tsjeru Catu Naregam* vorstellt und nicht die geringste Ähnlichkeit mit des ältern Burmanns Pflanze hat. Zu diesem Fehler scheint ihn Linne verleitet zu haben, welcher für seinen *Schinus foliis pinnatis, rachi membranaceo articulato, spicis axillaribus solitariis* (Fl. zeyl. 175), nachher *Limonia acidissima* genannt, Rheedes *Tsjeru Katou Naregam* (IV. t. 12.) anführt, statt *Tsjeru Catu Naregam* t. 14., und diese zu *Limonia Malus sylvestris zeylanica, fructu pumilo* des ältern Burmanns stellt, welche Walhedi oder Jakuwa der Ceplonen ist, während Linnés Pflanze die Diwul oder Giwul dieses Volkes ist (Thes. zeyl. 89), welchen Namen Linne unbegreiflicher Weise vom Schwedischen *Diawul* (Teufel) ableitet, vielleicht weil Burmann sagt: *Diwul notat adstrictionem gutturis quae saepe causatur a fructibus immaturis. Hujus autem arboris fructus adstringunt, unde in dysenteria valde commendatur.*

Wegen dieser Eigenschaft wurde die Sippe *Coru* gegründet, von welcher Diwul wahrscheinlich der Prototyp ist und wohl einerley mit *Bolanga* (Thes. zeyl. 31) oder *Balanghas* (Thes. zeyl. 84), das ist *Feronia elephantum*, welche wirklich der *Limonia acidissima* sehr nahe verwandt ist: beyde aber sehr verschieden von *Mal Naregam*, wenigstens im Laub und Aussehen. Die Delighaha, welche Linne in der Flora zeylonica unter den *Plantae annihillatae* ließ, nannte er nachher in der *Mantissa Limonia monophylla* (Willdenow II. 521), weil er Burmanns *Limonia acid* annahm und dafür *Catu Tsjeru Naregam* citierte, aber offenbar *Tsjeru Catu Naregam* meynte, weil er Taf. 14. citierte, und nicht Taf. 12.

*Catu Tsjeru Naregam* blieb demnach unbeachtet, bis Lamarck (Enc. méth. III. 517) dieselbe mit Burmanns *Delighaha* in der *Limonia monophylla* vereinigte. Ob sie aber mit *Tsjeru Catu Naregam*, welche der ächte Prototyp für *Limonia* ist, zu derselben Sippe gehört: ist sehr zweifelhaft: denn abgesehen vom verschiedenen Habitus, scheint sie 4blättrige Blumen zu haben, viele Staubfäden am Grunde verwachsen und eine Beere mit einem einzigen Samen.

11. *Catu seu Katou Naregam*, p. 29. t. 13.

Commelyn betrachtet diese mit den Malabaren als eine Gattung von *Citrus* oder *Limonia*, was ganz falsch ist. Plukenet scheint es etwas verbessert zu haben, indem er sie mit Hermanns *Granata Malus zeyl. spinosa* vergleicht, welche letztere er *Malus punica zeylonensis spinosa* nennt (Alm. 240) und *Malus Granata zeylonensis aculeata* (Phyt. t. 98. f. 6.). Ob Hermanns Pflanze einetley ist mit Plukenets, weiß ich nicht; ist das aber der Fall, so halte ich sie nicht für Rheedes Pflanze, obgleich beyde zu den Rubiaceen gehören. Plukenet citirt übrigens *Catu Naregam* mit Zweifel; der ältere Burmann aber vereinigt ohne Weiteres nicht bloß Rheedes, Hermanns und Plukenets Pflanzen, sondern stellt sie auch zu Rumphs *Malum Granatum Delima* (Herb. amb. II. 94 t. 21. f. 1.), und zu Grimms *Arbor granata*, welche nichts weiter ist, als der gemeine Pome granate, und auf diese Weise ertheilt er der *Catu Naregam* alle seine Kräfte (Thes. zeylon. III.).

Diese Böcke waren zu grob für die späteren Botaniker, bey denen ich keine Spur von *Catu Naregam* finden kann.

Sie gehört übrigens zu *Gardenia*, worunter viele Sippen stehen. In Bezug auf die Zahl der Staubfäden, sehr ungewöhnlich in dieser Familie, kommt *Catu Naregam* am nächsten der *Gardenia thunbergia* (Willdenow I. 226); unterscheidet sich aber durch Dornen, und, was wichtiger ist, durch den Bau der Frucht, wofern sie nämlich bei *Gardenia thunbergia* wirklich 4 Fächer hat. Vielleicht aber hat sie nur zwei, jedes wieder getheilt durch einen Fortsatz der Scheidwand, wodurch die Samen in jeder Zelle, von 2 Massen von Mus umgeben, getrennt werden, so daß man das Ganze wohl für 4 Fächer ansehen kann. Eine Frucht aber mit 2 Fächern und vielen Samen am *Septo medio* durch ein *Receptaculum longitudinale* angeheftet ist der Character von *Randia* (Gärtner Taf. 26.), nicht gut unterschieden von *Genipa* und *Tocoyena* Taf. 190. Verhärtet die Membran, welche die äußeren Wände der Frucht ausfüllt, zu einer holzigen Substanz; so ist es die Frucht von *Posoqueria* Taf. 195., sive *Cerciseus* Taf. 140., ein wohl zu geringer Unterschied von *Randia*. Die ächten *Gardenien* aber Taf. 193. 194. sind hinlänglich unterschieden durch den Mangel aller Scheidwände und durch die Anheftung der Samen an den äußeren Wänden statt am *Septo medio*. *Catu Naregam* hat daher vielleicht einerley sippische Charactere mit *Gardenia thunbergia* und sollte nicht von *Randia*, wie ich sie definiert habe, getrennt werden, wofern man nicht die Zahl der Staubfäden dazu für hinlänglich hält; denn *Randia* hat nur halb soviel, was unter den Rubiaceen von großer Wichtigkeit ist. Ist aber der *Habitus* so sehr ähnlich und die Zahl der Gattungen mäßig; so verdient solch' ein Unterschied wenig Berücksichtigung.

Ich habe einen Baum gefunden, welchen ich für einerley mit *Catu Naregam* gehalten hätte, wenn seine Blumen Geruch gehabt hätten und dieselbe Zahl von Staubfäden. Ich will ihn hier beschreiben, theils um zu zeigen, daß bei diesem Zahlenunterschiede keiner im *Habitus* ist, welcher eine sippische Trennung rechtfertigte, theils weil dieses die Pflanze seyn kann, welche Plukenet und Burmann für *Catu Naregam* gehalten haben. Exemplare davon liegen im indischen Hause.

*Randia virosa.*

*Posoqueria drupacea.* Gaertn. De Sem. III. 77. t. 195. ?

*Granata Malus zeylanica*, spinosa. Burm. Thes. Ceyl. III. ?

*Malus Panica zeylonensium* spinosa. Pluk. Alm 240. ?

*Malus Granata zeylonensis aculeata.* Pluk. Phyt. t. 98. f. 6. ?

*Laurifolia minor* ex Java. Pluk. Mant. 113. ad Alm. p. 221. l. 3. referens, quae ultima tamen forte est *Garcinia Mangostana*, Horto malabarico perperam citato.

Bis (*viriosa*) *Moyen Bengalensium.*

Habitat in Indiae Gangeticae dumetis.

*Arbuscula Vauqueriae facie.* Rami rigidi, non pubescentes. Ramuli brevissimi, ex anni praeteriti foliorum axillis (foliis deciduis nudati), subquadriphylli. Rami nunc inermes; tunc spinis oppositis supra ramulorum

axillas enatis, rectis, ramulos longitudine aequantibus armati. Folia opposita, approximata, oblongo-obovata vel cuneata, acuta, integerrima, glabra, subcostata, venosa. Petiolus brevissimus, marginatus. Stipulae petioli longitudine interfoliaceae, ovatae, acutae, diaphanae.

Pedunculi terminales 1—3. uniflori. petiolo vix longiores. Bractae vix ullae. Flores mediocres, lutei, inodori.

Calyx glaber, basi longitudine tubicorallae cylindracea; limbo quinquepartito lacinii patentibus, linearibus, acutis, coralla vix brevioribus. Corallae hypocrateriformis tubus crassus, brevis, teres, ad medium intus pilis cinctus; limbus glaber, aestivatione imbricata obliquus, quinque partitus lacinii obovatis, acutiusculis. Antherae quinque ad corollae incisuras adnatae, oblongae, acutae, basi emarginatae. Germen inferum; globosum. Stylus longitudine tubi teres. Stigma exsertum, ovatum, sulcatum, bipartibile.

Pomum magnitudine fructus *Juglandis subrotundum*, calyce truncato umbilicatum, parietibus crassis intus in putamen tenue induratis biloculare. Receptacula e medio septi utrinque enata, membranacea, bifida. Semina plura horizontalia, bifariam in singulis pomi loculis nidulantia, pulpo carnosio tecta.

Es ist zu bemerken, daß *Gardenia uliginosa* (Hort. beng. 13. Hort. kew. I. 370. Willdenow I. 228.) sich von der vorigen wesentlich nicht unterscheidet, und daher Poiret sie mit Recht *Randia uliginosa* nennt (Enc. Suppl. II. 829.); und ich habe unter diesem Namen Exemplare dem indischen Hause übergeben.

Daß *Genipa* (Gärtner L. 190.) eine eigene Sippe bilde ist sehr zweifelhaft. Ich habe die Stellung des Embryo's in *Randia uliginosa* nicht untersucht, und weiß daher nicht, ob er sich verhält wie bei *Genipa*; aber Gärtners Figur der Frucht ist ganz so wie bei *Randia uliginosa*. Ich muß mich gegen so kleinliche Unterschiede, worauf sich hier Gärtner stützt, erklären; dadurch werden natürliche Sippen auseinander gezerrt, was leider jetzt unter den Botanikern eine zu gemeine Practik ist.

12. *Tsjerou Katou Naregam seu Tsjeru Catu Naregam* p. 31. Tab. 14.

Bei Mal Naregam habe ich die Mißgriffe bemerkt, welche entstanden sind durch Vorlesung des Wortes *Tsjeru* und *Catu* vor die Figur. Die Brahmanen auf Malabar stellen sie zu *Citrus*. Mit der gewöhnlichen Sorglosigkeit der Orthographie der indischen Worte schreibt Rheede nicht bloß auf der Tafel den gemeinen Namen anders als im Text, sondern auch der brahmanische Name auf der Tafel ist *Naringi* (*Orange*), während der im Text ist: *C. Ranee Nimba* (*alba fera Citrus*). Uebrigens deuten alle diese Namen auf *Citrus*, was Commelin abweist, Ray aber annimmt und diese Pflanze nennt: *Malus Limonia indica fructu pusillo* (Hist. plant. 1658.). Das that auch zuerst Plukenet und nannte sie *Malus Limonia Lenticel foliis zeylanica, fructu minimo, uvarum magnitudine aemulo* (Alm. 239); nachher bemerkte er aber den Fehler (Man-

tissa 125) und stellte sie zu *Coru*, wovon wahrscheinlich *Feronia elephantum* der Prototyp ist, wie ich bey Mal Naregam bemerke.

Eben da habe ich auch gezeigt, daß der ältere Burmann unrichtig diese Pflanze für *Wahedi* oder *Jakuwa* der Ceplonesen angesehen hat, welche nach den Synonymen von Rumph und Sloane eher ein kleinfrüchtiger *Citrus* ist, welchen die Engländer *Lima* nennen. Linne scheint das gemerkt zu haben und stellte deshalb *Tsjerou Katou Naregam* zu *Diwal* oder *Giwul*, obchon er Taf. 12. statt 14 citierte, vielleicht durch einen Druckfehler. Er stellte in der *Flora zeyl.* 173. *Tsjerou Katou Naregam* oder *Diwal* zu *Schinus*, mithin unter die *Terebinthaceen*; aber davon müssen die Synonyme *Burmans* und *Sloanes* weg, weil sie zu den kleinfrüchtigen *Citrus* gehören.

Der jüngere Burmann schützte, daß *Tsj. K. N.* kein *Schinus* sey, weil dessen Frucht eine *Drupa* ist und bildete eine neue Sippe *Limonia*, und setzte dazu eine andere, welche seitdem *Triphasia* genannt worden; er setzte mithin zur alten Meinung zurück, indem er sie unter die *Aurantien* stellte, was beweist, wie nahe diese den *Zerebinthaceen* verwandt sind. *Tsjerou K. N.* mag demnach als der eigentliche Prototyp von *Limonia* betrachtet werden, und ist vielleicht die einzige Gattung, welche dazu gehört; wenigstens haben die anderen dazu gekommenen ein sehr verschiedenes Aussehen und einen andern Character. Burmann setzte fernerlich auch dazu *Rumphs Anisifolium* oder *Boa Balangan* (*Herb. amb.* II. 133. Taf. 43.), von welcher aber der letztere nur sagt, sie hätte dieselbe *Folitura*; und der ältere Burmann gibt wesentliche Unterschiede an in der Erklärung der Taf. 43. Linne citirt bloß *Rhodes* Figur, und da *Burmans Limonia acidissima* Linne's *Schinus* ist; so kann sie nicht *Anisifolium* seyn, obchon *Willdenow* immer noch beide zusammenstellte (II. 572). Aus seiner Beschreibung: *Bacca trilocularis, Seminibus solitariis*, geht aber hervor, daß er doch nur *Katou Naregam* meynete. Gegenwärtig betrachtet man *Anisifolium* als eine eigene Sippe, *Feronia elephantum* (*Encycl. Suppl.* II. 630. *Hort. beng.* 33), obchon beide Pflanzen sich so ähnlich sind, daß ich zu *Plukenet's* Meinung zurückkehre, indem mir einige Unterschiede in der Frucht zur Trennung nicht hinlänglich scheinen, wenigstens nicht, um sie aus den Familien der *Aurantien* und *Terebinthaceen* zu verweisen; auch steht ihnen *Murrugu*, mit Ausnahme des *Habitus*, sehr nahe, und läßt sich wohl kaum durch hinlängliche Charactere unterscheiden. Von beyden habe ich Exemplare dem indischen Hause gegeben.

König hielt *Anisifolium* für die ächte *L. acidissima*, und daher bekam *Tsjerou K. N.* den Namen *L. crenulata*; denn er hatte die beyden Pflanzen für verschieden gefunden. Diese Namen wurden vorbehalten im *Hort. Kew.* III. 43. und selbst im *H. beng.* 32. und in der *Enc.* III. 44; nach meiner Meinung kann man aber eine solche Meinung nicht gelten lassen.

### 13. *Paenoe* seu *Paenu* p. 33. Taf. 15.

Die Brahmanen auf Malabar nennen diesen Baum *Doepe* oder *Dupa*, von den Portugiesen richtig übersezt *Arvore Enseza*, weil man wahrscheinlich sein weiches Harz als

Weibrauch braucht. Er ist auch, wie *Commelyn* bemerkt, dem *Gummi Anime* aus *America* sehr ähnlich und wird oft als solches nach *Europa* geschickt. Nach *Commelyn* bringen verschiedene Bäume ein ähnliches Harz hervor, welche übrigens botanisch wenig verwandt sind. Das gilt auch von dem jetzt gewöhnlich als Weibrauch gebrauchtem Harz.

Der *Paenoe* ist einer der zierlichsten Bäume *Indiens* und steht in der Provinz *Canara*, wo ich ihn allein gesehen habe, gewöhnlich längs der Straßen, wo er sehr schöne Zugänge bildet (*Buchanans Mysore* III. 89).

Nach, dem *Plukenet* folgte (*Alm.* 28), war gewöhnlich sehr unglücklich im Einzeichnen dieses Baumes; er nannte ihn *Amygdalae affinis indica, fructu umbilicato, nucleo nudo, cortice pulvinato trifido tecto* (*Hist. plant.* 1482), Linne machte richtiger daraus eine neue Sippe unter dem Namen *Vateria* (*Flor. zeyl.* 204) *indica* (*Burmans, Flora indica* 122) — Linne scheint übrigens denselben Baum unter einem andern Namen zu erwähnen, *Kaekuria ghaha* (*Flora* 630), welcher ist *Arbor kaekuria ghaha odorata, ex qua fluit Gummi Elemi*, des älteren *Burmans* (*Thes.* zeyl. 28), wo er richtig *Paenu* citirt (durch Druckfehler *Paeru*), aber unrichtig einen americanischen Baum hinzubringt, welcher *Gummi Elemi* liefert und bey *Plukenet* abgebildet ist (*Phyt. Taf.* 217. fig. 4.). Noch ist zu bemerken, daß das Citat von *Grimm* hinsichtlich des *G. Elemi* wahrscheinlich zu einer anderen Pflanze gehört, der *Kaekuna* der *Ceplonesen*, welche *Burmans* nennt *Myrobalanus zeylaica, ex qua Gummi Elemi, fructu odore et sapore praestans* (*Thes. zeylan.* 166).

Nachdem *Commelyn* die Verwandtschaft des *Gummi-harzes* des *Paenoe* zum *Gummi Anime* bemerkt hat, setzt er hinzu: *Similis arboris meminit Recchus nomine Copalli montana. Ad haec e Zeylan Insula simile adfertur Gummi, quapropter et haec arbor non male forsitan eo referri potest.*

Auf nicht vesterem Grunde beruht wahrscheinlich die Nennung von *Rezius*, daß dieser Baum *Gummi Copal* hervorbringe, weshalb er ihn *Elaeocarpus copaliferus* nennt, woben es schwer zu entscheiden ist, ob er die Unterartung dieser in den Künsten angewendeten Substanz oder die botanische Anordnung mehr vernachlässigt habe, indem *Paenoe* alle Charactere entbehrt, welche *Elaeocarpus* hat.

*Bahl* und *Willdenow* (II. 1170) nehmen den Namen an, *Pellet* aber behält besser den Namen *Vateria indica* bey (*Enc.* VIII. 418), wie auch *Korburgh* (*Hort. beng.* 42). Da *Bahl* sagt, seine Pflanze habe alle spissigen Kennzeichen von *Elaeocarpus* in Kelch, Blume, Beutel und Frucht; so können wir sie ohne Bedenken für ganz verschieden halten von *Paenoe*, besonders wenn sie einen untern Fruchtstiel hat, wie *Rezius* versichern soll. Nach *Korburgh* heißt das Harz der *Paenoe* ostindischer *Copal*, und als solcher mag er auch in ein indisches Kaufhaus gekommen seyn, wo nicht viel Kenntniß der *Arzneymateria* zu finden ist. *Turnbull* aber von *Mirzapur* sagte mir, er habe eine Probe davon nach *England* geschickt, aber niemand habe es wollen für *Copal* kaufen, obchon man es für *Anime* gelten ließ. Der ächte *Copal* übrigens, so wie das *Anime*, sind Erzeugnisse von *America*.

1806 gab ich Exemplare und Zeichnungen dem J. E. Smith; hier eine Beschreibung aus Canara, wo der Baum Dupada heißt; in Carnata Conglyum, im Hindwidiadict Gulut.

Arbor resinifera magnitudine Quercus. Rami teretes. Turiones farina quasi aspersi. Folia alterna, magna, oblonga, utrinque obtusa, vel aliquando retusa, integerrima, glabra, costata, venosa. Petioli teres, medio attenuatus, rugosus, nudus, brevissimus. Stipulae geminae, laterales, caducae, sessiles, oblongae, integerrimae, obtusae, farina aspersae, brevissimae.

Paniculae axillares, folio longiores, ramosissimae, laxae; ramis alternis, teretibus, albidis, farinosis. Bractae stipulaeformis, caducae, geminae ad singulas paniculae divisiones, et ad singulorum pedicellorum basin. Flores alterni, pedicellati, albi, odorati, calycibus extra farinosis.

Calyx coloratus, persistens, patulus, laciniis oblongis obtusis ultra medium quinquefidus. Petala quinque, longitudine calycis sessilia, disci hypogyni lateribus inserta, calyce alterna, ovata, integerrima. Antherae plurimae, sessiles, disco insidentes, seta recurva terminatae. Germen superum, ovatum, sulcatum, ovulis quinque foetum. Stylus subulatus, staminibus longior. Stigma acutum.

Die Beschreibung der Frucht findet man bey Gärtner (III. 53 t. 189), zu der ich nichts zu setzen habe.

Hieraus ergibt es sich, daß Paenoe nicht einmal zu einerley Familie mit Elaeocarpus gehört, sondern nahe verwandt ist mit Vatica, Shorea, Dipterocarpus, Hopea Roxburgh, Dryobalanus et Lophira, welche eine natürliche Ordnung bilden zwischen den Guttiferen und Aurantien, während Elaeocarpus, obchon von Jussieu unter die letzteren gesetzt, nach meiner Meynung mehr den Tillaceen verwandt ist.

#### 14. Nyalel sive Nialel p. 57. t. 16.

Nach Rheede heiße dieser Baum bey den Brahmanen Lassa, welcher Name gewöhnlich einigen Gattungen von Cordia gegeben wird: auf der Insel aber soll der brahmanische Name Rana Bori seyn; da Rana wild heißt, so ist Bori der Sippenname, zu dem auch 2 andere Pflanzen tab. 40 und 41. gezogen werden, obchon sie wenig Verwandtschaft damit haben.

Commelyn vergleicht Nyalel mit Sambucus indica des Ventius, welchen ich nicht nachschlagen konnte. Plukenet vergleicht beyde, weil er sie wahrscheinlich für einerley hielt, mit seiner Usifera arbor americana per funiculose summis ramis ad terram usque demissis prolifera (Alm. 394; Phyt. t. 237. f. 5.); aber ich sehe keinen Grund dafür; denn die Blätter dieses Baumes sind einfach, die des Nyalels gesiedert; auch sagt Rheede nicht, daß von seinen Zweigen Wurzeln herabfallen, wie bey Ficus, zu welcher Sippe vielleicht die americanische Pflanze gehört.

Jussieu (Genera plant. 297) und Poiret (Enc. Suppl.

IV. 93) meynten, Nialel könnte zu Vitis gehören, aber der Habitus ist zu verschieden; er hat mehr Verwandtschaft zu einigen Aurantien, wie Cookia und Murraya, besonders aber zu Lansium, wie ich in meinem Commentar über Rumph (Herb. amb. I. 151 t. 54.) bemerkt habe.

Auf der Insel Ternate heißt das Lansium Lassa, mithin wie der Nyalel auf Malabar.

#### 15. Angolam seu Alangi p. 39 t. 17.

Commelyn waag keine Vermuthung über diesen Baum; Plukenet (Alm. 31) führt Ray's Namen an: Arbor indica baccifera fructu umbilicato rotundo Cerasi magnitudine diococo, und bringt dadurch die Sache nicht weiter.

Lamarck führt zuerst die Angolam ein und nennt sie Alangium decapetalum (Enc. I. 174); stellt sie zu den Myrten neben Decumaria; Jussieu aber glaubt, sie gehöre eher in die 4te Abtheilung seiner Onagrae, worinn ich ihm gänzlich bestimme.

Willdenow (II. 1174) und Poiret (Enc. Suppl. I. 366) führen an, wahrscheinlich nach Wahl, daß der jüngere Linne die Angolam unter dem Namen Grewia salvifolia beschrieben habe; aber er citirt nicht den Hort. malab. und seine Beschreibung stimmt nicht mit Rheede's und Wahl's Angolam überein. Vermuthlich war durch ein Versehen ein Exemplar von Angolam mit Grewia salvifolia bezeichnet.

#### 16. Idou Moulli seu Idu Mulli p. 48 t. 18.

Mulli bedeutet Dorn und ist eher der Name einer ganzen Abtheilung als einer Sippe; das Wort Idu muß demnach sippisch seyn, oder die 2 Worte sind eine Zusammensetzung wie Bockdorn, Hagedorn, Schwarzdorn udl., welche verschiedene Sippen bedeuten. Das Wort Elati-canto der Brahmanen auf Malabar ist ähnlicher Natur. Canto bedeutet Dorn im Hindwidiadict.

Commelyn classificirt diese Pflanze nicht. Plukenet glaubte eine der Wadouka S. 97 dieses Bandes ähnliche zu besitzen, und vermuthete, es könnte Idu Mulli seyn; daher nannte er sie: Wadoukae Malabaricae haud multum dispar, frutex aculeatus e Maderaspatan (Alm. 395; Phyt. tab. 69. f. 7.); aber die Figur, welche er gibt, hat weder Ähnlichkeit mit Idu Mulli, noch mit Wadouka. Später (Mantissa 133) bekam er eine bessere Vermuthung: Myrobalano Bellericae, ut nobis videtur Idu Mulli congenere est et nominari potest Myrobalanus indica, arbor spinis horrida, angustiore folio longo, fructu racemoso.

Obchon nun diese Pflanze nach der Zahl der Staubfäden und dem Habitus keine Myrobalanus oder Terminalia seyn kann, so glaube ich doch, daß sie zu derselben Familie gehört. Einmal hielt ich sie für eine Pyralaria Michaux (Encycl. V. 745), welche Willdenow in Hamiltonia verwandelt hat (IV. 1114); das Aussehen der Pflanzen ist aber so verschieden, daß ich jetzt glaube, sie gehören zu verschiedenen Sippen.

17. *Poerinsii* seu *Purinsii* s. *Vercoepoelongi* p. 43. t. 19.

Sabao dos Canarius *Lus.*, Seep - nooten *Belgis*.

Der portugiesische und holländische Name kommt von der felsenartigen Eigenschaft der Frucht; was die indischen Namen bedeuten, weiß ich nicht: denn alle ihre Namen der Seife kommen von den Portugiesen her, welche wahrscheinlich diese Substanz eingeführt haben; auch wird sie nur von den Dienstboten der Europäer gebraucht.

Commelyn bemerkt, daß die Indier statt Seife verschiedene Früchte anwenden, *Poerinsii* aber den Botanikern ganz unbekannt sey. Als Ray Rheedes Pflanzen ordnete, warf er wenig Licht darauf, indem er sie *Pruniferae fructu racemoso parvo, nucleo saponaceo* nannte, ob schon J. Bauhin den Namen *Saponaria* einigen damit verwandten amerikanischen Pflanzen gegeben hatte. Aber Plumet's *Nux portoricensis amplissimis foliis venosis et lacte virentibus*, womit er sie vergleicht (*Alm.* 265 und *Phys.* t. 208. f. 2.), hat einfache Blätter und mithin keine Verwandtschaft mit *Poerinsii*, auch nicht mit *Sphaerulae saponariae* von J. Bauhin.

Der ältere Burmann vereinigt, nach Commelins *Flora malab.*, die *Poerinsii* mit *Saponaria Arbor zeylanica trifolia*, semine lupini von Hermann; wenn aber Hermanns spezifischer Character nicht sehr schlecht ist, so muß sie verschieden seyn; denn die eine hat *Folia ternata*, die andere *pinnata*. Wir können aber kaum annehmen, daß Commelyn so geirrt habe, und einige Blätter auf Rheedes Tafel sind entschieden *ternata*. Wird dieser Umstand zugegeben und Hermanns spezifischer Character verbessert, so mag *Conghas* der Ceylonesen *Poerinsii* seyn. Darauf werde ich später zurückkommen.

Burmann citirt zweifelshaft *Arbor prunifera, sphaerulas saponarias ferens, tetraphylla, ex India orientali* (*Alm.* 47; *Phyt.* t. 14. f. 6.), welche gefiederte Blätter hat wie *Poerinsii*; aber so verschieden in Gestalt, daß ich sie nicht für einerley halten kann; ich werde nachher eine Pflanze beschreiben, welche vielleicht Plumet's ist und ganz verschieden von *Poerinsii*. In der *Flora zeyl.* 603 läßt Linne *Conghas* unter den *Barbarae annihilatae*, weil er sie nicht unterbringen konnte; citirt auch nicht dazu *Poerinsii*, wahrscheinlich, weil er die gefiederten Blätter bemerkte. In der *Spec. plant.* vereinigte er jedoch *Conghas*, d. h. Hermanns *Saponaria arbor indica trifolia* und des ältern Burmanns *Saponaria arbor trifoliata semine lupini* mit *Poerinsii*, und da der Name *Saponaria* schon an ein Kraut vergeben war, so bekam *Sapon. arbor* den Namen *Sapindus*, und *Poerinsii* wurde *Sapindus trifoliata foliis ternatis* (Burmanns *Flor. ind.* 91), ob schon dessen Blätter im vollkommenen Zustande gefiedert sind: *Folia bina et bina sibi invicem opposita tenerioribus surculis (petiolis) proveniunt*.

Zu gleicher Zeit stellten Linne und Burmann (*Flor. ind.* 91) eine andere Gattung von *Sapindus* auf: *Saponaria foliis impari pinnatis, caule inermi*, für welche die einzige Auctorität Rumphs *Saponaria* ist (*Herb. amb.* II. 134); denn alle anderen Citate von Browne, Sloane, Commelyn und Plumet beziehen sich auf eine amerikanische Pflanze, verschieden von der indischen, wie Plumet's Figur zeigt (*Phyt.* t. 217. f. 7.). Rumph sagt von seiner *Saponaria*: *Similis Saponaria arbor descripta quoque occurrit in Horto malabarico* IV. f. 19. nomine *Poerinsii*, hält sie mithin nicht für dieselbe.

Stf. 1838. Sept. 6.

In den Beschreibungen der zwey anderen kann ich keinen wesentlichen Unterschied finden: denn ob schon in Rheedes Figur einige Blätter *ternata* und selbst *binata* sind, so sind doch andere auch *pinnata*, und ob schon er sagt, daß die *Pinnae oppositae* seyen, so sind doch auch einige *alternae* abgebildet. Es ist zu bemerken, daß Rheedes Mäler, um alle Theile darzustellen, das Ende eines Zweiges mit Blumen, jungen Früchten und Blättern gewählt hat, besonders wenn sie gefiedert sind; weil dann das Blatt noch nicht ausgewachsen ist und später verlängert wird durch das Ende des gemeinschaftlichen Blattstiels, welcher neue *Pinnae* treibt. Rumph hat leider keine Abbildung gegeben; aber ich halte seine *Saponaria* für *Poerinsii* und Linne's und Burmanns *Sapindus trifoliata*, ob schon diese großen Botaniker vielleicht wirklich Exemplare von einem *Sapindus* mit *Foliis ternatis* hatten und ihre Ansichten nicht bloß aus Rheedes Figur schöpften. In letzterem Falle ist der Name *S. trifoliata* verkehrt für eine Pflanze mit gefiederten Blättern. Wahl und Willdenow haben sie daher besser *S. laurifolius* (II. 469) genannt, und *S. saponaria* Burmanni als indische Pflanze verworfen, weil sie einerley ist mit *Sap. laurifolius*; davon gab ich dem indischen Hause Exemplare. Ich muß noch bemerken, daß Willdenow und Poiret (*Enc.* VI. 664) wahrscheinlich nach Wahl für *S. trifol.* die *Flora zeyl.* 603 citieren. Dieser unrichtige Name war für die *Species plantar.* aufbehalten und konnte nicht in der *Flora zeylanica* stehen, da sie noch keine Gattungsnamen hatte. *Conghas* ist an dieser Stelle erwähnt; hat sie wirklich *Folia ternata*, so ist sie weder Rheedes *Poerinsii* noch Rumphs *Saponaria*. Das läßt sich nur durch die Einsicht von Hermanns Herbarium entscheiden. Indessen beschreibt Roxburgh die *Schleichera trijuga* als den *Kunghas* der Ceylonesen (*Hort. beng.* 29), welches mithin sehr wahrscheinlich die Pflanze Nr. 603 der *Flora zeyl.* ist.

Weiter ist zu bemerken, daß Poiret (*Enc. suppl.* IV. 447) die *Poerinsii* zu *Sapindus spinosus* L. stellt, eine Pflanze aus Jamaica: *Caule spinosissimo* (Willd. II. 469). Wie dieser große Bod in ein so vortreffliches Werk kommt, begreife ich nicht: Rheede weiß nichts von Dornen.

Hier folgt eine vollständige Beschreibung des oben angeführten *Sapindus* als die wahrscheinliche Pflanze von Plumet (*Phyt.* t. 14. fig. 6.). Sie wird zugleich den ächten Bau der Frucht angeben, welcher den Unterschied zeigt mit *Euphorbia*, *Scytalia*, *Molainae*, *Schleichera* und anderen verwandten Pflanzen.

*Sapindus emarginatus*. Willd. Sp. Pl. II. 469; Hort. beng. 29; Enc. méth. VI. 664.

*Arbor prunifera sphaerulas saponarias ferens tetraphylla, ex India orientali*. Pluk. Alm. 47.

Ritha hindice.

Habitat ad Magadhae pagos.

*Arbor mediocris, ramulis teretibus, pubescentibus. Folia alterna, abrupte pinnata, bi- seu tri-juga. Foliola opposita, oblonga, utrinque obtusa, apice subretusa, integerrima, costata, venis minute reticulata, supra pilis brevissimis raris, subtus densis longis pubescentia, inferiora breviora. Rachis teres. Petiolus communis brevissi-*



*mus, pubescens, basi incrassato teres: partiales brevissimi, rachi crassiores. Stipulae nullae.*

*Panícula terminalis, erecta, foliis brevior, conferta, ovata, constans e racemis pluribus multifloris, sparsis. Pedicelli sparsi, uniflori, ad medium squamula una vel altera bracteati. Flores albi, parvi.*

*Calyx pubescens, ultra medium quinquefidus laciniis obtusis, concavis, inaequalibus, fundo tectus disco hypogyno, quinque crenato, plano. Petala quinque, obovata, crenis disci inserta, calyce breviora, simplicia, utrinque pilis intus longioribus crenita. Filamenta octo, pilosa, petalis breviora.*

*Germen trilobum, tomentosum. Stigma acutum. simplex.*

*Drupae carnosae, tres (una vel altera nonnunquam abortiva), obovatae, tomentosae, absque receptaculo sibi parietibus intus membranaceis coadunatae, supra mucrone communi brevi instructae luteae. Caro crassius, spongiosus, saponaceus, e putamine facile secedens. Putamen nigrum, politum, subrotundum, compressum, ad latus inferius derasum, crassum, corneum, uniloculare. Receptaculum vel commune vel proprium nullum. Semen putaminis lateri deraso adherens, forma loculi solitarium. Integumentum simplex, membranaceum. Embryo spiralis. Cotyledones crassae, carnosae, involutae. Radicula infera.*

*Varietatem in Cicata legi pedicellis multifloris, paniculis folio majoribus.*

Exemplare von beyden Varietäten habe ich dem indischen Hause gegeben.

Aus dem Vorigen zeigt es sich, daß Gärtners *Sapindus* (L. 341 t. 70. f. 3.) sich sehr im Bau der Ruß unterscheidet, welche 2fächerig seyn soll. Ich vermuthete aber, daß Gärtners einen Fortsatz, der zwischen die Falten des Embryos läuft, für eine Scheidewand angesehen habe, wie es mit auch einmal mit *Cussambium* gegangen ist. Die Ruß ist in beyden Sippen sehr ähnlich, wie auch bey Gärtners *Koon* (Zaf. 180), so daß es schwer seyn möchte zu sagen, zu welcher von beyden Sippen die letztere gehört; indessen sind *Sapindus* et *Cussambium* nicht besonders nahe verwandt.

# 18. *Adamboe seu Cadeli-poea seu Cadeli-pua* p. 45 t. 20. 21.

Es ist zu bemerken, daß es noch eine andere *Adamboe* (Hort. mal. XI. L. 56.) gibt; welche aber gar keine Verwandtschaft mit der gegenwärtigen hat, sondern ein *Convolvulus* ist.

Es ist schade, daß die neueren Botaniker den schönen Namen *Banava* von *Camelli* nicht beibehalten haben und sie als eine neue Sippe betrachten. Commelin stellte sie nebst der folgenden zu *Pariti* oder *Gossypium*; Breynius, Ray und Plukenet zu *Alcea*, welche bey den beyden letzteren heißt: *Alcea indica arborea*, *pericarpio carnosio*, in *plura loculamenta partito* (Alm. 16), eine eben so ungenügende Vermuthung, wie die von Commelin. Hermann nannte sie *Althaea*, und verbesserte damit nichts, eben so wenig der ältere Burmann,

der sie nannte *Ketmia indica*, *foliis laurinis*, *flore violaceo*, *spicato* (Thes. zeyl. 137). Linne setzte sie zu keiner Sippe, sondern unter die *Malvaceen* mit dem ceylonischen Namen *Mustu-ghas* (Flora. zeyl. 553).

In der Mantissa beschrieb er einen Baum unter *Münchhausia speciosa*; Lamarck (Enc. I. 39) hatte seine Kenntniß davon nur von Rheede, glaubte auch, sie gehöre zu den *Malvaceen* und nannte sie *Adambea glabra*. Später (Enc. III. 357) erkannte er sie für *Münchhausia speciosa*, welche aber zu *Lagerstroemia* gehört (G. plant. 367); daher nannte er sie *L. münchhausia* (Enc. III. 375), welche aber schon von Rebus als *L. major* beschrieben war. Er stellte diese Sippe zu den *Salicarien*; ich aber glaube, sie habe mehr Verwandtschaft zu den *Myrtaceen*, besonders zu *Sonneratia*.

Willdenow II. 1179 vereinigt auch *Münchhausia* et *Lagerstroemia*, läßt aber *Adamboe* nicht für *M. speciosa* gelten, sondern führt sie bey *L. reginae Roxburgh* an, oder *Rumphs Flos reginae*, Jarul der Bengalesen, eine Pflanze, die mir vollkommen bekannt ist, und zwar als ein großer Forstbaum, während *Adamboe* nur ein Busch ist: "Septem circiter pedes alta;" auch citirt ihn Roxburgh nicht dazu. H. beng. 38. Ich glaube daher, daß man von Willdenows *L. reginae* die Synonyme Lamarcks, Rays und Rheedes wahrnehmen und zu *L. münchhausia* stellen müsse, wie Lamarck gethan.

Im östlichen Bengalen und in Ava, wo ich sie allein wild gefunden habe, hat *L. reginae* häufig an Stamm und den dickern Aesten einige starke und gerade Dornen, 1 bis 3' lang. Sie scheinen vorzüglich bey alten Bäumen zu entstehen, die in gutem Boden wachsen. Solche Bäume werden von den Eingebornen für besseres Zimmerholz gehalten als die ohne Dornen. Deshalb setzen die Bengalesen den Namen *kanta* (dornig) dazu; diese Dornen können aber keine Gattung begründen. Ich habe Exemplare davon dem indischen Hause gegeben.

Deßgleichen von einem andern Baum aus derselben Gegend, welchen Roxburgh *L. grandiflora* nennt (H. beng. 38), ich aber für eine eigene Sippe ansehe, das Verbindungs-glied zwischen den *Lagerstroemien* und *Sonneratien*. Im Jahr 1798. schickte ich Exemplare an J. Banks unter dem Namen *Duabanga*, welcher ich nun den Gattungsnamen *sonneratioides* befügte. In Tripura heißt er *Duyabanga* oder *Banurhola*; in Camrupa *Chokrosal*. Hier die Beschreibung.

*Arbor magna. Rami verticillati, horizontales. Ramuli laeves, glabri, tetragoni, petiolos communes mentientes. Folia opposita, horizontalia, disticha, oblonga, basi cordata, integerrima, acuminata, supra nitida, subtus nuda, costis subtus carinatis lineata, venosa, plana, pollicis undecim longa, quatuor lata. Petiolus vix ullus. Stipulae nullae.*

*Paniculae axillares et terminales, foliis breviores, ramis oppositis, angulatis, glabris, rigidis, apice pedunculiferis pauciflorae. Pedunculi proprii teretes, flore breviores, ebracteati. Flores magni, albi.*

*Calyx crassissimus, persistens, inferus, campanulatus, laciniis incurvis ovatis acutis ultra medium sexfidus.*



Petala sex, subrotunda, tenuissima, caduca, calyci ad incisuras inserta. Filamenta plura, subulata, perigyna. Antherae oblongae, incumbentes. Germen conicum, angulatum. Stylus compressus, erectus, calyce triplo longior. Stigma peltatum, margine lobato convexum.

Capsula subrotunda, calyci patenti insidens, magnitudine fructus juglandis, suboctovalvis, septis ad medium non pertingentibus, suboculocularis, centro concava. Septa e medio valvularum enata, alternis longioribus membranacea, binis lamellis conflata; lamellae ad marginem interiorem loculos versus replicatae, et in receptacula carnosiuscula incrassatae. Receptacula unius septi cum iis adjacantium connata, loculos introrsum claudunt. Semina acerosa, pedicellata, plurima, conferta receptacula undique tegunt.

19. *Katou adamboe seu Katou Cadeli Poea*  
pag. 47 tab. 22.

Commelyn hält sie für ein Pariti oder Gossypium aus keinem guten Grund. Quippe utraque sunt Species Malvae seu Althaeae arboreae; Ray nannte sie Alcaea indica arborea elatior, pericarpium carnosum, subaspera. Wort auf er sein Pericarpium carnosum gründet, weiß ich nicht; vielleicht auf den Durchschnitt der Frucht in Rheede's Figur, welche aber nur die unreife Frucht vorstellt; die reife ist eine trockene Capsel, wie man an der Figur sieht, welche die Frucht klaffend zeigt. Ray hat Plukenet verführt, welcher die Pflanze anführt für seine Alcaea indicae arboreae genus peculiare, foliis Beidel Ossaris, Alpini, fructu intus carnosum. Alm. XVI.

Lamarck hielt sie zuerst für eine besondere Gattung und nannte sie *Adambea hirsuta*; so Willdenow, aber wissend, daß *Adambea* eine *Lagerstroemia* ist, nannte er sie *L. hirsuta*. Später sah Lamarck die *Katou adamboe* bloß für eine Varietät von *L. münchhausia* an (Enc. III. 376), setzte aber hinzu: Ich weiß es jedoch nicht gewiß, weil ich sie nicht gesehen habe. Ich bin in demselben Falle und würde seinem Beispiele folgen, finde sich nicht außer der Pubescenz ein großer von Rheede herausgehobener Unterschied: Flores praecedentis adamboe (*Lagerstroemiae münchhausiae*) ut et Parrett (Gossypii) floribus quos similes; mediam tamen floris cavitatem et umbilicum quinque tantum stamina, surrecta, candida rubicundis apicibus ornata occupant.

20. *Karin Kara* pag. 49 tab. 23.

Commelyn und andere sagen nichts darüber, mit Ausnahme von Poiret, welcher sehr passend den brahmanischen Namen Tamagali annimmt und sie für verwandt der *Geoffroea* hält, wenigstens in Blumen und Frucht, obgleich der Habitus verschieden ist (Enc. VII. 560).

Ich kann nichts Besseres darüber sagen, weil ich sie nicht kenne. Der malabarische Name deutet auf eine Verwandtschaft mit *Perin Kara* (*Elaeocarpus*); aber die Blumen scheinen so verschieden, daß man sie nicht dazu stellen kann, obgleich das Volk und die Brahmanen beide Pflanzen

nebst der folgenden unter dem sippischen Namen *Gale* oder *Gali* aufführen.

21. *Perin Kara* pag. 51 tab. 24.

Auf der Tafel steht durch ein Versehen der Gattungsnamen *Perim*. Commelyn bemerkt richtig, daß diese *Kara* eine andere Sippe bildet als die vorige, und keine *Dive* ist, wie die Portugiesen und Holländer meynen. Im botanischen Sinn hat er recht: aber die Frucht ist einer *Dive* so ähnlich in Aussehen und mehreren Eigenschaften, daß sie jederman auffällt und deshalb die Bengalesen die *Dive* auch *Jolpayi* nennen, weil dieses der Name von *Perin Kara* ist. Commelyn (*Flora malabarica*) und Ray (*History of Plants*) nennen sie *Olea sylvestris malabarica fructu dulci*, nicht richtig, weil sie in Indien eben so häufig angepflanzt wird, wie die *Dive* in Europa. Ray soll nachher (*Dendrologia*) die Meynung, daß es eine *Olea* sey, verlassen und sie *Prunus* genannt haben, was keine Verbesserung war.

Plukenet stellt sie mit Zweifel (*Mantissa* 75) zu p. 355 lin. 26 des *Almagest*, welche ist: *Sorbi Alpinae* (forte) species Arbor americana durioribus serratis foliis ex *Insula Jamaicae*, welche, wie er sagt, abgebildet ist Taf. 318. F. 1. seiner Phytographie: aber diese Figur scheint eine *Justicia* vorzustellen, und hier ist sicherlich ein Druckfehler. Die Taf. 318. F. 2. hat viel Ähnlichkeit in den Blättern mit *Perin Kara*, und ist wahrscheinlich diejenige, welche Plukenet meynet. Ist es aber ein *Sorbus*, so kann sie keine Ähnlichkeit mit *Perin Kara* haben, und endlich auch deshalb nicht, weil sie aus *America* stammt.

Burmans (Thes. zeyl. 93 t. 40.) betrachtet *Perin Kara* als einerley mit *Weralu* der Ceylonesen, welche Hermann für einen *Laurus* hält; Burmann macht aber eigentlich daraus eine neue Sippe und nennt sie „*Elaeocarpus folio Lauri serrato, floribus spicatis*.“ Beide gehören ohne Zweifel zu derselben Sippe, aber wohl nicht zu einer Gattung; denn er sagt: *Nucleum crispum*; aber der von *Perin Kara* ist glatt, und sie hat selten viertheilige Blumen, was in Burmanns Pflanze die gewöhnliche Zahl zu seyn scheint. Linne nannte die Pflanze *Elaeocarpus* (Flor. zeyl. 206) und verwirft mit Recht die Synonyme von Plukenet und Sloane, vereinigt aber *Weralu* mit *Perin Kara*. Er meynet eigentlich Hermanns Pflanze, weil er ihr auch *Nucleum crispum* gibt, was auf *Perin Kara* nicht paßt. In der *Species plantarum* steht er den Namen *serrata* dazu, angenommen von Burmann (Fl. ind. 120) und Willdenow (II. 1169). Zu den Synonymen der Flor. zeylon. kam nun auch Rumph's *Ganitrus* (Herb. amboinense III. 160. t. 101.), sicherlich ganz verschieden von *Perin Kara* und wohl auch *Weralu*. Ich glaube, Rumph habe die *Perin Kara* unter dem Namen *Cattulican* (II. amb. III. 163) beschrieben, von welcher er sagt: *Ossiculum oblongum non excavatum, vel rugosum uti ganitri, sed glabrum*. Mit diesen unverträglichen Pflanzen hat Lamarck (Enc. II. 605) *Dicera dentata* Forster vereinigt, welche nach seiner Figur III. gen. Taf. 459. F. 1. hinlänglich verschieden zu seyn scheint. Der Hortus Kewensis (III. 301) citirt bloß den Thes. zeylonicus: da aber die hier beschriebene Pflanze von *Perin Kara* in der Sammlung des

ostindischen Hauses verschieden ist; so habe ich letztere *Elaeocarpus perincara* genannt. Hier die Beschreibung der Frucht, weil nur durch diesen Theil die Gattungen von *Elaeocarpus* unterschieden werden können.

*Drupa acida Olivae majoris similis, supera, glabra, carnosa, subobovata, basi umbilicata. Putamen osseum, suturis tribus spuris, laeve, oblongum, utrinque attenuatum, paulo incurvum, abortu forte uniloculare, loculo ad unum latus propiniori, angusto. Semen oblongum, utrinque acutum, non compressum. Perispermum album. Embryo centralis, erectus.*

## 22. *Manil seu Manyl Kara* p. 53 t. 25.

Dieses ist eine andere Gattung der unnatürlichen malabarischen Sippe *Kara* oder *Gale*. Alle Namen in Malabar deuten darauf hin, daß sie aus den Manillen oder China eingeführt worden, wohin sie wahrscheinlich von den Spaniern aus America kamen. In der Voraussetzung, daß sie aus China kam, vergleicht sie *Commelyn* unachtsam mit *Pruno similis fructus chinensis* des Caspar Bauhins und mit der *Lechya* der Chinesen.

*Rumph* (H. amb. III. 20) verbessert *Commelyn's* Fehler, vermengt aber *Manil Kara* mit seiner *Metrosideros macassariensis*, und *Burmah* ist von der Uebereinstimmung so überzeugt, daß er die Beschreibung der *Manil Kara* hinzusetzt, um zu ergänzen, was *Rumph* fehlt. *Willdenow* trennt richtig *Rumph's* und *Xheede's* Pflanzen, nennt jene *Minusops kauki* (II. 326), die letztere *Achras dissecta* (II. 223), welche *Willdenow* für *A. balata* Aublet hält.

*Poiret* nennt *Manyl Kara* (Enc. IV. 434) *Imbricaria malabarica*, bemerkt aber, daß *Commerson's* *Imbricaria* kaum verschieden ist von *Minusops*. Später (Enc. VI. 530) fand er *Manil Kara* nicht verschieden von *Achras dissecta* W. und *A. balata* Aublet, zieht aber den letztern Namen vor. Im gangetischen Indien habe ich in der Nähe von Städten, und daher wahrscheinlich ausländisch die Pflanze gefunden, welche ich für *Manil Kara* halte und Exemplare davon dem indischen Hause gegeben. Dieser Baum heißt im bengalischen Dialect *Kshirni*, und *Korburgh* sagt: der *Kshirni* sey *Minusops kauki* (H. beng. 25); aber er führt den *Hortus malabaricus* nicht an. Wofen hier kein Mißgriff ist, so ist *Korburgh's* *Minusops kauki* nicht Linne's, sondern *Achras dissecta*, welche wirklich ein *Minusops* ist. Zwar betrachtet *Robert Brown* (Nova Hollandia I. 531) *Minusops hexandra* Roxb. als kaum verschieden von *Achras dissecta*; aber im *Hortus beng.* haben wir eine *Minusops Kauki* et *hexandra*, und dieses erregt die Vermuthung, daß in Bezug auf *Kshirni* ein Mißgriff obwaltet. Vielleicht ist die mir sogenannte Pflanze *Korburgh's* *Minusops hexandra*, und der Name *Kshirni* mag beiden Gattungen angehören. Auf jeden Fall kann *Manil Kara* nicht Linne's *Minusops Kauki* seyn, wofen diese 8 Staubfäden hat, wie *Robert Brown* anzunehmen scheint.

Bei *Minusops* herrscht übrigens eine große Verwirrung. *Burmah* (Thes. zeyl. 133) führt für den Kauken *Indorum* an: die *Elenzi* des *Hortus malabaricus* und *Hermann's*

*Museum zeylanicum* 33, und sagt: es sey die *Morumal* der Ceplonesen; Linne dagegen sagt: *Flora zeylan.* 137; beide Gattungen von *Minusops* hießen bey den Ceplonesen *Munamul* oder *Manghunamul*, und führt S. 23 von *Hermann* für den Kauken von *Burmah* an.

## 23. *Kara Angolam* pag. 55 t. 26.

Eine andere *Angolam* steht Taf. 17. Es scheint sonderbar, daß die Brahmanen von Malabar diese Pflanzen nicht für sippenverwandt halten, da sie die eine *Angolam*, die andere *Namidou* nennen: dabey vermuthet ich aber einen Fehler bey *Xheede*, welcher in solchen Dingen keineswegs genau war.

*Kay* hellte die Sache dadurch nicht auf, daß er die Pflanze *Prunifera indica* nannte. Niemand hat mehr daran gedacht bis auf *Lamarck*, der sie *Alangium hexapetalum* nannte (Enc. I. 174). *Poiret* hält *Loureiro's* *Diatoma* nicht für verschieden (Enc. suppl. II. 469, V. 551). Allein *Diatoma* soll eine lappige Narbe haben, *Kara Angolam* aber eine ganze. Ich habe sogar die Vermuthung, daß *Diatoma* die *Kare Kandel* des *Hortus malabaricus* (V. tab. 13) seyn kann, worauf ich zurückkommen werde.

*Plukenet's* *Arbor baccifera Maderaspatana*, *Mali citraeae foliis, nonnihil scabris, fructu coronato, gemello, ad sinum foliorum, pediculis curtis insidente*, welche *Lamarck* zweifelhaft für sein *Alangium hexapetalum* ansieht, kann wohl nicht zu dieser Sippe gehören, da die Tracht so verschieden ist.

*Vahl* und *Willdenow* (II. 1175) nehmen *Lamarck's* *A. hexapet.* an. *Korburgh* hat im *Hortus beng.* auch ein *Alangium hexapetalum*, welches mild wachsen soll. Da er dabey den *Hortus malabaricus* nicht anführt, so könnte es *Loureiro's* *Diatoma* seyn: denn ich habe *A. hexap.* nie gesehen: dabey ist *A. tomentosum* (Enc. I. 174) in allen Wäldern sehr gemein südlich vom Ganges; es heißt im Hinduw-Dialect *Dhela*. Hier die Beschreibung:

*Arbor magna. Ramuli teretes, pubescentes, brevioribus apice saepe spinoscentibus. Folia alterna, ovata-oblonga, acuta, integerrima, costata, nervis subtus reticulata, supra pilis brevissimis raris, subtus longioribus densioribus pubescentia. Petiolus brevissimus, teres, supra planiusculus, tomentosus.*

*Flores ex anni praeteriti foliorum axillis saepius gemini, gemma foliosa interposita subsessiles, odorati, subalbidi. Bractaeae squamaceae. Calyx superus, brevissimus, subocto dentatus. Petala circiter octo, linearia, revoluta, imo calyci inserta. Filamenta plura, indefinita, extra germinis discum inserta, ad medium erecta, barbata. Antherae lineares. Germen turbinatum, disco magno concavo intra calycem coronatum. Stylus staminibus longior, incrassatus. Stigma magnum, simplex.*

*Drupa nucis moschatae magnitudine ovalis, calyce cylindrico coronata, nigra, corticosa. Cortex mollis, crassus. Pulpa alba, mollis, nuci adhaerens, dulcis. Nux ovata, acuminata. Funis umbilicalis e basi nucis ad seminis apicem decurrens. Semen ovatum, acuminatum,*

amarum. Integumenta gemina, tenuissima. Albumen forma seminis, album. Embryo inversus, rectus. Radicula teres. Cotyledones foliaceae, planae, nervosae, magnae, tenues.

In den Wäldern von Magadha fand ich einen Baum mit Namen *Cphota Gandai* im Hindwi-Dialect, welcher ungeachtet des verschiedenen Namens die auffallendste Ähnlichkeit mit dem vorigen hat, nur sind die Blätter breiter, glatt und glänzend auf der Oberseite; sah aber weder Blüthe noch Frucht. Ein Exemplar davon im indischen Haus.

#### 24. *Theka seu Thekka* p. 57 t. 27.

Wir haben hier 4 Pflanzen der indischen Volksippe *Thekka*, und *Sailo* der Brahmanen auf Malabar (auf der Tafel fehlerhaft *Saiko*): sie haben aber, wie schon Commelyn bemerkt, keine Ähnlichkeit mit einander und gehören nicht einmal zu einerley Familie. Der Prototyp dieser Sippe liefert das beste Zimmerholz zu Haus und Schiff, und hat deshalb zuerst die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und wurde schon von Bontius und Nieuhoff mit der Eiche verglichen, mit der sie aber nur im Holz Ähnlichkeit hat. Plukenet erwähnt nur die Namen von *Xheede* und *Bontius*, sagt aber (*Mantissa* 178), sie wachse auf der Insel Johanna, welches andeuten würde, daß sie in Africa so gut vorkäme wie in Asien. In seinem Almagest nichts davon; noch weniger vergleicht er sie mit *Terebinthus*, wie der ältere *Burmann* anführt in seinen Bemerkungen zu *Xumph*.

Der letztere spricht auch zuerst wieder davon nach *Xheede*, und nennt den Baum *Jatus* nach dem Malayischen *Jati*, welches dauerhaft bedeute, nicht Eiche, wie sich *Commelyn* einbildet, welcher Baum den Eingebornen ganz unbekant ist.

Nach *Xumph* hat sich um diesen schätzbaren Baum niemand mehr bekümmert, bis ihn der jüngere *Linne* in seinem *Supplemente Tectona grandis* nannte, nach einer gezwungenen Ableitung von *Tecton* (*Faber*). Inbessen wurde der Name beygehalten, bis auf *Poiret*, welcher *Theka* vorzieht (*Enc. VII.* 592).

Im Königreich *Wa* heist er *Kiun*; es ist aber daselbst eine andere Gattung, *Talabat*, viel gemeiner, jedoch fast nicht benutzt, obgleich sie sehr zierlich ist. Die Schreiner polieren mit dem Laub ihre Arbeiten. Ich schickte davon Exemplare und Zeichnungen an *Joseph Banks*.

*Jussieu* stellt den *Theka* zu den *Vitices*, ich aber glaube, er sey den *Borragineen* näher verwandt wegen der Zahl der Staubfäden und der regelmäßigen Blume. Hier die Beschreibung.

*Theka ternifolia*. Habitat in *Avae* collibus sterilissimis. Arbor inter minores. Rami hexagoni, obtusanguli; juniores trisulci, lanati. Folia terna, elliptica, integerrima, acuta, costata, venis reticulata; supra papillosa, hispida, ad nervos pilosa; subtus tomento albo, molli pubescentia. Petiolus brevissimus, semiteres, tomentosus, non stipulaceus. Inter tomentum pili nonnulli stellati.

Corymbi axillares, terni, folio longiores, patentes, 3ff 1838. Heft 6.

ramosissimi, divisionibus inferioribus 3 seu 5fidis, superioribus dichotomis; flore in dichotomia sessili. Rami tomentosi, rigidi. Bractee ad corymbi divisiones singulas binae, lineares, pubescentes. Flores parvi, coerulei, erecti.

Calyx monophyllus, persistens, superne ampliatus, laciniis reflexis, ovatis quinquefidis. Corolla monopetala, infundibuliformis; tubus longitudine calycis supra dilatatus, ore patente, quinquangulari intus pilosus; limbus reflexus, laciniis ovatis, obtusis quinquepartitis. Filamenta quinque, subulata, erecta, longitudine pilorum apici tubi inserta. Antherae cordatae. Germen in fundo calycis minutum. Stylus longitudine staminum teres. Stigma lobis acutis bifidum.

Nux calycis fundo aucto tecta, laciniis coronata, oblonga, laevis, quadricularis, tetrasperma.

#### 25. *Katou Theka s. Catu Tekka* p. 59 t. 28.

Die Gattungsnamen *Katou* et *Vana* bedeuten beyde wild. Die Brahmanen von Malabar scheinen für diese Pflanze zwey Cippennamen zu haben: *Sailo* und *Papalou*; der erste ein roher Versuch zur Classification, indem er auch die *Theka robusta* einschließt.

*Papalou* versteht ich nicht.

Ich habe schon (*Linn. Trans. XIII.* 549) *Burmänn's* Fehler gerügt. *Poiret* macht einige passende Bemerkungen (*Enc. V.* 1). Steht die Frucht über dem Kelch, so, denkt er, müsse sie zu den *Verbenaceen* gehören: allein sie hat, wie *Theka*, 5 Staubfäden und eine regelmäßige Blume, und kommt mithin den *Borragineen* näher. *Poiret* gesteht indessen, daß die Frucht vom Kelche gekrönt zu seyn scheint, und dann müßte sie zu den *Rubiaceen* gehören neben *Psychotria*; nur scheint sie einsamig zu seyn; diese zweysamig. Obschon indessen die Figur nur einen Samen zeigt, so kann man wenig darauf bauen, weil viele Pflanzen einen Samen zu wenig bekommen, bey welchen in der Regel 2 und mehr sind. Es ist sehr wahrscheinlich, daß diese Pflanze die sippichen Charaktere der *Webera* hat, wie sie *Willdenow* (1224) gegeben, aber nicht die von Gärtner, welche von *Xheede's* *Cupi* genommen sind, wie ich in meinem Commentar über *Hortus malabaricus* (II. 37 t. 23) bemerkt habe. Da *Willdenow* Exemplare seiner *Webera corymbosa* hatte, so mögen seine Charaktere richtig seyn, wenn er die Frucht untersuchen konnte. In diesem Fall ist aber *Xheede's* *Cupi* unrichtig angegeben, und daher dürfen wir vermuthen, daß *Katou tekka* *Willdenow's* *Webera corymbosa* ist.

#### 26. *Tsjerou theka s. Tsjerou Tekka* p. 61 t. 29.

Dieses ist eine andere sehr unähnliche Pflanze, welche von den Malabaren mit *Theka robusta* zu einerley Sippe gebracht wurde. Durch ein Versehen stellt sie *Plukenet* (*Mantissa* 26) zu seiner *Arbuscula barbadensis amplexicaulis triphyllus* (*Almagest* 48, *Phyt. L.* 145. F. 4.). Bey spätern Schriftstellern wird sie nicht mehr angeführt: es ist aber augenscheinlich ein *Clerodendron*, wie es *Jussieu* (*Ann. mus.*

VII.) und Robert Brown (Nov. Holl. I. 316) aufgestellt hat. Ich fand in Mysore eine Pflanze, welche ich für dieselbe halte und zwar für *Volcaneria serrata* (Willdenow III. 384), wie auch Roxburgh. Seitdem habe ich in Nepal und im nördlichen Bengalen eine Varietät davon gefunden, welche zwar im Aussehen sich ziemlich unterscheidet, aber im ganzen Bau der ersten doch so ähnlich ist, daß ich sie nicht als besondere Gattung ansehen kann. Hier die Beschreibung der Pflanze von Mysore und die wenigen Abweichungen der aus Nepal.

*Clerodendrum serratum*. Habitat ad sylvarum margines in Carnata. Radix crassa, lignosa, amara. Caulis lignosus, duos pedes altus, erectus, sulco ex ima folii parte utrinque decurrente angulatus, laevis, simplex. Rami pauci, breves, axillares oppositi vel terni. Folia aliquando opposita, saepius ternata, subsessilia, oblonga vel elliptica vel cuneiformia, serrata saepius ovata, aliquando obtusa, glabra, costata, venosa, non stipulacea.

Panicula terminalis, erecta, folio longior, obtusa, densa. Rami oppositi vel terni, trichotomi, tomentosi. Bractae ovatae vel oblongae, acutae, integerrimae, pubescentes, persistentes, ad singulas paniculae divisiones oppositae vel ternae. Flores magni, coerulescentes, laciniarum intermedia saturatiore.

Calyx turbinatus, quinque dentatus. Corollae tubus calyce duplo longior, crassus, teres: limbus patentissimus, quinquepartitus laciniis ovatooblongis, secundis, intermedia longiore, concava, ad basin bisulca. Filamenta ex tubi apice didynama, subulata, parallelo approximata, basi pilis imbricatis, fissuram versus petali summam declinata, dein incurva. Antherae oblongae. Germen superum, subrotundum. Stylus subulatus, staminibus longior. Stigma bifidum, acutum, lacinia superiore brevior.

Bacca depresso-turbinata, quadriloba, e quatuor coalitis composita, quadrilocularis, calyce infra oblecta. Semina solitaria, globosa, nonnullis saepe abortientibus.

Varietas  $\alpha$ .

Buya Taeldar Bengalensium.

Huriya montanorum Hindice.

Hab. in Bengala boreali et Nepala.

Frutex sex pedes altus, subscandens, ramis tetragonis.

## 27. *Ben Theka* seu *Teka* p. 63 t. 30.

Wieder eine Gattung der unrichtigen Hindu-Sippe *Theka* oder *Sailo*. Ben bedeutet weiß. Hey keinem Botaniker findet man Vermuthungen über diese Pflanze; sie scheint zu den Solanaceen zu gehören.

## 28. *Iripa* pag. 65 tab. 31.

Im Commentar über das Herb. amb. I. 167 habe ich das Nöthige gesagt; man hält die Pflanze für *Cynometra ramiflora* Linne.

## 29. *Kalesjam* seu *Calesani* p. 67 t. 32.

Der letztere Name auf der Tafel sollte wohl *Calesam* heißen. *Kalesjam* ist ein in Indien gemeiner sippischer Name, der aber sehr unregelmäßig angewendet wird, z. B. auf eine aus den Aesclepiadeen und auf die zwei folgenden, welche sich näher verwandt sind. Mourmouratarum der Brahmanen ist ein Wort, das ich nicht verstehe: denn der Baum heißt im Sanscrit Jiyal, welches die Bengalesen in Jiyal verberben; im Hindwi: Dialect ist der Name Kashmirula oder Kusambhar.

Commelyn bemerkt richtig, daß Kherde's sogenannte 2te Art von Frucht ein galläpfelartiger Auswuchs ist, d. h. die Arbeit eines Kerfs. Ray gab, wie gewöhnlich, dieser Pflanze einen neuen Namen, der ihm zu seiner Anordnung paßte; sein späterer Botaniker hat sie classificirt; nur Lamarck hält sie für verwandt mit Brucea, Comocladia, Rhus und andere Sippen unter den Terebinthaceen (Encycl. t. 559). Das halte ich für richtig und glaube, daß sie nicht von Rhus getrennt werden kann. Roxburgh aber scheint mir dieselbe unter dem Namen Odina wordier (Hort. beng. 29) beschrieben zu haben, obgleich er den Hort. malab. nicht anführt: ich kenne aber keine Pflanze, welche in Bengalen sehr gemein ist und sich auch in Kankana findet und in den nahe liegenden Theilen von Karnataka, wo sie Godala heißt. Unter diesem Namen und unter dem von Roxburgh, sowie unter dem von Rhus odina, welchen ich für den besten halte, schickte ich Exemplare an J. E. Smith und das indische Haus. Hier die Beschreibung nach den Vermuthungen, die ich in Mysore aufgezeichnet habe.

Arbor magnitudine mediocri, succo resinoso scattens. Rami cicatricibus obcordatis exasperati. Folia decidua, alterna, cum impari pinnata, apices versus ramulorum congesta, non stipulacea. Pinnae oppositae, bi-vel trijugae, integerrimae, latere posteriore ad basin latiore obliquae.

Paniculae utriusque sexus ante folia prodeuntes e gemma terminali, at post foliationem laterales, compositae, ramis sparsis, patentibus, pubescentibus. Bractae infra singulas paniculas, quasi petiolorum rudimenta, subulatae. Flores fasciculati, parvi, intus lutei, extra rubicundi, dioeci; sed in planta foeminea flores nonnulli masculi saepe intermixti.

Masc. Calyx quadrifidus, parvus. Petala quatuor, margine revoluta oblonga, concava, obtusa, ungui lato calycis inserta. Filamenta sex, septem vel octo subulata; petalis breviora, alterna epipetala, alterna hypogyna. Rudimentum germinis superi minimum. Stylus brevis. Stigma quadrilobum.

Foem. Calyx et corolla maris. Stamina octo circiter sterilia. Germen superum, oblongum. Styli quatuor remoti, brevissimi. Stigmata simplicia.

Drupa oblonga, compressa, punctis quatuor prope apicem notata. Nux solitaria, monosperma.

## 30. *Katou Kalesjam* seu *Catu Calesjam* p. 69 t. 33.

Commelyn hält diese für ähnlicher dem Sorbus als

der vorigen Pflanze, mit welcher sie vom Volke in Malabar zusammengestellt wird; allein sie gehört zu den Terebinthaceen und ist der Sippe *Schinus* sehr nahe verwandt. Ray und Plukenet (Almagest 355) nennen sie *Sorbus spuria malabarica*, Katou Kalesjam dicta. Spätere Botaniker haben sie nicht erwähnt bis auf Roxburgh, der sie für *Garuga pinnata* citirt (*Hortus bengalensis* 33), von der aber bis jetzt keine Beschreibung gegeben ist. Daher will ich sie hier mittheilen.

1801. Schickte ich Exemplare aus Mosore an J. E. Smith unter dem Namen *Ekeberga serrata*, später aus dem nördlichen Indien ins indische Haus: denn es ist einer der am allgemainsen verbreiteten Bäume in dieser Gegend. Im Hindvi-Dialect von Kankana heist er Mau, wovon das Moemoe der Brahmanen von Malabar eine Verdoppelung ist.

Arbor mediocris. Rami succo albido scatentes, cicatricibus obcordatis exasperati. Folia decidua, alterna, conferta, cum impari pinnata. Foliola novem circiter utrinque, oblonga, latere posteriore ad basin angustiore longiore obliqua, opposita, serrata, acuminata, costata, venosa, lateralibus subsessilibus, impari petiolato; insuper petiolo communi utrinque insidunt foliola duo vel tria minuta, falcata, quorum duo infima stipulas mentiuntur. Petioli inam versus incrassatus, obsolete trigonus, foliolis longior, non stipulaceus.

Paniculae plures, patentēs, congestae, terminales, ante folia prodeuntēs; ramis subangulatis, pubescentibus, patentibus. Bractae squamiformes, caducae, sparsae.

Calyx deciduus, coloratus, ad basin intus disco hypogyno decem striato vestitus, quinquefidus lacinis erectis acutis. Petala quinque oblonga, calyce paulo longiora, apice revoluta, ad calycis incisuras inserta. Filamenta decem subulata alternis longioribus, pone disci crenas inserta.

Antherae oblongae. Germen ovatum, quinqueloculare. Stylus teres longitudine staminum et calycis. Stigma incrassatum, quinquelobum. Bacca magnitudine nucis moschatae subrotunda, loculo uno vel altero tantum fertili, succulenta. Semina solitaria, integumento duro nuciculosa. Perispermum nullum. Cotyledones foliaceae, plicatae, virides.

Zu den Wäldern von Gorakhpur und Shahabad (*Cosala* et *Cicata*) fand ich bey den obigen sehr nahe verwandte Bäume, da ich aber zwey davon nur im Laube fand, so weiß ich nicht, ob sie zu derselben Sippe gehören. Sie gleichen jedoch so sehr der *Catu Calesjam*, daß ich nicht weiß, ob sie als besondere Gattungen zu betrachten sind. Hier die Beschreibung von Ort und Stelle.

*Garuga*? *Pharhad* Hindice. *Habitat in Cicatae sylvis.*

Arbor mediocris. Ramuli crassi, teretes, cicatricibus reniformibus notati, juniores pilis erectis mollioribus hirti. Folia alterna, cum impari pinnata, 4—6 juga. Pinnae oppositae, oblongae, serraturis magnis obtusis incisae, acuminatae, costatae, venis plurimis reticulatae,

utrinque pilis plurimis longis erectis hirtae, basi acutiusculae; laterales costis anterioribus longioribus obliquae. Petiolus non stipulaceus, foliolis imo longior, basi incrassatus, subanceps, pilis plurimis longis hirtus. Rachis hirtus, teretiusculus. Petioli partiales hirti; laterales brevissimi, terminalis brevis.

*Garuga*? *Kengkar* Hindice. *Habitat in Cosalae sylvis.*

Foliola quam in praecedente minus hirta, molliora 9—12 juga. Folia nunc fere glabra, tunc hirsuta, nunc foliolis falcatis instructa, tunc destituta, unde dubito an a planta Roxburghii satis distincta.

*Garuga*? *Khamar* Hindice. *Habitat in Cosalae sylvis.*

Folia decidua, impari pinnata, 5—7 juga, cum foliis nonnullis parvis falcatis saepe deciduis, quorum duo ima stipulas mentiuntur. Foliola oblongo ovata, latere posteriore angustato obliqua, acuta, serrata, costata, venis reticulata, subopposita; terminale pedicello elongato elevatum; novella pilosiuscula, sed ante maturitatem pili decidui.

Paniculae ante folia erumpentes, facie terminales, sed foliis prodeuntibus novis infra foliaceae, ramosissimae. Rami sparsi, angulati; divaricati, nudiusculi. Bractae squamiformes, vage, parvae, caducae. Flores odorati, e luteo rubescentes.

Calyx campanulatus, coloratus, intus disco decem crenato vestitus, basi decem striatus, quinquefidus. Petala quinque calycis lacinis duplo longiora, oblonga, disci apici inserta. Filamenta decem, crenis disci inserta subulata, alternis longioribus calycem aequantibus. Germen superum, stipiti crasso insidens, subrotundum. Stylus teres longitudine staminum. Stigma subrotundum quinquelobum.

Bacca calyce minuto emarcido insidens, magnitudine nucis Avellanae turbinata, submucronata, quinquelocularis, loculis nonnullis semper fere abortientibus.

### 31. *Ben Kalesjam* s. *Calesam* p. 71 t. 34.

Der Name *Ben* heist weiß; der Name *Katou* ben der vorigen heist weiß; beyde Namen passen auf beyde Pflanzen. Der brahmanische Name in Malabar ist nach dem Terte *Mourmoura*; auf der Insel Zelara, über welchen Unterschied ich keine Auskunft geben kann.

Commelyn bemerkt richtig, daß die Figur, welche die Frucht vorstellen soll, nur ein Auswuchs ist, verursacht von einem Kerf; so *Poirer* (*Encycl. suppl.* I. 613). Er ist der einzige neuere Botaniker, welcher sie erwähnt und zu den Sapindaceen stellt. Ich habe aber eine Gattung von *Schinus* mit der Frucht gefunden, welche der *Ben Kalesjam* sehr gleicht, wofen sie wirklich verschieden ist. Inbeßsen muß man zugeben, daß die Sapindaceen und Terebinthaceen, zu welchen *Schinus* gehört, sich sehr nahe verwandt sind, und nur durch kleine Unterschiede in der Frucht abweichen, aber nicht besonbers

durch das Aussehen. Ich beschreibe nur die erwähnte Pflanze, welche vielleicht einerley mit *Ben Kalesjam*.

*Schinus Saheria*. *Ben Kalesjam Hortus malab. 71 t. 34?* Saheri Hindice. Hab. in Magadhæ sylvis.

Arbor magna, ramulis crassis tomentosis. Folia alterna, cum impari pinnata. Foliola 5—7 juga, opposita, petiolata, oblonga, acuminata, integerrima, supra nisi ad nervos nuda, subtus pilosa, costata, venis minute reticulata; lateralia costis posterioribus abbreviatis subsemiovata; terminale basi acutum. Petiolus communis basi incrassatus, subangulatus, pubescens, mediocris, non stipulaceus. Rachis ad foliola nodosus, angulatus, pubescens. Petioli parciales, utrinque incrassati, canaliculati, pubescentes, brevissimi, terminali cæteris duplo longiore.

Panicula in ramulo novo infra foliaceæ, vel ex axillis foliorum inferiorum, folio breviores, angulatæ, pubescentes. Ramuli alterni, breves, subquinquefide id est bis bifidi, bifurcatione primaria florifera. Bractea vix ullæ. Flores parvi, herbaceæ.

Calyx minimus quinquefidus, concavus, disco decem crenato tectus; crenis alternis latioribus, dorso emarginatis. Petala quinque ovata, pubescentia, patula, ungue lato perigyna, calyce alterna, crenis disci latioribus opposita. Filamenta decem disci margini inserta, basi lato subulata, petalis breviora, quinque petalis opposita cæteris paulo longiora.

Antheræ cordatæ. Germen ovatum disco immersum. Stylus nullus. Stigma obtusum, pilosum.

Dieser Baum war wahrscheinlich männlich; ich sah keinen weiblichen; die Frucht aber soll eine eßbare Beere seyn. Sie blüht im Frühling; aber die Saheri, welche ich im November sah, hatte Foliola serraturis magnis remotis incisa. Ich glaube jedoch nicht, daß sie deshalb eine besondere Gattung ist, und dieser Umstand verbindet sie noch besser mit *Ben Kalesjam* und den unter dem Namen Garuga beschriebenen Pflanzen. In Rheede's Figur ist kein Blatt mit einem Endblättchen dargestellt; aber die 3 untern Blätter sind augenscheinlich abgebrochen, um Raum für den Malar zu gewinnen, und selbst das oberste ist unvollkommen. Um desswillen habe ich die Figur nur zweifelhaft citirt.

In den Wäldern des Districtes Nungpur auf der Nordseite des Brahmaputra fand ich einen Baum, welchen ich in den Exemplaren für das indische Haus *Schinus bengalensis* nannte. Er ist dem vorigen sehr nahe verwandt, wie es die folgende Beschreibung zeigt.

Arbor magnitudine mediocris, odore terebinthaceo. Ramuli pilis brevissimis herbaceis pubescentes. Rami teretes, cicatricibus parvis notati. Folia alterna, cum impari pinnata, 3—5 juga. Foliola subopposita, basi obliqua ovata, inaequaliter, acuminata, apicem versus serrata, omnia pedicellata, supra nuda, subtus pilis herbaceis raris pubescentia, venosa. Petiolus teres, pubescens. Rachis non alata.

Panicula axillares vel infrafoliaceæ, folio multo

breviores, ramis alternis, teretibus, pubescentibus, paucifloris, divaricatis. Flores parvi, herbacei, omnes quos vidi pseudo-hemaphroditi, abortivi.

Calyx minimus, quinquefidus. Petala quinque ungue lato. Filamenta decem, perigyna, petalis breviora.

Antheræ parvæ. Germen ovatum, superum, minimum, disco decem crenato circumdatum. Stigmata tria obsoleta, crassa.

In den Wäldern auf der andern Seite des Brahmaputra fand ich einige Monate später einen Baum in der Frucht, welchen die Eingebornen Niyar nennen und der dem vorigen auffallend gleicht, wenn er wirklich verschieden ist. Ich muß bemerken, daß der Hauptunterschied sowohl hier als im Saheri zwischen dem Baum mit ausgewachsenen Blättern und dem Baum in der Blüthe darin besteht, daß die Blätter des einen ganz sind, des andern gefügt. Hier meine an Ort und Stelle ausgenommenen Bemerkungen.

*Schinus Niara*. Niyar Bengalensium. Habitat in Camrupæ orientalis monticulis. Arbor præcedenti similis, sed foliola angustiora saepius integerrima.

Bacca corticosa, supera, pulpo viscido cum Euphoriae consistentia esculenta farta, 1—4 locularis, seminibus varie abortientibus.

Nuculae solitariae, angulatæ. Perispermum nullum. Cotyledones foliaceæ, complicatæ, virides.

### 32. *Ponga seu Pongu* p. 73 t. 35.

Rheede sagt im Text mit seiner gewöhnlichen Nachlässigkeit: die Brahmanen nannten diesen Baum Helay, auf der Tafel Calo dumpu. An einer Stelle sagt er: die Portugiesen nennen ihn Massao spinosa, und an einer andern Tsjakado Mato; wegen dieser Ähnlichkeit nennt ihn Commelyn Jaca minor sylvestris malabarica. Ich muß übrigens bekennen, daß die Figur der durchschnittenen Frucht wenig Ähnlichkeit hat mit einem Artocarpus und aus einer Menge einblättriger Kelche zu bestehen scheint, wovon jeder in dornige Abtheilungen endigt; auch zeigen sich weder Geschlechtsheile noch Samen.

Plukenet war nicht viel glücklicher als Commelyn, indem er die Ponga (Mantissa 42) verglich mit seiner Cenchramidea arbor pilulifera, fructu tuberculis inæquali, ex granulis conformibus in orbem glomerato, non capsularis (Almagest 92, Phytogr. t. 156. f. 3), welche gefügte Blätter hat, und sowohl nach ihrem Namen Cenchramidea als nach ihrer Tracht ein Bubroma seyn muß.

Der ältere Burmann irte noch mehr, indem er die Ponga für Rumphs Cussambium (Herb. amb. I. 157) hielt, worauf Lamarck (Enc. II. 230) einen gewissen Zweifel legte, worüber man sich wundern muß: denn obgleich er beyde Pflanzen für verschieden erklärt, so nimmt er doch, verleitet durch Burmanns Meynung, die Blättlein des Cussambi für ein Blatt; aber die Blätter von Ponga sind einfach, die von Cussambi gefiedert.

**Poiret** (Enc. V. 563) war glücklicher. Er hielt die **Ponga** für eine **Papyrius** oder **Broussonetia**, was nach meiner Meinung wirklich der Fall ist. Ich nehme daher an, daß die Figur des gerichnitterten **Capitulum** die weibliche Blüthe vorstellt, ehe das sonderbare **Receptaculum** die Samen in die Höhe gehoben hat.

In den Wäldern bey **Goyál para** an der Südseite des **Brahmaputra** habe ich eine Gattung dieser Sippe mit reifer Frucht gesehen, welche in den Blättern sehr der **Ponga** gleicht; aber ihre Frucht ist viel zu klein und steht auf einem zu langen Stiel, als daß man sie für eineley halten könnte. Die Exemplant in indischen Hause habe ich genannt **Papyrius seu Broussonetia integrifolia**, welcher Name übrigens auch auf **Ponga** paßt; um sie jedoch gehörig zu unterscheiden, will ich die Pflanze beschreiben, welche ich gesehen habe.

**Arbor mediocris, succo pellucido turgida. Ramuli teretes, tomentosi. Folia alterna, oblonga, basi obtusa, acuminatissima, integerrima, costata, venis minutissime reticulata, supra nudiuscula, subtus pilosa. Petiolus brevissimus, teres, sulco supra exaratus. Stipulae gemmaeae, caducae.**

**Flores non vidi. Pedunculi fructiferi axillares, sed folio deciduo plerumque nudati, saepius ex eodem axillo quatuor bis bifidi, petiolo paulo longiores.**

**Bacca pisiformis, echinata, alba, composita e receptaculis circiter duodecim, receptaculo communi indentibus, pulposis, apice umbilicato semina totidem gerentibus. Semina ovata, dura.**

(Fortsetzung folgt.)

## B e y t r ä g e

zur Kenntniß der Coleopteren der Türkei  
von Dr. med. **Waltl** zu Passau.

Während fast alle Länder des südlichen Europas von Entomologen bereiset und die dort vorkommenden Insecten fleißig gesammelt wurden, z. B. Andalusien von uns selbst und vom Dr. Rambur, jetzt zu Paris, Spanien überhaupt von Bory de St. Vincent, Bedeau und Goudot, und früher schon vom Grafen Dejean und L. Dufour; Portugal vom seel. Grafen von Hofmannsegg, Sicilien vom seel. Dahl und Helfer, der jetzt in Ostindien lebt, Sardinien vom Dr. Küster, Griechenland von der französischen Expedition während der Occupation Moreas durch die Franzosen, Dalmatien vom Grafen Dejean, Parceß und anderen, blieb die fruchtbare Türkei für die Entomologen eine terra incognita, und man zitterte schon bei dem Gedanken, in dieses Land einzubringen. Endlich kam Dr. Frivaldski auf den Gedanken, zwei geliebte Märsche zum Sammeln dahin zu senden, welche auch fleißig sammelten und die erbeuteten Schätze nach Pesth sandten. Sie selbst kamen nicht mehr zurück, der Eine durch die tödtliche Kugel eines Fanatikers, der Andere durch die Pest dahingerafft. An der Ausbeute sieht man leider, daß sie nur fleißige Sammler, aber

keine Entomologen waren, denn die kleinen unansehnlichen Insecten wurden von ihnen nicht gesammelt. Im Jahre 1835. und 36. sammelte Alb. Kindermann jun um Konstantinopel, wohin er absichtlich eine naturhistorische Reise gemacht hatte, was um so leichter aing, da der Eusz der Dampfschiffahrt bis nach Konstantinopel schon geregelt war. Die Ausbeute war bedeutend an Coleopteren, gering an Lepidopteren. Da er aber leider die Sache nur als Sammler betrieb und ebenfalls die kleinen Arten nicht berücksichtigte; so fehlt uns immer noch viel, die Coleopteren-Fauna der Türkei genau zu kennen, und es ist noch eine Nachlese zu machen, die bei einem längeren Aufenthalte in diesem von der Natur so gesegneten Lande, wo die Insecten durch die vernichtende Thätigkeit des Menschen noch nicht vermindert oder theilweise vertilgt sind, sehr bedeutend ausfallen wird. Wenn man bedenkt, daß die unfruchtbare Mark Brandenburg so reich an Coleopteren ist, wie wir durch Dr. Erichsons Fauna dieser Provinz erfahren; so leuchtet von selbst in die Augen, daß die Türkei eine Unzahl uns noch unbekannter Käfer beherberge. Da wir es kaum erleben werden, eine Fauna der Türkei von einem Türken herauszugeben zu sehen, obwohl diese Nation schnelle Fortschritte in der Cultur macht; so entschlossen wir uns, einige Vorträge zur Kenntniß der türkischen Coleopteren bekannt zu machen, und bebauen, daß wir nicht im Stande sind, mehr zu leisten. Wir werden nur diejenigen Arten aufzählen, die wir erhalten konnten, und die beschreiben, welche noch wenig oder gar nicht bekannt sind. Wir haben stets den von Dr. Frivaldski gegebenen Namen beibehalten. Derselbe hat bereits die meisten neuen Arten in ungarischer Sprache beschrieben, was aber für uns Deutsche eben so viel ist, als wenn es chinesisch abgefaßt wäre.

In Hinsicht auf geographische Verbreitung der Insecten stoßen wir bei genauer Betrachtung der aufgezählten Coleopteren auf merkwürdige Thatfachen. Die **Heteromera**, die dem Süden Europa's und dem nördlichen Theile Afrika's fast ausschließlich angehören, sind oberhalb dem 43° n. B. noch sehr selten, entwickeln sich aber unter dem 42° schon, und nehmen an Anzahl zu bis zum äußersten Punct des Südens, also bis zum 37. Grad. In Dalmatien stößt man noch nicht auf **Pimelien**, wohl schon um Konstantinopel, und um Cadix wimmelt alles von diesen Thieren. Die bedeutende Anzahl der blätterföhrigen Käfer läßt uns nicht zweifeln, daß die Vegetation üppig ist, und die vielen Dorcadien beweisen das Vorhandenseyn großer Steppen, denn diese Thiere sind wahre Steppenbewohner. Die Wupressen sagen uns, daß das Land noch nicht baumleer ist, und daß die Vernichtungswuth des Türken, obwohl sehr verächtigt, doch nicht so groß ist, als die der Spanier, die den Bäumen ewige Feindschaft geschworen haben und in diesem Puncte in der Cultur den Türken nachsehen. Die geringe Anzahl der Laufkäfer läßt uns ohne Landkarte die südliche Lage des Landes erkennen und einen solchen Wärmegrad, der im Stande ist, den Woben auf längere Zeit so auszutrocknen, daß das Fortkommen der **Carabiceina** schon sehr gehindert ist. Wir gehen nun zur Aufzählung und Beschreibung der Arten, und hoffen, letztere so genau gegeben zu haben, daß man darnach leicht Bestimmungen wird vornehmen können.

- 1) **Cicindela dilacerata** Dj.  
angulosa Ol.
- 2) **Polystichus fasciolatus** F.

- 3) *Cymindis meridionalis* Dj.
- 4) *Cephalotes nobilis* Dj.
- 5) *Ditonus dama* Rossi.
- 6) *Ditonus atrocaeruleus* Wl.

*Subtus lacte, supra obscure coerulescens, thorace lato, rotundato, capite exserto. Long. 8—9", latitudo 3 1/2".*

Der Kopf oben cylindrisch, nach den Augen zu mäßig erweitert, die Seiten flach, grob punctiert, von einer Fühlerbasis zur andern ein leichter Quereinschnitt, der Brustschild breit und ziemlich flach, nach hinten zu etwas enger werdend, oben ein leichter Längeneinschnitt, weder den vorderen noch hinteren Rand berührend, die ganze Oberfläche sehr grob punctiert. Die Flügeldecken gestreift, die Streifen aus zusammengeflochtenen Punkten entstanden, die Zwischenräume der Streifen sehr breit und sehr grob punctiert; der Rand der Flügeldecken heller gefärbt, an der Spitze leicht ausgeschnitten; die ganze Unterseite des Leibes schön stahlblau glänzend, die Füße dunkler, haarig und sehr robust.

**Anmerk.** Diese sehr schöne Species gehört zu der Abtheilung der *Ditoni*, bey welchen der Kopf nicht tief im Brustschild steckt. Lebt am Balkan.

#### 7) *Ditonus tenebrioides* Klg.

*Piceus, elytris atris, antennis palpisque rufis, capite exserto. Long. 6 1/2", lat. 2 1/2".*

Der Kopf mäßig groß, oben cylindrisch, die Augen wenig hervorragend, die ganze Oberfläche mit sehr groben Punkten (Grübchen), die hier und da zusammenfließen, bedeckt, die Oberseite sehr stark, an der Seite ausgeschliffen, so daß oben eine scharfe Kante entsteht, die Oberlippe scharf getrennt und einzeln punctiert. Der Brustschild flach, länger als breit, nach hinten etwas verhältnismäßig, grob punctiert, in der Mitte ein vollkommener Längeneinschnitt. Die Flügeldecken gestreift, die Zwischenräume flach, grob punctiert, jedoch ziemlich glatt, der äußerste mit einzelnen Gruben, die Spitzen der Flügeldecken an der Seite nur sehr wenig ausgeschnitten. Die Füße pechbraun, mäßig dick. Um Konstantinopel.

**Anmerk.** Diese Art ist durch den langen hinten verengten flachen Brustschild von ähnlichen sehr leicht zu unterscheiden.

- 8) *Ditonus nitidulus* Stev.
- 9) *Ditonus megacephalus* Wl.

*Totus ater, pedibus palpisque rufis, antennis fuscis, capite incrassato, exserto. Long. 4", lat. 1 1/2".*

Der Kopf verhältnismäßig sehr groß und dick, die Stirn in der Mitte mit breiter Vertiefung, diese mit groben Punkten versehen, die Augen sehr hervorragend, glänzend, die Ocelli nicht sichtbar. Der Brustschild mäßig groß, herzförmig, mit einzeln stehenden groben Punkten, in der Mitte ein schwacher unvollkommener Längeneinschnitt, die Flügeldecken punctiert gestreift, die Zwischenräume mit einzeln stehenden Grübchen, die Spitze nicht merkbar ausgeschnitten. Um Konstantinopel.

#### 10) *Procerus tauricus* Pall. Um Konstantinopel herum.

#### 11) *Procrustes caraboides* Friv.

*Totus ater, subtus politus, elytris coriaceis, lineis eminentibus interruptis subtribus. Long. 1" 2", lat. 6".*

Der Kopf ziemlich groß, die Stirn grobrunzelig, an der Oberlippe in der Mitte eine Vertiefung, vierseitig ausmündend; der Brustschild vorn ziemlich glatt, hinten gröber runzelig, in der Mitte ein Längeneinschnitt, der die Basis nicht berührt; die Flügeldecken grob warzig, die Warzen in einander verfließend und glänzend, während der Grund matt ist; auf jeder Flügeldecke 2 erhabene Längslinien, die öfter unterbrochen sind; von der Stirn ist nur eine Spur vorhanden. Die nächste an der Nath nähert sich gegen hinten zu derselben, geht nahe an der Spitze nach auswärts und verbindet sich mit der zweiten. Diese Art ist also leicht von andern zu unterscheiden. Am Balkan gesammelt.

**Anmerk.** Die Gattung *Procrustes* ist von *Carabus* nicht wesentlich verschieden. Will man sie als verschieden ansehen, so ist das leichteste Kennzeichen der mittlere Theil des Kinnes, der bey *Procrustes* breit und öfters in der Mitte ausgeschnitten ist, während er bey *Carabus* entweder gar nicht erhaben ist, z. B. *C. hortensis*, oder in eine Spitze ausgeht, z. B. *C. violaceus*. Man müßte auf diese Art auch das Genus *Carabus* trennen.

#### 12) *Procrustes Kindermanni* Wl.

*Totus ater, capite fere glabro, elytris punctis in lineas tres positus ornatis. Long. 1" 1", lat. 6".*

Der Kopf ziemlich glatt, der Brustschild wie bey dem vorigen, die Flügeldecken rauchwarzig, auf dem Grund glänzend, auf jeder Seite 3 Reihen weit auseinander stehender, der Länge nach gestellter breiter Vertiefungen (Punkte). Diese 3 Reihen beginnen nicht ganz an der Basis der Flügeldecken in einer Querlinie, also keine höher hinaufreichend als die andere. Verwechselt man dieser Käfer nicht leicht werden; denn der *P. Faudrasi* hatte eine matte Oberfläche, und der *P. rugosus* Dj. ist viel glänzender, runzeliger, und hat ganz unregelmäßig gestellte Punkte. — Er kommt um Konstantinopel vor.

#### 13) *Procrustes vicinus* Friv.

*Niger, thorace rotundato, elytris glabris, punctis singulis ornatis. GröÙe wie die des vorigen.*

Der Kopf mäßig rauh, matt, der Brustschild schön rund, an der Seite nach hinten zu aufgestülpt, in der Mitte eine schwache Längslinie, die Basis nicht ganz erreichend, mit feinen Runzeln, die nach der Quere auslaufen; die Flügeldecken von sogenanntem Leder: ober Fettglanz, glatt, nicht warzig, mit sehr wenig tiefen Punkten, dazwischen einzelne große Grübchen, doch nicht so regelmäßig, daß man sie in Längslinien gestellt betrachten kann. Am ähnlichsten ist diese Art dem *P. Faudrasi*, dieser jedoch viel schmaler und die Punkte der Flügeldecken deutlicher und in Linien geordnet zeigend. Am Balkan und um Konstantinopel.

#### 14) *Carabus graecus* Dj.



15) *Leistus coeruleus* Latr.

16) *Licinus agricola* Dj.

17) *Sphodrus conspicuus* Klg.

*Opacus*, fere metallescens, thorace elongato, parallelipipedeo, pedibus lanuginosis. Long. 11<sup>'''</sup>, lat. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>'''</sup>.

Der Kopf mit flachen Künzeln, Palpen und die kahle Basis der Fühler dunkelbraun, diese mit fuchstothten Haaren bedeckt; der Brustschild länger als breit, nach hinten wenig verschmälert, mäßig aufgestülpt, in der Mitte eine Längelinie, mit quer parallel laufenden Wellen, die Basis grob punctiert, der Hinterleib viel breiter als der Brustschild punctiert-gestreift, die Zwischenräume ganz flach, matt. Die Farbe hat einen Stich ins Metallische, ist übrigens fast schwarz. Verwechselt kann dieser Käfer nicht leicht werden, da er sich durch den Bau des Brustschildes so sehr auszeichnet. Der Sp. *cimmerius* Stev. hat den Brustschild vorn breiter, im Ganzen viel kürzer, ist kleiner und glänzender. — Um Konstantinopel.

18) *Spodrus cimmerius* Stev. Um Konstantinopel.

19) *Sph. terricola* Ol. Um Balkan.

**Anmerk.** Die Trennung des Genus *Spodrus* durch Dejean ist, wie die meisten Trennungen, nicht nur unnöthig, sondern auch unnatürlich. Wenn man wegen jeder kleinen Abweichung gleich neue Genera aufstellt, so kömmt es soweit, daß Niemand mehr eine Wissenschaft zu pflegen anfängt, die er so sehr der Mode unterworfen sieht. Zur Aufstellung guter Genera gehören mehr Kenntnisse, mehr Übung und Ueberblick, als die meisten Namensfabrikanten besitzen, die jetzt so viel Verwirrung anstiften.

20) *Zabrus segnis* Klg. Um Balkan. Konnten wir nicht erhalten.

21) *Gyrinus niloticus* Koll.

*Nitidus*, obscurus, incassatus, pedibus palpisque ferrugineis. Long. 3 — 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>'''</sup>, lat. 2<sup>'''</sup>.

Der Kopf glatt, glänzend, neben jedem Auge nach innen zu ein tiefes Grübchen, vor den Augen ein Quereindruck, der Mund mit Wimpern versehen, das letzte Palpenglied an der Spitze schwarz; der Brustschild hart am Vorderrande und mit diesem gleichlaufend mit einem tiefen Einschnitt am Discus des Brustschildes sich vertiefend, hinterhalb eine gleichlaufende, eben solche vertiefte Linie, an der Seite nicht bis an den Rand reichend, am Discus viel schwächer werdend und fast verschwindend, an der Seite gegen die Basis des Brustschildes eine 3te Linie, die oben nach der zweiten sich hinneigt und gegen den Rand zu sich verliert. Der Hinterleib dick, stark gewölbt; oval, die Flügeldecken fein punctiert gestreift, Nath und Rand gleichfarbig, Farbe dunkel mit einem Stich ins Metallische. Die Brust, der Rand der Flügeldecken und der After braun, die anderen Theile dunkel. Um Balkan und in Egypten.

**Anmerk.** Diese Art ist bisher noch unbekannt geblieben, nach der gegebenen Beschreibung jedoch von anderen Arten leicht zu unterscheiden. Uebrigens herrscht eine heillosse Verwirrung bey der Gattung *Gyrinus*, die man nur

dann aufhebt, wenn man die vielen Namen als Synonyme behandelt und ordnet.

22) *Buprestis cupressi* Dej. Um Konstantinopel.

**Anmerk.** Wie schon bemerkt wurde, haben wir die neuen Gattungsnamen von Dejean, als für uns werthlos, nicht angeführt.

23) *B. hirsutula* Friv. Am Balkan. Konnten wir nicht erhalten.

24) *B. tenebrionis* F. Der folgenden sehr ähnlich.

25) *B. tenebricosa* F. Auch in Dalmatien.

26) *B. geminata* Ill. Auch in Süd-Frankreich und Spanien.

27) *B. variolaris* F. Die Larve scheint im Innern von großen Distelgewächsen zu leben.

28) *B. porosa* Klg.

*Facie cariosae*. Lata, thorace punctato, opaco, maculis 5 nitidis et fovea profunda pone basin, elytris striatis. Long. 1<sup>''</sup> 2<sup>'''</sup>, lat. 6<sup>'''</sup>.

Der Kopf punctiert, im Innern der Grübchen Goldschimmer. Der Brustschild der Form nach wie der dem *B. carinosa*; grob und dicht punctiert, im Innern der Grübchen, besonders vorn Goldschimmer. Vor der Mitte 3 glänzende Flecken, der Quere nach stehend, und hinten an der Basis in der Mitte ein tiefes Loch, daneben zwei größere Glanzflecken. Die Flügeldecken oben sehr rauch gerunzelt, schwarz mit einem schwachen Goldschimmer, der beim lebenden und nicht abgetriebenen Thiere die Oberfläche ganz zu bedecken scheint, gegen die Spitze zu deutliche punctierte Streifen, nach der Basis der Flügeldecken zu sich verlierend. Unterseite des Körpers mit einem Goldschimmer, besonders an den vertieften Stellen. Um Balkan und um Konstantinopel.

29) *B. stigmatica* Friv.

*Plana*, thorace rugoso, elytris maculis 4 flavis ornatis. Long. 11<sup>'''</sup>, lat. 4<sup>'''</sup>.

Die Stirn eingedrückt, grob punctiert, in der Vertiefung eine Längenfurche, der ganze Kopf roth und goldglänzend. Der Brustschild grob und einzeln punctiert; an der Seite ein eckiger Vorsprung, von da nach hinten nur ein wenig sich verschmälert, in der Mitte am 2ten Drittel anfangend ein Längeneinschnitt, der nicht ganz bis an die Basis reicht. Die Flügeldecken sehr rauhrunzlig, mit 2 schwach erhabenen, ziemlich undeutlichen Linien, mit der Nath parallel laufend. Auf jeder Flügeldecke zwei Vertiefungen mit gelben Borsten besetzt, eine vor und die andere nach der Mitte stehend. Die Unterseite des Reibes und die Füße goldglänzend, die Tarsen stahlblau. Um Balkan und um Konstantinopel.

30) *Cantharis oculata* Gebler.

*Thorace et abdominis margine rufo, ore, palpis pedibusque ferrugineis, capite elytrisque nigris*. Long. 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>'''</sup>, lat. 2<sup>'''</sup>.

Der Kopf schwarz, graubaarig, der Mund braun, Fühler nur an der Spitze dunkel, Unterleib bis auf den Rand schwarz; der Brustschild breiter als lang, am Dicus 2 schwarze Flecken; Flügeldecken grau behaart. Am Balkan, ein Gebirgskäfer wie es uns scheint. Auch um Passau, jedoch sehr selten, und in Sicilien. Die Larven der Gattung *Cantharis* können die stärkste Kälte ertragen, und erscheinen nicht selten als sammet-schwarze Würmer auf dem Schnee.

31) *Malachius flabellatus* Friv.

*Statura omnino M. bipustulati* F. *Ore et elytrorum apice rubris, antennis flabellatis.*

Der Kopf voll von erhabenen Wellen oder Falten, nur der Mund roth, die Fühler federartig, 7 Strahlen sind lang, 4 viel kürzer und dicker. Der Brustschild voll von sehr feinen erhabenen Querfalten, sonst wie der *M. bipustulatus*. Die Flügeldecken glatt, an der Spitze lebhaft roth, durchaus mit schwarzen Punkten besetzt; der Hinterleib am äußersten Rande lebhaft roth. Am Balkan.

32) *Malachius coccineus* Klug.

*Abdomine, thoracis margine elytrisque laete rubens.* Long. 2—2 $\frac{1}{4}$ ''' , lat. 1'''.

Der Kopf stahlgrün, schwarz behaart, zwischen den Fühlern eine Erhabenheit mit einem Haardopf, die Fühler schwarz, Mundtheile blaßsch. Der Bauchschild so breit als lang, an den Ecken abgestumpft, der Dicus von der Basis bis zur Spitze dunkel stahlgrün, das Schildchen und die nächste Umgebung dunkel, die Flügeldecken schön zinnoberroth, schwarzborstig; Brust und Füße stahlgrün. Diese Art ist ähnlich dem *M. rufus* F., der jedoch nicht einmal so groß und dessen Brustschildrand breiter roth ist, und dem *M. sanguinolentus* F., der jedoch keine Borsten an den Flügeldecken hat.

33) *Clerus transversalis* Hellw. *myrmecodes* Hoffing.

Auch um Cadix in Andalusien von uns gesammelt.

34) *Trichodes apustulatus* Dj.

*Totus viridi-cyanescens vel viridis, antennis palisque pallidis, elytrorum maculis marginalibus 4.* Long. 4''' , lat. 1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{1}{2}$ '''.

Der Kopf grob punctirt mit langen blonden Haaren, das erste Glied der Fühler vorn mit einem grünen Fick. Die Flügeldecken blaugrün mit sehr tiefen Grübchen, gedrängt und fast in Reihen stehend, in der Mitte und etwas vor der Spitze auf jedem Flügeldeckenrand ein reicher Fick, letzterer ziemlich nahe an der Nath sich erstreckend. Dem *T. bifasciatus* F. etwas ähnlich, doch nicht leicht mit ihm zu verwechseln. Am Balkan.

35) *Trichodes crabroniformis* F.

Kömmt auch auf der Insel Spalato, dann in Kerfu und Egypten vor. Von ersterer Insel sandte ihn Hr. Hauptmann Gutschmoer, von Kerfu brachte ihn Paronk mit und von Egypten Dr. Fischer.

36) *Notoxus thoracicus* Friv. Kennen wir nicht erhalten.

37) *Sisyphus Schaefferi* F. Kömmt auch um Regensburg und Passau, in Triest und im südlichen Europa überhaupt vor. Der unter dem Namen *S. albiventris* von Rindemann

verlante Käfer ist ein aus Kreideboden ausgeschlossener, am Bauch und an den Seiten beschümelter *S. Schaefferi*. Man kann die Erde leicht wegwaschen. Dieser Käfer bildet schönere Pillen als mancher Apotheker, obwohl er keine Pillenmaschin hat. Er bildet sie mit den Füßen und schiebt sie mit den Hintertüssen fort, gerade wie der *Ateuchus sacer* u. a.

38) *Onitis Menalcas* F. Auch im südl. Rußland.

39) *O. irroratus* Rossi. Auch in Italien.

40) *O. Damoetas* Stev. Auch im südl. Rußland.

41) *O. bubalus* Latr.

Er unterscheidet sich von *O. bison* bloß durch kürzere Hörner und durch die kürzere, in der Mitte ausgeschnittene Erixe an der Vorderseite des Brustschildes.

42) *Oniticellus pallipes* F. Kömmt auch in Andalusien, Griechenland und Egypten vor.

43) *Onthophagus lucidus* F. Kömmt schon in Ungarn vor.

44) *Onthoph. marginalis* Gebler.

*Armatus, thorace deplanato, in margine laterali pulvinato, elytris pallidis nigro-maculatis.*

Von der Größe des *O. fracticornis*.

Der Kopf des Männchens gehört, der Brustschild breit, an den Seiten fast in der Mitte stumpfedic, und über dem Eck eine ziemlich große kissenartige Erhabenheit; die Oberfläche matt, glatt, einzeln grob punctirt, die Flügeldecken mit einzelnen schwarzen Flecken, sehr schwach gestreift, die der Nath nächsten Linien punctirt, die Zwischenräume mit einzelnen sehr flachen Punkten. Die Nath schwarz und punctirt. Dem *O. andalusicus* Wl. am nächsten stehend, sonst von andern ähnlichen Arten durch die größeren schwarzen Flecken schon sehr leicht unterscheidbar.

45) *Aphodius furvus* Klug. Konnten wir nicht bekommen.

46) *Geotrupes laevigatus* F. Auch im südl. Frankreich.

47) *G. fossor* Friv.

Gestalt wie *G. typhoeus*, nur ein wenig kleiner. Er unterscheidet sich vom *G. typhoeus* durch die kürzeren Hörner, durch den am Dicus und an den Seiten stärker punctirten Brustschild und durch die dunkelbraunschwarze Färbung, die bey *G. typhoeus* radschwarz ist, ferner durch geringern Glanz.

48) *Rhisotrogus tenebrioides* Pall. Auch im südlichen Rußland.

49) *Rh. torulosus* Friv.

*Pallidus, elytris rufis, apice adustis.* Von der Größe des *Rhis. aestivus*.

Der Kopfschild stark aufgebogen, der aufgebogene Rand schwarz. Der Brustschild einzeln punctirt, gerandet, an der Seite in der Mitte nahe am Rande ein schwarzer Fleck. Die Flügeldecken mit erhabenen breiten Linien, auf jeder derselben mit der an der Nath 4. Die ganze Oberfläche unregelmäßig grob punctirt, die Nath und der Rand von der Mitte an bis hinten schwarz. Die Brust stark wölblich, die Zähne der Vorderfüße schwarz. Am Balkan.

50) *Rhisotrogus costulatus* Friv.

*Gracilis, niger, elytris rufis costatis, sutura nigra.*  
 Long. 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>“, lat. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>“ — 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>“.

Der Kopf und Brustschild schwarz, gänzlich mit fahlen langen Haaren besetzt, Fühler kastanienbraun, Schildchen schwarz; die Flügeldecken braun, grob punctiert, jede mit 4 wenig erhabenen Rippen der Länge nach versehen, vorzüglich auf diesen Rippen mit Borsten besetzt; der Unterleib wollig. Am Balkan.

51) *Rh. transversus* F. Auch in Dalmatien.52) *Leptopus gracilis* Wl.

*Castaneus, subtus pilosus, elytris coriaceis, lineatis.*  
 Long. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>“, lat. 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>“.

Der Kopf sehr stark mit fahlen Haaren besetzt, der Kopfschild länglich, vorn schon abgerundet und aufgestülpt, grob punctiert. Die Fühler sehr merkwürdig. Das erste Glied sehr dick, das 2te kleiner, das dritte ungemein lang mit einem sehr langen Dorn nach vorn stehend, die Keule aus sieben sehr langen und schmalen Blättern bestehend; die Palpen sehr lang und dünn, auch das letzte Glied nicht verdickt. Der Brustschild dunkelschwarz, einzeln grob punctiert, glänzend, an der Seite fast in der Mitte sehr erweitert; das Schildchen groß, flach, die Flügeldecken dunkelbraun, neben der Nath auf jeder Seite eine Furche mit ihr parallel laufend; die Oberfläche grob punctiert, mit 2 unbedeutlichen Längslinien auf jeder Flügeldecke. Die Unterseite stark haarig, Füße schwach. Am Balkan. Dieses Thier ist durch den Bau seiner Fühler und Palpen sehr merkwürdig, von der Gestalt einer *Melolontha*, nur mehr gedrungen.

53) *Anisoplia lineolata* Dj.

*Nigra, thorace viridi, nitente, elytris flavis, maculis oblongis nigris decoratis.* Von der Größe und Gestalt d. *A. horticola* F.

Der Kopfschild dunkel, rauhfaltig und mit langen fahlen Haaren besetzt; der Brustschild an den Seiten in der Mitte stumpfedic, mit Ecken an der Basis; die Oberfläche metallisch-grün, punctiert, fahl behaart; das Schildchen fingerhutartig punctiert; die Flügeldecken mit wenig erhabenen zerstreuten Wärmchen, oben an den Schultern und hinten neben der Nath ein schmaler schwarzer Fleck, die Nath und der Rand bis nicht ganz zur Basis schwarz. Am Balkan. Die Art hat Ähnlichkeit mit der folgenden, unterscheidet sich aber bei genauer Untersuchung wesentlich.

54) *Anisoplia rumeliaca* Friv.

*Nigra, thorace obscuro lanato, elytris flavis nigro-costatis.* Von Gestalt und Größe der vorigen.

Der Kopf- und Brustschild feiner punctiert, dunkel, ohne Glanz, stärker fahl behaart, das Schildchen feiner punctiert, die Flügeldecken blaß braun, glänzend, auf jeder 2 schwarze Rippen, die äußere abgekürzt; die Nath, der Rand und Schultern ebenso glänzend schwarz, der an der Nath nächste Zwischenraum grob punctiert, beim 2ten die Punkte in 2 Linien stehend, beim äußersten in 3 Linien. Neben dem Rande läuft eine abgekürzte schwarze Rippe, und daneben zwei Furchen. Am Balkan.

55) *Omaloopia ferruginea* Kl. Konnten wir nicht erhalten.  
 Jfis 1838. Heft 6.

56) *Amphicoma purpuricollis* Friv

*Thorace scutelloque violaceo rubente, abdomine rufo elytris fusco rufis.* Long. 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>“, lat. 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>“.

Der Kopf und Brustschild fingerhutartig punctiert, stark fahlwollig, Fühler braun, Flügeldecken an der Nath fast bis zur Spitze zusammenstoßend, grob punctiert, schwächlichschwarz, mit einzelnen fahlen und schwarzen Haaren, der Rand schwarz, mit einzelnen dicken schwarzen Borsten besetzt; die Brust dunkel; Hinterleib braun durchaus, besonders neben dem Rande der Flügeldecken stark fuchsthewollig. Um Konstantinopel und am Balkan.

57) *Amphicoma strigatum* Dj. (Von Kindermann und Trivalakti als *A. cyanipenne* Friv. verendet).

*Atra, thorace chalybeo-coerulescente, nigro piloso, elytris divaricatis.* Long. 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>“, lat. 3“.

Der Kopf nicht wie bei der so eben beschriebenen Art ziemlich flach, sondern stark ausgehöhlt, d. h. der Rand überall stark ausgebeugt, grob punctiert, glänzend schwarz, die Stirn blaugrün, metallisch glänzend; Fühler schwarz, Kolbe schwarzbraun; der Brustschild mit stahlgrauen glänzenden Partien, nemlich in der Mitte bis zur Basis, daneben ein Feld fingerhutartig rauh mit Vorsten, schief nach vorn und außen laufend, dann wieder ein Glanzfeld bis zur Mitte des Brustschildes nach vorn reichend, das Uebrige grob punctiert mit langen schwarzen Haaren. Das Schildchen schön stahlblau, grob punctiert, die Flügeldecken von Natur kaffeebraun, dunkelbraun, mit anliegenden braunen Borsten, gegen den Rand und die Nath zu nach der Länge kahl, so daß nur der Rand, die Nath und in der Mitte der Flügeldecke ein Streif borstig ist. Der Unterleib schwarz-wollig. Am Balkan.

**Anmerk.** Bei dem Weib sind die Flügeldecken stärker borstet, und die mittlere Borstenlinie nicht so deutlich auch ist der Brustschild stahlgrün und nicht schwarz, sondern fahl behaart, ebenso der Unterleib. Die *Amphicomen* kann man in 2 Abtheilungen bringen, a) mit anstoßenden, b) mit klaffenden Flügeldecken. Ihr Vorkommen scheint an besondere Bedingungen gebunden; so finden wir in Südspanien kein Stück, und finden auch in der großen Insectenausbeute des Dr. Fischer aus Egypten keine Art, während sie in der Türkei und in Arabien zahlreich erscheinen. Es scheint, daß eine gewisse Höhe des Aufenthaltortes über dem Meere zu ihrem Gedeihen wesentlich nothwendig sei.

58) *Amphicoma bicolor* Friv. Ein wenig kleiner als Nr. 56.

*Thorace in uno sexu aureo-virescente, in altero atrato, elytris rufis, divaricatis, abdomine viridi-metallico.*

Der Kopfschild stark ausgehöhlt, nach vorn schwarz, Stirn und Brustschild beim Mann sehr schön grün goldglänzend schimmernd, grob punctiert, fahl behaart, beim Weib fast schwarz, Flügeldecken klaffend, dicht grubenartig punctiert, wenig behaart, Unterleib, besonders neben dem Rande der Flügeldecken, stark fahlwollig, Füße von der Farbe des Brustschildes bei jedem Geschlechte. Am Balkan.

59) *Amphicomma mustela* Friv. *ciliata* Menet.

*Totus compressus, thorace pectore et pedibus virescens, elytris apice infuscatis, piloso-striatis.* Long. 5<sup>'''</sup>, lat. 2<sup>'''</sup>.

Der Kopf ziemlich fein punctiert und glatt, in der Mitte der Länge nach ein scharfer Kamm, Stirn metallisch blaugrün glänzend, schwarzborstig, Fühlertolbe kastanienbraun; Brustschild viel länger als breit, grün, matt, glatt, in der Mitte grob punctiert und schwarzborstig, gegen den Rand zu einzeln borstig, der Rand selbst weißborstig; Schildchen klein, schwarz, Flügeldecken an der Spitze klastend, rußigbraun mit 2 deutlichen Streifen von Borsten, grübenartig punctiert, der Rand mit einzelnen, sehr dicken, blaffen Borsten. Der ganze Unterleib sehr stark zusammengedrückt, Brust und Füße blaugrün metallisch glänzend, Hinterleib blaßbraun, dicht goldgelbborstig, die letzten 2 Glieder dunkler und nicht besorftet. Am Balkan.

60) *Amph. apicale* Friv.

*Thorace virescente, elytris fusco-rufis, ad suturam et apicem virescentibus.* Von der Größe des *Amph. bicolor*.

Der Kopfschild rauch, metallischgrün, stark gerandet, Fühlertolbe dunkelbraun; Brustschild so breit als lang, fein wellenartig rauch, ohne starken Glanz, goldgrün und metallisch, fahl behaart mit einzelnen schwarzen Haaren, Schildchen von der Sculptur und Farbe des Brustschildes; Flügeldecken nicht klastend, rußigbraun, grob punctiert, einzeln fahl behaart, neben der Nath und die ganze Spitze schön grün glänzend, beim Manne fast die ganze Oberfläche der Flügel grün. Brust und Füße dunkel metallisch glänzend, die letzten 3 Abschnitte des Hinterleibes rothbraun. Am Balkan.

61) *Amph. Lasserei* Parr.

*Thorace pectoreque aeneo-virescente, abdomine aereo, elytris rufo-fuscis, scotoso-lineatis.* Von der Größe des *A. bicolor*.

Der Kopfschild vertieft, vorn schwarz, die Seiten und der Brustschild grün metallisch mit Goldschimmer, fingerhutartig punctiert, stark gewölbt, an den Seiten gerundet, oben in der Mitte und an den Seiten nahe an der Basis stark glänzende Stellen. Die Flügeldecken an der Nath nicht geschlossen, rußig braun, neben der Nath, dem Rand und in der Mitte ein Streif aus fahlen Borsten, Bauch fahlhaarig. Lebt in der Türkei und auf Corfu.

62) *Amph. psilotrichius* Parr.  
*distinctum* Falderm.

*Thorace aeneo-coerulescente, elytris rufis nitore coerulescente.* Von der Größe des vorigen.

Der Kopfschild stark gerandet, schwarz, grob punctiert, in der Mitte ein nicht hoher Kamm. Der Brustschild so breit als lang, an den Seiten schön gerundet, die Oberfläche schön blaugrün metallisch, rauch, mit schwarzen Borsten und fahlen feinen Haaren ziemlich dünn bedeckt; Schildchen groß, blau, fingerhutartig punctiert; die Flügeldecken nicht klastend, schön

blau, der übrige Raum wie blau angelauten, mit wenig fahlen Haaren; Unterleib dunkelblau glänzend, fahl behaart. Findet sich auch in Corfu und im südlichen Rußland.

63) *Amph. vulpes* F. Findet sich auch im südlichen Rußland.64) *Cetonia atrocoerulea* Friv.

*Subtus aeneo-, supra opaco virescens, elytris albo-maculatis.* Long. 10<sup>'''</sup>, lat. 6<sup>'''</sup>.

Der Kopf einzeln grob punctiert, der Brustschild dunkelgrün, an den Seiten stark punctiert, das Schildchen ganz glatt; die Flügeldecken dunkelstahlgrün, ohne Glanz, lichter als der Brustschild, besonders nach außen dicht mit hufeisenförmigen Einrückungen, am Rande in der Mitte der Flügeldecken und an der Nath schneeweiße schmale Flecke, ganz kleine hie und da zerstreut. Die Brust stark punctiert, der Hinterleib sehr schön glänzend und glatt. Am Balkan und um Konstantinopel.

65) *Cetonia adspersa* Friv.

*Thorace elytrisque nigris, opacis albo maculatis, abdomine nitente.* Long. 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>'''</sup>, lat. 5<sup>'''</sup>.

Der Kopfschild mit Grübchen, schwarz, glänzend; der Brustschild matt, schmaler als der Hinterleib, von der Basis nach vorn nur sehr wenig sich erweiternd, dann plötzlich bis zum Kopf zu sich verschmälernd, der Quere nach in der Mitte mit 4 weißen Flecken, vor diesen 2 kleinere; Schildchen nur an der Basis punctiert. Die Flügeldecken ziemlich dicht weißfleckig. Der Unterleib glänzend mit rötlichem Schimmer, neben dem Rand der Flügeldecken 3 weiße Flecken, der letzte Abschnitt an der verticalen Seite fast ganz weiß.

Dieser Käfer ist etwas ähnlich der *C. squamosa* Dj., doch nicht leicht damit zu verwechseln.

66) *C. cinctella* Stev., *albella* Pall. Auch im südlichen Rußland.67) *Pimelia granulosa* Latr.

*Sub-oblonga, tota nigra, pilosa, elytris verruciferis.* Long. 10<sup>'''</sup>, lat. 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>'''</sup>.

Der ganze Kopf warzig, nicht glänzend, mit schwarzen, ziemlich aufsteigenden, nach hinten gerichteten Borsten, die Fühler kurz, der Brustschild viel breiter als lang, mit Warzen und Borsten wie der Kopf und die Flügeldecken; Schildchen nicht sichtbar. Diese Art scheint den Uebergang von den rundlichen zu den länglichen Punctien zu machen; sie ist durch ihr tiefes Schwarz ohne allen Glanz, kurze Fühler usw. mit keiner andern leicht zu verwechseln. Sie kommt auch in Griechenland und um Dan in der Barbarey vor.

68) *P. verrucifera* Solier.

*Globosa, valde convexa, thorace opaco glabro, elytris verruciferis.* Long. 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>'''</sup>, lat. 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub><sup>'''</sup>.

Der Kopf matt schwarz, von der Fühlerbasis quer zur andern eine schwache Vertiefung, einzeln warzig; der Brust-

Schild im Verhältnisse zum Hinterleib sehr klein, matt schwarz, an den Seiten warzig, in der Mitte ziemlich fein punctiert. Die Flügeldecken durchaus mit fahlen, sehr kurzen ausliegenden Borsten, meistens aber abgerieben, darüber stark hervorstechende, sehr große halbkugelige glänzende Warzen, zwischen diesen einzelne wenige, viel kleinere, der Grund aber dicht und gleichförmig mit ganz kleinen Warzen besetzt. Die Art ist der *P. subglobosa* Pall. sehr ähnlich, unterscheidet sich aber durch ihre Größe und Mangel aller Rippen.

Anmerk. Die Pinelien gewähren den besten Maassstab zur Beurtheilung des Klimas eines Landes. So z. B. kommt in Dalmatien und Ungarn noch keine Art vor.

#### 69) *Akis deplanata* Wl.

*Thorace spinoso, elytris deplanatis punctatis. Long. 11<sup>'''</sup>, lat. 5<sup>'''</sup>.*

Der Kopf und Brustschild grob einzeln punctiert, die hinteren Ecken des Brustschildes verlängert, spitzig, die Flügeldecken mäßig glänzen, oberflächlich punctiert. Die Art Käfer sieht der *A. hispida* Hbst. ähnlich, wenn man sich bey dieser die Flügeldecken glänzender und die Warzen ganz weg denkt.

#### 70) *Tentyria grossa* Dj.

*Atra, thorace convexo, dilatato, abdomine oblongo-ovato. Long. 10<sup>'''</sup>, lat. 4 1/2<sup>'''</sup>.*

Der Kopf ziemlich lang, einzeln grob punctiert, neben den Augen nach innen eine Längensalte. Der Brustschild breiter als lang, sehr convex, vom Hinterleib sehr stark abschend, an der Basis schmaler als vorn, einzeln punctiert, die Flügeldecken viel feiner einzeln punctiert, die ganze Oberfläche glänzend. Durch Größe, starke Wölbung des Hinterleibes und den großen Ausschnitt zwischen diesem und dem Brustschilde ist diese Art leicht von andern unterscheidbar. Sie kommt auch in Griechenland u. a. Ländern vor.

#### 71) *Gnathosia caraboides* Dj. (prius Hegeter).

*Atra, thorace fere parallelipipedo, abdomine oblongo, elytris punctatis. Long. 6 1/2<sup>'''</sup>, lat. 2 3/4<sup>'''</sup>.*

Der Kopf glatt, fein punctiert; von der Basis des Kopfes bis zu der der Fühler eine Längensalte, gerade vorwärts laufend, die Augen in dem hinteren Ausschnitt der Fühlergrube liegend, der Brustschild mehr länglich als viereckig, an der Basis etwas verschmälert, durchaus gerandet, schwach glänzend, einzeln ziemlich fein punctiert; der Hinterleib hart an dem Brustschild anliegend, breiter als dieser, in der Mitte etwas erweitert, mäßig gewölbt, glänzend, nicht so dicht, wie der Brustschild punctiert. Kommt auch in Griechenland vor.

#### 72) *Tagenia filiformis* F. Lebt in ganz Süd-Europa.

#### 73) *Cephalostenus elegans* Dj.

*Ater, opacus, thorace plicato, elytris verruciferis. Long. 7<sup>'''</sup>, lat. 3<sup>'''</sup>.*

Der Kopf sehr lang und schmal und dadurch allein von *Seaurus* verschieden. Die Stirn grobfaltig, eine fahlförmige Erhabenheit von der Basis des Kopfes bis zu der der Fühler

nach vorn laufend; der Brustschild mäßig groß, die Ecken ganz abgerundet, faltig, kein Schildchen; der Hinterleib ziemlich lang; die Flügeldecken warzig, undeutlich aber doch kennbar gestreift.

#### 74) *Pedinus cylindricus* Parr.

*Elongatus, thorace latissimo, elytris punctato striatis, interstitiis crebro punctatis. Long. 5 1/2<sup>'''</sup>, lat. 2<sup>'''</sup>.*

Der Kopf dicht, ziemlich fein punctiert, der Brustschild breiter als der Hinterleib, dicht und fein punctiert, der Hinterleib sehr lang, ziemlich schmal, die Flügeldecken punctiert gestreift, die einzelnen Punkte der Reihe groß und deutlich von einander getrennt; die Tarsen haarig. Diese Art kommt dem *P. sculus* Dj. am nächsten, ist aber größer, der Hinterleib länger und der Brustschild breiter, mehr gewölbt und glänzender. Findet sich auch auf Corfu.

#### 75) *Pedinus byzantinicus* Klg.

*Parvus, antennis pedibusque castaneis, elytris punctato striatis dense punctatis; facie Cryptici glabri.*

Der Kopf grob punctiert, der Brustschild so breit als der Hinterleib, gegen den Rand zu gröber punctiert, der Rand an der Basis nach hinten verlängert, so daß die Basis des Brustschildes fahlförmig erscheint. Der Hinterleib ziemlich stark gewölbt, punctiert gestreift, die Zwischenräume sehr dicht, fein und oberflächlich punctiert. Diese Art ist unter 10 uns bekannten die kleinste. Lebt um Konstantinopel.

#### 76) *Dendarus dalmatinus* Dj.

*Totus ater, elongatus, thorace punctatissimo, acuminato, elytris punctato-striatis, interstitiis dense punctatis. Long. 6<sup>'''</sup>, lat. 3<sup>'''</sup>.*

Der Kopf dicht punctiert, der Brustschild etwas länger als breit, schmaler als der Hinterleib, durchaus gerandet, an den Seiten wenig, beim Weibchen mehr erweitert, der Rand hinten in einen Spitz auslaufend; am Discus grob punctiert, gegen den Rand zu die Punkte verschließend und Falten bildend; der Hinterleib lang, die Flügeldecken punctiert gestreift, die einzelnen Punkte von einander stark getrennt; die ganze Oberfläche dicht punctiert. Auch in Dalmatien sehr gemein. Er unterscheidet sich von dem ähnlichen *D. stygius* Helf. durch den schmälern Brustschild und kleinen Körperbau.

Anmerk. Man erkennt die Dendari sehr leicht durch die Breite und Größe des 2ten und 3ten Tarsengliedes der Vorderfüße des Männchens.

#### 77) *Dendarus stygius* Helf. Long. 7 1/2<sup>'''</sup>, lat. 3 3/4<sup>'''</sup>.

Dieser Käfer stimmt in allen Theilen mit dem so eben beschriebenen überein, nur ist er konstant größer, der Brustschild gegen den Kopf zu mehr erweitert und die Punctstreifen der Flügeldecken gröber. Lebt auch in Sicilien.

#### 78) *D. cribratus* Klg.

*Totus ater, elongatus, thorace dilatato, elytris foveis in linea positis ornatis. Statura D. dalmatini.*

Der Kopf grob punctiert, der Brustschild so breit als der Hinterleib, an den Seiten rundlich, gegen die Basis zu stark ausgedrückt und mit dieser eine spitzige Verlängerung bildend, die Punctur fein, sehr dicht, neben dem Discus die Puncte hier und da faltenartig in einander verfließend. Die Flügeldecken mit länglichen, großen Oruben der Länge nach in einer Reihe gezeit; die ganze Grundfläche dicht fein punctiert. Ist von allen andern Arten sehr ausgezeichnet.

### 79) *Phylan carbonarius* Wl.

*Totus ater, elytris punctato-striatis, interstitiis punctatis.* Long. 4<sup>'''</sup>, lat. 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub><sup>'''</sup>.

Der Kopf flach, mattglänzend, vorn ausgeschnitten, punctiert, Fühler fein, Brustschild sehr breit, überall fein gerandet, hinten mit Ecken, an den Seiten grob, am Discus fein punctiert, das Schildchen fein punctiert, Hinterleib lang, nicht bauchig, Flügeldecken glatt. Auch in Sicilien und Egypten.

### 80) *Opatrum geminatum* Brulle.

*Nigrum, dilatatum, elytris nodis nitentibus in series positus ornatis.* Long. 5<sup>'''</sup>, lat. 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub><sup>'''</sup>.

Der Kopf rauh warzig mit einem Quereindrucke. Der Brustschild so breit als der Hinterleib, der Seitenrand flach, etwas aufgebogen, am Discus mit einzelnen Buckeln, die ganze Grundfläche mit gleichförmigen, flachen Warzen versehen; der Hinterleib sehr breit, ziemlich gewölbt, die Flügeldecken auf jeder Seite mit 8 Reihen glänzender, einzeln stehender Höcker versehen, in einer Kantenreihe gestielt, zwischen 2 Reihen eine erhabene Linie oder Rippe, die ganze Grundfläche einzeln fein warzig. Ist nicht leicht mit andern zu verwechseln; lebt auch auf Morea.

### 81) *O. obesum* Wl.

*Atrum, valde convexum, aureo setosum, elytris verrucoso-striatis.* Long. 4<sup>'''</sup>, lat. 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub><sup>'''</sup>.

Der Kopfschild in der Mitte stark ausgeschnitten, vorn fangfahrig punctiert; der Brustschild viel breiter als lang, gerundet, in der Mitte eine Längsrippe, gänzlich mit Warzen und sehr kurzen, goldfarbigen, anliegenden, einzelnstehenden Borsten besetzt, das Schildchen rauh, die Flügeldecken goldborstig, fein rauhwarzig, mit Furchen, die einzelnstehende größere Warzen zeigen. Am Balkan.

### 82) *O. viennense* Dft.

### 83) *Diaperis azurea* Friv.

*Elongatus, atra, thorace marginato, punctato, elytris cyaneis punctato-striatis.* Long. 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub><sup>'''</sup>, lat. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>'''</sup>.

Der Kopf grob punctiert, Fühler und Palpen kastanienbraun, der Brustschild ein wenig breiter als lang, gerundet, nach vorn ver schmälert, der Hinterleib sehr lang, an den Seiten nicht erweitert, die Flügeldecken glänzend kornblumenblau, punctiert gestreift, die Zwischenräume ziemlich fein punctiert. Unterscheidet sich durch den längeren, nicht erformigen Hinterleib sehr leicht von der *D. violacea*. Am Balkan und im Banat in Ungarn.

### 84) *Trachyscelis rufus* Latr.

### 85) *Helops exaratus* Germ.

### 86) *H. coelestinus* Klg.

*Elongatus, totus nigrocyanus, thorace marginato punctato, elytris punctato striatis.* Long. 7<sup>'''</sup>, lat. 3<sup>'''</sup>.

Der Kopf sehr grob punctiert, die Oberlippe stark braun gefranzt, Fühler und Laster schwarz, der Brustschild überall gerandet, an den Seiten schwach gerundet, quadratisch, schwarz, wenig glänzend, einzeln punctiert, so breit wie die Basis des Hinterleibes; dieser sehr lang, hinter der Mitte sich an den Seiten erweiternd, die Flügeldecken mäßig glänzend, punctiert gestreift, die einzelnen Puncte nicht zusammenhängend, die Zwischenräume stark punctiert. Ist durch seine dunklere Farbe von *H. Reichii* koll. aus Griechenland leicht zu unterscheiden.

### 87) *H. maurus* Friv.

*Totus niger, gibbosus, opacus, thorace lato punctatissimo, elytris marginatis, punctato-striatis.* Long. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>'''</sup>, lat. 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub><sup>'''</sup>.

Der Kopf sehr stark grob punctiert, der Brustschild an den Seiten allein gerandet, der Hinterleib sehr stark gewölbt, wie bucklig, nicht lang, matt, punctiert gestreift. Die Puncte tiefliegend, die Zwischenräume häufig, ziemlich fein aber tief punctiert. Am Balkan.

Anmerk. Die Beschreibungen sind so viel als möglich stets nach dem Mündchen entworfen. Die Weibchen sind im Durchschnitt etwas größer und dicker.

### 88) *H. mucoreus* Klg.

*Elongatus, fuscus, opacus, thorace elongato, parum marginato, elytris crenato costulatis punctatissimis.* L. 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub><sup>'''</sup>, lat. 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub><sup>'''</sup>.

Der Kopf sehr dicht grob punctiert, der Kopfschild sehr groß, die Mundtheile überdeckend, vorn breit aufgestülpt, der Brustschild schmaler als der Hinterleib, sehr dicht punctiert, vor der Mitte etwas breiter, an der Basis edspitzig, der Hinterleib sehr lang, mäßig gewölbt, die Flügeldecken mit ziemlich scharfen Rippen, durch zusammenstoßende Warzen gebildet, am Discus glatt, die ganze Grundfläche rauh punctiert. Am Balkan.

Anmerk. Die meisten dunkelfarbenen und schwarzen Heteromeren haben gleich nach der Entwicklung einen staubartigen Anflug, der aber sehr leicht sich abreibt und bey gefangenen Thieren selten mehr bemerkt wird, so auch bey dem erwähnten Käfer unserer Sammlung.

### 89) *H. obesum* Friv.

*Aterrimus, elongatus, fornicatus, thorace punctatissimo, elytris punctato striatis.* Long. 7<sup>'''</sup>, lat. 3<sup>'''</sup>.

Das Weibchen um die Hälfte größer. Die Oberlippe stark braun gewimpert, der Kopfschild breit, mäßig eingedrückt, der ganze Kopf dicht grob punctiert; der Brustschild viereckig, vorn breiter als der Brustschild; die Flügeldecken punctiert gestreift, die Zwischenräume glatt, mäßig dicht punctiert, die an der Seite etwas runzelig. Der Hinterleib sammetartig grauhaarig.

90) *Cerocoma Kunzei* Friv.

*Chalybeo-viride, pubescens, thorace bifoveolato, elytris violaceis, antennis, palpis pedibusque flavis.* Von der Größe des *C. Schaefferi*.

Der Kopf ziemlich grob punctiert, kurz, weiß behaart, das erste Fühlerglied sehr lang, cylindrisch, darüber ein blattförmiger Auswuchs, die nächsten 2 Glieder sehr kurz, das folgende in der Mitte durch die Insertion des nächsten Gliedes gespalten, dieses kurz, rund, das nächste größer, von den Seiten stark zusammengebrückt, das letzte sehr groß, breit, plattenförmig und von unregelmäßiger Gestalt; das mittlere Palpenglied ungemein dick, haudig; der Brustschild ziemlich schmal, vorn an jeder Seite eine tiefe schiefe Grube, am Discus ein Längeneindruck; die Flügeldecken dicht grob punctiert; die Füße hellbraun, die Hinterfüße nicht ganz bis zu den Schienbeinen flachläufig. — Beim Weibchen haben die Mundtheile und Fühler eine regelmäßige Gestalt, letztere sind 8gliedrig. Es wäre sehr interessant, die physiologische Bedeutung der so sonderbar gestalteten Fühler und Mundtheile der Männchen zu kennen.

91) *Mylabris taeniata* Wl., *militaris* Klg.

*Atra, elytris pallide miniatis, bifasciatis, apice nigris.* Long. 9—10<sup>1/4</sup>“, lat. 3<sup>1/4</sup>“.

Der Kopf glänzend schwarz, haarig, grob flach punctiert, die Stien in der Mitte schwach der Länge nach breit eingedrückt; der Brustschild schmal, vorn dicker als hinten, hinter der Basis eingedrückt, so daß an den Seiten überall ein Höcker erscheint, in der Mitte am Discus eine Längengrube in einer breiten Vertiefung, die ganze Oberfläche glänzend schwarz, grob punctiert, schwarz behaart. Die Flügeldecken blaß mennigsfarbig, im lebenden Zustande wahrscheinlich lebhafter roth; die erste Binde doppelt so schmal als die 2te, den Rand nicht erreichend, die zweite den Rand erreichend, beide an der Nath zusammenfließend, die Binden nur an der hinteren Seite gegen den Rand zu gezackt oder erweitert.

Abänderungen: die obere Binde die Nath nicht erreichend und mit der zweiten nicht zusammenhängend, die 2te Binde den Rand nicht ganz erreichend und hinten nicht gezackt oder gegen den Rand breiter.

**Zusmerf.** Die Beschreibung der *Mylabris*-Arten ist ungemein schwierig, da es viele Arten gibt, die einander sehr ähnlich sind. Viele Arten enthalten Cantharidin und können statt des Pflasterkäfers angewendet werden.

92) *M. solonica* Pall. ist wahrscheinlich nur eine Abänderung der *M. floralis* Pall. Sie unterscheidet sich nur durch die Unterbrechung der ersten Binde.

93) *M. Dejeanii* Schh. findet sich auch in Egypten und ist eine der kleinsten Arten.

94) *M. bicolor* Wl., *conspicua* Helf.

*Atra, nigro-pilosa, elytris miniatis, bifasciatis, apice nigris.* Long. 1<sup>1/4</sup>“, lat. 4<sup>1/4</sup>“.

Der Kopf groß, grob punctiert, die Stien mit einem

schwachen Eindruck; der Brustschild verhältnismäßig dick, an der Basis nur ein wenig schmaler, mit mehreren breiten, unregelmäßigen flachen Buckeln; die Flügeldecken mit 4 deutlichen Adern oder erhabenen Längslinien, eine nahe an der Nath, die andere nahe am Rande, parallel laufend, die anderen 2 in der Mitte; die obere Binde in der Mitte bis an das Schildchen verlängert, der Vorderrand in der Mitte gebuchtet, am Rande schmaler werdend und ihn erreichend, die zweite Binde noch einmal so breit, nahe an der Nath am oberen und unteren Rande gebuchtet; die Spitze breit schwarz, der Vorderrand gezackt. Findet sich auch in Egypten.

95) *Mylabris melanura* Dj. findet sich auch in Andalusien.

Die *M. fasciato punctata* Fisch. halten wir nur für eine Abart der *M. melanura* Dj. Ueberhaupt ändern die *Mylabris* sehr ab, und es herrscht große Verwirrung in der Nomenclatur. Eine Monographie mit guten und illuminierten Abbildungen wäre sehr zu wünschen. Die von Billberg genügt nicht mehr.

96) *M. 10punctata* F. findet sich auch in Andalusien.

97) *M. maculata* Billb.

98) *M. setigera* Wl.

*Attenuata, atra, nigropilosa, elytris flavis 6maculatis, tarsis nigris setigeris.* Long. 6<sup>1/4</sup>“, lat. 2<sup>1/4</sup>“.

Der Kopf sehr groß, quadratisch, etwas breiter als der Brustschild, dieser verhältnismäßig grob punctiert, am Discus ein Grübchen; das Schildchen von einem schwarzen, nach hinten spitz zulaufenden Fleck umgeben; die Flügeldecken ohne Adern, an der Schulter neben dem Rand ein Höcker, dieser mit einem schwarzen Längsfleck; am Ende des ersten Dritttheiles des Hinterleibes am Discus ein runder, ziemlich kleiner Fleck; am Ende des 2ten Dritttheiles 2 Flecken auf jeder Flügeldecke, der eine größer und der Basis näher, der kleinere ein wenig hinterhalb und mehr gegen den Rand zustehend; am Anfang des letzten Dritttheiles ein noch größerer Fleck, fast bis an den Rand reichend, und daneben an der Nath ein ganz kleiner, die Spitze sehr schmal schwarz. Unterleib und Füße sehr langhaarig.

99) *M. crocata* Billb.

100) *Lydus algiricus* F.

101) *Oenas crassicornis* F.

102) *Lytta collaris* F.

103) *L. chalybea* Tausch.

*Tota coerulea, antennis tibiisque nigris.* Long. 4<sup>1/4</sup>“, lat. 1<sup>1/2</sup>“.

**Zusmerf.** Die Größe ist sehr verschieden, einige Exemplare sind fast noch einmal so groß.

Der Kopf ziemlich gewölbt, grob punctiert, schwarzhaarig, der Brustschild schmaler, weitläufig grob punctiert, nur hin-

ten gerandet, die Flügeldecken dicht fein runzelig. Auch im südlichen Rußland.

104) *L. erythrocephala* F. auch im südlichen Rußland.

105) *L. lutea* Klg.

*Atra*, *antennis maris in medio parum incrassatis, thorace elytrisque luteis. Long. 7'''*, *lat. 2'''*.

Der Kopf ein wenig breiter als der Brustschild, am Scheitel ein Eindruck, einzeln punctiert, schwarz haarig; der Brustschild etwas breiter als lang, hinten schmaler, glatt, glänzend, sparsam punctiert, hinten schwarz gerandet, am Discus 4 flache Eindrücke übers Kreuz, das Schildchen schwarz, die Rath der Flügeldecken nur bis zum letzten Drittheil schwarz.

106) *L. phalerata* Friv.

*Viridis, lateribus aureo-limbatis, pedibus luteis, antennis nigris. Long. 8'''*, *lat. 3'''*.

Dieses prächtige Insect beschämt alle seines Gleichen. Die Grundfarbe ist ein glänzendes Grün, auf den Flügeldecken ins Goldgelbe spielend. Der Kopf sehr grob einzeln punctiert, die Stirn flach, die Palpen blaßbraun, der Brustschild so breit wie der Kopf, vorn dicker als hinten, am Discus 2 flache Balken, einzeln grob punctiert, der Rand wie der des Kopfes roth goldfarben glänzend; die Flügeldecken runzelig, punctiert, nicht weit vom Rande von der Basis bis zur Spitze eine breite, rothe Längsbinde, gegen die Spitze zu allmählich breiter werdend. Die Schienen des 2ten Fußpaares unten breit und ausgeschnitten, die Oberschenkel des letzten Fußpaares mit einem schwarzen gebogenen Haken an der Insertion.

107) *Meloe tuccia* Meyer. Vide Meyeri Tentamen Monographiae Gen. Meloë. Göttinge. 1793. p. 30. n. X.

108) *Zonitis praeusta* F.

109) *Z. caucasica* Pall.

110) *Zonitis pubescens* Friv.

*Abdomine, thorace pedibusque atris, elytris rubris. Long. 6½'''*, *lat. 2½'''*.

Der Kopf so breit als der Brustschild, dicht grob punctiert, mit fahler Wölle, auf der Stirn ein länglicher Längeneindruck, der Brustschild dick, wenig schmaler als der Hinterleib, glänzend schwarz, nur an der Basis gerandet und mit stumpfen Ecken, dicht, mäßig grob punctiert, in der Mitte eine Furche; das Schildchen sehr groß, mit einem Quereindruck, grob punctiert, wenig glänzend, die Flügeldecken sehr dicht punctiert, dicht fuchshaarig, die Haare anliegend und kurz. Unterscheider sich von der *Z. caucasica* durch ungestreifte Flügeldecken und viel größeren und dickern Kopf und Brustschild.

111) *Apalus bipunctatus* Zgl.

Durch seine fahlgelben Schienen an allen Füßen und rothe Afterspitze leicht erkennbar. Findet sich auch in Ungarn.

112) *Brachycerus Besseri* Dj. Schoenherri Genera et spec. curculionidum, Tom. I. Pars II. p. 413.

113) *Liparus intermedius* Friv.

*Aterrimus, glaber, elytris punctato striatis; statura L. germaui.*

Der Kopf grob, nicht dicht punctiert, der Brustschild, parallelpipetisch, hinten schmaler, als vorn, sehr weitläufig punctiert; der Hinterleib an der Basis breiter als der Brustschild, lang, an den Seiten nicht rundlich erweitert, wie die meisten anderen Arten, die Flügeldecken mit Reihen von Punkten, diese weit von einander und oberflächlich stehend, die Zwischenräume mit sehr feinen einzeln stehenden Pünctchen.

114) *Meleus nodosus* Klg.

115) *Loborhynchus viduus* Klg.

116) *L. infaustus* Klg.

117) *Psalidium vestitum* W.

*Nigrum, totum squamosum, statura Psal. maxilloso.*

Der Kopf ziemlich grob punctiert, der Brustschild vorn sehr schmal, gegen hinten sich erweiternd, an der Basis rundlich, schmaler als der Hinterleib; die Flügeldecken punctiert gestreift, die Zwischenräume mit vst anliegenden Schuppen; die Schienen der Füße stark fahlnollig.

118) *Larinus hirtus* Helfer.

*Totus pilosus, marginibus thoracis et elytrorum lineaque subsuturali albidis. Long. 3'''*, *lat. 1½'''*.

Der Rüssel sehr lang und dünn, gerade nach unten gekrümmt, mit langen fahlen Haaren; der Brustschild und Flügeldecken ebenso behaart, die Ränder weißhaarig; neben der Rath, doch etwas davon entfernt, eine weiße Linie; die Füße roßbraun, lang behaart. Auch in Sicilien zu Hause.

119) *Apatе aurita* Friv.

*Elongata, thoracis lateribus albidis, elytris rugosis aureo-pilosis. Long. 4'''*, *lat. 1½'''*.

Der Kopf schwarz, zwischen den Augen fahlghaarig, grob punctiert, mit vielen verticalen, scharfen, linienförmigen Erhabenheiten, die Fühler braun, der Brustschild fast wie bey *A. capucina*, vorn mit großen scharfen Höckern, die nach hinten immer feiner werden, dazwischen vorn gelbe Borsten; der hintere Theil an der Seite dichtweiß behaart, in dem weißen Felde 2 schwarze Flecken, die Flügeldecken schwarz mit groben glänzenden Wellen, tiefen einzelnen Punkten und tiefer liegenden Stellen, diese mit fuchstrothen Borsten besetzt; Unterleib und Füße mit blaffen Haaren.

120) *Purpuricenus Desfontainii* F.

121) *Dorcadion tauricum* Friv.

*Atro-sericeum, elytrorum sutura nivea, margine lineaque submarginali albidis, pedibus ferrugineis. Long. 6—7'''*, *lat. 3'''*.

Der Kopf flach mit einzelnen Grübchen, weißgrau anliegend behaart, dazwischen einzelne schwarze Borsten, in der



Mitte eine Längenfurche, die Fühler glänzend schwarzbraun, das erste Glied heller; der Brustschild an der Seite mit einem Zahn, in der Mitte ein schneeweißer Strich, der sich an den des Kopfes anschließt, der Grund an der Seite grob gerübbt, am Discus einzeln grob punctiert, schwarzsammetartig; der Hinterleib länglich eiförmig, stark gewölbt, die Flügeldecken schwarzsammetartig, der Rand und eine nebenlaufende, etwas davon absteigende breite Linie weißlich; der Unterleib weißlichsammetartig. Es unterscheidet sich durch die neben dem Rande laufende Längensbinde von anderen Arten sehr gut. Auch in der Keim zu finden.

#### 122) *D. catenatum* Friv.

Griseum, elytris atro-sericeis, margine albedo, lineis 2, in medio interruptis, niveis. Long. 7<sup>'''</sup>, lat. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>'''</sup>.

NB. Das Weibchen um die Hälfte größer und dicker.

Der Kopf mittelmäßig grob punctiert, mit weißen Härchen sammetartig bekleidet, die Stirn zwischen den Fühlern eingedrückt und in der Mitte eine scharfe feine Furche, Fühler groß, braun, Palpen dunkler; der Brustschild so breit als lang, am Discus schwarzsammetartig, in der Mitte eine weiße Längenslinie, die Seiten grau mit einem Dorn versehen; die Flügeldecken tief schwarzsammetartig, die Nath schneeweiß, mehr gegen den Rand zu 2 weiße Linien der Länge nach, die äußere mit dem Rande parallelaufend und die Spitze erreichend, die innere nur bis zum Anfang des letzten Vierteltheils reichend und an die andere anstoßend, beide in der Mitte breit unterbrochen. Beim Weibchen sind diese Linien zweifach unterbrochen. Die Füße heller braun als die Fühler.

#### 123) *D. griseum* Wl.

Totum griseum, antennis tenuibus maculis subterminalibus quatuor nigris; statura D. fuliginatoris.

Die ganze Oberfläche mit ziemlich langen aber vest anliegenden grauen Haaren bekleidet; auf den Flügeldecken drei Rippen, wovon eine die äußerste Spitze erreicht; die Nath heller, zwischen den inneren 2 Rippen ein langer schwarzer Fleck, und neben der Nath ganz an der Basis zwei viel kleinere schwarze Flecken. An der Größe wie *D. fuliginator*, nur bedeutend dicker.

#### 124) *D. 7lineatum* Menetr.

Griseum, elytris atro-sericeis margine, sutura lineisque 2 niveis. Long. 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>'''</sup>, lat. 3<sup>'''</sup>.

Der Kopf sehr einzeln grob punctiert, grau behaart, auf der Stirn eine Furche, ganz oben eine weiße Linie, daneben schon schwarzsammetartig, die Fühler dunkelbraun, das erste Glied heller; der Brustschild etwas breiter als lang, schwarzsammetartig, in der Mitte eine weiße Linie, an den Seiten gebornt; der Hinterleib dick und ziemlich kurz; der Rand breit, grau, daneben eine weiße Längenslinie bis an die Spitze reichend und mehr gegen innen eine kürzere nur bis zum letzten Viertel reichend, die Nath schneeweiß, die Füße heller als die Fühler.

#### 125) *D. laqueatum* Friv.

Griseum, elytris atro-sericeis, lineis 2 niveis ornatis. Long. 7<sup>'''</sup>, lat. 3<sup>'''</sup>.

Der Kopf schwarz einzeln punctiert, auf der Stirn eine Längenfurche, die Fühler schwarz, der Brustschild ganz schwarz, einzeln grob punctiert, gebornt; das Schildchen groß und weiß behaart; die Flügeldecken schön schwarzsammetartig, der Rand graulich, mit demselben parallelaufend eine schneeweiße Linie, nach innen zu eine andere, an der Basis des Hinterleibes und am Ende des 3ten Viertel mit der anderen zusammenstoßend; die Füße dunkelbraun. Da die Nath nicht weiß ist, so ist diese Art sehr leicht unterscheidbar.

#### 126) *D. ferruginipes* Menetr.

Griseum, elytris atris margine suturaque niveis, pedibus ferrugineis. Long. 6<sup>'''</sup>, lat. 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub><sup>'''</sup>.

Der Kopf schwarz, einzeln grob punctiert, auf der Stirn eingedrückt, die Fühler fast schwarz, das erste Glied braun, der Brustschild schwarz, sehr grob punctiert, in der Mitte eine weiße Längenslinie, an den Seiten gebornt, die Flügeldecken schwarz, an den Schultern warzenartige Höcker, Rand schmal, Nath ziemlich breit, schneeweiß, Füße braun. Diese Art nähert sich am meisten dem *D. pedestre* F., ist jedoch durch die breitere weiße Nath und helleren Füße leicht zu unterscheiden.

#### 127) *D. Kindermanni* Friv.

Griseum, elytris atro-sericeis, margine, sutura, lineaque una niveis; statura D. pedestris.

Der Kopf einzeln punctiert, grau behaart, von der Basis bis zur Oberlippe ein Längeneinschnitt, Fühler schwarz; der Brustschild etwas glänzend, hinten viel schmaler als vorn, dornig, sehr grob punctiert, in der Mitte der Länge nach breit, aber leicht eingedrückt; die Flügeldecken schön schwarzsammetartig, der Rand und die Nath sehr dünn, schneeweiß, mit dem Rande parallelaufend und an den Schultern und der Spitze sich mit ihm vereinigen eine breite schneeweiße Längenslinie; Füße schwarz, mit grauen Härchen sammetartig überzogen. Beim Weibchen ist die breite weiße Linie besonders gegen die Spitze zu viel breiter, als beim Männchen.

#### 128) *D. graecum* Dj.

Griseum, thorace unistriato, elytris atro-sericeis, sutura nivea, maculis 4 flavis. Long. 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>'''</sup>, lat. 2<sup>'''</sup>.

Der Kopf schwarzsammetartig, die Augenregion grau, von der Basis bis zur Oberlippe eine Furche, gegen die Basis zu weiß, so daß diese weiße Linie sich an die des Brustschildes anschließt; Fühler dunkelbraun, an der Basis heller, der Brustschild mehr lang als breit, gebornt; am Discus schwarzsammetartig, in der Mitte eine weiße Linie, die Seiten sehr grob punctiert; die Flügeldecken mit 4 isabellgelben Flecken, einer auf jeder Schulter, ein Dreieck vordellend, 2 hinten, vom letzten Drittel anfangend und spitzig zulaufend gegen die Spitze zu; Füße hellbraun. Beim Weibchen, welches eine graue Oberfläche hat, ist statt der 4 Flecken eine breite Längenslinie, und daneben nach innen eine 2te, in der Mitte breit unterbrochene; auch die äußere Linie ist hier halb unterbrochen. Findet sich auch in Griechenland.

129) *Dorcadion Sturmii* Friv.

*Elongatum*, thorace lineis 4 atro-sericeis ornato, elytris foveolatis, pedibus rufis. Long. 7<sup>'''</sup>, lat. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>'''.

Der Kopf fein punctiert, innen neben dem Auge und ganz oben an der Basis des Kopfes auf jeder Seite ein schwarz-sammetner Fleck, die Fühler braun, nach oben dunkler. Der Brustschild hinten enger als vorn, hinten allein gerandet, die Seitenbäder ganz stumpf, am Discus auf jeder Seite eine breite schwarz-sammetne Längensbinde, der Raum dazwischen glänzend und weiß eingefärbt, die Gegend der Höcker schwarz, so daß im ganzen 4 schwarze Felder erscheinen. Der Hinterleib schmal, lang, die Flügeldecken mit vielen starken Grübchen ziemlich dicht bedeckt, der Rand und die Nath grau, diese schwarz-sammetartig der Länge nach eingefärbt.

Das Genus *Dorcadion* umfaßt eine Menge Arten und es werden jährlich noch einige entdeckt: so besitzen wir in unserer Sammlung 32 genau unterschiedene Arten. Sie leben meistens in den wärmeren Ländern der alten Welt auf trockenem Haldeboden; die Larven scheinen von Gräserwurzeln sich zu nähren; die beiden Geschlechter sind sich öfters ziemlich unähnlich, und daher ist bey Aufstellung neuer Arten große Vorsicht nöthig.

130) *Callidium strepens* F. im ganzen Südeuropa und Egypten.

131) *Clytus trifasciatus* F. auch in Andalusien.

132) *Stenopterus cyaneus* F. auch im Vauat u. in Italien.

133) *Certallum ruficollis* F. auch in Andalusien.

134) *Saperda humeralis* Menetr.

*Nigra fronte, thoracis disco humerisque flavis, elytris griseis*. Long. 5<sup>'''</sup>, lat. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>'''.

Der Kopf schwarz punctiert, der ganze unter der Fühlerbasis gelegene Theil mit fuchsrothen Haaren besetzt, innen, neben den Augen überall ein gelber Haarfleck; Fühler schwarz; Brustschild schwarz, dicht grob punctiert, in der Mitte eine gelbe glatte, glänzende Stelle weniger dicht, im Mittelpuncte gar nicht punctiert, das Schildchen weißhaarig, die Flügeldecken glatt, grob punctiert, die Schultern gelb, Füße grau, die Vorderfüße bis zum halben Obersehenkel hinauf gelb. Lebt auch in Rußland.

135) *Saperda modesta* Wl.

*Capite, thoracis medio scutelloque flavo piloso, elytris nigris*. Long. 6<sup>'''</sup>, lat. 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>'''.

Der Kopf schwarz, mit fuchsrothen Haaren bekleidet, der Brustschild tief unten an der Seite und in der Mitte ebenso behaart, zwischen dem braunen Discus und der Seite schwarz, fingerhutartig punctiert, vor der Mitte am Discus hart daneben 2 glänzende schwarze Stellen. Die Flügeldecken ziemlich glatt, tief punctiert, die Obersehenkel der Füße zur Hälfte schwarz, dann gelbbraun, die Schienen und Tarsen schwarz, die Schienen der Vorderfüße gelbbraun, die Brust an der Seite fahlgelblich, die Hinterleibsringe schwarz, hinten gelb.

136) *Leptura villosa* Koyi.

var. *flavimana* Wl.

*Grisea, thorace flavo piloso, ano pedibusque 2 anterioribus rufis*. Long. 5<sup>'''</sup>, lat. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>'''.

Das Weibchen bedeutend breiter.

Der Kopf sehr fein behaart, die Fühler schwarz, der obere Theil der ersten 6 Glieder schmal, gelb geringelt; der Brustschild stark convex, vorn enger als hinten, vorn gerandet, hinten an den Seiten eingebuchtet, am Discus Höckerig, in der Mitte eine Furche, die ganze Oberfläche grob punctiert und fahlgelblich; Schildchen glatt, schwarz, Flügeldecken sehr grob dicht punctiert, kurz fahlgelblich, die Schultern vorsiehend. Auch in Ungarn.

137) *Clythra valeriana* Friv.

*Elongata, nigra, thorace rubescente bimaculato, elytris rufis amaculatis*. Long. 5<sup>'''</sup>, lat. 2<sup>'''</sup>.

Der Kopf schwarz, dicht punctiert, zwischen den Augen in der Mitte eine längliche Grube, der Theil der Stirn von hier aus nach unten mit wellenartigen Längenfalten; Fühlerbasis und die ersten 3 Glieder hellbraun, die übrigen schwarz, die Keule gefärbt, achtgliedrig; der Brustschild sehr breit, hinten an der Seite schmalrandig, durchaus ganz glatt und glänzend ohne Punkte; am Discus 2 schwarze Flecken. Das Schildchen emporstehend, glatt, schwarz; an der Schulter jeder Flügeldecke, doch etwas vom Rande und der Basis entfernt, ein schwarzer Fleck, und in der Mitte ein sehr großer, mit ihm verflochten ein kleinerer nach außen; Füße schwarz.

138) *Cl. rufa* Klg.

*Tota coerulescens, elytris rubescentibus, maculis humeralibus 2 nigris*. Long. 4<sup>'''</sup>, lat. 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>'''.

a. Das Männchen. Der Kopf rauch, die Stirn stark eingedrückt, die Kiefer sehr stark und groß, innwendig schüsselförmig vertieft; Fühler schwarz, das erste Glied nach unten hellbraun; die Keule mit dem 5ten Gliede beginnend, die einzelnen Glieder tief in einander eingelenkt; der Brustschild sehr breit, schmal, an der Seite gerandet, hinten stark buckig, grob punctiert, durchaus aber nicht dicht feinwollig, wie mit Flaum überzogen; das Schildchen fahlgelblich; Flügeldecken sehr grob punctiert; die 2 schwarzen Schulterflecken glatt; die Vorderfüße sehr lang, die Schienen gebogen.

b) Das Weib unterscheidet sich durch kleine Kiefer, wenig eingedrückte Stirn und kurze Füße. Ähnlichkeit hat diese Art mit *Cl. tridentata* F., mit *Cl. scapularis* Dj. und *Cl. binotata* Klg., ist jedoch bey genauer Vergleichung leicht davon zu unterscheiden.

139) *Cl. binotata* Klg.

Unterscheidet sich von der *Cl. rufa* durch etwas größeren Körperbau, plattere, viel feiner punctierten Brustschild, fahlgelbe Farbe des Leibes und hellere Flügeldecken.

140) *Cl. limbata* Stév.

*Tota viridis, elytrorum margine late rufo*. Long. 2<sup>'''</sup>, lat. 1<sup>'''</sup>. Das Weibchen viel größer.

Der Kopf dicht, ziemlich grob punctiert, die Stirn eingedrückt, die Fühler schwarz, das zweite und dritte Glied braun; der Brustschild sehr schmal, glänzend, einzeln grob punctiert, an den Seiten und hinten schwach gerandet, das Schildchen emporstehend, punctiert; die Flügeldecken sehr grob grubenartig; der Discus sattelförmig, schön lebhaft grün, der breite Rand hellbraun; ein sehr niedliches Thierchen, kommt auch in Rußland vor.



# S i i S.

## Encyclopädische Zeitschrift,

vorzüglich

für Naturgeschichte, vergleichende Anatomie und Physiologie,

von

### S t e n.

1 8 3 8.

H e f t VII. u. VIII.

Tafel V. u. VI.

Der Preis von 12 Heften ist 8 Thlr. sächs. oder 14 fl. 24 Kr. rheinisch, und die Zahlung ist ungetheilt zur Leipziger Ostermesse des laufenden Jahres zu leisten.

Man wendet sich an die Buchhandlung Brockhaus zu Leipzig, wohin auch die Beiträge zu schicken sind. Es wird gebeten, dieselben auf Postpapier zu schreiben.

Unfrankirte Bücher mit der Post werden zurückgewiesen.

Einrückgebühren in den Text oder Umschlag die Zeile sechs Pfennige.

Von Anticritiken (gegen Fests-Reценsionen) wird eine Quartseite unentgeltlich aufgenommen.

Leipzig, bey Brockhaus.

# A n z e i g e n.

## Insecten-Verzeichniß

des Dr. med. Jos. Walzl zu Passau in Bayern.

Fortsetzung von Heft VI.

<i>Erotulus immaculatus</i> St.	kr.	18 <i>Macronota strigosa</i> Ol.	kr.	20 <i>Steirastoma depressa</i> F.	kr.	20 <i>Trox luridus</i> F.	hr.
— <i>gibbosus</i> F.	24	24 <i>Mallosoma elegans</i> F.	18	18 <i>Saperda hemispila</i> Germ.	21	— <i>horridus</i> —	9
<i>Eumolpus biguttatus</i> Germ.	9	9 <i>Megalopus sellatus</i> F.	20	20 — <i>triangularis</i> Germ.	21	<i>Rhytirhinus inaequalis</i> —	13
<i>Eumolpus cruciatus</i> St.	15	15 <i>Monocrepidius alternans</i> F.	18	18 <i>Scarabaeus Pan</i> F.	fl. 3	— <i>Myllabris Lavaterae</i> —	19
<i>Eurylobus cingulatus</i> F.	18	18 <i>Nyctophanes lineata</i> F.	18	18 <i>Trachyderes rufipes</i> —	15	— <i>capensis</i> —	14
<i>Falciger sanguinicollis</i> Germ.	9	9 <i>Orobis anceps</i> Germ.	6	6 — <i>succinctus</i> —	15	— — —	14
<i>Galleruca assimilis</i> St.	9	9 <i>Passalus convexus</i> Dj.	21	21 <i>Upis chrysops</i> —	14	<i>Anisoplia trochyl.</i> St. Mexico.	9
— <i>15 punctata</i> Germ.	9	9 — <i>morio</i> —	21	<b>COLEOPTERA CAROLI-</b>		<i>Dytiscus grandis</i> Cuba	40
<i>Gymnetis sordida</i> F.	14	14 — <i>crenulatus</i> —	20	<b>NENSIA.</b>		<i>Geonemus alternans</i> Schh.	15
<i>Haltica 8 guttata</i> Schh.	8	8 — <i>striolatus</i> —	20	<i>Americae borealis.</i>		<i>Hydrophilus olivaceus</i>	20
— <i>famelica</i> F.	8	8 — <i>transversalis</i> —	20	20 <i>Calosoma calidum</i>	24	<i>Chrysomela fulminans</i> F. Sib.	15
— <i>divisa</i> Ger.	8	8 <i>Pelidnota semiaurata</i> Klz.	20	20 <i>Canthon volvens</i> F.	10	<i>Scarabaeus Orion</i> D. Senegal.	18
<i>Heilopus spathulatus</i> Germ.	10	10 — <i>testacea</i> Dj.	18	20 <i>Chrysomela pulchra</i> —	6	<i>Coccinella trilineata</i> St. Cruz.	4
— <i>ruftarsis</i> F.	18	18 <i>Phanaeus splendendus</i> F.	18	18 <i>Clytus flexuosus</i> —	9	<i>Euchlora viridis</i> F. Ind. or.	18
<i>Heomus roreus</i> F.	12	12 — <i>corydon</i>	18	18 <i>Colaspis ovata</i> K.	6	<i>Prionus damicornis</i> F. Cuba fl. 1	—
<i>Helops suturalis</i> Germ.	14	14 — <i>maculicollis</i>	18	18 <i>Copris carolina</i> F.	24	<i>Gematis varians</i> Wl. Mexico.	18
<i>Hispanigrofasciata</i> St.	15	15 <i>Platymus piscatorius</i> F.	20	20 <i>Coccinella 10maculata</i> —	6	<i>Hypolithus holosericeus</i> D.	9
<i>Hister angulatus</i> Pk.	9	9 — <i>nodipennis</i> F.	18	18 <i>Elatr myops</i> —	15	— <i>sap. nar.</i>	9
<i>Homalinotus deplanat.</i> Sahlb.	18	18 — <i>variegatus</i> F.	18	18 <i>Gyrinus vittatus</i> Germ.	10	<i>Ambates pictus</i> Schh. Cayen.	10
<i>Hypsonotus clericus</i> F.	15	15 — <i>maculatus</i> F.	20	20 <i>Helops micans</i> Dj.	12	<i>Eumolpus asiaticus</i> Krim.	24
— <i>clavulus</i> Germ.	12	12 <i>Poecilobius fasciatus</i> F.	15	15 <i>Hister abbreviatus</i> F.	9	— — —	9
<i>Leucothyreus pulverosus</i>	15	15 — <i>histrio</i> —	15	15 <i>Macroductylus subspinos.</i> F.	10	<b>COLEOPTERA JAVANICA.</b>	
— <i>abdominalis</i>	21	21 <i>Pogonocherus violaceus</i> W.	12	12 <i>Macronota nitida</i>	12	<i>Upis impressa</i> Wd.	18
— <i>aurochalcus</i>	21	21 <i>Probatus albonotatus</i> Dj.	18	18 <i>Megacephala carolina</i> —	20	<i>Opatrum crenatum</i> F.	12
<i>Lissonotus purpuratus</i> Germ.	30	30 <i>Promecops nubifer</i> —	15	15 <i>Passalus cornutus</i> —	15	<i>Uloa 4 corne</i>	20
<i>Lixus impressus</i> Wtl.	6	6 <i>Ptychoderes elongatus</i> F.	12	12 <i>Phanaeus carnisex</i> —	14	<i>Hydrophilus resplendens</i> Et.	24
<i>Lordops navicularis</i> F.	14	14 <i>Rhigus tribuloides</i> Hbst.	42	42 <i>Rhagium lineatum</i> —	9	<i>Galleruca albicornis</i> Wd.	18
— <i>Gyllenbali</i> Schh.	15	15 <i>Rutela pustulata</i> F.	20	20 <i>Scarabaeus relictus</i> Say.	15	<i>Passalus laterisculptus</i> Pty.	30
<i>Lytta fucata</i> Dj.	15	15 — <i>rubiginosa</i> —	18	20 <i>Tetraepus tornator</i> F.	18	<i>Gyrinus aeralus</i> Wtl.	20
— <i>suturalis</i> Klz.	20	20 — <i>ephippium</i> —	18	18 <i>Upis saperdoides</i> Dj.	12	<i>Eumolpus corallifer</i> St.	30
<i>Macraspis tetractyla</i> F.	18	18 <i>Soerangodes cicatricosus</i> Dj.	18	<i>Coleoptera capensis.</i>		<i>Mormolyce phyllodes</i> fl. 10	—
— <i>nitida</i> F.	20	20 <i>Stenochia cylindrica</i> F.	21	21 <i>Ateuchus granulatus</i> Ol.	10	<i>Hylobius irroratus</i> Hag.	15
— <i>fucata</i> F.	48	48 — <i>splendida</i> G.	20	20 <i>Buprestis hirta</i> F.	18	<i>Passalus 4dentatus</i> Wtl.	18
— <i>clavata</i> —	12	12 — <i>limbata</i> F.	20	20 <i>Cetonia haemorrhoidalis</i> —	18	<i>Erotulus 4 maculatus</i>	18
<i>Macromerus crinitarsis</i> Schh.	12		20	— <i>carmelita</i> —	15	<i>Oxyrhynchus discors</i>	20

Remarque. Les 'coléoptères ci-joints forment le suite de la liste parue l'année passé dont on donnera toujours des exemplaires en cas de demande. Les coléoptères y mentionnés sont encore pour la plupart présents. Dans un débit au dessus de 30 florins on permettra un rabais de dix p. c. Les exemplaires sont parfaitement bien conservés.

# COLEOPTERA EUROPAEA.

	kr.		kr.		kr.		kr.
Cicindela germanica	6	— bipunctatus F.	10	Malachius rubricollis Fal.	6	Anisoplia austriaca Hbst.	6
— gracilis Pall.	18	— femoralis Pk.	9	Dasytes rubidus Koy.	6	— lineolata Dj.	20
— riparia St.	8	Lacophilus variegatus Kch.	12	— metallicus	6	— rumelica F.	24
— dilacerata	24	Noterus crassicornis	3	— maurus Mg.	6	Amphicoma bicolor F.	24
— silvatica	12	Hydroporus balensis	6	— tomentosus Pz.	30	— apianipennis F.	24
Drypta cylindrica	12	— fusculus Ill.	6	Rhysodes europæus Dj.	6	— apicalis Brul.	30
Polystichus fasciolatus	24	— pictus St.	6	Dorcotoma dresdense Hbst.	6	— Lasserei	20
Dromius fasciatus	9	— ruficornis Dft.	8	Gibbium sulcicollis St.	24	Cetonia fastuosa	20
— linearis Ol.	9	Haliplus bistriolatus —	8	Seydmænus hirticollis Gl.	6	— albella Fall.	12
— plagiatus Mg.	12	— elevatus Pz.	12	Tillus ambulans	15	— adpersa F.	36
Cymindis meridionalis D.	12	Gyrinus orientalis F.	12	Clerus mutilarius	9	Pimelia aspera D.	21
Brachinus glabratus	8	Staphylinus fuliginosus Gr.	15	Trichodes 4pustulatus Brul.	30	— granulosa Lat.	21
Apinus mutilat.	15	— decorus —	6	Silva 4punctata	10	— globosa Pall.	24
Ditomos dama Rossi	18	— coenosis —	9	— granulata Ol.	15	— subscabra Dj.	21
Cychnus semigranulosus	36	— himaculatus —	9	Peltis dentata	15	Hegeter caraboides —	24
Procerus tauricus Pall.	11. 4	— quisquilius Gyl.	9	Thymalus limbat.	24	Akis inflata K.	24
Procrustes carab. Friv.	11. 1	Oxytelus unicornis Germ.	10	Ips abbreviata Pz.	9	— deplanata W.	40
— vicinus —	11. 1	Omalium pallidum Gr.	2	Strongylus ferrugin.	6	Blaps spinimana Pall.	15
Carabus graniger Dhl.	18	— castaneum	2	— strigatus	8	— angusticollis Fdl.	18
— Wolfi	21	— atrocephalum Gyl.	8	Colobicus marginatus Lat.	18	Platyscelis gages	24
— campestris St.	24	Tachyporus pusillus Gr.	9	Nitidula flexuosa	9	Heliophilus punctatus St.	18
— caelatus	24	— fimetarius G.	11	Micropeplus staphylinoid. Mb.	24	Phylan crenatus Dj.	15
— graecus	42	Aleoxyx castanea Wtl.	3	Cryptophagus Wolfi Wtl.	6	— aegyptiacus St.	15
Nebria castanea Bon.	15	Aleochara elongatula Gr.	18	Dermestes vulpin.	2	Dendarus cribrerosus Wtl.	18
Leistus analis	12	— angustula Gyl.	6	Attagenus 20guttat.	8	Opatur laticollis Dhl.	12
— coeruleus	15	— excavata —	6	Troscus clavicornis Mg.	10	— obesus W.	15
Licinus silphoides	15	— impressa Erchs	8	Hister granulum Erchs.	12	— pictum	9
Badister peltatus Pz.	10	Buprestis conspersa Gl.	36	Byrrhus setosus Wtl.	15	Crypticus gibbulus Schh.	18
Chlaenius velutinus	10	— lugubris	20	— gigas	15	Tenebrio curvipes	18
Amara spreta Zim.	9	— geminata Ill.	15	— auratus	10	Hypophloeus depressus	10
Anchomeus oblongus	8	— morio	12	Georissus pygmaeus	8	Uloa chrysomelina	15
Agonum fuliginosum Kch.	9	— candens	15	— Elmisi pygmaeus Mül.	15	— furca F.	54
— foveolatum Gyl.	15	— flavomaculata	30	— canaliculatus Gyl.	9	Diaperis violacea	12
— elongatum Dj.	12	— onopordi	30	— Parnus substriat. Mül.	15	— cornigera Mg.	18
Sphodrus cimmerius F.	20	— maculicollis Dj.	12	Heterocerus parallel. Chr.	9	Pentaphyllus melanophthal-	
Calathus fulvipes	2	— taeniata	12	Elophorus tuberculatus Gyl.	6	— mus Dj.	12
Argutor striatocollis Dj.	12	— tenebricinis	12	Ochthebius sulcicollis Mül.	20	— testaceus	15
Omasus cophosioides	gl. 15	— stigmatica Fr.	11. 12	— exsculptus	9	Corticus tuberculatus	20
Abax bekenhauptii	18	— porosa F.	11. 12	Hydraena pulchella Mül.	10	Lithophilus connatus	21
Pterostichus fossulat. Schh.	15	Elater rugipennis St.	12	Hydrobius minutissim. M.	12	Trachyscelis aphodioides Lat.	21
Zabrus blapoides	15	— assimilis Gyl.	9	Spharidium boletophag. Mb.	12	— rufa Fr.	24
Myas chalybeus	42	— minutus	6	Onitis bison	10	Agathidium atrum Pk.	6
Ophonus obsoletus Dj.	12	— mus Ill.	12	Onthophagus hirtus Ill.	12	Dircaea discolor	24
— affinis Dhl.	12	— lythrodæ G.	6	— marginalis Gebh.	18	— 4guttata	21
— punctatulus Dj.	12	— fasciatus F.	6	Aphodius tessellatus Pk.	6	Serropagus barbatus	40
— columbinus Germ.	6	— atomarius	15	— scrutator	6	Pytho depressus	18
Harpalus nitidus St.	6	— ephippium	3	— tristis Gyl.	10	Allecula morio	15
— impiger Dft.	10	— striatus	4	— rufescens	3	Helops obesus F.	20
— flavicornis Dj.	8	— rufipes F.	12	— cæsus	3	— maurus F.	20
— crassipes Dft.	8	— nigrinus Pk.	2	— terrestris	8	— laticollis Dj.	12
— servus —	10	— var. ustulus Schh.	2	Scarabeus punctatus	10	— asphaltnus Dhl.	16
— anxius —	9	Encumenes elaticollis R.	18	Lethrus cephalotes	12	Cistela atra	15
— griseus Pz.	6	— capucinus	14	Armideus fossor Wtl.	18	— lugubris Dj.	15
— luteicornis Gyl.	9	Atopa cinerea	18	Melolontha pilosa	40	Anthicus limbatus Erchs.	10
Acupalpus discophorus F.	9	Enbria palustris Zgl.	18	— fullo	18	— bifasciatus	14
— luridus Dj.	10	Lycus sanguineus	12	— luscens St.	8	Rhipiphorus flabellatus	12
— vespertinus Kg.	36	Lampyrus illyrica Dj.	4	— transversa Ol.	15	Cerocoma Kunzei Fris.	30
Apotomus testaceus Ol.	36	— italica	12	— torulosa F.	12	Myliabris variabilis Pall.	12
Trechus micros Hbst.	9	Cantharis lateralis Bon	6	— tenebricoides Pal.	30	— decora F.	20
Bembidium lepidum Dj.	9	— oculata Gebh.	24	— costulata F.	24	— fasciatopunctata	12
— confusum	4	Homalitis suturalis	12	— gracilis W.	36	Zonitis caucasica Pall.	21
— bipunctatum	8	Silis spinicollis Mg.	18	Anomala auricollis Dhl.	36	— præusta	15
					9	— maculata Ol.	21

Fortsetzung folgt.

# I n n h a l t.

## Versammlung der Naturforscher und Aerzte zu Prag 1837.

- E. 473. Vorbereitungen.
- 476. Mitglieder.
- 478. Graf Caspar Sternberg, Eröffnungsbrede.
- 483. Bischoff, über die Abkühlung der Erde.
- 494. Baron C. v. Hügel's Reise.
- — Göppert, über die Bildung der Pflanzen-Versteinerungen.
- 501. Wahl des Versammlungsortes.
- 502. Schaafpie, über den Einfluss des Branntweins.
- 506. Lenhoffel, Preis auf die Hundswuth.
- 508. Zippe und Sternberg, über einen verschlackten Wall.
- 513. L. Reichenbach, über die Entwicklung und den heutigen Stand der Naturgeschichte.
- 524. Kromholz und Röggerath's Abschiedsreden.
- 530. Physikalische Verhandlungen.
- — Ettingshausen, über die Einrichtung und den Gebrauch der magneto-electrischen Maschine. Taf. V.
- 538. Chemische und pharmaceutische Verhandlungen.
- 539. Mineralogische Verhandlungen.
- — Reuß, über die geognostischen Verhältnisse von Töplitz.
- 541. Klipstein, über die Stellung des Dinotheriums.
- — Röggerath, räthselhafte Versteinerungen.
- — Mieninger, über Thierfährten bey Stuttgart.
- 542. Preininger, geognostische Charte von Prag.
- 543. Raumann, geognostische Charte von Sachsen.
- — Zippe, geognostische Charte von Böhmen.
- 544. Sellet, neue Mineralien; Selen mit Spießglas.
- — Reuschner, über den Diorit in Oberschlesien.
- 546. Kesterlein, Geognosie von Töplitz.
- — Dtko, schlesische Versteinerungen.
- 547. Germar, Solaniten.
- — Jäger, Keuper.
- 548. Abich, Erhebungs-Grater.
- 551. Frankenheim, Crystallisation.
- — Breithaupt, Verwachsung der Cryskalle.
- 552. Strauß, Explosionen in der Erde.
- 553. Meier, geognostische Charte von Böhmen.
- 554. Bousdorff, Bekandtheile des Labradorsteins.
- — Bousdorff, geognostische Charte der Karpathen, edler Dyal.
- 555. Zawadzky, Mineralien aus der Bukowina.
- 556. Botanische Verhandlungen.
- — Langer, Spermatozoen der Pflanzen; Raltesia.
- 559. Bentham, Hülsenpflanzen; Pflanzenhandel.
- 561. Ramiß, fruchtbare Samen ohne Bestäubung.

- E. 562. Diafoletto, Metamorphose der Meer-Algen.
- 564. Corda, Spiralfaserzellen den Pilzen; System der Pilze.
- 565. Fenzl, Samenträger der Kürbisen.
- — Jäger, Blätter des Tabaks.
- 567. Dpiz, Pflanzentaufsch.
- 568. Welwitsch, unterirdische Pilze; Pflanzenboden.
- 569. Rifan, Meerbälle.
- 570. Reichenbach, über Richters Ausgabe der Linneischen Schriften.
- 571. Dpiz, Vegetation; Verhältnisse Böhmens.
- 572. Göppert, Pflanzenstelette.
- 573. Anatomische Verhandlungen.
- — Czermak, Nierenkanäl.
- — Purkinje, Bau der Magendrüsens. Taf. VI.
- 575. Wilbrand, Brustkasten der Fische.
- 576. Münz, Herzpölypen; kypflose Mißgeburten.
- 580. Berres, Bau der weiblichen Schleimhaut; der Nerven; Darmfloeken.
- 581. Purkinje, Bau der Nerven. Taf. VI.
- 583. Heller, Rhodizonsäure im Blut, Dotter, Federn.
- 587. Purkinje und Popenheim, Verdauung.
- 591. Zoologische Verhandlungen.
- — Schlegel, der große Salamander aus Japan.
- 592. Cars, Entwicklung der Tritonia ascanii.
- — Zilefius, Crang-Utan.
- 593. Schulze, Macrobiotus.
- 594. Kaup, Dinotherium.
- 597. Medicinische Verhandlungen.
- — Kreyffig, über den Kreislauf.
- 600. Stoda, Theorie des Herzstoßes.
- 603. Landwirthschaftliche Verhandlungen.
- 604. Besuch von Fabriken, Anstalten und Landgütern. Große Fichte. Schädliche Larven. Seidenzucht.
- 610. Kaiserliches Gastmahl. Ball des Handelskaudes.
- 611. Gedichte von Swoboda, Rifan, A. Müller, Frank, Evert.

- 621. Röggerath's Ausflug nach Böhmen.
- — G. Bonaparte's Fauna italica.

## U m f a ß.

Dr. Jos. Walz's Insecten-Verzeichniß. Fortsetzung.

## Kupfertafeln.

- Taf. V. zu Seite 530. Magneto-electrische Maschine.
- VI. zu E. 573 Fig. 1—8. Magendrüsens; E. 581 Fig. 9—20. Bau der Nerven.

1838.

D e f t VII.

## Versammlung der Naturforscher und Aerzte zu Prag

im September 1837.

**P**rag ist eine der ältesten, größten und schönsten Städte unseres Vaterlandes, war einst die Hauptstadt des deutschen Reichs, war lang die zweyte Stadt desselben und ist noch gegenwärtig die dritte des deutschen Bundes. Sie hat uralte Erinnerungen in der Geschichte der Slaven und Deutschen, sowohl im Kriege als im Frieden, sowohl in der Cultur des Landes als in der Kunst und Wissenschaft. Ihre Universität, die älteste in Deutschland und eine der ältesten in Europa, war und ist eine der berühmtesten, zählte einstens Tausende von Studierenden und kann ein langes Verzeichniß der größten Gelehrten in allen Fächern der Wissenschaft aufweisen. Von jeher blühten daselbst die Naturwissenschaften und in der neuesten Zeit haben sie eine Höhe und Ausdehnung erreicht, wie nie zuvor, sowohl hinsichtlich der reichen Sammlungen als der tüchtigen Männer, welche an diesem Rufensitze lehren. Es war daher begreiflich, daß die Naturforscher und Aerzte sich nach der Versammlung an einem solchen Orte sehnnten und die erste Gelegenheit ergriffen, ihre Wanderung dahin anzustellen. Sie wurden daselbst auch mit so viel Liebe empfangen und so gastfreundlich behandelt, wie es von einer Bevölkerung zu erwarten war, welche in den Naturwissenschaften, der Medicin, der Landwirtschaft und den Gewerben eine der höchsten Stufen erstiegen hat. Es ist nur eine Stimme über die Zufriedenheit mit dem dortigen Aufenthalt und über die Belehrung, welche man aus den Anstalten und aus dem wissenschaftlichen Betriebe so vieler Gewerke und der höhern Landwirtschaft geschöpft hat.

Der Kaiser wies eine namhafte Summe zur Bestreitung der Ausgaben an, und die höchsten Beamten, sowohl zu Wien als zu Prag, ließen den Geschäftsführern, dem Grafen Caspar v. Sternberg, dem Professor v. Krombholz und dessen Gesammann, Prof. Kozielezky, alle Unterstützungen ange-

beihen. Die Universität wies das Carolinum zu den Sitzungen an, wodurch der Vortheil erreicht wurde, daß jeder Anwesende bey jeder Witterung und ohne Zeitverlust mehreren Fachverhandlungen bewohnen konnten, was immer sehr schwierig ist, wenn die Sitzungen in verschiedenen Gebäuden gehalten werden müssen.

Nachdem die verschiedenen Zimmer zum Empfang, zu den Versammlungen, zum Essen und zur Conversation aussersehen und eingerichtet waren, erließen die Geschäftsführer eine Aufforderung an die Einwohner, wegen Ablassung von Wohnungen für die Fremden. Auch in Hinsicht der Policey und Mauth wurden von den obersten Behörden die liberalsten Befehle ertheilt, so daß die Fremden an den Grenzen nicht nur keinen Aufenthalt gefunden, sondern aufs freundlichste behandelt wurden, wie dieses in Noeggerath's Ausflug nach Böhmen aufs Rühmlichste erwähnt ist. Als Noeggerath mit mehreren andern Naturforschern von Bayreuth her zu Mählsbad die österreichische Mauth zu passiren hatte, ängstigte es sie sehr, daß man alle ihre Kisten und Säcken mit den auf der Reise gesammelten Mineralien aufpacken und durcheinander werfen würde. Nachdem sie aber ihre Pässe vorgewiesen und sich als Naturforscher erklärt hatten, sagte der Mauthbeamte: ihre Sachen würden nicht visitirt und sie sollten nur erklären, was sie mit sich führten. Diese milde Behandlung war Folge ausdrücklicher Anordnung von Seiten der Regierung. — Als ihm am Thore von Prag der Officier den Empfangschein für den Paß zurückbrachte, sagte er ihm sogleich den Namen seiner bestellten Wohnung, so daß er nicht nöthig hatte, vorher in einem Wirthshause abzusitzen, in den Einschreibsaal zu gehen, um seine Eintrittskarte und den Namen der Wohnung zu holen. Der Officier fügte hinzu: die Mauthbeamten haben nicht das Recht, sie zu visitiren. Diese begnügten sich auch mit der Erklärung, daß sie Naturforscher seyen. In

seinem Zimmer angekommen, fand er sogleich die gedruckten Nachrichten für die Mitglieder der Versammlung, wo sie sich nämlich sollten einschreiben lassen, wo die Sitzungssäle usw. seyen. Mit den Mietzwägen waren billige Preise festgesetzt.

Die Theilnehmer schrieben sich mit chemischer Dinte ein und das Verzeichniß derselben wurde abgedruckt in dem sehr vollständigen amtlichen Bericht (Prag, bey Haase. 1838. 4. 235.). Die besondern Sitzungen wurden in 7 Fächer getheilt:

- 1) Physik, Chemie, Astronomie und Mathematik.
- 2) Pharmacie.
- 3) Mineralogie, Geognosie, Geologie und Geographie.
- 4) Metanik.
- 5) Anatomie, Physiologie und Zoologie.
- 6) Heilkunde.
- 7) Agronomie, Pomologie, Technologie und Mechanik.

Hiebey erlauben wir uns noch zu bemerken, daß es sehr vorthellhaft ist, wenn der Protocollführer an dem Versammlungs-orte selbst zu Hause ist, weil man einem Fremden unmöglich zumuthen kann, daß er sich täglich einfinde und den Abend damit verliere, daß er das Protocoll in Ordnung bringe. Auch ist es sehr unangenehm, wenn der Geschäftsführer vor dem Abdruck der Protocelle vielleicht wiederholt an die weit entfernten Protocollführer schreiben soll, um über dieses und jenes Auskunft zu erhalten. Sind alle Protocollführer von demselben Orte, so können sie sich mit den Geschäftsführern zusammensetzen und die Verhandlungen in wenig Tagen ordnen, während im andern Falle mehrere Monate verstreichen, ehe der Bericht gedruckt werden kann. Dagegen ist die Stelle des Vorstandes seines Faches eine bloße Ehrenstelle, womit keine weitem Geschäfte verbunden sind, und daher ist es schädlich einen Fremden zu wählen, besonders solche, welche weit her sind, wosern sie nur deutsch sprechen können. Aus demselben Grunde muß man täglich einem Andern die Ehre erweisen, sowie auch deshalb, damit ein- und derselbe nicht gezwungen ist, täglich der Sitzung seines Faches bezuzuwohnen, während er vielleicht gern ein anderes Fach besuchen möchte.

Noch ist es rathsam, ein mäßiges Mittagsmahl zu veranstalten, welches ohne den Wein nicht über einen Gulden, wenigstens nicht über eine halbe Krone kosten sollte; sonst verbringen die Naturforscher zu viel Zeit bey dem Essen und können den kurzen Nachmittag nicht mehr zu Excursionen benutzen. Vielen ist auch die Ausgabe zu groß und sie bleiben daher vom Mittagstische weg oder gar von der Versammlung.

In Prag finden sich nicht weniger als 30 Anstalten und Sammlungen, welche den Gelehrten täglich offen standen:

- 1) die Universitätsbibliothek;
- 2) die Bibliothek des Prämonstratenserstiftes Strahof;
- 3) das vaterländische Museum;
- 4) die Gemäldesammlung der patriotischen Kunstfreunde;
- 5) die des Grafen E. Nestitz;
- 6) das anatomische Museum;
- 7) das zoologische Cabinet;
- 8) das mineralogische Cabinet;
- 9) der botanische Garten;
- 10) das chemische Laboratorium;

- 11) das physikalische Cabinet;
- 12) die Sternwarte;
- 13) die Sammlungen des polytechnischen Instituts;
- 14) das Krankenhaus;
- 15) die Irrenanstalt;
- 16) die Entbindungsanstalt;
- 17) das Siechenhaus;
- 18) das Spital der Elisabetherinnen;
- 19) das Spital der barmherzigen Brüder;
- 20) das Taubstummen-Institut;
- 21) das Waisenhaus;
- 22) das italienische Waisenhaus;
- 23) das Armenhaus;
- 24) das Blinden-Institut;
- 25) die Beschäftigungsanstalt für Blinde;
- 26) die fünf Kleinkinder-Bewahranstalten;
- 27) die Sammlung des Vereins zur Ermunterung des Gewerbetreibenden;
- 28) die Anstalt zur Beförderung weiblicher Kunstfertigkeit;
- 29) das Provinzial-Erstrafhaus, und
- 30) das Correctiionshaus.

Ueber die naturhistorischen Sammlungen findet man ziemlich ausführliche Nachrichten bey Nöggerath.

Auch das Theater hat auf die Anwesenheit der Naturforscher Rücksicht genommen.

Nach Nöggeraths Beschreibung stand in dem großen Promotionssaale auf einer erhöhten Bühne der Tisch der Geschäftsführer und an den Seiten mehrere Reihen Sessel für die Landesbehörden und die Personen von höherem Rang. Die Mitglieder setzten sich nach Belieben. Im Hintergrunde waren die übrigen Theilnehmer auf einer erhöhten Bühne; auf den Vorbühnen die Frauen.

Die Zahl der Mitglieder betrug 392. Darunter 88 Physiker und Chemiker, 11 Pharmacuten, 73 Mineralogen, 65 Botaniker, 64 Zoologen, 142 Aerzte und 62 Landwirthe. — Es würden viel mehr gekommen seyn, wenn nicht 14 Tage vorher in den Zeitungen wäre ausgeteilt worden, daß in Prag die Cholera wüthe. — Wir heben diejenigen aus, welche als Schriftsteller bekannt sind oder Vorträge gehalten haben. Etwaige Versehen wird man verzeihen.

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Abich aus Braunschweig.         | Corda zu Prag.           |
| Ambraser zu Prag.               | Cotta aus Tharand.       |
| Baumgartner aus Wien.           | Czermak aus Wien.        |
| Elie de Beaumont aus Paris.     | Dießing aus Wien.        |
| Benham aus London.              | Dorffler zu Prag.        |
| Berres aus Wien.                | Ehrmann aus Olmütz.      |
| Biacetto aus Triest.            | Ehrlicher aus Krakau.    |
| Bischof v. Uttenkofen aus Wien. | Ettingshausen aus Wien.  |
| Blasius aus Halle.              | Fenzl aus Wien.          |
| Bonnendorf aus Helsingfors.     | Frankenheim aus Breslau. |
| Brandes aus Cassauken.          | Fürnrohr aus Regensburg. |
| Dreithaupt aus Freiberg.        | Gernar aus Halle.        |
| Duch aus Berlin.                | Göppert aus Breslau.     |
| Duchner aus München.            | Gumprecht aus Berlin.    |
| Dujanewicz aus Habsan.          | Haidinger aus Elbogen.   |
| Cerutti aus Leipzig.            | Harleß aus Bonn.         |
| Chaupepié aus Hamburg.          | Heidler aus Marienbad.   |



Seller zu Prag.  
 Herrig Schäfer aus Regensburg.  
 Seßler zu Prag.  
 Solger aus Wien.  
 Sorpe aus Regensburg.  
 Sögel aus Wien.  
 Täger aus Stuttgart.  
 Täger aus Wien.  
 Tanderer zu Prag.  
 Teittelsee zu Prag.  
 Tof aus Wien.  
 Klippstein aus Gießen.  
 Tobell aus München.  
 Tostelky zu Prag.  
 Treßig aus Dresden.  
 Trombold zu Prag.  
 Leithner aus Wien.  
 Leinheck aus Ofen.  
 Leupold aus Erlangen.  
 Lichtlein aus Berlin.  
 Liebig zu Prag.  
 Loewig aus Zürich.  
 Lumniger aus Brünn.  
 Mäbler aus Berlin.  
 Mikan zu Prag.  
 Mohr aus Coblenz.  
 Mohs aus Wien.  
 Morstadt aus Prag.  
 Münchmayer aus Lüneburg.  
 Münz aus Würzburg.  
 Munte aus Heidelberg.  
 Naberny zu Prag.  
 Natterer aus Wien.  
 Naumann aus Freyberg.  
 Nees von Esenbeck aus Breslau.  
 Nessler aus Olmütz.  
 Neumann zu Prag.  
 Nöggerath aus Bonn.  
 Graf v. Nostitz zu Prag.  
 Aufhardt zu Prag.  
 Omalius aus Halloy in Belgien.  
 Orit zu Prag.  
 Otto aus Breslau.  
 d'Outrepont aus Würzburg.  
 Partsch aus Wien.  
 Pfeißl zu Prag.  
 Pleininger aus Stuttgart.  
 Pogendorf aus Berlin.  
 Pohl aus Breslau.

Popp zu Prag.  
 Preininger zu Prag.  
 R. Preol zu Prag.  
 S. Preol zu Prag.  
 Purkinje aus Breslau.  
 Radius aus Leipzig.  
 Rammelberg aus Berlin.  
 Reich aus Freyberg.  
 Reichenbach aus Bielsko.  
 Reichenbach aus Dresden.  
 Reum aus Tharand.  
 Reuß aus Bilit.  
 Riecke aus Stuttgart.  
 Ritgen aus Gießen.  
 Ritterich aus Leipzig.  
 Rohde aus Leipzig.  
 S. Rose aus Berlin.  
 Roser aus Stuttgart.  
 Rosmüller aus Tharand.  
 Roux aus Paris.  
 Rumpelt aus Dresden.  
 Sars aus Bergen in Norwegen.  
 Schimfo aus Olmütz.  
 Schlieben aus Dresden.  
 Schrötter aus Grätz.  
 Schwägerich aus Leipzig.  
 Schweigger aus Halle.  
 Schweitzer aus Tharand.  
 Silber aus München.  
 Sommer zu Prag.  
 Stelzig zu Prag.  
 Graf v. Sternberg zu Prag.  
 Strang aus Breslau.  
 Tauch zu Prag.  
 Teichmann aus Muckeln.  
 Textor aus Würzburg.  
 Tilschuo aus Leipzig.  
 Türckheim aus Wien.  
 Unger aus Grätz.  
 Voigt aus Jena.  
 Walz aus Altenburg.  
 Weiße aus Krakau.  
 Wendt aus Breslau.  
 Wenke zu Prag.  
 Wiesenfeld zu Prag.  
 Wikstrand aus Gießen.  
 Zennet aus Tübingen.  
 Zeischner aus Krakau.  
 Zippe zu Prag.

Capellmeister Titl. Der Prager Kaufmannsstand gab den geachteten Gästen auf dieser Insel einen glänzenden und geschmackvollen Ball.

Montag, den 18. September,

um 11 Uhr eröffnete der erste Geschäftsführer, Caspar Graf v. Sternberg, der ruhmgekrönte Veteran in der Naturgeschichte und der eifrigste Beförderer der Versammlung,

### die erste allgemeine Sitzung

mit folgendem Vortrag:

1) Die heute beginnende Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in diesem ehrwürdigen Musen-Sitze leitet uns auf zwei, eben so merkwürdige als erfreuliche Betrachtungen. Wir sehen auf den Bänken der alten Carolina, die einst den Schülern der vier Nationen gewidmet waren, um die Anfangsgründe der, selbst kaum aus der Asche wieder aufstehenden Natur- und Arzneikunde zu erlernen, — die Meister aus Deutschlands verschiedenen Hochschulen und Naturforscher von entfernten Punkten Europas versammelt, nicht um zu lernen oder zu lehren, sondern um das Gelehrte und Erfahrene als ein Gemeingut mit uns zu theilen, sich an dieser Verbreitung des Wissens zu erfreuen, und wie einst Plato das Schöne zum Guten, hier das Gute zum Gemeinnützigen zu wenden.

Sie seien uns herzlich willkommen an der Witawa Strand!

Willkommen in der alten geschichtlichen Praga!

Willkommen in der nahe 500 jährigen Carolina!

Derselbe Gegensatz, der sich uns bei Vergleichung des Ehemals und Jetzt in dieser Versammlung dargeboten, wird uns eben so deutlich entgegen treten, wenn wir den Zustand der Natur- und Arznei-Wissenschaften im Jahre der Gründung der Universität 1348 mit jenem des Jahres 1837 vergleichen. Dadurch werden jedoch die Verdienste des ersten Stifters um das Vaterland und die Wissenschaften nicht geschmälert. Was in seiner großartigen Denkwiese gereift war und ausgeführt wurde, hat reichliche Früchte getragen. Jede geistige Entwicklung ist durch Zeit und die vorwaltenden Umstände in derselben bedingt, wird oft auf indirectem Wege mehr gefördert als durch die getroffenen Vorkehrungen und Anstalten.

Kaiser Karl IV., von dem gelehrten Abt Roger erzogen, war mit seinem Vater, König Johann, in Paris. Das wissenschaftliche Treiben an der hohen Schule, welches er dort gewahrte, scheint in dem Gemüthe des jungen Königssohnes einen tiefen Eindruck zurück gelassen zu haben, der ihn bis zu der späteren Ausföhrung seines Planes nie verließ. Er wurde von seinem Vater als Statthalter in Mailand gerade in der Zeit eingesetzt, als die aus dem Orient nach Europa strömenden Wissenschaften sich zu entwickeln und zu verbreiten begannen; er kam hier in Berührung mit wichtigen Zeitgenossen, worunter auch Petrarca gezählt wird; die berühmten Aerzte, Matthäus Sylvaticus, der in Mailand lebte, Jacob von Dordis u. a. m. werden ihm nicht unbekannt geblieben seyn; die Werke von Petrus de Crescentiis, der sich mit dem Land- und Weinbau so viel beschäftigte, haben wahrscheinlich darauf eingewirkt, daß er sich in der Folge mit der Verbreitung des, schon lange bestehenden Weinbaues in Böhmen so viel beschäftigte.

Das Mittagsmahl wurde auf der sogenannten Färber-Insel in der Moldau eingenommen, in einem prächtigen Gebäude des Heren Nowotay. Der Saal ist 95 Schuh lang 42 breit und 40 hoch, mit Säulengängen, großen Spiegeln, Leuchtern, Arabesken und andern Wandgemälden; umgeben von 7 großen Zimmern. Etwas davon entfernt ein großes Badhaus; die Insel selbst von Pappeln umgeben. Während des Essens spielte die vortreffliche Musik des Regiments Latour unter dem

Das viel bewegte Leben König Johannis ließ jedoch seinem Sohne wenig Zeit, sich in dem zu ergehen, was ihn besonders ansprach: er mußte seinen Vater bei seinen öfteren Ritterfahrten begleiten. Jene gegen die Heiden mit dem Hochmeister Werner von Derslein, wo Markgraf Karl mit den ausgezeichneten Männern des deutschen Ordens und den zugezogenen Fürsten und Ritters Deutschlands zusammen traf, zu gleicher Zeit aber auch Völkerscharen kennen lehrte, bei denen das Christenthum die rauhe Schale der allein vorwaltenden physischen Kraft noch nicht abgestreift, eine wissenschaftliche Bildung noch keine Civilisation ermittelt hatte, mag ihm den Contrast mit Frankreich und Italien nur noch schärfer bezeichnet haben. — König Johann, seinem Charakter treu, kam nach Frankreich, sein Leben auf dem Schlachtfelde zu enden; er ließ sich, obschon alt und ganz erblindet, in der Schlacht von Crecy in das größte Gerümmel bringen, wo er sammt den treuen böhmischen Edeln, die ihm aus persönlicher Anhänglichkeit und Kampflust in eine ihnen und ihrem Lande ganz fremde Fehde gefolgt waren, das gewünschte Ziel erreichte.

Markgraf Karl kam verwundet zurück nach Böhmen, besaß den Thron, und wenn er gleich nach dem Geiste jener Zeit das Schwert nicht ablegen konnte, so beschäftigte er sich doch ganz besonders mit den innern Einrichtungen des Landes; die Errichtung einer Universität in Prag blieb sein vorherrschender Wunsch. Er scheint die geistvolle Idee schon in seiner Jugend aufgefasset zu haben: es sey das Verhältniß religiöser und wissenschaftlicher Intelligenz der moralische Mäßeßer der Civilisation und der Hebel des Gedeihens der Staaten, die durch innere Ruhe, Kraft der Gesetze, und Liebe der Völker blühend erhalten werden können.

Ein günstiges Ereigniß beschleunigte die Erfüllung seiner Wünsche. Sein ehemaliger Lehrer, Abt Roger, hatte den päpstlichen Stuhl unter dem Namen Clemens der VI. bestiegen. Der König, glücklicher als sein Vorgänger König Wenzel II., der schon auf Einführung einer Hochschule gedacht hatte, — nachdem er alle Hindernisse, die bei seinem Vorgänger im eigenen Lande erschwerend eingewirkt hatten, gehoben, reiste sogleich nach Avignon; der lang gehegte Wunsch gieng in Erfüllung, die Bullen wurden ausfertigt, die Universität errichtet und dotirt, Handschriften in Avignon angekauft, Professoren angestellt, und eine unerwartete Menge wißbegieriger Jugend drängte sich heran, Belehrung zu erhalten.

Für das Studium der Theologie und der Rechtswissenschaft war es leichter, sich mit Professoren und Handschriften zu versehen; die Naturgeschichte war aber damals nur ein Theil des medicinischen Studiums. Es hatten zwar Griechen und Römer auch hiezu wichtige Schriften hinterlassen; sie waren aber weniger bekannt, die Manuscripte nur mit Geld aufzuwiegen. Am fleißigsten wurde Aristoteles nachgeschrieben. Dioscorides, Hippokrates, Galenus waren seltener als die Araber, und wegen der kurzen Beschreibungen der Naturkörper schwer zu verstehen. Bei dieser Dürftigkeit an Hilfsmitteln traten Compendien an die Stelle, die sich als Auszüge und Essenzen von dem Besten, was die Gelehrten der Vorzeit geliefert hatten, in pomphaften Titeln oder Einleitungen geltend machten. Thomas Cantapritanus und Bartholomäus Anglicus haben sich ganze Jahrhunderte hindurch in diesem Ruhme erhalten. Handschriften ohne Zahl, selbst als Pracht-

werke mit den wunderbarsten illuminirten Abbildungen finden sich in vielen Bibliotheken.

Kaiser Karl hat alles gethan, was in seiner Zeit möglich war, die Wissenschaften zu fördern, zu ihren Studien aufzuregen. Er war von wissenschaftlichen Männern umgeben; sein Leibarzt, Magister Gallus, den sein Collega *Ambrosius de Praga* optimum physicum et astronomum aulicum, Doctorem in Strahow claustro-nennet, war selbst Schriftsteller. So lange dieser König lebte, waren die Professoren thätig und der Raum der Schulen mußte erweitert werden.

Das Gleichniß von dem Sämannen in dem Evangelium ist für die Verbreitung der wissenschaftlichen Lehre eben so gültig, als für jene des Christenthums: der ausgestreute Samen muß auf guten Boden fallen, nicht unterdrückt oder bedrängt werden, wenn er reiche Ernten bringen soll.

Es zeigte sich zwar König Wenzel im Anfang seiner Regierung ebenfalls der Universität und den Wissenschaften geneigt. Seine beiden Leibärzte, Albit, Lehrer an der Universität, Dr. der Rechte von der Universität in Padua, Arzt, später Erzbischof in Prag, und nachdem er dem Erzbisthum entsagt, Probst auf dem Bisthumb, — und Christann von Prachatic, Rector der Universität, Mathematiker, Theolog und Arzt, haben beide ärztliche und andere Schäften hinterlassen. Den Hofapotheker, Sohn des Angelus de Florentia, der dieselbe Stelle bei Kaiser Karl vertrat, hat er mit mehreren Diplomen begnadigt, damit er den Apotheker-Garten (die botanischen Gärten jener Zeit) hortus Angelicus genannt, unterhalte und mit wohlriechenden Gewächsen bepflanze.

Die so erfreuliche erste Epoche der neuen Universität wurde aber bald durch Zwiespalt über religiöse Meinungen getrübt. Heftige und hartnäckige Vertheidigung oder Bekämpfung derselben entzweiten stets die Gemüther und störten die zum Studium nöthige Ruhe. Die fremden Studenten verließen scharenweise die beunruhigte Stadt; die einheimischen traten in Parteien scharf gegen einander; die nach Wissen strebenden zerstreueten sich in ganz Deutschland; der aufgeregte Geist suchte Befriedigung; aus den Bruchtheilen der Prager Universität entstanden neue Hochschulen; die Geistesbildung schritt mit der Zeit vorwärts, konnte selbst in Böhmen durch Feuer und Schwert nicht verdrängt werden!

So gewiß es aber auch immer fern mag, daß errungene Kenntnisse und ein höherer Grad von wissenschaftlicher Bildung nicht leicht ganz zu verlieren sind; so kann doch die fortschreitende Entwicklung zeitweilig gehemmt, gleichsam eingeschläfert werden; sie bedarf alsdann eines neuen Anstoßes, um wieder rege und thätig zu werden, und ein solcher erscheint oft unerwartet durch einzelne Menschen im Stillen vorbereitet, ohne des ungeheuern Effectes bewußt zu seyn, der aus ihren stillen Kammern hervor gehn werde.

Deutsche Männer waren es, ein Guttonberg, ein Faust und Schäfer, die das Mittel erdachten, die Thaten wie die Gedanken der Menschen festzuhalten, hundert- und tausendfach zu vervielfältigen, und Jedermann zur Kenntniß zu bringen. Dieß war der Wendepunkt, der die Wissenschaften für ewige Zeiten gesichert hat; kein Herodotus vermochte mehr, ihnen mit dem Feuerbrand entgegen zu treten: denn was in

einem Tage hundertmal vervielfältigt und verbreitet worden, vermag die Zeit selbst nicht leicht ganz zu vertilgen. Keine Erfindung hat sich je mit einer solchen elektrischen Geschwindigkeit verbreitet, wurde von allen Nationen so dankbar aufgenommen und unterstützt, als diese. Allenthalben entstanden Druckofficinen oder wanderten von Stadt zu Stadt beinahe so schnell als die gedruckten Werke selbst. Auch in Böhmen war bereits im Jahr 1468 eine Buchdruckerei in Pilsen, später in Prag, bezwiegend in Winterberg, Rutenberg, u. a. D.

Die naturhistorischen Werke kamen im allgemeinen etwas später an die Reihe und wie man erwarten mußte, waren es die bekannten Compendien: das Buch der Natur (Cantapritan) bei Bäumler in Augsburg 1475, mit Holzschnitten; der Herbarius von Cuba bei Faust und Schürer in Mainz 1485, in Padua dasselbe Jahr und 1488 bei Schönperger in Augsburg. Man sieht aus den schnell auf einander folgenden Auflagen, wie begierig diese Bücher gesucht wurden. Der größte Gewinn für die Wissenschaften ergab sich aber dadurch, daß eine Menge Werke, welche als Manuscripte unbekannt oder selten geblieben waren, nun vervielfältigt in verschiedene Sprachen übersezt wurden.

In dieser glücklichen Erfindung schneller Darstellung und Verbreitung aller neuen Entdeckungen und Beobachtungen lag auch schon der Keim eines neuen Impulses, der sich am Ende des 15. Jahrhunderts entwickelte, als Christoph Columbus, durch die Erfindung des See-Compasses ermutigt, mit unerschütterlichem Muthe und unzerstörbarer Beharrlichkeit die Bahn gebrochen, die längst geahnte neue Welt zu entdecken, zu erobern, und eine Menge goldlustiger Abenteuerer mit und nach ihm in die unbekannten Gluthen zu reisen. Denn ohne dieses Mittel der Verbreitung der Wissenschaften würden den Schifffahrern manche astronomische Hilfsmittel gemangelt haben und ihre Entdeckungen nur langsam und unvollständig zur allgemeinen Kunde gelangt seyn.

Die geistige Aufregung, die sich fast allgemein im 16ten Jahrhunderte entwickelte, muß Staunen erregen. Mit einer fast unbegreiflichen Hast drängten sich die Menschen nach den unbekannten Ländern. Die Schifffahrer bewölkten die Meere mit neuen Inseln und Continenten, die ein jeder Nachseglende suchte und gefunden zu haben glaubte, wenn sie auch nirgends vorhanden waren; die Geographen in ihrer Stubierstube trugen sie auf ihre Charten, wo sie oft von einer Stelle zur andern wandern mußten. Die Inseln Antilla, jene des heiligen Brandans, und die zehn Städte, Brasil oder Brazier, die Hand des Satans (Man de Satanasso) wurden lange in den Welten herumgetrieben, bevor sie einen festen Punct gewannen oder ganz aus den Charten verschwanden.

Aus dem Wunderlande Chitan, Katoge und Kadilla, welches Columbus vergeblich suchte und gefunden zu haben glaubte, hatte Marco Polo und Pietro della Valle die auffallendsten Nachrichten über die Naturverzeugnisse und Menschen in die Welt gebracht, die in dem 16. Jahrhunderte, wo das Wunderbare mehr noch als das Wahre beliebt war und Glauben fand, sich leicht geltend machen konnten. Dadurch machten die Erzählungen von Mandeville sich besonders beliebt. Die Frucht, die, wenn sie in das Wasser geworfen wird, sich in einen Vogel verwandelt, die kürbisartige Frucht, in deren Mitte,

3ffs 1838. Heft 7.

wenn man sie eröffnet, ein Lämmchen gefunden wird, woraus in der Folge die fabelhafte Lammfranze *Parometz* (Beranec) entstand, deren Namen Linne zum ewigen Andenken in dem *Polypodium Barometz* erhalten hat, waren ganz in dem Geiste der Zeit hinein gebichtet.

Diese Pflanze erinnert uns an unsere Knabenjahre, wo wir Brüder uns hoch erfreuten, wenn uns von den Eltern Hochbergs adeliges Land- und Feldleben zur Bilderschau gereicht wurde, wo diese Pflanze abgebildet und ganz im Ernst als eine tartarische Pflanze beschrieben ist. Wir bewunderten dieses mit dem Nabel auf der Spitze des Stängels angewachsene Thierchen, und versehten nie, wenn wir Schächsen auf der Weide sahen, uns nach den Pflanzen umzusehen, auf denen sie gewachsen waren.

So wie sich die älteren Handschriften durch den Druck verbreitet hatten, wurden sie auch in das Böhmisches übersezt: Petrus de Crescentis über die Landwirthschaft, Marco Polo, Mandeville, Leras Reise nach Brasilien. Der erste böhmische Herbarius von Claudian und Egerm erschien im Jahre 1517, wurde aber, der Holzschnitte wegen, in Nürnberg gedruckt.

Den erfolgreichsten Impuls zur Verbreitung der Naturwissenschaften in Böhmen haben wir dem Erzherzog Ferdinand, Sohn Kaiser Ferdinand I. und sein Statthalter im Königreich Böhmen, zu verdanken. Er darf mit Recht unter die ausgezeichnetsten Männer seiner Zeit gezählt werden. Er vereinigte mit der größten Gewandtheit in allen ritterlichen Uebungen den Ueberblick eines geübten Staatsmannes und eine große Vorliebe für die Naturwissenschaften, besonders Botanik und Bergbaukunde, welche die Mineralogie jener Zeit genannt werden kann; und diese ermunternde Vorliebe für die Naturwissenschaften hat sich zu unserer höchsten Freude in unserem Herrscherstamme bis in unsere Tage vererbt.

Der berühmte Dr. Petrus Mathiolus, sein Leibarzt, stand mit den meisten Naturforschern und Aerzten seiner Zeit in Briefwechsel. Der Erzherzog unterhielt einen eigenen Maler bei der kaiserlichen Gesandtschaft in Constantinopel, um die orientalischen Pflanzen für die Herausgabe der Prachtauflage der Commentare über den Dioscorides von Mathiol malen zu lassen. Die Abbildungen des *Hyacinthus orientalis*, des Lilac und vieler anderen Pflanzen, die Mathiol zuerst herausgab, sind ihm von Constantinopel zugeschiedt worden.

Der wohlriechende *Elaeagnus angustifolia* erhielt den Namen böhmischer Delbaum (*Olea bohemica*), weil er schon damals in vielen Gärten Böhmens vorhanden war.

Um ein böhmisches Herbarium mit großem Holzschnitten herauszugeben, welches der Arzt Thaddäus Hagek nach Mathiol bearbeitet hatte, verschaffte der Erzherzog dem Dr. Mathiol einen Beitrag von 250 Schock böhmischer Groschen oder 500 Thaler, welche die böhmischen Stände zu diesem Zwecke auf dem Landtage 1558 bewilligten. Die großen Holzschnitte wurden in Prag geschnitten, und Mathiol benutzte sie später zu seiner Prachtauflage von dem Jahre 1555 bei Valgrües in Wienig, früher aber wurden sie für den deutschen Herbarius von Handsch verwendet. Die beiden Auflagen des Herbarius, so wie die Briefe Mathiols sind sämmtlich in Prag bei Melantrich 1552 lobenswerth abgedruckt. Will man sich einen richtigen

Begriff von dem damaligen Drange nach Wissen und von der schnellen Verbreitung der Wissenschaften durch den Druck machen, so darf man bloß das Beispiel von den Werken des Petrus de Crescentiis und von Mathiols Commentaren anführen, die in verschiedenen Sprachen 33 Auflagen zu 1000 Exemplaren erlebten.

Die wissenschaftliche Aufregung im 16. Jahrhundert drang durch alle Stände; die Sovereäne zogen Gelehrte und Künstler zu ihrer Umgebung; an die Stelle der Astrologen waren die Astronomen getreten, Tycho Brahe und Kepler hatten Observatorien in Prag aufgestellt. Die Sitte des Adels, fremde Länder zu bereisen, jene der Professoren, die italienischen Universitäten zu besuchen, hatte sich erhalten. Der Adel begünstigte die sich entwickelnden Talente; Wobuslaw Lobkowitz, der die ausserlesene Bibliothek in Rudnic gesammelt, selbst Schriftsteller, war als Mäcen allgemein verehrt.

Der Bergbau hatte sich durch die Entdeckung der Bergwerke Buhweis, Rudolphsbad und Joachimsthal wieder gehoben; die vorzüglichsten Stufen, die sich allenthalben hervorthaten, führten auf den Gedanken, sie zu sammeln, und auch hier finden wir den Erzherzog Ferdinand als den ersten, der, nach der Terminologie jener Zeit, eine Sammlung von Handsteinen (Mineralsammlung) aufstellte, die später mit ihm nach Tyrol wanderte, und in dem Schloß Ambras aufbewahrt wurde. Mit Erlaubnis des Erzherzogs wurde eine ähnliche Sammlung von böhmischen Handsteinen von dem Bergmeister Hölzel von Sternstein in Buhweis errichtet: die reichste und werthvollste war jene Kaiser Rudolphs im Prager Schlosse, der Jahre lang zwei Edelstein-Sammler unterhielt, und in allen Bergwerken die schönsten Stufen erkaufte. Leider ist nur wenig von diesen drei Sammlungen der gegenwärtigen Zeit gerettet worden.

Die Declinasse in den Bergwerken hatte zwar noch keine großen wissenschaftlichen Vor Schritte gemacht; dagegen culminirte in diesem Jahrhundert die Alchimie. Gold und Silber durch die Anwendung der rothen oder weissen Tinctur versprechend, wurde sie allenthalben wohl aufgenommen; durch sie wurden chemische Kenntnisse erobert, verbreitet, und auf indirectem Wege das Gold und das Silber, welches die Adepten für die Tincturen den Einzelnen abgenommen, dem Allgemeinen wieder reichlich ersetzt. Ihre verdanken wir die einheimischen Erzeugung des Alauns und Vitriols in Kuttenberg, die ein ähnlicher Adept, Namens Eschen von Kempfen dort eingerichtet, und die sich schnell im ganzen Lande verbreitete, so daß in wenig Jahren dieses Material auf so geringe Preise herabfiel, daß Venedig, welches Jahrhunderte hindurch den Alleinhandel behauptet hatte, die Concurrenz nicht mehr aushalten konnte. Von mehreren alchimischen und diamanthausen Werken sind auch böhmische Uebersetzungen in Manuscripten vorhanden. Die inländische Industrie wurde auch dadurch gesteuert, daß der Gebrauch der mineralischen Kohle, wenn auch anfangs nur sparsam, eingeführt wurde. Die Landwirtschaft trat ebenfalls in die Reihe rationeller Behandlung: Obrigkeiten ertheilten ausführliche Instructionen an ihre Beamten; es erschienen gedruckte Schriften über den Feldbau, die Schafzucht, das Pfropfen der Obstbäume in böhmischer Sprache. Die Letzte und Naturforscher der hiesigen Hochschule, die sich in jeder Zeit durch ihre Scheitern hervorthaten, gleich wie jene überhaupt, welche die Kenntnisse der

Vorzeit in den Bereich der Gegenwart zurückführen, und mit dieser in Verbindung brachten, brauche ich in dieser Versammlung nicht namentlich anzuführen.

Es war die Periode vom Ende des 15. bis in den Anfang des 17. Jahrhunderts das Zeitalter der Suchenden. Und wahrlich sie haben gefunden, wenn auch nicht immer, was sie gesucht, — auch nicht bloß Länder und Inseln, Sterne am Himmel, Thiere, Pflanzen und Steine auf der Erde; aber vieles, was man ihnen nicht zutraute, zum Theil nicht anerkannte und nicht glaubte, weil schon eine große Summe des Wissens dazu gehört, um die Erzählungen der Thatfachen und die daraus gezogenen Schlüsse und darin verborgenen neuen Entdeckungen zu sondern und aufzufassen. Alexander von Humboldt, der sich mit dem Geiste Christoph Columbus gleichsam identificirt, hat aus seinen Berichten und Briefen weit mehr naturhistorische und physische Entdeckungen hervorgehoben, als jemals darinn geahnet wurden. Seine Apologie des 17ten Jahrhunderts macht alles überflüssig, was hier noch gesagt werden könnte. Marco Polo, gegen dessen Reiseberichte Mißtrauen herrschte, ist erst in der neuesten Zeit wieder zu Ehren gekommen; Beschreibungen von Naturkörpern aus Aristoteles und Plinius wurden nun erst verständlich, als man dieselben wieder gefunden hatte; eine kritische Untersuchung von allem, was die von uns bezeichnete Epoche für die Naturwissenschaften geleistet, in dem Geiste der kritischen Untersuchungen über die geographischen Kenntnisse jener Zeitperiode von Alexander von Humboldt, würde die Welt in Verwunderung setzen.

Sind auch in der Folge Zeitperioden eingetreten, welche zeitweilig oder örtlich zurückhaltend oder störend eingewirkt haben: die Summe des Wissens ist ungetrübt durch alle Begebnisse immer sich mehrend hindurch gegangen, der Drang nach neuen Entdeckungen und Erfahrungen in den Wissenschaften hat sich bei allen civilisirten Völkern erhalten, und jedes Jahrhundert hat hervorragende Gelehrte erzeugt, die mächtig darauf einwirkten; mit dem 16ten Jahrhundert läßt sich aber keine Epoche vergleichen als die gegenwärtige, in welcher durch die neueren Erfindungen und Verbesserungen der Schnellfahrten zu Wasser und zu Land, die Entfernungen gleichsam verschwanden, das kaum möglich gedachte erreichbar wurde. Auch haben wir seit 25 Jahren von dem damals entdeckten neuen Welttheil mehr erfahren und erhalten, als in den vergangenen drei und einem halben Jahrhundert. Ein fünfter Welttheil, der seitdem hinzu gekommen, hat die Sammlungen und die Wissenschaften mit den seltensten Naturalien bereichert; wenigbesuchte Länder sind durch die neuesten Reisenden durchforscht worden; ein deutscher Marco Polo, der seine sechsjährige Reise durch die entferntesten, zum Theil noch wenig besuchten Länder glücklich vollbracht, und mehr als 32000 Exemplare aus allen Reichen und Zweigen der Naturwissenschaften und die seltensten ethnographischen Gegenstände nach Europa herübergebracht hat, befindet sich in unserer Mitte.

Der Fall, daß von einem naturhistorischen Werke in Folioformat 33000 Exemplare abgesetzt werden, dürfte wohl schwerlich mehr eintreten: dafür erscheinen aber in einem jeden Jahre so viele Werke von dem größten Folioformat bis zu dem kleinsten Duodez, daß nur noch wenige Bibliotheken hinreichend dotirt sind, um sie anzuschaffen. Die Verbreitung der gedruckten Werke ist auf die mannichfaltigste Weise erleichtert; der Austausch

der Meinungen, die Mittheilung neuer Entdeckungen und Erfahrungen wird durch unsere Versammlungen gefördert, — Vortheile, die dem 16ten Jahrhundert nicht zu Gebote standen.

Wenden wir nun noch einmal den Blick auf die flüchtig durchlaufenen Jahrhunderte zurück; erwägen wir, wie schwer es geworden, die wissenschaftliche Bildung civilisirter Völker der Vorzeit auf andere Nationen in einer Zeit zu übertragen, deren Geist, Geseßgebung, Sitten, Gebräuche durch Weltbegebenheiten eine andere Richtung angenommen hatten; bleiben wir aufmerksam, wie nur stufenweise sich der Drang nach Wissen entwickelt, aber trotz allen retardirend einwirkenden äußeren Umständen mit geringen Hilfsmitteln dennoch vorgeschritten ist; folgen wir der Geistesbildung überhaupt, und dem Vorschreiten der Naturkunde bei vermehrten Hilfsmitteln und angeregtem Geistesstriebe durch alle Phasen der Jahrhunderte bis zu unserer Zeit; vergleichen wir diese wechselnden Perioden mit dem gegenwärtigen Standpunkt der Naturwissenschaften, und blicken nun auf den Kreis, der hier verammelt ist, und in seinem inneren Verkehre diesen Standpunkt näher zu bezeichnen, wie er es bereits durch 14 Jahre bethätigt hat: so dürfen wir, ohne den Vorwurf einer Ueberschätzung zu befürchten, auch die Versammlungen der Naturforscher und Aerzte aller Nationen, die sich an Deutschlands Beispiel angeschloffen haben, als Zeugen eines unaufhaltsamen Vorschreitens in den Wissenschaften aufrufen.

War es mir auch nicht möglich, in einer Versammlung solcher Zuhörer etwas vorzutragen, was ihnen, meine Herren! unbekannt geblieben wäre; bin ich auch, wie es des Alters Brauch ist, als ein *laudator temporis acti* aufgetreten; so werden Sie mir doch darinn Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß ich bloß Thatfachen an einander reihend der Vergangenheit wie der Gegenwart gleiches Recht habe widerfahren lassen. Ehre wem Ehre gebührt!

## Die XV. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte ist eröffnet!

Dann verlas der zweite Geschäftsführer die Statuten. Nachher folgten die Vorträge. Da die meisten in dem amtlichen Bericht über die Versammlung (Praag, bei Haase. 1838. 4.) abgedruckt sind, so geben wir hier nur diejenigen vollständig, welche mehr für die Isis passen.

2) Es wurden Bemerkungen über die Abkühlung unserer Erde vorgelesen, eingeschickt von Professor Bischoff zu Bonn.

Es dürfte wohl eine Frage von allgemeinem Interesse seyn, ob in historischen Zeiten eine merkliche Abnahme der Temperatur auf der Oberfläche der Erde statt gefunden habe.

Diese Frage steht im genauesten Zusammenhange mit den Hypothesen über die Entstehungsart unserer Erde. War sie in der Schöpfungsperiode eine Kugel, welche dieselbe Temperatur hatte wie ihre Umgebung, d. h. der Weltraum, in dem sie sich bewegt: so mußte sie sehr kalt gewesen seyn. In diesem Falle würde sich die Temperatur der Oberfläche nach und nach durch die Wirkung der Sonne bis zum gegenwärtigen Grade erwärmt haben. Es läßt sich aber leicht zeigen, daß dieser Fall nicht statt gefunden haben könne; denn da die Erwärmung der

Erde von Außen nach Innen hätte erfolgen müssen: so müßte sich von Außen nach Innen eine Temperatur-Abnahme zu erkennen geben; statt dessen zeigt sich aber gerade das Gegentheil. Alle bis jetzt in Bergwerken und in Bohrlöchern angestellten Beobachtungen haben übereinstimmend dargezogen, daß die Temperatur von der Oberfläche nach dem Innern zunehme. Eben so zeigen sich die Quellen um so wärmer, je tiefer sie aus dem Innern der Erde kommen. Ueberhaupt kann man die Wärme der Thermen, die Temperatur-Verhältnisse in dem Meere und in den Seen, das Abschmelzen der Gletscher an ihren untern Flächen schwerlich auf andere Weise als aus der Temperatur-Zunahme nach dem Innern erklären. Ebenso erklären sich die vulkanischen Erscheinungen am Einfachsten aus einer bis zur Githöhe gesteigerten Temperatur-Zunahme nach dem Innern. Ich beziehe mich, was alle diese Erscheinungen betrifft, auf das, was ich hierüber in meiner eben erschienenen Wärmelehre des Inneren unserer Erdkugel gesagt habe.

Dürfen wir die Temperatur-Zunahme nach dem Innern als ein vollkommen constatirtes Factum betrachten, so beseitigt sich also von selbst die Annahme, daß die Erde in ihrer Entstehungs-Periode eine kalte Kugel gewesen seyn könne; vielmehr führt uns dieses Factum zur entgegengesetzten Annahme, daß die Erde zur Zeit der Schöpfung eine heiße Kugel gewesen sey, daß sie sich nach und nach abgekühlt habe, daß diese Abkühlung von der Oberfläche nach dem Innern fortgeschritten sey, und daß sie noch in ihrem Innern diejenige hohe Temperatur bewahre, welche ihr in der Schöpfungsperiode in ihrem ganzen Maße eigenthümlich gewesen ist.

Physikalische Gründe führen uns also zu derselben Ansicht von der Entstehung unserer Erde auf plutonischem Wege, welcher bey weiten die Meisten und die Ersten unter den jetzt bekannten Geologen zugethan sind. Und in der That, das Studium der fossilen Pflanzen, ihr Vorkommen in den verschiedenen Formationen, und die Vergleichung derselben mit den noch jetzt lebenden führt unabweislich zur Annahme einer höheren Temperatur in den früheren Perioden unserer Erde, wie Graf von Sternberg, Adolph Brongniart und Andere auf eine so überzeugende Weise nachgewiesen haben.

Nur darinn scheinen die Ansichten getheilt zu seyn, ob eine stete Abnahme der Wärme unserer Erde von ihrer Schöpfungs-Periode bis auf die heutige Zeit nach irgend einem Geseze statt gefunden habe, oder ob, in irgend einer frühern Zeit, eine plötzliche Erhaltung der Erde erfolgt sey. Cuvier neigte sich, um das Vorkommen der Elefanten und Rhinocerosse am Ausflusse der Rona und an den Ufern des Wilhni zu erklären, zu der Ansicht, daß eine plötzliche Erhaltung der Erde zu der Zeit eingetreten sey, wo diese Nachbarn in den angeführten Fundorten ihr Grab gefunden haben. Alex. v. Humboldt zeigt aber mit überwiegenden Gründen, daß die Annahme einer plötzlichen Erhaltung der Erdkugel durchaus unnöthig sey. Nach physikalischen Gesetzen kann auch nur eine allmähliche Abkühlung unserer Erde, nach irgend einem bestimmten Geseze, gedacht werden; es sey denn, daß wir zu den wenig wahrscheinlichen Hypothesen unsere Zuflucht nehmen: daß einstens eine plötzliche Veränderung in der Neigung der Erdaxe statt gefunden habe, oder daß unser ganzes Planetensystem bey seiner Bewegung im Himmelsraume plötzlich in eine Re-

gion von sehr niedriger Temperatur gekommen sey: eine Hypothese, welche neuerdings von Poisson aufgestellt worden ist.

Hatte die Erde zur Zeit der Schöpfung eine hohe Temperatur, so ist, wie schon Mitscherlich gezeigt hat, damit sehr wohl vereinbar die Erstguss des Wassers auf derselben, indem zwar ein großer Theil desselben in luftförmigem Zustande die Erde umgeben mußte, gleichwohl aber unter dem starken Drucke einer solchen Wasserdampf-Atmosphäre Wasser im liquiden Zustande, wenn auch bis zum Glühen erhitzt, vorhanden seyn konnte. Eine solche Wasserdampf-Atmosphäre konnte natürlich nur in der Nähe der erhitzten Erdoberfläche bestehen; entfernt von ihr in den höheren Regionen des kalten Weltensystems mußte dieser Wasserdampf eine beständige Condensation erleiden. Die Erde mußte also eingehüllt gewesen seyn in einen dicken Nebel, und unaufhörlich mußten wässrige Niederschläge erfolgen, welche, kaum die Erdoberfläche erreichend, auf Kosten der hohen Temperatur derselben wieder in den Gaszustand zurückkehrten. In dieser Nebel-Umhüllung verblieb die Erde, bis ihre Temperatur unter den Siedepunct des Wassers, d. i. unter 80° R. herabgekommen war. Während dieser gewiß sehr langen Periode konnte sich durch die für das Licht fast undurchdringliche Umhüllung keine merkliche solare Wirkung äußern, und es erstarrte also gleichsam in dieser Periode für die Erde keine Sonne. Wir haben also hinlängliche Gründe zur Annahme, daß von der Erschaffung der Erde an bis dahin, wo ihre Oberfläche bis unter 80° herabgekommen war, die Abnahme der Temperatur auf der ganzen Erdoberfläche ganz gleichförmig erfolgte, und das somit in dieser Periode, zu jeder Zeit, ein gleichförmige Temperatur unter dem Aequator wie unter den Polen statt fand. Hatte in der Zeit, wo die Temperatur der Oberfläche unter den Siedepunct herabgekommen war, die Erdoberfläche ihre gegenwärtige Neigung gegen die Erdbahn: so mußten sich allmählich die davon abhängigen climatischen Verschiedenheiten herausstellen; denn nun, wo sich die undurchdringlichsten Nebel zerstreuten, trat die Wirkung der Sonne auf die Erdoberfläche ein, und unter dem Aequator, wo durch diese Wirkung mehr Wärme erzeugt wurde, wie unter den Polen, mußte die Abkühlung der Oberfläche langsamer fortschreiten als unter den letztern. Es ist indeß leicht einzusehen, daß die, von der Neigung der Erdoberfläche abhängigen climatischen Verschiedenheiten erst nach und nach den Umfang erreichen konnten, wie er in der gegenwärtigen Zeit statt findet. Es gab also eine Zeit in dieser zweiten Periode, wo gewissermaßen ein gleichförmiger Frühling auf der ganzen Erdoberfläche herrschte, die Temperatur derselben aber natürlich viel höher war, als sie derzeit in den heißesten Theilen unserer Erde ist. Indem die Erde in ihrer Erkalzung, nachdem ihre Temperatur unter 80° R. herabgekommen war, fortschritt, mußte diese Erkalzung in den Polarländern schneller als unter den Tropen erfolgen als Folge der solaren Wirkung, wodurch jene Länder in einer kälteren Umgebung sich befanden, als der Aequator. In den höheren Breiten mußte daher die Temperatur früher bis zu dem Puncte herabsinken, wo das organische Leben beginnen konnte, als in niederen Breiten. So entsfalteten sich also zuerst Organismen in jenen höheren Breiten, in denen jetzt das organische Leben auf einer niederen Stufe steht, oder, wie wahrscheinlich unter den Polen selbst, ganz unterdrückt ist. Von den Polargegenden schritt nach und nach die Organisation gegen den Aequator fort, wo sie sich am spätesten entsfaltete.

Mit diesen Ansichten, oder vielmehr mit diesen Schlüssen stimmt sehr gut überein das Vorkommen von fossilen tropischen Pflanzen und Thieren in höheren Breiten, die nur zu einer Periode entstanden und untergegangen seyn konnten, wo in diesen Gegenden ein Tropen-clima herrschte. Vielleicht ist man geneigt, dagegen die Erinnerung zu machen, daß die Identität der Verfeinerungen in den secundären Gebirgs-Formationen auf gleichzeitige Bildung und Zerstörung dieser organischen Ueberreste in den verschiedenen Breiten schließen lasse. Ja, der verstorbene Hoffmann behauptete geradezu, daß bis jetzt noch nirgend eine Thatfache bekannt sey, welche uns nöthigen könnte, in allen früheren Perioden der Erdbildung irgend einen gleichzeitig bestehenden Unterschied in der organischen Schöpfung, ähnlich dem, ihrer gegenwärtigen Verteilung auf der Erdoberfläche, vorauszusetzen. Eben so ist Göppert in seinem vortrefflichen Werke über die fossilen Farrenträuter geneigt, aus dem Umstande, daß die Pflanzenabdrücke im älteren Steinkohlengebirge in beiden Hemisphären, wenn auch nicht immer der Art, doch dem Gattungs-Character nach durchaus dieselben sind, auf ein gleichförmiges, damals über die Erde allgemein verbreitetes Klima zu schließen. Durch diese Mittheilungen, deren Quellen bey Göppert zu finden sind, dürfte aber noch nicht der Beweis geführt worden seyn, daß auch alle die von ihm angeführten Kohlenlager als gleichzeitig mit der Kohlen- und Grauwacken-Gruppe zu betrachten sind. Indem sich Göppert auf die allerdings sehr gewichtige Autorität des Grafen von Sternberg stützt, muß erinnert werden, daß dieser aus-gezeichnete Forscher keineswegs behaupten wollte, als habe überall auf dem Erdboden ein ganz gleicher Thermometerstand statt gefunden; sondern bloß, daß allenthalben, woher uns bisher fossile Pflanzen bekannt geworden, isotherme Pflanzenpuncte vorhanden gewesen, auf welchen entweder ganz dieselben, oder wenigstens sehr verwandte Pflanzen gezeihen konnten, und daß die Temperatur dieser isothermen Puncte wenigstens jener ähnlich oder noch höher seyn mußte, als sie gegenwärtig in den Tropenländern herrscht; weil die vorgefundenen Analogen der fossilen Pflanzen der ersten Vegetation nur in den Tropenländern anzutreffen sind, mehrere Familien aber in keiner späteren Formation mehr vorkommen. Doch selbst dann, wenn sich eine gleichzeitige Bildung der Steinkohlen-Formation unter den Tropen und in höheren Breiten, vom geognostischen Standpuncte aus, nachweisen ließe: so wäre damit noch immer nicht der Beweis einer gleichzeitigen Gleichheit des Clima's in so entfernten Puncten geführt. Denn es war gewiß ein sehr großer Zeitraum erforderlich zur Anhäufung so beträchtlicher vegetabilischer Ueberreste, wie wir sie selbst in den minder mächtigen Kohlenflözen finden, und überdieß wiederholte sich die Zerstörung und Verteilung von Pflanzenmassen in einigen sehr oft. Alle Erscheinungen in den Lagerungs-Verhältnissen der Steinkohlen-Flöze tragen Beweise, daß die Ursachen, welche sie hervorbrachten, unregelmäßig wirkten und daß ihre Bildung äußerst langsam erfolgte. Ganz besonders sprechen hiefür die Untersuchungen des Bergwerksdirectors Gräfer in Eschweiler-Pumpe, welche ich der gütigen Mittheilung meines Freundes Nöggerath verdanke und deren weitere Auseinandersetzung in meinem vorhin angeführten Werke sich findet. Wenn nun die Bildung jedes der verschiedenen über einander liegenden Kohlenflöze (wo von z. B. die Eschweiler-Steinkohlenmulde nur allein 44 baubwürdige enthält, andere Kohlen-Reviere eine noch viel größere Zahl) einen sehr langen Zeitraum umfaßt, wenn nach Ablage

zung eines Kohlenflözes wieder eine neue Vegetation begann, welche erst in einer viel späteren Zeit abermals zerstört wurde, und zur Bildung eines jüngeren Flözes Veranlassung gab: so ist leicht zu begreifen, daß während einer langen Zwischenzeit eine bedeutende Veränderung in dem Klima des Orts, als Folge der stets-fortschreitenden Abkühlung der Erdoberfläche, eintreten konnte. Ja es ist denkbar, daß die Zerstörung einer gewissen, während eines langen Zeitraumes sich behaupteten Vegetation gerade durch die Verminderung der Temperatur oder Verschlechterung des Klimas erfolgte. So können wir also selbst in zwei auf einander folgenden Flözen sehr verschiedene Pflanzenüberreste finden, und die Vergleichung derselben in verschiedenen Breitengraden kann eine Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit zeigen, ohne daß man aus der Ähnlichkeit auf gleichzeitige Bildung zu schließen berechtigt wäre. Ich überahe, um nicht zu sehr in's Specielle einzugehen, noch andere Facta anzuführen, welche keineswegs zu Gunsten eines gleichzeitig gleichartigen Klima's auf unserer ganzen Erde während der langen Periode, wo sich die secundären und tertiären Formationen bildeten, sprechen. Ich bemerke nur noch, daß die schönen Untersuchungen des jüngeren Brongniart ebenfalls zu dem Schlusse geführt haben, daß vom Beginn der Vegetation auf der Erde bis zur gegenwärtigen Zeit die Temperatur und die Größe der Meere fortwährend abgenommen haben, woraus von selbst folgt, daß während dieser ganzen Periode niemals eine ganz gleichförmige Temperatur über die Erde verbreitet gewesen seyn konnte, obgleich der Natur der Sache nach die Temperatur-Differenz zwischen dem Aequator und irgend einem Punkte in den höheren Breiten um so geringer war, je mehr sich die Temperatur der Erdoberfläche der Siebthe näherte.

Nach diesen vorausgeschickten allgemeinen Betrachtungen komme ich zur Mittheilung der Resultate einiger Versuche, welche ich angestellt habe, um das Gesetz der Abkühlung unserer Erde von der Schöpfungperiode bis auf unsere Zeit zu finden.

Dem unsterblichen Newton verdanken wir zwar schon das Gesetz der Abkühlung erwärmter Körper, wornach diese Abkühlungen nach einer geometrischen Reihe erfolgen, wenn die Zeiten eine arithmetische bilden. Allein mehrere frühere Naturforscher bestritten die Richtigkeit dieses Gesetzes, während andere durch eigene Versuche es benäthigt gefunden hatten. Dulong und Petit folgerten aus ihren trefflichen Untersuchungen über die Gesetze der Abkühlung, daß Newtons Gesetz nur in den niederen Temperaturen Gültigkeit habe, daß es sich aber um so mehr von der Wahrheit entferne, je höher die Temperatur erhitzter Körper sey.

Meine eigenen Versuche habe ich in einem möglichst großen Maasstabe angestellt. Ich ließ auf der Sayner-Hütte eine Basaltkugel von 2 Fuß Durchmesser in eine Form von Lehm gießen, überließ sie dann der freien Abkühlung und beobachtete, nachdem die Temperatur der Oberfläche auf  $240^{\circ}$  N. herabgesunken war, ihre Abkühlung in den ersten 74 Stunden stündlich, am vierten bis sechsten Tage, wo erst in größeren Zeit-Ab schnitten die Abkühlungen merklich wurden, täglich einige Male. Die Zeit der Erkalzung dieser 700 bis 800 Pfd. schweren Basaltmasse vom Schmelzpunkte des Salzfels bis zu einem Temperatur-Überschuß von  $\frac{1}{100}^{\circ}$  R. betrug 6 Tage 20 Stunden. Aus diesen Beobachtungen ergab sich nun mit völliger Evidenz, daß Newtons Gesetz innerhalb der Tempe-

raturen meiner Beobachtungen allgemeine Gültigkeit habe. Als Beweis hiefür führe ich an, daß die größte Differenz zwischen den aus dem Gesetze berechneten Abkühlungen und den beobachteten nur  $1^{\circ}$  R. beträgt, was um so weniger in Anschlag kommt, da während der sechstägigen Dauer der Beobachtungen die Temperatur der die Kugel umgebenden Luft unmöglich constant erhalten werden konnte, vielmehr dieselbe durch die glühend heiße Kugel anfangs bedeutend erwärmt wurde, und mit der abkühlenden Kugel ebenfalls nach und nach sich etwas abkühlte.

Worin liegt nun der Widerspruch in den Behauptungen Dulong's und Petits? Diese Physiker wandten zu ihren Untersuchungen Körper von so kleinen Dimensionen an, daß für jeden Augenblick eine gleiche Temperatur in allen ihren Punkten vorausgesetzt werden konnte. Newton erhielte hingegen ein hinlänglich starkes Stück Eisen bis zum Glühen, und beobachtete die Abkühlungen auf der Oberfläche. Hier, wo die Oberfläche beständig Wärme aus dem Inneren empfieng, waren also die Umstände wesentlich verschieden von denen, unter welchen die französischen Physiker ihre Versuche angestellt hatten. Und merkwürdiger Weise haben sie selbst auf diesen wesentlichen Unterschied aufmerksam gemacht. Der ganze Widerspruch liegt wohl darin, daß sie in dem falschen Wahne waren, als hätte Newton das Gesetz a priori bestimmt. Hätten sie Newtons Abhandlung nicht bloß citiert, sondern auch gelesen, so würden sie eines Besseren belehrt worden seyn.

Bei dem Gusse der erwähnten Basaltkugel wurde die Form so eingerichtet, daß drei Kanäle von der Oberfläche nach dem Inneren an verschiedenen Stellen gebildet wurden, wovon der erste 2 Zoll tief, der zweite 7 Zoll und der dritte bis zum Mittelpunkte reichen sollte. Diese Kanäle waren zur Aufnahme von Thermometern bestimmt, um ebenfalls den Gang der Temperatur im Inneren der Kugel kennen zu lernen. Dieser Zweck wurde aber nur unvollständig erreicht. Indem jedoch die beim Gusse dieser Kugel gemachten Erfahrungen benützt wurden, gelang es bei dem Gusse einer zweiten  $27\frac{1}{4}$  Zoll dicken Basaltkugel, von der Oberfläche bis zum Mittelpunkte in gleichen Abständen 6 Kanäle zu bilden, in welche harmonisierende Thermometer gesteckt wurden und so der Gang der Temperatur in diesen verschiedenen Tiefen während der Abkühlung der Kugel bestimmt werden konnte. Gleichzeitig mit dieser Kugel wurde noch eine zweite Basaltkugel von  $9\frac{1}{2}$  Z. Durchmesser gegossen und die Abkühlungen beider Kugeln beobachtet. Als Resultat dieser Untersuchungen ergab sich:

1) Die abermalige Bestätigung des Newtonischen Gesetzes.

2) Die Zunahme der Temperatur in den erkaltenden Kugeln von Außen nach Innen erfolgt nach einer geometrischen Progression, deren Exponent nur um ein unmerkliches größer als Eins ist, so daß also dieselbe geometrische Progression sehr nahe einer arithmetischen kommt.

3) Die Abkühlungen der beiden Kugeln in gleichen Zeiten und von gleicher Temperatur, von Überschußen an gerechnet, verhalten sich genau umgekehrt wie die Durchmesser.

Dieses letztere Gesetz setz uns in den Stand, die Abkühlungszeit jeder Basaltkugel von beliebigem Durchmesser von der Schmelzthe dieses Gesteines bis zu irgend einem Tempe-



ratur-Überschuß zu berechnen. Nehmen wir nun an, unsere Erde habe in der Schöpfungsperiode die Schmelzhitze des Basalts gehabt und in ihrer Masse dieselbe Wärme-Capacität wie der Basalt, so lassen sich die Zeiten ihrer Erkalzung von irgend einem Temperatur-Überschuß bis zu einem andern geringen berechnen.

Halten wir uns innerhalb der Temperaturen, in welchen die Abkühlungen an unsern Basaltkugeln wirklich beobachtet wurden: so dürfen wir uns so weniger befürchten, bedeutende Fehlschlüsse zu thun. In den höheren Temperaturen, wo der allmähliche Uebergang der geschmolzenen Masse aus dem flüssigen in den festen Zustand erfolgt, erleidet nemlich das Geseß ganz bestimmt eine Störung als Folge der durch das Verfließen der geschmolzenen Masse frey werdenden Wärme. Meine Beobachtungen an der zweiten großen Basaltkugel zeigen dieses auch. Sechs Stunden nach dem Gusse war nemlich die Erkalzung auf der Oberfläche in einer Stunde  $11^{\circ}$ , in der 7ten Stunde  $4^{\circ}$ , und diese Erkalzung hielt 15 Stunden lang mit geringen Abweichungen an, ja, 22 Stunden nach dem Gusse betrug sie sogar noch  $4\frac{1}{10}^{\circ}$ . In der 6ten Stunde nach dem Gusse war die Kugel 9 Zoll tief unter der Oberfläche oder 6 Zoll tief im Basalt noch ganz flüssig, und die Periode der Erstarrung fällt also in die Periode der gleichbleibenden Abkühlung auf der Oberfläche. Ähnliche Beobachtungen haben bekanntlich Rudberg und Marr bey der Erstarrung des Bleis, Zinn's, Wismuths und Schwefels gemacht. Ich werde, sobald es meine Gesundheit erlaubt, wo möglich das Geseßmäßige in diesem Verhalten zu ermitteln suchen. Ich beabsichtige nemlich, eine 2 Fuß dicke Kugel von Blei gessen zu lassen und durch Einsetzung von verschiedenen Thermometern bis zum Mittelpuncte die Temperatur in jeder dieser Tiefen unmittelbar nach dem Gusse bis zur Erkalzung zu bestimmen.

Nach La Place's Berechnung hat sich seit Hipparch's Zeiten die Rotation der Erde noch nicht um  $\frac{1}{100}$  Sec. verändert; es kann sich daher die mittlere Wärme unserer Erde seit dieser Zeit noch lange nicht um  $\frac{1}{10}^{\circ}$  R. vermindert haben.

Berechnen wir die Abkühlung für diesen Zeitraum von 1977 Jahren nach dem oben mitgetheilten Geseße, so finden sich ohngefähr  $\frac{3}{1000}^{\circ}$  R., d. h. seit 1977 Jahren hat sich die mittlere Erdoberfläche nur um eine so unbedeutende Größe vermindert. Ist nach den heiligen Büchern das Alter des Menschengeschlechtes 5840 Jahre, so würde sich seit Adam die mittlere Temperatur am Aequator erst um  $\frac{1}{100}^{\circ}$  vermindert haben. Man sieht hieraus, daß die oft wiederholten Behauptungen, als habe in der historischen Zeit die Wärme der Erde abgenommen, das Klima sich verschlechtert, zu den Fabeln gehören.

Bekanntlich ist diese Meynung namentlich in den Alpen verbreitet.

In einer 1820. von der Schweizerischen gelehrten Gesellschaft gekürten Preisschrift ist aber aus einer großen Menge von Thatfachen schon der Beweis geführt worden, daß die mittlere Temperatur in der Schweiz seit Jahrhunderten keineswegs abgenommen habe. Bey griechischen und römischen Autoren finden sich Stellen über größere oder geringere Strenge des Winters zu ihren Zeiten, über das Zufrieren der Flüsse, der Seen und der Meere, woraus man ebenfalls schließen kann, daß seit jenen Zeiten das Klima sich nicht verschlechtert habe.

Endlich hat Gay-Lussac durch Zusammenstellung neuerer Nachrichten gezeigt, daß das Klima der Provence während eines Zeitraums von 1400 Jahren sich nicht merklich verändert habe. Damit soll aber nicht behauptet werden, daß nicht hier und da durch locale Ursachen das Klima verändert, hier rauher dort milder geworden ist. Nur die allgemeine Verminderung der Temperatur auf der ganzen Oberfläche der Erde in historischen Zeiten müssen wir gänzlich in Abrede stellen.

Wir wollen es nicht versuchen, das Alter unserer Erde aus ihrer Abkühlung zu berechnen; denn wir würden unsichere Zahlen erhalten, da wir die gewiß ungeheuren Zeiträume, innerhalb welcher die Erdoberfläche eine fast gleich bleibende Temperatur behauptete, nicht kennen. Ich beziehe mich nemlich auf die schon gemachte Bemerkung, daß durch das im Inneren fortschreitende Verfließen der ursprünglich geschmolzenen Massen der Erde und die dadurch bewirkte Entspickung gebundener Wärme die Erdoberfläche hinlänglichen Ersatz für den Wärme-Verlust durch Abkühlung erhielt.

Wir wollen aber den Zeitraum berechnen, der verfloß, als in unserm Deutschland die Temperatur von  $22^{\circ}$  auf  $8^{\circ}$  herabsank. Unter der Voraussetzung nemlich, daß die vegetabilischen Ueberreste in der Steinkohlenformation in einem Tropenklima gewachsen sind, würde die damalige mittlere Temperatur von Deutschland  $22^{\circ}$  R. gewesen seyn.

Nehmen wir für die dermalige mittlere Temperatur von Deutschland  $8^{\circ}$  an, so findet sich für unsere Steinkohlenformation ein Alter von 19 Millionen Jahren. Berechnen wir endlich die Abkühlungszeit unserer Erde von einem Temperaturüberschuß von  $230^{\circ}$  bis zu dem von  $\frac{1}{100}^{\circ}$  über die Temperatur des Weltraumes, was für eine gängliche Erkalzung anzunehmen ist, so erhalten wir 353 Millionen Jahre.

Wenn man bey Berechnungen dieser Art, die ihrer Natur nach nur approximative Werthe haben können, auf so große Zahlen kommt, welche frühere Schätzungen von dem Umfange gewisser Erperioden den weitem übertreffen, so ist es nöthig, die zum Grunde gelegten Voraussetzungen etwas näher zu beleuchten.

Die erste Voraussetzung ist, daß die Erde in ihrer ganzen Masse, oder vielmehr im Mittel aller ihrer Bestandtheile dieselbe Wärme besitze, wie die Basaltkugeln, womit ich meine Versuche anstellte. Sollte die Erde, wie ihre mittlere Dichtigkeit vermuthen läßt, aus einem metallischen Kern bestehen, so würde ihr Leitungsvermögen größer seyn, als das unserer Basaltkugeln, und in diesem Falle wären die obigen Abkühlungszeiten zu groß gefunden worden.

Zweytens mußte bey meinen Berechnungen eine Größe für die Temperatur des Weltraumes, in welcher die Erde sich bewegt, gesetzt werden.

Ohne Zweifel kann diese Temperatur nicht höher seyn, als die größte Kälte, welche in den Polargegenden beobachtet worden ist. Die größte, bis jetzt und zwar unter  $62\frac{1}{4}^{\circ}$  n. Br. beobachtete Kälte war aber nach Kapitan Rad  $45\frac{1}{2}^{\circ}$  unter Null. Arago schließt hieraus, daß die Temperatur des Weltraumes unschäbbar unter  $45^{\circ}$  liegen müsse. So höchst wahrscheinlich dieß ist, so habe ich doch, um keine ganz willkührliche Zahl anzunehmen, nur diese Temperatur für die Tem-



peratur des Himmelsraumes gesetzt. Fällt aber diese Zahl noch unter  $45\frac{1}{2}^{\circ}$ , so mußte in den angenommenen Perioden die Erkaltung schneller erfolgen, und in diesem Falle wären die obigen Erkaltungszahlen ebenfalls zu groß gefunden worden.

Drittens wurde bei diesen Berechnungen vorausgesetzt, daß die Oberfläche der Erde während der angenommenen Perioden nur Wärme verliere, keine aber zurückhalte. In der ganzen großen Periode, welche die Erde in ihrer Erkaltung von  $80^{\circ}$  an durchlief und vielleicht noch durchläuft, empfing sie Wärme von der Sonne und von den Sternen, die natürlich ihren Wärmeverlust zum Theil compensiren mußten. Die Abkühlungen erfolgten daher langsamer, als die Berechnung sie ergeben hat. In dieser Beziehung sind daher die obigen Abkühlungszeiten zu klein gefunden worden.

Endlich mußte der schon mehrmals erwähnte Umstand, das Freiwerden von Wärme in Folge des von Außen nach Innen fortschreitenden Erstarrens der ursprünglich geschmolzenen Massen der Erde die Erkaltung der Oberfläche ebenfalls retardiren.

So haben wir also zwei Ursachen gefunden, welche, wenn man sie dem Calcul unterwerfen könnte, die obigen Erkaltungszeiten wahrscheinlich vermindern würden. Die beiden andern Ursachen aber würden, wenn man sie dem Calcul unterwerfen könnte, nicht bloß mit Wahrscheinlichkeit, sondern mit Gewißheit jene Werthe erhöhen. Wir sind nicht im Stande, beides gegen einander abzuwägen, nur so viel ist zu bemerken, daß die Ursachen, welche die gefundenen Werthe erhöhen, sehr mächtig wirkende sind, und daß wir daher nach Wahrscheinlichkeitsgründen die gefundenen Abkühlungszeiten eher für minima, als für maxima nehmen können.

Schon **Sourier** hat darauf aufmerksam gemacht, daß unsere Erde notwendig einmal in einen stationären Temperaturzustand kommen müsse, in welchem ihr Wärmeverlust durch Abkühlung vollständig compensirt werde durch die solare Wärmeerzeugung auf ihrer äußeren Kruste. Er berechnet, daß die jetzige Temperatur der Oberfläche den Werth nicht um  $1^{\circ}$  R. überschreitet, welchen sie zuletzt erreichen wird. Ich habe mehrere Gründe für die Vermuthung, daß unsere Erde jetzt schon in jenem stationären Zustande sich befinde. Es mag aber das Eine oder das Andere seyn; sa viel ist unumstößlich gewiß, daß nach Eintritt dieses stationären Zustandes von einer weiteren Erkaltung keine Rede mehr seyn könne. Und so kommen wir zu dem Resultat, daß, so lange die Sonne am Himmel steht, das organische Leben auf Erden nicht untergehen wird.

Wirkungen ganz anderer Art müßten auftreten, wenn jemals das organische Leben vernichtet werden sollte.

Es ist leicht einzusehen, daß mit dem Eintritt des mehr erwähnten stationären Temperaturzustandes unserer Erde das bis dahin von Außen nach Innen fortgeschrittene Erstwerden seine Gränze erreichen müsse: denn wenn nach der Voraussetzung die in ihrer Temperatur veränderte äußerste Erdkruste genau dieselbe Wärme von der Sonne wieder zurückempfängt, welche sie an den Weltraum abgibt: so bildet sie gleichsam eine undurchdringliche Hülle für die von Innen nach Außen zu entweichen strebende Wärme. Könnte man z. B. einem Hochofen die durch die Gicht, durch das äußere Gemäuer usw. entweichende Wärme auf irgend eine Art von Außen wieder zuführen: so ist klar,

daß die im Innern enthaltenen geschmolzenen Massen so lange im Flusse bleiben würden, als diese reciproce Wirkung dauerte. Gerade so ist das Verhältniß unserer Erde in ihrem stationären Zustande, und so groß als der innere flüssige Erdkern beim Eintritte desselben war oder seyn wird, wird er bis in die entferntesten Zeiten bleiben.

Schließlich ist indeß noch zu bemerken, daß es mehrere Ursachen gibt, welche dem Innern der Erde Wärme entziehen, die nimmermehr dahin zurückkehrt. Bis jetzt kennen wir folgende:

- 1) Das Aufsteigen warmer Quellen, oder der Thermen überhaupt;
- 2) das Abschmelzen derjenigen Gletscher an ihrer untern Fläche, welche an Orten liegen, deren mittlere Bodentemperatur über Null ist;
- 3) die erwärmten aufsteigenden Wasserströme in Seen und im Meere, und die davon zum Theil abhängige Verdunstung des Wassers auf der Oberfläche;
- 4) die vulkanischen Wirkungen, Ergießung von Lavaströmen, und endlich
- 5) die Gasentwickelungen aus dem Innern der Erde, vorzüglich die Kohlensäuregas-Exhalationen.

3) **Baron Carl von Hügel** aus Wien, Abriß seiner Reise um die Welt von 1830—1836. Er reiste am 2. May 1831 von Toulon nach Griechenland, Alexandrien, Cypern, Syrien, Palästina, Libanon, Tripolis, Beirut, Sidon, Jerusalem, Java, Indien, Himalaya, Madras, Sincapur, Neuholland, Neuseeland, Manilla, Canton, Bengalen, Casmir, Lahor, Eli, Bombay, Vorgebirg der guten Hoffnung, St. Helena, Portsmuth; er beobachtete vorzüglich die Völkersämme, sammelte aber Thiere und Pflanzen. Er brachte mit:

Säugethiere 120.	Münzen 1249.
Vögel 1410.	Idole 63.
Lurche 205.	Musicalische Instrumente 40.
Fische 279.	Waffen 141.
Kerfe 6438.	Stoffe 49.
Crustaceen 851.	Schmuck 163.
Conchylien am meisten.	Zeichnungen und Gemälde.
Pflanzen 20,000.	Manuscripte.
Mineralien 1250.	Tagbücher 12,000 Blätter.

4) **Professor Göppert** aus Breslau, über die Bildung der Pflanzenversteinerungen auf nassem Wege.

Im vorigen Jahre machte ich Versuche bekannt, welche zeigten, wie man Vegetabilien, welche in verschiedenen metallischen oder erbigten Lösungen gewesen sind, durch Glühen und Verbrennen des Organischen in Erden und Metalle mit Beibehaltung ihrer Struktur zu verwandeln vermöchte.

Später fand ich, daß der anorganische bald aus Kiesel, Kali oder Kalk, bald aus einem Gemisch von allen drei Stoffen bestehende Rückstand, welchen jede einzelne Zelle und jedes einzelne Gefäß nach dem Verbrennen liefert, nebst den in dieselben aufgenommenen anorganischen Stoffen dieß vorzugsweise vermittelte. Je mehr also von den letztern Stoffen die Pflanzen aufnehmen, um so besser wird sich die Form erhalten. Man kann sich davon sehr leicht überzeugen, wenn man mehrere

mäßig dünne Vertikalschnitte eines Holzes in concentrirte Auflösung von schwefelsaurem Eisenoxydul bringt, und sie in verschiedenen Zeiträumen, also das eine etwa 6, das andere 12 Stunden oder längere Zeit darin liegen läßt, sie später glüht, und diese Producte ebenfalls mit den durchs Glühen erhaltenen Resten eines nicht imprägnirten Stückes Holzes von gleicher Größe vergleicht. Von letzterem, welches nur in zarten Umrissen der früheren Gestalt des Holzstückes entspricht, kann man durch erstere die stufenweise sich verbessernde Erhaltung der äußeren Gestalt verfolgen; die dasjenige natürlich am besten bewahrt haben wird, welches man am längsten in jener Auflösung liegen ließ.

Da nun alle Pflanzen, ja auch die zartesten Theile derselben, einen unverbrennlichen, der früheren organischen Form mehr oder minder entsprechenden Rückstand, vielleicht bewahren nicht mit Unrecht Skelet genannt, zurücklassen; so sind die von mir beschriebenen Versuche auch noch einer großen Ausdehnung fähig, werden aber, da jene Rückstände immer nur eine sehr geringe Festigkeit besitzen, selten sehr haltbare Producte liefern, wenn man die Substanzen auf längere Zeit, vielleicht Jahre lang, einweicht. Nur einige Pflanzen, wie Blüten von *Erica mediterranea* und *Clavaria coralloides* Bull., welche ein Jahr lang in concentrirter Auflösung des salpetersauren Silbers sich befunden hatten, waren nach dem Glühen mit Erhaltung der Form in zusammenhängendes, regulinisches biegsames Silber verwandelt\*.

Man kann sie also wohl mit den wahren Versteinerungen, d. h. mit den in Kalk, Kiesel oder Eisen (scheinbar verwandelten) Vegetabilien vergleichen, indem auch hier die Gestalt bei gänzlich veränderten Bestandtheilen unverändert blieb; doch dürfte sich die Natur, wie ich schon im vorigen Jahre bemerkte, zur Bildung der durch ihre Festigkeit so ausgezeichneten Versteinerungen wohl kaum eines so gewaltsamen Weges, wie des Feuers, bedient haben.

Indem ich nun weiter mich bemühte, erhielt ich durch meinen geehrten Freund, Herrn Dörfelstrath Cotta in Tbarand, und später durch Herrn Kaufmann Laspe in Gera, Stücke von einer Eiche der Jetztwelt, die von dem letztern in einem Wache bei Gera gefunden war, und sich theilweise in einem unbekannten Zeiträume in kohlensauren Kalk verwandelt hatten, bedeutende Festigkeit zeigten, und selbst Politur annahmen. Noch merkwürdiger erscheint mir ein ebenfalls vom Herrn Cotta mitgetheiltes Stück Buchenholz aus einer alten, wahrscheinlich römischen Wasserleitung im Bückeburgischen. Die Versteinerung hat sich auf einzelne der Länge nach durch das Holz sich erstreckende cylindrische Stellen beschränkt, so daß man bei oberflächlichen Untersuchungen wohl meinen könnte, es seien dort Risse oder durch Fäulniß entstandene Lücken gewesen, die von dem Kalk ausgefüllt worden wären. Von Fäulniß ist aber an dem diese Stelle umgebenden Holze keine Spur wahrzunehmen, und bei mikroskopischer Untersuchung sieht man auf den verkalkten Theilen dieselbe Structur wie auf dem benachbarten

Holze. Nach dem Auflösen der versteinerten Stelle in Säuren blieb noch sämtliche organische, noch Gerbstoffe enthaltende Substanz zurück, die aus Holz und punctierten Gefäßen bestand, welche keineswegs etwa verkohlt, sondern noch mit der eigenthümlichen Farbe und im Zusammenhange untereinander erschienen. Ein gleiches Verhalten beobachtete ich nun auch bei den vorweltlichen in Kalk verwandelten Hölzern, wie z. B. in dem, schwarzen Marmor ähnlichen Holze aus dem Uebergangsgebirge bei Hausdorf in der Grafschaft Glatz, also der ältesten, Versteinerungen führenden Formation, bei dem aus dem Lias bei Wanz und Bamberg, so wie von Abanil aus der Krinna und dem berühmten Stamm von Craigleith in Schottland, welches erstere mir Herr Dubois, letztere Herr L. C. Treviranus zur literarischen Benützung mitgetheilt hatten. Aus einer ebenfalls im Uebergangsgebirge von Hausdorf in Kalk verwandelten *Stigmara licoidea*, über deren Structur man so lange zweifelt war, schied ich auf diese Weise noch vollkommen erhaltene Treppengefäße. — Bei dem aus der Grafschaft Glatz beruh die Menge der die Structur von Coniferen zeigenden, keineswegs verkohnten, sondern nur schwach gebräunten, vollkommen biegsamen Fasern noch 6 bis 7 pC. Auch schied sich hier noch Del aus von bernsteinem, Kreosot- ähnlichen Geruche, welches also eben so, wie oben im Eichenholze der Gerbstoff in die Versteinerung mit übergegangen war, oder wohl vielleicht richtiger sich während des Versteinerungsprocesses aus dem ätherischen Del der Coniferen entwickelt haben mochte. Im vollkommensten erhält man die Fasern noch im Zusammenhange, wenn man recht zarte Splitterschen mit sehr verdünnter Salzsäure übergießt; weil bei der concentrirten nicht nur die Säure selbst, sondern auch die durch die rasche Entwicklung der Kohlen Säure bewirkte Erschütterung auf den Zusammenhang derselben zerstörend einwirkt. Nachdem ich mich durch Versuche überzeugt hatte, daß mäßig concentrirte Flußsäure auf die vegetabilische Faser nicht zerstörend einwirkte, bediente ich mich derselben, um die Kiesel- und Chaledonhölzer in Beziehung auf ihren Gehalt an organischen Fasern zu untersuchen, und fand, daß auch in der festesten, auf dem Stahle Funken gebenden Masse, z. B. in den Stämmen von Buchen in Schleifen, vom Kiffhäuser, von Timenau, und in mehreren Geschiebshölzern noch wohlerhaltene Gefäße vorhanden sind, die nach Entfernung der Kieselrinde zurückbleiben, und in den meisten noch vollkommen hineinreißen, um auf die Gattung des Holzes schließen zu lassen. Es werden sich hierinn wohl noch manche Verschiedenheiten hinsichtlich der Quantität der organischen Substanzen ergeben, worauf ich später noch zurückkomme; da ich alle versteinerte Hölzer nicht nur nach ihrer Structur, sondern auch nach dem hier angeführten chemischen Verhalten untersuche. Doch können Arbeiten dieser Art nur langsam vorschreiten; weil außer den geringen Vorarbeiten in diesem Felde auch noch die Zubereitung der Hölzer zur Beobachtung, wie das Schleifen, welches man am Besten nur selbst besorgt, viel Zeit und Mühe erfordern. In den Hölzern, welche nur sehr wenig organische Substanz enthalten, ist dieselbe offenbar erst nach der Versteinerung theils durch Verwesung unter fortwährender Einwirkung von Wärme und Feuchtigkeit, theils wohl auch durch Einfluß des Feuers vernichtet worden. Jedes Gefäß und jede Zelle war aber gewissermaßen als ein Steinkorn zu betrachten, daher also auch diese Hölzer, wie z. B. sehr viele der weissen glasartigen ungarischen Quaschhölzer, die offenbar theilweise der Einwirkung des Feuers ausgesetzt gewesen sind, ihre Structur

\* In der vereinigten geognostisch-botanischen Section am 21. September zeigte ich sowohl den Versuch, als mehrere andere im weitem Verlauf dieses Vortrages erwähnte Experimente, oder legte die Resultate derselben vor.

noch bewahrten. Um mich von der Richtigkeit dieser Annahme zu überzeugen, setzte ich in einem kleinen Schmelztiegel feine, geschlossene Quer- und Längenschnitte der verfeinerten Hölzer von Buchau in Schlesien und Chemnitz drei Viertelstunden lang der Weisglühhitze eines Sessförmigen Ofens aus. Die verschiedenartig hölzernähnlich gefärbten Fossilien waren milchweiß geworden, zeigten noch ganz deutlich die frühere, die Coniferen charakterisirende Structur. Ein Paar Stücke, welche sich unmittelbar mit den Kohlen in Berührung befunden hatten, waren offenbar durch die Einwirkung des in denselben enthaltenen Kalis an ihrer Oberfläche glasartig. Da ich nun bis jetzt noch niemals fossile Hölzer mit solchem Ueberzug erhielt, wiewohl es ihnen, nicht an Gelegenheit fehlen konnte, mit Kali in Berührung zu gelangen, so dürfte auch dieser Versuch in geologischer Hinsicht vielleicht zeigen, wie selten das Feuer hiebei thätig gewesen seyn mag. Nur unter den Späthölzern aus Ungarn besitze ich mehrere Stammstückchen, deren Aeußeres vollkommen mürbe und milchweiß erscheint, während der innere Theil noch sehr viel organische, nach Entfernung der Kieselrinde durch Flüssigkeits darstellbare Fasern enthält. Durch Stüßen wird auch der innere Theil vollkommen erstarrt und mürbe, woraus wohl hervorgeht, daß die Einwirkung des Feuers, aber erst nach der Verfeinerung ausgeübt gewesen seyn mag. Bey einigen, wie z. B. bey manchen Hölzern aus der alten Steinkohlenformation Böhmens bey Halle, Neurobe in der Grafschaft Glas, Radnitz in Böhmen (aber auch aus der Braunkohle): Bilin, von Weisner, erhält man nach Entfernung der Kieselrinde reine, köstliche Masse, welche Fossilien also entweder vor der Verkohlung oder nach derselben von dem kieselhaltigen Fluidum durchdrungen wurden. Die älteren Naturforscher bezeichneten sie im Ganzen sehr richtig als verfeinerte Holzkohle. Bey andern Hölzern sieht man ganz deutlich an den destruirten Zellen, daß sie im Zustande der Säuligkeit von der verfeinerten Flüssigkeit erfüllt wurden. Auf gleiche Weise verhielten sich nun auch die in silberhaltiges Kupfererz verwandelten Hölzer von Frankenberg in Böhmen, und die in Rhodochrosit veränderten, durch ihre Festigkeit so ausgezeichneten Stämme, wie z. B. die von Schlackenwerth oder Elbogen, eigentlich die Schwefelkieselhölzer. Entfernt man nemlich durch Stüßen den Schwefel, so bleibt das Eisenerz, und nimmt man durch Salpetersäure das Eisen hinweg, der Schwefel in Form der Pflanzengefäße, zuweilen auch noch unveränderte organische Substanz zurück. Abgesehen davon, daß wir vermittelst dieser Methode in manchen Fällen das bisher der Untersuchung der fossilen Hölzer so störend entgegenstehende Schleifen entbehren können, so ergeben sich hieraus wohl nicht unwichtige Aufschlüsse über die Beschaffenheit und Bildung der Verfeinerung überhaupt. Es scheint nun nicht mehr unerklärlich, daß wir in den meisten Fällen bey den verfeinerten Hölzern die einzelnen Abtheilungen derselben, Rinde, Holz, Splint, Mark und die einzelnen Jahresringe nicht bloß wohl erhalten, sondern oft noch mit den natürlichen Farben oder wenigstens doch scharf von einander getrennt erblicken. Die verfeinernden Flüssigkeiten durchdrangen zuerst die Wände der Holz- zellen und Gefäße; später wurden die Höhlungen derselben selbst ausgefüllt. Je gleichförmiger und ruhiger dieß geschah, um desto wohlhaltener erscheint die Structur und der Durchmesser der Gefäße. Es geht aus hieraus hervor, wie richtig im Allgemeinen die ältern Naturforscher von Agricola bis auf Walch, Schulze und Schröter den Vorgang der Verfeinerung nicht als einen Erregungs- oder Substitutions-, sondern als einen Im-

prägnationsproceß ansahen. Auch vermuthete schon Schulze (von den verfeinerten Hölzern S. 5. Halle 177 und S. 24) gegen Bondarow von den verfeinerten Hölzern in den mineralischen Belustigungen Thl. 5. S. 438, und Fourcette (Schröters lithol. Journal, Thl. II. S. 275), daß man bei Versuchen, wie sie Carl in seiner *Docimasia ossium fossilium* mit verfeinerten Theilen von Thieren angestellt, deutliche Merkmale sowohl einer vegetabilischen Grunderbe, als anderer mit selbigen innig verbundenen, und von einem natürlichen Holze noch rückständigen Theilen beobachten könnte. Nach Wallerius (Ej. Systema mineral. Thl. II. Viennae 1778. p. 398) soll jedes wahre vegetabilische Petrifact durch Destillation oder Calcination ähnliche Bestandtheile (*acidum et phlegma*) wie Pflanzen der Jetztwelt liefern. Auch läßt sich auf diese Weise leicht erklären, wie man halb verfeinerte Hölzer antrifft, wie man mehrere dergleichen theilweise verfeinerte, verkalte und vergipfte besitzt\*. Was nun die verfeinernden Flüssigkeiten selbst betrifft, so war es offenbar die Kohlensäure, die die Auflösung des Eisens, des Kupfers und des Kalces, und das bloße Wasser, welches die der Kieselrinde vermittelt, welches, wie bekannt, diese Erde, wiewohl nur in geringer Menge, auflöst. Doch durften diese Auflösungen auch nur von geringer Concentration seyn, weil sich sonst Ueberzüge oder Incrustate bildeten, und darnach das Organische, völlig abgeschlossen, sich wohl zu erhalten, aber nicht zu verfeinern vermochte.

Man sieht also hieraus, welcher lange Zeitraum zur Erzeugung derselben erforderlich war. Eisenstein, nemlich Eisenorybhydrat bildet sich auch durch das oben genannte Auflösungsmittel aus vermoderten Pflanzen bekanntlich noch vor unsern Augen, und vermag auch gegenwärtig noch Vegetabilien zu verfeinern, wenn sich dazu günstige Gelegenheit darbietet. Ein solch merkwürdiges Beispiel fand ich im Herbst vorigen Jahres auf der Bibliothek zu Gotha, dessen Mittheilung ich dem leider für die Wissenschaft viel zu früh verstorbenen Herrn v. Hoff verdanke. Es ist eine Kapdaube, welche in den Tiefen des Schloßbrunnens nachweislich 150 Jahre gelegen hat und nun theilweise, namentlich an den Stellen, wo die ganz orts- bildeten eisernen Streifen sich befanden, mit bestem Eisenerz imprägnirt und so fest geworden ist, daß es sich an mehreren Stellen schleifen läßt. Daß sich Kalkverfeinerungen noch zu unsern Zeiten bilden können, beweisen die oben erwähnten Beispiele von der Erde und Wuche; es fehlt also gegenwärtig nur noch eine Kieselverfeinerung, um den für die gesammte Geologie gewiß nicht unwichtigen Satz, daß Verfeinerungen sich noch heute, also noch fortwährend, und nicht bloß zu gewissen Katastrophen bildeten, unbestreitbar nachzuweisen. Die ältern Naturforscher führten mehrere Beispiele dieser Art an\*\*. Und ich bin überzeugt, daß, wenn wir aufhören werden, ihre Angaben als Täu-

\* Von diesem in Gyps verwandelten Holze, welches nebst dem in Kalk verwandelten am seltensten vorkommt, wurde vor zwey Jahren ein 4 Centner schwerer Stamm in den Gypsgruben von Dirsch in Oberhessen entdeckt, welches Holz ich der hiesigen Universität übergab.

\*\* Sieh Walchs bekanntes Werk: Naturgeschichte der Verfeinerungen. Theil 3. S. 32, und daraus in Schröters vollst. Einleitung in die Kenntniß der Geschichte der Steine und Verfeinerungen Theil 3. S. 209, 1178; wo alle bis zu dieser Zeit bekannten Erfahrungen dieser Art gesammelt sind.

schungen und Irthümer zu betrachten, die von ihnen gemachten Beobachtungen nicht lange allein stehen werden. Jedoch nicht bloß auf analytische, sondern auch auf synthetische Weise läßt sich die Bildung dieser Versteinerungen auf nassem Wege anschaulich machen. Auflösung des Eisens in kohlenstoffhaltigem Wasser würde nur sehr langsam zum Ziele führen. Da ich nun durch Versuche fand, daß man auch innerhalb des Pflanzengewebes die Dryde von metallischen Lösungen mittelst geeigneter Stoffe niederschlagen kann, so benutzte ich das Verhalten, um eine möglichst große Quantität Eisenoxyd (durch Imprägnation mit schwefelsaurem Eisenoxyd und Niederschlagung mittelst kohlenfauren Natriums oder Ammoniums) in die Pflanzen zu bringen, so daß das Holz binnen wenigen Wochen ganz das Aussehen des in Eisen veränderten Holzes erhielt: doch war es noch nicht sehr best, weil, wie sich bei näherer Betrachtung ergab, erst die Wundungen und noch nicht die Lumina der Gefäße ausgefüllt waren, wozu offenbar längere Zeit erforderlich ist. Dasselbe kann man auch mit dem Kalk, und wie eine erst in den letzten Tagen gemachte Erfahrung lehrt, ohne Zweifel auch mit der Kieselerde erreichen. Gewöhnlich schlägt sich die Kieselerde aus ihren Auflösungen in Alkalien durch Säuren in Pulverform nieder. Als ich aber vor dreiviertel Jahren in sehr engen Gefäßen eine sehr concentrirte, durch organische Stoffe etwas braungefärbte Lösung von Kiesel in Kalium mit concentrirten mineralischen Säuren vermischte, so hatte sich im Laufe der Zeit auf dem Boden eine feste Masse von muschelförmigen Bruchstücken, bedeutender, das Glas rigender Härte gebildet, die sich ganz wie Feuerstein verhielt\*. Da die Niederschlagung der Kieselerde auch innerhalb der Pflanzengefäße Statt findet, so darf man hoffen, auch feste künstliche Kiesel-Versteinerungen bereiten zu können.

Auf ähnliche Weise, wie die vegetabilischen Versteinerungen, ging nun auch wohl die Bildung der thierischen, wie der Knochen, vor sich. Ein Theil der Gallert ward durch Einwirkung des Wassers entfernt, deren Stelle nun und die dadurch entstandenen Lücken in dem phosphorsauren Kalk, oder dem Gerüste der Knochen kohlen-saurer Kalk oder Eisenoxyd ausfüllten, die als specifisch schwerere und dichtere Masse den Knochen die größere Dichtigkeit und Schwere verliehen. Durch Imprägnation mit metallischen Substanzen und nachheriges Glühen werden die Knochen niemals schwerer, obwohl die metallischen oder erdigen Substanzen bis in die feinsten Kanälchen verbreitet erscheinen. Die weichen thierischen Theile konnten aber eben so wenig, wie die krautartigen saftigen Theile der Vegetabilien mit

in die Metamorphose gezogen werden; weil bei der geringen Concentration der verfeinernden Flüssigkeiten und bei der leichten Zerfaserbarkeit ihrer Structur sie weit früher verfaulten, bevor sie sich mit einer hinreichenden Menge imprägniren oder nur verhärten konnten. Krautartige Pflanzen vermochten sich in der Regel nur in Form von Abdrücken oder auch in Substanz, abgeschlossen von Licht und Luft, unter Zutritt von Wasser zu erhalten, wodurch sie vielleicht allmählich sich in Braunkohlen, oder vielleicht selbst in Steinkohlen ähnliche Substanzen verwandelten. Ob sie immer nur auf nassem Wege ohne Zututh des Feuers entstanden, will ich durchaus nicht behaupten, indem ich nicht glaube, daß sich jemals ein geologisches Gestein auf alle Verhältnisse anwenden lasse, aber in sehr vielen Fällen mag es wohl so geschehen seyn. Daß sich Bitumen auf diese Weise bilden könne, habe ich oben bei Erwähnung des in Kalk verwandelten Holzes aus der Grafschaft Glas bemerkt, und noch mehr sprechen dafür die in der älteren Kohlenformation zwischen dem Schieferthone gefundenen, noch völlig biegsamen, und nur schwach gebräunten Vegetabilien, die gewiß nicht so selten sind, als man bisher annehmen geneigt war.

So besitze ich allein in meiner Sammlung aus der älteren Kohlenformation folgende, auf die erwähnte Weise erhaltene fossile Pflanzen oder deren Theile: von Waldenberg in Schlesien mehrere mir zunächst ihrer Abstammung nach noch unbekannte Samen, aus Kreuzburg in Oberschlesien ebenfalls Samen, das unter dem Namen *Alethopteris Ottonis* beschriebene und abgebildete Farrentraut, ein *Lycopodites*, ähnlich unserem *Lycopodium undulatum* (die Blätter lassen sich noch bei beiden in drei Schichten zerlegen, und wachsen natürlich vollkommenere Einsicht ihrer Structur); aus Zwettau eine ähnlich erhaltene *Neuropteris* und ein Farrentraut mit Sporangien, an denen man noch den gegliederten Ring deutlich wahrnimmt, als das erste Beispiel dieser Art in der älteren Kohlenformation besonders interessant. Unstreitig ist bei der Verkohlung auf nassem Wege auch die Wirkung des Druckes mit in Anschlag zu bringen, wie der ganz einfache Versuch des Zusammenpressens freier Blätter und Pflanzen lehrt, die sich sehr bald unter Einfluß von Wärme und Feuchtigkeit bräunen, was offenbar wohl nur als ein beginnender Verkohlungsproceß zu betrachten ist, während dieselben Vegetabilien in bloßem Wasser unter ähnlichen Verhältnissen mit Ausnahme der Einwirkung des Druckes viel länger sich erhalten. Unverändert bleiben sie fast, wenn man sie hermetisch verschließt, namentlich vom Schimmel unberührt, der vorzugsweise, wenigstens zum Unkenntlichmachen derselben beiträgt. Auf diese letztere Weise bewahre ich mehrere Vegetabilien (die Blüthe einer Citrone, junge Erbsen- und Linsenpflanzen, *Sedum rupestre*) seit 1½ Jahre in Glasröhren hermetisch verschlossen auf, ohne daß sie eine merkliche Veränderung, außer einer gelblich-grünen Färbung, die aber bald, in den ersten acht Tagen nach dem Einschließen, eintrat, bis jetzt erlitten hätten\*. Eine Anzahl anderer Vegetabilien, Blätter von *Acrostichum alicorne*, *Tectaria coriacea* Lam.,

Ob das kürzlich in der Seine mit einem Schiffsanker gefundene Holz, welches Herr Becquerel in der Sitzung der Akademie (den 6. Nov. d. J.) als versteinert bezeichnet, hierher gehört, werden wohl spätere Berichte näher entscheiden. \* Mit welcher der Säuren, ob mit der Schwefel-, Salz- oder Salpetersäure, dieß am besten gelingt, vermag ich in diesem Augenblicke selbst nicht anzugeben, da das Gewonnene durch Vertheilen aus den drei verschiedenen Flüssigkeiten zusammengeschiedet wurde. Anfangs waren die Stüchchen noch sehr spröde und sehr weich, daß sie beim Glühen in Pulver zerfielen; als ich sie aber nach 4 Wochen wieder auf diese Weise prüfte, hielten sie das Feuer sehr gut aus. Es erinnert dieß an die, wenn ich nicht irre, in Frankreich gemachte Beobachtung, wo man noch wider, tiefliegende Masse entdeckte, die erst später an der Luft erhartete. Ich habe jene Versuche wiederholt, und hoffe zu befähigen, was ich früher mehr zufällig als absichtlich auffand.

\* Am 1. August d. J. schloß ich einen Frosch und eine Kröte, jedes besonders, in ein hinreichend weites Gylinderglas so vorsichtig ein, daß sie von der zum Aufschmelzen des Glases erforderlichen hohen Temperatur nicht berührt wurden. Wie vorauszusetzen war, traten bald heftige Respirationsbewegungen ein, die dem Leben dieser Thiere ein Ende machten.

*Adiantum aethiopicum*, *Pteris arguta*, *Asplenium trichomanes*, *Aspidium molle*, *Juncus squarrosus*. Blätter von *Thalictrum minus*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Equisetum palustre*, *Pinus sylvestris* legte ich am 12. August 1836 zwischen Thonplatten, und senkte sie in einer offenen stehenden Glaskrause in das Beet des 6 Fuß hoch mit Wasser angefüllten Grabens im hiesigen botanischen Garten. Als ich sie am 20. August d. J., also nach 12½ Monate wieder herausnahm, so fand ich sie im Ganzen hinsichtlich der Form sehr wohl erhalten, aber stark gebüdet, namentlich die *Tectaria*, *Aspidium molle*, *Juncus squarrosus*, die Kieferblätter fast noch grün. Wenn diese Versuche auch zunächst kein erhebliches Resultat lieferten, so sehe ich sie doch fort, weil die von mir beobachtete Versahrungsart, wenn ich nicht irre, vielleicht dem Vorgange in der Urzeit, in welchem sich Abdrücke jener Art bildeten, am meisten ähneln dürfte. Ich habe daher die oben genannten Pflanzen wieder zwischen Thon gebüdet, auf ähnliche Weise versenkt, um sie erst in einigen Jahren an das Tageslicht zu ziehen. Welche Veränderungen zusammengehäufte Vegetabilien unter Zutritt der atmosphärischen Luft erleiden, zeigen die sehr interessanten Versuche des Herrn A. F. Wiegmann, durch die er nicht nur die Nachbildung von Torf, sondern auch der Braunkohle bewirkte. (Ueber die Entstehung, Bildung und Wesen des Torfes von Dr. A. F. Wiegmann, Professor in Braunschweig. 1837. S. 60 ff.)

Ich schließe diesen Vortrag mit der Bitte: daß man ihn an dem Orte, von welchem einst die Gestaltung der Flora der Vorwelt als Wissenschaft ausging, freundlich aufnehmen möge, für deren Begründer wir Alle, das Inland, wie das nahe und ferne Ausland, wünschen, daß er bis an das späteste Ziel des menschlichen Alters der Wissenschaft und seinen zahlreichen Verehrern erhalten werden möge.

## Zweite allgemeine Sitzung.

Freitag, den 22. Sept.

Wahl des nächsten Versammlungsortes. Es waren schriftliche Einladungen eingegangen von den Universitäten Erlangen, Freiburg im B. und Rostock. Der letztere Ort erhielt 9 Stimmen, Erlangen 85, Freiburg 125. Beck, Prof. der Chirurgie,

Den Frosch bewahre ich noch auf. Seine äußere Gestalt ist jetzt, indem ich diese Abhandlung zum Druck überreiche, noch eben so natürlich, wie jene der Pflanzen.

- Während meiner Anwesenheit in Prag zeigte mir der Dr. jur. Herr Ritter Kalina von Jäthenstein, der sich viel mit der Untersuchung der heidaischen Opfer- und Begräbnisplätze Böhmens beschäftigt, und bereits auch ein interessantes Werk im vorigen Jahre darüber publicirt, Reste der ausgehöhlten Baumkämme, in welchen die Urbewohner dieses Landes ihre Todten zu begraben pfl egten. Wiewohl die Knochenreste derselben, und alle andere Verhältnisse keine Spur von Einwirkung des Feuers zeigten, fand ich doch dieses den Coniferen angehörige Holz in glänzend schwarzlicher, die Holzstruktur noch deutlich zeigende Braunkohle vermandelt. Ich führe dieses Beispiel nur an, um die Aufmerksamkeit der Forscher auch auf ähnliche Fälle zu lenken, in denen ich oft die Einwirkung eines Momentes wird näher bestimmen lassen, den wir leider nur in geringem Maßstabe anwenden können, ich meine die Zeit.

wurde erster, Prof. Leuckart zweyter Geschäftsführer: Prof. Baumgärtner Stellvertreter im Verhinderungsfall des Ersten.

5) Dr. H. Chaufepie' aus Hamburg; über den Einfluß des Branntweins auf die Gesundheit, das Glück und Moralität.

Gern wünschte ich diese hochverehrte Versammlung mit einem Gegenstande zu unterhalten, der ein allgemeines, vielseitiges Interesse gewährt. Die Aufgabe ist nicht so ganz leicht, einen solchen zu finden, und ich bitte um Nachsicht, wenn ich vielleicht einen unpassenden gewählt habe. Möchten die verehrten Zuhörer nur nicht besorgt werden bey der Benennung des Gegenstandes; es soll nicht so schlimm werden und nicht so lange dauern.

Mein Thema heißt, erschrecken Sie nicht, der Branntwein — ein Gegenstand, worüber sich viel sagen läßt; doch wird die geehrte Versammlung erlauben, daß ich die Bereitung desselben, die verschiedenen Materialien, die Einrichtungen der Brennereyen, die Vortheile, die der Staat davon zieht, kurz das Deconomische und Technische mit Stillhschweigen übergehe und ihn nur von der Seite betrachte, die für die Menschheit ein psychisches und physisches Interesse gewährt.

Das Geschichtliche der Erfindung ist etwas dunkel, und ich habe wenig Data auffinden können. Ganz so alt, wie die des Weines, ist sie nicht; aber sie gibt vielleicht Aufschluß über den satanischen Antheil der Erfindung, den der Teufel, zu Folge der Meynung alter Rabbiner, bey der des Weines gehabt hat. Es heißt nehmlich, daß, wie der Herr Zebaoth die Altväter Noah und Loth den Bau und die Zubereitung des Weines gelehrt habe, Satan darüber entrüstet gewesen sey, und um dieses Göttergeschenk den Menschen verderblich zu machen, getathen habe, zur Verübung Lamm's-, Pferde- und Schweineblut zu nehmen. Dieß habe die Folge gehabt, daß der, welcher ein Glas Wein trinke, heiter und freundlich, wer zwey zu sich nehme, muthig und wild, und wer drey und mehrere genieße, zum Schwein selbst würde. Ganz ohne Satan's Einfluß mag demnach die Geburt des geistig-teuflischen Getränkes wohl nicht gewesen seyn. Wahrscheinlich ist die Erfindung des Branntweins als *Spiritus vini* doch schon sehr alt; denn man hat Gefäße mit einer spirituellen Flüssigkeit bey ägyptischen Mumien gefunden. Und es ist mehr wie wahrscheinlich, daß er, zwar in anderer Gestalt, wie die nicht erreichte Kunst, Gold zu machen, von den Arabern zu uns gekommen. Wahrscheinlich, daß er von diesen aus Wein bereitet, zuerst von arabischen Aerzten als Arzney gebraucht wurde, und daß wir Europäer ihn aus arabischen Schriften kennen lernten; wenigstens war seine Bereitung im 15. Jahrhundert nur den Alchymisten als eine geheime Kunst bekannt.

Alexander Tassori erzählt, daß zu Ende des 15. Jahrhunderts die Maden sein bey einem sehr ergiebigen Weinjahre zuerst Branntwein aus Wein gemacht und verhandelt hätten, und der starke Verbrauch die Venetianer aufgefordert habe, dieses Product nachzumachen. Zuerst hätten sich deutsche Vergleute an dieses Getränk gewöhnt, und der meiste Absatz sey nach Deutschland gegangen.

Es gibt noch zwey alte deutsche Schriften, die eine von Michael Schrich v. J. 1483., und die andere von Mar Ayzer v. J. 1487., die aus 3 Blättern, ganz in Holz ge-

schnitten, besteht und ein Gedicht über den Branntwein enthält; eine Schrift, die schon über den Gebrauch und die Wirkungen des Branntweins etwas Bestimmtes sagt. So schreibt Michael Schrich 3. B. 1. der geprannte Wein ist gut für die Gicht damit gestrichen. 2. Wer heiser sey, der bestreiche sich mit gepranntem Wein um den Hals und trinke ihn Morgens nüchtern. 3. Wer alle Morgen trinkt in halben Köffel nüchtern, der wird nimmer krank. 4. Wenn eins sterben soll, so gießt man ihm ein wenig geprannten Weins in den Mund, so wird er reden vor seinem Tod. 5. Wer auch geuffet des Weines in einen Todten, der faulet und erksinet auf der Erden noch darunter. Was Fleisch man damit bestreicht, es sey roh oder gekochten, das faulet und erksinet nit.“ — Und so empfiehet er besonders noch den Gebrauch gegen Blasenstein, Herzwarm, Husten, Wasserkucht, äußerlich bey kranken Augen, Schwerhörigkeit und als Schönheitsmittel. Schon im 16ten Jahrhundert war der Gebrauch des Branntweins ziemlich allgemein, und es würde zu weit führen, die ganze Geschichte der Verbreitung dieses Getränks über alle Welttheile durchzugehen; daher ich um die Erlaubniß bitte, nur noch einige allgemeine Bemerkungen und Etwas über den Nutzen und den Nachtheil desselben beifügen zu dürfen. — Also ins Dunkle der Kunstgeschichte verliert sich die Entdeckung des Branntweins, und stammt höchst wahrscheinlich aus Arabien, von wo die Kunst Gold zu machen, und so viele nützliche, und so manche selbst verloren gegangene Erfindungen ausgegangen sind. Merkwürdig bleibt es, daß drey wichtige Entdeckungen so nahe zusammen treffen, Entdeckungen, die für die Menschheit und für die Weltgeschichte so wichtig geworden sind. Es sind dieses die Buchdrucker-Kunst, das Schießpulver und der Branntwein.

Wie unähnlich sind diese drey göttlichen Gaben ihrer Natur und ihrer Anwendung nach! zu welchem erhabenen, göttlichen Gebrauch haben wir die eine, — zu welchem schrecklichen, zerstörenden Gebrauch die beiden andern benutzt! Fast muß man glauben, daß bis dahin eine gütige und weise Vorsicht das Menschengeschlecht nicht für reif genug gehalten habe, um es mit diesen nützlichen, gefährlichen und schrecklichen Dingen bekannt zu machen. Groß, erhaben und beglückend ist der Nutzen, den uns die Buchdrucker-Kunst schafft; unserm Geist und Herzen gewährt sie Nahrung, unsere Kenntnisse vermehrt sie, und sichert uns ihren Beisitz für die Zukunft. Mit dem Schießpulver ahmen wir Gottes Blitz und Donner nach, zerstören wir dieser, und oft noch fürchterlicher als er, erschüttern den Erdboden gleich einem Erdbeben. Mit dem Branntwein, diesem Spiritus vitae, erhebt sich der Muth, die Fröhlichkeit, die Geistesthätigkeit und die Kraft; und mit dem nämlichen Mittel sinkt der Mensch zum Thiere herab und wird leblos. Zu ich kenne kein Mittel, das so merkwürdigen Einfluß auf den psychischen und physischen Menschen hat wie dieses. So schnell den moralischen wie den körperlichen Zustand zu verändern vermag. Lassen Sie uns unter vielen nur Ein Beispiel wählen! Nehmen Sie den muthlosen, traurigen, geschwächten, an allem Glück verzweifelnden Menschen, denken Sie sich ihn ohne Nahrung, ohne nöthige Bekleidung und Wohnung, entbloßt von Allem, was dem Leben Reiz und Annehmlichkeit verleiht, und geben Sie diesem Unglücklichen kleine Gaben dieses Lebensgeistes, und schon in einer Viertelstunde ändert sich sein Zustand. Seine gesunkenen Kräfte heben sich, andere Gefühle bemächtigen sich seiner, er wird muthig, heiter, vergißt seines

Unglücks und seiner Lage, vermißt nichts, wird ein Fürst, ja ein Gott! Und dieser nämliche Mensch nimmt zu viel von diesem Lebensgeiste, und Alles ist verschwunden; seine Kräfte nehmen ab, leb- und bewußtlos liegt er da, und von den hohen Vorzügen, die den Menschen wesentlich vom Thiere unterscheiden, ist keine Spur mehr vorhanden.

Gewiß gehöret die Erfindung des Branntweins zu den wichtigsten und erfolgreichsten, die der Mensch gemacht hat, und wohl darf man sie ihres Einflusses wegen der der Buchdrucker-Kunst, des Schießpulvers, der Magneten, der Aerostaten, Dampfmaschinen und Eisenbahnen zur Seite stellen. Zu weit würde es führen, wenn wir einzeln den Einfluß und die Einwirkung anführen wollten, den diese Erfindung auf so mannigfaltige Gewerbe und Künste, auf die Lebensart, auf die Gesundheit und Glückseligkeit der Menschheit gehabt hat. Aber gedenken wollen wir doch, daß sie viele neue Künste, Fabriken und Gewerbe geschaffen und manche gekannte verbessert hat; die Physik, die Chemie und Medicin kann sie nicht entbehren; denn sie hat dem Chemiker neue Auflosungs-, dem Naturforscher neue Untersuchungs- und dem Arzte neue und schätzbare Arzneimittel geliefert. Sie hat unter dem verführerischen Namen von Lebenswasser uns angenehme Getränke und Mittel verschafft, wodurch auch der Knechte eine Zeit lang seine Noth und Sorge vergißt. Sie hat den Fürsten und Staaten große Einnahme verschafft und mit dem Branntwein macht man Armen mobil, führt man ungeheure Bauten aus und errichtet Monumente, die der Ewigkeit trotzen, überwindet Schwierigkeiten, die die Alten nur durch Maschinen und Menschenzahl zu Stande bringen konnten, erabert neue Welttheile, und unterwirft sich die uncultivierte Menschheit, wie man das wilde Vieh bändigt.

Groß ist aber auch die Schattenseite dieser Erfindung. Welches namenlos Elend hat sie der Menschheit gebracht, und wie zerstörend sind ihre Wirkungen für die Gesundheit und das Glück so vieler Familien geworden! Wahrlich, der Branntwein hat manche Menschen vernichtet und getödtet, wie das Schießpulver! Unter eben dem verführerischen Namen von Lebenswasser hat sie ein langsam wirkendes Gift bereitet, welches das Leben verkürzt, die Gesundheit untergräbt und das Glück der Menschen zerstört, und den, der sich dem Genuße des Branntweins ergeben hat, bis zum Vieh herabwürdigt. Sie ist eine Quelle von Laster, Verbrechen und Schandlichkeiten geworden, die die Menschheit entehren und die sich durch Entdeckung und Aufklärung über alle Welttheile verbreitet hat. Sie hat den Europäern die Mittel gegeben, wodurch sie gelernt haben, jene rohen Völker durch Anlockung, Bezähmung und Entkeimung zu bekämpfen, zu besiegen und zu Sklaven zu machen, die dadurch erst recht unglücklich geworden sind. Sehr schnell hat sich die Liebe zu diesem Getränk über alle Welttheile verbreitet, und selbst die rohesten Völker, welche weder lesen, schreiben noch zählen können, haben nicht nur die Kunst der Bereitung begriffen, sondern auch Wis genug gehabt, ihn aus ihren einfachen Producten zu gewinnen. Auf die Moralität und Mortalität hat nicht leicht eine Entdeckung größeren und tiefern Eindruck gemacht; das können Aerzte, Seelsorger und Polizeybehörden bestärken. Wie oft trifft nicht hier das Schießpulver mit dem Branntwein zusammen, und wenn der vom Branntwein bis zum Vieh gesunkene Mensch nicht mehr weiter kann, so hilft ihm der schwarze Bruder über die Barriere weg, die das Diebstahl vom Tenselscheidet.

Um diese Erfindung noch nachtheiliger für die Gesundheit zu machen, hat man in neuerer Zeit eines der nützlichsten und wohlthätigsten Producte, die Kartoffeln, zu seiner Bereitung angewandt. Nicht allein, daß man dadurch seine Quantität unendlich vermehrte, sondern man hat auch dadurch seine Qualität unendlich verschlimmert. Kennen alle Fabriken die Mittel, das giftige Princip, das Solanin, was vorzüglich die Schale der Kartoffeln bewohnt, davon zu scheiden und es gänzlich unschädlich zu machen; würden sie stets gute und gesunde Waare und nicht oft das Schlechte und den Ausschuß dazu wählen; ließen sie ihr Product lagern und alt werden: so würden manche Nachtheile für die Gesundheit wegfallen. Denn der junge Kartoffelbranntwein ist eben so ungesund wie der junge Rum, den man in den Colonien den Negermörder nennt und dessen Auskuch bey hoher Strafe verboten ist. Der milde, angenehme Geschmack, der wohlfeile Preis ist aber zu verführerisch, und der schnelle Debit ist oft so groß, daß die beliebten Fabriken kaum so viel verarbeiten können, als zum Verbrauch und zum Verschleiß verlangt wird. Wahrscheinlich ist jener eigenthümliche Wahnsinn, worin alte Zinker verfallen, das Delirium tremens, das in neuerer Zeit zu häufig vorkommt, eine Folge des jungen und schlechten Kartoffelbranntweins. Wenigstens erinnere ich mich im Anfange meiner über 40 Jahre geführten Praxis nicht, und ich berufe mich auf das Urtheil meiner älteren Herren Collegen, daß diese Form des Wahnsinns früher nicht so oft vorgekommen sey wie jetzt.

Freyleich gibt es in Europa noch Länder, wo der Gebrauch des Branntweins und seine Nachtheile sehr beschränkt sind; selbst die deutschen Staaten kennen ihn wenig; bey ihnen heißt es: der Wein erfreut des Menschen Herz. Sachsen gebraucht ihn wenig; in Baiern trinkt man Bier; Italien, Frankreich, Spanien und Portugal bedürfen seiner fast nicht und genießen ihre köstlichen Weine; aber England verbraucht schon mehr, obgleich der Engländer sein köstliches Bier auch zu schätzen weiß, und den Branntwein, mehr mit Wasser verbünnt, als Grog zu trinken gewohnt ist. Nur Rußland, Pohlen, Schweden, Dänemark, Holland und Nord-Deutschland können ihn nicht entbehren, und in diesen Ländern hat man Gelegenheit genug, das Unglück und die Nachtheile kennen zu lernen, die dieses Lieblingsgetränk über ihre Bewohner verbreitet. Freyleich macht das Klima, die Lebensweise und in vielen Fällen die Armuth seinen Genuß nothwendiger, unschädlicher und auch wohl vergeßlicher. Denn bey so manchem Armen, der schlecht genährt und gekleidet ist, dessen Wohnung alles Nöthigen ermangelt und oft einem Viehstalle gleicht, der halb erfroren und entkräftet zur Tagesarbeit gehen soll, um seinen täglichen Unterhalt zu verdienen: bey diesem muß der Schnaps alles ersetzen und ihn zur Arbeit fähig machen, und er wiederholt die Gabe so oft ihm die Kräfte ausgehen. Sollte es wohl eine Sünde seyn, einem solchen Unglücklichen einige Kreuzer selbst zum Branntwein zu geben? Haben wir Deutsche doch eine Lebensart, die fast allen Sprachen fehlt, das Wort Trinkgeld, das freyleich nur in Folge seiner Bedeutung noch gebraucht wird.

Aber sollte es unmöglich seyn, dieses unglückbringende Getränk unschädlicher zu machen, oder wohl gar zu vernichten? Ich glaube und hoffe, daß es möglich und ausführbar seyn werde, da schon in manchen Ländern das Beispiel dazu gegeben worden ist, wie z. B. in America, England, Schottland,

Juli 1838. Heft 7.

Holland und in einigen Gegenden Deutschlands. In einigen Provinzen Amerika's, wo das Laster der Trunkenheit den höchsten Gipfel erreicht hatte, wird kein Branntwein mehr getrunken, und wir sehen von dorthier Schiffe in Hamburg ankommen, wo der Matrose alle Gefahren der See ohne Murren erträgt und die schwersten Arbeiten folgsam leistet.

Wenn es der ernstliche Wille wäre, die Branntweinsepest auszurotten, so müßten die Regierungen, die Gesetzgeber, die Volks- und Schullehrer, die Fabrikherren, die Zunftmeister, die Herrschaften, welche Dienstboten halten, und vorzüglich die Vorsteher der Armenanstalten das Ihrige redlich dazu beitragen; so müßte die Trunkenheit nicht die Strafe des Verbrechens mildern; so müßten Mäßigkeits-Vereine errichtet werden, die durch gute Einrichtungen und Bessspiele dem Laster der Trunkenheit Schranken setzen könnten.

Möge es den Edlen und Menschenfreunden der verschiedenen Staaten Europa's gelingen, diese Geißel der Menschheit, die das Glück, den Frieden und die Gesundheit so vieler Einzelnen wie ganzer Familien vernichtet, unschädlich zu machen oder gar auszurotten; und möchten vielleicht von dieser geehrten Versammlung aus einige wohlthätige Maßregeln ergriffen werden, um diesen großen Zweck zu erreichen: so würden diese wenigen, zu Ihnen gesprochenen Worte eines segenvollen Erfolges sich erfreuen.

6) Protomedicus von Lenhossel aus Ofen: über die Wuthkrankheit.

Unter allen Uebeln, die den Menschen treffen können, ist wirklich keines so fürchterlich, als die seit Jahrhunderten bekannte, — aber leider noch nicht erkannte Wuthkrankheit. — Wer kennt das schauerliche Bild, die Entsetzen erregenden Erscheinungen dieser Krankheit nicht? wo ist der Arzt, den das Mißgeschick traf, mit diesem Uebel kämpfenden Menschen beizustehen, der sie aber unter martervollen Leiden, aller angewandten Mittel ungeachtet, dahin sterben sah, ohne in seinem Innersten erschüttert worden zu seyn? — Je größer dieses Uebel ist, desto schrecklicher muß es uns erscheinen, wenn wir die traurige Ueberzeugung haben, daß wir bis zur Stunde noch keine Heilmethode, kein Mittel gefunden haben, das bereits tiefer in den menschlichen Organismus eingedrungenen Wuthgift zu beschwichtigen, seine, das Blut- und Nervenleben störende Kraft zu hemmen, dem unglücklichen Kranken, der mit Bewußtseyn unter entsetzlichen Qualen seinem gewissen Tode entgegenfiehet, Trost und Hülfe zu leisten! —

Wiele der Umstände sind mit diesem Uebel, wie ich in meiner vor Kurzem erschienenen Schrift „die Wuthkrankheit nach bisheriger Beobachtung und neuern Erfahrungen pathologisch und therapeutisch dargestellt“ ausführlich nachzuweisen mich bestrebte, die sich der wahren Erkenntniß desselben bisher entgegenstellten. —

Bey den besten Absichten und Bestrebungen der Aerzte und mancher Regierungen, die namhafte Opfer brachten, wurden Verirrungen herbeigeführt, die das erwünschte Ziel beynahe immer weiter rückten; — man haschte nach specifischen Mitteln, die unselige Gewinnsucht von Quacksalbern eitle herbey, und früher oder später kam man erst zur Erkenntniß, daß man unnütze, wohl auch schädliche Geheimmittel zu theuer bezahlt



habe. Wohl ist es nicht zu verkennen, daß es dem erhellten Forschungs- und Beobachtungsgeiste unserer Zeit gelungen ist, viele der bisherigen Jerrthümer zu zerstreuen, und manche Momente, die sich auf erwähnte Krankheit beziehen, zu beleuchten; — allein weit sind wir noch davon entfernt, eine genügende Pathologie und rationelle Therapie der Wuthkrankheit aufzustellen. — Noch wissen wir nicht, wie wir die Quelle des Wuthcontagiums ersticken sollen; da uns weder die Anlage, noch die einwirkenden Ursachen der Wuth bey dem Hundsgeschlecht bekannt sind; — wir können die scheinbare von der wirklichen Gefahr nicht unterscheiden; in dem die zuverlässigen Zeichen der Hundswuth noch nicht gehörig hervorgehoben wurden; — die Prophylaxis gegen diese Krankheit dürfte bey unbekannter Natur des Wuthgiftes noch manche Berichtigungen erhalten; — ferner ist uns die Pathogenie und die eigentliche Natur der Wuthkrankheit, ohne welche wir nie zu einer rationalen Therapie gelangen können, unbekannt.

Ich glaube aber, der günstigste Zeitpunkt zur wahren Erforschung dieses Uebels sey schon herbeigeführt; — indem wir wissen und erkennen, was wir bestimmt wissen und nicht wissen. — Wir müssen also diesen so hochwichtigen Gegenstand möglichst zu verfolgen suchen; durch Aufmunterungen zu fernern Beobachtungen, zu weiteren Aufschlüssen zu gelangen, uns bestreben. — Meiner Ueberzeugung nach dürften aber derley Aufmunterungen, wenn sie von dieser gelehrten Versammlung ausgehen, vom besten Erfolge seyn. — Zu diesem, die Vervollkommnung der Heilkunde und das Wohl der Menschheit beabsichtigenden Zweck will ich nun nach meinen geringen Kräften beptragen; — indem ich nachfolgende Preisfrage mit einem Prämium von 100 Stück f. Dukaten zu honoriren mich verpflichte:

„1) Welche sind die vorzüglichsten Ursachen und die zuverlässigsten Zeichen der ursprünglichen Wuth bey dem Hundsgeschlecht?

2) Welche sind die pathognomonischen Symptome der durch das mitgetheilte Wuthgift hervorgerufenen eigenthümlichen Wuthkrankheit bey dem Menschen?

3) Welche sind die zuverlässigsten prophylactischen Mittel gegen die Wuthkrankheit? sind nebst der örtlichen Behandlung verdächtiger Wunden und durch den Wuthgeifer verunreinigter Hautstellen, auch allgemeine, auf die Blutmasse, das Nervensystem und Lymphsystem wirkende Mittel erforderlich? welche sind dieselben, und worauf gründet sich ihre Indication?

4) Welches Heilverfahren und welche Mittel kann man bey bereits ausgebrochener und vollkommen entwickelter Wuthkrankheit des Menschen mit wahrscheinlichem Erfolg anwenden? welche sind die begründenden Anzeigen derselben, und kann man über alle Zweifel erhabene glückliche Behandlungen dieser Art nachweisen?

Das erwähnte Prämium von 100 Dukaten für eine durchaus genügende, auf zuverlässige und wiederholte Erfahrung gegründete Beantwortung obiger Fragen werde ich bey der medicinischen Facultät zu Pesth hinterlegen; — dieser überlasse ich auch die erste Beurtheilung der eingesandten Beantwortungen. — Mein Wunsch ist aber, daß jene Abhandlungen, welche vor der Hand für preiswürdig gehalten werden, den nächstfolgenden fünf Versammlungen der Naturforscher und Aerzte in der Zeit-

folge ihrer Einfindung zur nähern Beurtheilung vorgelegt werden, — daß daher die Zuerkennung des Preises von dieser gelehten Versammlung ausgesprochen werde. Die Preiswerber haben ihre, mit einem Motto bezeichneten, in deutscher oder lateinischer Sprache verfaßten Abhandlungen an die medicinische Facultät zu Pesth portofrey einzusenden und ihren Namen, Character und Wohnort in einem versiegelten, mit gleichem Motto bezeichneten Zettel anzudeuten. Die Concurrenz für diese Preisfrage bleibt durch fünf Jahre bis 1842. incl. offen.

Theilweise Beantwortungen dieser Fragen können wohl belobt aber nicht honorirt werden; da keine Zerstückelung des Prämiums Statt findet.

Die gekrönte Preisschrift bleibt Eigenthum des Preisaussellers, und die nicht honorirten Abhandlungen werden den Verfassern auf Verlangen zurückgestellt.“

(Wir erlauben uns hiebey zu bemerken, daß eine solche Beurtheilung von Seiten der Versammlung unmöglich ist. Eine solche Arbeit überschreitet weit die Zahl von 8 Tagen, auch wenn man sie der Versammlung wirklich aufbürden könnte. Die Versammlung ist ja keine stehende Gesellschaft und kann sich daher mit keiner Art von Geschäften abgeben. Das Urtheil der Pesther Facultät und die Bekanntmachung desselben in der Versammlung reicht vollkommen hin. D.)

7) Kammerrath Schlieben aus Dresden, über die unseeliche Zunahme des Selbstmordes wie der unehelichen Geburten. — Dabey müssen wir auf den amtlichen Bericht S. 64 verweisen.

8) Prof. Schweigger aus Halle, über die Bedeutsamkeit naturhistorischer Akademien im Sinne eines Leibnizes und über die Wichtigkeit einer in Wien zu gründenden Academie der Wissenschaften für die Verbreitung der Naturwissenschaften im Orient. — Sieh Buch S. 70.

9) Prof. Zippe zu Prag: über die von Grafen Caspar Sternberg unlängst in Böhmen gemachte Entdeckung eines aus verschlakttem Gesteine bestehenden Walles.

Vor zwey Jahren wurden dem hochverehrten Herrn Präsidenten unserer Versammlung, Herrn Grafen Caspar Sternberg, einige Stücke eines theils porösen, theils bläulichen und schlackigen Gesteines gebracht, welches in der Gegend zwischen Pilsen und Pßaz auf der Kuppe eines Berges vorkommen sollte, und welches seinem Ansehen nach vorläufig für bläulichen Basalt oder eine lavaähnliche Abänderung dieses Gebirgsgesteines gehalten wurde, wie solche Abänderungen des Basaltes am Wolfesberge bey Czernoschin, am Kammerbühl bey Eger und an andern Basaltbergen des westlichen Böhmens in großer Mannfaltigkeit bekannt sind. Der Fund wurde vorläufig in der Sammlung des vaterländischen Museums niedergelegt.

Das frische Ansehen des Gesteines, die mehr glasartige, fast himssteinähnliche Beschaffenheit, die größere Härte und Sprödigkeit, das Abweichen der Farbe ließen nun wohl eine Verschiedenheit desselben von eigentlicher Basaltbildung vermuthen; doch konnte darüber aus der bloßen Untersuchung der gebrachten Handstücke, welche sämmtlich einander gleich waren, nicht mit Bestimmtheit entschieden werden. Dieses so wie der



Umstand, daß in der angegebenen Gegend die Felsarten des Uebergangsgebirges und die der Schwarzkohlenformation die allein herrschenden Gesteine bilden, und dort durchaus nichts von einer basaltartigen Gebirgsmasse weder als verfließendes Gestein, noch als Gerölle bekannt ist, ließ eine Untersuchung dieses Fundes an dem Orte seines Vorkommens wünschen, da nicht wohl anzunehmen war, daß diese Steine von dem viel weiter westlich und nördlich im pilsner Kreise hervortretenden Basaltmassen abstammen können.

Diese Untersuchung konnte erst vor Kurzem von unserem hochverehrten Herrn Präsidenten vorgenommen werden, welchen ich dabei zu begleiten die Ehre hatte. Sie führte zu dem merkwürdigen Resultate, daß diese räthselhaften Gesteine nach den Verhältnissen ihres Vorkommens sowohl, als ihrer Lagerung und Verbreitung, nicht für eine geologische, sondern für eine historische Erscheinung zu erklären seyen. Zu diesem Schlusse führte nun auch die Beschaffenheit des an Ort und Stelle in größerer Menge und Mannfaltigkeit aufgefundenen Gesteines.

Der Ort des Vorkommens dieses Gebildes ist eine mit Wald bewachsene Bergkuppe am rechten Ufer der Mies, unweit des Dorfes Butowetz, eine Meile N. O. von Pilsen, der Schafberg genannt. Die Bergkuppe fällt N. W. und S. ziemlich steil gegen das Flussthal der Mies, und in ein kleines, hier in dasselbe einmündendes Seitenthal ab. Zum Theile sind die Gehänge berastet, zum Theile felsig und mit losen Steinbrocken bedeckt, von derselben Beschaffenheit, wie sie der west anstehende Fels des Berges zeigt. An der Ostseite verläuft sich die Kuppe in das Plateau, welches das Uebergangsgebirge in dieser Gegend bildet; sie erhebt sich nur unmerklich von dieser Seite. Die obere Platte der Kuppe ist fast eben, und somit der ganze Berg eigentlich nur Vor sprung der Hochebene gegen die Thalgänge. Das feste Gestein der letztern, so wie die zahlreichen Gesteintrümmer, welche sie stellenweise bedecken, zeigen eine von den vielen Abänderungen der Schieferbildung, an welchen die schieferige Structur gänzlich oder größtentheils verschwunden ist; welche somit einen Uebergang aus dem Grauwackenschiefer in ein dichtes, der Grundmasse eines Porphyr ähnliches Gebirgsgestein andeuten, und welche auch wohl mit den Benennungen Feldstein und Aphanit bezeichnet werden; doch kommen auch deutlich, wiewohl nicht vollkommen schieferige Abänderungen mit den dichten untermergt vor; es scheint, daß Feldspath von verschwindender Zusammensetzung in dem innigen Gemenge des Gesteines den vorwaltenden Bestandteil bilde. Die obere Platte der Kuppe ist an ihrem Rande fast ringum mit einer Art von Wall eingefäumt, gleichsam wie mit einem Kranze umgeben, welcher sich bey der Untersuchung als ein Werk von Menschenhand gemacht, sehr bald kund gibt. Diese wallartige, 3 bis 4 Fuß hohe, und in der Basis gegen 2 Klafter dicke Einfassung, bildet ein unregelmäßiges Polygon mit theils geraden, theils sanft gekrümmten Seiten, zum Theile mit stumpfen, einspringenden Winkeln. Diese unregelmäßige Figur ist in der größten Ausdehnung 90 Klafter lang und 50 Klafter breit; sie richtet sich ganz nach der Figur des Randes der Bergplatte, welchem sie angepaßt ist. In der Entfernung von 90 Klafter findet sich an der N. O. Seite, da wo die Bergplatte in die Hochebene verläuft, ein anderer wallartiger Aufwurf, welcher von einem Gehänge des Berges bis zum andern reicht, und vor welchem eine grabenartige Vertiefung sichtbar ist. Beyde Wälle, besonders der äußere Abschnitt, sind ziemlich mit Rasen

und Dammerde bedeckt. Der innere Wall oder das Hauptwerk besteht aus zusammengetragenen losen Gesteinen; seine Vereinigung derselben durch eine Art von Kitt oder Mörtel, nichts einer anderweitigen Maurerarbeit Ähnliches ist daran wahrzunehmen. Dieser Wall ist es aber, in welchem diese lava- oder bünsfeindähnlichen Bildungen vorkommen, ja, er besteht fast größtentheils daraus; nur an einigen Stellen bemerkt man Gesteine, welche den am Gehänge des Berges umherliegenden, und der festen Grundmasse derselben gleich sind. Eine genaue Untersuchung und Vergleichung der Gesteine des Walles selbst zeigt ferner, daß es eben diese zusammengetragenen Gesteintrümmer des Berges selbst sind, welche hier an Ort und Stelle durch Feuer verändert, zum Schmelzen gebracht und in die blasse oder poröse, schlackige Masse umgeändert wurden: denn man findet alle Uebergänge von der, einem glasigen Bünsfeine ähnlichen Mineralsubstanz bis zu dem feischen unveränderten Gebirgsgestein, ja, man findet die Andeutungen zu diesen Uebergängen oft an einem und dem nämlichen Gesteinklumpen. Außerhalb des Walles findet sich nichts von solchem verschlackten Gesteine, eben so wenig in dem Raume innerhalb des Walles; vielmehr führte eine auf Veranlassung Sr. Excellenz des Herrn Grafen Sternberg gemachte Nachgrabung im inneren Raume sehr bald auf die unveränderte Felsmasse des Berges, woraus zur Genüge hervorgeht, daß diese verschlackten Gesteine nicht durch Wirkung eines unterirdischen Feuers gebildet worden sind. Auch lehrt der Augenschein an Ort und Stelle, daß diese Gesteine des Walles nur lose zusammengetragene Felsbrocken von dem Gehänge und der Platte des Berges seyen, und daß sie mit dem festen Untergrunde nicht weiter zusammenhängen. Eben so sieht man bey der Untersuchung sehr bald, daß diese schlackigen Massen nicht als solche zusammengetragen, sondern daß sie dort, wo sie sich gegenwärtig befinden, gebildet wurden: denn sie hängen oft unter einander zusammen, greifen gleichsam in einander ein und bilden so größere zusammengebackene Klumpen und stellenweise ziemlich ansehnliche Massen, welches nicht der Fall seyn könnte, wenn sie als bereits fertige Schlacken zusammengetragen worden wären, da diese vielmehr, vermöge ihrer Sprödigkeit, bey dieser Arbeit ihren Zusammenhalt verloren haben würden.

Um über den Untergrund des Walles und über den Zusammenhang der Schlackensteine mit demselben noch mehr in's Klare zu kommen, als es durch bloße Besichtigung von Außen möglich ist, wurde eine Durchgrabung des Walles an einigen Stellen veranlaßt, und das Ergebnis derselben war eine Bestätigung der Vermuthung, daß das Gestein an Ort und Stelle diese Umänderung in Schlackenbildung erlitten habe; denn zwischen dem Walle und dem Untergrunde fand sich ganz unerwartet eine 2 bis 3 Zoll starke Lage von Holzkohlen, dem Anscheine nach Buchenholze. Somit ist denn dieses merkwürdige Gebilde auf eine Weise, welche jeden Zweifel beseitigt, als ein Werk von Menschenhand, als ein Kunstproduct nachgewiesen.

Schwieriger möchte es seyn, über den Zweck und die Zeit der Bildung dieses verschlackten Walles, wie wir ihn benennen wollen, etwas Bestimmtes auszusprechen, so wie über den Umstand, ob diese Verschlackung eine absichtliche oder zufällige gewesen sey. Obwohl nun die Beantwortung dieser Fragen nicht mehr in das Gebiet des Naturforschers, sondern in das des Geschichtsforschers und Archäologen gehört; so sey es doch erlaubt, vor der hochansehnlichen Versammlung auch darüber, als über einen Gegenstand von allgemeinerem Interesse, einige Ver-

muthungen äußern zu dürfen, um so mehr, als ähnliche Untersuchungen schon mehrere Male von Geologen gemacht und zur Sprache gebracht worden sind, und als in Böhmen, einem Lande, welches sowohl dem Natur- als dem Geschichtsforscher so manches Räthselhafte, Unerwartete und früher Unbekannte geliefert hat und noch liefern wird, vielleicht Erscheinungen dieser Art noch öfter vorkommen dürften, welche vielleicht auch auf dem übrigen europäischen Continente nicht ganz fehlen werden, obwohl unseres Wissens noch nirgends etwas darüber kund geworden ist.

In der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Heidelberg, am 19. September 1829., las Herr Hofrath von Leonhard eine Abhandlung über die in Schottland an mehreren Orten vorkommenden verschlachten oder verglasten Burgmauern; zugleich wurden Belegstücke vorgezeigt, an welchen sowohl Verschlackung als Verglasung deutlich erkennbar waren. Diese wallartigen Gebäude, welche mit Wahrscheinlichkeit für Vertheidigungswerke gehalten werden, liegen Jenseits der Geschichte und der Tradition; man weiß nicht, welchem vorgeschichtlichen Urvolke sie zuschreiben sind. Einwirkung des Feuers liegt am Tage; es bleibt aber räthselhaft, ob diese Einwirkung bey ihrer Erbauung statt fand, oder bey ihrer Zerstörung. Es sind mehrere kleine Schiften in England darüber erschienen, unter anderen eine sehr ausführliche Abhandlung von Mac Culloch, im 2ten Bande der *Transactions of the geological Society*. Mehrere Ansichten und Vermuthungen sind darüber ausgesprochen worden. Hofrath von Leonhard hat sich darüber mit folgenden Worten geäußert: „Der Verglasungs- und Verschlackungsproceß unserer Burgen dürfte, fast man alles darüber Gesagte zusammen, auf die Art bewirkt worden seyn, daß die Mauern in zweckdienlicher Weise mit einem Erd- oder Asenwall umgeben, der Zwischenraum mit Brennmaterial angefüllt, und Füllung und Verbrennung so oft wiederholt wurden, bis die Absicht erreicht war.“

Sollte die Verschlackung oder Verglasung eines solchen Burgwalls oder einer Mauer beabsichtigt worden seyn, so möchte eine solche Vorrichtung, wie sie hier angenommen worden, allerdings den Zweck erreicht haben; nur dürfte dann die Flamme an dem oberen Rande, wo sie mit der Atmosphäre in Berührung kam, stärker auf das Gestein gewirkt haben als unten, wo sie durch die äußere Wand gedeckt war. Es ist aber nirgends durch Versuche von Durchgrabung solcher Steinwälle bis auf ihren Untergrund nachgewiesen, ob die Verschlackung oben und unten in gleichem Grade statt gefunden habe. Auf Kohlenplätzen werden Steine, welche sich zufällig darauf befanden, nicht verschlackt gefunden; wohl aber schmilzt eine Schieferplatte in freyer Flamme, obwohl das kaum als Beweis für die mögliche Verglasung einer Mauer angeführt werden dürfte; da eine Schieferplatte von etwa 8 Linien Dicke wohl leichter zu verschlackt seyn mag, als stärkere Gesteinsstücke.

Eine obachtliche Verschlackung möchte bey unserem Walle kaum anzunehmen seyn; denn ähnliche Bauwerke, wie das beschriebene, finden sich mehrere in Böhmen, theils von großem, theils von geringerem Umfange. Um nur einige anzuführen, so findet sich ein solcher Wall feinstwärts von Aurinowes, der der Kirche St. Mathias, und ein anderer auf dem Berge Grabsicht bey Berzina, dem Wohnsitz unseres verehrten Herrn Präsidenten auf seiner Herrschaft Radniß. Hier sind

die Steine, aus welchen der Wall zusammengehaufte wurde, Quarzfels, die Felsart des Berges selbst, welche, so wie bey Bukowetz, in zahlreichen Trümmern an den Gehängen umherliegt. Bey St. Mathias aber sind die Steine Plänkalkstein, welcher dort nicht an Ort und Stelle vorkommt, sondern aus größerer Entfernung herbeigeschafft werden mußte. Nicht alle Gesteine sind durch Feuer einer Verschlackung oder Verglasung fähig; der Plänkalkstein würde aber eine solche sehr leicht eingegangen seyn, wenn sie von den Erbauern beabsichtigt worden wäre. Der Quarzfels am Walle des Grabsicht würde wenigstens eine Frittung, welche noch wahrnehmbar seyn würde, erlitten haben, wenn Feuer auf ihn eingewirkt hätte. Der Wall am Schafberge bey Bukowetz ist das erste Beispiel der Verschlackung eines solchen Bauwerkes, welche nach den Geschichtsforschern Böhmens sämmtlich aus vorflavischer Zeit herrühren sollen. In Beziehung auf die Verschlackung scheint er mit den schottischen verglasten Burgen überein zu kommen; aus den im Grunde des Walles gefundenen Kohlen aber, und aus dem Umfange, daß andere ähnliche in Böhmen, und wahrscheinlich auch in anderen Ländern des Continents von Europa vorkommende vorgeschichtliche Bauwerke nicht verschlackt gefunden werden, scheint hervorzugehen, daß hier die Verschlackung nicht beabsichtigt, sondern durch Zufall herbeigeführt wurde. Wahrscheinlich waren diese Bauwerke größtentheils von Holz errichtet und die Steine wurden nur zu ihrer größeren Festigkeit, gleichsam zur Verschönerung, darinn aufgeschütt, und diese wurden dann sehr zufälliger oder feindlicher Zerstörung des Bauwerkes durch Brand verschlackt. Daß nicht alle solche Bauwerke durch Feuer zerstört wurden, die meisten vielmehr einem allmählichen Untergange durch den Zahn der Zeit im Verlaufe vieler Jahrhunderte anheim fielen, mag das Vorkommen der nicht verschlackten Wälle erklären, welche ihrer übrigen Beschaffenheit nach gewiß denselben Ursprung haben und ihrer Entstehung nach in dieselbe Zeitperiode fallen.

Darauf folgt im Namen Sr. Majestät des Kaisers eine Einladung des Oberst Burggrafen, Carl Graf v. Chotek zu einem Gastmahl in der Burg, und die Anzeige von einer Münze, welche der Magistrat zum Andenken an die Versammlung hat prägen und an die wirklichen Mitglieder vertheilen lassen. Sie stellt vor das Rathhaus zu Prag; auf der Rückseite steht: *Concioni. XV. Natur. scrutati. et. Medicor. Germaniae. MDCCCXXXVII. Praga consortii memor.*

Außerdem bekam jedes Mitglied das topographische Taschenbuch von Prag, zunächst für Naturforscher und Aerzte bearbeitet von Prof. Kromholz. Es ist mit einer schönen Ansicht der Kleinfeste der Stadt geschmückt und noch mit einer Charte der Umgegend versehen.

### Dritte allgemeine Versammlung

Dienstag, den 26. Sept.

Die Fremden dankten durch eine Deputation den Landes- Behörden und dem Magistrat für das der Versammlung vielfach bethätigte Wohlwollen.

(Wir erlauben uns, hieby zu bemerken, daß diese Act von Danckagung statutenwidrig ist. Der §. 14. sagt: Jede Be- ante unterzeichnen allein im Namen der Gesellschaft. Statuten

die Fremden die Dankfagung ab, so kann es kommen, daß sie auch vor Fürsten erscheinen müssen, wozu Reisende nicht eingerichtet sind. Die Sache hat aber selbst ihre schlimmen Folgen und hat sie schon gehabt. Gewöhnlich wird eine und die andere Behörde vergessen und mithin Aerger erregt. Selbst Vorkände von Anstalten oder Sammlungen haben schon eine solche Deputation erwartet. Endlich können die Geschäftsführer, wenn ihnen allein die Dankfagung übertragen wird, bei dieser Gelegenheit vieles vor ihren Behörden zur besten Vergründung oder Anlegung von Sammlungen und Anstalten an ihrem Orte vorbringen, was bei der günstigen Stimmung der Gemüther für die Naturwissenschaften vom besten Erfolg ist, während die Deputationen der Fremden nur leere Ceremonien sind. Man raubt auf diese Weise den Universitäten oder Städten die passendste Gelegenheit, ihre Anstalten zu verbessern."

Dann wurden die Protocolle der Fachsitzungen verlesen.

10) Prof. L. Reichenbach aus Dresden: über die Entwicklung und den heutigen Standpunct der Naturgeschichte.

Wenn im Laufe der Zeit ein fortgesetzter Umgang mit der lebendigen Natur oft neue Seiten für deren Beschauung geboten und neue Bahnen der Forschung eröffnet, und wenn durch das Resultat solchen Forschens nach Innen, dann auch wieder nach Außen, der Naturgeschichte eine Anerkennung geworden, wie nur wenige Zweige des menschlichen Wissens in der Gegenwart wirklich gefunden; so mag es an der Zeit sein, zu fragen: wo wir nun in der Gegenwart sind, wenn es darauf ankommt, einen Blick auf die Resultate zu werfen, welche die verschiedenen Bahnen der Forschung für das Ganze geboten, die Möglichkeit zu ahnen, einen allgemeinen Gesichtspunct, einen Zusammenhang in der Naturanschauung wieder zu finden.

Einzelne große Ergebnisse der Naturforschung schweben als Entdeckungen der neueren Zeit unserer Erinnerung vor, welche im Stande sind, jenes Ineinandergreifen der Momente des Naturlebens klar vor unserer geistigen Anschauung zu entfallen. So war es erst die lebende Generation, welcher es gelang, die Lehre von der Bildung unseres Erdbörpers tiefer zu begründen: die frühere Ahnung einer Erhebung der älteren Gebirgsmassen wuchs so aus der Wahrscheinlichkeit fast zur Ueberzeugung heran, und jener große Geist, in dem sie geboren worden, wurde assimiliert von der ganzen forschenden Welt, und so wurde durch ihn die Basis des Naturlebens zum Object einer klaren Beschreibung. Dieselbe Zeit war es, welcher es gelang, das Beginnen und Fortbilden einer frühern organischen Schöpfung nun wahrscheinlicher nach ihren Erscheinungsperioden zu ergründen, jene zahlreichen und zum Theil in titanischer Urfkraft colossal emporgewachsenen Formen einer Pflanzen- und Thierwelt der Vorzeit vor unser lebendes Auge in die Idee lebendig wieder zu führen: denn es vermögte sich dem unermüdeten Eifer hochachteter Forscher die Lösung der Aufgabe, aus den versteinigten Mummien jener Wesen jene Hieroglyphen zu entziffern, welche ihnen die Elemente darboten, eine Flora und Fauna der Vorwelt zu entwickeln, welche in klarem System alle Classen und Ordnungen, ihre Familien, Gattungen und Arten sehr wohl angeordnet, sich parallelisiert mit dem Systeme der noch lebendigen Schöpfung. Eine noch neuere Zeit war es dann, welche die Erforschung jener vorweltlichen Organismen durch microscopische Beschauung noch tiefer ergründet, welche

uns Gebirgsmassen selbst, als Aggregate von zertrümmerten Molluskengehäusen und von Panzern fast unsichtbarer Infusorien kennen gelehrt, welche die Erzeugung des Eisens zum Theil aus dem Thierreiche nachwies, welche im lebendigen Thiere, wie in der lebendigen Pflanze einen reichen Heerd für Mineralienbildung aufschloß, und mancherfaltige Crystalle aus den Zellen der Pflanzenbehalter, wie aus dem Gehörorgane der Kröte und aus dem Gehäuse der Schnecke entwickelt und selbst den Hauptpanzer von Rhinocerosen, in versteinigten Schildern bewahrt, wieder an's Licht zog, mit den Hautschildern anderer Säugethiere sie systematisch vergleichend. Anderwärts ergründete fleißige Beobachtung der natürlichen Vorgänge den Proceß der Verfeinerung genauer, und vollführte vor unseren Augen die Enträthselung dieses großen Geheimnisses des immer thätigen Naturlebens im Kleinen ihn nachahmend. Ein anderes Moment unserer vielfach thätigen Zeit fichtete uns weiter und tiefer hinein in das organische Werden und Wachsen, entdeckte Schmarogethiere in allen Theilen höherer, lebender Körper, sogar im sehenden Auge des Menschen, zeigte uns das räthselhafte Doppelleben der Polypenschaar und ihres mineralischen, doch organisch aus ihnen und mit ihnen fortwachsenden Corallenstammes, wie er sich zu Klippen und Inseln erhebt; für Pflanzen, Thiere und Menschen wieder Land und Häuser und Vestungen bietet. Es lenkte ferner die Zeit das schöne, Jahetaufende lang ungesehene Bild einer Umdehnung der Embryonen in den Eiern der Schnecken und Muscheln, und die Bewegung der Säfte in den Gewächsen vor das sehende, sehnedne Auge. Wir sind jetzt nahe daran, seit Kuntz's lichtvoller Entdeckung der Embryonenlage in den Crucifern vor der Reife des Samens, auch in den Gewächsen die Umdehnung des Keimlings vor seiner Reife nachweisen zu können, und alle Forschung leitet uns auf die Bahn, zu ahnen, wie das organische Leben aus einem ersten Urpuncte, im Bereich des Chemismus, vielleicht durch electro-magnetische Schwingungen erweckt wird, welche den Gesetzen des Macrocosmos folgend, eine Aere für ihre Bewegung firtir finden. So schwingt sich aber im Character des activ in die Welt hinausstrebenden Thieres, in rastlosem Wirbel, der Keimling in den Eiern der Muscheln und Schnecken, und so neigt sich langsam im passiven, bewußtlosen Ahnungsleben der Pflanze, ihr sich nach Licht sehnender Keimling, bevor er zum Genuße des Lichtes gereift war: und so wie die schönen Tage, welche wir in diesem Vereine heftammen verlebten, an Döbereiners großes Platinphänomen und an Dersched's Versuche erinnern, durch welche Magnetismus und Electricität in ihrer innern, tiefem Beziehung erkannt wurden; so boten uns die jüngst verfloffenen Tage die Fortbildung dieser großen Entdeckung, während sich die tiefsten Räthsel des Lebens lösten, und der wahre Grund des Lebendiggewachsens, durch Costes's geistvolle Beschauung der Zoogenese, sich aufklärte.

Fernbleibend von einem Eingehen in Einzelnes, mag nur erlaubt sein zu glauben, daß kein Zeitalter so reich gewesen an Aufhäufung von speciellen Objecten, wie an bergleichen Resultaten seiner Forschung über das erste Werden und Widen, über das Schaffen und Wachsen in der Natur, als das unserige; und manche Fragen wurden wirklich gelöst über Gestaltung und Belebung, welche seit lange als Problem unlöslich erschienen, wenn auch das wahre Wesen des Lebens, als ein göttliches Urmoment, der menschlichen Zukunft für immer als Urproblem unlöslich verbleibt.

Solcher Forschung und solchen Resultaten vertrauend, senden wir aber jetzt ruhiger unsere Blicke hinaus in die Urwelt, verfolgen die Beobachtung der vor Jahrtausenden versteinerten Pflanzen, bis zum Blüthenstaube ihrer Aetheren, wie zum Fruchtstaube der Farrenkräuter, die der damals thätigen Thierwelt durch alle Classen hindurch, und sehen auch unter ihnen den Aufschlüssen der Geschichte ihrer individuellen Entwicklung entgegen.

Aber in Allem, was wir entdecken und finden, was wir beobachten und gründlich erforschen, erkennen wir zugleich wieder, wie in der noch lebenden Welt, jenen ungesäglichen Kampf der Antithesen, welcher vom Anbeginn an gewaltet, und auf seiner Bahn immer zum Frieden dahin führte; denn die schöne Zensur in der Natur ist der ruhige Abschluß in Raum und Zeit, die gegenseitige Selbstbestimmung von Materie und Leben; sie erscheint überall als das Ziel des immer thätigen Waltens und göttlichen Schaffens, jener Entfaltung und Vollendung, welche unablässig vorwärts schreitet zum Höheren, und immer wieder vorbereitend sein Fortleben in der Zukunft begründet. Die Polarität in der Natur bedingt die Momente aller Erscheinung, sie bedingt das Stillleben der Pflanzen und ihrer ahnenden Blüthe, wie das Leben des Thieres in seinen Instinkten und Trieben, und das höhere Geistesleben im Menschen; sie bedingt die Stufen seines Alters und die Stadien seiner Krankheit, wie sie im lebendigen Organismus ihre Akme entfaltet und glücklich besiegt.

Nem passiven Pflanzenreiche entgegengesetzt, steht das active Thierreich, losgerissen von seinen irdischen Fesseln und freywandernd auf der Erde wie im Wasser, und jenes Reich der willenlosen, geseßten Pflanzen vernichtend, endlich in sich selbst seine Gegenstände wieder entwickelnd und gegenseitig sich selber vernichtend. So standen bereits in der Vorwelt zwei Gruppen von Thieren einander gegenüber, unter der Herrschaft feindlicher Principien einander bekämpfend. In der ganzen Organisation jener Thiere sprechen sich im Aeußeren und Innern Gegensätze aus, welche auffallend sind im Bau und in der Weise des Lebens. Das pflanzenfressende Säugethier, vielleicht sobald nach der Schöpfung der Pflanzenwelt auf den Schauplatz getreten, lebt in geselliger Einigkeit, wenig bekümmert um die übrige Thierwelt, sucht sich seine Kräuter, und verdaut diese mühlos wiedererkauend, bis durch vielfache Zubereitung und Durchwirkung der Pflanzenstoff fähig geworden ist, in dem langen Darmcanale sich zu zersetzen und die für die Ernährung passenden Stoffe zu sonbern. Die sanften, gutmüthigen Thiere sind, wie wir sie nun in unserer Zeit kennen, scheu und flüchtig und zähmbare, kann zutraulich gegen den Menschen, und werden nur durch ungeheure Vermehrung schädlich für das Gedeihen der Pflanzen. Das fleischfressende Raubthier dagegen überachtet aus dem sicheren Hinterhalt im wüthenben Sprunge die Heerde jener sorglos grasenden Thiere, reißt sein Opfer nieder mit den gewaltigen Klauen oder Fängen, sättigt sich in seinem Blute, und genießt gierig die eben Theile, das Uebrige den seine Spur verfolgenden kleineren Raubthieren übrig lassend, und schnell, ohne Beschwerde die seinem eigenen Körper gleichartige Nahrung verdauend, bereitet es bald wieder zu neuem Raube sich vor. Und der Mensch verfolgt dann in seiner Zeit wieder das Raubthier, und dessen Ausrottung setzt er sich ganz ernsthaft zum Ziele. So bewegt sich aber ewig der Cyclus des Lebens in der Natur, und räthselhaft dünkt uns dabei, wenn wir in diesen

Erscheinungen sie auffassen wollen, die Nothwendigkeit des Raubthieres im Kreise der Schöpfung, und wir müssen auch hier, wollen wir einer Erklärung uns nähern, zum Anfang der Erscheinung zurückkehren; denn das Ganze genethisch verfolgend, tritt uns das Bild erst deutlich vor den forschenden Blick.

Bevor der Mensch die Natur sah, begann sie formlos, ursprünglich mit sehr einfachen Wesen und nur im allgemeinen Mutterelemente des Wassers bevölkert, bis die Uferlande vom Wasser entblößt wurden, und nach schwächeren Vorbildern die gewaltigen Ichthyosauren und der Saurier altes und reiches Geschlecht überhaupt, als Mittelwesen zwischen Fisch und Crocodil, aus den Sümpfen heraufstauten, sie als die ersten Raubthiere der Scene, die Vermehrung der zahlreich gewordenen Wasserthiere und Sumpfwohner begründend. Es wurden dann, bei fortschreitender Entwicklung der Erdschichten, die Thiere des Bestandes geschaffen, und auch unter ihnen war Friede, denn sie genossen die nicht widerstrebende Pflanze, wie sie auf den schon mehr ausgebreiteten Flächen grünte und blühte, und ungeheure Heerden von Elephanten, Nashörnern, Nilpferden und Tapiren wohnten um jene Gewässer, und Antilopen und riesenartige Hirsche weideten ungestört auf den Steppen des Orients, wie auf den Bergen und Waldwiesen des deutschen Vaterlandes, friedlich sich mehrend: hnd blieb ihr Treiben ungehemmt, so mußte wohl die progressiv-ungeheure Vermehrung dieser Kräuter und Blätter fressenden Thiere die Erde nach und nach ihres heiteren Schmuckes, ihres vegetabilischen Reides berauben, vorzüglich in den Niederungen, welche diese Riesenheerden des Wassers wegen bewohnten. Die Schöpfung sollte sich aber mit ihnen nicht abschließen, denn noch fehlte ihr Schlußstein — der Mensch. Vorbereitende Glieder mußten deshalb vorausgehen, den Boden für ihn zu säubern, die ungeheure Vermehrung jener pflanzenfressenden Thiere wieder zu zügeln, und darum erschienen wohl zuerst jene Vießkäse, jene kräftigen Bären, jene rüchischen Hyänen und gewaltigen Raben, wie Löwen und Tiger, und unter Heerden von Füchsen und Wölfen auch ein gigantischer Hund, der den epirotischen Molossus an Größe wohl noch überstiegen. Solcher Verein von Kräften war aber nothwendig, für den Menschen das Terrain zu bereiten, ihm die bewachsenen, fruchtbaren Niederungen bewohnbar zu erhalten. Als aber endlich der Beherrscher der Erde selbst auftrat, fühlte er sich mit Vernunft begabt und mit Mitteln versehen, von jenen Räubern, die unbewußt ihm gedient hatten, und von Zeit zu Zeit, für ihn aber immer zu oft, noch ferner ihren Tribut holten, sich wieder befreien zu können. Auf diese Stufe hat sich der Mensch in allen von ihm cultivierten Ländern wirklich gestellt, und erkannte die Raubthiere als Geschöpfe, welche bei seinem Erscheinen ihre Rolle ausgespielt hatten, und er fühlte sich zum Vergeltter ihrer Thaten befähigt, zum Richter über das Gleichgewicht in der lebendigen Schöpfung. Wie weit der Mensch in Ausführung dieses seines Auftrages gebieten, das dürfen wir nicht unbekannt nennen, wenn wir wissen, daß Britannien seine Inseln von ihren Wölfsheerden gänzlich befreit hat. Auch Deutschland hat fast seine Bären und Wölfe vertilgt, und mit ihnen sind seine Entenbäre und Auerochsen zur äußersten Gränze geflohen; seine wilden Schweine, und die im Schweizerlande schon unbekannten Hirsche erscheinen im übrigen Deutschland bereits als Zwergbilder ihrer riesenartig kräftigen Voreltern, und Afrika, welches noch dem Julius Cäsar vierhundert männliche Löwen sendete, um sie zur Belustigung des römischen Volkes

im Circus kämpfen zu lassen, schafft jetzt vielleicht schwieriger so viele Löwen, als die Menagerien Europas enthalten, und deren Anzahl, so wie die der Tiger Bengalens, wird noch jährlich vermindert, da die Spur eines einzigen solchen Thieres Laufende von Menschen in Bewegung setzt, welche vor Verlangen brennen, den Triumph seiner Vertilgung zu feiern. Immer und überall weicht die kräftige Thierwelt dem sie feindlich verfolgenden Menschen, und schon im Leben des Einzelnen leidet oft die Erfahrung das Abnehmen der Arten und Individuen in Districten, in denen der Mensch seine Hütten gebaut hat. So sind die Däquien und Känguruh auf Neu-Holland schon nach der kurzen Ansiedlung der Engländer dießseits der blauen Gebirge kaum mehr zu finden, da deren lustige Jagden jene sonderbar hüpfenden Thiere vertilgten, und das Riesenelendthier lebte noch vor wenigen Jahrhunderten in Europa, ist aber denselben Weg gewandelt, den seit Menschengedenken die Dronten der Mascarenen, Nordafrika's Elephanten und die, Thessaliens bevölkernden Löwen genommen; nur die Urkunden ihrer Existenz beobachtet noch hier und da calcinirt und versteinert jener mütterlichen Boden, welcher uns dadurch die Geschichte ihres Erscheinens bezeugt.

In dieser Weise erfüllte sich aber auch hienieden im historischen Erscheinen der Organismen das Gegenwirken der Kräfte, das Gesetz des polaren Verhaltens in der Natur, das große Urgeßes, welches am tiefsten eingreift in alle Erscheinung in Form oder in Zeit, die Antithese als Bedingung stehend für die Erhaltung und Fortbildung der Welten, und dessen, was in ihnen ist. So wie nun aber die pflanzen- und fleischfressenden Thiere fortschreiten in ihren natürlichen Reihen zu solchen, welche, dann aus beyden Reichen der Natur ihre Nahrung aufzunehmen befähigt, auch in der Organisation ihres Geblüthes und ihrer Wärme die Eigenthümlichkeiten jener Antithesen wieder friedlich vereinen: so führt auch die Natur in der Aufzählung ihrer Formen alle ihre Gegensätze zur Synthese hin, und erreicht immer den Ruhepunkt in der Versöhnung des Differenten, was Anfangs sich feindlich bekämpfte.

Die größte und auf die Bearbeitung der ganzen Naturgeschichte unserer Zeit einflußreichste, von diesem Gesichtspunkte ausgegangene Entdeckung, die Anschauung der Metamorphose der Pflanze, verdankt unser Jahrhundert dem Ende des verfloßenen, und in Goethe's an sich unbedeutend scheinender Metamorphose der Pflanze liegt eine klare Andeutung jener gesetzlichen Folge der Entwicklung aller Formen und alles Lebens, durch Antithesen vermittelt, verborgen; in ihr jenes genetische Princip klarer erläutert, welches schon die Forschungen der Alten so glücklich geleitet, in der Folgezeit bey dem Bestreben, die Natur immer nur an ihrer vollendeten Seite fassen und nur Entdeckungen ohne klaren Zusammenhalt häufen zu wollen, wieder einschlummernd, aus dem Gesichtskreise einiger Forscher verschwand. Wunderbar ergoß sich dagegen für das allgemeine Bestreben, seit jenem Zeitpunkt einer Wiederbelebung der Metamorphose in Deutschland, durch Owen's schaffenden Geist für das Thierreich und durch Mees v. Efenbeck's tief empfundene, klar beleuchtende Forschung im Reiche der Pflanzen, über die Bahn der Naturgeschichte der organischen Wesen wieder jener Segen, welcher sie allein auf eine bewußte Weise zu ihrem Ziele dahinleitet. Denn nicht minder sprang ihre Wirksamkeit über aus ihrem zunächst ihre Wurzel fessellenden Boden in das verwandte Reich der frey beweglichen Thiere, in

deren Wirbelbildung die erste Analogie mit der sich gliedernden Pflanze erwachte. Die Entdeckung der Bedeutung der Schädelknochen und die Anerkennung einer höheren Potenzirung der Wirbelbildung in ihnen, gab das große Signal zur Umgestaltung der Zoötomie, für welche von da alle selbstfindende Geister, wie mit einem Zauberschlage durch das genetische Princip kräftig belebt wurden.

Einer der ersten, in denen es klar wurde, für Anordnung der ganzen Natur jenes obwaltende Princip der Genesis durchzuführen zu müssen, war unser Owen, dessen Riesengeist mit strenger Consequenz seine Natur schuf, und darin eben das für alle Zeiten unvergängliche Verdienst sich erwarb, daß er sich als Systematiker selbst bewußt wurde, ein in der Natur selbst liegendes, ihr Wesen klar abspiegelndes Princip für Classification befolgen zu müssen. Owen gab den ersten Anstoß für die neue Richtung der Zeit.

Seine Systematik wurde ein neuer Gegensatz gegen jene, ihre Abtheilungen isolirenden Gruppierungssysteme, indem in seiner Anschauung die Idee des organischen Fortwachsens hindurchging; er beherrschte wieder die Natur und gestaltete das höchste Individuum, um dieser Zerfällung entsprechend, das Ganze aus dem Einzelnen sich konstruirend, herauszuwachsen zu sehen. Owen war es, welcher den besseren Weg einschlug und durchführte. Er verließ die eingewohnte Sitte, von dem subjectiven Selbst ausgehend, sich herablassend, die Natur in ihre letzten Glieder zu verfolgen, wobei freilich der ermatete Geist diese letzten, schwächeren Productionen kaum noch zu beachten vermochte. Bey diesen niederen, einfachen Gebilden begann er, mit feischem Geiste das geheime Daseyn dieser Urthiere im Tropfen des belebenden Urelementes zu erforschen; von da aus vorwärts und immer nur vorwärts schreitend, gelangte er höher hinauf, und immer mehr dem Bekannten sich nähernd, bauten sich die Organismen der Thierwelt aus ihren Organen zu ihrem höchsten Vorbilde zusammen; aus der stufenweise entfalteten, treulich und vielfach geläuterten Metamorphose des Thieres, entstieg endlich, als Schlussstein der organischen Welt, der Mensch, und zeigte sich wieder als leidlicher Indbegriff der lebendigen Thierwelt. Der weitere Schritt zur Systematik der Natur, die Mitbeachtung von Seele und Geist, ist tief im Wesen dieses Principes der Steigerung bedungen; alles Walten im irdischen Leben beginnt als Resultat einer gleichzeitigen Zusammenwirkung von Körper und ursprünglich bewußtloser Seele; keines von beiden ist früher und keines folgt später, im Urmomente beide mit einander beginnend, und vom Einfachen beyde fortschreitend zur weitem Entwicklung in Raum und in Zeit, bis die Seele, durch das Leben im Reich der Antithese des Körpers, der Instincte und Triebe geläutert, zum höhern Leben einer Selbstständigkeit des Geistes gereift ist. Und was in dieser Sphäre der Systematik gelöst oder in ihr, als der göttlichen, vielmehr nur begehenden andeutend zu lösen versucht worden, das liegt gleichfalls vor in den zahlreichen Schriften geachteter Collegen.

Ich würde unbescheiden die hohe Versammlung ermüden, wollte ich davon einen Abriß geben, wie in der ganzen lebendigen Schöpfung formell und geistig jene Thesen sich beginnend gestalten; wie dann ihre Antithesen beschränkend und hemmend herintreten, und beide dann zur Synthese sich freundlich, und Höheres schaffend, versöhnen. Ich würde nur Bekanntes wiederholen, wollte ich darauf hinduten, wie jener arabischste

haben durch die Natur der Organismen sich hindurchschlingt, von dem wir glauben diesen, daß es jener sey, den der unsichtliche Linne schon geahnet, während er die wenig bedürfende, wenig verlangende Zeit einführt in ein künstlich geschaffenes Gebäude, um erst antitisch aus dem endlos scheinenden Chaos seiner Zeit eine vorbereitende Verkettung zu finden, welche sich unablässig und unausgesetzt an deren lebendiges Fortschreiten anknüpft, das er selbst in tieferer Seele verfolgt. Sie wurde dann durch Füssien und Cuvier subjectiver beherrscht, bis endlich die Metamorphose von Goethe eine klar objective Beschreibung leichter vermittelte.

Ein Blick in die Pflanzenwelt erläutert das Verketteten der Momente auch hier. Es ist uns bekannt, wie aus dem Staupilze, aus dem Urmus des Gewächskernes, und dem darum auch im Leben der Zeit immer und immer wieder als Moment neugeschaffenen und fortgebildeten Urkeime, durch Vermehrung seiner Hülsen ein inneres Gefüge ermöglicht wird, und endlich die Sphäre und der Punct hervortritt, alle aus den Segmenten der organischen Urkegel formell sich entfaltend, gefesselt noch im Erleben, auch hier das beginnende Moment der Existenz der höhern Pflanze, ihr Samenleben und Aufquellen noch vor der Bildung eines pflanzlichen Keimes, vorbereitend stabilisirend.

Dieser schlummernden Pilzwelt folgt dann der Flechten noch erdfarbig buntes Scheinblätterwesen; und pilznählich sich ausbreitend oder emporhebend, tritt diese Stufe noch weiter heraus aus der Beherrschung der Urkegel, wuchernd und nur in feuchter Atmosphäre lebend, in ihren Antithesen sich weiter entfaltend. Denn in ihrem Innern ist die Flechte der, die höhere Pflanzennatur schon schlummernd ahnende Pilz: denn jener Grünspross, welcher die höhere Pflanze belebt, entsteht in ihrem Innern, und so tritt die Flechte durch diesen ihren Typus zwischen die Pilze, und mit dem in ihr verborgenen Grün (als Empfängerkegel) wird sie zur Grünspross als vermittelnde Glied. Gleichwie aber im Leben des Menschen der Traum im Bereich der Ideenwelt oft eine wichtige Folge für Natur und Leben entwickelt: so mag auch dieser unbewußende Traum der Flechte, die Erscheinung der Knospung aus sich erwecken und durch die ganze Welt der Pflanzen hindurch sich ausbreitend weiter entfalten.

Diese innere Antithese gegen das einfache Pilzleben versteht sich jetzt mit dem Ganzen, und aus dieser Versöhnung erblüht uns das höhere Reich der grünen Pflanzen.

Es ist zuerst die Alge, welche das, seines Grüns sich bewußte Leben der Pflanze im Wasser beginnt. Sie breitet sich aus vor unsern Augen, wo wir in der Natur sie öffnen wollen, zum Schauen dessen, was uns umgibt. Wir gewahren eine große, herrliche Welt; wir staunen über die Mannigfaltigkeit in der Entwicklung eines Niederen zum Höheren, wenn wir sehen, wie diese anfänglich zarten Wassergewächse den idealen Punct in microscopischen Kugeln realisirend erschließen, Pilzfäden nachbilden, Gallertmassen wiederholen, als Diatomeen die frei bewegliche Thierwelt berühren, ja selbst in diese hinterschreiten, sich dann wieder wurzelartig zu zarten Gebilden entfalten, in der Verwahnung des Blattes sich gefallen, endlich, in Riesengestaltung auseinanderstrebend, die Meere beherrschen. Denn bald lassen sich überall, wo das Leben dieses eigenthümlichen Wassergewächses beginnt, im gleichartig schlummernden Grün jene microscopischen Kugel- und Spinzelgestalten, jene Fadengebilde

und Zweiglein kaum ahnen: bald bedecken sie hier mit schön grünem Filzteppich die Flächen unserer Wässer, den Spiegel der Landseen und Teiche; bald wandelt sich das bescheidene Grün in das herrlichste Roth, und mit Rosetten geziert, schmückt in Verhüllung einer Blüthe *Delesseria rhodantha* die die Insel Mauritius umgebende See; bald fluctuiren sie wieder dort in zwanzig und mehr Fuß Länge von der vielsarmigen Wurzel ausgehend und breiten Wänden gleich, als Laminarien umgürten sie die Schellen und Eisineln; bald erstreckt sich im nördlichen atlantischen Ocean *Chorda filum* zu einer Ausdehnung von 30—40 Fuß; bald vereint und verwirrt der Sargasso westlich von den canarischen Inseln, sich selbst zu schwimmenden Inseln von 160 Seemeilen verwickelnd und ausbreitend, durch welche die durch eine Alge besorgt gemachten Bescherer des stürmenden Oceans mit dem Weile sich Bahn hauen; bald endlich scheint im stillen Meere *Macrocyctis pyrifera*, selbst über die Macht des Elementes hinauszugreifen zu wollen, in Tausend Armen zur Länge von fünf hundert, ja fünfsechshundert Fuß von ihrem Ursprunge aus in die weite Umgebung dahinstrahelnd. Wer sollte aber nach einem solchen, obwohl nur flüchtigen Blicke auf die lebendigen Algen in seinem Enthusiasmus für die natürliche Beschreibung der Natur nicht überzeugt werden, daß solch eine Welt, solch eine großartige Pflanzennatur nicht in der Systematik herabstiege dürfte unter die noch träumende Flechte, tiefer als der noch im Erdgeiste schlummernde Pilz? — In der That, es scheint nur wenig natürliche Anschauungsgabe dazu zu gehören, in der Erscheinung dieser Algen, wie sie aus dem Einsinken herausfanden, wie sie in ihrem Sauerstoffleben endlich schon legal functionirt, das heitere Grün der höheren Pflanzennatur bereits offenerzig darbieten und in die höchste Färbung, die diesem Grün ungeschicklich zu folgen vermag, wieder es umbilden; in diesen lieblich friedlichen Algen, wie sie in ihrem ungeheuren Elemente in Zonen sich fortbildend, zu Licht und Luft immer höher emporsteigen, endlich das Ganze belebend beherrschen, oder wie sie in ihrer formellen Entfaltung überall austreifen, überall hinstielen, und wie sie, Höheres vorausbeutend, endlich in ihrem geistigen Zurfue an uns, in ihrer wohlgefalligen Schwärmerei uns fast zwingen, jene außerordentliche Ouverture zu hören, welche den Traum der Flechte zum pflanzlich-bewußten Wachen erweckt hat, die große, göttliche Harmonie des ganzen Gewächereiches zum ersten Male dem, für solche Musik empfänglichen Erdkreise verkündend.

Während so das grüne, höhere Pflanzenreich aus dem Wasser, als neue Thesis in der Alge erwache, so setzt sich als Antithese das Moos, zur Luftpflanze werdend, mit seinen Staubeinheiten zum ersten Male in der Pflanzenwelt ihr, der unweiblichen, knospenden Alge, männlich entgegen. Die reiche Entwicklung der Farnekräuter nimmt die Keimung und Knospung der Algen wieder auf, entfaltet sich in wunderbarer Wedigefaltung als Luftalge, und von einem Wurzelblattleben ausgehend, concentrirt sich das ganze Gebilde aus der Knospe und der ihr entgegengesetzten Antithese, in immer feilterer Abschweifung bis wieder zur Gewinnung einer centrischen Knospung und scheinbar schon doppelartigen Blüthe sich synthetisch verschönd.

Von hieraus beginnt ein Widen im Centrum der Pflanze, zuerst sich entfaltend aus der Urknospe der Spizkeimer: *Isotetes*. Aber der Knoten theilt sich und wiederholt sich, und Zwischenstücke dehnen als Glieder sich aus zum Stamme, und Schoben



als Blätterphantome entkeimen dem Knoten, und Männliches wieder gebiert sich aus und für sich; das Pistill und die Scheiden gewinnen ihr Ziel, und verkünden, in einer Blüthe endlich, nach dem Schwanken in der Zweyzahl, die Norm dieser Spizkeimer, im Uregeße der Drenzahl, die erste Gliederung zur Synthese, aus den Antithesen eines weiblichen und männlichen Principes verbindend geschaffen. So gestalten sich im Sumpfe die Laichkräuter, und so erheben aus ihm die Alismen und Aroideen und die Nymphen ihre Blüthen, bis die inbische Nelumbo ihre Frucht zum Throne des Amphas bereitet. Auf dem Lande aber wächst, unter diesem Gesetze der Natur klarer geworden, das Gras, und schafft uns die nordischen Wiesen; und aus demselben Gesetze der Drenzahl entblühen dem Süden seine Lilien und Schwertel, während die Tropen unter ihren Palmen erglänzen. Auch ihr Nachbild, die Frucht, verfolgt treulich der Blüthe Geses, und der Samen bewahrt bereits um den Keimling wieder den Urknoten, das Ureisig. So von dem, noch einmal ähnlich der Alge, im Wasser schwimmenden Seegrass, bis zur edlen Gerüßstille und Palme hinauf, steigert sich die Entfaltung der Organen-Elemente, welche die Classe der Spizkeimer geboten, und diese Palme, an äußerer Würde so reich, wie an Dauer und innerem Gehalte überlegen, stellt sich als Führerin der großen spizkeimenden Pflanzennatur Allem entgegen, was vor ihr gewesen und was nach ihr geworden; sie wird so die allgemeinste Antithese gegen die ganze Welt der Gewächse.

Neues Schaffen und Gestalten erwächst auf der neuen, größeren Bahn der blattkeimenden Pflanzenatur, nachdem das Blattgebilde in diesen Blattkeimern durch abfallende vollendete Blätter selbst zum Organe geworden, in dieser Weise sich ferngemacht und sich selbst einen Gegensatz durch sich, bey der Keimung, gestellt hat. Und was früher aus Knoten und unmittelbar anhängenden Scheiden geboren, das sehen wir von jetzt an Alles nur aus der jährlich sich neu erzeugenden Stammschicht entspringen, welche sich zuerst die Erythebenen bereitet; und die Knospen aus den Achseln der Blätter wirken wieder mit, die äußere Stammschicht immer neu sich zu schaffen, in dieser Weise eine Sphäre in der andern, eine für die andere alljährlich einander gegenseitig erweckend, lebend.

Aus niederen Anklängen an Algen und anderen da gewesen Formen bilden zuerst die Sonchlamideen, zweifelsumig noch, im einfachen Blattleben der Blüthe sich fort aus den niederen Gestalten der Hornblattgewächse und Varräpae, Equiseten, Cyressen und Nadelbäume, durch Röhrenblüthen und Nesseln bis zum edlen Lorbeer- und Zimmerbaum.

Die Blumenkrone tritt dann auf, Anfangs nur als einfaches, inneres und zarteres Nachbild des Kelches, und aus den niederen Formen der Scabiosen und Syngenesiten beginnend, veredelt der Typus der Synpetalen sich fort, bis in die vielgestaltigen Formen der Heidegewächse und Sapotaceen.

Die Blumenkrone folgt aber dem Rufe der männlichen Sphäre, und mehrblättrig sich theilend, strebt sie hinaus über die Tendenz des immer mehr mit der Frucht verschmelzenden, sie selbst noch fesselnden Kelches. Diese Kelchblüthigen Pflanzen, aus den Dolden und schmetterlingsblüthigen Gewächsen geschaffen, durchlaufen ihre Reihen durch Cactusgewächse und Rosen, und finden ihren endlichen Abschluß als Umbellaceen und Melastomen abermals in der tropischen Welt.

Die Frucht ist aber der Endzweck des pflanzlichen Lebens; sie muß sich befreien, und, frey von allen umgebenden Reissen, selbstständig sich durchbilden: so will es die Idee der Pflanzenatur, denn die Frucht ist wieder die Verschmelzung oder Synthese, für die thetisch weibliche und antithetisch männliche Sphäre. Die in sich am höchsten vollendete, freye Frucht der Drange bestimmt die höchste Gruppe der Pflanzen.

Wie hier aber anatomisch und morphologisch die Momente in einander greifend sich steigern, so steigert sich auch physiologisch das Fortschreiten der Dauer von einjährigen Kräutern und von Stauden zu Sträuchern und tausendjährigen Bäumen; so steigert sich dann der Gehalt an Stoffen, an Gummen und Harzen und ätherischen Oelen; so steigert sich endlich die Verbreitung von der nördlichen Erde bis hin unter den tropischen Himmel, Alles einem einzigen Canon folgend, den ich im verflochtenen Jahre in unserer Versammlung in Jena zu entwickeln mir vorläufig erlaube habe\*.

Ähnliche Beziehungen einer organischen Steigerung, nach bestimmten Gesetzen materieller und geistiger Entwicklung, bieten wieder die Classen im Reiche der Thiere. So wie es scheint, daß in diesem Reiche der Empfindung und Bewegung die in sich selbst und in der Thieridee noch am tiefsten schlummernden, in dem von ihnen bewohnten, ihnen wirthlichen Organismus geborenen, und so im äußeren Weltbewußtseyn gehemmten oder stabilisirten Eingeweidewürmer, eben darum, weil sie die tiefsten in der Natur der Thierseele sind, auch nur von den Spermatozoen und Hydatiden naturgemäß beginnen, da diese eben nur Nebenprodukte des Reproductions-Systems eines höheren Organismus sind, durch die sich ausschließenden Reihen hindurch, sich dann weiter als Entozoen höher entfalten: so tritt als zweytes Moment in der Bildung das Heer der Mollusken erst wirklich heraus in die Welt, und im Urelemente des Wassers, wie dort im Pflanzenreiche die Alge, wird hier das, Anfangs auf den Corallenstamm vegetabilisch fixirte, blumenartig centrisch gestaltete Thier mit seiner gehemmten Willkür geboren; indem die übrigen Strahlthiere, ein höheres Thierleben träumend, von den Fesseln sich frey machen. In jenen Entozoen, welche der Mensch in sich selbst trägt, waltet nur das tiefere vegetabilische, in der Fortbildung der Organisation als das tiefste bedingende, sexuelle Princip vor, theils unweiblich ohne Befruchtung durch Ureer und vegetabilische Theilung sich vermehrend, dann hermaphroditisch, dann endlich mit sexueller Antithese männlich und weiblich, so schon hier anders als im Reiche der Pflanzen sich anreihend, im Canon der animalischen Sphäre gegliedert.

Die Mollusken wiederholen diese Entfaltung des ersten, auf die Forturgung in der Zeit berechneten organischen Systems, und vollenden ein zweytes, bereits in seiner Einfachheit bey den Entozoen angedeutetes System der Verdauung, zum ersten Male durch die Antithese eines Magens, noch weiter. Hier und da deutet schon auf den Stufen der Mollusken eine Metamorphose in der Entwicklung des Ganzen auf ein Streben nach höherer Gestaltung, und in dieser Metamorphose das

\* Handbuch des natürlichen Pflanzensystems — enthaltend eine vollständige Charakteristik und Ausführung der natürlichen Verwandtschaften der Pflanzen. Dresden u. Leipzig, bey Arnold. 1837.

Niedere wiederholend, ja sogar als Schalthiere in der Jugend erscheinend, und manche Gattung der Gastropoden nach einem Verlassen der Schale zur freyen Willkür werdend, wie Sars durch seine schönen Beobachtungen, die er am Strande der Nordsee gemacht, uns überraschend belehrt hat.

Die Gliederthiere beginnen, und auch in ihnen ist die Metamorphose des Individuums bestimmend für die Gliederung des Systems; allgemeiner erkennt man jetzt die Anneliden, Renäen, Crustaceen und Arachniden innig an einander sich anschließen. Bey allen ist das Hautsystem als klar geordneter Gegensatz gegen den Darmkanal durchgebildet und fähig geworden, das Phänomen der Häutung vermitteln zu können. Die Athmung durch Stigmen ist das höchste, was die Classe der Vielgelenkthiere in den Affen und Arachniden erlangt.

Dasselbe wunderbare Ereigniß, meist mit Formveränderung, begleitet uns durch die Classe der Insecten, deren sinnliche Wahrnehmung mit der freyeren Willkür im Einklang, diese Luftgeschöpfe auf die höchste Stufe der wirbellosen Thiere erhebt.

Wie bey den mit Wirbeln versehenen Thieren jenes System des fernellen Verhältnisses in den Fischen wieder vorwaltet und ein Zurückdrängen der übrigen Systeme, das ganze Thier als Repräsentant einer Durchbildung der Sexualität wieder erscheint; wie dann die Amphibien aus der Fischnatur im Vorwalten eines Verdauungssystems sich hinausbilden, der Vogel als das höchste Respirationsthier alles Gestalten und Leben auf die Function der Athmung bezieht, das Säugethier endlich, in der höchsten Harmonie sinnlicher Wahrnehmung Leib und Seele vollendet, das liegt zu nahe, um hier weiter verhärt werden zu können.

Wenn aber auch alle Ordnungen in den Classen jenen Hauptmomenten der Classen selbst entsprechen müssen, in diesen wieder die Familien die Gliederung der Ordnungen andeuten sollen, so tritt zunächst die Frage ein: was die natürliche Familie sey, oder was sie sagen solle.

Man hat sich bey deren Bestimmung vielleicht bisweilen zu sehr an einzelne Momente gehalten. Fleißige Zootomen verfolgten z. B. die Auffuchung des merkwürdigen Singmuskelsapparates in der Classe der Vögel, ihn als Character für die Singvögel bestimmend. Sie fanden denselben Apparat bey den Schwalben, und Systematiker nahmen die Schwalben unter die Singvögel auf. Die Singmuskeln fehlen aber den Mauer- und Nachtschwalben, und dieselben Systematiker sahen sich um des von ihnen umschriebenen Characters willen genöthigt, diese von den übrigen Schwalben als gesonderte Familie trennen zu müssen. So zerstreut sich aber hier, wie in Tausenden von Beispielen, die innigste, in der Natur unzerrennlichste Verwandtschaft, wo man verkennt, daß die Natur ihr natürliches Verwandtes nur durch Entwicklung eines Typus verbindet, und daß jeder Character innerhalb der Gränzen seiner Stufen sich erst entfaltet, und wie er oft schon im Niedern sich andeutet, in höheren Familien dann sich wiederholt. Eine natürliche Familie in beyden organischen Reichen, aus diesem Principe gewonnen, erscheint uns dann als ein von der Natur selbst gegebenes Object; sie ist nicht mehr das ideale Product einer individuellen Anschauung, sondern dessen, was nothwendig in ihr und wirklich so ist; nicht dessen, was wir aus der Natur uns gemacht haben, wenn sie, die natürliche Familie, auftritt:

als ein Aggregat von Gattungen, welches durch den Zusammenhang in sich einen Typus durchbildet, welcher durch den Zusammenhang des Ganzen als ein dem Entwicklungsgange dieses Ganzen entsprechendes Glied bedingt ist.

Schon aus der Vergangenheit leuchtet uns diese Wahrheit entgegen: aber die Wahrheit ist's wieder, die wir in der Gegenwart suchen, und der wir selbst uns, so lange unser Tag währt, wieder widmen. Aber die Wege, auf denen wir sie suchen, sind verschieden, und eben so verschieden die Resultate, die wir finden und als Wahrheit erfassen. So wird auch für alle Zeiten, so wie die Wissenschaft in ihrem Laufe sich gestaltet hat, 1) einfache, treue Beobachtung des Einzelnen, 2) künstliche Classification nach unbedingten Characteren, den innern, tieferen Zusammenhang der Natur aufweisend, 3) endlich: die Reflexion über die in der Erscheinungsweise des Ganzen bedingene Gliederung und Gruppierung des Einzelnen, Hand in Hand parallel fortwandelnd, und das alte Gesetz der Polarität, auch sogar im Wirken der Naturforscher fortkriechend, so wie zu allen Zeiten sich dasselbe bewährt hat im Schaffen, im Gestalten und Leben in der Natur selbst.

Von der Wichtigkeit solcher Anschauung der Naturforschung unserer Zeit und von der Wichtigkeit und Unentbehrlichkeit der dritten reflectirenden Richtung für eine klarere Systematik der Natur, insbesondere für Erläuterung mit factischer Lehre unserer practischen Studien, von der Lehre insbesondere, wie die Formen und Stoffe in rein natürlich verwandten Pflanzen und Thieren sich fortbilden, und wie nun die anatomischen, physiologischen und morphologischen Charactere zur Hervorbringung einer Methode sich innig vereinen, überzeugt, wagte ich es, diese Worte vor Ihnen zu sprechen. Ich that dies aber hier in Prag mit um so freudigerem Gemüthe, als diese Anschauungsweise in dieser ehrwürdigen Stadt schon seit lange theilnehmend geachtet, und bis in die formelle Exposition der natürlichen Verwandtschaften in den Museen und in der lebendigen Natur im botanischen Garten der Universität ihren Anflang gefunden. Die großen botanischen Arbeiten eines Krombholz, Kosteletzky, Presl, Corda und Tausch folgen alle dem vom Schöpfer einer Flora der Vornwelt gegebenen Vorbilde, jener practisch treffenden Anschauungsweise aus dem Gesichtspuncte des genetischen Principes, wie es uns Goethe gelehrt hat; sie alle geben die große Natur objectiv; sie folgen eben so wie die tief eindringenden zootomischen Vorträge, welche wir hörten, diesem genetischen practischen Wege zur Wahrheit.

Folgt ein Verzeichniß von 79 eingegangenen Schriften.

Darauf hielt der zweite Geschäftsführer, Professor von Krombholz folgende Abschiedsrede:

Sitte und Neigung fordern mich auf, am Schlusse der gemeinschaftlichen Verhandlungen das Wort zu ergreifen, um all den Verehrungswürdigen, welche aus der Ferne unserer Einladung freundlich entgegen gekommen, so im eigenen als im Namen meiner Collegen und Mitbürger, den Tribut froher Erkenntlichkeit, aufrichtiger Hochachtung, und vertrauensvoller Freundschaft darzubringen.

Ermögen wir, wie viel des Guten im Gebiete der nützlichsten Forschung durch diese Ihre wohlwollende Annäherung,



durch Ihr belehrend Wort, durch Ihren bibelnden Umgang für uns angeregt und gewonnen ist, so daß Sie überdies die Mühe einer beschwerlichen Reise, eines unbequemen Aufenthaltes nicht scheuten haben, um sich uns zu befeunden: so wird es uns zur Pflicht, Ihnen, Hochschätzbarste! den wärmsten Dank aus vollem Herzen auszusprechen.

Wenn wir überdies erwägen, daß nur unbedeutend die Gegengabe wissenschaftlicher Aufklärungen sey, welche Sie von uns für so manches Opfer, das Sie diesem Besuche gebracht, mitnehmen könnten — da mehrere unserer wichtigsten Institute, unserer nützlichsten naturhistorischen und medicinischen Sammlungen, theils erst im Entstehen, oder doch in sehr jugendlichem Wachsthum begriffen sind, theils einer gänzlichen Umgestaltung und einem zweckmäßigen Umbau ihrer Localitäten entgegenstehen, — erwägen wir, daß demnach die Anstalten noch nicht viel des Interessanten (wenigstens in ihrer gegenwärtigen Verfassung) dem Kenner bieten mochten: so können wir nicht umhin, Ihre schonende Güte, Ihre freundschaftliche Rücksicht dafür anzusuchen.

Sollten Sie sich also vorläufig bewogen finden, uns das Zeugnis des guten Willens, des aufrichtigen Emporstrebens zu dem Bessern zu geben: dann werden wir alle aufstehen, die Geschäftsleiter aber, welche Ihrer Rücksicht von Amtswegen doppelt bedurften, sehr beruhigt seyn.

Möchte es mir vergönnt seyn, bey dieser Gelegenheit der kräftigen Einwirkung Sr. Excellenz, des Herrn Grafen von Sternberg, welcher das Ganze gelenkt, dankbar zu gedenken, und öffentlich zu erklären, daß ohne seine Förderung, ohne die gefällige Verrückung meines Freundes, Professor Kozielecky, ohne die ausgezeichnete Gewandtheit, Emsicht und Sorgfalt der uns von Seiten der löblichen Behörden beigegebenen Beamten, es mir unmöglich gewesen wäre, den vielseitigen Verpflichtungen eines Geschäftsleiters nur einigermaßen zu genügen.

So angenehm uns indeß die Erfüllung dieser Dankespflicht vorkam, und so innig wir auch das Ehrenvolle des Besuchs so ausgezeichneten Gelehrten zu schätzen wissen, die wir zugleich als Freunde lieb gewonnen; so hoffen wir zugleich, daß Ihre Humanität uns jeden weitem Ausdruck, den die Trennung von so viel verehrten Gästen in uns hervorruft, hier freundlich erlassen werde!

Mögen Sie denn, verehrteste Freunde! im Genuß unverkümmerten Wohlseyns Ihre heimatlichen Gauen erreichen, und noch lange zum Segen der Menschheit den fruchtbaren Samen Ihrer wissenschaftlichen Forschung austreuen!

Mögen Sie sich auch späterhin Ihrer hiesigen Verehrer und Freunde mit Zuneigung erinnern, denen Ihr Andenken unvergänglich genorden! Mögen Sie endlich auch auf unsere Collegen, welche in der Folge etwa in Ihrer Nähe gelangen dürften, durch freundlichen Rath, durch gütige Belehrung den erwärmenden Strahl Ihres bieder Wohlthuns fortwirken lassen, das so ganz unsere Neigung und Freundschaft für immer gewonnen hat!

Darauf sprach Prof. Nöggerath aus Bonn den Dank aus:

Hochgeborner Herr Oberstburggraf!

Hochverehrte Autoritäten des Landes und der Stadt, würdiggste Vorsteher, unsere Mitgenossen und lieben Freunde!

So nahez die Stunde, wo wir, Jeglicher seinem Berufe folgend, Prag verlassen, zur Heimath zurückkehren sollen, — und mir, als jüngstem anwesenden, vorzeitigem zweiten Vorsteher dieser Gesellschaft, liegt die angenehme Pflicht ob, die Gefühle an diesem Orte auszusprechen, welche die Mitglieder beim Scheiden empfinden. Eine schöne süße Pflicht, deren Erfüllung die angenehmste Wirksamkeit meines hiesigen Aufenthaltes ist, die aber zugleich eben so schwer mir wird; da ich nicht entfernt zu erreichen vermag, ihren großen Umfang im Sinne aller meiner Comittenten zu erfassen, weil mir die Gewandtheit der Rede mangelt, die zahlreichen Fäden tiefer Empfindungen aus eines jeden Einzelnen Brust und Herz zum mächtig sich ergießenden Strome zu sammeln.

Seine Majestät der hochberzige Kaiser Ferdinand vernahm, durch das Organ unserer verehrten Herren Vorsteher, nicht allein willfährig unsern Wunsch, zum zweiten Male uns in Seinem Staate versammeln zu dürfen; sondern großmüthig als Schlichter und Schlichter der Wissenschaften, bewilligte Er die Mittel, welche das Unternehmen erleichtern, begünstigen, zur großartigsten Ausführung fördern möchten. Der Landeschef Böhmens, Seine Excellenz der Herr Oberstburggraf, Graf v. Chotek, den Prag und ganz Böhmen als den wirksamsten, einheitsvollen, humanen Beförderer alles Guten, Schönen und Nützlichen mit so großem Rechte rühmen, war in seiner umfassenden Sphäre ersorgvoll bemüht, die Erreichung unserer Zwecke vorzubereiten, und nachhaltig dafür thätig zu seyn; Er nahm uns allesamt in seinem Hause auf, wohnte selbst als Kenner und Freund der Naturforschung unsern allgemeinen und besondern Versammlungen bey. Und die hohen Behörden des Königreiches und der Stadt, alle folgten nicht bloß aus Pflichtgefühl, sondern aus innerem Impuls, aus Anhänglichkeit für die Sache, dem schönen Vespiele ihres Chefs. Die Vorsteher unserer Gesellschaft, der im Leben und in der Wissenschaft hochgestellte Altmeister der Naturforscher, Herr Graf von Sternberg, und der verdienstvolle Priester Aeskulaps, Herr Professor von Kromholz, aus vieljähriger eigener Erfahrung bekannt mit demjenigen, was eine Versammlung wie die unsrige, an äußerer und örtlicher wissenschaftlicher Zuthat zur Erreichung tieferer Einsicht in die Natur bedarf, ließen während des Laufs eines ganzen Jahres es nicht fehlen an Vorbereitungen und Bemühungen einer jeden Art, um uns den Weg zu bahnen, das leisten zu können, was die Zeit und unsere intellectuellen Kräfte zu leisten vermögen. Letzterer unterzog sich sogar der Mühe, unter Verrückung hochkundiger Männer ein nützlich und anziehendes Werk auszuarbeiten, welches durch Gutterbergs wohlthätige Erfindung vervielfältigt, uns in Prag als Wegweiser und Leitfaden bey unserm hiesigen Aufenthalte diente. Die Stadt Prag ließ uns ein schönes ehernes Gedenkzeichen prägen, das uns immer, und unsern Enkeln noch eine freundliche Erinnerung der Tage seyn wird, welche wir genussreich in der Wissenschaft, wie im Leben, in ihren Mauern zubrachten. Und der allehrwürdige Kaufmannsstand der Geygenhauptsstadt gab uns seine Theilnahme an unsern Bestrebungen zu erkennen durch einen prächtigen Ball, der unserm Auge das schönste der Natur, die Frauen und Jungfrauen zeigte, die Frauen und Jungfrauen Prags, von längst

her, unter allen Deutschen gerühmt, durch edle Gestalt und Anmuth, welche hier noch der anziehende deutsche Tanz erhöhte. Selbst der Kaiser erzeugte uns die hohe Gnade, durch Seinen höchst stehenden Wortführer uns in sein Haus einzuladen, und Namens Seiner uns auf das Gastliche und Kostbarste bewirtheten zu lassen. Und liberal wurden wir von den Einwohnern Prags, uns persönlich oder wissenschaftlich befreundet oder nicht, mit gleicher Zuversichtlichkeit und Gastlichkeit empfangen, aufgenommen, bewirthet. Der wissenschaftliche Genuß, der uns in Prag, von Prag aus, eben so freundlich dargeboten wurde, war von keinem geringen Umfange. Die Universität, berühmt durch ihr hohes Alter, durch großartige Leistungen in manchen Perioden ihres langen Daseyns, durch die Universitäten Leipzig, Ingolstadt und Rostock, deren Mutter sie war, durch die zahlreichen bedeutenden Namen, die hier lehrend wirkten, durch ihr erfolgreiches Streben der heutigen Zeit, stellte uns in Personen und Sachen, in ihren zahlreichen Instituten, Sammlungen und Bibliotheken, so viel Belehrendes, Beschauendes und Untersuchungsverwerthes dar, daß leider die kurze uns zu Gebote gestandene Zeit nicht entfernt hinreichen konnte, den Nutzen daraus zu ziehen, der bey der großen Liberalität, womit einladend die Zugänglichkeit bereitet war, in größerer Maße davon zu ziehen stand. Das großartige schöne Institut des vaterländischen Museums, dessen Präsident auch unser allverehrter Präsident ist, welches im Laufe weniger Jahre, durch die Freigebigkeit, die Einsicht und umfangreichen Kenntnisse seines Vorsitzenden und anderer Vaterlandsfreunde zu einer bewundernswürthen Vollständigkeit herangewachsen ist, lieferte unsern Forschungen das reichste, ein unerschöpfliches Feld. Die zahlreichen, praktisch nützlichen Anstalten, der ausübenden Heilkunde ganz oder theilweise angehörig: das allgemeine Krankenhaus, das Gebärhaus, die Strafanstalt, das Irrenhaus, das Sienchenhaus, die Taubstummenanstalt, und andere, die ich aus meinem abgeforderten Standpunkte nicht alle zu nennen weiß, waren uns geöffnet, und boten unsern Mitgliebern das reichste Feld der Beobachtung, der Untersuchung, das Beispiel zur Vorbereitung in andern Theilen des weiten deutschen Landes dar. Die reichen und prächtigen Gärten, begünstigt von einem ganz vortheilhaften Klima, und von den Besitzern uns freundlichst aufgeschlossen, gewährten köstlichen Genuß für Botanik und Geschmack.

Auch die Genüsse der Kunst wurden uns dargeboten in mehr als einer Form; Gemäldesammlungen von großer Bedeutung waren uns zugänglich, die Musik, von jeder heimisch auf böhmischen Boden, war unsrer freundliche Geleiterin an allen Orten, welche dem Leben, und nicht bloß der Wissenschaft bestimmt waren.

Der unssterbliche Mozart wirkte täglich wirkend in unsrer Nähe; den weiß Prag zu ehren und zu würdigen, wie keine Stadt in der Welt. Aber auch Beethoven, egoistisch mag ich es aussprechen, mein nächster Landemann, findet hier eben so sehr und seine würdig zahlreiche Pfister und Verehrer. Es möge mir erlassen seyn, als das noch zu nennen, was uns hier noch dargeboten wurde in Liebe und Freundschaftsleiste. Es ist zu viel, um es mit Einem Witz, der hier nur verquäht seyn kann, zu überschauen. Das ergriffene, von dem großen Eindrücke hingezogene Gemüth vermag es nicht, in anatomische Zerlegung des zahllosen Großen, Guten und Schönen einzugehen: dazu bedarf es der ruhigen Recapitulation in der heimatlichen Stube. Herzujubeln, was wir dagegen für die

Wissenschaft gethan und gewirkt haben im innern Kreise unsrer Thätigkeit, dürfen wir nicht wagen. Möge die Versicherung genügen, daß jeder nach Kraft und Lage sein Schätzflein beizutragen hat zur nähern Kenntniß der Natur, ihrer Producte und Kräfte. Ob das Bestreben erfolgvoll war, kann die Zeit nur lehren, und wenn die nächste dieß auch nicht überall in großen schlagenden Resultaten zu erkennen gibt, so möge Größe des Gesamtbaues ins Auge gefaßt werden, den wir unternommen, an dem der Aufbau der einzelnen Steine nicht sobald erkennbar seyn kann, und daß Vieles nur von uns empfangende Keime sind, welche lange Zeiträume erfordern mögen, ehe sie sich der Welt, in ihrer Nutzbarkeit ausgebildet, darstellen können. So vermögen wir denn unsere Anerkennung des hier Geleisteten nicht durch den Werth unsrer Leistungen zur Stelle zu bekräftigen, und schwer wird es mir daher, den Ausdruck des Dankes zu finden für so Vieles und Alles, was uns in der alten Praga dargeboten wurde, was für und an uns geschehen ist. Eine viel bereitere Zunge wünschte ich dazu mit einer laut sprechenden Stimme vereinigen zu können. Zunächst Dank, den allerunterthänigsten und aus des Herzens Fülle dargebrachten, Sr. Majestät dem hochverherrlichen Kaiser und König Ferdinand ab für die vielseitige Beförderung unsers anspruchlosen Wirkens! Möge der Allmächtige Ihm und Seiner Allerhöchsten Familie dafür Gesundheit und Wohlergehen auf lange, lange Jahre verleihen, — möge Sein väterlicher Scepter noch viele Decennien das Land regieren, welches unter Ihm in vollem Maße sich glücklich fühlt, — möge Sein glorieiches Haus wachsen und gedeihen immerdar! Dann fernher, Dank den gehusamsten und innigsten, dem hochgeachteten Herrn Oberburggrafen von Böhmen, für die großen Aufopferungen jeder Art, welche er der Gesellschaft dargebracht hat; möge er sich lange der fortwährenden, ihm so gerne vom In- und Auslande gesellten Anerkennung erfreuen, die sein rastloses, erfolgvolles, nützliches Streben schuf.

Weitern Dank den hohen Behörden des Landes, die, wirkend zum Zwecke, sich an den hochverehrten Chef anschließen; Dank der alten Praga und selbst ihren Autoritäten mit der Versicherung, daß in unsern Herzen noch tiefer das freundliche Andenken an die Stadt eingepreßt steht, als das Rathhaus auf der uns gewehnten Medaille im ehernen Relief sich erhebt. Möge die Stadt, welche im Laufe der Zeiten die furchtbarsten Schicksale zu bestehen hatte, sich fernerhin immerdar der genussreichsten Ruhe erfreuen. — Dank der Universität, Ihren Lehrern und Institutsvorstehern allen, für die zahlreichen Bemühungen, für die freundliche Begegnung und Aufnahme, welche uns durch sie zu Theil ward. Möge die Hochschule armen und blühen noch Jahrhunderte lang, noch länger lebendig frisch in der Geschichte vorwärts schauen, als sie derselben bereits angehört.

Dank allen Vorsehern und Besitzern von Instituten, Sammlungen, Bibliotheken jeder Art, welche uns zugänglich waren, deren Beschauung und Benutzung wir uns zu erfreuen hatten. Immer vorwärts! des alten Wüthers Wahlrecht ist es, den wir als Wunsch für euch aussprechen wollen. — Dank dem allverehrlichen Kaufmannsstande Prags für die liebreich freundliche Bewirthung in Trepischorens Tempel. Möchten unsere Bestrebungen mit dahin führen, Erfindungen zu erzeugen, welche den Gewerbs- und Handelsstand bestärken können; möchte die Blüthe davon dem Kaufmannsstande dieser Stadt als Lohn seiner Gastlichkeit zu Theil werden. — Dank allen biedern Bewohnern der von Klüßla gegründeten Stadt, die uns freundlich aufnahm und beherbergte.

Den zartesten Dank Euch, den edlen Frauen und Jungfrauen Prag, für die freundlichen Blicke, mit denen Ihr die fremden Männer begrüßt habt, und deren Aufenthalt in hiesiger Stadt Ihr aufs Freundlichste gestalten halfst. Euch ergebe es wohl im Kreise glücklicher Familien; uns bleibt nur das Bedauern, nicht länger Zeuge der Anmuth seyn zu können, womit Ihr Euerer Umgebung zu beglücken gewohnt seyd.

Und endlich bleibt mir hiemit auch übrig, gegen zwei Männer einen ganz besonderen Dank auszusprechen, ungeachtet sie selbst zu den Unsrigen gehören, und uns in wissenschaftlicher Beziehung enge verbunden sind. Namen brauchte ich in der That nicht zu nennen, wenn es gilt, die Beiden zu bezeichnen, welche wahres Hochverdienst um unsere Versammlung in Prag sich erworben haben. Dir, Graf Sternberg! Dir, Du Schöpfer der Flora subterranea; Du Eingeweihter ersten Ranges in die Fülle der Mythen der Natur, Dir, auf den wir eben so stolz sind, als Böhmen mit vollgegründetem Rechte. Deinen höheren Patriotismus hoch verehrt, Dir sey der Wunsch geweist, daß Dir noch viele Jahre das Glück blühen möge, der innig Vertraute der Natur zu seyn; denn Dir bekennst sie Geheimnisse, welche Jahraufenden der dichteste Schleier verbirgt. Genehmige das persönlich Wohlwollende dieses Wunsches und verzeihe den Egoismus in ihm, da die Verwirklichung uns und der ganzen Menschheit den größten Genuß bringt. Aber der Gedanke an Graf Sternberg läßt sich von dem an tüchtige erfolgreiche Naturforschung nicht trennen. Möge die notwendige Combination Jahrhunderte lang noch im Gedächtnisse unserer Nachkommen verbleiben!

Dank Dir, Du verdienter Hochlehrer von Krombholz, Erreue auch Du noch lange die Welt mit dem Worte deiner Lehre, geschöpft aus gereifter Erfahrung; fahre eben so fort, der Menschheit Leiden erfolgvoll zu heilen, erreue Dich des Segens deiner Familie. Doch die Worte verstummen in der Tiefe der Empfindungen; erläßt uns Ferneres, Ihr hochgeehrten Männer; beyde erkennt des Gefühles Macht in den Wogen unserer Herzen. Aber schon zuckt der Stundenweiser, um den Augenblick des Abschiedes anzudeuten. So lebt denn wohl, Ihr Männer, Ihr Frauen und Jungfrauen insgesamt, die Ihr uns wohlthutet in Prag. Wehmuthsvoll werden unsere Blicke nach der Mielguthürten gerichtet bleiben, bis sie ihnen einschwindet, und dann bleibt noch das Ankenken auch immer an Euch. Auch wir Wissenschaftsgenossen und Freunde vertheilen uns nach allen Divergenzen der Compakrose. Jedem von Jedem einen deutschen Händedruck beim Scheiden! Nach Jahresfrist treten wir wieder zusammen nahe dem Strande des Baters Rhein, dort, wo sich mein liebes Siebengebirge im stättlichen Kaiserstuhl wiederholt. Frey ist die Burg, die wir beziehen wollen, frey für unsere Gewerbe — für Forschungen und Ermittlungen der Wahrheit im schuldlosen Wiefen der allmächtigen Isis. Möge dann kein theures Haupt fehlen, uns vom unerbittlichen Tod entrißen. An das Schöne unserer Versammlungen vom Jahre 1837 knüpfe sich der Anfang für 1838 wieder an.

Aber Eins noch beym Schlusse, liebe Freunde! lasset mir mit leben hoch den hochherzigen Kaiser, König Ferdinand, und zum zweyten Male hoch, und zum dritten Male hoch!!!

## Sitzungen der Fachabtheilungen.

### I. Physikalische Abtheilung.

Von 9—11 Uhr.

Secretär: Prof. Hefler zu Prag.

Erste Sitzung am 19. September.

- 1) Dr. Schimko aus Olmütz, über Astronomisches.
- 2) Dr. Möbler aus Berlin, über die physische Beschaffenheit des Mondes.

Zweyte Sitzung am 20. September.

- 3) Derselbe, über Lohrmanns und seine eigene Mondkarte.
- 4) Prof. v. Ettingshausen aus Wien, über die Einrichtung und den Gebrauch der magneto-electrischen Maschine. Taf. V.

Faraday's glänzende Entdeckungen im Gebiete der Electricitätslehre, welche seit dem Jahre 1832 die Aufmerksamkeit der Freunde der Physik im hohen Grade in Anspruch nehmen, haben nicht bloß den Schatz der an das Tageslicht geförderten Thatfachen vermehrt, sondern zugleich neue und unerwartete Hülfsmittel zur Erzeugung electricischer Ströme eröffnet.

Unter diesen Hülfsmitteln behauptet, in Hinsicht auf die Bequemlichkeit und Sicherheit, mit welcher sich electricische Ströme hervorbringen lassen, wie auch rücksichtlich der Größe des Effectes, die Einwirkung eines Magnets auf einen geschlossenen Electricitätsleiter unstreitig den vorzüglichsten Rang. Die Form, unter welcher das so eben genannte Hülfsmittel ins Werk gesetzt werden kann, läßt sich mannichfaltig abändern; wir wollen uns hier lediglich auf die Angabe derjenigen beschränken, welche der Einrichtung der zu beschreibenden magneto-electrischen Maschine unmittelbar zum Grunde liegt.

Wenn man ein Stück weichen Eisens von solchen Dimensionen, daß es als Anker eines hufeisenförmigen Stahlmagnets dienen kann, mit Kupferdraht, welcher mit Seide überspannen ist, in gedrähten Lagen schraubenförmig umwickelt, und die Enden der so entstandenen Drahtspirale, deren Windungen unter einander und von dem weichen Eisen durch den Seidenüberzug isolirend getrennt sind, mit den Zuleitungsdrähten eines so weit entfernten Galvanometers oder Multipliers, daß der Hufeisenmagnet auf die Nabel desselben nicht merklich einzuwirken vermag, in leitende Verbindung bringt; so gibt sich in dem Augenblicke, in welchem der Anker an den Magnet angelegt, wie auch in jenem, in welchem der Anker von dem Magnete getrennt wird, jedesmal das Auftreten eines electricischen Stromes zu erkennen. Diese Ströme sind von sehr kurzer Dauer, denn, läßt man den Anker an dem Magnete unverrückt liegen, so findet man an der Galvanometernadel nach dem bey dem Anlegen des Ankers erfolgten ersten Ausfalle derselben keine Andeutung der Fortdauer des electricischen Stromes, da dieselbe nach Beendigung der gewöhnlichen Anzahl Schwingungen in ihre ursprüngliche Gleichgewichtslage zurückkehrt. Ein Gleiches zeigt sich auch nach der Trennung des Ankers von dem Magnete. Allein die Richtung des electricischen Stromes, welcher bey der Annäherung des Ankers an den Magnet in der Drahtspirale entsteht, ist, wie man aus der Beobachtung sieht, nach welches die

Galvanometernadel abgelenkt wird, der Richtung des Stromes, welcher bey der Entfernung des Ankers vom Magnete sich einstellt, entgegengefest. Der Beschaffenheit nach sind die electricischen Ströme benjennigen ähnlich, welche durch Voltaische Apparate erhalten werden. Sieht man nun als Richtung des electricischen Stromes in einem gewöhnlichen geschlossenen Voltaischen Elemente, im Einklange mit dem herrschenden Sprachgebrauche der Physiker, selbst derjenigen, welche das gleichzeitige Vorhandenseyn zweyer entgegengesetzter Ströme in einem solchen Elemente sich vorstellen, diejenige an, welche im metallischen Contacte vom Kupfer zum Zink, mithin im flüssigen Leiter vom Zink zum Kupfer führt: so läßt sich die Richtung des in der Drahtspirale des Ankers eines Magnets bey dem so eben erwähnten Versuche entstehenden electricischen Stromes leicht angeben. Denkt man sich nehmlich den Magnet über den Anker gestellt, ferner letztern gleichfalls hufeisenförmig gebogen, und das Drahtgewinde bis an die Enden der aufwärtsgekehrten Schenkel desselben in einem Zuge fortgesetzt, so geht der electricische Strom in der vordern, d. h. dem Beobachter zugewendeten Hälfte jeder Windung der Drahtspirale auf dem Ankerschenkel, welcher dem Nordpole des Magnets entspricht, bey dem Anlegen des Ankers an den Magnet, von der Linken gegen die Rechte, — dagegen bey dem Trennen des Ankers vom Magnet, von der Rechten gegen die Linke.

Zur Bildung der electricischen Ströme in der Drahtspirale wirken mehrere Umstände zusammen, deren jeder für sich betrachtet das Entstehen solcher Ströme zu veranlassen vermag. Diese sind: 1) Die unmittelbare Einwirkung des Magnets auf das den Anker umgebende Drahtgewinde; 2) die Einwirkung des Magnetismus, welchen der Anker, weil er aus weichem Eisen besteht, bey der Annäherung an den Magnet erlangt, und bey dem Entfernen von ihm verliert, auf die Drahtspirale; 3) die Einwirkung des in jeder einzelnen Windung entstehenden Stromtheiles auf die übrigen Windungen. Der Leitungs Widerstand, welchen das Material des Drahtes dem electricischen Ströme entgegensetzt, und welcher sich um so größer zeigt, je länger und je dünner der Draht ist, modificirt offenbar den aus den genannten Quellen entspringenden Totaleffect.

Die Erzeugung eines electricischen Stromes in einem Drahtgewinde durch unmittelbare Einwirkung eines Magnets auf dasselbe bey dem Annähern oder Entfernen des einen von dem andern, läßt sich durch Faradays leicht zu wiederholende Versuche erweisen. Man hat zu diesem Ende bloß einen mit Seide überspannenen Kupferdraht um einen hohlen Cylinder von Holz zu wickeln, die Enden des Drahtes mit dem Galvanometer zu verbinden, und einen Magneten in die Höhlung des Cylinders rasch einzuführen, oder den bereits eingeführten Pol nach zu entfernen. Je nachdem ein Nord- oder ein Südpol in die Spirale ein- oder austritt, entstehen in jeder dieser Beziehungen einander entgegengesetzte Ströme, so daß also ein in die Spirale eintretender Nordpol dieselbe Wirkung hervorbringt, wie ein aus der Spirale heraustretender Südpol, und umgekehrt.

Die Einwirkung der in jeder einzelnen Windungen einer Drahtspirale vorhandenen Stromtheile, bey ihrem Entstehen oder Verschwinden, auf die benachbarten Windungen läßt sich gleichfalls durch directe Versuche nachprüfen. Entladet man nehmlich ein Voltaisches Element durch einen langen Schließungsdraht, so kann man bey Unterbrechung des Stromes selbst dann noch

einen Funken erhalten, wenn dieses Element durch einen kurzen Draht von derselben Dicke und materiellen Beschaffenheit entladen seinen Funken zu geben vermag; allein diese Wirkung eines längeren Schließungsleiters erscheint bedeutend verstärkt, wenn derselbe mit Seide bekleidet und zu einer Spirale mit dicht an einander liegenden Windungen umgebildet wird. Die Einführung von Stäben aus weichem Eisen in diese Spirale steigert den Effect noch mehr.

Unter den genannten Umständen, welche die Entstehung electricischer Ströme in dem Drahtgewinde eines Ankers, bey seiner Annäherung an einen Magnet, oder bey dessen Entfernung vom Magnete, bedingen, hat die unmittelbare Einwirkung des Magnets auf das Drahtgewinde augenscheinlich den geringsten Antheil. Sehr wesentlich dagegen ist das plötzliche Entstehen und Verschwinden des Magnetismus des Ankers selbst, wie auch die wechselseitige Action der einzelnen Windungen der Drahtspirale. Es ist demnach zur Hervorbringung einer möglichst intensiven Wirkung bey gegebener Kraft des Magnets (denn daß der Effect größer ausfällt, wenn der Magnet kräftiger ist, versteht sich von selbst), auf die Weichheit des Eisens des Ankers und auf zweckmäßige Wahl des Materials und der damit zusammenhängenden Länge und Dicke des zur Spirale zu verwendenden Drahtes zu sehen. Wegen der Koffspieligkeit des Silberdrahtes ist man bey derley Versuchen lediglich auf den Gebrauch des Kupferdrahtes beschränkt, mit welchem sich, wenn gleich seine Leitungsfähigkeit für bewegte Electricität bedeutend geringer ist als jene des Silberdrahtes, dennoch völlig befriedigende Resultate erhalten lassen.

Die magneto-electrische Maschine, zu deren näherer Betrachtung wir jetzt übergehen, stellt sich lediglich als ein Apparat dar, mittelst dessen der so eben besprochene Versuch zur ununterbrochenen Erzeugung kräftiger electricischer Ströme auf eine bequeme Weise benutzt werden kann. Anstatt nehmlich einen mit einer isolirten Kupferdrahtspirale umwickelten hufeisenförmigen Anker fortwährend an einen Stahlmagnet anzulegen und von demselben wieder abziehen, wird dieser Anker, welcher wir in der Form, die er an unserer Maschine an sich trägt, den Inductor nennen wollen, in der Nähe eines hinreichend starken Magnetes in drehende Bewegung versetzt, so daß seine Schenkel an den Magnetpolen in stetem Wechsel vorübergehen.

Die Figuren 1 und 2 zeigen die ganze Einrichtung der magneto-electrischen Maschine, insofern bey derselben die volle magnetische Kraft in Anwendung gebracht wird, mit welcher sie von ihrem Erfinder in Wien, dem Mechaniker Joh. Michael Fleming, ausgestattet zu werden pflegt, und welche vollkommen hinreicht, electricische Ströme von der Stärke zu erzeugen, wie selbe die Voltaischen Apparate darbieten, deren sich Physiker und Klerge gewöhnlich bedienen, so daß die magneto-electrische Maschine als ein bequemes und wirksames Surrogat für Voltaische Apparate empfohlen werden darf.

A B C (Fig. 1 und 2) ist das aus zwey horizontalen Holzplatten, welche durch verticale Verbindungsstücke mit einander zusammenhängen, gebildete Gestelle, innerhalb dessen das Rad D sich befindet, welches durch eine an seiner Axe über der obern Gestellplatte angebrachte Kurbel E in rotirende Bewegung versetzt werden kann, und mittelst einer Schnur ohne Ende, welche um den Winkel I der Spinbel des Inductors herumgeht, diesen in rasche Rotation bringt. Um diese Schnur anspannen

und nachlassen zu können, ist die Ase des Rades **D** in einen Schlitten **F G** eingefügt, welcher in einem Falze zwischen den beiden Gestellstangen läuft, und mit Hilfe der Schraube **H** vor- und rückwärts geschoben werden kann.

Die obere Platte des Gestelles der Maschine trägt ein auf fünf starken Füßen ruhendes und dadurch mit ihr unveränderlich verbundenes Tischlein zur Aufnahme der magnetischen Batterie. Diese besteht aus einer längeren Eisenlamelle **L**, welche auf dem Tischlein liegt, und aus sechs kürzeren Lamellen **P**, welche auf ersterer in der Gegend ihrer Pole stehen. Sämmtliche Magnete fügen einander die gleichnamigen Pole zu. Der bloße Anblick der Figuren 1 und 2 wird genügen, ersichtlich zu machen, wie die vertikalen Lamellen **P** untereinander und auf der Grundlamelle **L** mittelst der Presse **N** festgehalten werden, deren horizontaler auf der Grundlamelle liegender Anschlag durch die Schrauben **R** und **S** auf die Tischplatte niedergedrückt wird. Um die gemeinschaftlichen Pole der Magnetbatterie dem rotirenden Inductor **K** so nahe als möglich zu bringen, ruht die Tischplatte, welche die Magnete trägt, nicht unmittelbar auf den Tischfüßen, sondern auf vier Stellschrauben **x**, welche durch eine von diesen Füßen getragene Platte gehen, wodurch die Stellung der oberen Tischplatte, und mit ihr jene der Magnetbatterie gegen die Schenkel des Inductors, nach Belieben regulirt werden kann\*.

Die Voltaischen Apparate, welche bey physikalischen Versuchen in Anwendung kommen, sind entweder einzelne Zink-Kupfer-Elemente von größerer Oberfläche oder vielplattige Säulen. Großplattige Elemente liefern glänzende Glühphänomene und kräftige magnetische, Wirkungen des electrischen Stromes; bey vielplattigen Säulen finden kräftige physiologische Wirkungen, z. B. Erhöhrungen des menschlichen Körpers Statt, auch gehen dabey chemische Zersetzungen gut vor sich. In den Wirkungen großplattiger Elemente waltet die Quantität, in jenen der Säulen die Intensität des electrischen Stromes vor. Beyde Arten von Wirkungen lassen sich nicht wohl mit einem rotirenden Inductor erreichen. Die magneto-electrische Maschine ist daher mit zwey Inductoren versehen, welche leicht gegen einander ausgewechselt werden können, wenn man die das Rad **D** umgebende Schnur nachläßt, und die Flügelschrauben, welche die eine Hälfte des Rades der Inductorspindel an dem Vorbertheile des Gestelles halten, hinwegnimmt.

Jeder dieser Inductoren, deren Gestalt durch die Figuren 3 bis 6 ersichtlich gemacht wird, besteht aus einer eisernen Spindel **a b**, welche eine Platte **c d** von weichem Eisen trägt, worauf in gleichen Abständen von dem Einfügungspuncte **b** der Spindel in die Platte, zwey massive Cylinder **e, f**, gleichfalls von weichem Eisen sitzen, welche zur Aufnahme der Drahtgewinde dienen. An der Spindel **a b** steckt zunächst unter der Platte **c d** ein hoher Eisen Cylinder **g**, welcher durch einen untergeschobenen Holzcylinder von der Spindel isolirend getrennt ist. Unter diesem befindet sich an der Spindel ein zweyter, der Hauptform nach cylindrischer Eisenkörper **h**. Er ist mit der

Spindel und daher auch mit der Platte **c d** in leitender Verbindung. An seinem untern Rande ist ein Ausschnitt angebracht, welcher die Hälfte des Umfanges hinwegnimmt; an seinem obern Rande befinden sich einander gegenüber zwey grubenartige Vertiefungen, über deren Zweck das Folgende Aufschluß geben wird.

Der Bequemlichkeit der Rede wegen soll der Inductor, dessen Wirkungen jenen eines einzelnen großplattigen Voltaischen Elementes entsprechen, der Quantitäts-Inductor, und der andere, welcher zur Hervorbringung der Wirkungen einer vielplattigen Volta'schen Säule dient, der Intensitäts-Inductor heißen.

Zwischen diesen beyden Inductoren waltet folgender Unterschied ob.

Die zur Aufnahme der Drahtgewinde bestimmten Eisen-cylinder **e, f** sind am Quantitäts-Inductor kürzer und dicker, als am Intensitäts-Inductor; ferner sind dieselben an dem ersteren mit dickerem Kupferdraht in wenig Lagen, hingegen an dem letzteren mit dünnerem Draht in vielen Lagen umgeben; auch ist der wohl mit Seide besponnene Draht unmittelbar auf die Cylinder des Quantitäts-Inductors gewickelt, während er für den Intensitäts-Inductor auf hölzerne Spulen aufgetragen ist, welche über die Cylinder **e, f** gesteckt werden. Die Erfahrung hat gelehrt, daß die Anwendung metalener Spulen zu diesem Behufe der Energie der Wirkungen Eintrag thut. Die beyden Enden des Drahtgewindes sind das eine Ende an der Platte **c d**, das andere an das isolirte Stück **g** geklemmt. Bey dem Quantitäts-Inductor besteht aber jedes der die Cylinder umgebenden Drahtgewinde für sich, d. h. es ist ein Ende eines jeden an die Platte **c d** und das andere an das Eisenstück **g** geheftet, während bey dem Intensitäts-Inductor nur das Ende des einen Drahtgewindes an die Platte **c d** und nur das Ende des anderen an den Eisenkörper **g** geht und die beyden übrigen Enden mit einander verbunden sind, so daß hier die Spirale des einen Cylinders als die Fortsetzung der Spirale des anderen erscheint. Es ist jedoch dabey wohl zu beachten, daß bey dem Quantitäts-Inductor die in den zwey Drahtgewinden entstehenden electrischen Ströme an derselben Stelle eintreten und an derselben austreten, ferner die Ströme am Intensitäts-Inductor beyde Drahtgewinde in demselben Sinne durchlaufen, weil sich sonst die Wirkungen beyder Drahtgewinde gegenseitig tilgen. Bedenkt man, daß die in den Spiralen an beyden Schenkeln des Inductors sich einstellenden electrischen Ströme nothwendig entgegengesetzte Richtungen haben; so wird man leicht einsehen, daß bey dem Quantitäts-Inductor, wenn die Spirale des einen Schenkels rechts, die des anderen links gewunden ist, die äußeren Enden der Spiralen an denselben Punct, z. B. an **g**, und die inneren Enden wieder an denselben Punct, z. B. an die Platte **c d**, zu klemmen sind; hingegen, wenn beyde Spiralen rechts oder beyde links aufgetragen würden, stets ein äußeres Ende der einen mit einem inneren Ende der anderen zugleich an dem nämlichen Puncte anzubringen wäre. Aus demselben Grunde müssen bey dem Intensitäts-Inductor, wenn beyde Spiralen in demselben Sinne gewickelt sind, zwey gleichnamige Enden derselben miteinander verbunden, und die übrigen Enden an die Platte **c d** und den Eisenkörper **g** geklemmt werden; sind aber die Spiralen auf beyden Cylindern in entgegengesetztem Sinne gewunden, so gehören ungleichnamige Drähte

\* Die Möglichkeit, jeden beliebigen Magnet in Anwendung bringen und die Pole desselben auf die vortheilhafteste Weise benützen zu können, ist eine Eigenthümlichkeit der hier beschriebenen Maschine, welche keiner bisher bekannten ähnlichen zukommt.

enden (ein inneres und ein äußeres) zusammen, und die übrigen an die Anheftungspuncte. Auf diese Weise wird bey dem Quantitäts-Inductor die möglichst größte Quantität, bey dem Intensitäts-Inductor die möglichst größte Intensität für die Electricität gewonnen, welche während der Rotation des Inductors unter dem Einflusse der Magnetbatterie in Bewegung tritt.

Ein electrischer Strom kann jedoch in dem Drahtgewinde nur in so fern zu Stande kommen, als die Enden desselben in leitender Verbindung stehen. Wird diese durch irgend einen Zwischenkörper demerkstelligt, so ist derselbe der Einwirkung des electrischen Stromes ausgesetzt. Zur bequemen Schließung der Kette und Leitung des Stromes stehen zu beiden Seiten der Inductorspindel Säulen aus Messing *m* und *n*, deren jede vier Löcher 1, 2, 3, 4 trägt, in welche Metallfedern, deren Bestimmung ist, an *g* und *h* zu greifen, gesteckt und mittelst Klammschrauben verschalten werden können. Stets muß eine Feder an *g*, eine zweyte an *h* greifen; bey gewissen Versuchen greifen sogar zwei Federn zugleich an *h*.

Es ist klar, daß zwei Federn, die an derselben Säule stecken, mit einander in leitender Verbindung stehen. Jedes Loch an *m* und *n* entspricht dem gegenüberliegenden Theile der Inductorspindel. Eine Feder in das Loch 1 gesteckt, hat daher an das von der Spindel isolirte Eisenstück *g* zu greifen. Eine Feder in 2 soll das Stück *h* an dem oberen Drittheile berühren, jedoch während dieselbe über die Vertiefungen gleitet, während jeder Umdrehung zweymal, einen Augenblick lang daran gehindert werden. Eine Feder in 3 hat die Bestimmung, an das Mittelstück von *h* zu greifen, daher *h* fortwährend zu berühren. Eine Feder in 4 steht mit *h* nur während der einen Hälfte der Umdrehung des Inductors in Contact; während der zweyten Hälfte der Umdrehung ist die Verbindung unterbrochen.

Zur Herstellung einer genügenden Verbindung der genannten Theile der Maschine in Betreff der vollständigen Leitung des electrischen Stroms ist ein leiser Druck der Federn hinreichend; ja man kann, der Schließung der Kette unbeschadet, zur Verminderung der Reibung an die Spitzen derselben Del bringen. Die Anwendung von Quecksilber, um einen guten Metallcontact herzustellen, ist daher völlig überflüssig.

Die Säulen *m*, *n* sind von gleicher Gestalt, was den Vortheil gewährt, den Inductor in einem oder dem andern Sinne sich drehen zu lassen. Hier wird jedoch stets vorausgesetzt, daß die Kurbel *E* (Fig. 1 und 2) links gedreht werde, mithin das Rad *D*, wie es der in Fig. 2 darauf bezeichnete Pfeil angibt, sich bewege. Bey dieser Anordnung sind für alle Experimente an der Säule *n* drey Klammschrauben hinreichend, welche in die Löcher 1, 2 und 4 gehören, und stets daseibst bleiben, während an der Säule *m* eine Klammschraube im Loch 1, und eine zweyte bald im Loch 3, bald in 4 sich zu befinden hat.

Wir gehen nun zur Andeutung einiger der vielen Versuche über, welche sich mit der magneto-electrischen Maschine, und zwar mit großer Leichtigkeit und Sicherheit anführen lassen.

### Versuche mit dem Quantitäts-Inductor.

**I. Glänzende Funken.** Hierzu steckt man eine Messingfeder in *n* 1 und eine zweyte in *n* 2. Diese Stellung der

Feder zeigt Fig. 3. So oft die Feder in 2 über eine Vertiefung des Eisenstückes *h* hinweggleitet, erscheint der stark sprühende Funke, an dem man die ungemein feinen brennenden Theilchen der Metalle von dem blauen Kerne leicht unterscheidet.

Eine andere Anwendung der Federn zur Darstellung der Funken zeigt Fig. 4, wobei eine Feder in *m* 1, die zweyte in *n* 2 steckt, und überdies die beyden Säulen durch einen in *m* 4 und *n* 4 eingeklemmten Draht in leitender Verbindung stehen.

**II. Glühen eines dünnen Platindrastes.** Hierbey werden die Federn in *n* 1 und *m* 3, — die Enden der mit Seide besponnenen Drähte, zwischen welchen der Platindrast sich befindet, in *m* 1 und *n* 2 eingesetzt. Die Anordnung des Versuches zeigen übrigens Fig. 1 und 2. Der Platindrast ist u. v. Wird derselbe dünn und kurz genommen, so geräth er in lebhaften Weisglühen, welches bis zum Schmelzen des Drahtes gehen kann. Dünner Eisendrast an die Stelle des Platindrastes gebracht, schmilzt augenblicklich, selbst wenn die Leitungsdrähte für den electrischen Strom eine bedeutende Länge haben. Es läßt sich auf diesen Versuch eine einfache Methode gründen, Schießpulver in großer Entfernung mit Schnelligkeit zu entzünden, zum Behufe des Sprengens und dergleichen.

**III. Electromagnetische Versuche, als Magnetisieren von Nadeln, Darstellung eines magneto-electrischen Electromagnets, die Rotation des Farrowschen Rädchens, des Faraday'schen Pendels, eines in Quecksilber schwimmenden Magnets, um den Leiter des electrischen Stromes oder um seine eigene Axe und dergl. werden leicht mit Hülfe der dazu dienlichen Apparate ausgeführt, indem die magneto-electrische Maschine die Stelle des dazu nöthigen Volta'schen Elements vertritt. Da jedoch während jedes Umlaufes des Inductors in seinem Drahtgewinde nach einander zwei Ströme von entgegengesetzter Richtung stattfinden, genannte Erscheinungen aber die Anwesenheit eines Stromes von unveränderter Richtung erfordern, weil sonst der eben eintretende Effect gleich wieder aufgehoben würde; so ist es nöthig, nur jenen Strom zu Stande kommen zu lassen, welcher einer Hälfte der Umdrehung des Inductors entspricht, den entgegengesetzten Strom aber auszuschließen. Dies wird dadurch geleistet, daß man eine Feder in die Oeffnung 1 der Säule *n*, die andere Feder in die Oeffnung 4 der Säule *m*, die beyden Zuleitungsdrähte für den auszuführenden electromagnetischen Versuch in die Oeffnungen *m* 1 und *n* 2 oder auch *n* 4 einsetzt, wie selbes Fig. 5 zeigt. Die in *m* 4 befindliche Feder verläßt während einer halben Umdrehung das Eisenstück *h*, wegen des an seinem angebrachten Ausschnittes, wodurch nur die Hälfte der einer Umdrehung des Inductors entsprechenden electrischen Strömungen zu Stande kommen kann. Damit jedoch wirklich nur ein Strom von Einer Richtung stattfindet, ist es wesentlich, daß die Unterbrechung des Contactes der Feder in *m* 4 mit der Spindel des Inductors gerade in dem Augenblicke erfolge, in welchem der Stromwechsel eintritt. Dieser ereignet sich erst, nachdem die Schenkel des rotirenden Inductors die Magnetpole bereits verlassen haben; bey beträchtlicher Kraft der Magnetbatterie und schneller Rotation erst, wenn die Drahtgewinde am 45° von den Magnetpolen entfernt sind. Hierauf ist bey der Anwendung der Gestalt der Feder in *m* 4 Rücksicht zu nehmen. Es ist leicht einzusehen, daß, wenn diese Feder richtig gestellt wurde, ihre Stellung sich nur auf ein**



bestimmte Umdrehungsgeschwindigkeit des Inductors und auf eine bestimmte Richtung seiner Rotation bezieht, mithin der Rotation in entgegengesetzter Richtung nicht mehr entspricht.

### Versuche mit dem Intensitäts-Inductor.

**I. Einfache Erschütterungen.** Hiezu kommen die Federn in n 1 und m 3; die Zuleitungsdrähte, welche in diesem Falle mit Handhaben versehen werden, in m 1 und n 4. Diese Erschütterungen sind, wenn die Magnetbatterie kräftig ist, und die Handhaben mit nassen Händen ergriffen werden, sehr fühlbar.

**II. Heftige Erschütterungen,** selbst bei Anwendung einer einzigen und schwächeren Magnetlamelle und mit trockenen Händen, verspürt man, wenn man bei der Anordnung des so eben beschriebenen Versuches die metallenen Handhaben einander bis zur Berührung nähert, und sodann den Contact derselben unterbricht. So oft dieses geschieht, erfolgt ein heftiger Stoß. Viel besser ist es aber, noch eine Feder in n 2 einzufügen, wodurch man der Mühe, die Conductoren einander zu nähern, überhoben wird. So oft nemlich die Feder in n 2 über eine der am Eisenkörper h angebrachten Vertiefungen hinweggleitet, erfolgt eine Erschütterung desjenigen, welcher die Handhaben der Leitungsdrähte hält. Die Anordnung dieses Experimentes ist in Fig. 6 dargestellt. Durch Auslegen eines Ankers auf die angewendete Magnetlamelle und Verschieben desselben kann man die Stöße innerhalb gewisser Grenzen beliebig ändern. Sie fallen um so schwächer aus, je näher der Anker an die Magnetpole gelegt wird, und können, wenn die Magnetlamelle nicht zu kräftig ist, durch Anlegen des Ankers an diese Pole unmerklich gemacht werden. Rückt man den Anker gegen die Richtung der Magnetlamelle hin, so wächst die Stärke der Erschütterungen allmählich, und erreicht, wenn der Anker gänzlich entfernt wird, die größte Intensität, welche die gewählte Magnetlamelle darzubieten vermag.

Dieser Theil der Leistungen der magneto-electrischen Maschine dürfte Ärzten besonders wichtig erscheinen, welche dieselbe bei Heilversuchen in Anwendung zu bringen Gelegenheit haben.

**III. Für Versetzungen des Wassers,** welches durch etwas Schwefelsäure oder Salpetersäure leitend gemacht worden ist, des Sodakaliums, essigsauren Natriums u. dgl. dient die durch Fig. 5 dargestellte Disposition des Apparats; denn hier ist ebenfalls ein Strom von bestimmter Richtung nöthig.

5) Prof. **Hefler** aus Prag zeigte einen von ihm eingerichteten electro-magnetischen Apparat.

6) **Morstadt** aus Prag zeigte einen neuen Thermographen.

### Dritte Sitzung am 21. September.

7) Prof. **Reich** aus Freyberg beschrieb die Einrichtung eines Schwingungs-Apparats zur Bestimmung der Dichtigkeit der Erde. Sie beträgt 5,44, nach Cavenish 5,48.

### Vierte Sitzung am 22. September.

8) **Kudberg** in Upsala über die Ausdehnung der Gase durch Wärme. Wie 1000 : 1363.

### Fünfte Sitzung am 23. September.

9) **Morstadt**, über ein Meteor.

10) **Hofrath Brandes** aus Salz=Usseln, über den stündlichen Gang der Wärme.

11) Prof. **Bonsdorff** aus Helsingfors, Beiträge zur Theorie des Thaus.

Stil 1838. Heft 7.

### Sechste Sitzung am 21. September.

Wiß chemische Gegenstände.

### Siebente Sitzung am 25. September.

12) Prof. **Doppler** zu Prag, über die scheinbare Durchsichtigkeit des Cometenkerns; sey nur Lichtbrechung.

13) Prof. **Wiesenfeld** aus Prag, über das Stahlgeläute als Ersatz größerer Glocken.

14) Prof. **Schweigger** aus Halle, über electro-magnetische Erscheinungen und die Urschichte der Physik.

15) **Wenke** zu Prag, über Dampf-Luftschiffe.

16) Mehrere Astronomen vereinigen sich zur Beobachtung der Sternschnuppen vom 11—14. November.

17) Prof. **Weiß** aus Karkau, über sein Sternverzeichnis.

### Achte Sitzung am 26. September.

18) Prof. **Usum** zu Würzburg über die Natur des electrischen Funken.

19) Prof. **Jarwadsky** zu Premysl, merkwürdiges Gewitter und Sternschnuppen.

20) **Bonsdorff**, über Ausdehnung des Bleies durch Wärme.

### Chemische Verhandlungen in denselben Sitzungen.

Secretär: Prof. **Pleischl**.

21) Prof. **H. Rose** aus Berlin, über künstliche Bildung von Kalzspath = und Aragonit = Crystallen.

22) **Dr. Selter** zu Prag, über Rhodizon = Säure.

23) **Gouverneurath Neumann** zu Prag, über die Mischungsverhältnisse organischer Pigmente.

24) Prof. **Löwig** aus Zürich, über die Einwirkung des Kaliums auf verschiedene organische Stoffe.

25) **Baron v. Leithner** aus Wien und Prof. **Pleischl** zu Prag, über eine crystallische Substanz an vergrabnem Fichtenholz.

26) Prof. **Schrötter** aus Grätz, über Idrialin und ein Erdbarz.

27) Prof. **Zenke** aus Tübingen, über das Reich der Gase.

28) **Neumann**, über die mittleren Temperaturen der Atmosphäre.

29) Prof. **Frankenheim** aus Breslau, über Schwefel und Selen.

30) **Brandes**, über Job = Antimon.

31) **Dr. Kammelsberg** aus Berlin, über Cyan-Metalle.

32) Prof. **Buchner** aus München, über eine neue einzuführende Nomenclatur in der organischen Chemie.

33) **Bonsdorff**, über Stannate; Natrium-Hydrat als Prüfungsmittel der Kohlenensäure; Verbindung des Eisenvitriols mit Wasser.

34) **Pleischl** zeigte schöne Präparate.

35) **Rose**, über Kieselerde und Eisenoxyd von fossilen und anderen Infusorien.

36) **Schrötter**, über Vanadin in Eisenschlacken.

37) **Simon** in Berlin. neue Pflanzenbasis; Gerwin.

(Alles ausführlich im amtlichen Bericht.)

Man besuchte in den Zwischenzeiten die Sammlungen und Fabriken von Brosche, Batka, Jerusalem, Porges, dem Fürsten Dettingen = Wallerstein, Richter, in der Stadt und in der Umgegend.

## II. Pharmaceutische Sitzungen.

Secretär: Rud. Brandes.

- 1) Dr. Josi aus Wien, Salpeter in Chanille; Eisenoryd in Drangenblüthenwasser.
  - 2) Brandes, Wirkung des essigsauren Bleys auf Terpentind; des Chlors auf Chinin.
  - 3) Prof. Buchner, Verflüchtigung des Farbestoffes der Berberitzenwurzel.
  - 4) Apotheker Rhode aus Leipzig, über Blutegel-Leiche.
  - 5) Apotheker Berndt, Schwefel-Erystalle.
  - 6) Dr. Buchner, Auflöslichkeit der Arseniklsäure.
  - 7) Dr. Mohr aus Coblenz und Hermann aus Osmütz, neuer Apparat zur Bereitung des Aethers.
  - 8) Lang aus Neutra, Pendel-Variirwege.
  - 9) Hermann, Benzoe-Erystalle; Vibergel; Eintheilung der organischen Stoffe.
  - 10) Biafoletto, Sphaerococcus conservoides statt Caragheen anzuwenden.
  - 11) Rhode, Prüfung des Copaiv-Balsams.
  - 12) Batka, über verschiedene Wurzeln, Sandelholz, Sarsaparilla.
  - 13) Storck, Darstellung des Antimonii diaphoretici, abluti.
  - 14) Popp zu Prag, Darstellung der Quecksilberpräparate.
- (Alles ausführlich im amtlichen Bericht.)

## III. Mineralogie und Geographie.

Secretär: Prof. Zippe.

1) Sommer, über die Ungewissheit der Höhe von Prag und Dresden.

2) Reuß, über die geognostischen Verhältnisse von Töplitz.

Nach einer kurzen Andeutung dessen, was seit v. Humboldt's, Freyesleben's und seines Vaters, des verstorbenen Dr. Fr. A. Arbeiten und in neuerer Zeit durch Raumann, v. Leonhard, v. Klipstein, Gumprecht u. A. über diese interessante Gegend bekannt gemacht worden, folgt eine Schilderung der Gegend und ihrer geognostischen Verhältnisse. Die Gegend von Töplitz läßt sich schon durch den Anblick in drei, auch geognostisch deutlich getrennte Partien sondern, nemlich das Erzgebirge im Norden, das Mittelgebirge im Süden und Osten, und das zwischen beynen verbreitete Thal. Das vorherrschende Gestein des Erzgebirges ist Gneus. Sein Streichen ist N., mit Abweichungen nach N., das Fallen unter ziemlich scharfen Winkeln meist N., auch S.; es ist nur in den Thälern und an wenigen Punkten bemerkbar. Die Structur ist verschiedenartig, mit Uebergängen in Glimmerschiefer und auch in Granit, so im Teinitzthale. Porphyrartig durch eingeschlossene Feldspathcrystalle erscheint der Gneus des Eisenberg.

Fremde Gemengtheile sind hier und da Turmalin, und bey Kulm Granat. Gänge von Quarz mit verschiedenen Bley- und Silbererzen streichen bey Niklasberg und Klostergrab. Bey Graupen enthält er schmale Lager, welche von Gängen durchsetzt werden, auf welchen Zinnerz, Fluspath usw. vorkommen. Basaltkuppen im Gneuse erscheinen bey Kulm, am Strobnitzberge und bey Straben. Phonolith bey Oberleutensdorf. Im Teinitzthal enthält er eine mächtige Masse von feintartigem Granit, welche an zwey Stellen vom Basalte durchsetzt wird; dieser Basalt enthält unter andern Gemengtheilen auch Feldspath und Granitstücke; er wird durch Conglomerate an einer Stelle deutlich vom Granite geschieden. (Noch andere Granitmassen und ihre Verhältnisse werden auf dem höheren Gebirgsrücken angeführt.) Große Porphyrmassen finden sich im Schönbachthale, bey Graupen, Tollenndorf; die mächtigste oberhalb Eidwald, wo der rothe Porphyr ein großes Stück des Abhanges bis an den Kamm hinauf bildet, welches sich von Klostergrab und Niklasberg bis hinter Züdenborn bey Graupen erstreckt. Auch in diesem Porphyr finden sich basaltische Massen. Die Gränze zwischen Gneus und Porphyr ist nur oberhalb Niklasberg wahrnehmbar, und hier zeigen sich ebenfalls Conglomerate. Der Porphyr des Erzgebirges steht im Zusammenhange mit dem bey Töplitz; die Trennung beyder ist nur oberflächlich, durch muldenförmig eingelagerte Braunkohlengedäule. Der Porphyr stößt in mehreren Ruppen zwischen Töplitz und dem Erzgebirge hervor. In den Umgebungen von Töplitz bildet er nackte klippige Hügel, welche von Plänerfalk umlagert sind. (Es werden nun die Varietäten dieser Gesteine, die Petrefacten des Pläners und die Verhältnisse dieser Felsarten zu einander ausführlich erörtert, und es wird dargehan, daß der Pläner von jüngerer Bildung sey.) Der südliche Fuß des Erzgebirges ist größtentheils vom Braunkohlengedäule bedeckt; nur an drei Punkten findet man Quadersandstein auf Gneus aufgelagert; ersterer zieht sich von der großen Masse seiner Formation im östlichen Theile des Erzgebirges längs dem Fuße dieses Gebirgszuges bis tief in den saezey Kreis fort, wird aber meist von der Braunkohlenformation bedeckt. Auch der Plänermergel tritt in der Gegend von Töplitz an mehreren Stellen inselartig hervor, bis er sich südlich am Mittelgebirge als zusammenhängendes ausgedehntes Flözgebirge ins mittlere Böhmen verbreitet. Im Südosten von Töplitz beginnen die Ruppen des Mittelgebirges, welches der Kulm mit dem Erzgebirge zusammenstößt. Die zur Formation des Mittelgebirges gehörenden Basalt- und Phonolithkuppen finden sich in der Gegend von Töplitz noch vereinzelt. (Diese Ruppen werden nun nach ihrem Gesteine und den vorkommenden Mineralien weiter charakterisirt; dabey wird dargehan, daß das als Keratitporphyr angeprohene Gestein des bekannten Hügels bey Wistbertschau zur Phonolithbildung gehöre.) — Das Thal zwischen dem Erz- und Mittelgebirge wird durch die weitverbreitete Braunkohlenformation ausgefüllt, welche aber hier durch die hervortretenden Porphyre, die Plänerkalkformation und die Basalte sehr eingeengt ist. Das Liegende derselben ist außer Zweifel die Quadersandstein- und Plänerkalksteinformation, wie selches unter andern im tiefen Stollen bey Klostergrab sichtbar wird, welcher durch die Braunkohlenformation, den unterliegenden Quadersandstein bis in den Gneus des Erzgebirges getrieben ist; ferner bey Hochpösch unweit Bilin, wo Braunkohlensandstein deutlich auf Plänerkalkstein abgelagert ist. (Es wurden nun die Stüder dieser Formation in der Gegend von Töplitz genauer beschrieben und ihre Verbreitung bezeichnert) Von den Producten der Erd-



brände, welche so häufig bey Töplitz vorkommen, wurde erwähnt, daß sie sich hauptsächlich an der Grenze des Braunkohlenterrains in der Nachbarschaft des Basaltes finden. Aus diesem Umfande und aus ihrer, im Vergleiche zu den heutigen Erdbänden ganz unverhältnißmäßigen Ausdehnung sey es nicht unwahrscheinlich, daß die Emporhebung der Basalte einen großen Antheil an der Entfaltung der Erdrinde und ihrer Producte genommen habe. Die so häufigen Sandsteinblöcke, treue Begleiter der Braunkohle, dürften allem Anscheine nach die Ueberreste einer zerstörten, der Braunkohlenformation angehörigen Sandsteinablagerung seyn; sie finden sich nie anstehend. Am Schlusse werden noch die in der Gegend von Töplitz häufig vorkommenden Alluvial- und Diluvialgebilde erwähnt. Der Vortrag wurde durch eine sehr ausführliche geognostische Charte der Umgebungen von Töplitz belegt.

### 3) Dr. Stolz aus Töplitz, gebiegen Gold von Eule.

4) Prof. v. Klipstein theilt nachträgliche Bemerkungen des Dr. Knap zu ihrer gemeinschaftlichen Abhandlung über das *Dinothierium giganteum* mit. Die eigentliche systematische Stellung dieses vorweltlichen Riesenthieres sey noch nicht zu entscheiden, da außer den Kopfknochen mit Zuverlässigkeit keine anderen Theile des Skelettes bekannt sind; es könne aber nach der Verwandtschaft in der Bildung der Backenzähne trotz der sonst sehr stark abweichenden Bildung des Kopfes als die niedrigste Form der Familie der Tapire, parallel dem *Hippopotamus* zu betrachten seyn. Knap stimme der Meinung des Herrn von Blainville und Strauß v. Dürkheim bey, daß es nach den hoch gelegenen Condylis für den Atlas und dem stumpfen Winkel, welchen das Hinterhaupt mit der Stirne bildet, wahrscheinlich immer im Wasser lebte, glaube aber nicht, daß es ein Meeresthier wie *Dugong* ohne hintere Extremitäten war, daß es vielmehr nur im süßen Wasser lebte.

5) Wöggerath zeigte einen räthselhaften Einschuß in einem geschlossenen Chalcedon von Oberstein und eine vergrößerte Zeichnung desselben. — Graf Casp. Sternberg bemerkt, daß ähnliche Dinge unter den Pflanzenversteinerungen vorkommen, und daß der Einschuß große Ähnlichkeit mit einem *Equisetum* habe; er gleiche nemlich einem hohlen Stengel oder Schaft, an welchem jedoch die wirtelförmig gestellten Blättchen sich zu einem runden, vom Schaft durchwachsenden Blatte vereinigen. Mehrere Anwesende sind jedoch der Meinung, daß diese sich mehrmals in gleichen Zwischenräumen wiederholenden runden Blättchen auch Risse im Chalcedone seyn können. Etwas Bestimmtes sey nicht zu entscheiden.

Er legt einen idealen Durchschnitt der Erdrinde vor.

6) Prof. Plieninger spricht über Thierfährten, welche er kürzlich in der Keuperformation in den Umgebungen von Stuttgart aufgefunden hatte; er legt eine Zeichnung derselben vor. Diese Thierfährten unterscheiden sich wesentlich von den bei Hesseberg im Hilburgshausen im bunten Sandstein aufgefundenen, sowohl durch ihre Figur und ihre gegenseitige Stellung, als auch durch die gänzliche Abwesenheit der hier letzteren vorkommenden neßförmigen Bildungen. Sie stehen stets zu zweyen, die eine hinter der anderen alternierend in zwey parallelen Reihen so, daß die in der rechten Reihe befindlichen bey gleichem Umfasse die entgegengesetzte Stellung gegen die in der linken Reihe

zeigen. Solcher Paralleltreffen zeigt die etwa 5' lange und  $2\frac{1}{2}$ ' breite Platte zwey, wovon die eine sechs Paar Fährten und noch zwey einzelne, die andere Reihe vier Paar und eine einzelne enthalten. Bey den einzeln stehenden fehlt die correspondirende zweyte Fährte entweder durch den Bruch der Steinplatte oder durch Verwitterung. Dabei zeigen die auf einander folgenden Fährten genau ihre gegenseitigen Entfernungen von fünf bis sechs Zoll. Eben diese Entfernung haben auch die einander gegenüberstehenden, so daß je vier der zunächst stehenden, d. h. zwey in der rechten und zwey in der linken Reihe durch gerade Linien mit einander verbunden, vollkommen einen Rhombus bilden, woraus zu schließen, daß, wenn diese Erhöhungen wirklich von Ausfüllungen von Thierfährten durch die Gesteinmasse herrühren, diese Fährten einem Thiere angehören mochten, bei welchem der Abstand der Vorderfüße von einander so wie der Hinterfüße von einander dem Abstände je eines Vorderfußes von einem Hinterfüße gleich war. Dieser Umstand, so wie die Umrisse der deutlichsten Spur eines Vorderfußes, bey welchem die ganz über die Fläche der Platte hervortretenden Spuren von vier Zehen oder Klauen in einer beynahe geraden Reihe neben einander stehen, würden auf ein Schildkrötenähnliches Thier schließen lassen. Auch zeigen die Spuren der Hinterfüße eine solche Bildung, woraus zu vermuthen, daß sie durch einen über den Schlamm hingleitenden Schritt entstanden wären, wie diesel von *Uctland* bei ähnlichen, nach seiner Ansicht von Schildkröten herrührenden Fährten, welche in England gefunden worden waren, nachgewiesen worden ist. Die Steinplatte, welche die fraglichen Fährten enthält, gehört der Salaminienführenden Schicht des Keupers an. Am Schlusse dieses Vortrages wurden vom Hrn. Grafen C. Sternberg noch einige Zweifel über die angenommene Erklärung der Thierfährten von Hesseberg angeführt, welche bey dem Besuche des Steinbruchs nach der Versammlung in Jena von einigen Geognosten angeregt worden seyen; namentlich wurden die Umstände bemerkt, daß man trotz aller Bemühungen keiner Schichte habhaft werden könne, in welcher sich die Hohlindrücke dieser Thierfährten finden, welche auf den Steinplatten stets erhoben erscheinen, wie auch, daß die Klaue oder der Nagel an den Zehen, welcher als Abdruck auf der Steinplatte hervortragen müsse, sich nicht finde. Professor Quenstedt bemerkt, in Beziehung auf den letztern Umstand, daß auf vielen Steinplatten an der Stelle, wo sich der hervorragende Nagel zeigen müsse, deutlich frischer Bruch wahrnehmbar sey, und daß diese kleine Hervorragungen bey dem Brechen der Steinplatten wahrscheinlich abspringen möge.

7) Dr. Stelzig, Bevölkerungsverhältnisse von Böhmen vor und nach der Kuhpocken-Impfung.

8) C. Sibir aus München, über Meeresströmung.

9) And. Preininger zu Prag legt eine geognostische Charte der Umgebungen von Prag vor, und bemerkt, daß die nöthige Erklärung dazu in dem, den Mitgliedern der Versammlung mitgetheilten topographischen Taschenbuche von Prag, vom Prof. v. Kromholz (S. 44) enthalten sey. Die in der Gegend von Prag bey Kuchelbad und anderwärts (auch in größeren Entfernungen) vorkommenden Blöcke von festem eisenhaltigem Conglomerate glaube er für Ueberreste der alten rothen Sandsteinformation erklären zu können. Prof. Zippe wendet gegen diese Ansicht ein, daß die alte rathse Sandstein-

formation (Old red) in Böhmen nicht vorhanden sey, daß ihre Ausgeh-Enden zwischen der Steinkohlenformation und dem Uebergangsbirge nirgends anzutreffen seyen, wo sie doch vor der Versörung durch spätere Veränderungen der Erdoberfläche bey der Bildung der Thäler durch die aufgelagerte Steinkohlenformation geschützt, noch anzutreffen seyn müßte; er glaube daher diese losen Conglomeratblöcke für Ueberreste der härteren Schichten der Quader sandsteinformation bestimmen zu dürfen; denn diese Formation enthalte solche härtere Schichten, welche der Zersüdung hartnäckig widerstehen, und welche sich daher bey der Zerrümmung der Formation während der Bildung der Thäler erhalten haben konnten.

10) Prof. Naumann legt eine Section der geognostischen Charte von Sachsen, welche von der Bergakademie zu Freiberg herausgegeben wird, und zwar die Umgebungen von Dresden vor, und giebt einige Erläuterungen darüber. Diese treffliche, in sehr großem Maßstabe ausgeführte Arbeit, von welcher bereits einige Sectionen erschienen sind, übertrifft nach dem Urtheile der Sachkennner in Beziehung auf Genauigkeit und Ausführlichkeit Alles, was bisher in diesem Fache geleistet worden, und erregte hier um so mehr Aufmerksamkeit, als aus der Auseinanderlegung des Planes hervorging, daß sie nicht bloß Sachsen, sondern auch einen beträchtlichen Theil von Böhmen, nemlich den Eiböquer, Saazer und Leitmeritzer Kreis bis zur Eger umfassen werde.

#### 11) Dr. Quenstedt über Crystallographie.

12) Zippe legt die geognostische Charte von Böhmen vor. Er machte darauf aufmerksam, welche Verbesserungen in der geognostischen Kenntniß des Landes sich seit der Wiener Versammlung der Naturforscher im Jahr 1832 ergeben haben, und welche Lücken in der damals von ihm vorgelegten Charte bis jetzt ausgefüllt worden seyen. Durch seine Reisen im östlichen und im westlichen Böhmen sey nunmehr die Ausdehnung der Flözformationen, ihre Begrenzungen unter einander und mit dem Granit- und Schiefergebirge vollständig bekannt, so wie auch die Zusammensetzung und die wechselseitigen Verhältnisse der letztern. Als merkwürdige Erscheinung glaube er erwähnen zu dürfen, daß im hrudimer Kreise das Schiefergebirge (Gneus und Thonschiefer) durch zwei große Granitparthien unterbrochen sey, und daß an dem Fuße des Gebirges der Plänerkalkstein, welcher das vorherrschende Glied der Kreide- und Grün sandformation bildet, an die Schiefergesteine unmittelbar angelagert sey, so daß bey der sanften Verflächung des Gebirges die Grenze zwischen den Formationen oft schwer aufzufinden sey; von dem Granite aber sey das Flözgebirge durch ein längs dem Fuße des ersten verlaufendes Thal geschieden, und dieses erhebe sich jenem gegenüber wallartig, mitunter mit steilen Wänden. Uebrigens sey das Wesentliche der geognostischen Verhältnisse dieser Gegenden in Sommer's Topographie von ihm bekannt gemacht worden, nemlich in den Wänden, welche den königgräzer und hrudimer Kreis enthalten. Im westlichen Böhmen sey nunmehr auch die westliche Begrenzung der Steinkohlenformation mit dem Uebergangsbirge bestimmt, zugleich aber eine vorher noch unkannte isolirte Ablagerung der alten Flözformation auf das Schiefergebirge aufgefunden worden; sie finde sich auf den Herrschaftlichen Manetin, Preitenstein, Ludis und Weskreis verbreitet, bestehe bloß aus grobkörnigem, sehr festem Conglomerate,

und führe keine Kohlen. Das Nähere darüber so wie über die geognostischen Verhältnisse der anderen Formation werde in der Topographie des pilsner Kreises, welche bereits bearbeitet wird, bekannt gemacht werden.

13) Dr. Sella sprach über zwei neue von ihm entdeckte Mineralspecies, die er vorgelegt. Das eine Mineral, dessen Fundort Piribram in Böhmen ist, ist eine Verbindung von Selen, dann Schwefel, mit Antimon und Wesp. (Nach Sella's Analyse.) Dieses Mineral hat ein doppeltes Interesse; erstens, da es die erste bisher bekannte Mineralspecies ist, in welcher das Selen in Verbindung mit Antimon vorkommt; und zweitens, indem dieses das erste Vorkommen des Selen in Böhmen ist, als in einer constanten Verbindung. Die Crystalle gehören dem tesseralen System an, und sind theils Octaeder oder Kuboctaeder, theils Zwillingsgestalten. Es besitzt schönen Metallglanz und die Farbe des Antimons. — Das zweite Mineral kam bei Jglau in Mähren im Gneus vor. Es gehört zu den Edelsteinen, und bestand sich in einer Kugel von der Größe eines Hühnereies, welche im Gneus, von diesem ringum eingeschlossen, gefunden wurde. Diese kugelige Hülle ließ sich nach und nach abblättern, und in der Mitte bestand sich das Mineral, als ein schön runder Kern, von der Größe einer Flintenkugel. Seine Farbe ist zeisiggrün, es ist durchsichtig und klar, seine Oberfläche ist runzelig; innen, nahe der Oberfläche, ist eine Blase sichtbar, wie sich solche öfter auch im Obsidian finden; es ist härter als Quarz, und hat ein spec. Gewicht von 2,135.

14) Dr. Zeuschner sprach über den Diorit von Rattowitz in Oberschlesien. — Durch die vortreffliche Schilderung des Baues des oberflächlichen Kohlengebirges von Dornhausen ist es bekannt, daß ein Theil der Kohlenflöße südlich, der andere aber nördlich fällt. Auf der seinem Werke beigefügten Charte ist die Linie angegeben, von welcher sich die Flöße nach beiden Seiten neigen. Daß die Ursache, die solche Veränderungen hervorgebracht, tief im Schooße der Erde liege, kann wohl nicht bezweifelt werden: denn Emporhebungen ganzer Landstriche können nicht von partiellen Wirkungen abhängen, und sind nur Folgen großartiger plutonischer Kräfte. Herr von Dornhausen glaubte, daß der inselartig aus Jurakalk im krakauschen Gebiete hervorragende rothe Porphyrie diese Emporhebung bewirkt habe; so ist es aber nicht. Durch die Aufdeckung eines neuen Steinbruches in der Nähe der Hohenlohe-Hütte bei Rattowitz, einem 2 Stunden von Mstowice und 1/2 von Königshütte entfernten Dorfe, zeigt sich Grünstein; dieser hat das Oberschlesische und polnische Kohlengebirge gehoben. In folgendem find die Beweise dafür. — Der Kohlen sandstein von Oberschlesien ist im unveränderten Zustande von graulichweißer Farbe, feinkörnig, seltener grobkörnig mit Quarzgerieben von faustgroße. Das thonige Bindemittel sondert sich durch größere Anhäufung aus, und der Sandstein wird schiefrig, geht selbst in Schieferthon über. In der Regel ist das Dach der Kohlenflöße Schieferthon, welcher in der Mächtigkeit von 1 Fuß bis zu 6 Lachter abändert. Seltener ist auch die Sohle thonig. In dem Steinbruche von Rattowitz zeigen sich diese Gesteine gänzlich verändert. Der Sandstein ist mehr oder weniger gefritzt, in dichten Quarzfels verwandelt, wird weiß, durch Eisenoxyd stellenweise roth gefärbt, und diese Färbung findet sich in parallelen Streifen vertheilt. Es kommen auch Sandsteine von bläulichgrauer

Farbe vor, welche etwas ganz eigenthümliches Schlackiges zeigen. Die Schieferthone sind roth gebrannt, selten violett, in Porcellanjaspis verwandelt. Schieferige Abänderungen von Sandstein sind aufgebläht in der Richtung der schieferigen Structur und die abgeforderten Theile erhalten ein geschmolzenes Ansehen, oder sind in kleine Stücke gebrochen, gebrannt, und mit einer schwärzlichen, glänzenden Rinde von Grünstein überzogen; diese wird öfters dicker, blasig, ja sogar schädig, und kettet die losen Sandsteinstücke zusammen. Für gewöhnlich bildet der Diorit 1 bis 5 Zoll mächtige Gänge im Sandsteine, ist von so feinkörnigem Gefüge, daß man die Gemengtheile nicht bestimmen kann, und folglich auch das Gestein nicht nach den von G. Rose angegebenen Sonderungen. Die Farbe des Diorites ist dunkelgrün, und geht stufenweise in's Schwärzlichgraue über. Die den Sandstein durchziehenden Gänge streichen nicht nur in die Höhe, sie nehmen vielmehr alle möglichen Richtungen an, stellenweise anastomosiren sie vollkommen. Nicht nur die Gänge sind mit Diorit ausgefüllt, sondern auch in die Schichtungsbeförderungen des Sandsteines dringt er hinein, mengt sich mit diesem, färbt ihn schwarz, und verliert sich bey größerer Entfernung vom Gange. Dasselbe Phänomen wiederholt sich hier im Kleinen, das sich im Großen in der blauen Kuppe bey Schwelze beyrn Basalt und bunten Sandstein zeigt. Die ganze Masse des Sandsteines erleidet auch auf eine andere Art eine Umänderung, sie wird nehmlich gefrittet und von Diorit durchdrungen, und erhält so eine lauchgrüne Farbe. Wäre nicht die Ursache dieser Veränderung in der Nähe, so würde das Gestein sehr problematisch erscheinen. Von Ausfonderungen metallischer Substanzen finden sich hier keine Spuren, nur auf den Absonderungsflächen des gefrittetten Sandsteines zeigt sich weißer Hyalith als rindenartiger Ueberzug. Die Stellung der Schichten im Bruche von Rattowice gibt ein Bild der Zerstörung; sie neigen sich in alle Weltgegenden, im Allgemeinen fallen sie gegen Norden; der Winkel ist auch verschieden und schwankt zwischen 10° — 40°. Die zerstückten Stücke des Sandsteines bindet Diorit zusammen, und daher hat man noch jetzt das Bild, wie der durch unterirdische Kräfte gehobene Sandstein zerborsten und zerfallen war. Nicht nur bey Rattowice finden sich Veränderungen im Sandsteine, sondern noch an vielen anderen Punkten, namentlich sind bichte aus der neuen Straße, welche von Rattowice nach Königshütte führt, zwei Punkte, wo der Schieferthon roth, zum Theile auch dunkelbraun gebrannt ist. In der Hebojogegrube, einer im Walde bey Königshütte liegenden Kohलगrube, erstreckt der Schieferthon die merkwürdigsten Umänderungen. Er verwandelte sich theils in rothen Porcellanjaspis, theils in ein homogenes Gestein, welches sich vom grünen Wandjaspis nicht unterscheiden läßt. Im rothen Porcellanjaspis finden sich prächtig erhaltene Spheopteris-, Pecopteris- und Bechera-Abdrücke mit erhaltenen feinsten Nerven. Es ist wohl glaublich, daß die verschiedenen vorhistorischen Kohlenbrände in Oberschlesien, als in der Ganniggrube bey Michalkowitz, in der Louisengrube bey Kabre, im Frankflöß Jamorno im Freysaat Kreutau, von diesem plutonischen Prozesse herculiren. Aus dem Vorgetragenen folgt: 1) Daß der Grünstein, indem er zu Tage kam, feurig flüssig war. 2) Daß der Sandstein und Schieferthon von ihm gebrannt wurden. 3) Daß die Hebung des ober-schlesisch-polnischen Kohलगebirges der Grünstein bewirkte. —

Nachmann bemerkte am Schlusse dieses Vortrages, daß man noch kein Beispiel kenne, daß Grünstein und Porphyr Veränderungen in der Beschaffenheit des durchbrochenen Sandsteines

Jhs 1838. Heft 7.

wahnehmbar machte. Zippe erwähnte einer solchen Frittung der feinkörnigen Grauwacke durch Porphyr, welche sich in der Nachbarschaft von Drabnoaugeß und Wegranow im berauner Kreise wahrnehmen läßt.

15) Zippe liest eine vom Hrn. Referstein aus Halle eingeschickte Abhandlung über die geognostische Beschaffenheit der Gegend von Töplitz mit besonderer Hinsicht auf die Verhältnisse der Braunkohlen- und der Kreideformation. Nach dem Schlusse der Abhandlung, welche hauptsächlich zu beweisen suchte, daß die Ablagerung der Braunkohlenformation älter sey als die der Kreideformation, widersprachen v. Buch und Röggerath dieser Ansicht, und führten Beispiele an, wo aus der Lagerungsfolge das jüngere Alter der Braunkohlenformation dargethan wird. Dr. Ruß führte solche Verhältnisse selbst aus der Gegend von Töplitz an.

16) Dr. Göppert machte Versuche über künstliche Versteinierungen.

17) Prof. Friesse aus Innsbruck zeigte einen seltenen Pflanzenabdruck auf Stinkschiefer von Häring in Tyrol.

18) Prof. Schmiedel, Statistk von Oesterreich, zunächst von Tyrol.

19) Bonsdorff, gebiegen Gold von Tornoe.

20) Schrötter, Brand-Erz mit Idrialith.

21) Zaidinger, Korund aus Böhmen in Cyanit.

22) Prof. Otto legte eine bedeutende Anzahl trefflicher Abbildungen von Versteinierungen aus dem Quadersandstein der Grafschaft Glas, dem Muschelkalk in Oberschlesien, dem rothen Todtliegenden und dem Uebergangskalk in Schlesien vor, welche er gesammelt und demnächst zur Herausgabe bestimmt habe. Mehrere darunter seyen wahrscheinlich, einige auch zuverlässig neue Arten. Als vorzüglich merkwürdig wurden hervorgehoben: Eine wahrscheinlich neue Art von Ostrea aus dem Quadersandstein; eine neue Art von Leuciscus aus dem Mergel, welcher mit Gyps bey Kattchau vorkommt; Kiefern eines Repetis aus dem Muschelkalk von Kopitz; ein Zoophyt aus der Gattung Eschara, dann ein Fragment einer Ostrea aus demselben Muschelkalk; eine gute Abbildung von Palaeoniscus Wratislawiensis, welchem der Beiname nunmehr mit größerm Rechte zukomme, als seit der Bestimmung und Benennung dieses Fisches bey der Versammlung der Naturforscher zu Breslau derselbe auch wirklich in Schlesien, und zwar bey Neuborf gefunden worden sey. (Agassiz habe den Namen in Beziehung auf die Breslauer Versammlung und in der Meinung gegeben, daß die dort vorgezeigten Exemplare aus Schlesien seyen; sie waren aber von Ruppertsdorf bey Braunau in Böhmen.) Otto zeigte eine Reihe von Abbildungen dieses Fisches mit großen Verschiedenheiten in dem Verhältnisse ihrer Dimensionen, und machte darauf aufmerksam, daß man leicht verkennt werden könne, die Extreme dieser Reihe für verschiedene Species zu halten. Prof. Heinrich bemerkte, daß er diesen Fisch auch auf der Colonie Nepomuk bey Landstern gefunden habe. Eine Abbildung eines trefflichen Exemplares von Pa-

*Iaeoniscus lepidurus* von Ottenhof bei Braunau in Böhmen; eine Art von *Euomphalus*, eine von *Sigaretus*, beide vielleicht neu, aus Uebergangskalk, dann eine *Fucoides* in rothem Marmor aus der Grafschaft Glas; viele *Terebrateln*, worunter 3 Arten vielleicht neu, 2 *Ammoniten*, von welchen Herr Leopold von Buch den einen als einen *Gonyatiten* mit sehr breitem Rücken und scharfen Kanten auch in den ältesten Schichten des Uebergangskalkes im Bayreuthischen vorkommend, den andern als *planorbiformis* bestimmte.

23) Prof. Germar über *Calamiten*. Die Biegungen, welche häufig in den Längstreifen vorkommen, seien nicht als Merkmale besonderer Species zu betrachten; sie finden sich auch mit umgebogenen Streifungen zusammen, so bey *Calam. undulatus*. Ein Absatz finde sich immer nach dem neunten Gliede. Er habe auch die Blätter der *Calamiten* gefunden; aus diesen gehe hervor, daß die im Kuipersandstein vorkommenden Equiseten seien, nicht aber die der Steinkohlenformation. Die Knötchen an den *Calamiten* flossen Ueberreste der Blattwurzeln, und alle *Calamiten* seien bloß Steinkerne, daher die Blätter äußerst selten. Göppert hält dafür, daß diese Knötchen mehr den Aesten der *Calamiten* als bloßen Blattansätzen entsprechen dürften. Dr. Säger aber äußert, daß diese *Calamiten* mit Knötchen zu *Pterophyllum* gehören dürften. Prof. Germar schließt mit der Bemerkung, daß man unter den *Calamiten* wahrscheinlich mehrere Gattungen werde unterscheiden müssen.

24) Prof. Säger zeigt *Gypsabgüsse* von Zähnen von *Mastodonsaurus salamandroides*, und macht Bemerkungen über die vorher getrennten beyden Species, welche nunmehr unter dem angeführten Namen in eine einzige vereinigt werden. Ferner zeigt er *Gypsabgüsse* von Zähnen aus der Melasse, welche nach Vergleichung mit den Zähnen der Lebenden wahrscheinlich dem Wallstoffe angehören. Dann theilte er Beobachtungen mit, welche er in Beziehung auf die merkwürdigen Absonderungen in der Structur des Kuipersandsteines gemacht habe. Die Sandsteine brechen in Parallelepipedon, deren Ecken zuweilen abgestumpft seyen. Die merkwürdigen Absonderungen der Massen wiederholen sich regelmäßiger, und seyen viel häufiger, als bey dem bunten Sandsteine, welcher sonst in mehreren Beziehungen mit dem Kuipersandstein übereinkomme. Hierauf zeigte derselbe Flugsand aus der Irbischen Wüste, welcher nebst andern Mineralien vom Cap, aus Neuholland und China durch Dr. Ludwig nach Stuttgart gebracht worden sey. Dieser Flugsand besteht bloß aus Quarzformen ohne andere Beimengungen, von graulich weißer Farbe, halbdurchsichtig, die Körner fast von der Größe eines Hirschkornes, und darin ziemlich gleich. (Bei der Versammlung der Naturforscher in Wien wurden Parthien von Sand aus der Irbischen, nubischen und arabischen Wüste vorgelegt, welche Ritter Professor von Osten mitgebracht hatte; sie unterscheiden sich wesentlich durch Farbe und Größe der Körner; der Sand der nubischen Wüste ist fast ochergelb, und der arabische ist viel gröber. Untersuchungen mit dem Microscope zeigten damals an der etwas matten Oberfläche der Körner durchaus keine Spur von Bruchflächen, auch scheinen sie ihre rundliche Gestalt nicht der Abreibung zu verdanken, sie scheint eine ursprüngliche. Es wurde damals die Bemerkung gemacht, daß der Wüstenand in geologischer Hinsicht vorzüglich auch deshalb wichtig sey, weil er die ausgedehnteste Formation der Erdrinde bilde.)

25) Dr. Abich spricht über Erhebungs-Krater und das Band eines innern Zusammenhanges, welches in der Richtung bestimmter Linien räumlich oft weit von einander getrennte vulcanische Erscheinungen und Gebilde zu ausgedehnten Zügen unter einander vereinigt. Er legte topographisch-geognostische Charten und erläuternde Ansichten von der Linie vor, welche von der Insel Ischia über den Vesuv in nordöstlicher Richtung über die Appenninen bis zur See läuft. Er sprach dann von der Natur des erloschenen Vulcanes Vultur in der Provinz Basilicata und nannte diesen als eine besondere Modification eines deutlichen Erhebungskraters. Einige Notizen des verewigten Prochi waren die Veranlassung zur Reise in das vulcanische Gebiet des Vulturs, welcher in der oben angegebenen Linie liegt. Der Weg ging durch die Campagna über Cisterna nach Monte Forte und Avellino. Auf diesem etwa 20 bis 21 Miglien weiten Wege erregt zuerst das mächtige Aufsteigen eines Leuzitgesteines bei Cisterna Interesse; es ist dem den Monte Somma zusammenfallenden ähnlich, die Entfernung vom Somma beträgt vier Miglien; es findet sich hier unter Bedeckung von lockeren Schichten von Bimssteinruß in bedeutenden Steinbrüchen. Da ähnliche Massen auch in der Campagna di Roma und am Vultur erscheinen, so lassen sie auf einen gangartigen Durchbruch dieser Massen schließen. In dem engen Thale, welches von Mugnano nach dem Monte Forte hinauf zieht, zeigen sich Ablagerungen von Bimssteinruß, welcher sich in dieser Richtung tief in die Appenninen hinein erstreckt. Derselben Massen bedecken den Boden des Thales, in dessen Mitte Avellino liegt und lehnen sich an den Fuß der Kalkgebirge. Weißer Bimssteinruß liegt sich bis zum Gipfel des Monte Vergine (6012 par. Fuß über dem Meere) verfolgen. Der Weg führte weiter von Avellino über Mirabella nach Frigento zu den berühmten Wasserfällen in Thal Ansaute. Bei Mirabella zeigt sich noch die Fortsetzung der vulcanischen Zuffe, welche sonst jenseits der Wasserscheide der Appenninen nicht erscheinen. Von der Höhe von Frigento (3092 par. Fuß) überschaut man die östliche Seite des Gebirges, welches mit Ausnahme der Erhebung des Vulturs sich als ausgedehntes Hochland gestaltet, über welches sich der genannte Berg von hier aus gesehen in der Form eines flachen stark abgestumpften Kegels erhebt. Das Thal und der See von Ansaute liegt drei Miglien von Frigento in südlicher Richtung, 2260 par. Fuß Meereshöhe. Noch heute entspricht die Dertlichkeit der Schilderung, welche Virgil von dieser Gegend macht, wo er die Furie Meleto zur Unterwelt hinabstiegen läßt. Es ist ein Kesselthal mit sanften Abhängen, welches gegen Westen in eine enge Schlucht ausläuft, Vade mortale genannt. Von den beiden Hainen, welche zu Virgils Zeiten den Eingang in dieses Thal beschatteten, ist erst zu Murats Zeiten der eine umgehauen worden. Der See im Grunde dieses Thales hat ungefähr 25 Meter im Durchmesser, das Wasser ist schmutzgrau und schlammig. Kohlensäure und Schwefelwasserstoffgas entbinden sich fortwährend, und erhalten den See in einer Art von kochender heftiger Bewegung, so daß die aufsprudelnde Flüssigkeit an mehreren Stellen zu einigen Fuß Höhe getrieben wird. Auch dem Boden des Thales im Umkreise des See's entströmen diese Gaskarten, so daß das ganze Thal mit einer Schicht von Kobstensäure bedeckt ist, und nur mit Vorsicht und bey bewegter Luft betreten werden kann. Merkwürdig sind die Veränderungen und Umwandlungen, welche die Gesteine im Thale durch die Einwirkung dieser Mofetten erlitten haben. Der bläuliche schiefrige Kalkstein mit Zwischenlagern von Cons-

glomeraten ist in kalkigen und thonigen Mergel und Gyps umgebend, welcher in zahllosen größeren und kleineren Erystallen in den Halben zerstreut ist, welche der blaue Thon um die trockenen Mofetten bildet. Auch die Schwefelbildung fehlt hier nicht, besonders in dem Thone auf dem Grunde des Thales. Die trockenen Gasquellen fand Abich um 8 Uhr früh 19,5° Cent. bei 18,50° Cent. Lufttemperatur. Die Differenz des Psychrometers war in der Gasquelle 2½°, in der Luft aber 5°. Die Temperatur am Boden des Thales war 24°, die des See's 24—25° und die Psychrometerdifferenz 2°, außer dem Reich der Gasemanationen blieb sie 5, ein Beweis der Wasserdampfmenge, die zugleich mit der Kohlensäure aufsteigt. Auch eine ausgezeichnete Mineralquelle findet sich eine halbe Stunde von Lago Infante am äußersten Ausgange des Bades Mortale in der Nähe von Villa Maina. Dieser Ort liegt auf einem mächtigen Hügel, und ist ungesund geworden, seitdem der ihn früher vor den mephitischen Ausdünstungen des Sees schützende Hain umgehauen worden. Die Quelle ist schwefelsäurig, und ihre Temperatur 27,5 Cent. Mit der größeren Annäherung an das Gebiet des Valturs verliert sich der Plateau-Character der Landschaft immer mehr; die tief eingeschnittenen Thäler des Clusento und Ofanto mit ihren nackten Gebängen geben der Gegend das Gepräge einer wahren Gebirgsnatur. Von der Höhe von Monte Verde überseht man das Gebiet des Valturs in seiner ganzen Ausdehnung. Majestätisch überragt seine obere Masse die vorliegende Hügelreihe jenseits des Ausflusses. Seine Gestalt verträgt sich allerdings mit der Vorstellung eines abgestumpften Kegels, dessen dem Beschauer zugekehrte Seite eingestürzt und fortgeführt zu seyn scheint, und in dessen Innern man Spuren eines Eruptionskegels zu erkennen glaubt. Verfährt durch die Umrisse dieser Gebirgsmasse ist man geneigt, sie für ein zerstücktes Analogon des Gassio zu halten, und steigt in dieser Voraussetzung den steilen Abhang zum Flußbette des Ofanto hinab. Doch zeigt sich keine Spur einer vulkanischen Gebirgsart, nur abgerundete Gesteine der Appenninenformation zeigen sich hier, und in den beinahe undurchdringlichen Wäldungen an seinen Abhängen sieht man nur Appenninen-Kalkstein mit Feuersteinen, überall mit verworrenen und zugleich aufgerichteten Schichten. Erst nachdem man 1½ Miglien vom Ofanto am sanften Abhang hinangestiegen, treten plötzlich senkrecht anstehende Massen eines Augitporphyrgesteins entgegen; doch nur gering ist seine Verbreitung, denn noch in bey weitem größerer Höhe läßt sich der aufgerichtete Felskalk verfolgen. Endlich zum Innern des Berges gelangt, sieht man ein conglomeratartiges Gestein mit einer großen Menge von Augit- und Hornblende-Erystallen, welches hier herrschend wird, durchaus ohne bestimmte Lagerungsverhältnisse. Die ganze Basis des Valturs hat einen Umfang von 20 Miglien; er wird durch ein Aggregat mehrerer aneinander gereihter Berge gebildet, deren höchster Punkt St. Michele 2468 par. Fuß über Meißi und 4156 Fuß über dem Meere erhaben ist. Die Abhänge dieser Berge fallen nach Innen zu unter verschiedenen Winkeln steil ein, nach Außen ziehen sehr, sanft gewölbte Rücken hinab, die Form des Berges wechselt sehr stark, je nachdem man sich ihm von verschiedenen Seiten nähert. Das erwähnte Conglomerat mit Augit und Hornblende bildet unter verschiedenen Modifikationen die herrschende Felsart. Im innern Raume des gekrümmten Berges finden sich regellos gruppierte Erhebungen des als Grundgestein bezeichneten festen Conglomerates. Weiter gegen Süden, wo das Aufhören dieser Massen zugleich

eine große Abstufung des Terrains bezeichnet, findet sich auf der zweiten Stufe eine große kreisförmige Weitung, welche zwey mit einander in Verbindung stehende See'n umschließt. Keine Tuffe, keine Auswürfinge. Alles deutet auf einen Einsturz. Das feste Conglomerat auf der einen Seite und auf der andern in nicht großer Entfernung die aufgerichteten Kalksteinschichten. Die See'n sind 2093 par. Fuß über dem Meer und 286 Fuß über denselben findet sich an einem steilen Abhange ein Capuzinerkloster. Der größte dieser See'n hat ungefähr 2 Miglien, der kleinere, unmittelbar unterhalb des Klosters gelegene aber nur eine Miglie im Umfange, die Tiefe beider beläuft sich auf ungefähr 100 Palmi. An wenigen Stellen am Rande bemerkt man schwache Entwicklung von kohlensaurem Gase; das Wasser ist übrigens rein und klar und die See'n enthalten gute Fische. (In den Jahren 1810 und 1820 entstand in den Sommermonaten nach lange anhaltenden Regengüssen an mehreren Stellen der angeschwellten See'n eine so starke Bewegung im Wasser durch die vermehrte Gasentwicklung, daß es an mehreren Punkten in Sprungquellen ähnlichen Strubeln bis zu 14 und 16 Fuß empor getrieben wurde. Brochi hat eine Beschreibung dieser, 23 bis 24 Tage anhaltenden, von unterirdischem Dröhnen begleiteten Erscheinung der Academie in Neapel mitgetheilt.) Auf den Abhängen des Berges, dessen Kern aus den genannten Conglomeraten und Basaltmassen besteht, findet sich eine Ablagerung basaltischer Tuffe, deren Verbreitung jedoch nur örtlich ist. Eine trachytische Formation tritt örtlich von Meißi am nördlichen Fuße des Berges an den Ufern des Flusses auf; man sieht deutlich ihre Forterstücke unter den Augit- und Leuzitgesteinen nach dem Innern des Berges. Dieser Trachyt ist hauptsächlich durch eingemengten schwarzen Halyn (?) ausgezeichnet; auch gibt es hier Abänderungen, welche durch die Größe der Feldspathcrystalle dem Trachyt des Drachenfels am Niederrhein gleichen. Auch der Kern des Berges, auf dessen flachem Rücken die Stadt Meißi liegt, besteht aus einem Gestein, in welchem Halyn einen vorwaltenden wesentlichen Gemengtheil bildet; außerdem aber auch Leuzit, sowohl fein eingeprengt, als auch in großen kugligen Massen ausgeföhrt, stets von gläserner Beschaffenheit. So wie der Pyroxen den Augitporphyr, so charakterisirt die schwarze Varietät von Halyn diese Felsart als eigenthümliches Gebilde; welchem man den Namen Halynporphyr beilegen könnte. Seine entsprechenden Conglomerate und Tuffe sind besonders mächtig im angrenzenden Tuffhügel des Monte Labore entwickelt, und vermengen sich mit denen der vorübergehenden Formationen auf eine schwer zu unterscheidende Weise. Am Fuße des südöstlichen Vergabanges ist bey dem Städtchen Alesia eine mächtige Ablagerung von Bimssteintuff, aus welchem eine frische Mineralquelle entspringt, merkwürdig; auf dem Tuff findet sich eine Schwefel-Kalksteinbildung abgelagert. Aus den Lagerungsverhältnissen der hier berührten Formationen und ihren Beziehungen zu den mit ihnen in Verührung tretenden Gliedern der Appenninenformation ergibt sich, daß von der Bildung des Berges bis zu seiner jetzigen Gestalt allgemeine, theils besondere, blos local wirkende Kräfte in mehreren Perioden thätig waren, wovon der letzte Act die energische Wirkung einer gewaltigen Erhebungs-Ursache gewesen seyn mag. Dieselbe Kraft, welche unter dem gleichförmigen Drucke des Meeres den vollkommensten Typus eines Erhebungskraters hervorzubringen vermag, wird im Innern des Felslandes stets mehr und weniger Störungen in der regelmäßigen Entwicklung ihrer Gebilde erfahren, und es ist bemerke-

wert, wie bey dem Erhebungskeater des Vulturs eine großartige Spaltenbildung in der Längendimension seiner Hauptzüge deutlich ausgeprägt ist, während ein regelmäßiges Aufstehen gleichgeneigter Massen um ein gemeinschaftliches Centrum nicht wahrzunehmen ist. Eben deshalb zeigt sich aber der Vultur als ein höchst interessantes verbindendes Glied in der Reihe analoger, bereits bekannter und doch rückfichtlich des inneren Baues so sehr von ihm verschiedener Gebilde; er dürfte dem Cantal und Mont b'Dr an ähnlichen Beziehungen näher stehen, als alle übrigen, bisher bekannt gewordenen Erhebungskeater.

26) Apotheker **Oswald** aus **Leis** in **Schlesien** zeigt **Schleifische Mineralien**.

27) Hofrath **Tilesius** zeigt **Abbildungen** von **ethnographischen Gegenständen**.

28) Prof. **Frankenheim** spricht über einige Beziehungen der Chemie zur Crystallologie, von Messungen der Crystalle mit dem Microscop und von der Bestimmung der Lage von Crystallen, welche durch Abdampfung aus einer Auflösung auf einer crystallinischen Unterlage erhalten werden, in Beziehung auf diese Unterlage. Die crystallisirenden Körper äußern ein Bestreben nach paralleler Stellung gegen ihre crystallinische Unterlage; dieses gehe so weit, daß sich bey einigen nicht nur ihre gewöhnliche Crystallform, sondern zuweilen auch das Crystallsystem ändere. So erscheine Jodkalium, dessen gewöhnliche und so zu sagen constante Crystallform das Herader sey, in der Gestalt von Octaedern, wenn man es auf Glimmer crystallisiren lasse; eine Fläche des Octaëders sey dann immer der vollkommenen Theilungsfläche des Glimmers parallel. Das Crystallsystem des Salpeters, bekanntlich ein prismatisches, ändere sich in ein rhomboëdrisches, dem Kalkspathe isomorphes um, auf einer Unterlage aus einem Mineral dieses Crystallsystemes. Lasse man salpetersaures Natron auf Kalkspath crystallisiren, so haben beyderley Crystalle entweder eine Seite, oder auch eine Seite und eine Diagonale gemeinschaftlich. Die Temperatur, Concentration, fremde Vermengungen haben keinen Einfluß auf die Crystallform, wohl aber die Unterlage, auf welcher sich die Crystalle bilden. Innerhalb der Flüssigkeit bilden sich die Crystalle in der Kernform; Combinationen entstehen durch andere Umstände.

29) Prof. **Breithaupt** spricht über regelmäßige Verwachungen von Crystallen zweyer und dreyer verschiedener Mineralpecies. Er erwähnt einiger, bereits bekannter, hieher gehöriger Beispiele nur beiläufig, und zeigt ähnliche regelmäßige Verwachungen am Quarz und Feldspath; eine solche sey der bekannte Schriftgranit. An ausgebildeten Crystallen dieser Mineralien zeigte Hr. B. die Stellung der beyderley Crystalle: eine Fläche der Pyramide des Quarzes ist nemlich parallel einer Fläche des vertikalen Prismas des Feldspathes; zugleich haben beyde Crystalle zwey bestimmte Kanten ebenfalls parallel. Ein ansehnlicher Feldspathcrystall erschien auf diese Art regelmäßig mit Quarzcrystallen besetzt, welche bey ihrer Durchwachsung mit dem Feldspathe Schriftgranit bilden. An Pseudomorphosen von Quarz nach Kalkspath seien die Flächen des Quarzrhomboëders parallel den Flächen des Rhomboëders von halber Arentlänge des Kalkspaths. Der heraderische Eisenfels stehe mit den Heraderflächen auf den macrodiagonalen Flächen des prismatischen Eisenkieses. Als ein Beispiel von regelmäßiger Ver-

wachsung von drey verschiedenen Mineralien zeigte Hr. B. den sogenannten gestrichten Kiesel von Sterzing, welcher aus zarten Amphibolcrystallen besteht, die in einer solchen Stellung regelmäßig mit Nautenpath verwachsen sind, daß ihre vertikalen Kanten den Polkanten der Rhomboëder des Nautenpathes parallel sind. Zuweilen finden sich noch Blättchen von Chlorit so mit diesen beyden Mineralien verwachsen, daß die vollkommene Theilungsfläche der Chloritcrystalle senkrecht auf der Axe des Rhomboëders des Nautenpathes stehe, und in ihrer Lage solchergestalt der Fläche D R. (der Endfläche) entspreche, dann seien auch die Rhomboëderflächen der Chloritcrystalle in paralleler Stellung mit den Rhomboëden des Nautenpathes.

30) Jreth. v. **Stranz**, über die großen Wirkungen der erplobirenden Gase in Erdböhlen und über Höhlenverband, mit Beziehung auf die Erdbeben.

In einer Zeit, wo man in der Geologie so bemüht ist, alle vorkommenden Erscheinungen möglichst zu erklären, muß uns daran liegen, keinen Gegenstand der Forschung aus dem Gebiete anderer Wissenschaften unberücksichtigt zu lassen. Es dürfen mithin die Kriegswissenschaften, insofern sie das Gebiet der Physik und Chemie berühren, nicht davon ausgeschlossen werden, zu deren Vervollkommnung viele kostspieligen Versuche im Großen Statt finden, welche die Mittel eines Privatmannes übersteigen. Versuchen wir daher die Theorie des unterirdischen oder Minenkrieges für unsere Studien zu benutzen. Das Schießpulver äußert bey seiner Entzündung in einem eingeschlossenen Erdraum eine Expansivkraft, gleich den vulcanischen Ausbrüchen, hier als Mine, und zwar vorzugsweise nach der mindesten Widerstandslinie, darunter auch die Mineneise verstanden wird. Diese Widerstandslinie findet bey einem wagrechten Boden zu Lage wirkend, senkrecht, bey einem Berge, nach Lage des Minenofens, hiezuwie auch seitwärts ausgehend Statt, gleich dem Seitenausbrüchen bey vulcanischen Kegelnbergen, wodurch Erdtrichter entstehen, auf die wir weiterhin zurückkommen werden. Wir wissen ebenfalls, daß eine Reihe von Minenöfen, bey doppeitem Abstände ihrer Widerstandslinie neben einander gelegt, eine gemeinschaftliche Zündung zulassen, und daß mittelst diesem Lauffeuer auf großen Strecken successive Wirkungen hervorgerbracht werden, die mit den Erdbeben unserer vulcanischen Zone zu vergleichen sind, wo nach Verhältnis des Widerstandes der Erdoberfläche Erschütterungen oder Explosionen entstehen, sich endlich neue Vulkane ergeben, oder alte, welche bisher geruht, von Neuem wieder in Thätigkeit kommen. Was nun das Streichen der vulcanischen Zone betrifft, so fällt dieses mit den Gebirgen der Continente sowohl, als mit den untermeerischen Gebirgen zusammen. Wir erkennen mithin hier Hebungen, mit Zurücklassung hohler Räume in großer Tiefe, meist verbunden durch Randle, nemlich hier den Luftzug befördernde Spalten, dergleichen Höhlen auch mit einer Centralhöhle in Verbindung stehen dürfen, aus welcher die vulcanischen Stöße sich periodisch entwickeln. Es sprechen mithin die Erdbeben für einen solchen Höhlenverband, indem sie unter den Gebirgen, oder längs ihrem Fuße streichen, der noch weiter unter die Tiefseebenen, und selbst unter dem Meere fortziehen kann. Ginge die Kraft vom Mittelpunkte der Erde aus, so würde sie, der mindesten Widerstandslinie folgend, vorzugsweise gegen die Tiefseebenen, den Ocean insbesondere sich äußern, ein Fall, der jedoch umgekehrt Statt findet. Wir wissen ferner, daß man sich keine Versenkungen ohne Raum zur Aufnahme jener Massen denken kann, daß die



muldenartigen oder kesselartigen Vertiefungen, so wie die Seiten des stärksten Abfalles eines Gebirges, wenn Längenthaler oder Meere seinen Fuß begrenzen, für Senkungen zeugen, wozu alle Rund- oder Wasserberge unbedingt Hebung erkennen lassen, indem hier die Aufrichtung der Schichten darauf hindeutet. Betrachten wir näher die expansiven Wirkungen, insofern sie einen Krater oder große Vertiefungen hervorbringen. Eine Pulvermaße auf eine gewisse Tiefe als Mine gelegt, bildet bei ihrer Explosion, indem sie die Erde durchbrechend zu Tage geht, einen Erdtrichter, kegelförmigen Auswurf, der durch das Zurückfallen der Erde zum Theile wieder ausgefüllt wird und dabei nach Größe der Ladung und Tiefe der Mine einen Durchmesser der doppelten bis sechsfachen mindesten Widerstandlinie hervorbringt; außerdem noch eine Seitenpressung von gleichem Radius des Trichters, nemlich Erd-Erschütterung, Auflockerung und Quetschung der Nebengallerien (oder damit zu vergleichen Nebenhöhlen) bewirkt. Die Erfahrungen, in so weit wir davon Grundregeln ableiten, erstrecken sich indeß bei den Kriegs-Minen nur zu 24 Fuß Tiefe, und 500 Centner an Pulverladung. So z. B. erhielt man 1762 bei der Belagerung von Schweidnitz mit 500 berl. Centner (5500 berl. Pfund) Ladung und 15 rheinl. Fuß Minientiefe, einen Erdtrichter von 84—94 Fuß, dagegen bei gleicher Ladung aber 24 Fuß Tiefe nur von einigen 60—70 Fuß im Durchmesser. Ein Mehreres bedarf er für unseren Zweck nicht. — Ähnliche Erdtrichter kommen bisweilen in der Natur vor, wo augenblickliche Explosionen Statt gefunden haben, die von Menschen für eingegangene Vulcane angesehen werden. Eben so denken wir uns auch das Entstehen der vulcanischen Conen. Zur Erklärung eines gleichzeitigen Einsturzes mehrerer Berge dienet ebenfalls die Theorie jener mindesten Widerstandlinie, indem wir uns die Expansivkräfte innerhalb eines Erdgewölbes denken, dem andere Höhlen zur Seite liegen, oder im Umkreise umgeben, wo alsdann die Zwischenwände, wenn sie an Mächtigkeit der Erdröcke nachstehen, bei dieser Explosion eingestürzen werden, mithin einen gemeinsamen Einsturz veranlassen. Unter einem solchen Falle begreifen wir jenen, mit dem Erdbeben zu Lissabon 1755 verbundenen Einsturz einer Felsenkette, von dort bis Mogador. Einzelne Bergeneinstürze können aber auch durch zu große Spannung ihres Gewölbes, und eben so im Verlaufe der Zeit durch Verwitterung hervorgebracht werden. Endlich können noch chemische Veranlassungen partielle Einstürze im Innern, auch große Erdbeben veranlassen. Rückenkungen können gleich nach Erhebung einer Bergmasse durch Nachlaß jener mechanischen Kräfte, oder auch durch Uebergang der Körper aus dem flüssigen in concreten Zustand finden, in letzterem Falle bei den aufgelagerten Schichten der Gebirgsmassen sich Vertiefungen ergeben, welche die Vertikalhälter bilden. — Was Herr von Carnall in neuerer Zeit Beachtungswürthes über Hebungen und Senkungen gesagt, stimme ich in Allem bei, als diesem mehrere meiner Betrachtungen sich anschließen. Schließlich glaube ich noch von den Naturerscheinungen, die sich in unsern Tagen ereignen, bemerken zu müssen: „daß häufig Senkungen im Großen Statt finden, während die Hebungen im Großen noch manchem Zweifel unterliegen, diese als erwiesen, insularisch zerstreut nur im Kleinen vorkommen“; woran sich manche Betrachtungen anknüpfen lassen, welche aber hier zu weit führen dürften.

31) Prof. Zippe legte die vom Hrn. Meier, k. k. Hofr. in Wien, eingesandte geognostische Chartre eines Theiles Afri 1838. Heft 8.

des südlichen und mittleren Böhmens vor, und las die dazu gehörigen Erläuterungen und Bemerkungen.

Diese Chartre umfaßt das Uebergangsgebirg im Kaurzimer, Berauner, Rakonitzer, Pilsner und Klattauer Kreise, das Granit- und Gneusgebirge des südlichen und südwestlichen Böhmens, und die auf die ältern Formationen aufgelagerten Flößgebirge, nemlich die Ablagerungen des älteren Flößgebirges von Budweis, und zwischen Kaurzim und Böhmischbrod, und die in den Bereich der Chartre fallenden Ablagerungen der jüngeren Flößformation. Mehrere Durchschnitte zur Veranschaulichung der Lagerungsverhältnisse waren der Chartre beigelegt. Der Wunsch, daß eine so umfassende Arbeit recht bald bekannt gemacht werden möge, wurde von allen anwesenden Geognosten laut ausgesprochen.

32) v. Bonsdorff, über die chemische Zusammensetzung des Labradorers und die Ursache seines Farbenspiels.

Diese sey in einem Ueberschuß von 5—6 pC. Kieselerde zu suchen, welche vielleicht sehr fein und gleichförmig eingemengter Quarz sey. Der nicht farbenspielende Labrador enthalte 52,0 Kieselerde, 30,0 Thonerde, 13,0 Kalk und 4,0 Natron, und gebe eine genaue chemische Formel, während die farbenspielenden Varietäten 57,0 und darüber Kieselerde enthalten, welcher Mehrbetrag nicht in die Formel gebracht, und somit als beigemengt betrachtet werden könne. Weitaupt bemerkt zu dieser Mittheilung, daß die farbenspielende Varietät ein anderes spez. Gew. besitze, als die übrigen, und Haidinger theilt die Beobachtung mit, daß die Farbenwanlung von Punkten ausgehe, welche in gehöriger Richtung unter dem Microscope betrachtet, eine regelmäßige Figur zeigen, welches eine Einmengung von fremdartiger Substanz in bestimmten Richtungen wahrscheinlich mache. v. Bonsdorff sprach dann weiter über das Austreiben der Kohlen säure aus kohlensauren Kalke durch Wasserdampf, und gründet darauf eine Theorie über den Ursprung der Kohlen säure in Mineral-Wässern, welche dem Zutritte von Wasser zu dem im Innern der Erde im glühend heißen Zustande vorhandenen kohlensauren Kalke zuzuschreiben sey. Er findet eine Bestätigung dieser Theorie in dem constanten Gehalte benachbarter Mineral-Wässer an kohlensauren Kalke bei sonst veränderlichen Verhältnissen der übrigen Bestandtheile.

33) Zippe legt Pläne der in seinem Vortrage in der allgemeinen Sitzung erwähnten vorhistorischen Wälle, und die verschlacten Gesteine des Burkower Walles vor.

Dr. Cotta macht hiezu die Mittheilung, daß sich in dem von Wenden bewohnten Theile der Lausitz eine bedeutende Zahl solcher Wälle finde, daß man jedoch bloß 3 gefunden habe, in welchen solche verschlacte Gesteine vorkommen.

34) Batka zeigte Crystallmodelle der Edelsteine von farbigem Glase (sogenannter Composition, mit welcher in Böhmern bekanntlich alle farbigen Edelsteine auf das täuschendste nachgeahmt werden); sie fanden sowohl wegen ihrer Richtigkeit und Nützlichkeit des Schließes, als auch wegen der Schönheit der Farben den verdienten Beifall.

35) Dr. Zeuschner legt ein von ihm entworfenes Profil der Karpathen vor, welches sich von dem von Pusch und Woul gegebenen wesentlich unterscheidet.

Das Urgebirge zeigt nicht blos Gneusgranit, sondern auch Glimmerschiefer, dann Talkschiefer mit Gängen, auf welchen die Schmelzinger Bergwerke umgehen. Er sprach dann über die Flözgebirge in den Karpathen, unter welchen bekanntlich die geognostische Stellung des Karpathensandsteines noch unentschieden ist. Die Stellung des Tatißchen Kalksteines sey noch unsicher. Die Versteinerungen des Klippentalkes, welcher in Karpathensandstein eingelagert ist, kommen im mittleren Jura und im Coral-Mag vor, auch zeigen sich Kreidepetrefacte, welche jedoch nach Beobachtungen von L. v. Buch ebenfalls in der Juraformation vorkommen. Einige Schichten führen die Petrefacten des unteren Doliths, daher sey der Karpathensandstein zur Juraformation gehörig. Im Sandstein des Trentschiner Comitatus komme *Gryphaea Columba* vor; die Ablagerung dieses Sandsteines erstreckt sich von Pressburg bis in die Wallachen auf 100 Meilen Länge bey 15 Meilen Breite; der Karpathensandstein dürfte demnach in die obere zur Kreide, und in die untere zum Dolith gehörige Formation zu trennen seyn. Die Salzablagerungen an den Karpathen sollen nach der allgemeinen Annahme tertiär seyn. Nach seinen Beobachtungen sind die Salzniebungen in Hon mit Hornstein usw. bey Dobromil von Karpathensandstein bedeckt, die Salzablagerungen am nördlichen Abhange der Karpathen bilden daher das Liegende des Karpathensandsteines. Nach den Versteinerungen von Wieticzka sey nichts zu bestimmen und über Ablagerungen am südlichen Abhange der Karpathen wisse man nichts Gewisses.

36) Dr. Reuß, über das Vorkommen des Pyrops.

37) Zippe legt einige vom Prof. Zawadsky in Przemyel eingeschickte Mineralien und Petrefacte vor.

Nr. 1) das neue Goldberg, welches in Szara Dorna in der Bukowina im Jahr 1836 entdeckt wurde, welches 8 pC. reines Gold (im Schlich?) liefern soll. Es wurde für ein dichtes Hornblendestein mit reichlich, aber fein eingepregnetem Eisenkies erkannt, welches daher wahrscheinlich goldhaltig seyn mag. Von gebiegenem Gold keine Spur. Nr. 2) Salmiak von Tschonow in österrösch Pöbolen, welcher in kugelförmigen Massen, in einem tertiären Sandsteine, der Tremblower Sandstein genannt, vorkommt. Das überschickte Exemplar ist ganz rein und frey von fremder Vermengung, derb, dünnklänglich zusammengefest und ganz dem in Fabriken durch Sublimation bereiteten Salmiak ähnlich. Es wurde jedoch die Bemerkung gemacht, daß unter den Varietäten des natürlichen Salmiaks in vulcanischen Gegenden ebenfalls mitunter solche reine Partien vorkommen. Nr. 3) ein Petrefact, welches im Dniester in österrösch Pöbolen gefunden, und dort *Diabli palee* (Teufelsfinger) genannt wird. Es ist ein Orthocerat mit sehr engen Concomerationen, welcher vermuthlich aus Uebergangskalkstein stammt. Es ist merkwürdig, daß auch bey Uns der gemeine Mann die Orthoceratiten mit dem angeführten Namen belegt. Nr. 4) kommt auf der Oberfläche des Flugsandes, welcher 6 Meilen von Przemyel große Strecken bedeckt, sehr häufig vor. Ist keine Versteinerung, sondern eine röhrenförmige Sandconcretion, wie sie in Sandablagerungen verschiedener Gegenden oft vorkommt.

38) Hofr. v. Edlenbach zu Prag zeigt ein Stück des in den Kohlengruben von Buschtiebrad stehenden fossilen Baum-

stammes mit der Rinde, in welcher deutliche Kohlentheilchen ausgeschieden erscheinen.

39) Prof. Kosmáßler sprach über Klippen im Bosensee mit theilweise eingeschlossenen Paludinen. Es sey zweifelhaft ob diese kalkhaltige Bildung als eine gegenwärtige anzusehen sey.

40) Prof. Zeuschner sprach über die Gruben des eblen Dpales von Gervonika. Man finde gegenwärtig den eblen Dpal in bläulichgrauen Trachtophyr eingeschlossen. Sehr merkwürdig sey das Vorkommen einer milchartigen Substanz, welche getrocknet kreidartig werde. Sie bestehe aus Kieselerde, vielleicht aus Infusorienpanzen.

41) Hofapoth. Zellner zeigt eine interessante Reihe von Zinkergzen aus Derschlitz, ausgezeichnete Exemplare von prismatischem und von rhomboedrischem Zinkernit, sowohl crystallisirt als derb und durch Vermengungen verunreinigt, nebst einigen anderen Mineralien, von welchen er die Resultate seiner chemischen Untersuchungen mittheilte.

42) Zippe legte ein Bruchstück einer Platte von Gusseisen mit halberhabenen Figuren vor, welche im Dorfe Kalmswiese auf der Herrschaft Tschich, nach dem deshalb amtlich aufgenommenen Protocoll angeblich inmitten eines Bruchsteines von Sandstein gefunden, und als ein Curiosum vom Herren Grafen Franz v. Thun-Hohenstein an die geognostische Section überichickt worden war. Vom Sandstein war ein Stück bezeugt; bey diesem, obwohl nicht ganz mit Gewisheit angegeben werden konnte, daß er von dem nämlichen Bruchsteine sey, zeigte sich das Bindemittel eisenhaltig. Aus dem Protocoll war ersichtlich, daß die Bruchsteine vor sehr langer Zeit mochten gebrochen worden seyn, da sie einem alten Steinhaufen entnommen wurden. Die Platte mochte durch ihre Verrostung wahrscheinlich selbst das Cement gebildet haben, welches sie vermöge ihrer zufälligen Lage zwischen zwey Steinblöcken mit diesem zusammenkittete.

Die Geognosten machten am 24. September eine Excursion ins Moldauthal.

## IV. Botanik.

Secretär: Opitz und Dr. Welwitsch.

1) Prof. Unger, über die Samenthiere der Pflanzen.

Die Lehre von der Befruchtung der Pflanzen, so wie von der Entwicklung des Pflanzengenes als Folge jenes Vorganges hat in neuester Zeit vor vielen andern schwierigen Gegenständen der Pflanzenphysiologie eine glückliche Erweiterung gefunden. In diese so geheimnißvolle Wirkamkeit der Natur ist durch mehrseitige Bemühungen ausgezeichneter Naturforscher so viel Licht gekommen, daß man schon jetzt mehrere bisher ganz unverständene Erscheinungen, welche mit dem Befruchtungssact in nothwendiger Verbindung stehen, mehr oder weniger umständlich zu erklären im Stande ist. Unstreifig spielt bey diesem Vorgange des reproduction Lebens der befruchtende Stoff eine der wichtigsten Rollen. Ihm habe ich durch längere Zeit meine Aufmerksamkeit geschenkt; ihm wünschte ich auch bey dieser Gelegen-



heit, wo so viele scharf prüfende Kenner versammelt sind, das Wort zu sprechen. Ich brauche nicht in das Gedächtnis rufen zu müssen, welche widerstreitende Ansichten man, noch bis auf den heutigen Tag, über die Natur jenes Stoffes ausgesprochen hat, und vielleicht noch gegenwärtig hegt; war man auch über seine physikalischen und chemischen Eigenschaften zum Theil im Einklange, so offenbarte sich doch in Bezug auf seine vitalen Eigenschaften eine desto größere Meinungsverschiedenheit, die man sogar bis auf die Geschlechtigkeit der Pflanzen ausdehnte, und diese einerseits eben so zu vertheidigen, als sie andererseits abzustreiten suchte. Als ich vor mehreren Jahren in der Befruchtungs-Feuchtigkeit des Torfmooses mit Hülfe sehr starker Vergrößerungen Wesen erkannte, welche mit einem Leibe und einem spiralig gebogenen Schwanze oder Rüssel versehen sind, deren Bewegungen selbstständig erschienen, und die nach allen Eigenschaften eine nicht zu verkennende Analogie mit den Samenthieren der Thiere und des Menschen zeigten: so glaubte ich zu dem Schlusse berechtigt, die Feuchtigkeit, welche diese offenbar thierischen Wesen enthielt, und die in den sogenannten Befruchtungsschläuchen enthalten war, in nächste Beziehung mit der Samenfeuchtigkeit der Thiere zu stellen, und so der wahren Bedeutung dieses Stoffes am nächsten auf die Spur gekommen zu seyn. Die Analogie ließ keinem Zweifel Raum, auch in der Fovilla des Pollens der vollkommeneren Pflanzen dieselbe Natur des befruchtenden Stoffes anzuerkennen. Fortgesetzte Beobachtungen haben die ersten Angaben nicht nur bestätigt, sondern noch Manches über die anatomische Structur der Moosanthidien und die Beschaffenheit und Lebensbedingungen ihrer Samenthiere hinzugefügt. In diesen Beobachtungen, welche ich vor nicht langer Zeit der Akademie der Naturforscher mittheilen die Ehre hatte, sprach ich mit Zuversicht die Hoffnung aus, die genannten Samenthiere, die ich bisher nur in der Gattung *Sphagnum* mit Sicherheit zu erkennen im Stande war, ohne Zweifel auch noch in andern Gattungen der Moose, und selbst der Lebermoose aufzufinden. Mit Beginn des letzten Frühlings, als die Blüthenzeit dieser Gewächse heranrückte, war ich bedacht, diesen Gegenstand weiter zu verfolgen. Wirklich habe ich mich in meinen Erwartungen nicht getäuscht: denn nicht nur in den mir blühend vorgekommenen Moosen, sondern auch in den Lebermoosen wurde die Existenz der Samenthiere in dem männlichen Befruchtungsorgane außer Zweifel gesetzt. Ich habe die Ehre, Ihnen hier die Resultate dieser letzteren Untersuchung in möglicher Kürze vorzulegen. Für *Polytrichum commune*, einer der gemeinsten diculmischen Moosarten, schien mir die letztere Hälfte des Monats May der geeignetste Zeitpunkt zu seyn, um in Bezug auf obige Gegenstände erfolgreiche Untersuchungen anzustellen. Die länglichen gelben Pollinarien dieses Mooses hatten bey den meisten Blüthen sich ihres Inhaltes wirklich noch nicht entledigt, waren nicht eingefallen, sondern geschlossen und streobend. Vom Blüthenboden gelöst und unter das Wasser gebracht, barsten sie an der Spitze, wahrscheinlich nach der größten oder geringen Reife, sogleich oder weniger schnell, und ließen einen trüben grumöfen Inhalt stoffweise herausfließen. Dieser bestand bey genauer Betrachtung keineswegs aus einer dickflüssigen Substanz, wie man glauben könnte, sondern aus sehr kleinen abschließend herabdrückten Zellen mit abgerundeten Kanten, die durch eine homogene Schleimmasse mehr oder weniger innig mit einander verbunden, wovon letztere besonders dort deutlich wahrzunehmen war, wo die abgerundeten, meist auch etwas verschobenen Kanten

der Zellen zusammentrafen. In jeder einzelnen dieser herabdrückten Zellen, von sehr zarter Membran gebaut, befand sich außer einem klaren und flüssigen Inhalt noch ein Körper, an dem ein verdicktes Ende mit einem dünnen spiralförmig gewundenen Fortsatze deutlich unterschieden werden konnte. Meistentheils erschienen diese Körperchen, wovon in jeder Zelle immer nur ein einziges vorhanden war, unbeweglich, indeß andere eine zitternde Bewegung mit dem vorderen Ende des dünnen Fortsatzes hervorbachten, andere endlich abstoßweise sich sogar um ihre Achse zu drehen anfingen. Mit den Samenthieren der Pollenfäden des Torfmooses hatten diese Thierchen die größte Ähnlichkeit. Der Körper war, wie bey diesen, etwas ins grüne spielend, nur war die Form mehr oval. Die Windungen des rüsselartigen Fortsatzes mochten  $1\frac{1}{2}$  bis 2 mal ineinander greifen. Bey Ruhenden konnte ich den Durchmesser der Spirale messen, er betrug 0,004<sup>'''</sup>. Nur wenige sah ich frey von ihrer Hülle, die beym Ausstoßen zerrissen wurde; aber sie bewegten sich nicht drehend, sondern man konnte nur eine zitternde oscillirnde Bewegung des Rüssels wahrnehmen. Daß hier, wie bey andern Pollinarien der Moose, eine besondere homogene Membran als Epidermis die Zellenschicht überzieht, welche die Höhlung derselben enthält, läßt sich bey dem Besten deutlich erkennen, indem sich hier mehrere Chlorophyllbläschen enthaltende Zellen trennen, und in der Fovilla einzeln fortgestoßen werden, während die durchsichtige Epidermis rings um die Oeffnung im Zusammenhange mit den übrigen Zellen bleibt.

Ganz dieselbe Beschaffenheit des Pollinariums und der Samenthiere fand ich auch im *Polytrichum juniperinum*, *urnigerum* und *alpestre*, die ich zu verschiedenen Zeiten untersuchte; ebenso konnte ich auch in *Funaria hygrometrica*, *Bryum cuspidatum* und *punctatum* durchaus nichts entdecken, was auf eine Verschiedenheit in der Form oder in den Lebensäußerungen dieser thierischen Wesen hindeutet. Mit Ungeduld erwartete ich die ersten reifen Anthidien der gemeinen *Marchantia polymorpha*. Auch hier fand ich das, was ich erwartete; die in denselben eingeschlossenen Pollenfäden verhielten sich ganz so wie die von *Polytrichum* und der übrigen Moose; die Fovilla bestand auch hier aus einer zelligen Masse, wie sie schon Mörkel in seiner trefflichen Abhandlung über die *Marchantia polymorpha* richtig darstellte; doch enthielten die einzelnen cubischen Zellen nicht ein oder mehrere unregelmäßige Körner, wie er in der oben genannten Abhandlung Fig. 55, 56, 57 angibt; sondern ganz solche thierische Wesen, wie in den Moosen. Bey vollkommener Reife der Pollinarien scheinen diese Zellen oder auch Epithate eben so absorbtirt zu werden, wie die Membran der Mutterzellen, welche die Pollenkörner höherer Gewächse einschließt; wenigstens findet man in dem milchigen Caste, der sich durch Zusammendrücken der Anthidien an den in denselben eingesenkten Pollinarien ergießt, keine Spur solcher Zellresiduen. Besonders gut gelang es mir bey *Marchantia*, die Form der Thiere, welche sie bey dem Schwimmen im Wasser annehmen, zu beobachten; auch konnte ich wahrnehmen, daß dabey der Rüssel, welcher nun eine schwache Spirallage annimmt, und also mehr als der übrige Theil des Körpers ausgedehnt ist, in einer äußerst schnellen Bewegung begriffen ist. Außend und in sich gewunden, maß der Durchmesser der Spirale hier 0,003<sup>'''</sup>. Auf Glas eingetrocknet nahmen sie eine Form an, woraus hervorzugehen scheint, daß der hintere Theil der Spirale, welcher den Körper und einen Theil des Fortsatzes enthält, stärker

und steifer seyn muß, als der vordere rüsselförmige Theil. Einmal eingetrocknet, kommen sie durch Befruchtung nicht mehr zum Leben. Außer der *Marchantia polymorpha* sah ich gleiche Samenhiere noch in *Grimaldia hemisphaerica*, doch hat es mir bey den Jungermännern noch nicht gefallen wollen, sie zu finden; die Aehnlichkeit inbeffen der Pollinarien dieser Pflanzen mit jenen der Moose und vorzüglich der Sphagnaceen, ihre Größe, Structur und der Inhalt, so lange sie ihre vollkommene Reife noch nicht erlangten, läßt keinem Zweifel Raum, daß sie auch in diesen noch werden aufgefunden werden.

Eust. Corda äußerte hierauf seine Zweifel an der thierischen Natur dieser Körper; indem bekanntlich jeder fein vertheilte Körper in eine mehr oder minder regelmäßige Bewegung versetzt werden könne, der jedoch das charakteristische Merkmal der thierischen Bewegung, die Willkürlichkeit, fehlt. Zugleich machte er aufmerksam auf die Unterschiede animaler und molecularer Bewegung. Derselbe zeigte endlich durch Kreidenszeichnung die herabdrückende Zelle, so wie die Bildung der Spitalfasern, und verglich sie mit gleichen Spitalfasern in den fruchtbarbildenden Organen anderer Cryptogamen.

Nees v. Esenbeck glaubte, daß der Organismus des Thieres noch mehr, als die willensfähige Bewegung, für das Daseyn der Thierheit spreche.

Hofr. Reichenbach bemerkte hierbey, daß auch für das systematische-genetische ein Upunct angenommen werden müßte. Die Beantwortung der Frage: wo die Gränze zwischen Thier und Pflanze anzunehmen sey, erschiene so schwierig, daß zu vermuthen steh, die Gränze werde nie gefunden werden.

2) Bentham sprach über seine bereits im Drucke befindliche Schrift über die Familie der Leguminosen.

Da de Candolle seit 12 Jahren den zweyten Theil seines *Podromus* vollendet habe und eine Menge, hauptsächlich tropischer und antarctischer Leguminosen zur Anzahl der Bekannten hinzugefügt worden sey, daß die Summe der schon bekannten Gattungen verdoppelt worden ist, und überdieß die reichen Sammlungen unbestimmter brasilianischer, australischer und ostindischer Arten hinzukommen, welche in den Herbarien aufbewahrt werden: so fand derselbe eine neue Bearbeitung zur Aufstellung des Zweifelshaften notwendig. Unter den vorzüglichsten Werken über diese große Pflanzensfamilie, welche seit de Candolle's erwähntem Werke erschienen, wurde besonders der „*Prodromus florae Indiae orientalis* von Wight und B. Arnott“, die „*Enumeratio plantarum Africae australis* von Ecklon und Zeyher“ und die „*Commentationes de plantis Africae australis* von Ernst Meyer“, nebst den in verschiedenen Werken zerstreuten Beschreibungen neuer Arten und Gattungen von Guillemin, Desvaur, Hooker, Wallich, Lindley u. a. erwähnt. — Was Dr. Eisingrein's Werk über Schmetterlingsblüthen betrifft, so scheint ihm dieses Werk zu viel aus bloß philosophischen, nicht immer fest begründeten Beobachtungen zu bestehen. Derselbe erwähnte auch der Arbeiten Vogel's in Berlin, worauf eine kritische Uebersicht der vorgenannten Werke folgte, in welcher Bentham bemerkte, mit de Candolle nicht ganz übereinstimmen zu können. — Er fügte bey, er sey demüthig gewesen, neue schwankende Arten zu bloßen Varietäten zu reducieren; indem er die Wandelbarkeit der Varietäten besser aufzufassen versuchte. In Hinsicht der feinen

Gattungsverschiedenheiten, welche de Candolle von der Lenkung oder Richtung des Wurzelschens herleitete, glaubte derselbe nicht festen Gebrauch zu machen. Bentham bemerkte, daß die ganze Abtheilung der Papilionaceen eine große natürliche Pflanzensfamilie bilde; daß er gesucht habe, deren Gattungen in solche Gruppen zu theilen, deren Kennzeichen von einer Combination von Merkmalen verschiedener Organe entlehnt sind. Ein bedeutendes Material hierzu habe er in seinem eignen Herbarium in London niedergelegt; seitdem habe er auch die reichen Sammlungen von Wien und München durch seine Freunde Dr. Endlicher und Hofr. v. Martius benützt (gegen 7000 Species). — Er entwickelte nun die Grundsätze für die Unterabtheilung der Familien, worüber er sich weitläufig aussprach. Dann folgte die Diagnose der Unterfamilien oder Tribus und sämtlicher Gattungen und Arten, worunter sich eine bedeutende Zahl neuer befindet.

Durch diesen Vortrag nahm Hofr. Reichenbach Anlaß, über die Bildung natürlicher Familien im freyen Vortrage zu sprechen; indem er sich, wie auch schon Bentham bemerkte, vorzüglich dahin aussprach, daß bey Aufstellung natürlicher Familien überhaupt und ihrer Gliederung unter sich, nicht irgend ein einzelnes Organ in Betracht gezogen, sondern immer und überall die ganze Organogenese wohl berücksichtigt und erwogen werden müsse. Bey Aufstellung natürlicher Familien müsse das Bewußtseyn der Eigenheiten derselben leitend erscheinen. Diesen Zweck zu erreichen, könne man zwey Wege betreten; den subjectiven und den objectiven. De Candolle's Eintheilung erscheine, wie Bentham bereits ausgesprochen, willkürlich; derselbe wiederholte das Schwankende der Merkmale, die von einem einzigen Organe hergenommen, und führte als Beispiel die Bestimmung der *Caryophyllaceen* nach einem *Embryo curvatus* (nach Lindley) an; da in dieser Umschreibung *Dianthus* selbst keine *Caryophyllacea* seyn dürfte, und bemerkte: Bentham habe bewiesen, daß die *Radicle* nicht zur natürlichen Abtheilung der Familien geeignet sey. Das einfache Zusammenrücken des Embryo sey bloß die niedere Stufe der Entwicklung; subjectiv könnten keine dergleichen Charaktere vorgeschrieben werden; die innere Gliederung der Familien sey eine der schwierigsten Aufgaben. Wir müßten mehr der Natur, ihrem Erscheinen und Wirken folgen, und überall deren Ursehe zu erforschen streben. Jede Familie müsse einen Upunct zeigen, von dem aus die Bildung gehe; sie müsse zeigen, wie sie sich gestalten wolle, und von welchem Organe aus sie beginne. Die vegetative Vollkommenheit in der Organisation schreite von Norden nach dem Aequator hin, sich ausbreitend, eben so geographisch zunehmend an Formen und sich weiter ausbreitend, fort, wie ihre Organe sich entfaltend gestalten. — Die *Papilionaceen* anbelangend, liege der Upunct im Trifolium. Aus den Gesetzen der weiblichen und männlichen Organe des *Gynaeceums* und *Androeceums* — entwickle sich die ganze Familie. Die Sippen der *Papilionaceen* begannen und seyen die Trifolien, Genisseen, Hedysareen, — bey welchen das Fortschreiten aus dem *Utriculus* zur Antithese des *Utriculus circumscissus*, Legumen, und endlich wieder aus der einfachen Frucht von *Onobrychis* zum gegliederten *Lomentum* die höchste Vollkommenheit der Bildung zeige. Analog erscheine die Entwicklung der Corolle bey Trifolium, nehmlich als eine *Corolla tubulosa* mit tieffter Anbeutung eine *Corolla papilionacea* werden zu wollen, dann bey andern zum Theil sich lösend, endlich vierlättrig, bey den

Cassiaceen normaler fünf-lätterig werdend, endlich bey den Mimosaceen ganz regelmäßig und höchst vollendet. Analog erscheinne auch die geographische Verbreitung der Familien, welche im innigen Verhältnisse mit dem Morphologischen stehet. Die Trifolien erscheinen in nördlicher Richtung, südlicher die Genisteen; tropisch, am reichsten die Heboaceen. Dasselbe Verhältniß wiederholte sich in den Cassiaceen sich andeutend. Das männliche sey bey den Trifolien: am niedrigsten, welche als Diadelphiten erscheinen, höher bey den Genisteen, welche Monadelphiten sind, die Decanbristen andeutend. Hierauf gieng er wieder auf Ventham's Satz von dem Nichtzureichen einzelner Charaktere über, worin er mit ihm gänzlich übereinstimmte. Auch die Cassiaceen schreiten vorwärts wie die Papilionaceen; das Streben oder die Ausstreckung des Embryo bey den Cassiaceen und Mimosaceen sey die höchste Vollendung. — Die wahre Bedeutung der Papilionaceen = Blumen scheine noch zur Zeit nicht gut erklärt, obwohl ihre Entwicklung aus drey Stipularpaaren (nicht aus einem Fiederblatte) augenfällig sey, und diese Zusammenstellung in der Gestalt,) oft sogar in der Bekleidung sich deutlich verrathe.

3) Superintendent Lumniger aus Bünn: Popularisierung der Naturgeschichte.

4) Prof. Lichtenstein übergab eine Knospe der *Rafflesia patna* zur Untersuchung.

5) Prof. Kämisch zu Prag: Beobachtungen über die Samenbildung ohne Befruchtung, die er an *Mercurialis annua* machte. Eine ähnliche Beobachtung machte zwar Prof. Rudolphi an *Mercurialis ovata*, fand jedoch, daß die Samen nicht keimten; Kämisch behauptete dagegen, daß derley Samen von *Mercurialis annua* nicht nur reifen, sondern auch keimen. Er bemerkte, daß Schkucht zwar an *Mercurialis* Zwitterblumen beobachtet haben wolle: allein er selbst habe dieß nicht finden können, sondern bloß, daß an den weiblichen Pflanzen wohl männliche vorkommen, welche derselbe jedoch fogleich beseitigte, die mithin keinen Einfluß auf die Befruchtung nehmen konnten. Daß reife Samenbörner sich auch ohne Befruchtung bilden könnten, dieß habe schon Garbh gesagt. Von diesen Samenbörnern können sich nun, nach Kämisch, Pflanzen durch mehrere Generationen vermehren, und gegenwärtig habe derselbe schon Pflanzen der 5. Generation erzogen. Im Pflanzenreiche wäre nun das Analogon der Blattläuse aufgefunden, wo die Befruchtung durch mehrere Generationen fortwüch. Derselbe vertheilte sodann seine hierauf bezügliche Abhandlung „Beobachtungen über die Samenbildung ohne Befruchtung am Bingelkraut“ an die Mitglieder der Section.

6) Baron von Hügel theilte mehrere Bemerkungen über *Nelumbium speciosum* mit, da so eben in dem, an seltenen Gewächsen reichen Garten Sr. Excellenz des Herrn Altgrafen von Salm-Reifferscheid mehrere Früchte desselben zur Reife gekommen waren und der Sectionsvorversammlung vorgelesen wurden. Baron Hügel erwähnte zuerst, in Bezug auf das Vaterland der in Rede stehenden Pflanze, daß er dieselbe am häufigsten in stehenden Wässern Ostindiens beobachtet habe; daß es allerdings wahrscheinlich sey, daß sich diese Pflanze einst, wenn auch eben nicht häufig, in Egypten vorgefunden habe, daß sie aber gegenwärtig dort nicht mehr gefunden werde. — Was die in mehreren Schriften vorgekommene Angabe über den häufigen

Jhs 1848. Heft 8.

Genuß der Samen von *Nelumbium* anbelangt: so erklärte Hügel jene Angabe größtentheils für unrichtig und fabelhaft, mit dem Beseße, daß hierzu wahrscheinlich die Verwechslung des *Nelumbiums* mit einer *Nymphaea* Veranlassung gegeben haben möge, von welcher aber nicht der Same, wohl aber die Wurzeln genossen werden. Uebrigens fand er bey seinem längern Aufenthalt in Ostindien mehrmals Gelegenheit zu der interessanten Beobachtung, daß das *Nelumbium speciosum* in der Mythologie der Indier eine ähnliche Rolle spiele, wie der Regenbogen in der Religion der Israeliten, indem die Pflanze vermöge der großen Ausdehnbarkeit der Blattstiele bey niedrigem und hohem Wasserstande ihre Blätter immer auf der Oberfläche des Wassers schwimmend erhalte. — Die vorgelegte *Rafflesia patna* wurde Herrn Unger zum Aufweichen übergeben, um später Untersuchungen über diesen merkwürdigen Parasiten anstellen zu können.

Nach Beendigung der Sitzung begab sich der größte Theil der Sectionsgesellschaft in den ausgezeichneten Garten Sr. Excellenz des Herrn Altgrafen v. Salm-Reifferscheid, wo sie mit zuvorkommender Freundlichkeit von dem edlen Herrn Besitzer empfangen, sich besonders an der ausgezeichneten Sammlung der Cacteen, so wie der Ericaceen erfreuten, welche der sorgsamten Pflege des ausgezeichneten Obergärtners Bienbaum anvertraut sind und sich hier, gleich den übrigen seltenen Gewächsen, wegen der naturgemäßen Behandlung in einer lebenskräftigen Fülle entfalten.

7) Dr. Biazioletto, über die Metamorphose der Algen.

Er nahm die Reste kleiner Algen, z. B. *Sporochnus*, *Calothrix*, *Exillaria*, besonders die *Exillaria truncata* Grv. und *Frustulia attenuata* Kütz. aus dem Meere, that sie in weit geöffnetes Glas mit destillirtem Wasser, und ließ sie gegen 2 Monat an einem Orte stehen, wohin die Sonne öfters scheinen konnte, bey einer Temperatur von 15 bis 20° R. Das Glas war mit einem Porzellansteller bedeckt, welcher mit seinem Rande gut schloß. Auf jener Seite, wo die Sonnenstrahlen durch das Glas auf das darin enthaltene Fluidum bringen konnten, bildete sich zuerst eine Art Zone von grasgrüner Farbe, welche die Alge früher nicht hatte; die grüne Farbe erstreckte sich nur so weit, als die Sonnenstrahlen eingingen waren, und dieß in einem Halbkreise bis zur Hälfte des Glases. Wo das Sonnenlicht stärker wirkte, wurde die Zone stärker, breitete sich allmählich bis auf den Boden, dann den Rand des Glases aus und endete an der entgegengesetzten Schattenseite auf der Flüssigkeit, aber heller und ganz klar werdend. Auf der Oberfläche erschien sie nur durchscheinend, von einer blauen, ins Violette spielenden oszillirenden Farbe, welche derselbe für identisch mit dem von Nees von Esenbeck in Bonn entdeckten neuen Princip *Saprocygnin* oder *Saprochrom* erkannte. Auf der Oberfläche der Flüssigkeit fand derselbe zwischen dieser oszillirenden Farbe einige kleine, olivengrüne Flecken, wie eine sehr feine Haut, welche derselbe sorgfältig auf Glimmer ausbreitete. Mit Erstaunen fand er nun in dieser feinen Membran unter dem Microscop eine *Tetrasporea*, die von der *T. lubrica* sich wegen ihrer olivengrünen Farbe und größeren Dichtigkeit in ihrer Textur verschieden zeigte, auch weniger zerissen war. Derselbe nannte sie *Tetrasporea olivacea*. Der grasgrüne Theil war unter dem Microscop nichts anderes als *Palmella botryoides* Ag. — Am Boden derselben Flüssigkeit

um das Glas fand er auch die *Frustulia hyalina* Ag. in großer Menge. Die Frustulen derselben hatten eine schwache Bewegung, in dem Abfalle selbst war aber die *Frustulia ulna* Kütz. (*Bacillaria ulna* Nitzsch.) — Ueberdies sahen in der Flüssigkeit verschiedene Infusorien gewesen. Bey gleichen Versuchen war er nicht mehr so glücklich, das *Saproecyanin* oder *Saprochrom* zu erhalten. Er suchte noch weite durch die Auflösung der Meeralgeln mit destilliertem Wasser in einem Glase, welches zur Schließ, mit *Bryopsis plumosa* Versuche anzustellen. Auf dieselbe Art wie früher stellte er auch dieses Glas an die Sonne. Nach einem Jahre zeigten sich auf der der Sonne zugekehrten Seite hier und da grüne Flecken, die eine dunkel gelbliche Farbe hatten. Die gräserne Alge war nichts als *Palmella botryoides* wie früher die dunkelgelbliche *Frustulia hyalina*. Die in das destillierte Wasser gebrachte *Bryopsis* ist so frisch geblieben, wie sie es früher war. — Derselbe zeigte sodann die Abbildung einer neuen *Hygrocoecis* vor. Sie war aus einem Abgusse von *Sphaerococcus confervoides*, welchen derselbe frisch aus dem Meere genommen hatte, entstanden; den Rückstand dieses *Sphaerococcus* that er am 15. Februar d. J. in eine kleine Glasche von gelbem Glase mit zwey Unzen destilliertem Wasser und vier Lothypfen Silberglätteessig. Auch diese Mischung brachte er auf einen mehr oder weniger sonnigen Ort, in eine Temperatur von 9—12° R. Nach einiger Zeit wurde das Fluidum trübe, später milchig, dann bildeten sich nach und nach kleine Wölken, welche sich zuvor im Fluidum zeigten, wo sie auch etwas dichter waren. Anfangs May brachte er sie unter das Microscop und fand seine *Hygrocoecis moniliformis*. Gleichzeitig machte *Biafletto* eine andere Mischung, nur nahm er statt destillierten Wassers gemeines Brunnenwasser. Das Brunnenwasser enthält gewöhnlich etwas kohlensauren Kalk mit Spuren von Magnesia und Salzsäure, die letzte als Ausdünnung des Meeres. Diese Mischung wurde früher trübe als die andere, hatte mehrere über einander gelagerte Wölken-schichten, ohne daß diese jedoch unter einander eine Verbindung gehabt hätten, die von oben nach unten stufenweise immer dünner und kleiner wurden. Die oberste Schicht hatte eine *Materia matricialis*, die etwas dichter als die andere und schwärzlich war. In der zweiten Glasche war die Befestigung mehr vorgerückt, die Fäden der Wölken an der Oberfläche waren weißlich und unter dem Microscop konnte er sie folgendes diagnostizieren: *Fili articulati, articuli elongato-elliptici, diametro ter quater majores, alii vero primis alternantes, rotundato-sphaerici, diametro aequales*. Sie geben das Bild einer Kette mit zweyerley Ringen. — Die 2te Wolke, gleich unter der obersten zeigte unter dem Microscop Fäden, welche ästig, walzenförmig waren, mit deutlichen Sporen und Gliederungen, und die in den Fäden selbst stecken sollten; etliche waren auch ungleich entfernt. — Die 3te Wolke zeigte *fili ramosi*, bald *flexuosi* und *curvati*, *irregulares*; sie waren dann und wann von Abtheilungen unterbrochen, als wenn sie Glieder von *Confervoides* waren, meistens zwey neben einander, mit kleineren Gliedern als die andern; die *Materia matricialis* war aus dem Fleischfarbigen in das Braune spielend. — Die vierte kleinere Wolke, nicht so dicht als die andern, hatte ihre *Materia matricialis* als eine sehr feine Haut von rosenrother Farbe; die Fäden waren unter dem Microscop sehr dünn, röhrig, einfach, an den Enden spitzig; hier und da hatten sie Spuren von runden Gliederungen, welche viel länger

und ungleicher waren als an *Hygrocoecis moniliformis*. Die in der Nähe des Stoffes, von denen der Abguss gemacht wurde, befindliche Alge hatte keine *Materia matricialis*, war ganz gleich mit der beschriebenen *Hygrocoecis moniliformis*, milchweiß, ins Fleischfarbige spielend. Der *Sphaerococcus*, von dem der Abguss gemacht ward, hatte beynabe nichts von seinem ersten Ansehen verloren, nur daß die Fäden etwas weicher geworden waren. Zu gleicher Zeit machte derselbe Versuche mit den Aufgussrückständen von *Sphaerococcus* ohne Silberglätteessig. Nach zwey Jahren fand er in der dritten Mischung eine kleine Wolke, welche sich gegen den Boden zog und aus einer *Calothrix*, mit einer *Frustulia* Ag. gemischt, bestand. Da ihm beyde Arten neu schienen, so beschrieb er sie. Ob sie jedoch Formen, Arten oder Varietäten sind, überließ derselbe der Beurtheilung.

8) Kotschy. Die Reise zur Auffuchung nutzbarer Fossilien nach Oberägypten usw. Er schickt Pflanzen zum Verkauf ein.

9) Prof. Zoppe legt seine schönen Laubmoose vor.

10) Unger übergab die gestern zur Aufweidung erhaltene *Raflesia patma*. Ein Querschnitt wäret gut gewesen, um die Anheftung auf Cissus zeigen zu können. Derselbe machte auf seine bereits gedruckte Abhandlung über Parasiten aufmerksam; die Parasitenwurzel bilde sich im Mittelgebilde der Pflanze, auf welcher dieselbe vorkommt; bey *Aphyteja Hyd-nora* sey sie einer Wurzel gleich. Hierauf wies er die von ihm herausgegebene Analyse der Parasiten vor. — Hofrath Voigt erwähnte, er habe die Bemerkung gemacht, daß die Parasiten aus dem Körper der Pflanzen selbst entstehen. Unsere Parasiten kommen nach Unger von Außen, selbst die tropischen an aufgerichteter Rinde, wo eine Reaction entsteht, welche die Bildung hervorruft. Viscum mache völlige Wurzeln, — auch bey der Anwurzelung entsche eine Reaction. — Hofr. Reichenbach warf die Frage auf, wie der Same in die Wurzeln gelange? — Rees v. Esenbeck war dagegen der Ansicht, das Keimen des Parasiten-samens finde nur auf der Oberfläche, nicht aber im Innern statt. Kammererath Waig fügte hinzu: die Gattung *Lathraea* habe eine Art Attraction, sie sauge sich gleichsam an. — Hierauf bemerkte Unger, daß es ihm noch nie gelungen sey, Parasiten durch die Aussaat zu erzeugen.

11) Prof. Meneghini zu Padua läßt seine Abhandlung über die Befruchtung der *Bryopsis* vorlegen.

12) Corda legte seine Abhandlung über Spiraalfaserzellen in dem Haargeflechte der Trichien vor. — In den Pilzen war bisher die Spiraalfaserzelle gänzlich unbekannt. Corda entdeckte jedoch die Spiraalfaser als Haargeflechte oder Sporen-träger der Haarfäbungen (*Trichia*), und ihre Analogie mit den Schleudern der Lebermoose erkennen, fand er eine neue interessante Verknüpfung der Erscheinungen in den Zellen höherer Pflanzen mit denen einer so tief gestellten Familie, wie die der Pilze, und namentlich der *Mycoagastres*. Die Spiraalfaserzelle der Haarfäbungen bildet das Haargeflechte dieser Pilze, und besitzt mithin wohl dieselbe Bedeutung wie die Schleudern der Lebermoose. Sie ist, gleich jenen, zwischen den gehaltenen Sporenmassen gelagert und von spinelförmiger Gestalt, bald einfach aus einer, bald doppelt aus zwey parallel gerundeten Spiraalfasern gebildet. In den Jungermännern

und Marchantien ist die, zwey parallele Fasern führende Schleierform überwiegend, während die Haartträger der Triebien 5—11 parallel gewundene Fasern besitzen. Die Haut der diese Fasern umschließenden Zelle ist einfach und undurchsichtig; oft ist sie an einer Seite mehr verdickt, glatt, gefaltet oder mit Warzchen besetzt, welche manchmal bey der Sporenreife verschwinden. Die normal einfache Spiralriserzelle verästelt sich öfters und zeigt dann die gleichen Anomalien, die E. bereits früher bey Verästlung der Schleiden von *Blasia germanica* in Sturm's deutscher Flora dargestellt hat.

13) Prof. Xumy in Gran schickt das Verzeichniß von 24 Weidenarten aus den Karpathen ein.

14) Dr. Fenzl: über die Cucurbitaceen.

Aus diesen Untersuchungen gieng hervor, daß die äußern Zellgewebe- und Gefäß-Schichten höchst wahrscheinlich dem erweiterten und ausgehöhlten Fruchtschleie angehören, welcher zunächst jenen Gefäßsclaus umschließt, der dem Quert der Blüthenröhre angehört, auf welchen ein dritter verticaler Gefäßkreis folgt, der mit den in der Zahl den Fruchtschleien entsprechenden Bündeln das Skelet des Carpellenscheitels darstellt. Er zeigte ferner, daß diese centralen Bündel an ihrer Basis in den peripherischen Gefäßtheil der Carpellien übergehen, oder besser, aus demselben entspringen, somit dem Carpophylle und keiner strengen Achsenverlängerung des Fruchtschleies angehören, daher nur als Seitenerven der eingeschlagenen Carpophylle zu betrachten seyen, was sich durch ihre Verbindung mit den Gefäßen der Carpellie und der Production der Placentargefäße erweisen lasse. Die Placentargefäße zeigten keineswegs Verbindung mit den Gefäßen des Carpellarrückens, mit Ausnahme von *Cucurbita*, bey welcher sich einige der letztern an den beyden Endtheilen der Placenta einwärts krümmen und zu Erstgrünzungen umbilden. Die Placenten selbst würden durch höher entwickeltes Zellgewebe gebildet, das sich zwischen die gegen den Carpellarrücken einwärts gekrümmten Carpellarrandgefäße fortsetzt und als verticale Platten erscheine, die zur Leitung der besuchten Pollenfeuchtigkeit zu den Eichen dienen und scheinbar Zwischenwände bilden, die später vertrocknen. Die Placentation sey daher keine wahre, sondern nur eine scheinbare Wandplacentation, und sey in ihren Grundzügen ganz dieselbe, wie man sie z. B. bey den Campanulaceen, Solanaceen und andern häufig findet, woben derselbe nur bemerkt wissen will, daß deshalb an eine natürliche Verwandtschaft mit gedachten Familien noch keineswegs zu denken sey.

Durch diesen Vortrag veranlaßt, sprach Hofr. Reichensbach im Allgemeinen über diesen Gegenstand, insbesondere über die Placentatio parietalis. Die Familie der Cucurbitaceen sey allerdings von hohem Interesse — besonders sey sie für die Metamorphose von der höchsten Wichtigkeit. In der letzten Classe der Fruchtpflanzen — *Thalamanthae* — werde die Fruchtbildung klar. Bald finden sich in den Systemen jene Familien mit Placentatio parietalis getrennt von einander, bald mit einander vereinigt. Dieser Weg sey aber nicht jener, den die Natur gehe. — Die Cruciferen verfolgen die Zweyzahl. 1. Thesis (*Thylacocarpaceae*). Die Siliqua sey das einfachste Ergebnis aus der Einheit als Nucamentum. — Die zweyzahlige Siliqua sey ein analoger Fortschritt wie bey den Papilionaceen; denn auch hier müsse sie die Gliederschotte schließen. Frucht sey die Umhüllung des Samens — sie müsse ver-

gehen, damit der Same seine Vollkommenheit erreiche. Derselbe beste hierauf den Unterschied zwischen Placentatio parietalis und centralis aus einander. Das Männliche sey excentrisch, das Weibliche concentrisch. — 2. Als Autithesis (*Rhizocarpaceae*) erscheine die Zerküftung der Frucht bey den Ranunculaceen, Rutaceen, Euphorbiaceen, Sapindaceen, Malvaceen, Geraniaceen, Draciden. — Durch Vermittlung der Thecaen lasse sich die Fortbildung nachweisen. Die Liliaceen seyen das Höchste der Ordnung Idiocarpaceae oder (3.) der Synthesis; wo das Männliche hervortrete, Hypericeae; das Höchste der Fruchtbildung in den Aurantiaceen. Diese Familie habe in anatomisch = physiologisch = morphologisch = geographisch Hinsicht die höchste Vollendung. Die Aurantiaceen haben wie der Mensch die höchste Fähigkeit, sich zu acclimatieren, das höchste chemische Product als ätherisches Del, sie haben die längste Dauer, das langsamste Wachsthum, sie seyen an fast alle Climate gewöhnt, die Samen seyen mit mehreren Keimlingen versehen, — wahrlich eine merkwürdige Synthesis! — Die Cucurbitaceen gehören unter die Sympetaleae, eine tiefere Verwandtschaft mit den Campanulaceen, als Gegensatz zwischen Synantheren und den letztern. *Gronovia* gehöre unter die Loasaceae, da die Corollenblenden einwärts gebogen sind. — Die Cucurbitaceen theilen sich in die Rhabdroiden, Cucurbiten, Papapaceen. Im Fortschreiten der Frucht erscheine ein Germen superum, als Gegensatz von dem beginnenden Germen inferum, wie in den Saxifrageen. — Die Campanulaceen seyen eine Wiederholung der Lobeliaceen, Synantheren, Woodeniaceen mit Corollenbildung der Cucurbitaceen. — Unter den Campanulaceen seyen *Michauxia* und *Canarina* auffallende Beispiele der Rückbildung usw. Diese Wiederholung ist dergestalt verkettet, daß sich darium die natürliche Verwandtschaft begründet.

Ferner sprach er über *Carica papaya*, und bemerkte, daß er der Vermuthung des Dr. Fenzl, daß das äußere Zellgewebe und die Gefäßschichten der Frucht höchst wahrscheinlich dem Fruchtschleie angehören, bejträte. Derselbe hob mehrere Momente heraus, welche auf die Bestätigung dessen hindeuteten, so wieder derselbe über die anatomische Verwandtschaft des Blüthenscheitels und der Frucht sprach. *Carica* gehöre noch den Cucurbitaceen an; sie zeige den Fortschritt der Bildung; denn ein Germen inferum werde zum Germen superum, mithin stelle sie die Vollendung der Cucurbitaceen dar. Nur die Placentatio sey verschieden, die Synthesis für den Apparat der Cucurbitaceen; das dritte Glied der Cucurbitaceen seyen die Papapaceen.

15) Jäger: eine Beobachtung an der *Nicotiana rustica*.

Diese von ihm in den Garten gesetzte Pflanze habe die Blätter Abends immer über die Blüthenzweige hinübergelegt, — welches Hinüberlegen aber stets minder auffallend war, je mehr sich die Blüthe entwickelte. Sie scheinen daher zur Beschützung der obersten Blüthen bestimmt. — Bey *Lupinus*, den er früh ins Land setzte, habe er ein Weichsüchtigenwerden nach Spätfrösten bemerkt, bey jenen Zweigen, welche Blüthen trieben, überdies eine wirkliche Verschidenheit der Blätter beobachtet. Es scheine daher eine Rückwirkung der Blüthe auf die Pflanze Statt zu finden. Diese allgemeinen Lebenserscheinungen der Pflanzen wären daher noch genauer zu beobachten.

Bentham theilte hierauf Nachrichten von mehreren Pflanzenfamilien mit, welche sowohl im Verkaufsweg als

im Tausche zu erhalten sind. Hunemann nehme Bestellungen auf Pflanzen an aus Nordamerica von Drumond; — Hooker habe noch Sammlungen von denselben, die Centurie zu 20 fl. E. M.; — aus America von Santa Fé, die Centurie zu 7 Dollar — durch Hooker zu bestellen; aus Mexico: Hartweg, welcher für die Horticultural-Society sammelte. Diese Pflanzen seyen durch Hunemann und die Societät zu beziehen, die Centurie zu 20 fl. E. M. Zu Kentucky wünsche Dr. Schott zu tauschen, aber nur Prachteremplare nach der Hoppe'schen Methode zu erhalten. — Schomburgk sey von der geographischen Gesellschaft nach Guinea geschickt worden, und verkaufe eine Centurie zu 26 fl. E. M. Mezcius Pflanzen aus Peru, eine Centurie zu 20 fl. E. M. Gabner in Brasilien, eine Sammlung von den Dracoen und Rio-Janeiro. Thuidée, ein Gärtner in Buenos-Ayres, verkaufe Sammlungen von Pflanzen, die Centurie zu 10 fl. E. M. Cumming, eine Sammlung von Pflanzen und Samen aus Peru und Chili, eine Centurie zu 25 fl. E. M. Ist sey derselbe nach den Philippinen gegangen.

Opitz trug seine Ansichten und den Zweck der von ihm begründeten und nun fast 20 Jahre bestehenden Pflanzentauchanstalt vor, deutete auf die Zweckmäßigkeit dieses Unternehmens, so wie auf die Ausdehnbarkeit desselben auf alle Botaniker der Erde hin.

Die Hauptidee ist folgende: jede Pflanze ist an einem Orte der Welt gemein und kann in Menge gesammelt werden. Viele Exemplare einer Art sind schneller und leichter gesammelt als viele verschiedene Arten. Selbst Anfänger unter der aufrichtigen Leitung weiter Ausgebildeter können auf diese Art eine Masse von Pflanzen sammeln, und sich durch diese eine Sammlung verschiedener Gewächse mit geringem Geld- und Zeitverlust verschaffen; wenn für die ganze Welt nur eine Austauschcentrale gewöhnt und dieß Gesammelte in Vielzahl an diese nach Verlangen eingesendet wird. Uebergibt ein jeder das alphabetisch gereichte Verzeichniß seiner Sammlung und nimmt alles darinn nicht Aufgeführte, so find die Lücken seiner Sammlung, wenn alle Botaniker der ganzen Welt sich in diesem Austausch vereinen, so schnell ausgefüllt, als es sonst nie möglich wäre. Auch die Transportkosten müssen unbedeutend ausfallen, wenn sich mehrere aus einer Gegend zu gemeinschaftlicher Sendung vereinen.

Corda sprach hierauf über eine neue Gliederung des natürlichen Systems der Pilze. Das Reich der Pilze zeige die Entwicklung der freien, selbstständigen Zelle. Derselbe wies mit der Kreide in der Hand nach, wie die Natur von der sphaerischen freien Zelle durch Verlängerung, Abtheilung, Aneinanderreihung, Zusammenfügung und feste Wiederholung der mannichfaltigsten Combinationen jene ungeheure Formmasse bilde und dem Naturforscher zur Beobachtung darbiete, welche die Pflanzengewelt in sich fasset, und wodurch es klar werde, daß die genauere Kenntniß der niedersten Organismen das größte Licht über die Bildung der übrigen Pflanzen zu verbreiten im Stande sey. Das Leben der Pilze bestche gleich dem Leben aller Organismen in Entstehung, Ernährung und Fortpflanzung durch Keime oder Samen, Sporen genannt. Die tiefsiehende Pilzspore sey eine hohle Zelle, die als selbstständiges Pilzorgan durch keine Wände getheilt sey. Die Combination höherer Ranges entsche durch rosenkranzartiges Aneinanderketten dieser er-

sten Form, und als Kettenglied erscheine das Obere älter als das Untere. Die Sporen bleiben bis zur Erreichung der Keimfähigkeit bestimmern. Hier entwickelte E. alle Glieder aus Familien mit einfachen Sporen, so ihm bekannt, und parallel die ihnen entsprechenden und opponenten Glieder der Familien, deren einfache Sporen rosenkranzartig gerichtet sind, und gieng dann auf die Hauptformen der ihm bekannten Sporen über. Alle Pilzfamilien können mit Hilfe des Sporenbau's nach ihren Gliedern eingetheilt werden. Er gieng hierauf alle Formen des Sporen- und Trägerbaues der Coniomyces und Ophomyces durch, und nachdem er durch Combination der Spore und des Trägers die Entwicklung der Gattungen, ihre Verwandtschaft, ihre Opposition, ihre progressive und retrograde Entwicklung gezeigt, gieng er auf die andern Familien der Pilze über, und verweilte vorzüglich bey den Gasteromyceten, deren Gattungsgliederung er einerseits aus Sporenbau und Gefeß, andererseits, als den ersten nothwendig entsprechend, aus dem Baue der sustentatorischen Organe und dem Totalhabitus darstellte. — Dann gieng er zu den Reichen der Helvellaceen, Polyporiiden, Agaricinen über.

17) Lumniger: über die verschiedenen Formen der Georginen.

18) Weltwitsch, über die geographische Verbreitung der Pflanzen.

Derselbe bemerkte, daß die äußern Einflüsse sehr viel auf die Metamorphose der Pflanzen einwirken. Das geographische Studium der Pflanzen sey daher sehr wichtig, und habe noch ein besonderes Interesse, weil man sehr viel sehen müsse; hierdurch werde die Phytogenese immer mehr erleuchtet. Hierauf gieng derselbe zur Schilderung der unterirdischen cryptogamischen Vegetation der Adelsberger Grotte über. Interessant sey die Flora der Borwelt, aber eben so interessant die Flora der Unterwelt, von der er mit lebhaften Farben die Beschreibung und die Beweise durch die Verzeigung sehr schöner Schwämmegebilde lieferte. — Die unterirdische Vegetation jeder Grotte könne nur immer Pilze vorweisen. Derselbe gieng hierauf über zur pittoresken Beschreibung der Grotte in Bezug auf die Schwammwelt; er bemerkte, daß schon beim Eintritt in die Grotte sich ein schwammartiger Geruch kund gebe, welcher von den in Fäulniß übergehenden Pilzen herrühre. Durch die weißen Gestalten, z. B. von Himantia, Xylotroma, werde man überrascht, allein nur mit Mycelien versehen sey es ein Polyporus. — Er wies eine Reihe von Sphaeria Hypoxylon, und bemerkte, die geringste Formentwicklung habe die meisten Früchte; wo die Vegetation vordreite, werde die Frucht unterdrückt; ferner Thelephora hirsuta, in fingerförmiger Vertheilung, und auch in sehr langen Stücken; Himantia sulphurea, bloß als Mycelium eines Pilzes. In dem tieferen Grunde der Grotte fanden sich die weißen Gebilde häufiger — hierunter eine Clavaria, die wohl eine Pseudomorphose anderer Pilze sey. Ferner eine Torula. Eine interessante Anamorphose der Entwicklungreihe aller Formen von Polyporus medulla, zuerst als Himantia, — dann Himantia radicans mit Bildung von Polyporus, ferner Polyporus Vaillantii (Corda glaubte jedoch, es sey Polyporus medulla panis), ferner Xylotroma giganteum. — Göppert erinnerte bey dieser Gelegenheit, daß auch in dem Bergwerke zu Wieliczka sehr lange Polypori vorkämen. — Die Metamorphose einer Chaetophora fribergensis



sey der Uebergang in *Daedalea abietina*. Eine *Mycena*, welche wahrscheinlich neu seyn dürfte. *Rhizophora pinnata*. *Phacorrhiza*, welche an der Decke der Grotte vorkomme, dürfte ein neues Genus seyn (Corba erinnerte hiebei, daß *Entophyta clavata* in ihrer verschiedenen Entwicklung die Gattung *Phacorrhiza* vertauschen dürfte). Die Bekleidung der ganzen Grotte werde durch *Ozonium stiposum* gebildet.

19) Waiz, über das Zahlenverhältniß in der Pflanzenwelt.

20) Welwitsch, über Unger's geographische Verbreitung der Pflanzen auf Kalk-, dann Granitgebirgszügen. Es sey ihm der Vorwurf gemacht worden, er habe Pflanzen als einem oder dem andern Gebirgszuge angehörig angeführt, die auch auf beyden Gebirgszügen vorkommen. Unger habe aber schon bey Grätz gefunden, daß sich in den Hauptgebirgszügen oft gewisse Einlagerungen von Kalk in Granit und umgekehrt fänden, welche dieses plötzliche Erscheinen der Kalkflora veranlassen; auch könne ja die Auflösung des Erdreichs von einer andern Gebirgsart hieran Antheil haben. Er führte mehrere Gewächse an, die er der weitem Beobachtung zu unterziehen ersuchte, die nicht auf Kalk vorkommen: *Prunella vulgaris*, *Cistus Helianthemum*, *Daphne Mezereum*, *Euphorbia Cyparissias*, *Orobus vernus*, *Fagus sylvatica*, *Pinus*. — Die auf Kalk vorkommen: *Aster amellus*, *Coronilla minima*, *Seseli glaucum*, *Serapias rubra*, *Cnicus*, *Erysithales*, *Daphne Cneorum*, *Alyssum saxatile*, *Geranium sanguineum*. — Das Gedeihen der cultivierten Pflanzen in einer Erde von nicht entsprechender Gebirgsart könne nicht als Norm angenommen werden, weil hier die Pflege des Cultivateurs ihren nöthigen Einfluß übe, bey wildgewachsenen Pflanzen sey es etwas anderes. Am beständigsten seyen die Lichenen der verschiedenen Gebirgsarten. Zwischen Fubweis und Gmünden habe er *Erica vulgaris* und *Ledum palustre* in Torfmooren gefunden, und zwar von der ersten eine *Varietas villosa*. Die Ursache dieser Behaarung leitete derselbe davon ab, weil am Ufer der Boden sandig und trocken war.

Lang will ungarische Pflanzen abgeben.

21) Tausch stellt *Draba stellata* als *Rhizobotrya alpina* auf und theilt eine neue Gliederung der Gattung *Erica* mit.

Er fand die bisherigen Eintheilungen dieser Gattung, besonders ihre Zerspitterung in mehreren Gattungen durch Don und Klotz nicht naturgemäß. So lange man noch keine vollständige Kenntniß der Früchte dieser Gattung habe, werde man nicht nach carpologischen, sondern anthologischen Grundsätzen reihen müssen, was er dann auch insbesondere mit Benutzung der Anheftung der Antheren zu seiner Eintheilung gethan hat.

22) Nisän zeigte Meerbälle (*Pilae marinae*), die er an der Küste des Golfs von Neapel gesammelt hatte, und erklärte ihre Entstehung aus den Wurzeln, Stengeln und Blättern der *Zostera marina*, welche, im Meere maceriert, durch das Rollen seiner Wellen nach und nach eine Kugelform erhalten, was auch durch das Vorzeigen der Uebergänge erläutert wurde. Er legte zugleich Kleins Abhandlung über diesen Gegenstand vor, um zu zeigen, daß dieser aufmerksame Beobachter schon vor mehr als 100 Jahren die richtige Ansicht von

der Entstehung dieser Meerbälle aus *Zostera marina* hatte. Er bemerkte schließlic, der Grund, warum diese Meerbälle nach irgend einer neuen Angabe von einer Art *Caulinia* herzuileiten seyen, mag wohl in der Veränderung der generischen Namen von *Zostera* und *Caulinia* liegen, wobei jedoch immer dieselbe Pflanze verstanden wird.

23) L. Reichenbach: über die Wichtigkeit des von Richter herausgegebenen Codex linneanus und die Nothwendigkeit, Linne's Arbeiten zu kennen.

Zwey Drittheile, Fascikel 1 — 8, sind bereits im Buchhandel, 3 Viertheile desselben schon beendet. Ein Funder würde die Benutzung leicht und bequem machen und sich sowohl auf ältere als neuere Synonymik, als auch auf Sachen (Realinder), besonders über philosophische botanische Ansichten Linne's beziehen. Die Bedeutung Linne's in dieser Ausgabe ist folgende: Sie sey die Vereinigung der gesammten systematischen Thätigkeit Linne's. Seine sämmtlichen Werke und Ausgaben seyen hier in der Art vereinigt, wie er selbst deren Benutzung überall voraussetzt, indem immer eines das andere ergänzt und erklärt und Linne selbst nie aus einzelnen derselben beurtheilt werden wollte, wie er noch in seiner letzten Mantisse ausdrücklich (Cob. S. 14) in der Vorrede darauf hinweist und in derselben die Methode dieser Ausgabe kurz andeutet (s. dessen Schluß der Vorrede aus der Mantisse 2). Er gieng zur Bedeutung der Linne'schen Werke für die Jetztzeit.

I. In diagnostischer Hinsicht. Kampf des phänomenologischen und genetischen Princip's in der Naturgeschichte. Erstes der Vielfachheit der Erscheinungen folgend; durch sie werde man immer zu speciellen Unterscheidungen (in Genus und Species) geführt. Letzteres erscheine stets einen höheren Sammel-punct suchend, diesem entgegengesetzt strebend. Letzteres sey eigentlich Linne's Princip, je älter seine Schriften, desto mehr erachtete er die Verschiedenheit der Form und suchte die genetische Einheit. Am höchsten sey die getrieben 1) practisch im *Hortus cliffortianus*, und 2) practisch in der *Dissertatio de plantis hybridis*, wo er die verschiedenartigen Genera zurecht ausfinden läßt, um einzelne Species hervorzubringen. — Linne's Diagnosen seyen in dieser Hinsicht als Versuche, feste Charactere für eine Minderezahl von Arten und Gattungen zu suchen, unter welche er die Mehrzahl der von ihm und seitdem minder von den neueren unterschiedenen zu vereinigen suchte — hauptsächlich wichtig und in Hinsicht der europäischen Arten fanden sich in wenig Werken so genaue und specielle Genealogien, wie im *Hortus cliffortianus*. — Je älter Linne wird, desto mehr gibt dem phänomenologischen Princip nach und geht schon in Spec. II. und Mant. II. vollkommen den Weg, den die neuere Botanik gegangen ist: mehr und mehr seine alten Arten in neuere von geringerem Umfange auflösend. Eben so, doch in geringerem Maaße mit den Gattungen.

II. In synonymischer Hinsicht.

A. Mit Linne wurde die ganze ältere Synonymik begraben, und die neuere datiert sich in Gattungen und Arten einzig und allein von ihm her. Wo tourmentöse Gattungsnamen mit Linne'schen concurren, stehen jene allemal zurück, und letztere haben sich allemal mit Unrecht an die Stelle ersterer gesetzt, z. B. *Stellaria*, *Alsine*, *Caryophyllus*, *Cicuta*, *Helenium*, *Alcea* usw. Bey der Ausführlichkeit, mit welcher

Linne die ältere Synonymik behandelte, sind seine Werke und hier der Codex Linnaeus besonders die reichste Fundgrube und das eigentliche Repertorium für ältere Gattungs- und Artennamen, und in dieser Hinsicht ist dieser Codex so ausführlich und doch so gedrängt als möglich bedacht worden.

B. Für die neuere Synonymik ist Linne der Ausgangspunkt, und so lange nach seinem Princip mit lateinischen Gattungs- und Trivialnamen benannt wird, so lange wird er auch der Codex bleiben, von dem die systematische Botanik beginnen muß.

### III. In beschreibender Hinsicht.

Die gegenwärtigen Beschreibungen ausländischer und inländischer Pflanzen finden sich in einzelnen Linneischen Werken, nicht in den systematischen verstreut, und waren schwer oder fast ganz unzugänglich. Auch waren nur wenige Botaniker gewohnt, sich in die Art, wie Linne benutzte fern wollte, hineinzudenken. In dieser Hinsicht ist im Codex alles vorbereitet und so zugänglich als möglich, auch fehlt fast nichts von Gattungs- und Artenbeschreibungen. Diese Beschreibungen sind theils diagnostisch wichtig, theils durch die Kürze, Kraft und Genialität des Ausdrucks und der Auffassung classisch.

#### 23) Opitz, über die Vegetationsverhältnisse Böhmens.

Der Aufsatz war mit 3 pyramidenförmigen Tabellen versehen, in welchen 1) die Vertheilung der Pflanzengattungen auf den verschiedenen natürlichen Standorten, 2) die Darstellung der Verhältnisse der natürlichen Familien nach Herrn Hofrath Reichenbachs System, endlich 3) die Verhältniszahlen der Pflanzengattungen Böhmens hervorgehoben waren. Derselbe bemerkte: daß, wenn Böhmen auch keine Alpen aufzuweisen vermöge: so erhebe sich dennoch der höchste Gebirgszug des Riesengebirges zu einer Höhe von 811 Klafter über die Meeresfläche bey Hamburg.

Die Böhmen umringenden Gebirge bilden ein großes Landesthal, in welches mittelst der Gebirgsthäler alle in Böhmen entspringenden Gewässer nach dem Herz des Landes eilen, so viele einzelne Flußgebiete bilden, und an der Gränze Sachsens in einem Hauptflusse vereint (der Elbe) dem Lande entleeren. Böhmen habe in geologischer Hinsicht eine sehr wichtige Bedeutung, indem beynahe alle Gebirgsformationen hier vorkommen, selbst die Vulcanität in mehreren Kreisen Spuren ihres Wiedereins zurückgelassen habe. Aus eben diesem Grunde dieß herrliche Land sehr viele Abwechslung in seiner Vegetation bey seiner allgemeinen Hochlage dar, — man könne aber demohngeachtet nicht sagen, daß sich der Gesamtvegetationsreichtum auf einem größern oder kleinern Bezirk fände, vielmehr sey das Vorkommen der seltenen Species äußerst zerstreut und die vollständige Erforschung der Vegetation Böhmens mit vielfachen Beschwernissen verknüpft.

Da Böhmen noch immer einen bedeutenderen Waldstand als die Nachbarländer besitzt, so zähle die Wälderflora 111 phan. Pflanzengattungen, die Gewässer 88, die Hügel und Berge 73, die Aecker 43, die Wiesen 59, das Hochgebirge 35 Gattungen. Die einzige Böhmen eigenthümliche Pflanzengattung sey *Coleanthus Scidl*; die in seinen Materialien zur Flora Böhmens aufgenommenen Pflanzen betragen 3645 Arten, hievon die Kryptogamen mit 1447, so ergebe sich für die Pha-

nerogamen die Summe von 2198. Ausgezeichnet sind im Riesengebirge die nördlichen Pflanzen, *Rubus chamaemorus* und *Saxifraga nivalis*. Die Kryptogamie erwarte noch täglich durch die unermüdblichen Forschungen des Herrn Prof. Erlen von Kromboitz und Herrn Eust. Corda Bereicherung. Das Verhältniß der Phanerogamen zu den Kryptogamen werde wohl aller Wahrscheinlichkeit nach wie 1:2 erscheinen. Der größte Artenreichtum finde sich in der Schwammwelt: *Manns Lichenologia bohemica* zähle 362 Kiechen auf. Die Moose zählten 313 Arten. *Compositae* zählten 220 Arten, machen  $\frac{1}{9}$  der Gesamtvegetation, in ganz Deutschland  $\frac{1}{8}$ . — Die *Papilionaceae*: 170 Arten, in ganz  $\frac{1}{12}$ , in Schlesien bloß  $\frac{1}{21}$ . Die *Rosaceae*: 146, mithin  $\frac{1}{15}$ . Die *Labiaten*: 138, mithin  $\frac{1}{16}$ . *Amentaceen* und *Personatae*: 100 Arten, mithin  $\frac{1}{22}$ . Die *Tetradynamae*: 91 Spec., daher  $\frac{1}{24}$ , in Lappland auch  $\frac{1}{23}$ . *Cyeroideae*: 86 Arten  $\frac{1}{35}$ , in Frankreich  $\frac{1}{27}$ . *Umbelliferae*: 76 Arten  $\frac{1}{29}$ , in Schlesien  $\frac{1}{25}$ . *Orchideae*: 61 Arten  $\frac{1}{61}$ , in Schlesien  $\frac{1}{13}$ . *Caryophyllaceae*: 58 Arten  $\frac{1}{37}$  —  $\frac{1}{33}$ . *Caprifoliaceae*: 50 Arten  $\frac{1}{44}$ . Die Phanerogamen Böhmens zeigen nach Reichenbachs System das folgende Verhältniß:

*Acroblastae* 46 Species, *Caulo-acroblastae* 271 Sp., *Phyllo-acroblastae* 138 Sp., *Synpetalae* 694 Sp., *Phylloblastae* 161 Sp., *Calycanthae* 492 Sp., *Thalamanthae* 396 Sp. Zusammen obede 2198. Die Gattung *Salix* zählt 72, *Mentha* 50, *Hieracium* 44, *Carex* 37 Arten.

Sieher legt 15 Formen von *Echium* vor.

24) Göppert, über Pflanzenskelete. Struwe habe eine Abhandlung „de silicia in plantis“ geliefert. Die *Equisetaceen* hätten einen großen Theilteil Kieselrde; nach dem Verbrennen der Pflanze bleibe ein Skelet derselben zurück. Durch Abbildungen werde dieses nachgewiesen; diese Angaben seyen vollkommen gegründet, auch die Blüthenheile ließen sich durch das Glühen auf dieselbe Art erhalten. Auf diese Art habe er auch andere Pflanzen, selbst die zartesten Theile derselben, untersucht. Selbst die Schleudern hätten durch das Glühen ihre äußere Form zum Skelet verwandelt gezeigt; das Skelet bestche aus Kali, Kalkerde, Kieselrde. Dieß führe zur Entscheidung der Frage: ob sie diese Stoffe erzeugen oder aufnehmen? Um die anorganischen Theile in den organischen aufzulösen, untersuchte er dieselben, indem er sie in einen Mörtel warf und zerstierte. Die verschiedenen Theile der Pflanzen enthalten auch verschiedene Bestandtheile in den verschiedenen Lebensperioden. Jene Theile, welche sich im Wasser auflösen, enthielten Kali; bleibe ein Rückstand, so sey dieß Kali oder Kieselrde. Diesen Rückstand prüfte man mit Salzsäure — Kali werde aufgelöst; — bleibe noch ein Rückstand, so sey dieß Kieselrde. Selbst *Secretions-* und *Affimilationsorgane* könnten gezeigt werden. Sykora bemerkte, dieselben Beobachtungen auch an der Röhle von *Pinus abies* gemacht zu haben. Göppert fügte bey, auf diesem Wege ließen sich die *Mono-*, dann *Dicotyledonen* am besten unterscheiden. Grabowsky meynete, wenn die Epidermis der Pflanzen bloß aus Kali bestände, wäre die Ausbeute an Kali sehr gering.

Man machte verschiedene Excursionen, besonders in den Garten des Altgrafen v. Salms-Reifferscheid, wo man auch die schönen Pflanzengemälde seiner Gemahlin bewunderte.



## V. Anatomie.

Secretär: Prof. Syrtl zu Prag.

1) Prof. Czermak aus Wien, über die Entwicklung und physiologische Bedeutung der Nierenkapseln.

Er verfolgte die Anatomie dieser Gebilde von ihrem ersten Auftreten in den Fischen bis zu ihrer höchsten Vollendung im Menschen. Er machte darauf aufmerksam, daß diese Körper in den Nieren der Fische durch ihre Kleinheit und geringere Anzahl, in den Amphibien durch ihre Größe und einfachere Bauart sich auszeichnen, und in den letzteren häufig auf ganz einfache Gefäßschlingen reducirt werden. Er zeigte Abbildungen vor, die nach eigenen und Syrtl'schen Präparaten verfertigt waren, und sprach die Vermuthung aus, daß ähnliche Gefäßconvolute auch in andern Drüsen, namentlich in der Parotis vorkommen dürften.

Abbildungen über Entwicklung der Nieren beim Molsch und deren Verhältniß zum Schwinden der Jacobson'schen Körper; Bemerkungen über Hermaphroditismus. Anspruch auf die Priorität der Entdeckung der *Membrana capsulo-pupillaris*. Er hat sie schon 1830. abgebildet.

2) Prof. Verres aus Wien, über die microscopische Bauart der menschlichen Nieren und Vertheilung der Anastomosen der kleinsten Harnkanälchen mit dem intermediären Gefäßnetz gegen Dr. Müller's Behauptung.

Er erbot sich, die Richtigkeit seiner Entdeckung jederman durch microscopische Demonstration evident zu machen, worauf von mehreren Mitgliedern die vorgelegten Präparate microscopisch untersucht und bewährt gefunden wurden.

3) Prof. Purkinje aus Breslau: über den Bau der Magenbrüsen und die Natur des Verdauungsprocesses. Tafel VI. Fig. 1—8.

Eberle's höchst wichtige Entdeckungen in der Lehre von der Verdauung und den chemischen Kräften der Drüsen und Schleimhaut-Substanzen gaben Veranlassung, die sogenannte Schleimhaut des Magens microtomisch genauer zu untersuchen. Es fand sich foglich, daß diese ganze Schleimhaut durchaus nichts anderes ist als eine Schicht dicht an einander gedrängter einfacher Drüsen, wovon jede mit einer rundlichen Mündung, von der inneren Wand des Magens beginnend, sich mit wenigen Krümmungen gegen die Zellhaut erstreckt, und hier etwas erweitert und mehrfach ausgezackt endet. Solche Drüsen, wie Bienenzellen dicht an einander gedrängt und durch Zellgewebe von einander geschieden, constituiren die ganze innere Schleimhautschicht des Magens bey den Menschen, den Fleischartigen, im Laabmagen der Wiederkäuer.

Purkinjes Untersuchungen zu Folge besteht die Schleimhaut des Magens bey Wiederkäuern (im Laabmagen), bey Fleischartigen und im Menschen aus einer Schicht dicht an einander gedrängter einfacher Drüsen. In jedem dieser Drüsen findet sich nun ein eigener königlicher Innhalt (Enchym), dessen Körnchen an den Wänden concentrisch geordnet sind und gegen die Extremität der Drüse größer werden; zuletzt zeigt sich nur eine aus homocentrisch gestellten Faserchen bestehende Sub-

stanz. Gegen die Achse des Drüsenkanales hin lassen diese Körner einen freyen Raum für den flüssigen Theil des Inhaltes zurück.

Ob sich auch hier noch ein Epithelium über die Körnchen erstreckt, oder ob diese frey gegen den inneren Theil beweglich sind, konnte nicht ermittelt werden. Jedes Körnchen ist durchscheinend mit zugrundeten Ecken, und zeigt in seinem Inneren einen kleineren, von der umgebenden Substanz verschiedenen Kern. Zwischen den einzelnen Körnchen ist noch eine eigene Punctmasse ergossen, deren Körperchen (unmeßbar) Bewegung zeigen.\*

Das aus diesen Drüsen hervordringende Secret besteht selbst auch aus ähnlichen Körnchen mit mehr oder weniger schleimiger Bindemasse verbunden. Dieses Secret, im gehörigen Verhältnisse mit wässriger Salzsäure gemischt, ist der natürliche Magensaft. Nimmt man dagegen die ganzen Drüsen sammt ihrem Innhalte, und mischt sie auf gleiche Weise mit wässriger Salzsäure, so hat man den von Eberle zuerst in Anwendung gebrachten künstlichen Magensaft. Hier ist nun der Zeitpunkt der Eberle'schen Entdeckung, daß die Masse der Drüse mehr oder weniger gleich sey dem Secretionsproducte. Diesen Satz wendete er weiter auf andere Drüsen an, und fand ihn mehr oder weniger physiologisch und chemisch bestätigt. — Das eigenthümliche körnige Enchym der einfachen Magenbrüsen führte nun zur analogen Untersuchung bey andern Drüsen, ob nicht auch hier in den Drüsenschläuchen und Canälen ein eigenthümliches Enchym als Material des Secretionsproductes sich finden lasse? Die Analogie bestätigte sich auf mannichfaltige Weise in allen Drüsen vollkommen. Die letzten Reiserchen der Leber bestehen aus ziemlich großen, röthlichbraunen, stumpf-eckigen Körnchen mit Centralern; eben so finden sich Körner in den letzten Schläuchen der Speicheldrüsen, des Pankreas, der Schleimdrüsen, der Ohrschmalzdrüsen, Nieren, Hoden usw. In den Nebenhoden zeigt sich außerdem eine dicke Schicht homocentrisch nach Innen gestellter, äußerst zierlich geordneter Cylinderchen, welche Schicht ganz analog der Schmelzmembran, welche die Fasern des Zahnschmelzes aussondert, organisiert ist, und wahrscheinlich auch hier für irgend einen plastischen Zweck (vielleicht zur Bildung der Spermatozoen) bestimmt ist. Wenn man nun bedenkt, daß die gesammte Epidermis und die Epithelien der Schleimhäute, so wie auch die Himmelmembranen des respiratorischen und Uterinalsystems aus discreten Körperchen von verschiedener Gestalt

\* Fig. 1 ist ein senkrechter Durchschnitt der Drüsen-schicht des Magens des Menschen.

— 2 ist die Ansicht der Mündungen der Drüsen an der inneren Magenwand des Schweins..

— 3 und 4 sind quere Durchschnitte aus der Mitte und gegen das äußere Ende der Drüsen-schicht desselben.

— 5 und 6 sind quere Durchschnitte einzelner Drüsen-schläuche mit den enthaltenen Enchymkörnern.

— 7 ist die Längensicht eines solchen körnigen Drüsen-schlauchs.

— 8 sind einzelne Enchymkörner.

und Größe zusammengesetzt sind; so führt uns dieses mit der schon früher geltenden Analogie der Schleimmembranen und der Secretionscanäle auch nun zu der Erkenntniß einer Analogie zwischen dem Endchym der Drüsen und dem Endchym der Membranen, und so wäre hiemit eine neue Bestätigung und Erweiterung jener älteren Analogie mit allen ihren Consequenzen gegeben. Aber auch die nicht nach außen offenen Drüsen, Milz, Thymus, Schilddrüse, Lymphdrüsen, besitzen größtentheils aus einer Masse von Körnern eigenthümlicher Beschaffenheit und Größe, und diese ihre Endchyme scheinen in nächster Beziehung zur Bildung des Blutes und der Lymphe zu stehen. Somit reducirt sich der thierische Organismus fast ganz in drey Elementar-Hauptformen: die flüssige, die körnige und die faserige. Die körnige Grundform dringt wieder eine Analogie mit der Pflanze auf, welche bekanntlich keynah ganz aus Körnern oder Zellen zusammengesetzt ist. Wie hier nun jedes Zellschen seine *vita propria* hat, und aus dem allgemeinen Saft sich seinen specifischen Inhalt bereitet und durch dessen Vermittlung wieder in den eigenen Saftbehältern eigenthümliche Stoffe abgesetzt werden: so könnte man sich auch den Endchymbildungs- und Entbildungsproceß vorstellen. Ueberhaupt führt gegenwärtige Auffassung über das körnige Endchym des thierischen Organismus wieder zu seinem strengern Studium der Pflanzenphysiologie, so wie die dadurch gewonnene Möglichkeit der reinen Darstellung specifischer Endchyme der Thierchemie zu weitern schnellern Fortschritten reichliches Material liefern wird. Nachträglich wird bemerkt, daß man es nicht als allgemeinen Satz betrachten mußte, daß alle Endchyme aus Körnern zusammengesetzt seyen. Schon unter den Drüsen findet sich bey den Nieren nur in den Canälchen der Hindeinfußkanal körniges Endchym, in denen der Marksubstanz ein gallertiges; eben so ist schon früher von den Enden der Magenbrüschchen ein Velnisches erwähnt. Noch mehr gilt dieses von den ganz abgeschlossenen Endchymen, dem Fett, der Erythallinse, der Knorpel-, Muskel- und Nervensubstanz, die bey einer so allgemeinen Ansicht sich nicht stiglich ausschließen lassen. Es ist nun zu erwarten, daß die specielle Betrachtung der körnigen Endchyme, sobald sie nur weiter fortgeschritten seyn wird, auch in der Entwicklungsgeschichte des Embryo und in der Pathogenie der Entzündung, der Eiterung und der Pseudoplasmen manchen Lichtblick gewähren werde.

4) Prof. Wilbrand aus Gießen: Haben die Fische eine Brust oder haben sie keine, und was ist insbesondere von den sogenannten Zungenbein-Knochen der Fische, so wie von ihren Schulterknochen zu halten? Er zeigte, daß die zu dem Kiemen-Apparat gehörigen Knochen sämmtlich die wahren Brustknochen seyen, daß insbesondere das seitliche Zungenbein Meckels das erste Rippenpaar darstelle, daß das mittlere innere Zungenbein Meckels das Brustbein, daß die Kiemenbögen die weiteren wahren Rippen, und daß endlich die oberen und untern Schlundkopfknochen als unächte Rippen, die sonstigen am Bauche der Fische vorhandenen Rippen als Bauchrippen zu betrachten seyen.

Er zeigte weiter, daß das mittlere äußere Zungenbein (nach Meckel) dem Gabelknochen der Vögel entspreche und mithin das wahre Schlüsselbein sey, — daß aber die bisher als Schlüsselbeine betrachteten Knochen dem geraden seitlichen Schlüsselbein der Vögel, und mithin dem jedesmaligen *Processus coracoideus* der Säugethiere entsprechen. Bey den Fischen liegt

die Brust vor dem Gürtel der vordern Extremitäten, — bey allen übrigen mit Knochen versehenen Thieren dagegen hinter diesem Gürtel, daher ist dann der dem Gabelknochen (wahren Schlüsselbeine) der Vögel entsprechende Knochen (das sogenannte äußere Zungenbein Meckels, oder der Zungenkathete's) als in seiner Stellung rückwärts gerichtet zu betrachten.

5) Prof. Otto aus Breslau: über Conservierung thierischer Körper nach Gannals Methode; rachitische Becken.

6) Hofr. Münz sprach über Herzpolypen, den Unterschied zwischen sogenannten wahren und falschen, und zeigte ein Präparat hierüber vor.

Obgleich die meisten Schriftsteller über Herzkrankheiten die Bildung von wahren Herzpolypen nicht anerkennen und vielmehr annehmen, daß die bisher dafür gehaltenen Afterbildungen in den Herzhöhlen nur *Coagula sanguinis* oder geronnener Eiweiß- und Faserstoff aus dem Blute gewesen seyen: so hält er doch diese Annahme für zu beschränkt, und zeigte, daß es in den Herzhöhlen auch wahre Polypen geben könne, wenn man darunter solche Afterbildungen verstehe, die als größere oder kleinere Geschwülste in Herzhöhlen hervorragen, und mit dünnerem Stiele oder selbst dickerer Basis mit der inneren Haut, oder selbst mit der Fleischsubstanz des Herzens einen organischen Zusammenhang haben und nicht bloß aus geronnem Blute, Eiweiß- oder Faserstoff bestehen und an die innere Haut des Herzens nur mehr oder weniger angelagert sind. So können schon Auswüchse, hypertrophische Vergrößerungen an einzelnen Theilen von Herzklappen oder einzelner Papillarmuskeln die Form von Polypen annehmen, wie er einige beobachtete. Unverkennbar sey jedoch die Entstehung von häufigen Herzpolypen. In der neuen Zeit, bey Vervollkommenheit der Lehre von den Herzkrankheiten, habe man doch kennen gelernt, daß es bey Entzündung der inneren Haut des Herzens, daß es in der Endocarditis häufig zur Verdickung der inneren Haut, besonders ihrer Klappen komme; daß dadurch öfters Verwachsungen derselben und Verengerung der Mündungen, die sie umgeben, entstehen, und daß es häufig Bildung von Pseudomembranen gebe, die sich aber, nach Annahme mehrerer Schriftsteller, wieder ablösen und durch den Blutstrom fortgeführt werden sollen. Er sehe nicht ein, warum solche Pseudomembranen mit der inneren Haut des Herzens nicht in Zusammenhang kommen und sich erhalten könnten, — und er habe wirklich solche mit der inneren Haut des Herzens zusammenhängende Pseudomembranen, welche die Form von Polypen annehmen, beobachtet. Mit Recht glaubt er daher, nebst anderen Arten auch membranöse Herzpolypen annehmen zu können. Zum Beweise dieser Annahme zeigte er ein Herz, in welchem sich ein häutiger, sackförmiger Polyp im Umfange eines Blutcoagulums gebildet hatte. Dieß in Weingeist aufgewachte Herz ist aus der Leiche eines dreißigjährigen Mannes; im hinteren linken oder Lungenvenen-Borste an der Scheidwand der Borste am unteren Rande der *Fossa ovalis* sitzt ein polypöser Auswuchs fest, der eine ovale Gestalt hat, mit einem Stiele an der angegebenen Gegend befestigt und mit seinem abgerundeten Ende zwischen den Anfangstheilen der beyden müßigenförmigen Klappen in das *Ostium venosum* der unter diesem Borste befindlichen Vorstenkammer frey hineinragt und den größten Theil dieser Oeffnung ausfüllt; wodurch der Uebergang des arteriellen Blutes aus dem Lungenvenen-Borste in die Vorstenkammer sehr erschweret war

und wodurch, bey längerer Anwesenheit dieses Polypen, der Lungenvenen-Worhof sehr ausgedehnt und seine Wände etwas dünner wurden; der innere Raum der Aortenkammer dagegen verhältnißmäßig enger ist. Dieser Polyp ist ein häutiger, der an der angegebenen Stelle mit einem dicken soliden Stiel verästelt. Dieser Stiel ist 5 par. Linien lang und gegen 4 Linien dick. Er besteht aus weicher fibröser Substanz und bildet ein Continuum mit der Mittelsubstanz des Herzens. Die äußere Haut dieses Stieles, die eine Fortsetzung der inneren Herzhaut ist, sich aber von der inneren fibrösen Substanz nicht trennen läßt, dehnt sich vom Ende des Stieles an in eine längliche ovale Blase aus, die in sich geschlossen ist und mit ihrem zugespitzten stumpfen Ende frey in das Ostium venosum hineinragt. Vom Stiel an ist die Haut dieser Blase am dicksten, etwas über eine Linie dick; gegen das stumpf zugespitzte Ende hin verdünnt sie sich allmählich und ist da nur  $1\frac{1}{4}$  Linie dick; denn in dem Anfangstheil der Blase setzt sich nach dem ganzen Umfange derselben auch die innere fibröse Substanz des Stieles fort, verliert sich aber allmählich, daher die Blase am Ende sehr dünnhäutig wird. Diese gleichförmig ovale, gegen ihr Ende stumpf zugespitzte Blase ist 1 Zoll und 2 Linien lang, und hat gegen 1 Zoll in ihrem größten Querdurchmesser. In der Hölle dieser Blase war ein festes Coagulum sanguinis enthalten, welches, aus der geöffneten Blase herausgenommen, gezeigt wurde. Dieses Coagulum genau von der Form der Blase bestehend innerlich auf dem Durchschnitt aus weisem, dunkelrothem, körnigem, geronnenem Blute, was den Kern des Coagulums bildet, und ist in seinem äußern Umfange, wie von einer Schale, von einer festen, geronnenen, erweisartigen, weißlichen Substanz umgeben, die Schichten zeigt und dicker in dem vom Stiele entferntesten Theil gegen das zugespitzte Ende hin ist. Dieß Coagulum füllte die Blase genau aus, hatte mit der inneren Oberfläche derselben keinen Zusammenhang, und trennte sich leicht davon. Er schloß diese Demonstration mit der Bemerkung, daß er glaube, durch Vorzeigung dieses Präparates vor einer zahlreichen Versammlung von Sachkennern einen kleinen Beweis für die Entstehung wahrer Herzpolypen gegeben zu haben, und erklärte die Entstehung dieses Polypen auf eine ähnliche, doch nicht gleiche Weise, wie die Adhäsion, Verwachsung und Organisation des Blutpfropfes in unterbundenen Arterien geschieht: da, wie der Blutpfropf in einer unterbundenen Arterie eine Reaction der inneren Haut derselben hervorruft, die dadurch zur Verwachsung mit denselben kommt, auch ein Coagulum sanguinis an der inneren Haut des Herzens eine Reaction und Verwachsung mit denselben hervorbringen könne, was in vorgezeigtem Falle unverkennbar ist; glaubt aber, daß auch ohne Bildung einer solchen Pseudomembran ein Blutcoagulum selbst durch Entwicklung von verbindenden Blutgefäßen mit der inneren Haut des Herzens in Form eines Polypen in organischen Zusammenhang kommen könne. So behauptet Boilard (in einem Mémoire sur l'oblitération des Veines; *Archive générale de Médecine* Tom. II.) selbst Gefäßbildung in Blutcoagulenten des Herzens beobachtet zu haben, und Riggacci (*Bulletin des sciences médicales*, *Septembre* 1828.) sah rothes Blut führende Gefäße von Papillarmuskeln des Herzens an polypöse Massen in Herzhöhlen übergehen.

Der beschriebene blasenförmige Polyp ist wohl von Hydatiden des Herzens verschieden. Diese bestehen aus Bläsen von der Größe einer Erbse bis zu der einer Haselnuß oder selbst 3ffte 1838. Heft 8.

auch einer wässchen Ruß; haben ihren Sitz zwischen der inneren Haut des Herzens und der Muskelsubstanz desselben, sitzen bisweilen tiefer in der Muskelsubstanz, oder ragen der inneren Haut näher, und sie erhebend, selbst in eine oder die andere Herzhälfte hervor. Sie enthalten ein dünnflüssiges oder dickeres, zäheres, gallertiges oder erweisstoffiges Secretionsproduct, und verhalten sich daher wie andere krankhaft erzeugte, absondernde Cysten. Er beobachtete solche, und zwar mehrere zugleich, wie sie häufig, jedoch auch einzeln vorkommen, in der rechten Herzkammer eines an Hydrops pericardii verstorbenen Mannes zwischen der inneren Haut und Muskelsubstanz dieser Herzkammer, so wie er erst einen ganzen Haufen von solchen Hydatiden gegen 40 von der Größe einer Erbse bis zu der einer wässchen Ruß in der Substanz der Leber beobachtete und auch das Präparat davon aufbewahrt.

Einen zweyten Vortrag hielt er über kopflose Mißgeburten, und unter mehreren, die er untersucht hatte, fand er eigenthümliche und höchst merkwürdige Beschaffenheiten an einer kopflosen Schafsmißgeburt; theilte diese mit und machte seine Mittheilungen durch Vorlegung von Abbildungen anschaulich, die er von dieser Mißgeburt nach der Natur gezeichnet hatte. Diese Mißgeburt war bis auf ein Drittel der Zeit ausgetragen, wurde lebend geboren, starb aber bald nach der Geburt. Die Größe und äußere Form des Körpers zeigte die Abbildung. Es mangelt an dieser Mißgeburt: der Kopf, die obere oder vordere Extremitäten und der Thorax. Nur die 3 untern Brustwirbel und 3 Rippenpaare sind vorhanden, die aber nur die Bauchhöhle mitbilden helfen, so daß das ganze Skelet nur noch aus dem der Bauchhöhle entsprechenden Theile der Wirbelsäule und den Knochen des Beckens und der untern oder hinteren Extremitäten besteht. Merkwürdig ist, daß letztere gestreckt sind und eine gerade Linie mit der Axe des Körpers bilden und im Hüft- und Kniegelenke fast ganz unbeweglich sind. Die rechte hintere Extremität ist beträchtlich länger und stärker als die linke. Die Klauen derselben sind ungefaltet. Der ganze Körper ist mit ziemlich langer weißer Wolle besetzt, nur in der Bauchgegend ist sie sparsamer. — Die Haut, die sonst bey kopflosen Mißgeburten unförmlich fett ist, oder viel gallertige Substanz enthält, zeigte an dieser Mißgeburt eine besondere Deformität; sie bildete, nach der vorgelegten Abbildung, am ganzen Umfange des Rumpfes 9 bis 10 ungleichförmige, größere und kleinere wulstige oder sackförmige Hervorragungen. Nach Durchschneidung eines größeren dieser Säcke, floß eine dünne, seröse Flüssigkeit aus, worauf allmählich die sämtlichen wulstigen Säcke zusammenfielen. Diese Säcke bestanden im Innern aus einem faserigen und serösen Gewebe, welches viele größere und kleinere unter sich zusammenhängende, mit serösen Membranen ausgekleidete Zellen bildete. Wurde daher nach Ausfluß der serösen Flüssigkeit, die sie enthielten, in einen dieser Säcke Luft eingeblasen; so verbreitete sich diese durch die Zellen aller Säcke, und sie nahmen ihre natürliche Form und Ausdehnung wieder an. Die eingeblasene Luft gieng selbst in das Zellgewebe der Haut der hinteren Extremitäten über. Weder für Geschlechtstheile, noch für Harnsystem, noch für den Darmcanal befindet sich äußerlich am Körper eine Oeffnung. In der Mitte der Bauchgegend ist die Nabelschnur inserirt. Obgleich an dieser Mißgeburt die obere Körperhälfte fehlt und die vorhandenen 3 untern Rippen und Brustwirbel nur zur Bildung der Bauchhöhle beitragen, zwischen diesen Rippen und der Bauchhöhle

auch keine Spur eines Zwercsfelles vorhanden ist; so befindet sich doch an der linken Seite des Rumpfes unterhalb des obersten Hautwulstes ein Kopfrudiment von eigenthümlicher Form. Das Kopfrudiment befindet sich an der linken Seite eines Hautwulstes, ist wenig hervorragend, und hat nur gegen  $1\frac{1}{2}$  Zoll im Umfange. Es befindet sich daran mehrere kleine ungleichförmige Erhabenheiten, und zwischen denselben eine nur 2 Linien tiefe Grube, deren Grund geschlossen ist, und in keine innere Höhle führt. Die äußere Haut hat von diesen Erhabenheiten an und in die angegebene Grube hinein eine schleimhäutige Natur angenommen. Eine dieser Erhabenheiten am Umfange der Grube ist nur 5 Linien lang und 2 Linien breit, — und flach oval, hat die Gestalt einer kleinen Zunge, war im frischen Zustande wie eine solche röthlich. Die Oberfläche derselben ist mit vielen kleinen, dem Papillarkörper der Zunge ähnlichen Wärtchen besetzt. Drey andere kleine Erhabenheiten an dem angegebenen zungenähnlichen Theile haben eine drüsensähnliche Beschaffenheit und scheinen kleine Rudimente von Speicheldrüsen zu seyn; eine fünfte solche Erhabenheit ist knorpelig. Dieses Kopfrudiment hat daher viel Eigenthümliches, was auch die vorgelegten Abbildungen genau anschaulich machen. — Die Muskeln an dieser Mißgeburt sind sehr unvollkommen ausgebildet; sie bilden eine unformliche, chaotische, fibröse Masse von mehr weißlicher Farbe und hängen mit der unformigen äußeren Haut zu einem Ganzen zusammen. Nur in der Nähe von Knochen der hinteren Extremitäten hatte dieß unformliche fibröse Gewebe eine etwas röthliche, muskulöse Beschaffenheit, ohne jedoch in einzelne bestimmbare Muskelpartien abgegränzt zu seyn. Die Bauchhöhle ist klein und nimmt nur die höchste Gegend des Rumpfes ein, daher sich auch die Nabelschnur sehr hoch an dieselbe inserirt. Sie ist vom Bauchfelle ausgekleidet, von dessen äußerem Umfange in verschiedenen Gegenden Fortsätze in die oben beschriebenen Wülste und zelligen Säcke der Haut ausgingen. Doch hatte die Bauchhöhle keine Communication mit den Zellen dieser Säcke, enthielt auch keine seröse Flüssigkeit wie diese. Die Bauchhöhle enthielt einen sehr langen Darmcanal; er ist länger als in allen bisher beschriebenen kopflosen Mißgeburten. Das Bauchfell fest sich an die ganze Länge desselben als Gefäße fort. Er fängt im obern Theile der Bauchhöhle blind geschlossen als Dünndarm an, und macht als solcher 12 Windungen. Am Ende der 12. Windung befindet sich ein sehr langer wurmförmiger Blindarm = Anhang. Der von diesem Anhang an fortgesetzte Dickdarm machte noch 15 Windungen, nahm erst in seinen letzten 4 Windungen als Mastdarm an Dicke zu, und sein Ende hing blind geschlossen durch eine kurze bandartige Verlängerung des Bauchfelles mit dem tiefsten Theile der Bauchhöhle zusammen. An der Stelle von Nieren waren kleine drüsensähnliche Häufchen vorhanden. Es befand sich in der tiefsten Gegend der Bauchhöhle eine äußerst kleine, längliche Harnblase, von welcher ein Urachus in den Nabelstrang überging. Rechts und links der Harnblase, in ziemlicher Entfernung von derselben, hing auf jeder Seite mit dem Bauchfelle ein kleiner Hoden zusammen. Der Kreislauf des Blutes geschah bloß durch eine Nabelvene, die sich nach ihrem Eintritt in die Bauchhöhle, einen Bogen bildend, wie eine Aorta an alle Theile des Körpers verzweigte, und sich am Ende in die beiden Nabelarterien theilte. In diese gingen kleine Blutgefäße, die von allen Theilen des Körpers kamen, über, und diese Nabelarterien, die das Blut vom Körper zurückführten, vertraten somit das Venensystem. Dieß Ver-

hältniß der Nabelarterien und der Nabelvene zeigte sich deutlich durch Einsenkung derselben mit Quetschfingern. Das Nervensystem besteht aus einem unformigen Gangliengeflechte hoch im Hintergrunde der Bauchhöhle, und aus Nerven, die aus dem vordernen Lenden-, und unvollkommenen Kreuzbeintheile des Rückenmarkes kommen; am deutlichsten zeigen sich kleine Nerven für die unteren Extremitäten, welche aus einem Geflechte entspringen, das dem Lenden- und Kreuzbeingeflechte entspricht.

#### 7) Lehnhoffet: Mißgeburt einer Kuh.

8) Berres: über die kleinen Muskeln an den Gelenken zur Spannung der Synovialcapseln; Canal im Glaskörper für die Arterie und Vene.

Ueber die Bildungsverhältnisse der Schleimhaut der weiblichen Geschlechtstheile. — Durch microscopische Untersuchungen wird dargethan, daß die Schamlefzen und zwar die kleinen an allen Punkten, die großen aber nur nach innen, der Kiefer, der Vorhof und die innere Fläche der Scheide, endlich der Gebärmuttermund mit einer ungemein Anzahl langer Laströhrchen, welche das intermediäre Schlingennetz durchdringen, versehen; der Hals der Gebärmutter aus einem großen Paquet von Haufendrüsen, welche ihre einzelnen Ausführungsgänge im Raume zwischen den Falten des Lebensbaumes ausmünden, und die allenthalben an ihren Wandungen ein starkes intermediäres Maschennetz besitzen, zusammengesetzt seyn; die Gebärmutterhöhle aber ein der Schleimhaut des Dickdarms ähnliches punctirtes Ansehen besitze, welches vom Ossein isolirt stehender einfacher Drüsen und ihrer Ausmündungen ergänzt wird. Hier umweht das intermediäre Maschennetz sowohl die in die Gebärmutterhöhle ragenden als auch die Fläche der Wandungen der einfachen Drüsen. Diese Hautverlängerungen der Gebärmutter sind es, welche mit der Placenta vorherrschend sich verbinden; hier wurzeln die vorzüglichsten Gefäße, und da scheint der lebhafteste Verkehr zwischen der Mutter und der Frucht Statt zu haben. Die Wand des Tubencanals umgibt ein einfaches Maschennetz; am Abdominalende der Trompete erblickt man jedoch Körper, die als Zotten und Falten dem unbewaffneten Auge sich darstellen, in ihrem Innern aber bezüglich des Baues zwischen den Strahlenfortsätzen des corp. ciliare und den Darmflocken in der Mitte stehen, daher ein starkes venöses Centralgefäß (d. i. in jeder Flocke und kleinen Falte) in der Achse und über ihren Scheiteln und Körpern das intermediäre Gefäßnetz ausgebreitet darbieten.

Die durch oben bezeichneter Merkmale und Bildungseigenheiten begränzte Analogie mit Organtheilen, deren Function bekannt ist, läßt der Vermuthung Raum, daß die Lezen, die Clitoris, die Scheide und der Gebärmuttermund zur Hervorrufung des Gefühles der Wollust bestimmt und während der Begattung thätig sind; der Gebärmutterhals und die in diesem Bezirke liegenden Drüsen um so mehr zur Absonderung des Menstrualblutes dienen als man bei Sectionen vorherrschend hier die größte Secretion des Blutes findet und der Gebärmutterhals bey Alten allmählich sich verkümmert und gleichsam verschwindet. Die Schleimhaut der Gebärmutterhöhle scheint dem Gefäßnetze der inneren Ernährungsdrüsen (als Gegenfas) — Gegenorgan der Brust- oder Milchdrüsen) vorzueilen. Endlich sprechen die Theile des Laufs abdrückes durch ihre Bildung das Vermögen, sich zu erigieren und Stoffe aufzunehmen, deutlich aus.

Prof. Th. Bischoff aus Heidelberg berichtigte seine früher ausgesprochene Meinung über die tödtlichen Folgen der Transfusion des Säugethierblutes in die Venen der Vögel dahin, daß dieses nur für die Transfusion des venösen Blutes gültig sey.

9) Purkinje, über die scheinbar canaliculöse Beschaffenheit der elementaren Nervencylinder, L. VI. §. 9–20. Bekanntlich haben schon die ältesten ärztlichen Physiologen, durch oberflächliche Analogie mit den Blutgefäßen geleitet, die Nerven für hohle Kanäle gehalten: doch waren dieß nichts als *Placita*, ihren Hypothesen von Nervensfluidum und Lebensgeistern zu Gefallen erfunden. In neuerer Zeit gelang es Bogros, die Nerven bis weit in ihre äußersten Verzweigungen mit Quecksilber auszuspritzen, aber dieß galt wahrscheinlich nur von den Scheiden der Nervenbündel, nicht von den elementaren Nervenfäden. In neuester Zeit hat Ehrenberg auch letztere als hohle Kanäle erkannt, in denen das dickflüssige Nervenmark in einer vom Centrum gegen die Peripherie fortschreitenden Bewegung begriffen seyn könne. Es bleibt jedoch noch immer der Zweifel ungelöst, ob man das Nervenmark überhaupt zu den festen oder flüssigen organischen Stoffen zählen solle, abgesehen von der inneren vegetativen Bewegung, welche den Stoffwechsel vermittelt. Wenn es nun gelänge, selbst innerhalb der Substanz des Marks oder elementaren Nervenfasern einen Kanal zu finden, den eine flüssigere Materie ausfüllte; so wäre für jenes, wenigstens relativ genommen, der Charakter der Solidität gewonnen, und es bliebe der Hypothese frey, diesem noch flüssigeren Inhalt einen Umlauf zu geben. Bey sehr feinen durchscheinenden Querdurchschnitten durch die Nervenbündel eines frischen Nerven gelang es ihm, die Lumina der elementaren Nervenfäden zu Gesichte zu bekommen. Es zeigte sich an der äußersten Peripherie eine kreisförmige Doppellinie, entsprechend der umhüllenden Membran des Nervencylinders, welche gefäßartig das Nervenmark umschloß; dann folgte nach innen zu ein dickerer Kreis, die Schicht des Nervenmarks, und im Centrum eine meistens mehrfache vollkommen durchsichtige Stelle, die man als den inneren Kanal des Nervenmarks ansehen konnte. Da jedoch solche gelungene Schnitte nur vom seltenen glücklichen Zufalle abhingen, nahm derselbe gehärtete Nerven zur Untersuchung, wo die feinsten und durchsichtigsten Querdurchschnitte jedesmal mit aller möglichen Sicherheit gelingen. Auch hier zeigten sich im Lumen jedes Nervenfadens gerade dieselben Umriffe (Fig. 9).

Wenn man einen dünnen Längenschnitt des gehärteten Nerven betrachtet, so zeigte sich hier mitten im Nervenmark ein dünner durchsichtiger Streifen. Ähnliches sah man an den, aus den Schläuchen der Elementarfäden durch Quetschung hervorbringenden cylinthischen Markfäden (Fig. 10). Nochmals wurde P. wieder zweifelhaft über die Consistenz dieser Differenzen im Nervenmark; indem er nach Burdach's Methode frische Nerven unter lauem Wasser untersuchte, wo sich die innere Substanz des elementaren Nervenfadens sehr limpid zeigte, und keine Spur von einem inneren Canaliculus zu sehen war. Demohnachtet weisen jene Beobachtungen auf eine organisch angelegte Structur im Innern des Marks des elementaren Nervencylinders hin, und es ist kaum anzunehmen, daß diese Structurvorgänge bloß durch die Wirkung der Verhärtungsmittel herbeigeführt worden wären. Ferner sprach P. über die Fortsetzung des Nervus sympathicus in die Cerebralarterien. Diese Nerven haben schon Lancisi, Wrisberg, Sömmerring

und andere bemerkt. Man kann sie theils von den Intervertebralarterien, theils von der ophthalmica an die großen Arterien der Hirnbasis, und mit Hilfe der Vergrößerung bis in die zweyten Ramificationen der Arterien der Fossa sylvii und des Corpus callosum verfolgen. Man muß sich bey dieser Untersuchung jedoch sehr hüten, Fäden der Arachnoida, welche sich allenthalben nach innen gegen die Gefäßhaut fortsetzen, und besonders die größten Arterienylinder umspinnen, mit jenen zarten Nervengeflechten zu verwechseln. Es macht nicht geringe Schwierigkeiten bey der Kleinheit und Zartheit dieser Nervenfäden, sich über ihren Nervencharakter microscopisch zu versichern. Es liegen hier die Elementararterien fast nackt zu Tage, und entbehren des festen Neurilems, welches die Bündel anderer Nerven umspinnt. In Fig. 11 ist ein solches Nervengeflecht, welches die Arterien der Carotisbrücke etwas vergrößert umspinnt, dargestellt; Fig. 12 ein Stück eines Nervenzweigs dieses Geflechtes mit seinen Elementararterien und eigenen Blutgefäßen. Es ist merkwürdig, daß ein in physiologischer und pathologischer Hinsicht gewiß höchst wichtiges Nervengeflecht wie dieses bis jetzt in den anatomischen Compendien entweder ganz mit Stillschweigen übergangen, oder nur im Vorbeigehn erwähnt wurde. Es ist zu wünschen, daß das erhöhte Interesse unserer Zeit für die Untersuchung des Organismus auch der Erforschung dieser Gefäßnerven sich zuwenden möchte.

Ueber den körnigen Ueberzug, welcher die Plexus choroides aller Hirnhöhlen bey Menschen und wohl bey allen Classen der Rückgrathsthiere umgibt. Die Körnchen desselben sind halb durchscheinend mit einem Körnchen differenter Substanz an ihrer Oberfläche, haben ein rundliches, aus der Körnerschicht nach außen frey hervorstehendes und ein spitziges Ende, womit sie an einer zarten, höchst erpanförmigen Membran, welche die Gefäße des Plexus unmittelbar umgibt, nach innen zu befestigt sind. Sieh Fig. 13 ein Stückchen der Plexusmembran aus den Seitenventrikeln des Menschen; Fig. 14 solche Körner isolirt; Fig. 15 ein Stöckchen des Plexus aus dem vierten Ventrikel des Menschen. Diese Körnchen scheinen epidermoidaler Natur zu seyn; Kümmerthären sind durchaus nicht an ihren freyen Enden zu entdecken. Ihre limpide Beschaffenheit könnte verleiten, sie für nervenartig zu halten; da sie jedoch mit wirklichen Nervenfäden weder in Verührung noch in irgend einem offensbaren Zusammenhange zu stehen scheinen, so ist dieß wohl für jetzt nicht anzunehmen. Vielleicht hat diese Membran die Function der Einsaugung in den Hirnventrikeln, wodurch das Uebermaaß der dort von den Wänden secretirten serösen Flüssigkeit jedesmal den zahlreichen Venen des Uebergeflechtes überleitet würde, und sie hätte eine ähnliche Function wie die gleichfalls hervorragenden, mit reichen Gefäßgeflechten versehenen und mit zarten Körnchen umgebenen Boten des Darmcanals.

Er sprach ferner über die gangliöse Natur bestimmter Hirnthheile. Man hat zwar, seitdem der Begriff der Ganglien klarer aufgefaßt wurde, nie unterlassen, auch im Gehirn die grauen kugligen Massen als Ganglien aufzufassen. Dies that schon Gall, sodann Reil und andere. Diese Analogie war jedoch nur von der äußeren Gestalt und Farbe hergenommen, es fehlte ihr noch die Bestätigung, welche nur die innere organische Structur gewähren kann. Schon vor 6 Jahren beobachtete er, daß die sogenannte schwarze Substanz der Shenkel des großen Gehirns aus dunkelbraunen, schon mit dem

bloßen Auge unterscheidbaren Flocken zusammengefaßt sey. Als durch Ehrenbergs Untersuchungen zuerst die Nervenganglien eigenthümlichen Ganglienkörner bekannt wurden, fand P. bald die Analogie dieser mit denen in der schwarzen Hirnsubstanz gefundenen, und er unternahm es, die ganze Topographie dieser gangliösen Körperchen, insofern sie im Gehirn gefunden werden, zu bearbeiten. Hier mögen vorläufig die Hauptresultate seiner Untersuchung ihren Platz finden.

a) Die wesentlichen Charactere eines gangliösen Körperchens sowohl in den Nervenganglien als im Gehirn sind: eine kornförmige, theils kuglige, theils rundlich eckige Gestalt mit oder ohne Fortsätze, die Substanz ist härlich, durchscheinend, besteht aus feiner, wahrscheinlich nervöser Punctmasse, und widersteht dem Drucke und chemischen Reagentien länger, als andere Nervensubstanzen; das Ganglionforn ist im Vergleiche mit microscopischen Gebilden groß zu nennen, von 8—30 einer

800

Wiener Linie; im Innern enthält es einen runden, in einer sphärischen größeren Hülle eingeschlossenen, etwas durchsichtigeren Kern, dessen Größe mit der Größe des ganzen Ganglienforn im Verhältnisse steht; in den Nervenganglien haben diese Körner eigene zellige oder gar safrige Hüllen, die sie nur nach dem stärksten Drucke verlassen; solche Hüllen zeigen sich nicht an den gangliösen Körperchen des Gehirns. An vielen Ganglienkörnern im Hirn- und Nervensystem zeigen sich Pigmentflecke von verschiedenen Nuancen des Braunen, und von verschiedener Verbreitung; meist lassen sie an der Seite oder ihrer Mitte eine durchsichtige Stelle frei, durch welche der Centralforn hindurchscheint; das Pigment selbst besteht wie anderwärts aus sehr kleinen Körperchen mit Brown'scher Bewegung.

b) Ueber den Zusammenhang der gangliösen Körperchen mit den elementaren Nerven- und Hirnfäden konnte noch nichts Bestimmtes ausgemittelt werden. In den Nervenganglien scheinen sie in ihrer Capel ganz isolirt sich zu befinden; die elementaren Nervenfasern bilden nur vielfach Schlingen um dieselben, ohne mit ihnen zusammenzuwachsen. Die Fortsätze der gangliösen Körperchen im Gehirn und Rückenmark scheinen manchmal mit den sie reichlich umgebenden Blutgefäßen zusammenzuhängen; doch konnte dieß nie bis zur Evidenz erwiesen werden, noch weniger konnte man hier das Verfallen der so äußerst garten Hirnfäden ermitteln. Meistens zeigte sich, daß die gangliösen Körperchen hier in einer zähen faserlosen Punctmasse eingebettet sind.

c) Die Topographie der gangliösen Körperchen im Gehirn und Rückenmark ist nun folgende: Am auffallendsten zeigen sie sich in der schwarzen Substanz der Großhirnschnecke, in der rothfarbigen Substanz, in den vordern Winkeln der vierten Hirnhöhle. Dort haben sie vielfache Fortsätze, welche die abentheuerlichsten Gestalten zeigen (sich Fig. 16); ihr Pigment ist dunkelbraun, und bey manchen Individuen sehr angehäuft, bey andern, besonders jüngern, ziemlich sparsam. In der vierten Hirnhöhle sind die Körperchen rundlich, zeigen selten deutliche Fortsätze, ihr Pigment ist heller und rothbraun. Ferner zeigen sich gangliöse Körperchen an verschiedenen Stellen, in der Substanz und der Corpora geniculata. Hier sind sie meistens sehr weich, rundlich, und die Körner ihres Pigmentes heller braun, und verhältnismäßig groß (Fig. 17). Ferner zeigen sich kleine, terrestrische gangliöse Körperchen mit Fortsätzen und schwachen

Pigmentflecken in einer eigenen grauen Schicht der gerollten Spiralsplatte des Ammonshorns. Im hintern Lappen des großen Gehirns in der Nähe der Substanz innerhalb der Marksubstanz findet man gleichfalls gangliöse, längliche, feigenförmige Körperchen mit Fortsätzen an dem dünnen Ende. Ähnliche Körperchen in großer Anzahl und theilweis die gelbe Substanz umgebend, zeigen sich allenthalben in den Blättern des kleinen Gehirns. Jedes dieser Körperchen ist mit dem stumpfen, rundlichen Ende nach Innen gegen die gelbe Substanz gekehrt, und zeigt in seinem Kolben deutlich sammt seinem Hofe den centralen Kern; das andere schwanzförmige Ende ist nach Außen gerichtet, und verliert sich mit meist zweien Fortsätzen in der grauen Substanz bis nahe an die äußere Peripherie, wo diese mit der Gefäßhaut umponnen ist. (Figur 18.) So zeigt sich's allenthalben in der ganzen Ausbreitung der blätterigen Windungen des kleinen Gehirns, so daß dieses dadurch vorzugeweise die Bedeutung eines Ganglions erhält. Diese Bedeutung wird noch erhöht durch die Beschaffenheit der rhomboiden Körper innerhalb der Marksubstanz des Kleinhirns, indem die den Kern des Corpus rhomboideum umgebende gelbgraue Schicht zwischen sparsamen Hirnsfasern und grauer härlicher Punctmasse allenthalben eckige pigmentlose gangliöse Körperchen enthält. Ähnlich beschaffen ist die graubraune Substanz, welche als Schale den Olivenkörper des verlängerten Markes umgibt. (Fig. 19.) Endlich hat auch der Hirnnoten oder die Parabrücke die Bedeutung eines Ganglions durch die große Menge rundlicher, mit grauem Pigment bedeckter Ganglienkörperchen, welche in den, mit faserigen abwechselnden Lagen von grauer Masse dieses Knotens eingestreut sind. — Ähnliche, theils rundliche, theils eckige, verhältnismäßig größte gangliöse Körperchen finden sich in dem ganzen Tractus der grauen Substanz des Rückenmarks. Es finden sich noch an verschiedenen Stellen der grauen äußeren Substanz des großen Gehirns, und der grauen Substanz der gestreiften Körper hin und her größere Körner, von denen es noch nicht ganz entschieden ist, ob sie gangliöse Körperchen sind, da der Centralforn mit seinem Hofe nicht deutlich zu sehen war.

d) Außer diesen gangliösen Körperchen gibt es noch andere Gebilde im Hirn, welche keinen Centralforn enthalten, und zu ganz verschiedenen Klassen gehören. So allenthalben größere, aus Punctmasse bestehende graue, weiße Körner, in der grauen Substanz der Windungen des großen Gehirns. Ferner eine eigene Gattung klar durchsichtiger runder oder rundlich eckiger, dem Ansehen nach den Amylonkörnern ähnlicher Körperchen von wachsender Consistenz (Fig. 20), welche die lamina cribrosa vor dem chiasma nervorum opticorum und die Hornstreifen zu beyden Seiten der thalami reichlich besetzen. Eine andere Gattung kleiner sehr gleichmäßiger Körnchen constituit nebst elementaren Hirnsfasern die gelbe, mittlere Substanz des kleinen Gehirns.

e) In Bezug auf die Bedeutung der gangliösen Körperchen wäre zu bemerken, daß sie wahrscheinlich Centralgebilde sind, wofür ihre ganze, dreifach concentrische Organisation spricht, und die sich zu den elementaren Hirn- und Nervenfasern wie Kraftcentra zu Kraftleitungslinien, wie Ganglien zu Gangliennerven, wie die Hirnmassen zu Rückenmark und Hirnnerven sich verhalten möchten. Sie wären Sammler, Erzeuger und Vertheiler des Nervensystems. —



10) Prof. Verres teug seine Ansicht über die Bildungsverhältnisse der Nerven vor. Hier wurde erwähnt, daß zur Zeit der Entdeckung Ehrenbergs die Organisation der Nerven dem Sprecher ebenfalls schon bekannt war, daß aber, da der Gegenstand in seinem ganzen Umfange noch nicht im Klaren stand, die Veröffentlichung erst später geschah. Die 3 bekannten Nervenformen wurden erklärt. Bey der Darstellung der Bildungsverhältnisse der Nervenganglien, wurde der Zellbläschen, die vom Prof. Hyrtl bereits in den Jahrbüchern des österreichischen Staates zur Sprache gebracht wurden, erwähnt, und die Meinung, daß diese für die Function der Nerven höchst wichtig, ja vielleicht das seyn mögen, was das Herz und die elastischen Häute den Gefäßen sind — Erection, Irritation und Bewegungsorgane für dieselben nehmlich näher beleuchtet.

Derselbe, über die durch fortschreitendes Alter des Menschen bedingte Umwandlung der Formen der Darmfloken. Hier wurde gezeugt, daß bey den Neugeborenen eine Art kleiner Falten, die sich später in pyramidale Körper, und in den Jahren der Dentition durch wiederholtes Einschnüren und Spalten allmählich in walzenähnliche Verlängerungen und endlich in den Jahren der Reife in die an ihrem äußersten Ende etwas kolbenähnliche Spindelform ausbilden. Mit vorwärts schreitendem Alter werden diese Falten immer länger, im hohen Alter aber immer dünner, kürzer und sparsamer —, daher sie aufgezogen und so verloren zu gehen scheinen.

Die innere Structur aller Formen nach den verschiedenen Lebensperioden wurde nun genauer erklärt, und durch illuminierte Tafeln sowohl, als durch das größere anatomische Werk des Vortragenden: „Anatomie der microscopischen Gebilde des menschlichen Körpers,“ von welchem ein Exemplar vorlag, und endlich durch die Autopsie mittelst des von demselben mitgebrachten großen Plößischen Microscopes veranschaulicht.

11) Prof. Hyrtl, über Bedeutung der Nebennieren, Sinus der Aorta bey mehreren Karpfenarten, die Lungengefäße der Schlangen.

12) Dr. Zeller zu Prag sprach: a) über das Blut des Menschen und der rothblütigen Thiere, und über die von ihm enthaltene Rhodizonssäure (eine fauere Oxydationsstufe des Kohlenstoffs) als Bestandtheil des Blutes, und die einzige Ursache der rothen Farbe desselben, welche durch die Rhodizonssäure in Verbindung mit Eisenerz und Alkali, dann mit Eisenoxyd bewirkt werden soll, und welche Verbindungen den rothen Farbstoff des Blutes ausmachen. — Dr. Zeller machte zugleich diese Verbindungen auch öffentlich, und zeigte die Uebereinstimmung der künstlichen Verbindungen mit dem natürlichen Farbstoff des Blutes (Cruor). Er machte auf das bereits bekannte Verhalten des rothen Blutfarbstoffes zu Reagentien aufmerksam, und zeigte, daß die Reactionen solche sind, wie sie der Rhodizonssäure zukommen. — Ferner fand er noch eine braune kohlenstoffreiche Substanz im Blute, welche im venösen in größerer Menge vorhanden zu seyn scheint als im arteriellen, und welche bey der Umwandlung des venösen Blutes in arterielles zum Theil zu Rhodizonssäure und Kohlenensäure höher oxydirt wird.

b) Sprach er über die Natur des Athmungsprocesses, und erklärte die Bildung der Rhodizonssäure und Kohlenensäure während des Athmens und des Kreislaufs, so wie die Ausscheidung  
Jfis 1838. Heft 8.

des im Blute aufgelöst erhaltenen Stickstoffs durch das Ausathmen. Ferner sprach er über die Umwandlung des venösen Blutes in arterielles, und des letztern in ersteres, und die Art der Verschiedenheit beyder.

c) Machte er mehrere Bemerkungen über verschiedene Veränderungen und Prozesse im thierischen Organismus, womit das Frühere nach seiner Ansicht im Zusammenhang steht. Er erwähnte der Veränderungen des Blutes während der Weichsucht, der Menstruation und des Winterschlafes der Thiere, machte auf die Aehnlichkeit des Blutes während diese Zustände aufmerksam, und spricht die Vermuthung aus, ob nicht an der Rhodizonssäure ein Mittel gegen die Weichsucht gefunden werden könnte; denn das Blut der Weichsuchtigen zeichnet sich durch einen größeren Gehalt an Kohlenstoff aus, und ist so dem Blute während des Winterschlafes und dem Menstrualblute ähnlich. Die Differenz zwischen venösen und arteriellem Blut ist geringer, es wird weniger Kohlenensäure ausgeathmet und die Wärmeerzeugung ist geringer. Verkeimmungen und kurzes Athmen finden so wie bey Weichsuchtigen auch bey der Menstruation, dem Winterschlaf und dem Maufen der Thiere, wober den Vögeln die Federn blässer werden, Statt. — Es sey also bey diesen Zuständen die Bildung der niedrigen (kohlenstoffreichen) Oxydationsstufe des Kohlenstoffs überwiegend, während die bey diesen Zuständen herrschende Verkeimung und durch das schwächere Athmen die Oxydation des kohlenstoffreichen Drydes zu Rhodizonssäure und Kohlenensäure in den Lungen und während des Kreislaufes nicht gehörig vor sich gehen kann, woher auch die geringere Wärmeerzeugung zu kommen scheint.

d) Zeigte er, daß das Eigelb eine Verbindung von Rhodizonssäure mit Eiweiß seyn dürfte. Er bereitete auch diese Verbindung *ex tempore*, welche von dem natürlichen Eigelb scheinbar nicht zu unterscheiden war. Man bemerkte in dieser künstlichen Verbindung, wenn sie eine Weile mit einem Ueberschuß von Rhodizonssäure gestanden ist, hie und da blutrothe Streifen, so wie sich die Gefäße in dem Dotter eines im Bebrütungsprocess begriffenen Eies darstellen. Er bemerkte, daß für die Wahrscheinlichkeit jener Zusammensetzung des Dotters, auch der Umstand spricht, daß alle von ihm bisher dargestellten Verbindungen der Rhodizonssäure mit thierischen Stoffen, (so wie die mit den mineralischen und vegetabilischen Basen) eine rothe Farbe (in verschiedener Nuance) besitzen, nur die Verbindung mit Eiweiß gelb ist. Auch stellte er einige Ansichten über die Verwandlung des Eies während des Bebrütens auf.

e) Erwähnte derselbe, daß es ihm gelungen ist, die Farbstoffe der rothen und gelben Federn und Haare mancher Thiere vollkommen und unverändert zu trennen; und es erhielt sich der rothe Farbstoff gegen Reagentien, wie rhodizonsaure und der gelbe wie krockonsaure \* Verbindungen. Er zeigte mehrere rhodizonsaure und krockonsaure Salze vor, welche den schönsten farbigen Metallglanz besitzen; z. B. die rhodizonsaure Kupfererde ist schön karmiroth, und zeigt bey auffallendem Lichte (oder mit einem klaren Körper gestrichen z. B. Achat) einen schön papagegrünen Metallglanz; das rhodizonsaure Kali oder Natron ist blutroth, und besitzt einen blaugrünen Metallglanz,

\* Die Krockonsäure ist, wie Heller zuerst zeigte, ein Product freiwilliger Färbung der Rhodizonssäure.

so wie Pfauenfedern, usw. Das kroskonnale Kupferoryd, Kobaltoryd, Eisenoryd ist braun, bey auffallen dem Lichte schön blau metallisch glänzend u. a. m. Hieraus zieht er die wahrscheinlichen Folgerungen, daß auch die braunen, schwarzen, grünen und blauen Federn und die dunklen Haare, ferner die Fäulgebilden der Coleopteren und anderer Insecten durch ähnliche, bisher noch unbekannte Oxydationsstufen des Kohlenstoffes, die so wie jene durch die Respiration gebildet werden konnten, und mit einem thierischen Stoffe z. B. Hornsubstanz, Faserstoff und anderen in Verbindung ihre Farbe erhalten haben können. Ebenso zog er aus andern hornartigen Körpertheilen der Vögel und anderer Thiere den Faserstoff z. B. aus der rothen Haut, die sich bey den Auerhähnen, den Fasanen, den Wickenhühnern u. a. neben den Augen findet, ferner aus der gelben Haut der Füße mancher Raubvögel u. a., endlich aus den Häuten mancher Reptilien.

13) **Lenhossek**, Anwendung der neuern anatomischen und physiologischen Untersuchungen auf den Unterricht. Die subtil wissenschaftliche Polemik sey auszuschließen.

14) **Dr. Kohen**, ein Kranker lebte 2 Wochen ohne Puls. Hyrtl fand die Arteria radialis mit einem abweichenden Verlauf und dieses könnte zu einer solchen Beobachtung Veranlassung gegeben haben.

15) **Prof. Bischoff** aus Heidelberg sagte in Bezug auf Hellers Vortrag, er habe bey neuern Versuchen frene Kohlensäure im Blute gefunden, was auch Magnus bestätigt; diese habe Heller nicht in Betrachtung gezogen.

16) **Prof. Trombholz**, über einen Anencephalus.

17) **Dr. Bochdalek** zu Prag, sprach über die von Schlemm entdeckten Nerven der Cornea, nahm ihre Existenz gegen die von Arnold gemachten Einwürfe in Schutz, und wies Zeichnungen über den Verlauf dieser Nerven im Diefenauge vor.

18) **Purkinje** theilte die Hauptresultate seiner in Gemeinschaft mit **Dr. Poppenheim** unternommenen Versuche über künstliche Verdauung mit. Veranlaßt durch die neuesten höchst wichtigen Beobachtungen und Entdeckungen Beaumonts und Eberles und die fernern Untersuchungen Müllers und Schwanns über den Verdauungsproceß, unternahm die Genannten im Sommer 1836 und 37 eine Reihe Versuche über die künstliche Verdauung. Die ganze Arbeit theilte sich in vorbereitende, charakterisirende und in Nebensuche. — Zu den vorbereitenden Versuchen gehörte:

a) Gewinnung und nähere Bestimmung des Verdauungsstoffes, oder um einen spezifischen Namen zu haben, des Laabs. Das Laab ist die in den Schläuchen der Drüsenficht des Magens, bey Wiederkehrern ausschließlich des Laabmagens, enthaltene körnige Substanz. Es wird gewonnen durch Abstreifen der Drüsenficht von der innern Fläche des Magens mit einem stumpfen Messer, wobei das zellige Gewebe größtentheils zurückbleibt. Das Abgestreifte wird kurz ausgewaschen, bis es nicht mehr sauer reagirt, dann auf dicken Glasplatten ausgebreitet, schnell getrocknet, gepulvert und zum fernern Gebrauche in Gläsern mit weicher Mündung verschlossen. Am ausgiebigsten

sind die Mägen des Pferdes, Rindes und Schweines. Auch das Alter, die Lebenskraft und die Stellen innerhalb des Magens zur Gewinnung des Laabs sind nicht gleichgültig: so ist das Laab des Pfortnertheils weniger wirksam, als das der andern Stellen. Das Laab des Embryo verdaut fast gar nicht. Zum Gebrauche wird dann die angemessene Quantität des Pulvers abgewogen und ferner verwendet.

b) Als Gefäße dienen Glasröhren von etwa  $1\frac{1}{2}$  Zoll Durchmesser, und 1 Zoll Höhe, denen man als Deckel runde Glascheiben anpaßt, die am Rande mit Dichtpflaster bestreichen, die Gefäßen luftdicht verschließen. Uebriens ist die Gestalt des Gefäßes gleichgültig. Das bestimmte Moment ist hier die Leichtigkeit, mit der man die Veränderungen des Eryweisses bemerken kann.

c) Zur Erhaltung der gehörigen Temperatur, welche die Reifezeit ist, wählte man eine gut construierte Brütmaschine. Conft findet noch bis zu bedeutend (auf  $60-70^{\circ}$  R) gesteigerter Temperatur Verdauung Statt.

d) In Bezug auf das normale Verhältnis von Laab, Säure und Wasser zur Bildung einer wirksamen, künstlichen Verdauungsflüssigkeit des hartgekochten Eryweisses ergab sich, daß auf 2 Drachmen destillirten Wassers 3 gr. Laab und 2—3 Tropfen concentrirter Salzsäure kommen müssen. Dieses Ergebnis findet sich erst aus mehrfachen Versuchsreihen mit steigender Laab- und Säuremenge bey constanter Quantität des Eryweisses und des Wassers. So muß auch durch vergleichende Versuche mit verschiedenen Säuren die geeignetste Säure ausgemittelt werden. Diese ist nun die Salzsäure, wie auch die directe Analyse des Magensaftes lehrt. Weniger entschieden läßt sich die Quantität des Wassers bestimmen.

e) Um reine und entscheidende Resultate zu erlangen, ist das hart gekochte Eryweiss am geeignetsten. Man vermeide die Chelazene, welche jederzeit unverdaute Flocken zurücklassen; am besten dienen frischgekochte Eyer; doch kann man auch Eryweisswürfel, einige Zeit in wohl verschlossenen Gläsern aufbewahrt, vorzüglich halten. Man nimmt bey oben angegebenen Verhältnissen der Verdauungsmischung 3 gr. Eryweiss, wo dann bey sonst normalen Umständen die Schnelligkeit der Verdauung bemessen werden kann, die in der Regel auf 3 Stunden sich beläuft. —

Charakterisirende Versuche: Diese beziehen sich zunächst auf die Ermittlung der wesentlichen Eigenschaften des Laabs oder des Verdauungsstoffes, und auf den Proceß der Verdauung selbst. Die Eigenschaften des Laabs sind entweder physiologisch oder chemisch; erstere theils anatomisch, theils functionell. Mit Uebergang der anatomischen ist von den functionellen zu bemerken:

a) Das Laab bringt bekanntlich die Milch zum Gerinnen, um dann den ausgeschiedenen Käsestoff durch eigentliche Verdauung weiter zu verwandeln. Diese Gerinnung ist nichts Abnormes, sondern gehört wesentlich zum Proceß als erstes Glied desselben.

b) Das Laab für sich mit Wasser, ohne Vermischung von Säure unter mäßig erhöhter Temperatur, kommt schnell in Fäulnis, und versteht auch thierische Substanzen schnell in denselben Proceß. Wahrscheinlich ist diese Eigenschaft der Grund der so schnellen Fäulnis im Dickdarm. Laab ohne Vermischung der Säure, wie dieß bey dem Mangel an Nahrung der Fall ist,



mag nun den Fäulungsproceß im Organismus prävalirend machen, wie dieß die Erscheinungen der Hungerkrankheit zeigen. Technisch wäre dieß zu anatomischen Macerationen zu gebrauchen.

c) Die wesentlichste Eigenschaft des Laabs ist die eigentliche Verdauungslösung organischer, besonders tierischer Substanzen. Diese findet nur unter Vermischung einer Säure, zumeißt der Salzsäure, Statt, und braucht hier, als am meisten untersucht, nur eine Erwähnung.

d) Schon Beaumont hat bey seinen Versuchen die Bemerkung gemacht, daß der Speichel die Verdauung eher hindere als befördere, und daß derselbe zunächst nur zur Bildung des Bissens bestimmt sey. Die künstliche Verdauung bestätigt gleichfalls diesen Satz. Wenn man statt der Portion Wasser Speichel in das Gläschen bringt, so wird das Etweiß langsamer und meist unvollständiger verdaut. Daß die Bestimmung des Speichels nicht sey, die Stelle des Wassers, wie es scheinen könnte, bey der Verdauung zu substituieren, geht auch schon daraus hervor, daß der Magenflüssigkeit während der Verdauung schon für sich flüssig abgefordert wird.

e) Ein eigenes auffallendes Verhältniß zeigt die Galle gegen den Magenflüssigkeit. Die Galle scheint unter andern die Bestimmung zu haben, den Auflösungsproceß der Verdauung, der nur auf die Magenhöhle beschränkt seyn sollte, absolut sogleich zum Stillstande zu bringen, sobald der Speisefrey in den Raum des Zwölffingerdarms gelangt ist, wo wieder andere Veränderungen desselben vorgehen sollen. Diese Sistierung des Verdauungsprocesses erfolgt schon zum Theil dadurch, daß die Magensaftsäure durch das Alkali der Galle neutralisirt wird, theils aber wirkt das Gallenprincip direct hindernd ein.

Wenn man mehrere Gläschen mit Verdauungsmischung zum Versuche in die Brühmaschine hinstellt, und von halber zu halber Stunde in die Gläschen und andere einige Tropfen frischer Kalbsgalle hinzubringt; so findet man, wenn man nach 3—7 Stunden den Stand des Verdauungsfortschrittes in allen Gläschen vergleicht, daß das Etweiß jedesmal auf der Stufe der Auflösung und Verwandlung durch die ganze Zeit geblieben ist, auf welcher es in dem Augenblicke war, als die Galle hinzukam. Uebrigens hat die Schleimhaut des Zwölffingerdarms für sich auch noch einen kleinen Antheil Verdauungskraft, wie directe Versuche mit derselben bewiesen haben. Wenn man den durch Niederschlag mit Säure gewonnenen Gallenstoff zum Versuche anwendet, so wird die Verdauung zwar nicht ganz gehindert, jedoch bedeutend verlangsamt, und das grünlich gefärbte Etweiß zeigt eine eigenthümliche gallertartige Umwandlung. Eine ähnliche ungeförbte gallertartige Umwandlung zeigt sich, wenn die Verdauungsfähigkeit mit Etweiß übersättigt wird, wo nach einem gewissen Maasse der Sättigung die folgenden Portionen nicht mehr aufgelöst, sondern bey unveränderter Gestalt bloß durchscheinend und gallertähnlich werden.

f) Merkwürdig sind auch die schon vor einem Jahre mitgetheilten künstlichen Verdauungsversuche mit Hülfe des galvanisch-electrischen Einflusses, wobei letzterer am Sauerstoffspol die Stelle der Säure vertritt, wenn man ihn in ein Gläschen mit gewöhnlicher Verdauungsmischung, wobei die Salzsäure ausgelassen worden, hineinleitet, und dieses Gläschen mit einem andern am basischen Pol mittelst eines nassen Baumwollfadens

in Verbindung setzt. Der electrische Einfluß macht jedesmal aus dem Laab so viel Säure frey als nöthig ist, um die Auflösung des Etweißes zu Stande zu bringen. Es würde daraus hervorgehn, daß auch im Magen eine Art electrischer Einfluß mittelst der Nerven zu jedesmaliger gelegentlicher Entwicklung der Säure thätig sey, was, wenn wir auch von den Versuchen Philipps und anderer absehen, auch darum nicht widersinnig erscheint, da man nervös electrische Verrichtungen auch anderwärts (bey den electrischen Fischen) bemerkt, und daß für eine eigene Absonderung der Säure durchaus kein Organ im Magen zu finden war, auch kaum zu finden seyn wird, da die Säureentwicklung hier wie auch anderwärts, nur von einem erhöhten Nervenreize abhängig zu seyn scheint.

Es wäre interessant und auch leicht durch electromagnetische Versuche sich zu überzeugen, ob während der Verdauung an den Magenwänden wirklich electrisches Agens sich entwickelte; man könnte das entweder unmittelbar an Thieren, oder durch Verschlucken von leitenden Fäden an sich selbst bewerkstelligen. Die am basischen Pol concentrirte alkalische Laablösung zeigte mit Säure Verdauung.

g) Zu den physiologisch-chemischen Arbeiten Schwann's ist hier die Bemerkung beizufügen, daß das Verdauungsprincip durch Alkohol durchaus nicht zerstörbar sey, und daß sein Hauptlösungsmittel das reine oder mäßig gesäuerte Wasser sey. Sein Hauptkriterium wird wohl noch lange, wenn nicht für immer, das bleiben, daß es in Verbindung mit Säure die Auflösung des Etweißes zu Stande bringt. Die Wirksamkeit der Niederschläge aus der Laablösung durch neut. essigsaures Blei, salpetersaures Quecksilberorydul (auch durch Galläpfelsäure) bestätigen sich auch gegenwärtigen Versuchen, und geben die Aussicht, daß das in Verdauungsprincip oder Pepsin in reinem Zustande sich wird darstellen lassen.

h) Eine besondere Reihe von Versuchen veranlaßt die Ermittlung der Veränderungen, welche verschiedene organische Substanzen durch den Verdauungsproceß eingehen. Hier nur Einiges. Auffallend schnell wird verdaut der reine Faserstoff des Blutes, die Crusta inflammatoria, wenn sie nicht zu dicht ist und in sehr großer Menge verwendet wird. Dieß spricht abermals für die große Analogie, wenn nicht Gattungsgleichheit des Faser- mit dem Etweißstoff. Bey der Verdauung von Fleisch, Fett, Nerven, Drüsen u. wird jedesmal das bindende Zellgewebe zuerst und schnell aufgelöst, wodurch dann die microtomischen Elemente auseinander fallen, jedes in seiner Art eigenthümlich verändert. Es geht daraus hervor, daß dieses Zellgewebe mit dem Gewebe des fibrösen Systems, welches der verdauenden Auflösung widersteht, nicht identisch seyn könne, und sich mehr dem Faserstoff anreihe. Bemerkenswerth sind längliche, hirseformförmige, microscopische Körperchen, welche an den Muskelfasern und andern Geweben neu zum Vorschein kommen und wahrscheinlich nichts anderes als partielle, durch den Verdauungsproceß hervorgeführte Umwandlungen sind, welche das allgemeine Zerfallen der Substanzen einleiten. Die verdauende organische Zerkümmerng könnte übrigens auch bey microtomischen Untersuchungen brauchbar werden, eben so bey Macerationen.

i) Eine Reihe Versuche gewährt die Ausmittlung der die Verdauung hindernden und befördernden Umstände und Substanzen. Dahin gehört, daß der Zutritt oder die Ausschließung

der Luft nicht wesentlich sey, dahin die Bestimmung, Erhöhung und Erniedrigung der Temperatur, die Ausmittelung der Wirkung der Säure, die Ausmittelung der Säuregrade für verschiedene Laabforten, und zur Verdauung verschiedener Substanzen, die Wirkung, die Verdauung hindernd und befördernd bei indifferenten Vermischungen, des Kochsalzes, des Weingeistes, des Terpentins, der Gewürze ic. Es geht daraus hervor, daß die Magenaction eine gewisse Freyheit, in Wahl, Steigerung, Minderung seiner chemisch organischen Mittel haben müsse, um auch bey hindernden Umständen die Verdauung zu Stande zu bringen, was wieder einen freyen Einfluß des Nervensystems voraussetzt.

k) Endlich wären hier noch die pharmacodynamischen Wirkungen zu erwähnen, deren Untersuchung wohl noch im weiten Felde steht. Dahin gehört die Brechen erregende Wirkung des reinen Laabs, die direct Verdauung befördernde Einwirkung der säuerlichen Laablösung, wozu man ungehindert Spirituosa, Aether, ätherische Oele, Balsame, Gummiharze, als Corrigation hinzu bringen kann, ohne daß es die Verdauungslösung störe. Auch bey Geschwüren, Verhärtungen, Entzündungen, vielleicht auch bey Flüssigkeitswülsten wird das Laab für sich oder säuerlich vielfache nützliche Anwendungen finden, indem seine Tendenz, den Faserstoff des Blutes aufzulösen, bey allen Coagulationsprocessen von bedeutender Wirksamkeit seyn muß. Ob diese lösende Kraft durch anhaltenden inneren Gebrauch auch der Blutmasse mitgetheilt werden könne, um dadurch weitere mittelbare Wirkungen im Organismus auszuüben, müssen weitere Versuche lehren, wozu hiemit umfangene Pharmacodynamiker und Therapeuten aufgefordert seyn mögen. Als Nebenuntersuchungen können hier angeführt werden: die nähere Erörterung der Organisation der Magenbrüsen; die Topik des wirksamen Verdauungsstoffes, wozu zu bemerken ist, daß bey den Wiederwürmern nur der Laabmagen Verdauungsbrüsen zeigt, indeß der Wanst, der Netz- und Blättermagen nur mit einem epidermidalen Gebilde innerlich überzogen sind. Beym Pferdemagen ist das obere Drittel epidermidal, auch bey dem Schwein ein Stück in der Nähe der Cardia, eben so bedeutende Antheile im Magen der Vögel.

Alle übrigen Schleimhäute des Körpers, außer der Drüsenhaut des Laabmagens (etwa der Dünndarm zum Theil ausgenommen) verdauen nicht; ferner gehört nach Eberle zu den Nervenversuchen die Verwendung des Laabs zur Fällung, zur Lösung organischer Substanzen für technischen Zweck. Endlich läßt sich auch vermuthen, daß das einmal rein dargestellte Pepsin oder Laab wohl für die gesammte organische Chemie, auch abgesehen von der Verdauung, von großer Wichtigkeit seyn wird.

### Zoologische Verhandlungen.

Secretär: Presl.

1) Dr. Schlegel aus Leyden übersendet eine Abbildung der *Salamandra maxima* in natürlicher Größe. Lichtenstein, welcher dieß Thier lebend in Leyden gesehen hat, bemerkt, daß es ein sehr starkes Gebiß besitze und bloß im Wasser lebe. Hofrath Reichenbach fand auch eine Aehnlichkeit der Füße mit den Fährten, welche im Sandstein in Hessen gefunden worden, wodurch die zuerst ausgesprochene Ansicht des Hrn. Hofr. Carius bestätigt wird.

2) Dr. Sars sprach über die Entwicklung der nackten Gastropoden, *Acolidia*, *Tritonia ascanii*, *Doris* von der Westküste Norwegens; dann über die Fortpflanzung der *Tritonia ascanii*, welche er selbst beobachtete. Er fand, daß der Laich aus einer ungeheuren Anzahl von Eiern besteht, spiralförmig aufgewunden und mit einer Schleimhülle umgeben ist. Die einzelnen Eier sind oval, die Epiblasten oder Chorion umschließt mehrere Dotter (5—11); die Dotter sind kugelförmig und mit der Purcinnischen Blase versehen, die aber schon am 2ten Tage zu verschwinden anfängt. Im Anfange des 2ten Tages theilt sich der Vitellus in 2 Theile, am Ende desselben Tages schon viele in 4, am 3ten Tage sind alle in 4 getheilt, und viele schon in 8. So geht es nun mit den Theilungen fort, bis der Vitellus am 10. oder 11. Tage an seiner Oberfläche die feinsten Granulation zeigt. Am 12. oder 14. Tage zeigt sich ein Einschnitt in dem nun zum Embryo umgeformten Vitellus, welcher theils von der Hervorwachsung der runden Lippen, theils von der Concholie bewirkt wird. Dieses wird aber erst am 17. oder 18. Tage recht deutlich. Jetzt wachsen am Rande der 2 Lippen Cilien, mittelst welcher einige Embryonen anfangen, sich langsam im Kreise zu drehen. Am 25. oder 26. Tage werden diese Bewegungen recht lebhaft, wo die Embryonen äußerst rasch in allerlei Richtungen durch einander laufen. Die Schale, in welcher der Embryo enthalten, ist Anfangs schufelförmig, später (am 23.—26. Tage) nautilusartig. Der Embryo liegt noch überdies in einem sackförmigen, durchsichtigen Mantel, — besitzt einen völlig ausgebildeten Darm, einen von einer leberartigen, kugelförmigen, undurchsichtigen Masse umgebenen Magen. Er streckt das Fußinstrument hervor, welches mit einem Deckel zum Schließen der Schale versehen ist, und die beyden mit vibrierenden Cilien besetzten Lippen aus, und schwimmt so in dem Etwasser. Am 30.—31. Tage haben die Embryonen im Ey keinen Platz mehr. Die Epiblasten platzt zuletzt; sie treten hervor, und schwimmen rasch mittelst ihrer Cilien herum. Das Herausschlüpfen geht aber sehr langsam fort; denn erst am 38. Tage war die ganze Epishnur aufgelöst. Nun wurde die vorhin weiche Schale hart, hornartig, glänzend, und einer Nautiluschale ähnlich. Die Jungen blieben noch eine Woche lebendig in dem täglich erneuerten Seewasser, dann aber starben sie, ohne eine weitere Metamorphose gezeigt zu haben. Die weichen Theile lösten sich auf und die Conchylien schwammen zu Tausenden auf der Oberfläche des Wassers. Lichtenstein machte hiebei die Bemerkung, daß vielleicht viele von den festen Panzern, welche Ebergrenz in der Kieselgault, in dem Polster- und Kiebschiefer gefunden hat, von ähnlichen Thieren herrühren könnten. Sars beobachtete auch die Entwicklung der *Acolidia bodoensis* und der *Doris muricata*, welche beyde eine sehr ähnliche Entwicklung haben.

3) Staatsrath Tilesius gibt Nachricht von einem Theile der zoologischen Beobachtungen, die er während der Erdumseglung Kreusensterns gemacht hatte. — Durch die Abbildung des alten Männchens von einem ostindischen Drang-Utang, welchen Schlegel aus Leyden eingeschickt hatte und welche zwar die richtige Stellung der Daumen, keineswegs aber die Stellung und den Character in der Physiognomie des Thieres ausdrückte, veranlaßt, legt er auch seine Zeichnungen von diesem merkwürdigen Thiere vor, das sich von allen andern Affenarten durch seine Bewegungen, durch seinen comischen Ernst und verkehrte Richtung seiner fuchstrotzen Haare und durch seine intellectuellen

Fähigkeiten unterscheidet. Er machte besonders auf den Bau der Hinde, auf ein Sepien-Gemäße von dem Inneren der Handfläche, und auf den Rüssel aufmerkksam, den es auffallend verlängern kann. Alfius hat einen Monat lang dieses Thier im Garten des portugiesischen Gouverneurs von Macao beobachtet, und mehrere Stellungen von ihm gezeichnet. Ueberdies zeigte er eine Reihe interessanter Abbildungen von Fischen, die er auf seinen Reisen näher kennen lernte.

Unter andern waren folgende Abbildungen: Ein nach dem Leben gemalter Caiman Archipelagi Brasiliensis, Alligator; eine sehr verkleinerte Abbildung der Rana cornuta, der gehörnten Kröte; ein zergliederter brasilianischer Kröte. Von Fischen: Epinephelus guttatus vel petechizans; Pleuronectes stellatus; Labrus fasciatus; Scarus niger et fasciatus; Muraena margaritifera; Helena ophis; Platystacus anguillaris; Dracaena atra; Chaetodon fasciatus, bicolor; Notacanthus vel Acanthotus rostratus; Uranoscopus scaber; Atherina hesperus, argentea, micans; Fistularia Japonica, minima; Cichla Banjos; Epinephelus genoiu (*Krusenst.* Atlas tab. 64); Platycephalus maximus, fasciatus, macrophthalmus, scaberrimus; Medusa saltatrix, Japonica; Aequorea coccinea, pallida; Pelagia noctiluca, scintillans; Aurelia rosea, cancrisuga\*; der farbenwechselnde Meerengel des Aristoteles (*Rhina*), Squatina chromophora Japon.; die chinesischen und japanischen Seeteufel, Lophius histrio, vesperilio, placenta *L.*, faujas Lacapedii. Uebergang der Haifische in die Rochen durch den Meerengel und Langrochen, der japanische Schwarzhai (*Rhinobatus melanorrhynchus*), die langgestreckten und kurzen Haien (*Squalus incisus*) im samtschaktischen Meere. Die Farbenpracht der japanischen Fische bey ihren sonderbaren Physiognomien: Scorpaena volitans Japonica, Cephalopholis chemosis, das Blutauge (*Krusenst.* Atlas tab. 63. Aca Mehar der Japaner), der Perlmuttermaal, der Congerual in Japan mit seinen sonderbaren noch unbekannten Eingeweidwürmern. Die Abbildungen zur Monographie der Seemablen in Japan, China und im schwarzen Meere. Abbildungen zur Monographie der Klippfische: Agonus blochii (*Phalangistes Pallasii*); der Spiegelfisch oder Sonnensich (*Zeus faber L.*); der Lammapfennich, Ericus cataphractus (*Gasterosteus japonicus Houttugyn*, *Monocentris carinata Bloch Syst.*); Cepola rosea, rubens.

4) Freiherr v. Hügel und Jacob Seffel, Abbildungen von Fischen aus Kaschmir.

5) Schreiben vom Professor Schulze aus Greifswald, 1) über den Macrobiotus huselandi und noch vier andere Species dieser merkwürdigen Krustenfamilie. Zwey davon sind mit Fühlhörnern, eine mit zwey, die andere mit vier, und mit Greifspitzen versehen, welche, sowohl die Fühlhörner als die Greifspitzen, der Gattung Macrobiotus fehlen. Das mit zwey Fühlhörnern versehene Thierchen dürfte das von Schrank beschriebene Arctiscum tardigradum seyn; auch legt dieses Thier seine Eyer (7—11) immer in die abgelegte Haut, was der Macrobiotus niemals thut. Hr. Hofr. Schulze hat ein kleines

Püschchen Sand, welches diese Thierchen enthält, eingesendet, den er seit 6 Monaten trocken aufbewahrt hat, worinn gewiß einige Exemplare dieses Arctiscum durch Benetzung mit frischem Regenwasser oder destillirtem Wasser werden sich beleben lassen. Außerdem sind viele Furcularia redivia und wahrscheinlich auch ein Paar Macrobiotus darin. Das Wiederbeleben läßt sich am besten beobachten, wenn man von dem Sande so viel, als eine Erbse oder ein Kirchsfern beträgt, auf einen großen Objectträger thut, mit 5—6 Tropfen Wasser benetzt, und den Brey dünn ausbreitet, so daß man ihn mit einer mäßig starken Vergrößerung, 50—70 mal im Durchmesser, beobachten kann; man entdeckt dann bald die sich ausstreckenden Thiere. — 2) Ueber die conservirende Kraft des Krostotwassers; welches die sehr flüchtigen Farben kleiner Fische, Insecten usw. besser aufbewahrt, als der Spiritus oder die Gannalschen Flüssigkeiten.

6) Purkinje macht die Mittheilung, daß man die Entsehung des Macrobiotus und ähnlicher Thiere in seiner Gewalt habe. Man braucht nemlich nur Sand mit Wasser zu benetzen und stehen zu lassen, wo dann nach einigen Tagen solche Thiere sich zeigen.

7) Dr. Kahlert zu Prag sprach über den böhmischen Biber, über die Bibercolonien bey Kruman in Böhmen, und bewies, daß das böhmische Castoreum eben so wirksam sey, als das russische.

8) Kosmäskler, über die geographische Verbreitung der europäischen Land- und Süßwasserthiere.

Von den 150 Arten der Clausilia leben wenigstens zwey Drittheile in den südöstlichen Ländern des österreichischen Kaiserthums. Neritina hat 10—12 Arten in der östlichen Gegend von der Donau, während in ganz Deutschland nur eine Art lebt. Eine große Anzahl von Arten der Unio wird in Nordamerika gefunden. Der Einfluß des Bodens äußert sich evident bey den Mollusken; sie sind streng an eine Bodenart gebunden. Gneus und Granit geben eine arme Ausbeute. Die Kalkgebirge sind dafür außerordentlich reich. Der Einfluß des Bodens auf die Dicke der Schale ist sehr bedeutend. Die Mollusken leben auf besondern Pflanzen, was mit Weispölen belegt wurde.

9) Brief von Raup über das Dinotherium giganteum.

In der Versammlung der Naturforscher zu Berlin 1828 stellte er nach dem kurz vorher aufgefundenen Unterkiefer des Tapirus giganteus, das Geschlecht Dinotherium auf, welches er zwischen Tapirus und Hippopotamus einzureihen versuchte. Später glaubte er in dem Nagelglobe, nach welchem Cuvier die Manis gigantea bildete, einen Theil des Dinotherium zu sehen, und publicirte außer diesem ein zweites Fingerglied, ein Schulterblatt, die er sämtlich diesen Thieren zuschrieb. Hiernach hielt er das Dinotherium für ein grabendes Thier, und stellte es in die Classe der Edentaten. Später stellte Professor Buckland in den Jahrbüchern von Le onhard und Brown die scharfsinnige Vermutung auf, daß das Dinotherium ein Wasserthier sey. Als Anfangs dieses Jahres der bey Eppelsheim aufgefundenen Schädel der Pariser Academie producirt wurde, gab er zu lebhaften Discussionen Veranlassung und v. Blainville bemühte sich zu beweisen, daß das Dinotherium

\* Sie saugt die kleinen Krebschen aus, welche das nächtliche Licht des Meerwassers verursachen, daher wird sie auch selbst leuchtend; so lange sie lebt, leuchtet sie hell.

ein der *Halicore* verwandtes Thier sey. Von seinem Fehler, daß die Krallenphalanx nicht dem *Dinotherium* gehöre, beachten ihn *Blainville* und *Kaullard* zurück; indem sie ihm eine ähnliche zeigten, welche in Gesellschaft eines Backenzahns gefunden wurde und die sprechendste Ähnlichkeit mit *Orycteropus* hat. In diesem Puncte, daß das *Dinotherium* kein grabendes Thier sey, pflichtet er *Blainville* vollkommen bey. Was jedoch dessen eifrig vertheibige Meinung betrifft, als sey *Dinotherium* ein Verwandter von *Dugong*; so kann er nicht umhin zu bemerken, daß dieser Gelehrte von einer vorgefaßten Meinung eingenommen sey. Im Sinne der früheren Meinung, daß das *Dinotherium* ein Pachyderm sey, machte *Kaup* dem *Blainville* in einer spätern Sitzung der Academie seine Einwürfe, und suchte namentlich in der Textur der Knochen, der Zahnbildung ufw. dieselben zu begründen. *Kaullard* und *Vallenciennes* stimmten diesen Gründen bey. Was die Lebensart betrifft, die *Buckland* zuerst angab, stimmt *Kaup*, von *Blainville*, *Strauß* *Dürckheim* vollkommen bey, nemlich, daß das *Dinotherium* seiner hochgelegenen Condyl wegen — und dem stumpfen Winkel nach, welchen das Hinterhaupt mit der Stirn bildet, beständig im Wasser lebte; allein er kann nicht glauben, daß es ein Meerthier ohne hintere Extremitäten wie *Dugong* gewesen sey. Ueberhaupt glaubt Hr. *Kaup* vest überzeugt zu seyn, daß es nur im süßen Wasser lebte. Es könnte demnach das *Dinotherium* für die niedrigste Form der Familie der Tapire, parallel dem *Hippopotamus*, betrachtet werden, obgleich bis jetzt zur Begründung dieser Meinung außer der Verwandtschaft in der Bildung der Backenzähne, keine Uebergänge aufzufinden seyen, die die enorm abweichende Bildung der übrigen Kopftheile auszugleichen im Stande wären. Derley Zweifel werden so lange dauern, bis andere Skelettheile von diesem Thiere werden aufgefunden seyn. Es wurden Abbildungen von *Tapirus priscus*, *Dinotherium giganteum* von *Expelsheim*, und vom Schädel eines Wiederkäuers, welcher eine Mittelgattung zwischen *Moschus* und *Cervus* bildet, vorgelegt.

Dr. *Diesing* zeigte Abbildungen neuer Gattungen brasilianischer Binnenwürmer (Entozoen) vor, und erläuterte in Kürze ihren äußern und innern Bau. Vorgezeigt wurden die Gattungen aus der Ordnung der Rundwürmer, und zwar: *Chiracanthus gracilis* D. aus dem Darmcanal von *Sudis gigas*, und *Chiracanthus robustus* D. aus dem Magen von *Felis concolor*. — *Ancyracanthus pectinatus* D. aus dem Darmcanal der *Podocnemys expansa*, und *Lobocephalus heterolobus* D. aus dem Magen des *Manatus australis*. — Aus der Ordnung der Saugwürmer: *Aspidocotylus cochleariformis* D. aus dem Darmcanal von einem *Cataphractus*, und endlich noch nachträglich drei neue Arten von *Amphistoma*; nemlich *Amphistoma fabaceum* D., aus dem Darmcanal des *Manatus australis*, *Amphistoma pyriforme* D. und *Amphistoma asperum* D. beide aus dem Darmcanal des *Tapirus americanus*.

10) *Lumnitzer*, über die Maasse des *Rhinoceros unicornis*. Er glaubt, daß das Horn zu gewissen Zeiten abgeworfen wird.

11) *Lichtenstein* bemerkt, daß die von *Sello* aus Brasilien eingeschickten und vom Prof. *Weiß* in den Verhandlungen der Berliner Academie beschriebenen Schilder einem *Rhinoceros* angehören, und daß sie mit der Haut des ostindischen *Rhinoceros* übereinstimmen.

12) *Tatterer*, Abbildungen von Fischen und Lurche aus Brasilien.

13) Prof. *Jäger* sagt, die Kage sey in England und im nördlichen Europa spät eingeführt worden. In neuerer Zeit hat man auf der schwedischen Alp mehrere Knochen von Bären gefunden. Kurz vorher hat man auch Knochen eines Bären gefunden, welcher mit dem jetzt lebenden europäischen übereinstimmt; auch vom Luchs. Sie sind ebenso incrustirt, wie die Knochen des *Ursus spelaeus*. Er glaubt auch, daß es von Wichtigkeit wäre, die Umstände zu untersuchen, unter welchen verschiedene Thiere verschwinden sind, von welchen man Ueberreste gefunden hat, wie z. B. der Biber, die Mäusearten, die Ratten, welche in *Stuttgard* jetzt fast ganz verschwunden sind.

14) Dr. *Ammerling* zu Prag, Präparation und Aufstellung der Hausfelle.

15) *Lichtenstein*, Abbildung des *Vultur californianus*.

16) *Swat. Presl* benutzte die Vertheilung der Flügeladern bey den Falkern zur Unterscheidung der Sippen.

17) *Lichtenstein*, der capische Ameisenbär lebt von Termiten, nicht von Ameisen.

18) *Tatterer* beschreibt *Lepidosiren*.

## Entomologie.

Secretär: *Sieber* zu Prag.

1) *Preysler* bestimmt die Sippen der Käfer nach den Flügeladern. Er legt Zeichnungen vor. Abbildungen von Käfern.

*Herrich-Schäffer* wünscht, man soll *Guerins* Nomenclatur der Flügeladern zum Grunde legen und nur die Unterflügel berücksichtigen. Er aber und *Germar* meynen, diese Andern hätten in obiger Beziehung keinen großen Werth, weil die Flügel nicht selten fehlten.

2) *Sieber*, Eintheilung der Wangen nach den Flügeladern.

3) *Germar* schlägt eine Zeitschrift für die Entomologie vor.

4) Fr. *Nickel* zu Prag, Spielart von *Papilio aglaja* und *Sphinx euphorbiae*; Uebersicht der Tagfalter Böhmens.

5) Dr. *Herm. Schmidt*, Abbildung des *Seydmaenus motschoulskyi*.

6) *Sindeli*, über künstlich eingeschmolzene Kerse in Bernstein.

7) *Sieber*, Zeichnungen von Rüsselkäfern, beschrieben in *Weitenwebers* Beiträgen zur Natur- und Heilkunde.

8) *Germar*, über vorweltliche Insecten.

9) Graf *Rüenburg* aus Rutenburg, drei Larven an einem Hinterfuß bey *Calosoma sycophanta*.

## VI. Heilkunde.

Secrétär: Dr. Kille zu Prag.

Da diese Vorträge größtentheils in dem amtlichen Berichte von S. 193—206 abgedruckt sind, auch ohne Zweifel in die eigentlich medicinischen Zeitschriften kommen werden; so theilen wir hier nur die Titel mit:

- 1) Dr. Münchmeyer aus Lüneburg, über die Hypertrophie des Gehirns.
- 2) Prof. Blasius aus Halle, Lähmung des linken Fußes.
- 3) Prof. Schneider aus München, über die prophylactischen Maaßregeln der bayerischen Regierung gegen die Cholera.
- 4) Prof. Korzeniewsky zu Prag, Afsägung einer Knochengefäßwurst.
- 5) Instrumentmacher Kunde zu Dresden läßt eine Klumpfußmaschine vorlegen.
- 6) Prof. Roux aus Paris, über Durchschneidung der Achilles-Sehne usw.
- 7) Bischof von Altenstern, Begriff des Abdominal-Typhus.
- 8) Dr. Zeine aus Petersburg, über die Pest.
- 9) Leibarzt Kreysig aus Dresden setze seine Ansicht über den Kreislauf des Blutes auseinander.

Schon bey der Bearbeitung seines Werkes über die Herzkrankheiten, kam er zu der Ueberzeugung, daß unsere gangbare Lehre vom Kreislaufe unvollkommen sey, daß es eine ganz innige nicht erkannte Wechselverbindung zwischen dem Blut- und Nervensystem gebe; so daß die Krankheiten, die ihren wahren Heerd in dem einen haben, sich eben so stark und noch weit stärker in dem andern aussprechen; ferner, daß sich dieses Wechselverhältniß in allen Krankheiten bestätige. Später erkannte er, daß sich die erste Entzweigung der Kraft des thierischen Lebens in dem Blute selbst als solchem und dem Mark des Nervensystems manifestire, und daß durch unmittelbare Wechselwirkung dieser beiden Agentien alle Functionen zu Stande kommen, ja, daß Bildung, Wachsthum, Ernährung eines Theils und Function des Organs andern Theils in einem und demselben Act zusammenfallen, und daß erst dann, wann feste Organe durch Blut und Mark geschaffen worden sind, die Organe anfangen, als eine obson relativ untergeordnete Rolle in den Zustand kommen, die Functionen mit zu übernehmen. Durch die Entdeckung dieses Gefeges der thierischen Haushaltung in Verbindung mit der Geschichte der Bildung des Huhns aus der Eyschichtigkeit, glaubt K. seine Idee, daß der Kreislauf ursprünglich auf Anziehung und Afstoßung der beyden obersten Factoren des Lebens, des Nervenmarkes und Blutes, beruhe, ganz bestätigt. Zur Begründung dieser Ansicht suchte er den Antheil, den das Herz an dem Kreislauf hat, und die Bedeutung des Herzens in der thierischen Oeconomie überhaupt, zu würdigen, gieng dann über zur Betrachtung der Blutgefäße und des lebendigen Blutes und seiner Wechselverbindung mit dem Marksysteme. Das Resultat seiner dießfälligen Untersuchungen war folgendes: Das Herz als Muskel bietet zuvörderst mechanische Seiten der Betrachtung

dar, die aber dem Leben desselben weit untergeordnet sind. Das Leben und die vitale Würde des Herzens steht weit höher als die aller andern Muskeln; als erster Hebel des Blutumlaufes darf es jedoch nicht angesehen werden. Es ist als Muskel wohl fähig, das Blut durch eigene Kraft durch die Arterien zu treiben; alleiniger Vorseher des Kreislaufes kann es aber nicht seyn. Die Circulation beherrscht eine höhere Kraft; der Antheil des Herzens an derselben besteht darin, daß durch seine Höhlen die Wellen des Blutes, welche in einem Zeitabschnitte durch dasselbe ein- und ausströmen sollen, dem Bedürfniß gemäß abgemessen werden. Die Arterien wirken nicht wie die Muskeln durch Contraction und Expansion, sie sind aber an sich auch nicht wie todtte Canäle zu betrachten; ihre Bestimmung ist nur, das Blut durch sich zu leiten; übrigens geschehen keine Functionen in und aus dem Blute, so lange es in den Arterien fließt. Was den Blutumlauf durch die Haargefäße betrifft, so mag vielleicht die Kraft des Herzens noch einigen Antheil daran haben; es ist jedoch nicht zu glauben, daß das Blut durch sie mechanisch durchgepeitscht werde; es muß vielmehr hier einen Ruhepunkt haben, um seiner Bestimmung als lebendiges Material zu jeder Verichtung dienen zu können. In den Haargefäßen kommt das Blut in fast unmittelbare Berührung mit den peripherischen Enden des Nervensystems, um den Act einer Erzeugung zu feiern. — Das Herz hat zwar keine so große Menge von Nerven, aber es vereinigen sich Fäden aus allen Provinzen dieses Systems, um es mit dem ganzen Leben und Hirn zu vereinigen. Durch die Nette des pneumog. Nerven, welche zur Bildung des Symp. eingehen, hat das Herz einen mittelbaren Zusammenhang mit den Nerven des Rückenmarks und mit dem Hirn. Nach der Entdeckung neuerer Anatomen gehen Fäden nicht nur von den hintern, sondern auch von den vordern Spinalnerven zum Sympath. Der Nerv. vag. geht also auch in die Bildung der Herzgefäße ein und vermittelt so ebenfalls die Verbindung mit dem Hirn. Nicht zu bezweifeln ist es, daß auch die unendlichen Stränge der Arterien von ihrem peripherischen Anfange an begleitenden Nerven einen wichtigen Einfluß auf den Blutumlauf haben. Den nächsten Grund der Herzthätigkeit tragen die eigenen Herznerven in sich, nicht das Hirn und Rückenmark: denn das Herz schlägt fort, wenn Hirn und Rückenmark zerstückt werden. Daß der Kreislauf außer dem Herzen auch noch durch andere Veranstaltungen der Natur bestimmt und modificirt werde, beweisen die vom Herzen unabhängigen heftigen Pulsationen großer und kleiner Arterien, die Erscheinungen der Erectionen und des allgemeinen Turgors der Haut, Abtheile in der Leber oder im Gefröße, wobei die Gedärme nach geschehener Entladung des Eiters durch dieselben augenblicklich wieder zu ihrer Function geschickt werden usw. Diese und ähnliche Vorgänge werden offenbar von einer allgemeineren Kraft beherrscht, als von der Thätigkeit des Herzens, und es haben gewiß die Nerven einen wesentlichen Antheil daran. — Das Herz steht in Wechselwirkung mit den Blutgefäßen und allen Organen, so mit den Geschlechtstheilen: mit Leber, Milz und den Lungen ist jedoch diese Wechselverbindung eine nähere, als mit den andern. Eines Theils läßt sich diese Verbindung durch die peripherischen Enden oder Anfänge der Gefäße und Nerven erklären, andern Theils aber kommt bei den Störungen der Herzthätigkeit auch die Qualität des Blutes in Betracht. Von der letztern ist die Herzthätigkeit sehr abhängig, wie es die beschleunigten oder verlangsamten Bewegungen des Herzens in der Wichsucht, im Scorbut, der Fiebertkrankheit, im Faul-

fieber usfo. beweisen. Diese abnormen Bewegungen werden dem Herzen mehr von hintenher durch den Kampf seiner eigenen Nerven mit dem kranken Blute mitgetheilt. Die großen Sclerme des Herzens bey eingetretener Verblutung und großen Erweiterungen der Herzhöhlen in den letzten Zeiträumen, wenn schon die Agonie bevorsteht, glaubt K. dadurch zu erklären, daß bey dem Sinken des einen Factors, des Blutes nemlich, der andere höher sich erhebt und nach dem dem Herzen eingepprägten Schema scheinbar verstärkte Thätigkeit in ihm erweckt. Ganz besonders erhellet jedoch der innige Rapport zwischen dem Blute und dem Mark aus der Betrachtung der charakteristischen Zufälle der organischen Herzkrantheiten. Diese lehren nemlich, daß die bey ihnen stattfindenden heftigen Leiden der Nerven nicht in einer tiefen Verletzung des Nervenlebens selbst begründet sind; sondern von einem Mißverhältniß zwischen dem Blute und der Nerven-thätigkeit abhängen, zunächst aber von der Blutseite ausgehen. Die Richtigkeit dieser Erklärung bestätigt die Beobachtung am Krankenbette, nach welcher stark aufregende Nervenmittel bey Nervenleiden der Herzkranthen höchst schädlich sind. Der Arzt muß hier nur dahin zu wirken suchen, das Gleichgewicht zwischen Blut und Nerven einigermaßen wieder herzustellen, manchmal durch Blutegel, selten durch Aderlässe, am meisten durch große Ruhe, Zureden, sanftes Streichen der Herzgegend und ganz milde befähigende Arzneyen. — Nach diesen Untersuchungen kam K. wieder auf den Blutumlauf zurück, und bemerkte, daß man, da mechanische Grundfälle nicht ausreichen, denselben zu erklären, sich zu höheren Kräften wenden müsse. Er berief sich zuerst auf das im Ey wirkende Leben, wodurch die Scheidung seiner Masse in Blut und Rückenmark gebildet wird. Die erste Erscheinung des thätigen Lebens, welche darauf folgt, ist, daß das an der Peripherie der Eys gebildete Blut um sich selbst herumkreiset, um dann bald nach dem Centrum hin zu strömen, von wo es aber eben so schnell wieder in allen Richtungen nach der Oberfläche hingetrieben wird. Dieß geschieht, ehe man ein punctum saliens bemerken kann. Da nun die ersten Erscheinungen Bildung von Blut auf der Oberfläche und Bildung eines Nervenstranges im Centrum sind: so muß man nach Kreyssigs Ansicht diese ursprüngliche Scheidung der Eysfeuchtigkeit als die Entzweigung der Einheit der letztern durch ein inneres höheres Princip und die nachfolgenden Thätigkeitsäußerungen als Strebungen nach ihrer Vereinigung ansehen, die so wenig gelingen, als die Vereinigung der beiden Pole des Magnets. Da die spätern Erfolge dieser Strebungen Bildung von Organen sind: so kann man die in sich verschlingenen Thätigkeiten dieser zwey Pole einer Kraft, als die Schöpfer der Organe ansehen. Die Bildung verschiedener Gewebe und Organe geschieht auf eine gefegmäßige Weise. So wird der vollkommenste Muskel, das Herz, zuerst aus dem reinsten Blute und dem nun gebildeten Nervenmarke geboren; unvollkommener ist der Bau der Arterien, noch mehr der der Venen; die Secretionswerkzeuge der edlen Säfte erhalten reichliche Nerven und arterielles Blut, die der Auswurfstoffe geringes, selbst venöses Blut und wenig Nerven, die Muskeln reichliche Nerven und gutes Blut. Unter den Muskeln bildet sich das Knochenkelet; gleichsam der mehr rohe und erdartige Theil der Blutmasse und des Nerven-systems scheidet sich nach eben dem Gesetze aus der Eysfeuchtigkeit aus, wie der erste Nervenstrang, und bildet mit letzterem einen peripherischen Gegenatz, nach welchem das Blut sich hinzieht, um wieder abgestoßen zu werden. Wenn es nun gewiß ist, sagt K., daß die Haargefäße alle Rerichtungen des

Stoffwechsels vermitteln und namentlich das rothe Blut in venöses dunkles verwandeln; so ist es wieder klar, daß dieses wesentlicher Bestandtheile beraubte Blut eines Theils einer Reintegration bedarf und gegen das arterielle einen Gegenatz bilde, aber auch, daß die peripherischen Nervenenden, nachdem sie den schaffenden Proceß mit diesem Blut gefieert haben, anstatt es an sich anzogen zu erhalten, vielmehr abgestoßen. Der Umstand aber, daß die Arterien von einer Menge Nerven, die in kleiner Zahl auch in die Venenhäute eingehen, begleitet werden, macht es K. wahrscheinlich, daß das Blut durch einen natürlichen Zug sich wieder nach dem Nervencentrum, wo das Herz sich gebildet hat, hinbewegen muß, und zwar wie von einer Art Kette von Nerven geleitet, welche die mit ihnen parallel laufenden Nerven begleiten und umschlingen. Uebigens machte er darauf aufmerkssam, daß auch den Arterien- und Venenhäuten ein Antheil an der Fortbewegung des Blutes nicht abgesprochen werden könne, was er durch das Vorkommen von dem Herzen ähnlichen Nachbildungen mitten im Kreislauf bey niederen Thieren, bey Menschen durch das in Krantheiten ohne Entzündung der Arterien und des Herzens beobachtete heftige Pulsiren aller Arterien und durch die Erscheinungen bey Entzündung der Venen zu begründen suchte. In Bezug auf den kleinen Kreislauf bemerkte er, daß er eigentlich nur einen Theil des allgemeinen Kreislaufes ausmache, und daß man daher flüchtig das Capillargefäßsystem der Lungen und aller Theile als die peripherische Quelle des Blutumlaufes ansehen könne, die dasselbe nach einem gemeinschaftlichen Centrum, dem Herzen zuführt, das Herz aber umgekehrt als den centralen Theil der Bewegung, von wo aus es nach den Gefäßenden strömt. Auf diese Art haben wir — so schloß er — wieder die Entzweigung, und doch dieselbe wieder aufgehoben.

10) Prof. Wendt aus Breslau, Schilderung der Cholera-Epidemie.

11) Prof. Tector aus Würzburg, über Nachblutung der Wunden.

12) Prof. Ritgen aus Gießen, über Blutungen beym Kaiserschnitt.

13) Dr. Stoda aus Wien, Theorie des Herzstosses und der Herz- und Arterientöne.

Der Herzstoss beruht auf einem bekannten physikalischen Gesetze: Jede Flüssigkeit übt auf die Wandungen des Gefäßes, in dem sie enthalten ist, einen an allen Punkten gleichen Druck aus. Hat das Gefäß eine Oeffnung, durch welche die Flüssigkeit abfließt; so ist an der Stelle der Oeffnung kein Druck, während er an der dieser Oeffnung gegenüberstehenden Parthie der Gefäßwand vorhanden ist. Dieser einseitige Druck ist Ursache, daß sich das Gefäß, falls es beweglich ist, in einer der Ausflußöffnung entgegengesetzten Richtung bewegt. Daraus erklärt sich bekanntlich die Bewegung des Segner'schen Rades, das Stößen der Schießgewehre u. und auch das Anschlagen des Herzens gegen die Brustwand. Während nemlich das Herz seinen Inhalt austreibt, wird es in der den Ausflußöffnungen entgegengesetzten Richtung gestossen. Nur nach dieser Ansicht über den Herzstoss lassen sich alle Verschiedenheiten, die im Herzstosse beobachtet wurden, erklären, während jede andere Ansicht durch Beobachtung widerlegt wird. So ist es z. B. klar, daß derjenige, welcher die Krümmung der Herzspitze als die Ursache



des Herzklopfes betrachtet, das Anschlagen des Herzens in einer großen Ausdehnung — in mehreren Zwischenräumen der Rippen und in der Herzgrube nicht erklären kann. Zur Erklärung der sogenannten Herztöne wurden bisher größtentheils Beobachtungen bey Dissectionen benutzt; und es kann darum nicht aufpassen, daß keine der über diesen Gegenstand bekannt gewordenen Ansichten im Stande war, die Verschiedenheiten zu erklären, die diese Töne im normalen und kranken Zustande des Herzens und der Arterien zeigen. Wer sich die Mühe nimmt, recht viel Gesunde und Kranke zu auscultiren; der wird sich die Ueberzeugung verschaffen, daß die in Frage stehenden Töne nicht im Herzen allein entspringen, und daß es auch richtig sey, wenn man den ersten bloß im Herzen, den zweyten bloß in den Arterien entstehen läßt. Er wird vielmehr einsehen, daß sowohl der erste als zweyte Ton ebenso im rechten und linken Herzen als in der Aorta und Pulmonalarterie erzeugt werden könne. Er wird nemlich Fälle finden, wo in der Gegend des Herzens gar keine Töne vernehmbar sind, während sie doch über dem Herzen der Lagerung der Pulmonalarterie oder der Aorta entsprechend recht deutlich sich hören lassen. Ebenso werden ihm Kranke vorkommen, bey welchen er in der Gegend der Aorta die beyden Töne vermisst, daß sie doch in der Gegend der Pulmonalarterie, in einem oder in beyden Ventrikeln sich vorfinden. Das Vorkommen von Geräusch: Blasbalg-, Raspel-, Sägegeräusch u. an bestimmten Gegenden des Thorax, z. B. in der Gegend der Aorta, der linken oder rechten Kammer, bey gleichzeitig vorhandenen beyden Tönen in der Pulmonalarterie und an den übrigen Stellen, wo kein Geräusch vorkommt, so wie die nicht seltene Erscheinung, daß im linken Ventrikel die Töne anders sind, als im rechten und in den Arterien, und endlich die Thatfache, daß bey einiger Energie des Herzens der Accent in den Arterien auf den zweyten Ton fällt, während er im Herzen jedesmal auf dem ersten ruht, lassen keinen Zweifel übrig, daß die Behauptung über die Erzeugung beyder Töne in jedem Ventrikel, und in jeder großen Arterie begründet sey. Dies Resultat ist ein von den bisher durch Dissectionen erlangten ganz verschiedenes; denn man ließ den Beobachtungen bey Dissectionen zu Folge die Töne entweder bloß im Herzen, oder wie Charles Williams den ersten Ton im Herzen, den zweyten aber in der Aorta und Pulmonalarterie entstehen. Die Entstehung des ersten Tones in der Aorta und Pulmonalarterie scheint kaum anders als durch die plötzliche Spannung, in welche die Arterienhüte während der Systole des Herzens versetzt werden, erklärbar. Der zweyte Ton wird durch das Anschlagen der Blutssäule gegen die Semilunarklappen während der Kammerdiastole erzeugt. Sobald nemlich die Triebkraft vom Herzen nachläßt, bewegen sich die Blutssäulen in der Aorta und Pulmonalarterie, von den elastischen Wänden gepreßt, gegen das Herz und verursachen einen Stoß gegen die Semilunarklappen, welcher diese sowohl als die Arterienwände in Schwingungen versetzt. Als Beweis, daß der zweyte Ton in den Arterien auf die beschriebene Art entsteht, dienen die Fälle, wo die Klappen der Aorta durch Krankheit so verändert sind, daß sie den Rücktritt des Blutes aus der Arterie in die linke Kammer nicht hemmen. In solchen Fällen läßt sich in der Gegend der Aorta statt des zweyten Tones ein Blasbalg- oder Sägegeräusch vernehmen, während in der Pulmonalarterie, wo die Klappen normal sind, der zweyte Ton fortbesteht. Um die Entstehung der Töne im Herzen aufpassen zu können, muß man eine klare Vorstellung über die Structur und Function der zwey- und

dreyspitzigen Klappe haben. Die sehnigen Fäden, welche von den Papillarmuskeln entspringen, inseriren sich theils in der Mitte der gegen die Kammer gekehrten Klappenfläche, theils aber näher gegen den Rand und selbst bis am äußersten Rande der Klappe. Wenn man durch Anziehen der Papillarmuskeln die Klappe spannt, so bemerkt man, daß sich auf diese Weise nicht alle sehnigen Fäden auf einmal anspannen lassen, daß folglich nicht die ganze Klappe gespannt wird. Beym Anziehen der Papillarmuskeln werden nemlich nur die Fäden gespannt, welche sich in der Mitte der Klappenfläche inseriren, während alle Fäden, die sich näher gegen den Klappenrand und an diesem selbst inseriren, auch bey dem stärksten Zuge erschlafft bleiben. Aus diesem Grunde wird durch das Anziehen der Papillarmuskeln der freye Rand der Klappe niemals gespannt, und läßt sich, wenn man dagegen bläst, ringsherum wie ein Segel aufblähen. Diese Construction der zwey- und dreyspitzigen Klappe macht es möglich, daß diese Klappen während der Kammerhsystole den Rücktritt des Blutes aus der Kammer in die Vorkammer verhüten. Es wird nemlich durch das eindringende Blut der nicht gespannte Theil der Klappe wie ein Segel aufgebläht und durch dieses Aufblähen die Communication zwischen Kammer und Vorhof geschlossen. Man sieht daraus, daß der Rücktritt des Blutes aus den Kammern in die Vorkammern auf eine ähnliche Weise verhindert wird als der Rücktritt des Blutes aus den Arterien in die Kammern. Der Bau der Vorhofsklappen ist aber von jenem der Arterienklappen wegen Verschiedenheit der Oeffnungen ein verschiedener. Die sehnigen Fäden sind an der zwey- und dreyspitzigen Klappe offenbar aus dem Grunde vorhanden, um zu verhüten, daß diese Klappen während der Kammerhsystole durch das Blut in die Vorkammern zurückgedrängt werden.

Es fragt sich noch, welchen Zweck die Papillarmuskeln haben. Zum Schließen und Öffnen der Klappen wären sie offenbar unnöthig und überflüssig; dieß geschieht vielmehr durch das Blut selbst. Der Zweck der Papillarmuskeln ist, die Länge der sehnigen Fäden der verschiedenen Capacität der Kammer während der Systole und Diastole anzupassen. Damit nemlich die sehnigen Fäden das Heraustrreten der Klappe in den Vorhof während der Kammerhsystole verhindern, können sie nicht unbestimmt lang seyn; sie müssen eine gewisse Länge haben, und es muß die Länge dieser Fäden wenigstens so groß seyn, daß dadurch die Ausdehnung des Herzens nicht gehemmt wird. Es ist somit klar, daß diese Fäden während der Kammerhsystole kürzer seyn müssen als während der Diastole, und dieß ist nur dadurch erreichbar, daß sie mit Muskeln zusammenhängen, welche sich während der Systole verkürzen, während der Diastole verlängern. Es wird nun zugleich klar, daß die sehnigen Fäden, welche sich in der Mitte der Klappenfläche inseriren, niemals erschlaffen. Während der Systole werden sie durch den Druck des Blutes in Spannung erhalten, und durch die vom Klappenrande sich an ihnen inserirenden zarteren sehnigen Fäden gegen das Centrum des sehnigen Kegels gezerrt, folglich gekrümmt; während der Diastole springen sie aus der gekrümmten in die gerade Richtung über, indem sie nicht so lang seyn können, um zu erschlaffen, weil eine solche Länge nicht bloß überflüssig, sondern dem Eindringen des Blutes aus dem Vorhofe in die Kammern selbst hinderlich wäre. So wie das Anschlagen der Blutssäule gegen die Semilunarklappen in den Arterien einen Ton — den zweyten — erzeugt, eben so muß das Anschlagen des Blutes gegen die zwey- und dreyspitzige Klappe während der Kammerhsystole einen Ton — den ersten Herztön — geben. Dieser

wird aber nicht bloß von dem Schlag des Blutes gegen sie dadurch in Spannung versetzte Klappe, so wie durch die gleichzeitig gespannten sehnigen Fäden hervorgebracht; und inbent elastische Fäden fortönen, so lange in der Spannung Veränderungen stattfinden, so ist es erklärbar, daß der erste Herzton während der ganzen Dauer der Systole anhalten kann. Wenn die zweispitzige Klappe durch Krankheit so verändert ist, daß sie den Rücktritt des Blutes aus der Kammer in die Vorkammer nicht zu hindern vermag; so hört man in der linken Kammer keinen ersten Ton, statt dessen aber ein Blasebalg- oder Sägesgeräusch, während doch in der Gegend der rechten Kammer der erste Ton fortbesteht. Diese Erscheinung ist ein Beweis für die Richtigkeit der gegebenen Erklärung des ersten Herztones. Der zweyte Herzton wird durch den Uebergang der sehnigen Fäden aus der gekrümmten in die gerade Richtung erzeugt, und man hat Grund, diese Erklärung des zweiten Herztones anzunehmen, weil jeder gespannte Faden beim plötzlichen Uebergang aus der gekrümmten in die gerade Richtung einen Ton gibt.

14) Prof. Striz zu Prag, über Zurückbringung eingeklemmter Brüche.

15) Dr. Schreiber zu Prag, Anwendung des Catheters bei Stricturen der Harnröhre.

16) Dr. Nebermann, Kopfzange und Wendungszange.

17) Dr. Ulrich aus Coblenz, Durchschneidung der Achilles-Sehne beim Klumpfuß. Operation der Variocoele.

18) Prof. Harleß aus Bonn, Begriff des Typhus.

19) Prof. Fischer zu Prag, zeigt ein Augenphantom und künstliches Auge.

20) Dr. v. Türkheim aus Wien, zweien Fälle von Herzpolypen.

21) Prof. Lumbe zu Prag, stellte ein 5½ Jahr altes Mädchen mit einem unvollkommen ausgebildeten Fetus vor.

22) Dr. Seidler aus Marienbad, herrschende Krankheiten im Volk.

23) Prof. Mianowsky aus Wina, Phallus esculentus sey nur essbar vor dem April, dann giftig.

## VII. Landwirtschaft und Technologie.

Secrétaire: Prof. Vestler aus Olmütz und Dr. Kalina von Jäthenstein zu Prag.

1) Comitats-Ässessor E. v. Bujanowicz aus Habsan in Ungarn, über die Wechselwirkung der Naturwissenschaften und der Landwirtschaft; wenig Nutzen der Rehschulen; Mar-morhäuser des Herrn v. Mayerffy zu Ofen, von 3000 und 4000 Eymern Wein.

2) Nowak, Gutsbesitzer aus Suchomast, über Maul-beerbäume; Grundzüge des Pflanzenwachstums.

3) Bergwerks-Inspector Haffe aus Schneeberg, Ersparung von Brennmaterial beim Eisenschmelzen.

4) Hofrath Fürbass, über die Vortheile verpflanzter Reben in andere Gegenden. Weinproben aus den lobfester, lobkornigsten und schönornigsten Reben.

5) Prof. Hayne aus Wien, über den Darmstich bey der Windcolik bey Pferden; Behandlung der Löser-Dörre.

6) Teichmann, Gutsbesitzer zu Muckern in Sachsen, über die Vortheile der Lehm-schneidebächer.

7) Prof. Diebl aus Brünn, Seidenbau in Mähren.

8) Kalina von Jäthenstein zu Prag, ebenfalls.

9) Dr. E. Dietrich aus Dresden, über den Weinbau und dessen Alter in Sachsen und Böhmen: Begann dort 981, hier 993.

Man machte einen Ausflug in die verschiedenen technischen Anstalten des Königsaal, Begau und Gimna, in Baumschulen, Maulbeerpflanzungen usw. Prof. Vestler berichtete darüber:

1) Ueber die großartige Zuckerraffinerie der Hrn. Kolb und Richter, deren Betriebsapparate zum Abdampfen und Austrocknen des wasserigen oder flüssigen Zuckers bereits für das Einfüllen in die Formen arbeiten, und wovon zwey andere gerade in der Aufstellung begriffen sind. Sie ist schon dormal auf die Verarbeitung von 30,000 Centner Rohzucker eingerichtet, zu dessen Erzeugung in Kurzem nach dem Aufhören der Zufuhren aus Westindien, die Wirtschaften der Umgegend 600,000 Centner Runkelrüben, oder etwa den daraus daretzten Syrup mit Freuden liefern werden, wenn, wie nicht zu zweifeln ist, die Besitzer der Raffinerie Patriotismus genug besitzen, den Landwirthen an die Hand zu gehen, und annehmliche Preise für den Syrup oder für die Rüben zu beantragen.

2) Daß die Gesellschaft bey der Besichtigung des Chöland Schröder'schen Filtrir-Apparates auf ein Gewebe aus Hanf gestoßen sey, das, der Angabe nach, in dieser Güte und Haltbarkeit vom Innlande nicht erzeugt werden könne, und deshalb aus der Fremde bezogen werden müsse. Nach der Meinung des Referenten R. liegt der Grund davon in dem Mangel des Schleifhanfes oder jener festen spinnbaren Faser, welche aus dem, von Dörsenbauer bey der Eingangssetzung gezeigten Riesenhanfe, durch Abziehen der breiten bandartigen Faser mit der Hand und einem stumpfen Messer von den gerösteten Stengeln gewonnen, und nach Bedarf weiter raffiniert wird. — Da dieser sinnreiche Filtrir-Apparat unverkennbare Vortheile gegen andere gewährt, und daher dessen Bedarf an dem Gewebe mit der Zunahme der Runkelzuckerfabriken steigen muß; so empfahl Referent jenen, welche kommenden Jahre so glücklich seyn werden, Freiburg und dem Rheine, als Heimat des Riesenhanfes, nahe zu kommen, sie möchten sich dort über die Röstung, Zugutmachung und Raffinierung des Schleifhanfes auf praktischem Wege Belehrung verschaffen.

3) Auch referirte derselbe über die Verarbeitung der süßen Abgänge aus der Raffinerie in einem Seitenflügel des Gebäudes, und zwar in getrennten Gemächern zur Erzeugung von Weingeist, und zur Erzeugung von Schnellessig von besonderer Güte.



Er schilderte hierauf die in den nächst anstossenden Häusern beobachtete Verwendungsart des gewonnenen Schnellesfigs zur Erzeugung eines sehr schönen Wenzuckers, und der nebenbei getrossenen, theils ruhenden, theils thätigen Vorrichtungen zur Erzeugung von mancherley Salzen und anderen chemischen Producten, wie zur Gewinnung der englischen Schwefelsäure, des Gessores, des Paraffins aus dem Holztheer ic. ic.

Ueberdies besprach er die vorgesehene Fabrikation von mehreren Sorten sehr guter gemeiner Seife, einer Natron- und Selseife, so wie auch über die vorgesehene Erzeugung sehr vollkommener sogenannter englischer Wenzschrote. Hiebei ward bemerkt, daß alle von Hr. S. an bezeichneten industriellen Anstalten Eigenthum der H. H. Kolb und Richter sind, wozu ein schon vorhandenes, ehemaliges Kloster-Gebäude verwendet, und wobei daher der kostspielige Aufwand für ein neues Gebäude erspart worden.

4) Er verbreitete sich über die Beschäftigung des sehr reinlich gehaltenen Locales, und der noch ruhenden Apparate und Spindelpressen für die angrenzende Fabrik von Runkelzucker aus selbst erbauten Röhren, Hr. Durchlaucht dem Fürsten von Dettingen-Wallerstein gehörig, und unter der Leitung des Fabrikdirectors Dr. Kobowis stehend.

Zudem referirte er über das ausnehmend große Interesse, welches die Gesellschaft an dem Besuche der von Sr. Durchlaucht dem Fürsten Dettingen-Wallerstein für die bessere Ausbildung der Handwerksleute in Königsaal gegründeten und unterhaltenen, an Sonn- und Feiertagen geöffneten Gewerbschule genommen hat, worin dormal 33 Handwerker, theils Meister, theils Gesellen und Lehrlinge von zwey besoldeten Lehrern in dem, ihr Fach betreffenden Theile der Mathematik und Zeichnungskunde, und zwar mit einem (wie augenblicklich vorgemommene Prüfung und Einsicht in die zahlreichen Zeichnungen lehrte) sehr lobenswerthen Erfolge in beyden Landessprachen Unterricht erhalten und den schlagenden Beweis liefern helfen, daß Böhmen, welches sehr oft mit der Gründung neuer Real- und Gewerbeschulen in den verschiedenen vielen Städten des Landes auftritt, und welches, wie der Augenschein lehrte, dieselben sogar schon auf Marktflecken von wenig mehr als hundert Häusern ausdehnt, in dem Weste und in der Vermehrung realer Bildungsmittel keinem Theile Deutschlands nachstehen will.

Der selbe erklatete auch über die Beschäftigung der, in einem namhaften, dem Fürsten v. Dettingen-Wallerstein gehörigen Meyerhofe aufgestellten sehr verschiedenen, theils älteren, theils neueren Ackerwerkzeuge Bericht, und sprach seine alte Ueberzeugung aus, daß es Böhmen (wie auch Mehlers Werk über die Ackerwerkzeuge dieses Landes darthut) nie an Studien der Ackergeräthe fehlen ließ, und hierin eine Abwechselung darbietet, wie sie nicht leicht eine andere Provinz Deutschlands zeigen kann.

**J. Bamberger zu Prag, zeigt eine Taubenschneere.**

**Prof. Lumbe, Acclimatization und Classification der Getreid-Arten.**

**Forstsrath Liebich zu Prag, Einführung des Seidenbaues in Deutschland; Behandlung des Maulbeerbaumes.**

**Wirthschaftsath M. Seidl zu Prag, machte die Mitglieder auf eine von dem Oberförster Schonauer aus dem**

Urgebirge des Böhmerwaldes eingeschickte Fichtenschneide aufmerksam, die in dem Locale der patriot. ökon. Gesellschaft vorhanden ist. Auf dieser Schneide läßt sich das Alter dieser Fichte erweislich auf 535 Jahre schätzen. Sie hatte die Länge von 190 Fuß Wiener Maas, und ihr Umfang am Boden betrug 200 1/2 Zoll, daher nahe 5 1/2 Fuß im Durchmesser. Die solide Holzmaas wurde auf 1358,85 Kubik-Fuß, oder 22,6 Klafter zu 60 Kubik-Fuß berechnet. Die auffallende Größe und Altershöhe dieser Fichte ist es jedoch nicht, was sie vorzüglich auszeichnet; weit merkwürdiger ist der Umstand, daß dieselbe in den ersten 257 Jahren einen kaum 9 Zoll großen Durchmesser, und etwa eine Höhe von 60 Fuß erreicht hatte. Die Jahresringe in dieser Periode sind so fein, daß sie mit unbewaffnetem Auge kaum zu erkennen sind. Sie muß daher in einer Verdämmung gestanden haben, wodurch ihr Wuchs früherhin unterdrückt worden. Erst nach dieser Periode begann sie stark zuzuwachsen, und wuchs binnen den letzten 278 Jahren zu dieser ungewöhnlichen Größe an. Der Nestor unter den heutigen Forstmännern, der rühmlichst bekannte Oberforstsrath Cotta, der eben die Section mit seiner Gegenwart beehrte und diese Fichtenschneide in Gesellschaft vieler anderer Mitglieder dieser Section besichtigte, nahm an dem Gegenstande großes Interesse.

Wirthschaftsath Wanisek legte der Section zwey Arten von Insectenlarven vor. Die eine, etwas über 6 Linien lang, 1/2 Linie dick, mit einem glatten, härtlichen, lichtgelb gefärbten, in zwölf Glieder getheilten, mit 6 kleinen vorn angebrachten Füßchen versehenen Leibe, war einem mit Krappspflanzen oder Färberröthe (*Rubia tinctorum*) besetzten Versuchsfelde von 9 Morgen Land so nachtheilig geworden, daß eine ganze Strecke von 3 Morgen vollkommen eingieng. Die andere ist etwa 9 Linien lang, 1 1/2 Linie dick, hat zwölf Glieder oder Ringe an dem lichtfarbigen, mit 6 Füßen vorn besetzten Leibe, und hat auf jedem Ringe des Oberleibes einen dunkelbraunen Streifen. Sie war den Koggenfaaten im letzten Herbst und Frühjahr durch das Abstreifen der Wurzelblätter und jungen Triebe sehr nachtheilig geworden. Beyde Insecten kamen auf der Gräflich J. M. Thunischen Herrschaft Schuschitz vor, auf deren Feldern der Anbau der Färberröthe zum ersten Mal versucht worden. Plieninger übernahm die Insecten, um sich über deren nähere Bestimmung mit mehreren Entomologen der zoologischen Abtheilung zu besprechen.

**Seidl, Berechnung des Holzertrags.**

Eine Fahrt von 25 Mitgliebern nach Breganz 2 Stunden von Prag, dem Ritter v. Riese gehörig.

Es wurden daselbst mehrere vorgelegte Proben von weißen und rothen Lischweinen vom Rieserischen Weingebirge, Pustezberg bey Leitmeritz von den Jahren 1796, 1834, dann aus dem Weingebirge Liffetz bey Bohnitz ausgezeichnet gut befunden. Riese zeigte ferner Proben von sehr gelungenem schäumendem Pusteyberger Wein, also von einem böhmischen Champagner.

Die Gesellschaft machte einen weiten Gang in das Freye. v. Riese zeigte die gebrüllten Rapsen, und hob die, von mehreren Seiten bestätigte Bemerkung heraus, daß der Raps in der Umgegend von Prag fast durchgängig, selbst von den Bauersleuten, gebrüllt werde. Auf einem der Rapsfelder zeigte er die Bearbeitung des gebrüllten Rapses durch ein in Bewegung

gefestes Zugwerkzeug. Dieß gab Veranlassung zur Besprechung über die ökonomischen Vorzüge des gebrüllten Rüppes im Gegensatz des ungebrüllten, bey der sich H. v. Riese nach seiner Erfahrung, und mit ihm die Mehrzahl, zu Gunsten der Drillsaat aussprach.

H. v. Riese führte seine Gäste auf die ebenfalls durchgängig schon seit Jahren gebrüllten Luzerne=Schläge, auf deren zwey einspännige Züge die Bearbeitung des Bodens in den schmalen Zwischenräumen zeigten. Langjährige Erfahrung leitet ihn darauf, von der gebrüllten Luzerne in der Folge zur breitwürfigen Saat überzugehen.

Dann führte er sie auf den so eben in voller Bestellung begreifenen Weizen=Schlag. Derselbe ist wohl seit Jahren der stärkste Drillschlag, den Deutschland je gehabt hat, und vielleicht haben wird. Die ganze Winterfaat von 600 W. Weizen Weizen wurde bisher immer und ganz mit den Fellenbergischen Säemashinen reihenweise gebrüllt. H. v. Riese erklärte mit der ebelfeit Offenheit, daß er nach so vielen, mit großer Beharrlichkeit durchgeführten Erfahrungen in Zukunft von der Drillsaat des Weizens in gewöhnlichen Fällen zur breitwürfigen Ausfaat zurückkehren werde.

Bei derselben Weizenbestellung fand die Gesellschaft die Rainzische Saathacke mit neun kleinen, an einem schief gestellten Rahmenbalken befestigten Scharen von der Form des erst durch Rainz selbst in dem größten Theile von Böhmen, und um so mehr anderswo, bekannt gewordenen Pfluges *Poulichon* (*Ruchado*), wodurch der Samen allerdings besser und schneller als durch Egge und Pflug bedeckt wird.

Auf einem Sommerfelde war der sogenannte Spotschner Pflug, welchen Rainz mit Verbesserungen bekannt machte, jedoch mit der Abänderung einer eisernen Pflugschle und Pflugsäule im Gange. Der Pflug, der in der ersten darüber gedruckten Nachricht (*Decon. Neuig. von Andre, 1833, Nr. 79, S. 631*) in der Umgegend von Prag noch ein neuer heißt, und ohne Rainz, Löhner und Seidl noch lange unbekannt geblieben wäre, ist nun nicht nur in seinem Vaterlande, sondern auch über dessen Gränze hinaus ein celebres Werkzeug geworden. Nestler sprach hier mündlich, wie schon anderswo schriftlich, für das seinem Vaterlande geschenkte vortrefliche Werkzeug einige Worte des Dankes an die anwesenden Böhmen.

Auf dem Rückwege zeigte v. Riese der Gesellschaft einen ansehnlichen, vortreflich gebliebenen *Espartett*=Schlag, und lieferte damit den nicht gar häufigen Erfahrungsfall, daß unter günstigen Umständen in einem kleinen Umkreise alle vier Hauptkleearten, *Trifolium pratense* und *Medicago sativa* und *Hedysarum onobrychis* dem Landwirthe stark Gebote stehen.

Es ward der Gesellschaft eine Mutterherde von *Merinos* entgegen getrieben, über deren Wollwerth sich dermal freylich kein hältiges Urtheil fällen ließ, die aber schon durch den schönen Bau und die gute Haltung des ausgezeichneten großen Körpers bewies, daß sie den Eigenthümer eine reichliche Schur feiner und beziehungsweise ausgezeichneter Wolle erwarten lasse.

Der Rundgang ward mit der Besichtigung eines ganzen landwirthschaftlichen Artillerie=Parkes von aufgestellten alten und neuen Ackterwerkzeugen und Saatmaschinen beschlossen. Bey der auf allen fünf herrschaftlichen Menehöfen stark betriebenen,

ja, in Ansehung des Rüppes sogar unter den Bauern heimischen Drillskultur wird es erklärbar, warum die dazu nöthigen Geräthe in so vielfacher Anzahl aufgestellt waren. Mitunter kam auch manches in dem industriellen Wozen selbst geborne Werkzeug vor, wie z. B. die Säemashine für die schwierige Ausfaat der gelben Rübe oder Möhre. — Einzelne Mitglieder blieben in Brezan, um die Fabrik=Anlage auf *Punkelseder* noch zu besuchen, die übrigen eilten Prag zu, um auf dem Rückwege durch das *Carolinenthal* in einigen dortigen Fabrik=Anstalten Notizen einzusammeln oder Mepnungen auszusprechen.

Die Gesellschaft nahm die durch alle vier Stodwerke von einer Dampfmaschine in Betrieb gesetzte Kunstwerkstätte des Hrn. *Eduard Thomas* in Augenschein, welcher den Bau von Dampfesseln, Dampfmaschinen, wie von allen Maschinen und Bestandtheilen für große Spinnereyen auf Baum= und Schafwolle, Kammgarn zc. übernimmt.

Zuletzt fuhr die Gesellschaft in die neu errichtete und bereits in vollen Betrieb gesetzte, den H. H. *Forschheimer* gehörige Spinnfabrik von Kammgarn aus Schafwolle.

Seidl, über landwirthschaftliche Maschinen, besonders den Pflug.

*Xangheri* sprach über die Vortheile, welche sich für Böhmen aus der Seidenzucht erwarten lassen. Er hält dieselbe in den meisten Gegenden des Landes ohne Vereinträchtigung des Wein= und Obstbaues, besonders für manche Stände, ausföhrbar. Er gab eine Uebersicht der Schicksale der Seidenkultur in Böhmen von ihren ersten Ansängen im Jahr 1749 bis auf unsere Zeit, woraus hervorging, wie sein Vater, und mittelst des letztern er selbst durch Kaiserliche Gnade das Recht erlangt hatten, die Reste der alten Maulbeerbäume in den Prager Stadtgräben zur Seidenzucht zu benutzen und zu vermehren. Seine Angabe, daß im Jahr 1789 in Böhmen 40 Centner rein gesponnene Seide erzeugt worden sey, erregte Aufmerksamkeit. Nach seiner Berechnung ließe sich die Seidenzucht sogar noch durch bezahlten Tagelohn mit Vortheil treiben, und im Durchschnitt der Baum mittleren Alters bey den ungünstigsten Seidenpreisen noch auf 1 fl. Conv. M. benutzen. Er legte der Gesellschaft als Erzeugniß des Jahres 1837. 31½ Pfund vierfältig gekaspelte reine Seide vor, und erinnerte, daß er im Jahr 1836 ebenfalls 30 Pfunde Erzeugniß Hr. Majestät bey der Gewerbausstellung unterlegt habe.

Fahrt von 25 Mitgliedern auf das Gut von *Martin Wagner* zu *Girna*, um unter der Leitung des Hrn. *Weinrich*, Inspector und Chemiker, die dortige bloß auf Erzeugung von *Runkelzucker* berechnete Fabrik in allen Theilen zu besichtigen. Ungeachtet es noch gar nicht an der Zeit war, in welcher die Campagne der Zuckerrabrikation aus *Runkeln* gewöhnlich beginnt, hatte dennoch Hr. *Wagner* der Wisbegierde der Gesellschaft das große Opfer gebracht, die, ökonomisch betrachtet, noch nicht reifen Rüben für einen vollständigen Versuch im Großen aus dem Felde zu nehmen, und die Fabrik in allen ihren Theilen so in Betrieb zu setzen, daß die Gesellschaft durch alle Manipulations=Zweige bey dem Vorwärmen der ungewaschenen Rübe im warmen Wasser, bey dem Schneiden in dünne Scheiben, bey der Maceration derselben in kaltem Wasser, bey der Arbeit in den Defecations= oder Läuterungseffeln, bey dem Abdampfen, Filtriren, Kochen, Füllen und Außnehmen der Formen gegen

wärtig seyn konnte. Als Techniker wollten die Anwesenden über den Vorzug der Macerations-Methode vor dem Gewinnen des Saftes durch Reiben und Pressen nicht rechten. Die Zeit wird vielleicht in der nächsten Zuckercampagne schon entscheiden, ob die Macerationsmethode oder die Reibmaschinen das Feld räumen müssen. Als Landwirthe dagegen hatten dieselben gegen die Macerationsmethode die Verschlechterung der Rübenschnitte zu Viehfutter, die Gefahr des baldigen Verderbens und daher die Unmöglichkeit längerer Aufbewahrung einzuwenden. Das Abdampfen des geläuterten Zuckers geschieht hier durch den bekannten Gurtenapparat, das Filtriren durch das Dumont'sche Beutelfilter. Für das letzte Kochen des Zuckers, und als Ersatz in der Königsaal gesehenen Howard'schen Apparate ist jetzt durch Hrn. Mathias, Civil-Ingenieur aus Paris, ein Degrand'scher Apparat zum Abdampfen des schon mehr concentrirten Zuckers aufgestellt. Beide Apparate haben denselben Zweck; sie sollen nemlich durch das Kochen des flüssigen Zuckers im luftdünnen Raum bei einer Temperatur, die nie 60 bis 65° R. übersteigt, die Bildung der vielen Melasse durch Zersetzung oder Umdänderung des crystallinischen Zuckers verhüten. Der Kochapparat von Degrand hat den Vorzug von jenem Howard's, daß er zur Erzeugung von der nöthigen Luftdünnheit oder Luftleere der Luftpumpe ganz entbehrt, und dazu bloß zugeführter und durch Abkühlung wieder tropfbar gemachter Wasserdämpfe bedarf; überdies, einmal luftleer gemacht, es den ganzen Tag über bleibt, so daß die, an sich sehr schnellen Kochungen ununterbrochen auf einander folgen können.

Prof. Plieninger berichtete über die, ihm in der Sitzung am 22. vom Wirthschafter, Daniel übergebenen zweyerley Insectenlarven. Prof. Germar und Legat. Rath Rose, als auch er selbst hielten das, in der Wurzel der Färberröthe vorgekommene Insect für die Larve des Springkäfers, das andere aber für eine Species der Gattung des Lauffäfers. Besondere Mittel zu deren Bekämpfung wären ihnen nicht bekannt; Vertilgung der Adercaine und oftmaliges Beunruhigen im Boden durch fleißiges Umarbeiten desselben wären gegen alle Gäfte dieser Art anwendbar.

**Diebl, wolleilere Gewinnung des Flasches.**

**H. Bartels** aus Breslau, Vortheile der Schaafwädsche.

**Prof. Mühlwenzl** zu Prag, über die Lorflager in Böhmen.

**Graf v. Bakowsky** aus Dresden, Erziehung der Weisfichte in Eichwäldern.

**Nestler, Fütterung mit Loh.**

**Diebl, über die Hebung der landwirthschaftl. Gewerbe.**

**Wirthschafterath Ochsenbauer** zu Prag, Zucht des Riesenhanfes.

**Kalina von Jächstein, Landwirthschaft Böhmens** in der vorhistorischen Zeit.

Am 20. September gab der Obergburggraf von Chotef den Gäften ein Concert in seiner Wohnung, unter Mitwirkung der Zöglinge des Prager Conservatoriums unter der Leitung von F. D. Weber.

Juli 1838. Heft 8.

Am 24. September um 2 Uhr ward im spanischen Saale der Hofburg ein feierliches Gastmahl abgehalten, wodurch Se. k. k. Majestät den deutschen Naturforschern und Aerzten das Allerhöchste Wohlgefallen über ihren dieser Hauptstadt abgestellten Besuch zu bezeugen geruheten, und wozu von Sr. Excellenz dem Herrn Obergburggrafen die Einladung durch den ersten Geschäftsleiter an sämtliche wirkliche Mitglieder und deren Gemahlinnen und Töchter bei der zweiten Versammlung ergangen war.

Treppen und Gänge waren mit rothem und weißem Tuche (den Wappenfarben des Landes) belegt, mit Drangenbäumen und blühenden Gewächsen die Seiten besetzt, und längs des großen Corridors paradierten in zwey Reihen die Grenadiere des Bürgercorps; die innern Räume der Säle waren geschmackvoll ausgeziert, und die Fenster mit erotischen Pflanzen besetzt. Die Ankommenden wurden von Sr. Excellenz dem Herrn Obergburggrafen und einer ansehnlichen Zahl von Personen hohen Ranges im deutschen Saale empfangen.

Als die Stunde des Mahles erschienen, öffneten sich die Pforten des anstoßenden spanischen Saales, und die Gäste traten in Begleitung jener Dignitäre in diese kolossale, festlich prangende Halle, in der vier wohl servirte Tafeln parallel an eine fünfte, querüber stehende, knielsen, an welcher lebten Sr. Excellenz der Herr Obergburggraf, als Stellvertreter des Monarchen, und der erste Geschäftsleiter in der Mitte Platz nahmen, während sich die anwesenden Personen aus dem Adel, dem Geistlichen, Civil- und Militär-Stände ihre Plätze beliebig unter den Gästen wählten, und nach dem Vorbilde Sr. Excellenz des Landes-Chefs mittheilten, durch zuvorkommende Aufmerksamkeit die treuen Organe der kaiserlichen Majestät zu seyn.

Der erste Toast, der aus überströmenden Herzen von den anwesenden Gästen ausgebracht wurde, galt Sr. Majestät dem Kaiser, und Seiner kaiserlichen Hoheit, den Erzherszogen Oesterreichs, worauf Sr. Excellenz der Herr Obergburggraf ein wiederholtes Lebehoch zu Ehren der fremden Herren Naturforscher und Aerzte ausbrachte. Von Seiten dieser erschollen sodann den gesammten Böhmen, ihrem humanen Landes-Chef die herzlichsten Toaste.

Die heitere, wahrhaft herzliche Stimmung der Anwesenden wurde durch die Musik einer trefflichen Capelle erhöht und unterhalten, bis spät Abends die Tafel aufgehoben wurde.

An die Stelle einer Lustfahrt in den sogenannten Baumgarten, welche der ungünstigen Witterung wegen unterbleiben mußte, trat am Abende des 24. Septembers ein ansehnlicher Ball, den der hierortige Handelsstand zu Ehren der Gäste im Saale der Färbereifabrik veranstaltete. Zahlreicher Zuspruch, gute Ordnung und prachtvolle Decorirung der Localität zeichnete ihn eben so günstig aus, als die Gefälligkeit der Herren Ausschußmänner, von denen die Gäste in der mit ausserlesenen Pflanzen und Blumen geschmückten Vorhalle das Geschenk elegant gedruckter Tanzordnungen und zierlicher Tanzcalender empfangen. Die freundliche Ueberraschung, welche der Eingang verursacht hatte, ward nun durch den Eintritt in den glänzenden, von einer gut gewählten Musik belebten Saal überboten. Geschmackvoll eingerichtete Toilettenzimmer gewährten den Tanz- und Schaulustigen anständige Erholung, und die gastlichen Speisesäle jede Erfrischung.

Auch das k. k. böhmische Theater bot den anwesenden Naturforschern und Ärzten in seinem hellen und geräumigen Schauplatz durch die anziehendsten Vorstellungen manchen schönen und genussreichen Abend dar.

\* \* \*

Zur Verherrlichung der Versammlung erschienen mehrere Gedichte, wovon wir folgende mittheilen:

### Alma Mater Carolina.

#### Doctis naturae scrutatorum coetibus,

Pragam 1837 visentibus.

Optata regi quondam atavo dies  
Nondum Bohemis inradiaverat,  
Regisque caesa stirpe nox jam  
Altius hic residere visa est.

At alma dudum regna per Italia,  
Et duriori prospera Galliae  
Lux jam refulsit, laude tellus  
Utraque personuit Camoenae.

Rex, quem Bohemi — si memori viget  
Avita virtus pectore — laudibus  
Non desinent efferre, quemque  
Concelebrant Patriae Parentem.

Rex in Bohemas Castalidum choros  
Adlexit oras, qui docilem gregem  
Artes beatas edocerent,  
Disceuterentque procul tenebras.

Regisque nutu sol nitidus statim  
Ubique sparsit vivificum jubar,  
Turbae frequentes undequaque  
Conveniunt liquidos anhelare

Haurire fontes. — Hinc generosior  
Fervere ludo ludus Olympio,  
Austerus horror mitigari,  
Semina prospera pullulare:

Perenne nil mortalibus exstittit  
Dextris creatum, mole ruunt sua  
Humana quaevis; sed ruinis  
Ecce salus rediviva prodit.

Sol, hisce qui tum splenduerat plagis,  
Labare coepit dissidio gravi,  
Sindque matris dissolutae  
En procul evolare stellae.

Quas nox premebat, coeligena ut face  
Luxere terrae lumine tum novo,  
Novique soles exstitere  
Omnia luce nova beantes.

Propulsa dudum matris ab ubere  
Nunquam est amoris solliciti immemor  
Proles, et horas laeta spectat,  
Tuta manu tenerae parentis

Quando vigeat. Nec genetrix potest  
Suo profectam progeniem sinu,  
Et Colcha partum non amare  
Non potis est proprium genetrix.

Hinc alma mater, quae — Caroli genus —  
Omni Camoenas tempore foverat,  
Hinc laeta vos coetus virorum,  
Ceu reducem sobolem, salutat.

Salvete, coeli lucida sidera  
Lustrare, rerumque abdita lumine  
Solerter acri perspicari,  
Et cupidis aperire docti!

Natura quidquid, strennus aut labor  
Hic sistit, aequis visite mentibus,  
Et matris in dextra fideles  
Perpetuum sociate dextras.

Prof. W. Sicoboda.

### P r a g

an die deutschen Naturforscher und Ärzte.

Im Jahre 1837.

Willkommen hier zum schönsten aller Feste  
Cybele's und Hygiea's Priester-Schaar!  
Prag feiert beim Erscheinen solcher Gäste  
Ein lang ersehntes, freudenvolles Jahr.

Es breitet Böhmen freudig seine Gaben  
Vor Euren tiefen Kennerblicken aus;  
Berschaut, beurtheilt Alles, was wir haben,  
Und nehmt davon ein freundlich Bild nach Haus.

Den Freund der Flora wird die Flur entzücken,  
Wie sie sich zeigt in feiner Farbenpracht.  
Auf der Subeten wolkennahen Rücken,  
Der rings die Berge riesig überwacht;

Und wo in tiefen, wild verwachsenen Gründen,  
Durch Felsentrümmer aus der Erde Schoos,  
Die Elb' und Iser fluthenreich sich winden,  
Da wuchern Pilze, Farnkraut und Moos.

Und wessen Geist durch Wein sich läßt beflügeln,  
Wem Frohsinn er für trübe Stunden schafft,  
Dem reist auf Czernosek's, auf Melnik's Hügel  
Der edlen Rebe labungreicher Saft.

Doch Form und Farbenschmuck herrscht auch im Dunkeln,  
Wo niemals hin die liebe Sonne blickt,  
Wo das Metallreich durch sein lockend Funkeln  
Den zu Verweg'nen in Gefahr verstrickt.

Von oben, wo die Blütenwelt ihm lachte,  
Führt zu den Gnomen ihn sein muth'ger Sinn;  
Hier holt er aus dem tief getrieb'nen Schachte  
Sich Silber<sup>1</sup>, Blei<sup>2</sup>, dort Eisen<sup>3</sup> und da Zinn<sup>4</sup>.

Und seine Königskrone schmückt Böhmen  
Mit Edelsteinen aus dem eignen Schoos;  
Dem Fels entrißen von den wilden Strömen,  
Bedarf es oft des em'gen Suchens bloß.

Auch Gold<sup>5</sup> errang sich Böhmen einst als Beute,  
Vom Berggeist, der — vergönnd den Gewinn —  
Mit neu erwachten Hoffnungen noch heute  
Liebt des fleiß'gen Bergmann's kühnen Sinn.

Die Moldau, die vom Böhmerwald sich senket,  
Wo noch der Bär aus ihren Quellen trinkt,  
Die letzte Saumen mit dem Laß besenket,  
Wirt Muscheln auch, woraus die Perle winkt.

Doch Schätze von weit höhern Werthe quellen  
Aus nie erforschten Tiefen hier empor,  
Genesung bringend sprudeln ihre Wellen  
Da heiß<sup>6</sup>, dort kalt<sup>7</sup> an's Tageslicht hervor.

Wie fühlt sich, ach, so arm! der reichste Kranke,  
Zeigt sich als Schmerzziel ihm nur das Grab,  
Ein Hoffnungsfünkchen schon entflammt zum Danke —  
Zum muth'gen Greifen nach dem Wanderstab.

Aus weiter Ferne kommt er hergezogen,  
Vertrauend naht er sich dem Seegens-Ort,  
Und sieh, sein Hoffen hat ihn nicht betrogen,  
Mit Dankgebet und Jubel zieht er fort.

Nicht kümmern ihn die Kräfte, deren Walten  
Geheimnißvoll die Wunderquellen schuf,  
Wenn ihre Heilungsmacht sie nur entfalten,  
Genügt es ihm, zu künden ihren Ruf.

Den Forscher aber drängt es, abzurufen  
Der räthselhaften Sphinx der Deutung Wort,  
Und kann er auch nicht in das Inn're bringen,  
So baut er doch auf kühnen Schlüssen fort.

Wo hier Neptun sich und Vulkan bekämpften,  
Bald zeugend, bald verderbend eine Welt,  
Wo Wasserfluthen Feuermeere dämpften,  
Da sind noch Kampfeszeugen aufgestellt.

Die Häupter heben sie, als Siegesmale,  
Vom Kammerbühl<sup>8</sup> bis zum Wiltner Stein<sup>9</sup>,  
Als Thermen laden sie, im Egerthale  
Und dem der Biela, Euch zur Forschung ein.

Und Reste von längst ausgestorb'nen Thieren,  
Wie nur die Vorwelt lebend sie gekannt, —  
Von Pflanzen, die noch Blatt und Blüthe zieren  
(Nicht von Linne und Buffon noch benannt).

Sie, die Jahrtausende verborgen lagen,  
Hat hier, zum Theil enträthselst schon als Art,  
Aus grauer Vorzeit bis zu unsern Tagen  
Dem Forscher die Natur selbst aufbewahrt<sup>10</sup>.

bad, die weithin verführten Bitterwässer von Püllna und Saibitz, der Wiltner Sauerbrunn, vieler anderen nicht zu gedenken.

8 Vorzüglich bekannt geworden durch Männer, wie Leopold von Buch, von Goethe, Alex. von Humboldt, Graf Rosp. von Sternberg, durch dessen Eifer jetzt auch das Innere dieses Hügel's der Forschung zugänglich wird.

9 Diesen in geognostischer Hinsicht höchst merkwürdigen Fels-Koloss, der auch Wozzen heißt, hat schon der gelehrte Keuß zum Gegenstande gründlicher Untersuchung gemacht.

10 Hier darf die „Flora der Borna“ des Grafen Rasper von Sternberg und die betreffende Sammlung im vaterländischen Museum nicht ungenannt bleiben.

1 u. 2 In Rutenberg, Joachimsthal, Pregibram u.

3 Birow, Horowitz u.

4 Zinnwald, Schlackenwald, Schlackenwerth, Graupen u.

5 Ber Galt, ehemals sehr ergiebig, jetzt neuerdings eifrig betrie-  
ben.

6 Karlsbad, Teplitz.

7 Marienbad, Franzensbrunn, Lieboverba, das laue Johannes-

Was alle Welten schuf, die ringsum prangen,  
Und durch dieselbe Schöpfungskraft erhält,  
Was zu erkennen sehnlichst wir verlangen,  
Ist ew'ge Liebe, sie besetzt die Welt.

Auch unsern Kreis soll Liebe fest umschlingen,  
Durch sie gewinnt erst Leben die Natur.  
Zur Freude leih uns Liebe jetzt die Schwingen,  
Und scheiden möget Ihr in Liebe nur!

Dr. J. Mitan,  
emeritierter Professor an der Prager Universität.

### Zum Willkomm der deutschen Naturforscher und Aerzte bei ihrer 15ten Versammlung zu Prag im September 1837.

Der Wahrheit Perle, die der kühne Denker  
Aus tiefem Dunkel holt zum gold'nen Licht,  
Er sucht sie nicht, das eig'ne Haupt zu schmücken,  
Er schmeißt die reiche Stufe nicht für sich,  
Die mühsam er bey seiner Lampe brach.  
Die Blume selbst, die er im Hain des Wissens  
Luftwandeln pflückte, legt er dankbar nieder  
Auf den Altar der Menschheit, der sie blühte,  
Und preiset Gott, der ihn vor Tausenden  
Durch regen Trieb und Geisteskraft erhob,  
Um Tausenden die Schätze seines Wissens  
Zu ihrem Heil und Frommen zu erschließen.  
Euch fiel dieß schöne Loos! — Seyd uns willkommen  
In diesen Räumen, wo das Licht der Weisheit  
Den Morgenstrahl auf unsre Heimath goß,  
Und, was im Keime schlief, zur Frühlingblume,  
Zum Blüthenhain erweckte und zur Frucht.  
Zwar lagerte, kaum daß es aufgegangen,  
Sich eine Donnerwolke vor das Licht;  
Doch, der dem ersten Tag sein „Werde!“ rief,  
Er führte sie vorüber; und, was sonst  
Die Geister schied, der gleiche Trieb und Zweck,  
Er hat Euch brüderlich vereint. — Seyd uns willkommen,  
Die Ihr, was Euer Geist erfand und prüfte,  
Den gleichgesinnten Freunden freundlich bietet,  
Auf daß es ein Gemeingut Aller werde  
Zu Rath und Trost und fröhlichem Gedeihn.

Prof. Anton Müller.

### An die Naturforscher und Aerzte zu Prag im September 1837.

Der Grieche zog in längst verklung'nen Tagen,  
An Kampf und Sieg gewohnt, zum wilden Spiel:  
Der Hesse Lauf, die kühne Flucht der Wagen,  
Es suchte jede Kraft und traf ihr Ziel;  
Der Discus flog, von starker Faust geschlagen,  
Und Beyfall scholl es, wenn der Ringer fiel.  
Dann der Gemüther Aufruhre zu versöhnen,  
Rief Sängerkhand die gold'ne Lyra tönen.

Und unsre Dichter greifen in die Saiten  
Und singen uns von gold'ner Griechenzeit;  
Seht, es erneuern sich die alten Zeiten,  
Es strömt herbei aus allen Landen weit,  
Olympias Spiele wieder zu bereiten,  
Die Schranken stehn, die Ringer sind bereit;  
Auch sind sie nicht genah't zum Körperspiele,  
Des Geistes Ernst ringt hier nach andern Zielen.

Die Seele wird belauscht in dem Atome,  
Der Vornwelt Wirken wird uns aufgethan;  
Die ewigen Pilger in des Himmels Dome,  
Sie wandeln die gemessene Strahlenbahn,  
Und auf des Herzens rothbewegtem Strome,  
Wie mächtig wogt und schiffet der Forschung Kahn.  
Gelichtet muß die felt'nen Wunder künden  
Der Pflanzenwelt in des Meeres Gründen.

Und leuchtend werden in des Schachtes Tiefe  
Die Aderneze des Metalls erhellet;  
Gelesen wird aus dem erbroch'nen Briefe,  
Den dunkel die Natur an uns bestellet,  
Gezeichnend deutet man die Hieroglyphe  
Am Riesenobelisk der schönen Welt.  
So seyd gegrüßt ihr Ringer und ihr Meister,  
Ihr Kranzsehrenden, und bekränzte Geister.

Schon einmal kamen freudig sie gezogen  
— Wer zählt die Pilger all — zu Pragas Thor:  
Da ringsumher ihr kein Ayst gewogen,  
Die Wissenschaft im Sturme sich verlor.  
Hier thaten auf sich Hallen ihr und Bogen,  
Ihr erster Tempel ragte hier empor;  
Noch rauscht davon der Moldau stolze Welle,  
Wie Praga war des Lichtes gold'ne Schwelle.

Und später hielt die geist'ge Tafelrunde  
 Ein König hier mit weiser Männer Schaar,  
 Und forschend hing ihr Blick am Sternenbunde  
 Und deutete Geschehnisse wunderbar;  
 Der Alchymie geheimnißvolle Kunde  
 Fand Priester hier und flammenden Altar;  
 Indesß ringtum des Krieges Sturm erbrauste,  
 War Wissenschaft in Praga die behauste.

Ob auch von Wahnes dunklem Rauch umflossen,  
 Ward doch zu künst'gem Licht geschürt die Gluth,  
 Ein Morgenroth hat leuchtend sich ergossen,  
 Ein gold'ner Tag stieg aus der Zeiten Fluth,  
 Ein Habsburg hielt mit geistigen Genossen  
 Der Weisheit Schätze hier in sich'rer Huth;  
 Und wollt ihr in der Kunst-Geschichte blättern,  
 Es glänzt der Rudolph drauf mit gold'nen Lettern.

Ein König wieder aus dem kräft'gen, alten,  
 Umkränzten Stamm vereint den heut'gen Bund.  
 Ein großes Fest der Wissenschaft zu halten,  
 Die Priester nahen mit geweihtem Mund.  
 Wie wird es glänzend sich und hell entfalten,  
 Wie wird es strahlend durch die Fernen kund!  
 So seyd gegrüßt, und mög' es Gott gefallen:  
 Gegrüßt zum Heil in diesen würd'gen Hallen.

M. D. Ludw. Aug. Frankl.

## N a c h r u f.

Wenn in des Sommers arbeitsvollen Tagen  
 Natur im kräft'gen Schöpfungswerk gelüht,  
 Wenn reichen Segen Feld und Flur getragen,  
 Wenn Frucht geworden, was im Lenz geblüht,  
 Wenn für die Menschheit, stillend ihre Klagen,  
 Die Pflegerinn alles Lebens sich gemüht,  
 Und wenn sie, sammelnd ihre tiefsten Kräfte,  
 Zu ruhen scheint vom irdischen Geschäfte:

Dann tritt zusammen in den deutschen Gauen  
 Der weisen Priester auserwählte Schaar,  
 Sie preisen ihre Götinn und erbauen  
 Bald hier, bald dort ihr einen Hochaltar;  
 Doch seltsam ist der Priester Dienst zu schauen,  
 Sie bringen nicht Gebet, nicht Opfer dar,  
 Sie lösen Räthsel an des Altars Stufen,  
 Und wagen's, laut Geheimstes auszurufen.  
 Jhs 1838. Heft 8.

Denn nicht mit Ehrfurcht will Natur erfüllen,  
 Durch ein Gewand von Nebel, das sie trägt,  
 Nein Jedem ist's gewährt sie zu enthüllen,  
 So viel sie auch des Wundervollsten hegt,  
 Und Jeder darf den Trieb des Wissens stillen,  
 Ihr heil'ges Buch ist offen hingelegt,  
 Und wer vom Antlitz ihr den Schleier lüftet,  
 Hat Heil sich selbst und Heil der Welt gestiftet.

Drum stehn die Priester auch im Heiligthume  
 Von ihrer Gottheit Anblick nicht geschreckt,  
 Und Einer ruft: Zu deinem neuen Ruhme  
 Hab' eine neue Kraft ich jüngst entdeckt,  
 In einer kleinen, unscheinbaren Blume  
 Hast du ein süßes, starkes Gift versteckt;  
 Ich forschte lang und hab' erkannt sein Wesen,  
 Gesunde tödtet's, Kranke macht's genesen.

Ein Zweiter spricht: Vom Laufe des Kometen,  
 Vor dem die Brust des Aberglaub'schen bebt,  
 Hab' ich zu Troz den schwindelnden Propheten,  
 In stillen Nächten Kunde mir erstrebt;  
 Der Erde Kreis wird nie der Stern betreten,  
 Der himmelweit an uns vorüberfliehet,  
 Schafft ruhig, Menschen, schlummert ohne Sorgen,  
 Noch lange folgt auf jede Nacht ein Morgen.

Ein Dritter hat ein seltsam Thier gefunden,  
 Ein Vierter will ergründen Ebb' und Fluth,  
 Ein Fünfter hat die Stoff im Stein entbunden,  
 Ein Sechster eint Metall in rascher Gluth,  
 Der weißsagt Mondverfinstung auf Secunden,  
 Und Jener sucht die Kraft, die nimmer ruht,  
 Der Priester Geist durchforscht, was nah und ferne,  
 Den Staub der Erde und des Himmels Sterne.

So nach der Dinge Gründen forschet der Weise,  
 Der Irrthum weicht, es fliehet der finst're Wahn,  
 Erkenntniß bricht, bald plötzlich, bald nur leise,  
 Allmächtig wirkend sich die weite Bahn,  
 Und in des Volkes, in der Menschheit Kreise,  
 Tritt Wahrheit, eine Glanzgestalt, heran,  
 Und spendet rings mit leuchtendem Gesichte,  
 Den Schatz des Nutzens, ihre gold'nen Früchte.

Willkommen drum, Ihr frommen Wohlthatsspender,  
 Gegrüßt, wohin sich Euer Fuß gewandt,  
 Ihr giengt schon manches Jahr als Lichtverfender  
 Im glühenden Lrie durch manches deutsche Land,  
 Und Euch erkannten, ehrten alle Länder,  
 Wo Euer Kreis sich froh zusammenfand;  
 Zuletzt auch Böhmens segensreichen Auen  
 Ward es vergönnt, die heil'ge Schaar zu schauen.

Hier, wo Natur sich freut, in Zeugungsfülle  
 Zu üben ihre schöpferische Kraft;  
 Hier, wo sie aus der Fluren grüner Hülle  
 Den Pflanzenreichthum treibt im vollen Saft,  
 Wo tief im Edgrund sie geheim und stille  
 An Tausend Erzen immer rege schafft;  
 Hier, wo sie prangt im buntesten Farbenscheine,  
 In Blumen, Perlen und im Edelsteine.

Vorüber ist, verrollt gleich andern Tagen,  
 Die schöne, frohe inhaltsvolle Zeit;  
 Doch tiefe Wurzel hat in uns geschlagen  
 Erinnerung, die Vergangnem Dauer leiht;  
 Und fern, von allen Winden fortgetragen,  
 Ward Euer Saatkorn in die Welt verstreut,  
 Und, wo es wachsend, wuchernd wird gefunden,  
 Da ist ein Denkmal jener schönen Stunden.

Karl Egon Ebert.

Und hier, wo gleich den Bergen in der Runde,  
 Die unverwandt zur Sonne schauend stehn,  
 Die Menschen auch, nach reiner Wahrheit Kunde,  
 Nach höh'rem Wissen schmachkend aufwärts sehn,  
 Wo rastlos strebend, doch mit stillerm Munde,  
 Die besten, nach den schönsten Zielen gehn;  
 Hier hob sich jest, den Erdkreis zu belehren,  
 Der Göttin Altar, die auch wir verehren.

Ach, daß so schnell die schönen Tag' entschwanden,  
 Die Freuden, die ein edler Sinn genoß;  
 Als Weisheit vom Geweitereu verstanden,  
 Von Euren Lippen, hohe Männer, floß;  
 Als Wahrheit, hergeströmt aus allen Landen,  
 Im Herzen unsrer Heimath sich ergoß;  
 Die Geister mit den Geistern eifernd rangen,  
 Und doch die Hände frieblich sich verschlangen!



## Ausflug nach Böhmen

und die Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte in Prag im Jahre 1837.

Aus dem Leben und der Wissenschaft von Dr. J. Nöggerath.

Bonn, bey Weber. 1838. Taschenformat. 480.

Mit Freuden begrüßen wir in diesem, aus 23 Briefen bestehenden Werkchen den, in der Wissenschaft wie im Leben vielfach verwandten, durch seine schriftstellerische, wie durch seine didaktische Thätigkeit um Mineralogie und Geognosie verdienten Präsidenten der mineralogischen Section der vorjährigen Versammlung der Naturforscher. Und wahrlich, wir finden uns freundlich wieder begrüßt, finden uns abermals angezogen und gefesselt durch das, was er in seinen Briefen zu erzählen hat, und durch die lebendige und joviale Weise, wie er zu erzählen versteht.

Das Buch zerfällt seinem Inhalte nach eigentlich in drei Abschnitte. Die ersten 8 Briefe geben eine Schilderung der Reise des Verfassers von Bonn über Frankfurt, Würzburg, Waireuth, Eger, Franzensbad und Karlsbad nach Prag; die folgenden 9 Briefe versetzen uns nach Prag und mitten in das Thun und Treiben der 15ten Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte; die letzten 6 Briefe endlich beschreiben die, größtentheils in Gesellschaft von Leopold von Buch und Elie de Beaumont gemachte Rückreise des Verfassers über Prgibram, Brzežina, Bilin, Teplitz, Dresden und Freyberg bis nach Eisenach. Bey der bekannten Auffassungs- und Darstellungsgabe Nöggeraths war zu erwarten, daß jeder dieser Abschnitte interessante Beobachtungen und Mittheilungen enthalten werde; und so bietet uns denn dieser Ausflug nach Böhmen Unterhaltung und Belehrung, mögen wir den Verf. auf seinem Hinfluge nach Prag, oder auf seinem Rückzuge nach Eisenach, oder auf seinen Gängen durch die Hauptstadt Böhmens begleiten. Besonders in letzterer Hinsicht wird nicht leicht ein Mitglied der vorjährigen Versammlung das Buch zur Hand nehmen, ohne

sich durch diese frisch hingeworfene Skizze eines Bildes erfreut zu finden, in welchem wohl Jeder nicht nur Erinnerungen an die eigenen damaligen Erlebnisse schöpfen, sondern sich auch die Herrlichkeiten der alten Praga, die Freundlichkeit seiner Behörden und Bewohner und die interessantesten Momente aus dem acht-tägigen Zusammenleben so vieler Wissenschaftsgenossen nochmals vor die Seele geführt finden wird.

Aber auch die Wissenschaft erfreut sich mancher Ausbeute, welche der Verf. theils in eigenen Beobachtungen, theils in Mittheilungen Anderer bietet. Dahin rechnen wir z. B. die interessante Notiz über die, bey Ehrenbreitenstein begonnenen Arbeiten zur Erbohrung heißer Quellen, S. 5; die Bemerkungen über die Perlenfischerei bey Verneck, S. 46; die Mittheilungen über das Alexandersbad bey Wunsiedel, S. 54; über die Granite der Luisenburg, S. 59; über die Kalksteine zwischen Wunsiedel und Einatengrün, S. 64 ff.; über die zerbrochenen Feldspathcrystalle in den Granitblöcken bey Göpfersgrün, S. 71 ff.; über den Kammerbühl bey Eger, S. 110 — 126, welchen der, im Gebiete erloschener Vulcanen einheimische Verfasser sofort für einen kleinen Vulcan erkannte; ferner die Notizen über die Lessauer Erdbbrandproducte, S. 168; über Prgibram, S. 372 ff.; über das Radnitzer Kohlengebirge, S. 387 — 400, u. dgl. m. Als eine interessante Beilage ist die S. 209 — 230 abgedruckte Abhandlung Bischofs über die Abkühlung unserer Erde zu betrachten.

Und so scheiden wir denn vom Verfasser mit herzlichem Danke für die, in diesen Briefen uns gewordene Unterhaltung und Belehrung.

## Iconografia

della Fauna italiana di CARLO LUCIANO BONAPARTE, principe di Musignano. Roma Salvincci.  
Vienna, Rohrmann et Schweigert. 1838. fasc. XXII. fol. 8 $\frac{1}{2}$ . tab. 6.

Die Abbildungen von diesem Hefte sind sehr schön gezeichnet und illuminirt, wenigstens die Säugethiere, Lurche und Fische; bey den Vögeln könnten die Federn besser seyn; sie sehen ziemlich Haaren gleich. Das Hefte enthält wieder interessante und mehrere neue Thiere, mit demselben vollständigen und lehrreichen Text und mit ungemein sorgfältiger Synonymie.

1) *Mustela boccamela*: castaneo-cinerea, subius lateribusque abrupte alba: cauda dimidio corporis parum breviori, apice vix obscuriori.

Als der Verfasser den Marbler abhandelte, glaubte er, es gebe in Italien nur zwei Gattungen der Halbsippe *Putorius*. nemlich *Mustela vulgaris* (Donnola) et *M. putorius* (Puzola). Professor Gene von Turin theilte ihm aber mit, daß dieses zwar für das südliche und mittlere Italien richtig sey, in den sardinischen Staaten aber finde sich nicht selten auch das nordische *Hermelin* (*M. erminea*). Später ist es seinen Nachforschungen auch gelungen, die *Boccamela* auf Sardinien, wo sie schon Cetti beschrieben hat, zu bekommen und dem Prinzen zu schenken. Es ist fast ohne Zweifel des Aristoteles *Ictis*, welche

den Honig sehr liebt, eine von **Cetti** bestätigte Eigenschaft. **Ictis** wurde für *Mustela martes* gehalten, *M. furo* und *Viverra* überseht.

Das Thier sollte *M. ictis* heißen. Es steht zwischen *M. vulgaris* et *erminea*: oben castanienbraun; Grund der Haare grau; Bauch weiß. [Im Character sollte es daher wohl heißen: Cinereo-castanea.] Länge 8" 5", Schwanz 3" 11". In dem Exemplar war ein Lückenzahn weniger im Unterkiefer als bei *Mustela vulgaris*. **Cetti** beschreibt die Lebensart genau. Diese Beschreibung wird hier mitgetheilt, weil dessen Buch in Italien selten sey. Die deutsche Uebersetzung ist gemein.

Es findet sich nicht selten in den Feldern auf Sardinien, ist aber doch schwer zu bekommen wegen seiner List und Huthigkeit, und weil es sich in dem Gesträuch der indischen Feigen versteckt, auch in Steinhaufen und Steindünen um Felder, und in alte Burgen. *Mustela* et *Putorius* können als Sippen betrachtet werden, und die kleinen mit kurzem Haar versammeln bleiben; so wie die größeren mit langem Haar, wie *Ictis* und *Marder*, ungeachtet des verschiedenen Gebisses. Es gibt also in Italien 3 Gattungen *Mustela*.

1) *M. vulgaris*: rufo-cinnamomea [cinnamomeo-rufa], subtus alba: cauda valde breviori tertio corporis, apice concolori.

2) *M. boccamela*: castaneo-cinerea [cinereo-castanea], subtus lateribus abrupte alba: cauda dimidio corporis parum breviori, apice vix intensiori.

3) *M. erminea*: rufo-cinnamomea [cinnamomeo-rufa] subtus flavo-albida (hyeme tota alba): cauda dimidio corporis valde longiori, apice late nigro.

Dazu kann man setzen die americanische *M. vulgaris* als eigene Gattung, welche mehr der *M. erminea* verwandt ist:

*M. cicognanii* n.: rufo-cinnamomea, subtus flavo-albida: cauda corporis dimidio subbreviori, apice nigricante.

*Sitta europaea*: plumbeo-cinerea, vitta transoculari utrinque nigra; subtus rufescens; rectricibus lateralibus nigris, quatuor extimis apice albis: rostro capite valde breviori.

Mit einer vollständigen Beschreibung; gehört nach **Dendrocolaptes**. In America gibt es drei Gattungen, abgebildet von **Wilson**; auf Java die *Sitta velata*; andere in Centralasien.

*Sitta syriaca*: plumbeo-cinerea, vitta transoculari utrinque nigra; subtus alba, ventre rufescenti; rectricibus unicoloribus; rostro capite sublongiori.

Zuerst von **Ehrenberg** entdeckt, findet sich auch in Dalmatien. Da man davon noch keine Abbildung hat, so wird hier eine mitgetheilt: ist größer als die gemeine, hängt ihr

flaschenförmiges Nest mit einem Seitenloch an Felsen und legt 5 Eyer.

*Merops aegyptius*: viridis pileo concolore, fronte albo, fascia oculari intra caeruleum nigra, gula flava, jugulo castaneo, alis subtus hypochondriisque cinnamomeis.

Wurde bey **Genua** getödtet, wo er mit seinem Weibchen flog; wurde zuerst von **Gorsfal** beschrieben, von **Ledaillant** abgebildet unter dem Namen **Gueprier savigny**. Ist wahrscheinlich *Merops persica Pallas*. *M. superciliosus* ist davon verschieden und darunter steckt noch ein anderer, den der Prinz **M. vaillantii** nennen will. Zum Unterschied ist der Vordertheil von *M. apiaster* daneben abgebildet.

*Tyria dahl*: cinereo-virens, subtus pallidiuscula, immaculata, colli lateribus atramentatis: squamis rhombeis: capite grandiusculo, ovali; scutello verticali campaniformi: cauda fere trientali.

Findet sich in Dalmatien und wurde zuerst von **Sizinger** aufgeführt. Länge 3' 5".

*Hyla viridis*.

Es wird viel Beachtungswerthes über die Classification der Lurche überhaupt mitgetheilt.

*Rana esculenta*. Der Verfasser vereinigt damit *R. maritima* et *alpina*.

*R. temporaria*.

*Leuciscus fucini* n.: *Squalius* cinereo-argenteus: longitudine altitudinem quintuplo superante: capite acutiusculo altitudinem corporis vix brevior: spatio interoculari oculo paulo majori: pinnis inferioribus rubellis: dorsali ventralibus opposita, capite vix humiliori, subtruncata.

*L. albus*: *Squalius* albo-virens argenteus, longitudine altitudinem sextuplo superante: capite altitudinem corporis multo longiori: spatio interoculari fere duplo oculo maximo: ore amplissimo: pinnis parvulis, subnigricantibus: dorsali ventralibus opposita, subtruncata. — *Albus* **Piscis Salviani** Hist. pisc. 88. f. 20. **Cyprin**. *Albo* **Ital** dictus, **Artemi** Syn. 13. spec. 26.

*L. cavendani*: *Squalius* cinereo argenteus, longitudine altitudinem quadruplo superante: capite multo breviori altitudinem corporis: spatio interoculari duplo magnitudine oculi: pinnis parvulis, decoloribus: dorsali inter ventrales et analem opposita, subrotundata. — *Cavendani*, **Aldrov**. **Pisc**. V. c. 17. p. 600. **Bellon**, **Aquat**. I. 315. **Cyprin**. capito, *Scopoli* Delic. faun. 73.

Der Verfasser setzt die Unterschiede dieser drei Fische sehr gut auseinander, und erweist dadurch den Ichthyologen einen großen Gefallen. Es wäre zu umständlich, einen Auszug davon zu geben, wohl auch unnöthig, da doch jeder Zoolog das Werk haben muß, und man sich ohne die Abbildungen doch nicht gehörig zurecht finden kann.





Fig. 3.




Fig. 2.




Fig. 4.




Fig. 5.











Fig. 6.









# U f i S.

Encyclopädische Zeitschrift,

vorzüglich

für Naturgeschichte, vergleichende Anatomie und Physiologie,

von

D f e n.

1 8 3 8.

H e f t IX. u. X.

Der Preis von 12 Heften ist 8 Thlr. sächs. oder 14 fl. 24 Kr. rheinisch, und die Zahlung ist ungetheilt zur Leipziger Ostermesse des laufenden Jahres zu leisten.

Man wendet sich an die Buchhandlung Brockhaus zu Leipzig, wohin auch die Beiträge zu schicken sind. Es wird gebeten, dieselben auf Postpapier zu schreiben.

Unfrankirte Bücher mit der Post werden zurückgewiesen.

Einschickgebühren in den Text oder Umschlag die Zeile sechs Pfennige.

Von Anticritiken (gegen Fests-Rezensionen) wird eine Quartseite unentgeltlich aufgenommen.

Leipzig, bey Brockhaus.



# A n z e i g e n.

## Insecten-Verzeichniß

des Dr. med. Jos. Walzl zu Passau in Bayern.

Fortsetzung von Heft VII. und VIII.

Apalus bipunctatus	kr.	40	Hypera viciae Gyl.	kr.	8	Silvanus 6 dentatus	kr.	8	Stenopterus cyanens	kr.	20
Lytta chalybea		45	Gastrodus gibbus Mg.		10	Trogosita coerulea		30	Pachyta clathrata F.		15
— phalerata F.		54	Liparus intermedius F.		30	Cucujus depressus	1 fl.	—	— var. reticulata F.		15
Meloë turcica R.		18	Loborhynchus geniculat. Germ.		6	— monilis		42	Leptura 4 maculata		4
Necydalis collaris Pz.		9	— mollicomus Ahr.		3	— testaceus		4	— flavimana W.		18
Necyterus umbellatarum		8	— setosus		6	Latrinus glabratus Wld.		24	— 9maculata L.		3
Anthrribus ephippium Dj.		15	Polydrusus pictus Parr.		15	— nov. Genus.		24	— tomentosa		6
— albirostris		15	— phaleratus Dhl.		9	Phylethus populi verus		24	— nigripes Pk.		10
Bruchus marginellus		9	— spartii Kn.		1	Prionus scabricornis		48	— cincta		8
— granarius		1	Tanymecus squameus Cr.		1	Hamaticherus heros		15	— rufipes		9
— pisi		1	Peritelus bisignatus Dhl.		6	Cerambyx ambrosiacus		30	— pubescens		9
— flavimanus Mg.		6	Thylacites fritillum		6	Lamia nebulosa		12	Lema 5punctata		9
— cisti		6	Psallidium vestitum Wld.		20	Callichroma alpinum		24	Haltica malvae Ill.		6
Cleopus labilis Hbst.		8	Cleonis albida		9	Dorcadion cruciatum		24	— nitidula		6
Sibinia lineata St.		6	— declivis		8	— molitor		9	Chrysomela rotundata Dj.		15
— albolineata Pz.		9	— costatus Mg.		9	— striatum Schh.		21	— analis		9
— Jungermaniae Rch.		12	Lixus cylindricus		15	— lineatum		15	— alternans		10
Falciger sellatus		8	— niveus Par.		21	— tauricum F.		20	— lapponica		14
— atomarius St.		8	Rhinodes aterrimus		9	— Sturmi F.		30	— Megerlei		10
— posthumus Ill.		8	Baris punctato-striata Par.		12	Saperda flavimana Cr.		15	Colaspis ulema Mg.		10
— paroculus —		9	— timida		9	— violacea		15	Clythra chloris Dhl.		9
— quercicola Schh.		8	— Wolfii W.		18	— virescens		9	— longimana		4
— sulcicollis Pk.		12	Cossonus pallidipennis Parr.		15	— scutellata		19	— ilicis Par.		10
— topiarius Ros.		8	Rhyncolus chloropus Gyl.		8	— Seidlzii		21	— longipes		4
— suturalis		8	Hylurgus angustatus Hbst.		6	— humeralis Klg.		24	— binotata K.		15
— analis Pz.		6	— melanoceph. Jan.		15	Certallum ruficollie		39	— limbata Men.		18
Campylirh. velaris Schh.		6	— minimus F.		15	Callidium humerale Dj.		12	— valerianae Fr.		20
— tuberculatus		6	Hylesinus fraxini		2	— strepens		48	— atraphaxidis		20
Cryptorhynchus hypocrita Cr.		15	— crenatus		15	— rufipes		18	Cryptocephalus punctifrons St.		3
— picirostris Ulr.		9	Psoa viennensis		27	Clytus gazella		6	— variabilis		4
Dorytomus obliteratus Hbst.		9	Latridius elongatus Schpl.		6	— mysticus		8	— flavescens		6
Anthonomus clavatus Zgl.		9	— rufus Wld.		9	— floralis		20	— connexus		9
Tanysphyrus lemnac		6	Synchita juglandis		18	— trifasciatus		15	Tritoma piliferum Gl.		18
Pissodes notatus		3	Rhizophagus bipustulatus		2	— semipunctatus		24	Clypeaster lividus Dj.		10
Hypera meles		6	Nemozoma fasciatum		30	Molorchus abbreviatus		18	Coccinella aut		10

*Coccinella meridionalis* Dj. 6 kr.  
 — pustulata St. 4  
 — plagiata W. 6  
 — salina St. 9  
*Scymnus dorsalis* W. 11  
*Lycoperdina succincta* L. 12  
 — binotata Dhl. 12  
*Euplectus brevicornis* Rchb. 9  
*Bryaxis juncorum* Lch. 9  
 — impressus R. 8  
*Arhopagus laevis* Ulr. 10  
*Psalophus dresdensis* Rchb. 8  
*Claviger foveolatus* Ml. 15

Outre les coléoptères on dé-  
 bitera aussi des collections en-  
 tières aux prix les plus justes,  
 je suis toujours à même de li-  
 vrer des collections de diptères  
 arrangés sy stématisquement  
 de 400 à 800 espèces (à 6 kr.).  
 Je puis lde même donner en  
 tout temps des collections de  
 lépidoptères, de minéraux, d'oi-  
 seaux, d'herbes; etc.

### Bügelbälge.

*Alanda calandra* 1 fl. 30 kr.  
*Anas querquedula* 1 fl. 10 kr.  
 — clypeata 1 fl.  
*Ardea minuta* 1 fl. 30 kr.  
 — rallioides 3 fl. 30 kr.  
 — nycticorax 3  
 — purpurea 3 fl. 30 kr.  
*Bombicilla garrula* 1 fl.  
*Ciconia nigra* 5 fl. 30 kr.  
*Cinclus aquaticus* 48  
*Corvus nasicifraga* 1 fl. 30  
*Cucul. canorus* var. moldavicus  
 1 fl. 12  
*Colymbus arcticus* 3 fl.  
*Emberiza citrinella* 24  
 — miliaria 48  
*Fringilla montifringilla* 1 fl.  
 — phalerata 3 fl.  
*Falco lagopus* 3 fl.  
 — pygargus 3 fl.  
 — palumbarius 2 fl.  
 — tinunculoides 6 fl.  
 — nisus 1 fl. 10  
 — subbuteo 1 fl. 30  
 — cinereus 3 fl.  
*Glareola torquata* 3 fl.  
*Lanius meridionalis* 1 fl. 30  
 — collurio 48  
*Merops apiaster* 1 fl. 12  
*Pelecanus onocrotalus* 11 fl.  
*Picus viridis* 36  
*Rallus porzana* 4 fl. 10  
*Saxicola rubicola* 30  
 — oenanthe 24  
 — rubetra 1 fl. 30  
*Sitta caesia* 1 fl.  
*Strix brachyotus* 1 fl. 20  
*Vultur fulvus* 8  
*Arctomys citillus* 3  
*Merula rosea* 3

HYMENOPTERA GERMAN.  
 Anm. Art für Art kostet 6 kr.,  
 wenn alle genommen werden,  
 einzelne 10 kr.

*Allantus.*  
*servus* F.  
 ephippium —  
 ovatus —  
 morio —  
*Alyson.*  
 maculatus —  
*Ammophila.*  
 sabulosa —  
 campestris Lat.  
 arenaria F.  
 holosericea —  
*Andrena.*  
 elongata Jmh.  
 rosae Kb.  
 fulvicrus —  
 nitida —  
 pilipes —  
 Gwynana —  
 nana —  
 parvula —  
 cineraria F.  
*Anthidium.*  
 manicatum F.  
*Banchus.*  
 falcator —  
 pictus —  
*Bassus.*  
 laetatorius —  
*Campoplex.*  
 majalis Gr.  
*Cephus.*  
 satyrus Pz.  
 pygmaeus F.  
 tabidus —  
 hortorum Kg.  
*Cerceris.*  
 ornatus Pz.  
 arenarius —  
 laetus F.  
*Ceropales.*  
 maculata —  
*Chalcis.*  
 minuta —  
*Cimber.*  
 sericea —  
*Coelioxys.*  
 conica —  
*Colletes.*  
 fodiens Kb.  
*Crabro.*  
 4 cinctus F.  
 lapidarius —  
 vexillatus Pz.  
 vagus F.  
 subterraneus —  
 leucostoma —  
*Cryptus.*  
 viduatorius —  
 assertorius —  
 perspicillator Gr.  
 titillator F.  
 peregrinator —  
*Cgnips.*  
 rosae —  
*Dichroa.*  
 Geoffroyella gibba Kb.  
*Doterus.*  
 eglanteriae F.  
 niger —

gonager F.  
*Emphytes.*  
 cinctus F.  
*Ephialtes.*  
 carbonarius Chsn.  
*Eucera.*  
 longicornis F.  
*Exetastes.*  
 fornicator —  
 guttator Gr.  
*Glypta.*  
 mensurator F.  
*Gorytes.*  
 scinctus —  
 mystaceus —  
*Hemiteles.*  
 bicolorius Gr.  
*Hylaeus.*  
 xanthopus Kbg.  
 subauratus Ros.  
*Hylotoma.*  
 enodis F.  
 berberidis Schk.  
 coerulea Kg.  
 ustulata F.  
 rosarum Kb.  
*Ichneumon.*  
 vaginatorius F.  
 infractorius Gr.  
 fasciatorius F.  
 luctatorius —  
 palliatorius Gr.  
 sputator F.  
 saturatorius —  
 castigator —  
 extensorius —  
 cingulatus Gr.  
*Leucospis.*  
 dorsigera F.  
*Lissonota.*  
 impressor Gr.  
 verberans —  
 bellator —  
*Lyrops.*  
 tricolor F.  
*Megachile.*  
 muraria —  
 centuncularis —  
*Megilla.*  
 furcata Kb.  
 Wowerthana —  
*Melecta.*  
 notata Ill.  
 armata Pz.  
*Mellinus.*  
 fulvicornis F.  
*Mutilla.*  
 sellata Pz.  
*Myrmosa.*  
 atra Lat.  
*Nomoda.*  
 furva F.  
 ruficornis —  
 flava F.  
 Goodeniana Kb.  
 varia —  
*Nyssos.*  
 spinosus.  
*Ophion.*  
 luteus F.

*ventricosus* F.  
*Osmia.*  
 bicornis —  
 fronticornis Ros.  
 auriolenta F.  
 fulviventris —  
 aenea Latr.  
 adunca Latr.  
*Paniscus.*  
 testaceus F.  
*Pemphedon.*  
 unicolor Latr.  
*Pezomachus.*  
 agilis Gr.  
*Philanthus.*  
 apivorus Latr.  
*Pimpla.*  
 examinatus F.  
 investigator Pz.  
 flavicans T.  
*Pompilus.*  
 fuscus F.  
 viaticus —  
 exaltatus —  
 punctatus Jur.  
 niger F.  
 bipunctatus —  
*Prosopis.*  
 signata Lep.  
*Psen.*  
 atra F.  
*Sapyza.*  
 5 punctata.  
*Schizocera.*  
 furcata Dev.  
 angelicae Pz.  
*Scolia.*  
 4 punctata F.  
*Sphe.*  
 flavipes F.  
*Stelis.*  
 aterrima P.  
*Stigmus.*  
 minutus Latr.  
*Tenthredo.*  
 blanda F.  
 neglecta Kg.  
 haematopa Pz.  
 punctum F.  
 vespoides Lep.  
 livida Kg.  
 fagi Pz.  
 albicornis F.  
 luteicornis —  
 bicincta —  
 scalaris Kg.  
 nassata F.  
 scutellata —  
 dimidiata —  
 atra —  
*Thyreus.*  
 histrionicus —  
*Tiphia.*  
 femorata —  
*Tryphon.*  
 rutillator —  
*Trypoxylon.*  
 figulus —

F I N I S .

Lingegangen:


- S. 625 Zeller, Bestimmung von Reaumur's Schmetterlingen.  
 — 628 Band I.  
 — 665 Band II.  
 — 702 Band III.  
 — 724 Nachlese.  
 — 729 Lateinisches Register.  
 — 731 Register nach der Reihe der Abbildungen.  
 — 736 Preisaufgabe auf Reaumur's Kerfe.  
 — 737 Freyer, Bestimmung von Reaumur's Schmetterlingen.  
 — 746 Band II.  
 — 753 Bücher von A. Schreiber, Chezy, Wolfram, S. Schreiber, Gombé, Röggerath, Lenz, dem böhmischen Museo, der Berliner, Züricher und Basler Gesellschaft.  
 — 759 Denkschriften der Petersburger Academie VI. 4. 1836.  
 — 760 Denkschriften der Petersburger Academie von verschiedenen Gelehrten III. 1837.  
 — — Rathke, Fauna der Krim.  
 — 771 Gebler, Thiere des katusischen Gebirgs im Altai: Steinbock, Reh, Bisamthier, Steinhase, Fiesel, Bobak, Irbis, Alpenwolf, Sobel, Bär usw.  
 — 778 Siebold's Fauna japonica, Fische. Salamandra maxima.  
 — 781 Bronn's Verfeinerungen.

U m f a ß.

Dr. Jos. Walz's Insecten-Verzeichniß. Schluß.

Bücher.

- Lenz, gemeinnützige Naturgeschichte. Gotha bey Becker IV. 38. 8. 710. 10 Tafeln. Pflanzenreich (1 Thl. 20 gr.).  
 Gr. von Berghold und Pix, öconomisch technische Flora Böhmens. Prag bey Kronberger II. 1. 38. 8. 299.  
 F. Jander, Naturgeschichte der Vögel Mecklenburgs. Wismar bey Schmidt. 1837. 8. I. II. 160.  
 Zetterstedt, Insecta lapponica. Lips. apud L. Voss. Fasc. IV. 1838. 4. 577 — 768. (Diptera).  
 Fischer von Röslerstamm, Abbild. zur Microlepidopterologie. Leipz. bey Hinrichs X. 1838. 4. 121 — 132. 2. 46 — 50. ill. (1 Thl. 12 gr.).  
 F. E. Anton, Verzeichniß der Conchylien seiner Sammlung. Halle bey Anton. 1839. 4. 110 (1 Thl. 18 gr.).  
 Verhandl. der Gesellschaft des Vaterland. Museums in Böhmen. Prag. 1838. 8. 71. 6 Taf.  
 Fr. Gertürner, Belehrungen für das gelehrte und gebildete Publicum über die Heilkunde und die Naturwissenschaft. Göttingen bey Vandenhoeck. 1838. 8. 56.  
 Agassiz, Recherches sur les poissons fossiles. Neuchatel. 1838. 4. XI. 73 — 140. 20 Pl. in Fol.  
 Lord Byron's sämmtl. Werke. Stuttgart bey Hoffmann. 1839. 1. Lyrische Gedichte von Ortlepp 284.  
 Dr. Zucker, Bessarabien. Bemerkungen und Gedanken bey einem mehrjährigen Aufenthalt. Frankfurt bey Wilmann. 1834. 8. 86.  
 Wydler, Formation de l'Ovule et de l'Embryon des Scrophulaires. 1838. 8. 15. 1 tab. (Bibliothèque universelle).  
 A. Mayer, die Elementar-Organisation des Seelenorgans. Bonn bey Weber. 1839. 4. 78.  
 Prinz Max von Wied, Reise durch Nordamerica. Coblenz bey Hölcher. 1838. 4. 3. III. und IV. Bogen 13 — 33. 4 T. kl. Fol., 4 T. groß Fol.  
 E. Müller, neue Säugethiere aus Borneo. Leyden. 1838. 8. 17; und Beobachtungen über die indischen Crocodille. 27. 1 T. (Besondere Abdrücke).  
 Rapp, die Cetaceen, zoologisch und anatom. dargestellt. Stuttgart bey Gotta. 1837. 8. 182. 7 Tafeln.  
 Herold, Untersuchungen über die Bildungsgeschichte der wirbellosen Thiere im Gn. Frankfurt bey Sauerländer. 1838. II. Fol. 6 Doppeltafeln ill. (auch lateinisch).



1838.

H e f t IX. und X.

## K r i t i s c h e B e s t i m m u n g

der in Reaumur's Mémoires pour servir à l'histoire des insectes vorkommenden Lepidopteren

von P. C. Beller,

Oberlehrer an der evangel. Bürgerschule in Groß-Siegan. \*

Reaumur's Absicht bey der Verfertigung seiner Abhandlungen ist nicht gewesen, eine Menge Arten zu beschreiben und abzubilden. Er sagt dieß nicht nur bey mehreren Gelegenheiten selbst, sondern er erklärt sich auch tadelnd gegen diejenigen, denen darum zu thun ist, recht viele Arten aus ihren Larven zu erziehen. Seine Memoiren haben eine ganz andere Bestimmung. Sie sollen das wahre Wunderbare der Insectenwelt kennen lehren und zur weiteren Verfolgung desselben aufmuntern. Von dem Verfahren, nach welchem er seinen Gegenstand behandelt, hebe ich nur die Seite hervor, die meine gegenwärtige Abhandlung hauptsächlich angeht. Wo Reaumur irgend kann, drückt er seine Beobachtungen allgemein aus, weßhalb ihm die aus vielen Fällen abstrahirten Beobachtungen eine besondere Freude machen. Das Specielle dient ihm nur zur bessern Verfasslichkeit des Generellen, und wo er mit einem Beyspiele auszureichen glaubt, da übergeht er die übrigen ihm bekannten Beyspiele entweder ganz, oder erwähnt sie kaum mit wenigen Worten. Er wählt aber am liebsten diejenigen Beyspiele, die jederman mit leichter Mühe auffinden kann, oder die nicht eine einzelne Merkwürdigkeit aufzuzeigen haben. Bey ihnen verweilt er gern, und daher haben wir im Allgemeinen von diesen die ausführlichsten Beschreibungen. Seine Eigenthümlichkeit, das Allgemeine auf Kosten des Besondern hervorzuheben, zeigt sich auch darinn, daß er die Färbung der Thiere nachlässig, fast mit Widerwillen beschreibt, mit ihrem Baue aber sich mit sichtbarem Wohlgefallen beschäftigt. Bey den Schmetter-

lingen, möchte ich sagen, hat die Natur die Farbe zur Bezeichnung der Species, den Bau und die Gestalt der Gliedmaßen zur Bezeichnung der Gattung gegeben. So zeigt R. unwillkürlich seinen Beruf und Trieb zum Ordnen des Manichfaltigen, zum Systematisiren; dagegen möchte man ihn zu einem Faunisten, dem Aufzähler und Beschreiber des Speciellen, weniger geeignet halten.

Aus dem Gesagten wird sich die Frage beantworten lassen, ob es möglich ist, die bey ihm vorkommenden Schmetterlingspecies alle genau zu bestimmen. Da er die Species nur in Bezug auf das Genus achtete und beschrieb, so werden solche Arten am besten zu ermitteln seyn, die er nur als einzelne Belege kannte. Wo er mehrere Beyspiele wußte und anführte, ist dieses weit schwerer, weil ihm zu wenig daran lag, die Arten von den Arten zu unterscheiden, und er mithin die Farbenunterschiede nicht sorgfältig genug angab. Auch solche Arten haben bey ihm ihre bedeutende Schwierigkeit, die er aus einer großen Menge von Beyspielen zur Erläuterung einer höheren Gattung (Ordnung oder Familie) herausnahm, und die weiter nichts Merkwürdiges an sich haben, als gerade das Eine, weßwegen sie an der Stelle erwähnt wurden. Um sie zu erkennen, muß man oft zu den Abbildungen seine Zuflucht nehmen. Leider thun diese nur geringe Dienste, und entfernen bisweilen von der Wahrheit, statt ihr näher zu führen. Man kann daher wohl mit Recht annehmen, daß, wenn auch nicht viele, doch einige Arten unbestimmbar bleiben werden.

\* Die Bestimmung ist nach der Ausgabe im Octav. Es ist die Beantwortung der von der Isis gestellten Aufgabe, welche wegen der genauen, vollständigen und beurtheilenden Bearbeitung den ersten Preis erhalten hat. D. 318 1838. Heft 9.

Die bestimmbarren Arten wird ein Einzelner gewiß nicht alle auf einmal bestimmen können, wenn er auch mit allen in unserer Zeit existirenden Hilfsmitteln, mit den besten lepidopterologischen Sammlungen und den vollständigen Bibliotheken ausgerüstet seyn sollte. Die lepidopterologischen Sammlungen sind in den Microlepidopteren, die R. verhältnißmäßig am zahlreichsten beschrieben, von denen er in Mehrzahl Arten aufzählte, welche nur schwache Verschiedenheiten zeigten, gerade am ärmsten und unvollkommensten. Natürlich läßt sich daher auch in Büchern wenig Rath darüber holen. Es hat, soviel ich weiß, bis jetzt nur wenig Männer gegeben, die in R. Fußtapfen getreten sind, denen mehr daran gelegen war, das Wesen eines einzelnen Insects als recht viele Species bekannt zu machen. Unbedingt sind als solche Degeer und der vortreffliche, noch zu wenig als Muster anerkannte Knoch zu nennen; mit wenigerem Rechte macht der, wenn auch vorurtheilsfrei, doch zu wenig wissenschaftlich gebildete Rösel auf dieses Lob Anspruch. Von den übrigen lepidopterologischen Schriftstellern mit wenigen Ausnahmen findet man nicht viel wahre Lepidopterologie; ihre Hauptabsicht ist Schilderung der Art, ihr Verfahren zur Erreichung dieses Zweckes Beschreibung der Färbung und Zeichnung. Was an der Art generisch ist, die Merkmale der Gattung, die Anatomie, die Lebensweise des Thiers in seinen verschiedenen Stadien, das fehlt alles bey ihnen, und folglich sind ihre Arten bey aller Sorgfalt der Beschreibung nicht sicher gestellt. Bey ihrer Unvollkommenheit können sie also keine sonderliche Hilfsquelle in Bezug auf R's. Arten abgeben, und wir sind darauf angewiesen, R's. Beobachtungen in der Natur Schritt für Schritt und wo möglich an Ort und Stelle zu folgen, um zu wissen, was er vor sich hatte, ein Verfahren, das eine Reihe von Jahren erfordert. Dadurch erst wird eine Anzahl Fragezeichen wegfallen, eine Anzahl Lücken in den Artnamen ausgefüllt werden. Bey andern Arten aber wird sich erweisen, daß sie seit R's. Zeiten nicht wieder beobachtet worden sind, und daß mancher, jetzt neu zu schaffende Name schon über Hundert Jahre alt seyn könnte, wenn R. den Einfall hätte haben können, dergleichen zu bilden. Wer hat z. B. die in den Datteln lebende Motte oder die an den eßbaren Kastanien öfters Mißwachs verursachende Phaläne nach ihm besprochen?

Der Plan meiner Arbeit ist folgender. Indem ich genau dem Gange des Buches folge, verweise ich bey jeder neuen Art, die mir begegnet, suche und begründe ihren Namen. Man wird also die Seitenzahlen, nicht aber die Kupfertafeln der Reihe nach verfolgen können. Ich habe aber diejenigen Arten im ersten Theile wegzulassen für zweckmäßig erachtet, die im zweiten oder dritten Theile vollständiger behandelt vorkommen, um sie an den passenden Stellen vorzunehmen, z. B. *Acherontia atropos*, *Liparis chrysorrhoea*. Wenn ich dennoch etliche Arten im ersten Theile vornahm, so wird sich bey einiger Betrachtung ein genügender Grund erkennen lassen, z. B. *Pontia crataegi*. Ferner bleiben auch die Arten, die nur in den Abbildungen und den Erklärungen derselben vorkommen, einstweilen weg; sie werden ganz zuletzt vorgenommen werden, z. B. *Smerinthus Thiae*. Dasselbe widerfährt auch solchen Arten, von deren Naturgeschichte im Texte nichts zu lesen ist, und den vergrößerten Körpertheilen, die ich keiner Art mit Bestimmtheit zuweisen kann.

Eine zu große Weitläufigkeit in meinen Untersuchungen glaube ich mir nicht vorwerfen zu dürfen; ich habe mich be-

müht, die rechte Mitte zu treffen. Diese schien mir auch darin zu bestehen, daß ich, wenn eine Art ohne Weiteres aus der Abbildung oder aus einem Namen erkennbar war, mich bloß auf die Abbildung, z. B. von *Saturnia Pyri*, oder auf jenen Namen beschränke, z. B. *Acherontia atropos*, *papillon à tête de mort*. Ueber die Bilder, die ich aus früheren oder späteren Stellen zu der Hauptstelle zog, sagte ich weiter nichts, wenn auf der dabey angeführten Seite des Werkes unverkennbar ist, daß sie dahin gehören.

Die Arten, die bey Linne, Fabricius und Latreille vorkommen, sind mit einem Sternchen bezeichnet; die bey Esper, Borkhausen, Knoch, Geoffroy, Degeer u. mit einem Kreuze; die erst von mir bestimmten haben kein Zeichen.

1) \* *Thyatira Batis*.

Reaum. I. 1. p. 249 et 315 t. 7. f. 1. 2.

Linn. Phal. — Syst. Nat. edit. XII. 1767. I. 2. p. 836. Treitschke *Thyatira* — Schm. v. Europa 5, 2. p. 162.

Die mit Brombeerbllättern ernährte Raupe ist nach R. „braun in verschiedenen Nuancen, und hat vom 6ten bis zum 10ten Ringe pyramidale Höcker auf dem Rücken und einen gespaltenen auf dem Kopfe.“ Damit vereinigt sich die Röselsche Abbildung (IV. t. 26.) aufs Beste. Der nach R. im May erscheinende Schmetterling hat „braune Vorderflügel mit 5 schön rosenfarbenen Flecken.“ Diese Angabe ist der Natur getreu; der Linneische Schmetterling ist, wenn er auch 5 weißliche Flecken mit brauner Mitte — wie bey Rösel — hatte, dieselbe Art.

2) \* *Vanessa Atalanta*.

R. I. 1. p. 341 et 358 t. 10. f. 8 — 13.

p. 133 t. 2. f. 4. 5.

I. 2. p. 108.

II. 1. p. 143. t. 3. f. 3.

p. 314 t. 16. f. 6.

Linn. Papilio — 779. Ochsenheimer *Vanessa* — Schm. v. Europa 1, 1. p. 104. Geoffroy *Mémoires* 2. p. 40. le Vulcain.

Die Abbildung in der Hauptstelle allein, die schon Linne citirt, macht die Art so kenntlich, daß ein weiterer Beweis für die Richtigkeit der Bestimmung überflüssig ist.

3) \* *Hipparchia Janira*.

R. I. 1. p. 344 et 358 t. 11. f. 1. 2.

Linn. Papilio *Jurtina* (Janira ♀) 774. Ochsenh. *Hipp. Janira* 1, 1. p. 218. Geoffroy 2, p. 49. Corydon.

Der nur in sitzender Stellung abgebildete Schmetterling wird von Linne richtig citirt. Außerdem daß die Abbildung kenntlich ist, stimmt auch die Beschreibung: die Unterseite seiner Hinterflügel ist grau, mit verschiedenen gelblichen Mischungen. Die Unterseite der Vorderflügel hat ein ziemlich schlechtes Gelblich; das Auffallendste an denselben ist ein schwärzlicher Augenfleck mit weißer Pupille. Die Oberseite der vier Flügel hat eine der Unterseite ähnliche Färbung. Diese letzten Worte lassen zugleich erkennen, daß R. das Weibchen vor sich hatte.

Denn an dem Männchen hätte er eine Ähnlichkeit der Ober- und Unterseite nicht finden können.

Was wir von Schmetterlingen, die kleiner als Janira seyn sollen, auf derselben Seite weiter lesen, ist so unbestimmt gefaßt, daß man sich auf keine Untersuchung einlassen kann.

4) \* *Papilio podalirius*.

R. I. 1. p. 345 et 359 t. 11. f. 3 — 5.

Linn. — 751. Ochsenh. — 1, 2. p. 11. Geoffr. 2, p. 56. Le flamé.

Linne's Diagnose findet auf die Abbildung und Beschreibung bey R. die vollkommenste Anwendung. Die langen Schwänze und die schwarzen Bänder der Flügel sind genügende Merkmale für den nach R. um Paris im July ziemlich häufigen Schmetterling.

5) \* *Hesperia malvarum*.

R. I. 1. p. 346 et 359. t. 11. f. 6 — 12.

Linn. *Papilio malvae* 795. Ochsenh. 1, 2. p. 195. Rösel I. Diurn. 2. t. 10. (excl. f. 7.)

Daß Linne's *Papilio malvae* ein Inbegriff der *Hesperia malvarum* und der ungezähnten, weißfleckigen, in nördlichen Gegenden vorkommenden Arten ist, geht aus der Vergleichung seiner Beschreibung und Diagnose hervor. Erstere paßt auf den bestimmt in Schweden lebenden *Alveolus* — Degeers *Papilio malvae* II. 1. p. 133, noch kleiner als *Pap. comma*, benähe schwarz, ist *Alveolus* —, letztere nebst der Angabe des Futteres auf *Hesp. malvarum*. Die Worte der Diagnose *Alis denticulatis* wären zur Beseitigung aller Zweifel hinreichend, da in Schweden sicher keine andere Art mit gezähnelten Hinterflügeln vorkommt, wenn die Beschreibung mit ihrem *Margine quasi dentato interjacentibus maculis albis* nicht hindernd dazwischen träte. Rösel's Fig. 5. mag Linne'n zur Verfassung der Diagnose gebient haben, während er nach *Alveolus* in seiner Sammlung beschrieb. — Zu der Rösel'schen Art gehört schon nach Linne's Etat, was Ochsenheimer zu erwähnen vergessen hat, R's. Schmetterling, dessen Abbildung jedoch der Zähne nach den Hinterflügeln ermangelt. Dafür kommt aber seine Raupe- und Schmetterlingsbeschreibung aufs Schönste mit Rösel's Abbildungen überein. Die Raupe ist nämlich: „überall von einem wahren Mäufegrau, außer ganz nahe bey'm Kopfe, wo sie auf dem ersten Ringe drey schön gelbe Flecken hat, die ein niedliches Halsband abgeben.“ Ebenso richtig ist der Aufenthalt und die Lebensweise der Raupe angegeben. „Der Schmetterling hat auf der Oberseite der vier Flügel eine Achatfarbe, worauf sich wolke, schwarze, braune und graue und auch fast weiße Flecken finden.“

Von Geoffroy's *Plein-chant* II. S. 67, bey dem R's. Stelle angezogen wird, läßt sich soviel sagen, daß er *Hesp. malvarum* nicht ist.

6) \* *Macroglossa stellatarum*.

R. I. 1. p. 275 et 320. t. 8. f. 7. 8.

p. 351 et 360. t. 12. f. 1 — 8.

1. 2. p. 45 t. 21. f. 9.

Linn. *Sphinx* — 803. Ochsenh. *Macrogl.* — 2. p. 193. Geoffr. 2. p. 83. *Le moro-sphinx*.

Abbildungen und Beschreibungen sind kenntlich und genau; auf den ersten ist nur der Mittelraum der Vorderflügel etwas zu hell gelassen. In der Beschreibung heißen sie: „rußfarbig mit schwarzen Wellen und Flecken;“ den Hinterflügeln gibt R. eine *couleur de tabac*, welche Linne durch *ferrugineus* ausdrückt. Die Härte des Hinterleibes, die in der Linne'schen Diagnose vorkommen, finden wir auch bey R. erwähnt, wo sie zu den Merkmalen der sechsten Schmetterlingsclasse des Reaumur'schen Systemes gehören.

7) *Macroglossa bombyliiformis*.

R. I. 1. p. 352 et 361. t. 12. f. 9 — 12.

Ochsenh. — 2, 189. Treitschke 10, 1. p. 125. Geoffroy 2, pag. 92. *Le sphinx vert à ailes transparentes*.

Der in unsern Gegenden einheimische *Fuciformis* mit schmalem, beschupptem Rande der Flügel kann R's. Art nicht seyn, da diese (Fig. 10.) breite Ränder hat. Es bleibt nur zu entscheiden, ob sie *Bombyliiformis* oder *Milesiformis* ist. Die Farbe der Binden des Hinterleibes beschreibt R. nicht; auch sehen wir auf der Abbildung keine. Dagegen sagt er: „der Hinterrand des Flügels hat eine schöne braune Farbe, die zwischen dem Zimmet- und Kastanienbraun die Mitte hält.“ Dieses ist also das Rothbraun der Ochsenheimer'schen Beschreibung und nicht das „entschiedene Kaffeebraun“ Treitschke's. Ferner heißt es: „der größte Theil der Oberseite des Körpers ist mit gelblich olivenfarbenen Haaren (poils d'une olive un peu jaune) bedeckt.“ Auch hiemit wird nur *Bombyliiformis* bezeichnet, da *Milesiformis* „gelb, fast ohne grüne Beymischung“ ist. Freylich sagt R. von der Unterseite des Leibes: „ihre Haare sind gelblicher als die der Oberseite, fast citrongelb.“ Doch möchte dieser Umstand die Richtigkeit meiner Bestimmung nicht umstoßen.

8) \* *Zygaena filipendulae*.

R. I. 1. p. 275 et 320. t. 8. f. 9. 10.

p. 354 et 361. t. 12. f. 13 — 16.

I. 2. p. 285.

II. 1. p. 94 et 141. t. 2. f. f. 1. 3.

Linn. *Sphinx* — 305. Ochsenh. *Zygaena* — 2. p. 51. Geoffroy 2. p. 88. *Le Sphinx béliér*.

Da R. an der ersten Stelle von 4—5 rothen Flecken, nicht etwa in Bezug auf seine siebente Classe, sondern auf eine einzige Art, *ce papillon*, spricht (er sieht nemlich die zwey an der Wurzel für einen an), so faßt er offenbar mehrere Arten zusammen. In Taf. 12. Fig. 15. sehen wir gegen den Hinterrand der Vorderflügel zwey Flecken, und da der Schmetterling auf den Wiesen gemein ist, so kann er nichts anderes seyn als *Zyg. filipendulae*, wofür ihn schon Linne erklärt. Die Beschreibung der Raupe in beyden Theilen der Memoiren spricht auch dafür, A. B. I. 1. S. 355: „kahl, bläsgelb mit mehrern Reihen schwarzer Flecken längs des Körpers.“

Ob aber Fig. 17. auf der 12ten Tafel dahin gehört, das ist eine andere Frage. Aus der Beschreibung läßt sich

nichts entnehmen, als daß R. sie für das Männchen hält. Aber auf der Abbildung finden wir einen hellen Gürtel des Hinterleibs und ganz deutlich nur einen Fleck gegen den Hinterrand der Vorderflügel. Zyg. *peucedani* hat einen oder zwei Flecken an dieser Stelle, und ich bin daher geneigt, Fig. 17. für diese Art anzusehen, wovon ich jedoch Linne's, Geoffroy's, Degeres, Fabricius und Wockhausens Auctorität gegen mich hätte. Sie nehmen Fig. 15. 16. 17. zusammen zu Zyg. *fulpendulae*.

9) \* *Deilephila euphorbiae*.

R. I. 1. p. 267 et 421. t. 13. f. 1—7.

p. 260 et 319. t. 8. f. 1. 3.?

I. 2. p. 48. t. 22. f. 7.

p. 89. t. 24. f. 9—12.

Linn. *Sphinx* — 802. Ochsenh. *Deileph.* — 2. p. 223. Geoffr. 2. pag. 87. *Le Sphinx du titimale*.

Die Abbildungen stellen den gemeinen Wolfsmilchschwärmer unverkennbar dar. Nach R. Angabe ist das, was an den Hinterflügeln in der Abbildung dunkel gelassen ist, nemlich die Basis und die Binde schwarz, das Uebrige ein wolfiges Roth. Als *Sphinx euphorbiae* zieht schon Linne Fig. 4—7. an. Die Raupe nennt R. vorzugsweise *La belle chenille du titimale*.

Hinsichtlich der Bestimmung von Taf. 8. Fig. 1. 3. wäre zu wünschen, er hätte dem Schmetterling die Flügel nicht abgeschnitten. So können wir nur mit einiger Wahrscheinlichkeit vermuthen, daß hier *Deil. euphorbiae* gemeint sey. Dafür spricht die Gestalt der Fühler und die Größe des Thieres, in welcher er weiter keine *Sphinx* vorgestellt hat. Allein diese zottige, struppige Behaarung des Thorax und dieser Zeichnung des Hinterleibs vermiffen wir bei *Sph. euphorbiae* völlig. Sollte der Hinterleib abgewischt seyn, um die Gelenke besser sehen zu lassen? Und welche Art könnte es sonst seyn?

10) \* *Sphinx convoluti*.

R. I. 1. p. 371 et 421. t. 13. f. 8. 9.

p. 325. t. 9. f. 9. 10.

Linn. — 798. Ochsenh. 2. p. 236. Geoffr. 2. p. 86. *Le sphinx à cornes de boeuf*.

Die aschgrauen Vorderflügel, der Hinterleib, der oben eine Strieme hat und zu jeder Seite mit schwarzen, weißen und rothen Querstreifen (*blanche, rouge nué und noire*) besetzt seyn soll, und die erstaunlich lange Zunge beweisen die Richtigkeit des Linne'schen Citates.

Zugleich geht aber auch daraus hervor, daß Linne einen Schreib- oder was sonst für einen Fehler begangen hat, da er dieselbe Figur zu *Sph. pinastri* zieht. *Sph. pinastri* hat nemlich *un rouge nué oder jaunâtre, oder couleur de rose*.

Es ist aber merkwürdig, wie dieses Versehen sich durch alle Fabricischen Werke hindurch fortgepflanzt hat, und zugleich ein Beispiel, wie wenig den Fabricischen Citaten zu trauen ist.

11) \* *Sphinx ligustri*.

R. I. 1. p. 372. et 422. t. 14. f. 1.

I. 2. p. 10. et 44. t. 21. f. 6. 7.

p. 49. t. 22. f. 11.

p. 393. t. 26. f. 6.

II. 2. p. 3 et 35. [t. 20. f. 1—4.

„Dem Vorigen sehr ähnlich, aber durch die viel kürzere Zunge verschieden. Die Vorderflügel oben fast so grau wie bey jenem; die Oberseite des Leibes hat eine schwarzbraune Strieme (*une raie d'un brun noir*) und jedes Segment einen rosenrothen Querstreifen.“ Die schwarzbraune Strieme findet sich in der Wirklichkeit nicht, sondern dafür eine hellbraune, in der Mitte mit einer schwarzen Längslinie versehen. Zu verwundern ist, daß R. in der ersten Stelle von der Zungenscheide der Puppe nichts sagt, da er doch den Schmetterling aus der Puppe erhielt, und daß er im zweyten Theile, wo er die Naturgeschichte dieses Schwärmers ausführlich gibt, diese Abbildung nicht erwähnt. Dennoch gehört die Figur der 14ten Tafel offenbar der *Sphinx ligustri* an, und die dürftige und oberflächliche Beschreibung im ersten Theile der Memoiren paßt, mit den angeführten Ausnahmen, gleichfalls auf dieselbe. Sie fehlt unter den Citaten Linne's und Fabricius. — Tafel 46. Fig. 6. wird schon auf den ersten Anblick als *Ligusterschmetterling* erkannt.

12) \* *Triphaena pronuba*.

R. I. 1. p. 379 et 422. t. 14. f. 4—10.

I. 2. p. 300 et 327. t. 41. f. 4—14.

Linn. *Phalaena* — 842. Treitschke *Triphaena* — 5, 1. p. 260—266. Geoffr. 2. pag. 146. *La phalène hibou*.

Nach R's. Beschreibung ist die Raupe kahl, sechzehnbeinig mit halben Hakenkränzen an den Sohlen, ziemlich schön grün, nach der letzten Häutung braun und schwarz gemischt, auf jedem Ring mit zwey parallelen, schwarzen Strichen. Bey Rösel (IV. tab. 32.) hat sie eine gelbliche Grundfarbe; allein dieß ist eine Abänderung, wie wir sie oft genug bey dieser Raupe finden. Wie veränderlich sie in der Färbung ist, erfahren wir am allerbesten bey Deger, der sich auch auf R's. Art als auf eben dieselbe, die er hatte, bezieht (I. 3te Abth. S. 85 und II. 1. S. 288). „Die Vorderflügel des Schmetterlings“, sagte er, „wechseln in der Farbe; die Hinterflügel sind gelb mit einer schwarzen Binde nahe am Hinterrande.“ Daß auch Figur 10. der Tafel 14. zu unserer Art gehört, geht aus den Worten S. 380 hervor: „die Oberseite einiger anderer Exemplare ist hellergrau, und nur zwey schwarze Flecken sind darauf deutlich ausgedrückt“, wovon Fig. 10. angezogen wird. Weiter unten auf derselben Seite gibt R. an, daß er auch Schmetterlinge, wie Fig. 10., erhalten habe, die nur ein gelblicheres Grau hatten; ihre Hinterflügel waren gelb (*feuille-morte*) mit dem schwarzen Bande. Darinn stimmt also die Beschreibung dieser Figur mehr mit Linne's Diagnose überein, als die übrigen Raummuthen Figuren, und doch hat Linne nur Fig. 8. und 9. angezogen. Er citirt auch die 41ste Tafel, aber sonderbar nur die Abbildung der Raupe (Fig. 4.). Man darf nur die Erklärung dieser Tafel S. 327 nachlesen, um einzusehen, daß alle Figuren von 4 an zusammen gehören. Esper

hat nur 8 bis 14, aber mit einem Fragezeichen, ohne einen Grund für sein Bedenken anzugeben.

Aus dem Gefagten wird leicht einzusehen seyn, wie sehr Linne und Fabricius irrten, indem sie (S. Nat. 831 — Ent. Syst. 3, 2. S. 64) Fig. 10. zu *Noctua lusoria*, einem Schmetterling mit grauen Hinterflügeln, rechneten.

13) \* *Amphipyra pyramidea*.

R. I. 1. p. 382 et 423. t. 15. f. 1 — 5.

Linn. Phal. — 856. Treitschke *Amphip.* — 5, 1. pag. 285. Geoffr. 2. pag. 157. *L'omicon nebuleux*.

Linne's Definition des Schmetterlings stimmt mit Fig. 4. so genau überein, als ob sie nach ihr verfertigt wäre. Die Raupe (S. 383) zeichnet R. durch die „dem Hintertheile eines Schiffes ähnliche Erhöhung“ als *Pyramidea* genug aus.

14) \* *Phlogophora meticolosa*.

R. I. 1. p. 383 et 423. t. 14. f. 11 — 13.

p. 304 et 323. t. 8. f. 25. 26.

Linn. Phal. — 845. Treitschke *Phlog.* — 5, 1. p. 373. Geoffr. 2. p. 151. *La méticuleuse*.

Das Zusammengehören der an beiden Stellen abgebildeten Schmetterlinge ist offenbar, da diese Art so ausgezeichnet ist, daß sie auch aus den schlechtesten Abbildungen, z. B. aus denen eines Guedart, erkannt werden muß. Sie ändert aber, worüber man bey Treitschke das Nöthige erfährt, in der Färbung bedeutend ab, und daher ist erklärbar, warum sich R. nicht bestimmter, als folgenndermaßen, äußert (S. 383): „die Farben der Dorsseite der Vorderflügel sind denen eines anderen Schmetterlings ziemlich ähnlich, welchen wir früher am Zucker saugend gesehen haben. Sie sind eben so zu Dreysecken geordnet, ausgenommen neben dem Hinterande (la base)“ S. 310 beschreibt er die Art am vollständigsten. Die dreyeckigen dunkeln Felder der Vorderflügel und ihr ausgezogener Hinterand, den die Abbildungen zeigen, sind Merkmale genug zum Erkennen der *Meticulosa*.

15) † *Botys sambucalis*.

R. I. 1. p. 386 et 424. t. 15. f. 7 — 9.

Treitschke — 7, p. 83. Degeer II. 1. p. 326. Nro. 2.

Der von R. vorgestellte Schmetterling gehört, da seine Raupe 16beinig ist, zu den Zünslern, und nicht etwa, was die Abbildung zu glauben verleiten möchte, zu den Spannern. Die Färbung (sanft, grau mit sehr blaß strohgelben Flecken und Punkten) und die Flügelhaltung, wovon ein beträchtlicher Theil der Hinterflügel sichtbar ist, lassen sich nur und gut auf *Sambucalis* anwenden. R. fand die Raupe auf spanischem Flieder (*lilas*), während man sonst nur *Sambucus nigra* und *ebulus* als ihre Nahrungspflanzen kennt. Dieser Umstand kann aber keinen Zweifel an der Richtigkeit meiner Bestimmung geben, da die Raummurphen und Fächerchen Raupen stimmen. Ersterer beschreibt sie nehmlich, „weißlichgrün, sehr durchsichtig, so daß man die Bewegung des großen Gefäßes oder der Art von Herz längs des Rückens deutlich sehen kann.“ von Lischer: ZfS 1838. Heft 9.

„glasartig weißgrün mit einem schmalen, grünen Längsstreifen über den Rücken.

16) † *Geometra (Boarmia)* — ?

R. I. 1. p. 387 et 424. t. 15. f. 10 — 13.

Borkhausen 5. p. 165

Borkhausen widerlegt Deger's Vermuthung (II. 1. S. 331), nach der dieser Spanner *Crepuscularia* seyn könnte. Die stark gekämmten Fühler (les barbes de ses antennes sont grandes par rapport à la grandeur du papillon) können durchaus der *Crepuscularia* nicht angehören. Aus der Abbildung des Schmetterlings und der stielartigen Gestalt der Raupe geht aber hervor, daß er eine *Boarmia* seyn muß. Auf *Cinctaria* paßt wohl die Raupenbeschreibung: „die Farbe benähe zimmetbraun;“ allein der Schmetterling, der mir auch nie im August vorgekommen ist, läßt sich aus der Abbildung so wenig wie aus der Beschreibung der Flügel herausfinden. Letztere lautet kurz genug: „seine Farben sind genau die, welche man in der Abbildung erblickt; Weiß und Schwarz sind mit Kunst auf seinen Flügeln vertheilt; auch hat er eine Junge.“ — Diesen Worten kommt *Consortaria* (Treitschke 6, 1. S. 200) einigermaßen nah; allein *Consortaria* hat eine beträchtlichere Größe, und an den 7 Männchen meiner Sammlung befindet sich auf den Vorder- und Hinterflügeln deutlich ein dunkles, längliches Fleckchen mit weißlichem Kern, wovon die Abbildung nichts zeigt. Ferner liegt dieser Spanner in der Mark Brandenburg, und hier im May und Juny, Rs. Schmetterling am Ende August; endlich stimmen beyde in der Raupe und deren Nahrung (bey R. *Polygonum bistorta*, bey Treitschke auf Bäumen) gar nicht überein. Eine ähnliche Verwandtschaft hat es mit *Rhomboidaria*, *Abietaria* und *Repandaria*.

17) \* *Lithosia jacobaeae*.

R. I. 1. p. 388 et 425. t. 16. f. 1 — 7.

Linn. Phal. — 839. Ochsenh. *Lithosia* — 3, p. 154. Geoffr. 2. p. 146. *La phalène carmin du séneçon*.

Die Farbe der Vorderflügel „schwarz“, etwas ins Graue, mit einem schönen, rothen Bande längs des Vorderandes und zwey rothen Flecken in den Winkeln am Hinterande.“ Die Raupe auf le séneçon und la jacobée sechsbeinig; jeder Ring halb schwarz, halb gelb.“ — Alles dieses kommt allein der *Lithosia jacobaeae* zu.

18) *Liparis auriflua*.

R. I. 1. p. 390 et 425. t. 16. f. 8 — 11.

Ochsenh. 3. p. 205. Rüssel I. noct. 2. t. 21.

Meines Wissens hat noch niemand diese Art aus R. richtig citirt. Die Abbildung der Raupe am Tafel 16 ist ganz unkenntlich, und ihre Beschreibung läßt sich fast so gut auf *Chrysorrhoea* wie auf *Auriflua* anwenden. Es heißt nehmlich: „sie sind an den Seiten sehr haarig; längs des Rückens haben sie einen breiten, kahlen, schön rothen Streifen; an jeder Seite aber einen weiten, welcher uns nöthigt, diese Raupen mit der gemeinen Raupe, la commune, d. h. *Chrysorrhoea*, in dieselbe Gattung zu setzen.“ Daß Raupen eine andere Art als *Chrysorrhoea* vor sich habe, läßt sich schon daraus schließen, 40\*



weil er beyde unterscheidet. Mit Bestimmtheit geht es aber aus folgenden Worten hervor: „der Schmetterling ist erstaunlich bebaart; seine Beine sind bis ans Ende der Füße mit Haaren bedeckt; man kann ihn kaum anfassen, ohne eine ganze Menge Haare, Federn und Schuppen abzureiben.“ Das ist ein Hauptmerkmal von *Auriflua*; die vielen, langen, aufgerichteten Haare längs des Innenrandes der Vorderflügel, wenn der Schmetterling sitzt, und die wir in Fig. 11. gut dargestellt sehen, unterscheiden diesen Schmetterling leicht von *Chrysorrhoea*.

Geoffroy, Linne und Fabricius vereinigen daher dieses Citat unrichtig mit *Chrysorrhoea*. Man vergl. Nr. 88.

19) \* *Botys forficalis*.

R. I. 1. p. 391 et 426. t. 16. f. 12 — 14.

Linn. Phal. — 582. Treitschke *Botys* — 7, p. 122. Geoffr. 2. 166. La bande esquissée??

„Der Vorderrand der Vorderflügel ist beträchtlich länger als der Innenrand; die Oberseite ist gelblich mit holzbraunen Ähren und Wellen, welche mit dem Hinterande beynähe parallel gehen.“ Wer den Schmetterling in der Natur kennt, vermuthet ihn auch, ohne die Beschreibung gelesen zu haben, aus der Abbildung. Die Raupe trägt zur Bestätigung des Citates bey: „Grünlichweiß, etwas durchsichtig, nur mit einigen Haaren und schwarzen kleinen Höckern, sechzehnbeinig, die Beine mit vollständigen Hakenkränzen.“

Die Sicherheit, mit welcher Treitschke Geoffroys Bande esquissée zu *Forficalis* zieht, kann ich nicht gut heißen. Geoffroys Beschreibung, vornehmlich die der Hinterflügel und der ganzen Unterseite, paßt gar nicht hieher, sondern eher zu einer Art wie *Cinctalis* Tr., *Flavalis* Hbn. etc.

20) \* *Episema caeruleocephala*.

R. I. 1. p. 392 et 429. t. 18. f. 1 — 10.

Linn. Phalaena — 826. Treitschke *Episema* — 5, 1. p. 111. Geoffr. 2. p. 122. Le double omega.

Die Raupe, welche man allenfalls aus der Abbildung erkennt, ist nach der Beschreibung schiefergrau mit schwarzen Höckern und 3 gelben Längsstreifen. Der Schmetterling hat „achtfarbene Vorderflügel mit einem großen, gelblichen, unregelmäßigen Fleck.“ — Dieser Fleck ist eben das, was Linne *Stigmata albida coadunata* nennt.

21) \* *Cossus ligniperda*.

R. I. 1. p. 395 et 426. t. 17. f. 1 — 8.

p. 217. t. 4. f. 17.

II. 2. p. 46. . . . t. 21. f. 10. 11.

Ochsenh. — 3. p. 90. Linne *Phalaena cossus* 827. Geoffr. 2. p. 102. Le cossus.

Zur Erkennung der Art genügen schon die Abbildungen. Die Flügel werden in der Beschreibung als weißlichgrau mit verschiednen braungrauen Flecken bezeichnet. Die Flügelhaltung in der Ruhe und die Gestalt der Fühler (die Flügel ein

rundes Dach bildend, die Fühler prismatisch) werden bey *Dachsenheimer* nicht einmal unter den Gattungsmerkmalen angegeben. — Daß die Figur der Tafel 4 hieher gehört, schließe ich aus den Worten: *chenille qui vit dans des troncs d'arbres*. Bey der Tafel 21. erleichtert die Abbildung selbst schon das Erkennen.

22) *Tortrix lechæana*.

R. I. 1. p. 398 et 428. t. 17. f. 9.

Linn. Phal. — 877. Treitschke — 8. p. 106.

Aus der Beschreibung des vollkommenen Insects allein läßt sich nicht mit völliger Sicherheit der Beweis führen, daß *Lechæana* gemeint ist. Der Schmetterling, der zu Ende May erscheint, dient als Muster für die *Papillons larges d'épaules*, deren Flügel flach dachförmig liegen. Beydes stimmt ganz gut; allein seine Flügel halten an der Wurzel die Mitte zwischen Tabaksfarbe und Isabellgelb, sonst aber sind sie braun, ins Dunkelastanienfarbene. *Lechæana* ist an der Wurzel gelb, hinten schwarz oder schwarzbraun, nicht aber d'un brun qui tient de la couleur de marron foncé. Auch ist schwer erklärlich, warum die bleifarbenen Linien nicht erwähnt werden. Zur Sicherstellung bleibt also die Vergleichung der Raupe übrig, die wir aber nirgends weiter beschreiben finden; ich selbst habe sie schon erzogen, ohne sie zu beobachten. Nach R. ist sie bräunlichgrau, citronengel punctirt, mit citrongelbem Bauche und dergleichen Seiten, und lebt auf Ähren.

In *Nyctemerana* H. Fig. 240. läßt die Farbe der Vorderflügelwurzel, die Flugzeit etc., an *Klugiana* (R. 10, 3. S. 71) die Nahrungspflanze nebst anderen Abweichungen nicht denken.

Geoffroy's *Chappe brune au sautoir* (2. S. 170) ist mir unbekannt; aber seine Beschreibung erwähnt Zeichnungen, die bey Rs Art nicht zu finden sind. Ich kann daher durchaus nicht glauben, daß beyde Schriftsteller dieselbe Art vor sich gehabt haben.

23) *Yponomeuta cognatellus*.

R. I. 1. p. 399 et 428. t. 17. f. 10. 11.

II. 1. p. 262. t. 12. f. 12. 13.

Treitschke — 9, 1. p. 220.

Linne citirt die Rischen Abbildungen im *Syst. Nat.* S. 885 zu seiner *Phalaena evonymella*. Er kann aber hierzu weiter keinen Grund als die Nahrung der Raupe, *le fusain*, gehabt haben. Gehe ich nach dieser und nach der geringen Anzahl Punkte, die wir in der Abbildung des Schmetterlings sehen, so muß ich diese Art für *Cognatella* Hbn. Fig. 391. 392. erklären. Hier bey Glogau wird der Spindelbaum alle Sommer mit Geweben überzogen und völlig kahl gefressen, und aus den Raupen, die das thun, habe ich in Menge und nur *Cognatella* Hbn. Fig. 391. 392., d. h. die schneerose Motte mit wenigeren Punkten und schneerosem Saume der Vorderflügel, erhalten. Dagegen fand ich vor einigen Jahren bey Schmirdeberg im Riesengebirge, und 1837. auch bey Glogau, zu Ende July, den *Yponom. evonymella*, d. h. die reinweiße Motte mit vielen feinen Punkten, Hbn. Fig. 88., scharenweise an *Prunus padus*-Sträuchern, die so kahl gefressen waren, wie

gewöhnlich der Spindelbaum, und an denen man doch des Namens wegen *Yponom. padellus* erwarten sollte. Hingegen ist der *Padellus* bey Glogau äußerst häufig an Schlehensträuchern; die er so vernichtet, wie *Cognatellus* die Spindelbäume und *Evonymellus* die Traubeneisengestrauchte. Nun hat aber Reaum. tom. II. part. 1. p. 257. t. 12. f. 13. noch einen Schmetterling vom *Evonymus*, der eine vollkommene Hehnlichkeit mit der Motte des Apfelbaums, Fig. 8., haben soll. Nach der Abbildung ist diese Hehnlichkeit nicht vollkommen; denn Fig. 13. weist mehr Punkte auf als Fig. 5. oder 8. Diese Abbildung möchte man vielleicht eher für *Evonymellus* ansehen; doch ziehe ich sie auch zu *Cognatellus*, worüber man bey *Yponomeuta Malinellus* (Nr. 93.) Anm. 1 nachsehe.

Ungeachtet der vielen Abbildungen und Beschreibungen, die wir von den *Yponomeuten* besitzen, ist die Kenntniß dieser Arten noch in großer Verwirrung, und die Untersuchung muß ganz von vorn anfangen.

#### 24) + *Lithosia complana*.

R. L. 1. p. 401 et 428. t. 17. f. 13. 14.

Linn. Phal. — Ochsenh. *Lithosia* — 3, p. 129.

Geoffr. 2. p. 191. Le manteau à tête jaune.

Aus der Abbildung läßt sich nichts weiter erkennen, als daß der Schmetterling eine *Lithosia* oder eine *Phycis* Zinckens ist. Denn bey diesen Gattungen werden die Flügel in der Ruhe so um den Leib gefalgen, daß ein Oberflügel den andern verdeckt. Auch stimmt damit die Angabe, daß der fragliche Schmetterling zur zweyten Rischen Classe gehört, d. h. borstenförmige Fühler und eine Zunge hat. Um die Art zu ermitteln, ist eine Emendation vorzunehmen und statt le dessous des ailes supérieures zu lesen le dessus des a. s. Denn warum sollte R. hier die Unterseite der Vorderflügel beschreiben und die Oberseite übergehen? Die Angaben: die Vorderflügel oben hellaschgrau, fast silberfarbig, und der Kopf und der Rücken gelb (*jaune qui tient du feuille-morte*), lassen sich auf keine bekannte *Phycis*, wohl aber auf eine *Lithosia*, nämlich *Complana*, anwenden. Freylich wünscht man auch den gelben Vorderrand erwähnt zu finden, und da dieses nicht geschehen ist, so möchte man an *Helveola* denken. Deren Flügel hätte R. aber nicht silbergrau nennen können, und es läßt sich auch denken, daß er die Schmetterlinge nur im ruhenden Zustande sah, in welchem der helle Rand leicht übersehen werden konnte.

Wenn man aber bey der silbergrauen Art mit gelbem Vorderrande stehen bleibt, so kann gefragt werden, ob es nicht *Lurideola* Zinck. seyn möchte. Hierauf ist kurz zu antworten, daß *Lurideola* breitere Vorderflügel hat, als die Abbildung zeigt.

Linne citirt die Rische Art, was mich sehr überrascht hat, bey seiner Phal. *culmella* 886. *Culmella* Linn. ist *Chilo culmellus* Zinck. und Tr. (9, 1. S. 93) oder *Straminea* Hbn. Fig. 49. Nun ruht aber erstlich kein *Chilo* so, daß ein „großer Theil des einen der Vorderflügel unter dem andern verborgen ist“ sondern so, wie Treitschke (9, 1. S. 60) nach Zinckens Angabe beschreibt. Zweytens erreicht *Culmellus* kaum die halbe Länge der Figur 13. oder 14. Drittens hat *Culmellus* weit hervorstehende Palpen, die so lang sind wie Kopf und Thorax zusammen genommen; bey R. Art sieht man

keine Palpen, weil sie bey *Complana* klein sind und nicht über den Kopf hervorstehen. Endlich hat *Culmellus* statt silbergrauer Flügel blaßgelbe mit einem grauen Schatten längs des Vorderandes, und sein Kopf und Rücken hat die Farbe der Vorderflügel. Es ist also nichts sicherer, als daß Linne sich geirrt hat.

Fabricius hat dasselbe Citat bey seiner *Tinea Culmella*, einer andern Art, als die bey Linne diesen Namen trägt. Sie ist gleich *Culmella* Hbn. Figur 404 oder *Chilo Aquilellus* Tr. (9, 1. p. 116). Die *linea unica albissima abbreviata*, den Hauptcharacter jener *Culmella*, sucht man bey R. Art in der Abbildung wie in der Beschreibung vergebens. Uebrigens passen die bey Linne's *Culmella* angegebenen Gengründe auch hieher. Also citiren Fabricius und Latreille (*hist. nat. des crust.* 14. S. 248 *Crambus culmorum*) eben so erwiesenen falsch.

Was mich aber in meiner Meynung gänzlich befestigt, das ist der Umstand, daß Geoffroy R. Art bey seinem Manteau à tête jaune citirt, der, wie auch Ochsenheimer thut, nur für *Complana* angesehen werden kann. Es ist schade, daß ich keine *Complana* im Stande der Ruhe zum Vergleichen habe; der gelbe Vorderrand der Vorderflügel muß doch sehr leicht zu übersehen seyn, weil Geoffroy ihn so wenig wie R. erwähnt.

#### 25) *Ypsolophus verbascellus*.

R. L. 1. p. 402 et 430. t. 18. f. 11 — 15.

Aus der Abbildung ist schwer auf *Verbascellus* zu rathen. Besser stimmen folgende Angaben. Die Raupe lebt unter der Wolle des Wollkrauts (*bouillon blanc*) und ist braun mit schwarzem Kopfe (die Abbildung legt ihr, gewiß mit Unrecht, nur 14 Füße bey \*). Sie verpuppt sich gewöhnlich an derselben Stelle, wo sie bisher lebte. Der Schmetterling, den beyde Figuren, und zwar Figur 12. stärker, vergrößert darstellen, hat schmutziggelbe oder gelbliche Flügel — (Fig. 11. zeigt auch etwas von den dieser Art gewöhnlichen braunen Punkten), die er en toit arrondi trägt. Die Palpen (Figur 15.) sind nicht genau genug abgebildet; die Haare auf der unteren Seite des zweyten Gliedes müßten länger hervorstehen. Die Beschreibung derselben stimmt besser. „Ein Theil des Tasters ist ein Stiel, der sich allmählich verbiegt, nach dem Kopfe krümmt und sich daran legt; aus dem obern Ende dieses Stiels kommt ein herzförmiges, glattes Glied hervor.“ — Da ich alles Angegebene oftmals selbst beobachtet habe, so zweifle ich nicht an der Richtigkeit meiner Benennung, und bestätige zugleich das Zusammengehören der Raupe und des Schmetterlings bey R.

#### 26) \* *Pyralis rostralis*.

R. L. 1. p. 403 et 431. t. 18. f. 16 — 20.

Linn. Phal. — 881. Treitschke *Pyralis* — 7, pag. 30. Geoffroy 2, pag. 168. Le toupet à pointes.

Reaumur beschreibt vom ganzen Schmetterlinge nichts als die Palpen; dafür ist aber die Abbildung des Schmetterlings so gut gerathen, daß er auf den ersten Blick erkannt wird. Warum Linne diese Abbildung mit einem Fragezeichen anführt, ist schwer zu sagen. Es wäre zu wünschen, daß alle Rische Bilder so gut wie diese wären.

\* In der Quart-Ausgabe ist eine Spur von Fuß am zweyten Ringel hinter dem vierten Bauchfuß. D.

27) \* *Plusia gamma*.

R. I. 1. p. 406 et 432. t. 19. f. 1—3.

p. 87 et 129. t. 1. f. 3.

II. 2. p. 92, 121 et 167. t. 26 et 27. f. 1—5.

Linn. Phalaena — 843. Treitschke *Plusia* — 5, 3. p. 185. Geoffr. 3, p. 156. Le lambda.

Diesen Schmetterling beschreibt Reaumur an der ersten Stelle wegen der sonderbaren Bedaarung seines Rückens. Die Raupe ist zwölffüßig, grün, mit zerstreuten weißen Haaren. Das Gespinnst weiß und dünn. Der Schmetterling hat braune Flügel mit einem glänzend gelben Fleck (*une tache d'un jaune brillant tirant sur la couleur d'or*). — Dieser Auszug aus seinen Angaben beweist hinreichend, daß die Vermuthung, auf welche die nicht sonderlich gute Abbildung führt, daß nemlich *Gamma* wirklich gemeint sey, ihren guten Grund hat. Dennoch wird diese Stelle weder von Linne, noch von Esper oder Treitschke citirt. Alle führen Tafel 26. und 27. Figur 4. 5. des zweiten Theiles an, bey welchen Tafeln jede Untersuchung, ob *Gamma* darinn vorkommt, überflüssig ist. R. selbst gedenkt der Taf. 19. im zweyten Theile nicht. — Die Abbildung auf Taf. 1. des ersten Theiles kann, da R. keine zwölffüßige Raupe weiter hat, nur zu *Gamma* gezogen werden.

Geoffroy trennt Taf. 19. und zieht sie zu seiner *plaque dorée* (2. S. 165), die ich nicht kenne.

28) \* *Orgyia antiqua*.

R. I. 1. p. 409 et 432. t. 19. f. 4—18.

I. 2. p. 4 et 45. t. 21. f. 8.

Linn. Phalaena — 825. Ochsenh. *Orgyia* — 3. p. 221. Geoffroy 2. p. 119. L'étoile.

Linne citirt Fig. 12. und 17. der Taf. 19., a. a. D. bey seiner *Phalaena antiqua*, und mit Recht. An *Gonostigma* ist nicht zu denken, da die helle Stelle in der Abbildung nicht fehlen würde. Auch passen die Angaben: röthlich gelb (*un feuille-morte*), stellenweise braun gewässert, mit einem weißlichen Auge, nebst der rothlichgelben Farbe der *Unterflügel* und der ganzen Unterseite, nur auf *Antiqua*. Die Haarbüschel in den Seiten der Raupe sind gleichfalls allein dieser Art eigen.

Dadurch widerlegt sich auch die Meynung der Verfasser des Wien. B., die S. 55 bey ihrem *Bombyx Gonostigma* aus R. la chenille à grosses du prunier anführen, welche keine andere als unsere hier besprochene Art seyn kann.

29) \* *Pterophorus pentadactylus*.

R. I. 1. p. 413 et 435. t. 20. f. 1—6.

Linn. Phal. *pentadactyla* 900. Treitschke *Alucita pentadactyla* 9, 2. p. 249.Fabr. *Pteroph. pentadactylus* 3, 2. p. 348. Geoffr. 2. p. 91. Le ptérophore blanc.

Diese Art wird von R. kurz und bündig durch die *grande blancheur* charakterisirt. Seine Abbildungen und Beschreibungen hätten Linnés falsche Ansicht über die Flügelpal-

tung leicht berichtigt seyn können. Treitschkes Angabe der Größe ist eine sehr arge Uebertreibung. Von Latreille (hist. d. crust. 14. S. 257) ist nur ein Druckfehler zu corrigiren, er schreibt nemlich Fig. 1. u. 2.

30) \* *Pterophorus pterodactylus*.

R. I. 1. p. 414. 418 et 436. t. 20. f. 7—18.

I. 1. p. 148 et 211. t. 3. f. 12. 13. ?

I. 2. p. 45. t. 21. f. 5, ?

Treitschke *Alucita Pterodactyla* 9, 2. p. 242. Geoffr. 2. p. 92. Le ptérophore brun.

Der Schmetterling hat ein helles holzfarbiges Braun (*un brun qui tire sur une couleur de bois clair*). In der Ruhe sind die Flügel so in einander gefaltet, daß die einer jeden Seite wie ein ausgestreckter Arm aussehen (*elles ont l'air de deux bras étendus*). Jeder Vorderflügel ist nur am Ende eingeschnitten, und zwar höchstens  $\frac{1}{6}$  oder  $\frac{1}{2}$  seiner ganzen Länge (*chacune n'est fendue que vers le bout au plus jusqu'à la 6me ou 7me partie de sa longueur*). Der Hinterflügel bildet drey Federn mit langen Fäden. — Diese Rischen Angaben sind vollkommen hinreichend, um aus ihnen den *Pterodactylus* zu erkennen. Da er der gemeinste *Pterophorus* ist, so hat man vielfache Gelegenheit, die von R. angegebene Flügelhaltung im ruhenden Zustande des Schmetterlings zu beobachten. Die langen Fängen der Hinterflügel Federn (*les plumes bien fournies de chaque côté de grandes barbes*) sind der beste Unterschied von *Ptilodactylus*, was Treitschke übersehen hat. So sicher und kenntlich aber R. Art ist, so wird sie doch nicht von Linne bey *Pterodactyla* 900 erwähnt und daher auch nicht bey Fabricius (3, 2. S. 337). Geoffroy hält seine Art fälschlich für einerley mit *Didactyla* Linn.

Sonderbarer Weise citirt aber Linne die Figuren 12—16 zu seiner *Phalaena monodactyla alis patentibus linearibus indivisis*. Nach der *Fauna suec.* sollen an dieser Art nur die Vorderflügel ungetheilt, die Hinterflügel dreytheilig seyn. Es ist mir sehr wahrscheinlich, daß, da die Spalte der Vorderflügel des *Pterodact.* in der Natur schon an frischen Exemplaren nicht ganz bequem sichtbar ist, Linne sich durch Fig. 18. hat täuschen und zur falschen Beschreibung der Vorderflügel verleiten lassen. Denn in dieser Figur sind die Vorderflügel so abgebildet, wie man sie am frischen Schmetterling sieht, wenn man seine Hinterflügel frey gemacht hat, nemlich so, daß die Spalte ganz unsichtbar ist. Daß sie in der Natur aber vorhanden ist, zeigen die Worte S. 416: *chacune des ailes supérieures n'est fendue que vers le bout*, wozu Figur 16 und 18. angezogen werden. *Alae cinereae* ist freylich keine rechte Uebersetzung jener französischen Worte, wohl aber kommen sie so an manchen Exemplaren von *Pterodactylus* vor. Nach seinen ungelappten Exemplaren wird Linne die Farbe, nach R. Fig. 18. die Gestalt beschrieben haben. Ich verhehle daher einen Verdacht nicht, daß eine *Monodactyla* nach der Linneischen Angabe in der Natur nicht existire, und behaupte, daß unter ihr nichts als *Pterodactylus* verborgen sey. Wenn übrigens Linne bloß Fig. 12—16. allegirt, so darf dieß keinen Anstoß verursachen. Er allegirt aus R. fast immer nur die vollständigen Insecten, nicht aber die Raupen, Puppen und vergrößerten Theile. Mit meiner Uebersetzung von dem Zusam-

mangehören aller oben angegebenen Figuren steht aber Latreille's Beschreibung des *Pterophore monodactyle* (h. d. crust. 14, S. 257) in starkem Widerspruche. Wenn Fabricius Linne's Citat beibehalten hat, so darf man sich nicht wundern; denn Fabricius hat die Art nicht gekannt, sondern sie aus Linne entlehnt. Allein Latreille hat einen *Pter. monodactyle* gekannt, dem er alles très-écartées d'un brun fauve sans divisions et très-étroites entzweit, und den er für „sehr gemein in Gärten“ ausgibt. Très écartées kann nur das bedeuten, was R. unter dem Aussehen wie zwei ausgestreckte Arme versteht. Un brun fauve ist eben die Farbe des *Pterodactylus*. Aus dem Citate R. 1. c. f. 12. u. 16. sieht man, welche Verwandtschaft es mit den sehr schmalen Flügeln hat, nemlich, daß auch hier wieder Verthum im Spiele ist, den ein sorgfältigeres Durchlesen von R's. Beschreibung hätte vermeiden lassen. Latreille hatte vielleicht ein paar ungepannte *Pterodactylus*, und da er bey R. keine Flügelfeilung sah und bey Fabricius den Linne'schen Verthum aufgenommen fand; so trug er kein Bedenken, dasselbe Versehen zu begehen.

**Anm.** Daß die Tafel 3. abgebildeten Weine zu den Fledermotten gehören, ja selbst, daß die Fledermotten dergleichen Mittelweine haben, meldet uns R., soviel ich auch beschreiben nachsuche, nirgends. Ich habe aber die Naturgeschichte des *Pteroph. monodactylus* sorgfältig beobachtet und an diesem solche Weine gefunden. Jetzt, da ich hierüber Degeer II. 1. S. 188 vergleiche, sehe ich, daß auch er die jambes de bois R. für Fledermottenweine gehalten hat. Mit Bestimmtheit kann man sie nicht zu *Pterodactylus* rechnen, indem R. auch die Larven des *Pentadactylus* gekannt hat, die ohne Zweifel hierin keinen Unterschied zeigen. — Ganz eben so ist es mit Tafel 21. Nur der Umstand, daß R. den *Pterodactylus* nach seinen Stadien mit Mäusen beobachtet hat, läßt die dort dargestellte Puppe mit einiger Wahrscheinlichkeit zu dem Windengeistchen ziehen.

### 31) \* *Alucita hexadactyla*.

R. I. 1. p. 416 et 435. t. 19. f. 19 — 23.

Linn. Phal. — 900. Fabr. *Pterophorus hexadactylus* 3, 2. pag. 349. Latreille *Orneodes hexadactylus* 14. p. 258. Geoffr. 2. p. 92. Le *pterophore en éventail*. Treitschke *Orneodes hexadact.* 9, 2. p. 255.

R. spricht von der Art, die im August, September und October in Landhäusern gemein ist, und die also, was er nicht wußte, am *Caprifolium* lebt. Ihre Flügel sollen ein helleres und dunkleres Braun, zu kleinen Flecken gemischt, mit einigem Goldglanze haben und in der Größe und Farbe der Flecken etwas wechseln. Da nun Linne's Art auf *Lonicera xylosteum* lebt, so gehört die R'sche ohne Zweifel dazu, und die Widersprüche in der Färbung sind durch Ungenauigkeit von Seiten R's. zu erklären. Es gibt aber zwey einander sehr nahe Arten, die sich so unterscheiden. Die eine hat ein dunkles Grau, das in der Flügelmitte wenig stärker ist als gegen den Hinterrand, mit weißen Wellenlinien durchzogen; die andere ist etwas bläulich grau in der Flügelmitte, und vor dem Hinterrande am tiefsten, anderwärts aber gelblich, woher die weißlichen Wellenlinien wenig abfließen. Mit Herrn Fischer von Röslerstamm habe ich, Jhs 1838. Heft 9.

als wir gemeinschaftlich meine Sammlung durchgingen, mich darinn vereinigt, daß die erstere Hübners *Hexadactyla* Fig. 30. 31. (— die Figuren 10. und 11. halten wir mit Zinken für eine eigne Art, die meine Sammlung aufweisen kann), die letztere *Polydactyla* Fig. 28. ist. *Polydactyla*, die ich in 12 Exemplaren besähe, habe ich in Gärten an *Lonicera*-Arten selbst gefangen; *Hexadactyla* Hbn., von der meine Sammlung 17 Exemplare enthält, fliegt bey Glogau nicht selten, aber auf Aeltern und in Wäldern, in denen keine Spur einer *Lonicera* existiert. Folglich wäre Hübners *Hexadactyla* nicht die Linne'sche, dagegen seine *Polydactyla* mit dieser einerley. Dann könnten aber auch die Treitschke'schen Citate und Beschreibungen nicht in Richtigkeit seyn.

### 32) \* *Vanessa polychlorus*.

R. I. 2. p. 50 et 107. t. 23.

p. 341. t. 46. f. 8 — 13.

I. 1. p. 311 et 324. t. 9. f. 1 — 8.

II. 1. p. 146. t. 3. f. 11.

Linn. Papilio — 777. Ochsenh. *Vanessa* — 1, 1. pag. 144. Geoffr. 2. pag. 37. La grande tortue.

R. beschreibt den Schmetterling nur sehr kurz in der Erklärung der 23ten Tafel. Allein daß er *Polychlorus* vor sich hatte, wird aus der Angabe gewiß, daß die Raupe die gemeinste Dornraupe der Ulme ist. Linne und folglich auch Fabricius citieren nur den mit ausgebreiteten Flügeln abgebildeten Schmetterling Fig. 2. auf Tafel 23.

### 33) \* *Vanessa Jo*.

R. I. 2. p. 93 et 126. t. 25.

I. 1. p. 134. t. 2. f. 6. 7.

p. 335 et 357. t. 10. f. 2. 3.

Linn. Papilio — 769. Ochsenh. *Vanessa* — 1, 1. pag. 107. Geoffr. 2. pag. 36. Le paon du jour.

Nach S. 93 und 94 a. a. D. ist die Raupe schwarz mit weißen Punkten und rothen Bauchfüßen und lebt gesellig auf Nesseln. Diese Angabe nebst der Abbildung, deren Grundfarbe nach S. 106 rothbraun ist mit einem in der Mitte blauen Auge auf den Hinterflügeln, zeigen unbezweifelt *Vanessa Jo* an. Dazu gehört auch die Raupe in tom. 1. part. 1., wie aus den Worten: d'un noir velouté et piquée de très-petits points blancs, erhellt. — In Linne's Diagnose am angeführten Orte ist aus Versehen subus statt supra geschrieben worden.

### 34) \* *Vanessa anticaea*.

R. I. 2. p. 108 et 128. t. 26. f. 1 — 7.

I. 1. p. 134. t. 2. f. 8 — 10.

Linn. Papilio — 777. Ochsenh. *Vanessa* — 1, 1. p. 120. Geoffr. 2. p. 37. La petite tortue.

Zwey kleine, schwarze, zugerundete Flecke im Mittelraume der Vorderflügel, die man auf der Abbildung deutlich sieht,

sind das Merkmal, wodurch man diesen gemeinen Schmetterling von seinen Verwandten unterscheidet. Daß die auf Tafel 2. abgebildeten Dornen hieher gehören, läßt sich nur daraus schließen, daß sie, nach Ks. ausdrücklicher Angabe, nicht zu *Jo* oder *Atalanta* gehören sollen.

35) \* *Vanessa cardui*.

R. I. 2. p. 110. t. 26. f. 8—12.

Linn. Papilio — 774. Ochsenh. *Vanessa* — 1, 1. p. 102. Geoffr. 2. p. 41. La belle dame.

Man erkennt diesen Schmetterling an den 5 (bey Linne 4) augenförmigen Flecken, die auf der Unterseite der Hinterflügel nahe am Hinterrande stehen und S. 111 angezeigt werden: à quelque distance de la base de l'aile. — Bey K. heißt nemlich der Hinterrand stets la base.

36) \* *Vanessa C album*.

R. I. 2. p. 111 et 129. t. 27. f. 1—10.

p. 6 et 47. t. 22. f. 2.

Linn. Papilio — 778. Ochsenh. *Vanessa* — 1, 1. p. 125. Geoffr. 2, p. 38. Le gamma.

Wenn man als zimmetbraun (*cannelle clair*) annimmt, was die Fig. 1. schwarz zeigt, so stimmt die Raupe mit der Ks'schen Abbildung überein. K. nennt sie wegen ihrer eignen Färbung la bed aude. Eben so kenntlich wie durch diese Raupe, wird die Art durch die 2 krummen Hörner am Kopf der Puppe (*deux espèces de cornes contournées en croissant* p. 112). Endlich gibt K. auch das weiße E auf der Unterseite der Hinterflügel des Schmetterlings an; er vergleicht es aber mit einem Neumonde — (*tache presque argentée qui tient un peu de la figure du croissant*).

37) \* *Hipparchia aegeria*.

R. I. 2. p. 113 et 130. t. 27. f. 11—17.

Linn. Papilio — 771. Ochsenh. Hipp. — 1, 1. p. 238. Geoffr. 2. p. 48. Tircis.

Die Abbildung des Schmetterlings, den K. aus der Raupe erzogen hat, entspricht in den Augenflecken der Flügel der Linnel'schen Diagnose. Die Grundfarbe ist nach S. 116, wie bey Linne, braun (*un brun avec une légère teinte de couleur d'olive*); die Flecke blaßgelb (*d'un jaune pâle*). — An der Raupe will K. eine sehr deutliche Zunge mit stumpfer Spitze bemerkt haben.

38) *Lycaena W album*.

R. I. 2. p. 135 et 177. t. 28. f. 1—7.

Ochsenh. — 1, 2. p. 109.

Diese Riche Art wird von Linne, den Verf. des Wien. B. und Borkhausen mit Unrecht bey Lyc. Pruni citiert. Die Raupen fand R. auf der Ulme, und erzog daraus an 10 Schmetterlinge (*huit à douze de ces papillons sont nés chez moi*), „die (S. 142) unter einander in der Färbung vollkommen gleich waren. Ihre Flügel sind hellbraun mit schwacher Körnung (*d'un brun clair légèrement rougeâtre*); die Unterseite der Hinterflügel hat eine Binde von kleinen, rothen,

augenartig gerundeten Flecken, gegen deren Mitte ein kleiner schwarzer Kreis ist (*une bande de petites taches rouges arrondies en oeil, vers le milieu desquelles est un petit cercle noir*). Diese Fleckenbinde fängt am Innenwinkel des Hinterrandes an und geht bis zur Mitte desselben. Zween Binden von kleinern und weniger hellen Flecken sind gegen die Mitte eines jeden Flügels. Am Innenwinkel des Hinterrandes ist ein kleiner, eine Art Faden bildender Theil.“ — Da Lyc. pruni und W album nahe verwandte Schmetterlinge sind, so läßt sich erwarten, daß auch ihre Raupen ähnlich seyn werden. Ließt man Ks'selbe Beschreibung der Pruniraupen, so findet sich die Ähnlichkeit der beyden Arten größer, als sie nach Dufschheimers Worten zu seyn scheint. Denn Pruni wird vor der Verwandlung eben so gut braun, wie W album; auch in den Höckern neben der Rückenlinie scheinen sie ziemlich gleich zu seyn. Wie sie sich wirklich unterscheiden, wird daher wohl erst noch durch genauere Beobachtungen ausgemacht werden müssen. Einstweilen ist gewiß, daß man die Ulme noch nicht als Nahrungspflanze der Lyc. pruni kennt, und somit spricht schon diese Nahrungspflanze für meine Behauptung. Ferner soll die rothe Fleckenbinde auf der Unterseite der Hinterflügel des Schmetterlings nur bis zur Mitte des Hinterrandes gehen, was wohl bey W album, aber nicht bey Pruni Statt findet; bey letzterer geht sie bis an den Vorderrand und setzt auf die Vorderflügel über. Auch würde K., wenn er von Pruni spräche, sich über die schwarzen Flecke in der Binde, von denen Pruni eher zwey Reihen hat, wohl anders ausgedrückt haben. Als entscheidend läßt sich aber das ansehn, daß er von den rothen Flecken, die Pruni in beyden Geschlechtern auf der Oberseite der Flügel immer hat, gar nichts sagt, daß er also eine einfarbige Oberseite sah, wie sie W album in der That hat.

Eine Erklärung, warum Ks. Schmetterling als Pruni galt, kann nicht schwer fallen. Die sehr ungenaue Abbildung bey diesem, die Seltenheit des Ulmens Schmetterlings in den meisten Gegenden, die daher kommende Unkenntniß desselben mußten wohl den Unterschied in der Raupennahrung als unbedeutend ansehn und daher keine Ahnung einer Artverschiedenheit aufkommen lassen. — Geoffroy's *Porte-neuve brun à deux bandes de taches blanches* (2. S. 60) scheint ein Gemisch von Lyc. Ilıcis, Pruni und W album, aus dem ich mich nicht herauszufinden, noch einen Grund für oder gegen meine Vermuthung aufstellen weiß. — Daß übrigens W album auch in Frankfurt gefunden wird, leidet keinen Zweifel; in de Villers' Tafeln sehe ich eine recht gute Abbildung, und ich selbst besitze ein aus Paris erhaltenes Stück.

39) † *Lycaena quercus*.

R. I. 2. p. 136 et 142.

Ochsenh. — 1, 2. p. 96. Borkh. Papil. — 1, p. 266. Geoffr. 2. p. 58. Le porte-neuve bleu à une bande blanche.

K. fand die Raupen auf der Eiche; sie waren erst grün, vor der Verwandlung braun, und unterscheiden sich von W album nur durch den Mangel der vertieften Längslinie des Rückens (*elle n'a pas la canelure du dessus du dos*). Ihre Puppe hat keinen so platten Bauch wie die von W album. Der Schmetterling hat nicht die rothen Flecke auf der Unterseite der Hinterflügel, und seine Oberseite ist schön dunkelblau oder

schön violet (d'un beau bleu foncé ou d'un beau violet). — Wort der Abtheilung E. der Schenheimerischen Lycæna oder der Gattung Thecla der Engländer ist *Quercus* die einzige europäische Art, der diese Prädicate zukommen. — Wothhausen und Geoffroy sind die Einzigen, die Rs. bey diesem Falter gedenken.

**Ann.** R. spricht S. 143 von Schmetterlingen aus seinen Eichenraupen, deren Flügel auf beyden Seiten braun waren. Da dieß alles ist, was er darüber angibt, so läßt sich nur mit einiger Sicherheit vermuthen, daß er *Lycæna ilicis* vor sich hatte.

40) \* *Pontia brassicae*.

R. I. 2. p. 143 et 178. t. 28. f. 8—14. t. 29. fig. 1.

p. 11 et 47. t. 22. f. 1.

I. 1. p. 156, 340 et 357. t. 10. f. 7.

II. 2. p. 211 et 268. t. 33. f. 2.

p. 226 et 270. t. 34. f. 1. 2.

Linn. *Papilio* — 759. Ochsenh. *Pontia* — 1, 2. p. 144. Geoffr. 2. p. 68. Le grand papillon blanc du chou.

Sind die Abbildungen der Raupe auch nicht sehr gut gerathen, so geben doch die Beschreibung derselben (I. 1. S. 156 und I. 2. S. 144) und die auf Taf. 29. dargestellten Schmetterlinge die nöthige Sicherheit für die Richtigkeit des Namens. Die zwey schwarzen Flecke und die schwarzen Spitzen an den Vorderflügeln, die Linne für seinen *Papilio brassicae* fordert, sehen wir auf der genannten Tafel dargestellt. Linne charakterisirt offenbar nur das Weibchen; ich weiß daher nicht, ob seine Diagnose von Schenheimer iso ganz unverändert aufgenommen zu werden verdient. — Diese Art kommt bey R. oft vor als la plus belle chenille du chou.

41) \* *Papilio machaon*.

R. I. 2. p. 152 et 179. t. 29. f. 9. t. 30.

I. 1. p. 317. t. 7. f. 7. 8.

p. 357. t. 10. f. 6.

Linn. — 751. Ochsenh. — 1, 2. p. 121. Geoffr. 2. pag. 54. Le grand papillon à queue, du fenouil.

Die Raupe ist grün (un beau verd), auf jedem Ringe mit einem schwarzen Quersstreifen (une raie transversale, quelle a sur chaque anneau), der an sechs Stellen durch orangerothe Flecken unterbrochen ist (coupées en six endroits par tes taches d'un rouge-orange). Ihre zwey fleischigen Nackenhörner beschreibt R. ausführlich. Die Abbildung des Schmetterlings, die auch Linne angiebt, sichert den Namen der Art ohne weitem Bedenken.

42) \* *Pontia rapae*.

R. I. 2. p. 165 et 179. t. 29. f. 4—8.

I. 1. p. 356. t. 10. f. 1.

II. 1. p. 120 et 142. t. 2. f. 3.

p. 146. t. 3. f. 12—14.

Linn. *Papilio* — 759. Ochsenh. *Pontia* — 1, 2. p. 146. Geoffr. 2. p. 69. Le petit papillon blanc du chou.

Die Raupe hat eine grüne Farbe (un assez beau verd), längs des Rückens einen gelblichen Streifen (une raie d'un verd plus jaune) und einige gelbe Punkte an jeder Seite (quelques points jaunes de chaque côté). Den Schmetterling charakterisirt Linne wie den *Papilio brassicae*, nur daß er minor statt major setzt und aus Versehen albis wegläßt, (was Fabricius und Schenheimer unverändert gelassen haben). Er hat also auch nur das Weibchen bezeichnet. Besser hätte er die apices cinereos als nigros genannt — R. unterscheidet beyde Geschlechter (H. 1. S. 91 und 92) sehr richtig, und gibt der Wahrheit gemäß an, daß Fig. 7., die auf den Vorderflügeln nur einen Fleck hat, das Männchen vorstellt. Auf der 10ten Tafel ist, wie der Augenschein lehrt, ein weiblicher Vorderflügel abgebildet. Die Abbildungen des 2ten Theiles gehören zufolge der Worte S. 120 le papillon blanc de la petite chenille verte du chou.

Die Verfasser des Wien. B. führen unter *Papil. Napi* die chenille verte du navet R. an (S. 163). Hier sind sie aber in einen erweislichen Irrthum verfallen. Ein Tagvogel, der auf du navet lebt, kommt bey R. nicht vor. Dagegen finden wir I. 2. S. 298 folgende Stelle: „Ich wage nicht zu entscheiden, ob eine grüne glatte Raupe, die auf den Rübenfeldern (dans les champs de navets) vielen Schaden anrichtet, nicht dieselbe grüne Kohtraupe (chenille verte du chou) ist, von der wir eben gesprochen haben.“ Die von R. zur Erläuterung hinzugefügten Taf. 40. und 41. zeigen sogleich, von welchen Kohl- und Rübenraupen die Rede ist. Die Wiener haben diese Tafeln und die frühern und spätern Worte des Textes nicht beachtet, sondern gemeint, hier sey von *Pap. rapae* und *napi* die Rede.

43) \* *Pontia crataegi*.

R. I. 2. p. 179. t. 29. f. 3.

II. 1. p. 92 et 142. t. 2. f. 5—9.

Linn. *Papilio* — 758. Ochsenh. *Pontia* — 1, 2. p. 142. Geoffr. 2. p. 71. Le gasé.

Man sieht es der Abbildung auf Taf. 29. schwer an, daß sie, wie die Erklärung S. 179 sagt, eine Puppe seyn soll. In der 11ten Abhandlung wird sie nirgends erwähnt. Daß sie *Crataegi* ist, schließe ich aus Folgendem. Sie ist an einen Weißdornzweig befestigt; sie zeigt eine Menge schwarzer Punkte, die man auf den vordersten Gelenken auch sternförmig gestellt sieht; es ist kein Grund da, die Puppe von *Brassicae* noch einmal und überbieß so plagraubend darzustellen, da sie schon auf Tafel 28. zweymal vorkommt; sie hätte der richtigen Ordnung nach mit Fig. 1. statt mit Fig. 3. bezeichnet seyn müssen, weil die zwey Puppen auf Taf. 28. die letzten Nummern (13 und 14) haben. — Die Figuren des zweyten Theiles stellen unsere Art unverkennbar vor.

44) \* *Euprepia villica*.

R. I. 2. p. 186 et 233. t. 31. f. 1—8.

Linn. Phalaena — 820. Ochsenh. Euprep — 3. pag. 330. Geoffr. 2. pag. 106. L'écaillé marbrée.

Von der Raupe dieser Phaläne gibt R. die Merkmale an, die gerade diese Art auszeichnen, nemlich einen rothen Kopf und rothe Beine. Der Schmetterling, den die Abbildung schon ganz kenntlich macht, hat sammetischwarze Vorderflügel (d'un beau noir velouté) mit hellstrohgelben Flecken (des taches d'un jaune plus pale que la couleur de paille) und hochgelbe Hinterflügel (d'une haute nuance de jaune) mit schwarzen Flecken, wie es die Linneische Diagnose fordert. Linne's Fragezeichen bey *Spirilinguis* läßt sich nach R's Angaben und meiner Prüfung wegstreichen. Es ist eine Zunge vorhanden, die etwa die halbe Länge der Fühler erreicht.

45) † *Catocala promissa*.

R. I. 2. p. 188 et 235. t. 32. f. 1 — 7.

Esper europ. Schm. IV. p. 117. t. 96. f. 1 — 5. Borkhausen 4. p. 36. Treitschke Catoc. — 5, 3. p. 349.

Esper hat die Raupe von *Promissa* ganz der R'schen Beschreibung der chenille lichénée gemäß gefunden, nemlich in bläulicher Grundfarbe, oder, wie R. sagt, gris blanc. Der Schmetterling stimmt mit R's Abbildungen und Angaben. Er ist auf den Vorderflügeln grau und schwarzweiss bandiert (travaillée en point de Hongrie, formé par des melanges de gris et de noir). Bey der Sponsa hätte R. in dieser Kürze nur von braunen und schwarzen sprechen können.

Es war aber ein sehr verzeihlicher Irrthum von Linne, daß er, da ihm *Promissa* unbekannt war, R's Figuren nebst den beiden R'schen zu seiner *Phal. sponsa* zog (S. 841). Fabricius behielt das Linneische Versehen bey. Das Wien. B. enthält ein anderes, indem es R's lichénée zu *Pacta*, d. h. *Electa* Bkh. stellt. Geoffroy's lichénée rouge, bey welcher auch das Citat aus R. steht, gibt Treitschke für *Sponsa* aus; mit welchem Rechte, hätte wohl gesagt werden müssen, da die ailes supérieures de couleur cendrée vielmehr auf *Nupta* hindeuten.

46) *Gastropacha lanestris*.

R. I. 2. p. 202 et 236. t. 32. f. 11. 12.

II. 1. p. 136 — 146. t. 3. f. 15 — 17.

Linn. Phal. — 892. Ochsenh. Gastrop. — 3. pag. 289.

Die Raupe ist halbzottig (demi-velue), schwarz violett oder fast violett. An der Seite eines jeden Ringes geht ein gelber Rand, der zwischen den Gelenken etwas höher steigt (le bout de la moitié supérieure de chaque anneau est bordé de jaune; cette bordure remonte un peu vers le dos). In dem dadurch gebildeten Bogen liegt ein fast eben so gelber Fleck (dans le petit arc renfermé par cette bordure il y a une tache à peu près du même jaune). Sie lebte auf Weisbörn und Apricot. Im Juli machte sie sich an Blättern ein sehr kleines Puppengehäuse, das auswendig so glatt, glänzend und braun wie eine Eichel war. Die Schmetterlinge kamen nicht aus. — Die gefürteste Puppenhülle läßt darauf

schließen, daß eine mit *Catax*, *Everia* und *Lanestris* verwandte Art gemeint ist. Die Beschreibung der Raupe kommt der Ochsenheimer'schen Beschreibung der Raupe von *Lanestris* so nahe, daß die Gleichheit beyder Raupen nicht zu bezweifeln ist. Die gewöhnlichste Färbung ist aber die oben angegebene, so viel ich beobachtet habe, in unsern Gegenden nicht. In den R'schen Tafeln (I. noct. 2. 62) sehe ich sie so wie an einer von mir ausgeblasenen Raupe, nemlich längs der Seite auf jedem Ringe mit ein paar gelblichen Pünctchen. Doch da die Ochsenheimer'sche Beschreibung wahrscheinlich nach der Natur genommen ist, so muß ihre Uebereinstimmung mit der R'schen als entscheidend angesehen werden (Ein sehr auffallendes Merkmal der *Lanestris*raupe, das ich bey allen Beschreibern übergegangen finde, bieten die zimmetrothen Beine).

Wohler R. die *Lanestris*raupe erhalten hatte, daher erhielt er auch die im 2ten Theile abgebildeten Eyer, von denen ich versichern kann, daß sie Eyer von *Lanestris* sind. R. erhielt sie an einem Schlehendornast. Hier bey Glogau findet man sie wohl auch an Schlehen, viel häufiger aber an Birken, an denen sie im Anfange des May in jungen Laube auffallend genug sind. Sie sitzen wie Ringelcarupeneyer, sind aber auswärts mit der weichen, mäusegrauen Afterwolke des Weibchens bekleidet. Die obersten und untersten Eyer eines Ringes sind spiralförmig um den Zweig gestellt und lassen Zwischenräume zwischen sich. Alles dieses ist von R. genau abgebildet und beschrieben. R'sels Abbildung gibt keine richtige Vorstellung; hier liegen die Eyer, statt aufrecht zusehen.

47) \* *Liparis salicis*.

R. I. 2. p. 210 et 240. t. 34. f. 1 — 6.

p. 4 et 46. t. 31. f. 13.

Linn. Phalaena — 822. Ochsenh. *Liparis* — 3. p. 198. Geoffr. 2. p. 116. L'apparent.

R. bildet die Raupe — la chenille du peuplier blanc et du saule — völlig unkenntlich ab und beschreibt bloß die Varietät, welche auf dem Rücken gelbe Flecken hat (des taches d'un jaune citron); bey R'sel sehen wir die Abänderung mit weißen Flecken, bey Esper beyde. — Die Puppe liegt nach R. in einem Gehäuse von wenig Seide, und ist eine der zottigsten, die er kennt. Die Flügel und der Leib des Schmetterlings sind schön glänzend weiß; an den Stellen des Körpers und der Beine, die nicht beschuppt sind, erblickt man eine schwarze Farbe (noir de jais).

48) \* *Acronycta aceris*.

R. I. 2. p. 212 et 241. t. 34. f. 7 — 11.

I. 1. p. 220 . . . t. 5. f. 8.

p. 257 . . . t. 6. f. 15. 16.

II. 1. p. 116 nt 146. t. 3. f. 9. 10.

Linn. Phalaena — 846. Treitschke *Acronycta* 5, 1. p. 11

Ihre langen, gelben Haarbüschel stehen nicht auf fleischigen Höckern und verjüngen sich nach oben. Auf dem Rücken geht eine Reihe schwarzer, weiß eingefasster Flecken (un rang de taches d'un beau noir bordées de blanc). Sie reißt sich, wenn sie ihr Gespinnst verfertigt, alle Haare aus und



bedeckt es von außen damit. Der Schmetterling, der in der Mitte des Frühlings auskriecht, hat auf den Flügeln verschiedene Nuancen von Grau und etwas Weiß, verschieden gemischt und vertheilt (différentes nuances de gris et un peu de blanc, différemment mélangées et distribuées). In diesem allen, besonders an der Raupe, ist die Aborneule kenntlich. Da die Raupe bey R. kurzweg chenille du maronnier d'Inde heißt, so müssen auch die Figuren in I. 1. hieher gehören.

49) *Orgyia fascelina*.

R. I. 2. p. 216 et 236. t. 32. f. 8—10.

I. 1. p. 111 et 136. t. 2. f. 21.

Linn. Phalaena — 825. Ochsenh. *Orgyia* — 3. p. 214. Degeer I. 7te Abh. S. 40. II. 1. S. 230.

Reaumur, der auf Tafel 32. nur das Puppengehäuse und zwey Schmetterlinge abbildet, beruft sich dabey auf die T. 2. abgebildete Raupe. Diese ist aber, wie aus der Erklärung dieser Tafel zu sehen ist, nichts als *Fascelina*. „Sie ist (S. 136) gegenwärtig in Grau, Weiß und Schwarz gekleidet. Zu Zeiten ist sie fast gelb. Sie hat auf dem Rücken 5 büstenförmige Haarbüschel und einen pinselförmigen über dem Hinterrücken.“ Diesen Büscheln gibt die Abbildung unten eine weiße, oben eine schwarze Farbe. Man darf nur Rösels Abbildung ansehen, um auch in der Rischen sogleich die *Fascelina*-raupe zu erkennen. Der aus dieser Raupe kommende Schmetterling, der sich aus den Figuren nicht erkennen läßt, hat „graue Vorderflügel mit schwarzen und einigen gelben Punkten.“ In Figur 10. sieht man auch die ausgebreiteten zottigen Brine. Da der Schmetterling sich nicht vollständig ausgebildet hatte, so konnte er ihm keine bessern Merkmale geben. Der Name ist aber durch die Raupe sicher genug.

50) \* *Orgyia pudibunda*.

R. I. 2. p. 216 et 238. t. 33. f. 4—17.

Linn. Phalaena — 824. Ochsenh. *Orgyia* — 3. pag. 209. Geoffroy 2. pag. 113. La patte étendue.

Die Abbildungen der Raupe stimmen mit den Röselschen überein; sie zeigen wie dort vier Rückenbüscheln und einen Pinsel über dem Hinterrücken. Die Farbe dieser Haare ist nach R. oft rosenfarbig. „Der Schmetterling hat schmutzig weiße Flügel, die beym Weibchen außer einem gelblichen Querstreifen und einem kleinen gelblichen Fleck (une raie transversale un peu jaunâtre et une petite tache de même couleur) einfarbig sind, beym Männchen aber wellige oder gestammte Flecken haben.“ Obgleich Linne's Diagnose, Rösels Bild gemäß, dreymal eine wellige Binde verlangt, so kann doch über die Richtigkeit der Bestimmung kein Zweifel obwalten, zumal da Linne die Abbildungen selbst citirt.

51) \* *Euprepia caja*.

R. I. 2. p. 219 et 244. t. 36. f. 1—7.

Linn. Phalaena — 819. Ochsenh. *Euprepia* — 3. pag. 335. Geoffroy 2. pag. 108. L'écaille morte ou hérissée.

Fig. 1838. Heft 9.

Bev R. heißt die *Cajaraupa* oder *Warper* oder *Igel* (la marte ou l'hérissée), weil ihre meisten Haare eine solche Farbe oder Stellung haben, wie bey diesen Thieren. Die Haare nahe am Kopf und die an den Seiten sind (nach R.) röhrtförmig und kürzer als die übrigen. Die Abbildungen des Schmetterlings sind nicht sonderlich gut; aber die weißen rivuli der Vorderflügel und die runden Flecken (puncta) der Hinterflügel lassen ihn schon erkennen, wenn man auch nicht die Beschreibung (S. 220) befragt, worinn allem Mangel abgeholfen wird.

52) \* *Gastropacha quercus*.

R. I. 2. p. 221 et 242. t. 35. f. 1—11.

I. 1. p. 318. t. 7. f. 11. 12.

p. 280 et 323. t. 8. f. 20—23.

II. 2. p. 272. t. 34. f. 7.

Linn. Phalaena — 814. Ochsenh. *Gastrop.* — 5. pag. 266. Geoffr. 2. p. 111. Le minime à bande.

I. 1. p. 136. t. 2. f. 19. 20. ?

I. 2. p. 227 et 243. t. 35. f. 12—15. ?

Von den ähnlichen Arten *Quercus*, *Trifolii*, *Spartii* etc. ist an den ohne Fragezeichen angezeigten Stellen nur *Quercus* beschrieben und abgebildet. Nur die Raupe von *Quercus*, soviel man jetzt beobachtet hat, nährt sich von Blättern mehrerer Bäume, vergleichen bey R. angegehen werden, Ulmen, Hainbuchen, Haseln, Corneltstrauchbäume. R. beschreibt die Raupe so: die Ringe sind an den Gelenken sammettschwarz, welche Farbe sichtbar wird, wenn sie sich ausstreckt. Außerdem sieht man nur ihre hellgelben, mit ein wenig Olivenfarbe und Silbergrau gemischten Haare, die zu andern Zeiten braunschwarz sind.“ Hier bieten die sammettschwarzen Einschnitte die beste Bezeichnung dieser Art. Wenn Schmetterlinge beschreibt R., ohne die Verschiedenheit der Geschlechter anzugeben, die Flügel so: „die Oberseite (S. 226) der vordern ist fast isabellgelb, jedoch etwas brauner. Auf jedem Flügel ist eine Art Querstreif, dem Hinterrande parallel, von dunklerer Farbe; zwischen ihm und der Flügelwurzel ist ein runder, innen weißer, außen schwarzbrauner Fleck.“ Dieses ist eine deutliche Beschreibung vom *Quercus*-Weibchen.

S. 227 sagt R., daß die chenille du gazon t. 2. f. 19. 20. von derselben Gattung (genre) ist, daß ihre Haare hell gemischt sind, daß er sie auf Gras fand, und damit, so wie mit Ulmen-, Hainbuchen- und Brombeerblättern nährte, daß die meisten Schmetterlinge verküppelten, daß aber ein davon erhaltenes Weib dem oben beschriebenen ziemlich gleich war. Es läßt sich nicht leicht entscheiden, ob dieses eine andere war.

Das Wiener Verzeichniß (S. 57) und Knoch (Deytre. 3. Stüd. S. 56) nehmen die chenille du gazon ohne weiteres zu *Bombyx trifolii*. Die Ursache hiervon liegt wohl darin, daß R. selbst sie von der chenille velue de la charmillie unterscheidet — dabey der Gegensatz von Gras und Eiche!, daß er ihre Haare hellgemischt, daß er ihre Hülse heller als bey der Hainbuchenraupe nennt, und daß er in den ausgekommenen Schmetterlingen nicht eine völlige Gleichheit mit jenen findet. — Allein anerkanntermaßen hat die Raupe



von *Trifolii* Schwarzblaue Ringeinschnitte. So lehrte Döschheimer, und so fand ich es stets an den hier auf sonnigen, trockenen Waldplätzen nicht seltenen Raupen. Dagegen geben Hs. Worte I. 1. S. 136 ein sehr wichtiges Bedenken: „die Raupe zeigt Schwarzes (du noir) quer an der Vereinigung der Ringe. Ferner finde ich andernwärts für die *Trifolii* Raupe als Nahrung nur Klee, Wegerich und andere niedere Gewächse angegeben (ich erzog sie nur mit *Medicago falcata* und *Trifolium pratense*); R. aber ernährte sie außer mit Gras auch mit Ulmen-, Hainbuchen-, und hauptsächlich mit Brombeerblättern. Ob *Trifolii* sich wohl an solche Nahrung möchte gewöhnen lassen? Von *Quercus* habe ich eine Menge Raupen auf einer weiten, mit Heidekraut bewachsenen Ebene gefunden und sie anfangs damit ernährte, bis ich ihnen Weiden- und allershand andere Baumblätter gab. Ohne Zweifel frisst sie auch Gras.“

Die hellen Haare der Raupe können kein sehr großes Bedenken veranlassen, da R. selbst (I. 2. S. 222) an der chenille de la charmille ein Abändern, wenn auch nur nach dem Alter, bemerkt. Ich habe noch zwei abgestreifte Häute von *Quercus*raupen vor mir, deren Farbe ziemlich gut chamois heißen kann.

Endlich läßt sich das assez de ressemblance, même par la couleur des ausgebrochenen Weichens beynahe eben so gut für als wider meine Zweifel verwenden. Ich denke daher, daß die zwei ersten meiner Gegengründe die Richtigkeit der Behauptung des Wiener Verzeichnisses und Knoch's noch etwas problematisch machen.

### 53) *Lithosia mundana*.

R. I. 2. p. 229 et 245. t. 36. f. 8—10.

Linn. Phal. *mundana* 812. Ochsenh. *Lithosia* — 3. p. 160.

Die Raupen fand R. in Menge an alten Mauern auf den dort wachsenden Flechten, von denen sie sich nährten. Sie hatten auf jedem Ringe 6 lange rothgelbe Haarbüschel (Fig. 9), zwischen denen die weißgraue Grundfarbe des Körpers gut zu sehen war (roux, mais leur couleur étoit adoucie par celle de la peau). Oben auf jedem Ringe befanden sich zwei gelbe Flecken; der Kopf war auch weißgrau (la tête étoit à peu près du même blanc que le corps). — Von dieser Beschreibung weicht die Döschheimersche darin ab, daß sie eine blaßgelblichgraue Grundfarbe, schwärzliche Haare und einen hellbraunen Kopf verlangt. Wahrscheinlich kommt diese beim Ueber-einstimmen alles Uebrigen geringe Verschiedenheit bloß daher, daß die Raupen etwas abändern, oder daß einer der beyden Beobachter den Gegenstand in genauern Augenschein nahm.

So sorgfältig R. sonst ist, wo er etwas Belehrendes zu sehen und zu erzählen hat, so leicht geht er über die Farben und Zeichnungen hin; daher scheint mir hier Döschheimer den Vorzug in der Glaubwürdigkeit zu haben. — Da das Verfahren der Raupe, sich zu verpinnen, etwas Merkwürdiges hat, so ist R. in der Beschreibung desselben sehr sorgfältig und ausführlich. Beim Schmetterling aber läßt er es wieder so fehlen, daß leicht Zweifel entstehen können. Es heißt: „gegen den 25. July gab mir jede Puppe einen Schmetterling, der nichts Merkwürdiges hat; er gehört zur zweiten Classe der Phalänen

und hat fönischfadenförmige Fühler (à filets coniques) und eine Zunge. Er trägt seine Flügel niedergebückt dachartig mit sich berührenden Innenrändern der Vorderflügel (en toit à vive-arête, mais évasé). Die Farbe der Ober- und Unterseite der Hinterflügel ist schmutzig weiß; die des Leibes gleichfalls. Der Schmetterling zeigt weder deutliche Flecken noch Querstreifen.“ Auf „deutlich“ ist hier ein Gewicht zu legen; undeutliche sind also da. An der Abbildung, die zu groß ist — oder vielleicht sind manche Weichen so groß — sieht man davon gar nichts. Merkwürdig ist, daß die Vorderflügel ganz vergessen scheinen. Oder soll du dessus auf die ganze Oberflache gehen, und so viel bedeuten, wie du dessus de toutes les ailes?

### 54) † *Abrostola triplasia*.

R. I. 2. p. 246 et 320. t. 37. f. 1—3.

Linn. Phal. *Triplasia* 854. Esper IV. pag. 614. Noct. *Triplasia*.

Treitschke *Abrostola* 5, 3. p. 138. Degeer I. 3te Abh. S. 96.

Schon an der Gestalt in Figur 1. erkennt man die Raupe. Außerdem sagt R., daß sie grün und stellenweise weißlich sey, auf dem Rücken mit zwei braunen, weißlich eingefassten Flecken, über dem Hintern mit einem Fleck. So finden wir es genau in Rösel's Abbildungen und in der Natur. Es ist also kein Zweifel, daß auch der Schmetterling dahin gehört, dem R. eine achatbraune Farbe mit verschiedenen gelblichen Flecken ertheilt. — Esper ist nach Degeer's Vorgang der erste, der R. bey *Triplasia* ansieht. Kinn muß die Abbildung, wie Göze mit gutem Grunde vermuthet, übersehen haben, da die Raupe sehr kenntlich ist. Da das Eisat bey Kinn fehlt, so suchen wir es auch bey Fabricius vergeblich.

### 55) † *Cleophana linariae*.

R. I. 2. p. 248 et 320. t. 37. f. 4—7.

Degeer II. 1. p. 314. t. 8. f. 1—6. Esper IV. p. 313. Borkh. 4. pag. 317. Treitschke 5, 3. pag. 77.

Nur die Angabe, daß die Raupe — la sangsue — auf *Linaria* lebt, brachte mich darauf, worauf mich die verschiedensten Abbildungen nicht gebracht hätten, hier unsere Einkrautentle zu vermuthen. Dann fand sich auch, daß die Verfasser des Wien. Verzeichnisses, Degeer, Esper und Wockhausen diese Abbildungen schon kannten. Die Raupe beschreibt Reaum. als kößlich, glatt, pergalt, weißlich mit einem gelben Rückenstreifen; an jeder Seite ist erst ein aus schwarzen Punkten zusammengefügter, dann ein gelber, darauf ein schwarzer Streif. —

„Die Schmetterlinge tragen ihre Flügel dachförmig; die vordern sind oben grau; ein helles Braun und ein graulichweiß, zu Punkten und Zügen darauf geworfen, geben ihnen eine sanfte und ziemlich angenehme Farbe.“ —

Dieß sind die wichtigsten Merkmale der *Cleoph. Linariae*. — Treitschke zweifelt an der Richtigkeit der Wockhausenschen Angabe, daß die Raupe noch im September gefunden werde. Ich selbst traf zu Anfang des Septembers an 20

Stück, groß und klein, und die letzten verspannen sich in den letzten Tagen dieses Monats. Daran ist aber nicht bloß das kältere Klima Norddeutschlands Schuld; denn auch bey R. verpuppten sich einige Raupen erst im Anfang des September.

### 56) *Acronycta euphorbiae*.

R. I. 2. p. 249 et 321. t. 37. f. 8. 9. 10. 15.

H. 1. p. 149 . . . t. 4. f. 14 — 16.

Treitschke — 5, 1. p. 40.

Die Raupe erhielt R. zu Ende des Octobers aus der Gegend von Tours, wo sie auf Wolfsmilch gesammelt worden waren. Ihre Beschreibung stimmt mit der von Brahm in Scriba's Beiträgen nach der Natur gegebenen genau überein. „Sie ist haarig, aus der Gattung derer, die 10 Haarbüschel auf jedem Ringe haben, von denen die zwey obersten sich nicht in der Peripherie des Kreises befinden, der durch die acht andern geht. Diese Haarbüschel, die nicht sehr stark sind, machen kein Hinderniß, die verschiedenfarbigen Streifen zu sehen, womit der Körper geziert ist. Die Mitte des Rückens entlang geht ein schön schwarzer Streif, der von einem weißen oder gelben zu beiden Seiten eingefast wird. Unter diesen ist ein schwarzer Streif; darunter ein rother (rouge de rocou) mit etlichen schwarzen Flecken; endlich kommt ein brauner Streif. Die ganze Oberseite des ersten Ringes ist roth.“

Die sehr schlechten Abbildungen der Tafel 37 sind wahrscheinlich die Ursache, daß sie noch von keinem Schriftsteller erkannt worden sind. Noch weit schlechter ist die Abbildung des Schmetterlings im zweyten Theile der Memoiren gerathen; doch konnte sie nicht leicht besser ausfallen, da R's. Schmetterling, als er ihn erhielt, abgestürzte Flügel hatte. Was er davon bemerken konnte, bestätigt die Richtigkeit meiner Benennung: „wo der Staub geblieben war, waren sie weißgrau (gris-blanc).“

### 57) † *Acronycta rumicis*.

R. I. 2. p. 251 et 321. t. 37. f. 11. 12.

I. 1. p. 385 et 424. t. 15. f. 6.

H. 2. p. 223 et 272. t. 34. f. 8.

Degeer II. 1. pag. 298. Treitschke — 5, 1. pag. 38.

Raupe und Schmetterling sind im ersten Theile gleich unkenntlich; viel besser ist die letztere im zweyten Theile dargestellt, und hiernach erkennt man die Art sicher als *Acronycta rumicis*. R. nährte sie mit Nessel, mit der aristolochia, mit Portulak, mit Ampfer und mit andern Küchenkräutern. Die Beschreibung im ersten Theile ist nach seinem eigenen Geständnisse mangelhaft: „jeder Ring hat 8 Höcker, welche kurze, dürftige Haarbüschel von braunrother Farbe tragen; an jeder Seite sind zwey Bänder weißer Flecken.“ Im zweyten Theile hilft er dem Mangel ab, indem er die orangefarbenen Flecken auf dem Rücken — die jedoch nicht immer sichtbar sind — nachträgt: „tout du long du dos elle a sur chaque anneau deux taches d'un rouge-orange.“ Wenn auch durch alles diese die Raupe von *Rumicis* erkennbar ist, so würde doch in einer scharfen, untafelhaften Charakteristik dieser Raupe die Angabe verlangt werden, daß die unterste weiße oder gelbliche Fle-

ckenreihe an der Seite, rothgefleckt ist. Weit weniger lästig, als diese Farbenbeschreibungen, fällt die auf *Rumicis* genau passende Beschreibung des Puppengehäuses, in das gerissenes Papier gemengt ist, und des Geräusches, welches die Puppe Viertelstunden lang verursacht, wenn sie in ihrer Wohnung beunruhigt wird. Den Grund des Geräusches hat er aber falsch angegeben; hätte er das Gespinnst geöffnet, so würde er die wahre Ursache leicht eingesehen haben. — Der Schmetterling „gehört zu der Gattung der Nachtschmetterlinge, deren innerer Theil der Flügel sich nach dem Körper formt, und dessen Form deutlich bemerken läßt. Eine Mischung von Schwarzbraun und Weiß bilden die Farben oder vielmehr die Nuancen von grauen Farben auf der Oberseite der Vorderflügel.“ — Hiermit habe ich aber nicht allein meine, sondern auch Degeers Meynung dargehan, der alle Rische, hieher gehörigen Bilder richtig zusammengestellt hat.

Raumur hat sich I. 1. S. 424 versehen, indem er schreibt chenille rase; auf S. 385 heißt es richtig chenille velue.

### 58) *Bryophila glandifera*?

R. I. 2. p. 255 et 323. t. 39. f. 1 — 4.

Treitschke — 5, 1. p. 58 et 10, 2. p. 10.

Die Raupen fanden sich zu Ende Juny auf einer Mauer der Tuilleries erwachsen oder versponnen. Zum Gespinnste verwandten sie Steinchen und Körnchen der Mauer. Sie waren 16füßig, bräunlichgrau (d'un gris un peu brun), längs des Rückens mit einem weißen Streif; unterhalb desselben ziemlich behaart. Zu Anfang August erschienen die Schmetterlinge. Sie hatten borstenförmige Fühler und eine Zunge; die Flügel fast horizontal; die zwey innern Seiten der Vorderflügel erhoben sich jedoch ein wenig über den Rücken. Die Grundfarbe der Oberseite der Vorderflügel ist ein grünliches Grau; ein weißes Grau bildete Flecken und Wellen, die von dem erstgenannten Grau eingefast wurden. Die Unterseite der vier Flügel war ein weniger weißes Grau als das der Vorderflügel. — Bey Treitschke finden wir die Behaarung der Raupe nicht erwähnt und eine grüne Grundfarbe (10, 2. p. 10) angegeben. Allein auch bey ihm hat der Rücken eine weiße Längelinie, und nach der Beschaffenheit der Perla zu urtheilen, muß *Glandifera* eine Behaarung haben. Ich glaube, daß die angedeuteten Abweichungen keine bedeutenden Hindernisse für die Richtigkeit meiner Bestimmung verursachen, zumal wenn man bedenkt, daß R's. Raupen völlig ausgewachsen und vielleicht schon infärbt waren.

Aus der Nahrung der Raupe ersieht wir schon, daß sie auf keinen Fall zu Noct. oleraceae gehören kann. Linne allegiert Figur 4. zu dieser Gule mit einem Fragezeichen; sah er vielleicht die dort gegebene Unterseite für die Oberseite an, so daß er Fig. 3. nicht für dieselbe Art hielt? Fabricius ist seiner Sache viel gewisser, obgleich er auch nur Fig. 4. anführt; er läßt auch das Fragezeichen weg! Bey Esper und Borthausen fehlt dieses Stüt billiger Weise.

### 59) *Bryophila*? — ?

R. I. 2. pag. 256.

Es wird sich wahrscheinlich nur in Charenton selbst entscheiden lassen, was für eine Art R. vor sich hatte. Er fand die Raupen auf den Flechten der Mauern; sie hatten die Größe der Raupe von *Pontia rapae* und waren glatt und bläulich. Weiter sagt er von ihrem Aussehen nichts; sondern er beschreibt nur noch die Weise, wie sie grünes Baummoos zu ihrem Gespinnste benutzten. So verfahren mehrere *Bryophilaraupen*. Ob etwa *Spoliatricula* gemeint seyn sollte? Treitschkes Beschreibung der Raupe (S. 1. S. 65) läßt an diese denken. Ich erinnere aber, daß ich die Raupe von *Spoliatricula* an den Flechten und Moosen alter Zünne in Berlin oft fand, daß sie aber zu Treitschkes Beschreibung wenig paßte. Einstweilen möchte aber behauptet werden können, daß R. Raupe eine *Bryophila* ist.

#### 60) *Bryophila*? — ?

R. I. 2. p. 257 et 321. t. 37. f. 13. 14.

Auch von diesen Raupen hat R. die Schmetterlinge nicht gesehen. Er erhielt sie Ende May von Lugon in Poitou, und vermuthet fast, daß sie mit der vorigen Art einerley seyen. Ihr Gespinnst war aber ganz anders. Sie waren Ende May erwachsen, 16beinig, sehr kahl; ihre Grundfarbe eine Mischung von röthlichem Violett und Dunkelgrün, wobey eine Weinfarbe hervorgebracht wurde (ce qui composoit une couleur vineuse). Auf jeder Seite hatten sie in der Höhe der Lufthöhle einen braungrünen Streifen." Sie fraßen Baummoos (de la mousse d'arbre).

Lithosien können sie nicht gewesen seyn, da diese nicht très-rases sind.

#### 61) *Hereyna strigulalis*.

R. I. 2. p. 258 et 322. t. 38. f. 1—6.

Treitschke — 7. p. 187.

Reaumur erhielt aus den Raupen keine Schmetterlinge. Die ganz eigenthümlichen Gehäuse, in denen die Puppen liegen, und deren Verfertigung R. weitläufig beschreibt und durch Figuren erläutert, sind allein der zweyten Familie der Gattung *Hereyna* Tr., oder der Gattung *Nola* Leach eigen. Es ist nur die Frage, welche Art R. vor sich hatte. S. 271 sagt er: „die Zahl ihrer Beine (vierzehn) und die gelblichweiße, fast fleischfarbige Haut, verbunden mit der rothgelben Farbe der Haare, sollen sie kenntlich machen helfen. Hiemit stimmt die Treitschkesche Beschreibung von *Strigulalis* sehr gut, nur daß in der letztern von den Haaren nichts gesagt ist. Diese Raupe ist, wie ich aus Erfahrung weiß, so gut behaart, wie ihre Gattungsverwandte *Palliolalis*; bey mir machte sie sich, ausnahmsweise, gar kein Gespinnst, entwickelte sich aber zu Anfang July zu einem vollkommenen männlichen Schmetterling.

#### 62) *Tortrix* — ?

R. I. 2. p. 272 et 323. t. 38. f. 7—9.

Folgendes ist alles, was R. von dieser Art sagt: „ich habe auf einem Eichenblatte eines dieser nachenförmigen Gespinnste aus reiner, weißer Seide gefunden, und daraus zu Anfang July einen kleinen Schmetterling erhalten, dessen Vorderflügel oben eine Mischung von Grau und Braun haben, und der seine Vorderflügel so zusammengerollt trägt, daß der eine Flügel ganz nach der andern Seite hinüber liegt und einen großen Theil des andern Vorderflügels verdeckt.“ Dieses wäre

unbezweifelt *Tortrix revayana*, wenn nicht die Haltung der Flügel in der Ruhe, die auch Fig. 8. dargestellt wird, durchaus widerstrebt. Von den Pyraliden und Wiskern mit nachenförmigem Gespinnste trägt kein einziger seine Flügel zusammengerollt wie Fig. 8., und da in diesem Punkte bey R. kein Irrthum möglich scheint, so müssen wir uns weiter umsehen. Unter den Tineaen machen nur die Plutellen (*Xylostella*, *Fissella*, *Vittella*) nachenförmige Gespinnste. Diese weichen aber in der Gestalt so wesentlich von jenen ab, daß R. sie gewiß ausführlich beschrieben hätte. Hierzu kommt, daß keine *Plutella* in der Größe und Flügelbreite, wie Fig. 9., bekannt ist, auch daß keine ihre Flügel so sehr zusammenrollt. Wenn also keine Vertauschung der Schmetterlinge bey R. vorgefallen ist, die ich jedoch als wahrscheinlich annehme — ein Gehäuse von *Revayana* und eine Tinea, vielleicht eine *Phycis* —, so ist seine Art in Deutschland noch ganz unbekannt und durch die Flügelhaltung, verbunden mit der Form des Gespinnstes, als eigne Gattung sehr kenntlich characterisirt.

Gesfroy gebet dieses Schmetterlings (S. 2. 190) bey seinem *maneu à points*. Mag dieser Schmetterling mit *Lispe cribrella* Tr., wofür ich ihn hatte, einerley seyn oder nicht, so ist er doch von R's. Schmetterling sehr verschieden. Dieser hat auf den Vorderflügeln un mélange de gris et de brun, jener aber hat les ailes supérieures d'un blanc argenté avec deux bandes de points noirs.

#### 63) *Halias prasinana*.

R. I. 2. p. 272 et 324. t. 59. f. 7.

p. 284 p. 326. t. 40. f. 7—9.

Treitschke — 8. p. 4.

Größe und Gestalt des caffeebraunen Gespinnstes (d'un brun café) zeigen, daß der Schmetterling *Prasinana* oder *Quercana* seyn muß; daß er nun *Prasinana* ist, geht aus der Angabe der Zeit hervor, in der R. die Raupe fand, nemlich Ende October. Sonderbar muß es scheinen, daß er diese Art in derselben Abhandlung wieder abbildet und beschreibt, ohne sich an die Fig. 7. auf Tafel 39. im Geringsten zu erinnern. „Sie (die Raupe) ist kahl, 16füßig, vorn dicker als hinten; ihre Farbe schön grün, auf jeder Seite mit einem schmalen, citrongelben Streifen. Der Vorderrand des ersten Ringes ist eben so gelb. Das Gespinnst von röthlichbrauner Seide.“ Hiermit darf man nur Rösels Abbildung (IV. t. 22.) vergleichen, um die genaueste Uebereinstimmung mit *Prasinana* zu erkennen. Die Schmetterlinge bekam R. weder aus der S. 272, noch aus der S. 284 beschriebenen Raupe. Wie er aber bey der zweyten Raupe nicht an die erste denken konnte, ist dadurch zu erklären, daß er die letztere auf der Reife fand, wo er sie nur wenig ansehen und noch weniger beschreiben konnte, woher er sie auch „schön grün“ nennt; ferner machte sie ein dunkleres Gespinnst, vielleicht, weil sie einen Parasiten nährte (die Bezeichnung des Gespinnstes als brun café scheint jedoch eben nicht die angemessenste zu seyn); wenn er sie nun gar noch einige Jahre früher fand als die zweite Raupe, so mußte er selbst beyde wegen dieser Verschiedenheiten für zwey verschiedene Arten halten.

#### 64) \* *Halias chlorana*.

R. I. 2. p. 273 et 324. t. 39. f. 5. 6.

R. II. 1. p. 299 et 316. t. 18. f. 1—7.

Linn. Phal. Clorana 876. Fabr. Pyr. Clorana 3, p. 244. Degeer II. 1. pag. 350. Clorana. Treitschke Halias Clorana 8. p. 10.

Die Raupe lebt nach R. in der Mitte eines Blätterbüschels der Weide; sie macht im August ein nachenförmiges Gespinnst. Der Schmetterling trägt die Flügel als ein ziemlich spitzes Dach, und die Oberseite der Vorderflügel ist ein schönes, zartes Grün, welches nur rings herum einen glänzenden, grünlichweißen Rand hat."

Man kann hier *Chlorana* nicht verkennen. R. erhielt, wie auch andere Schriftsteller, seine Schmetterlinge im Anfang September (S. 276); soviel Raupen ich aber bey Berlin, Frankfurt und Glogau sammelte, alle Gespinnste überwinternt und gaben die Schmetterlinge im Frühjahr, zu welcher Zeit und im Sommer bis zum July hin ich sie auch im Freyen öfters fang.

Linne hat das Citat aus dem zweyten Theile der Memoiren weder im Systema naturae, noch in der Fauna, bey Phal. clorana, wohl aber im Syst. nat. 875 bey Viridana, wohin es, da Viridana auf Eichen lebt und kein kahnförmiges Puppengehäuse macht, offenbar nicht gehört. Fabricius hat es bey Viridana beygehalten, zugleich aber auch an die richtige Stelle, zu Clorana, gesetzt.

### 65) *Penthina (Sarothrips) revayana*.

R. I. 2. p. 276.

II. 1. p. 317. t. 18. f. 8.

Treitschke — 8. p. 22. Degeer II. 1. pag. 348. No. 7.

Aus Gespinnsten, die R. für dieselbe Art mit *Chlorana* hielt, kamen ihm auch Schmetterlinge hervor, "die ihre Flügel fast horizontal trugen und deren Vorderflügel oben achatbraun (dun brun couleur d'agate) waren, welche Farbe Wellen und Flecken bildete, mit gelblichem Weiß." Die Abbildung stellt die Schmetterlinge unverkennbar als *Revayana* dar. — R. vermuthet selbst, daß *Revayana* nicht eine Art mit *Chlorana* ausmachen kann, und daß er aus Versuchen verschiedene Raupen zusammengebracht.

### 66) \* *Halias quercana*.

R. I. 2. p. 277 et 324. t. 39. f. 8—14. p. 325. t. 40. f. 1—6. 10.

Degeer II. 1. p. 295. Phal. Prasinana. Fabric. Pyr. Prasinaria 3, 2. pag. 243. Treitschke Halias — 8. p. 7.

Die Zeit, in der R. Raupen sich verwandelten, reicht allein zum Beweise hin, daß sie nicht zu *Prasinana* gehören. Sie waren in der Mitte des May erwachsen. Ihre Gestalt ist sehr richtig in Fig. 10. wiedergegeben; bey der so vielfach copirten Abbildung ist sie ganz falsch. Der Schmetterling wird S. 283 vollständig beschrieben, auch die bey R. vorkommende Bemerkung hinzugefügt, daß die Raupe, die Puppe und der Schmetterling grün sind. — Figur 10. gehört zufolge der Anmerkung S. 280 zu *Quercana*.

Fig. 1838. Heft 9.

Linne irrte sich, indem er Taf. 39. Fig. 13. 14. die Schmetterlinge von *Quercana* zu seiner *Prasinana* zieht, die durch den margo posticus alarum superiorum fulvus vest und ficher bestimmt ist. Fabricius hat dieselbe Stelle bey seiner *Pyr. Prasinaria*, welche Treitschke mit Recht, ungeachtet einiger widersprechender Citate, zu *Quercana* rechnet. Seinen Citaten nach hat Geoffroy dieselbe Art, *Quercana*, zweymal beschrieben, nemlich als *celadon* (2. S. 138) und als *chappe verte à bande* (S. 172). Zu beyden zieht er nemlich R. I. t. 39. f. 13. Seine zweyte Art ist bestimmt *Quercana*; die erste kann man, wenn man will, für *Prasinana* halten, weil diese eher auf den Vorderflügeln eine dunkle Mittelbinde hat: une large bande transverse un peu plus foncée (que le reste); cette bande est plus large vers le bord extérieur.

### 67) *Phalaena* — ?

R. I. 2. p. 285 et 330. t. 43. f. 1. 2.

Das abgebildete Gespinnst fand R. auf einem Feigenbaum. Der Schmetterling war schon heraus. Wir müssen R. glauben, daß es das Gespinnst eines Schmetterlings war, und dann kann es nur einem Nachtschmetterling angehört haben.

### 68) *Ornix (Coleophora) nov. spec.*

R. I. 2. p. 286 et 332. t. 44. f. 1—4.

Wahrscheinlich wird dieser Schmetterling noch lange nicht bekannt werden, da sein Vaterland Nocca in Arabien ist. Die Gespinnste fand der ältere Jussieu in einem Pack dorthier erhaltener Sonnenblätter. Aus den in ihnen gefundenen Häuten erkannte R., daß sie Schmetterlingen angehörten. Wir haben ganz ähnlich gebaute Gehäuse, nur von ganz schwarzer Farbe, z. B. von *Ornix pyrrolipennella* Tischeri, *Vibicippennella* Zell. msept., und daher schließe ich, daß jenes auch von einer Raupe aus der Fam. B. der Gattung *Ornix (Coleophora Hbn.)* verfertigt worden war.

### 69) *Phal. noct.* — ?

R. I. 2. p. 290 et 326. t. 40. f. 11—13.

Die Raupe fand R. Mitte July auf Luzerne; sie ist schmutzig weiß oder gelblich; schwarze Streifen bilden mehrere Längslinien. — Der Schmetterling kam 16—17 Tage nach der Verpuppung hervor. „Seine Vorderflügel liegen flach, mit den Innenrändern an einander und bilden daselbst eine scharfe Kante. Verschiedenes Braun, darunter auch Rußbraun und helles Braun, bildet auf der Oberseite der Vorderflügel eckige Flecken. Man sieht auch graue und gelbliche Flecken und Punkte darauf. Die Hinterflügel sind kürzer als die Vorderflügel. Alle 4 Flügel sind unten gelblichgrau; jeder Unterflügel mit einem sehr deutlichen, großen, schwarzen Fleck in der Mitte gegen den Vorderrand hin.“ — R. fand eine grünlche Raupe auf Mangold (Poirée) und andere ganz grüne auf einer Art Wolfsmilch (épurge, *Euph. lathyrus*). — Diesen Schmetterling kenne oder erkenne ich nicht. Die Raupenbeschreibung läßt sich allensfalls auf *Mamestra chenopodii* anwenden, nicht aber die Beschreibung des Schmetterlings.

### 70) *Trachea atriplicis*.

R. I. 2. p. 292 et 327. t. 40. f. 14. 15.

Linn. Phalaena — Treitschke Trachea — 5,  
2. pag. 66.

An dem Schmetterling kann man weniger Zweifel haben als an der Raupe. Von ersterem heißt es: „die Oberseite der Vorderflügel ist angenehm grünlich; Schwarzbraun, Gelblichweiß und ein schönes Grün find die Farben, mit denen sie geschmückt ist. Das Grün allein nimmt soviel Platz ein als beyde anderen Farben zusammen. Die Hinterflügel oben und alle 4 Flügel unten haben nur gemeine Farben, ein gelbliches Grau. Die Oberseite der Hinterflügel hat braunere Nuancen.“ — Auf der Abbildung sehen wir auch die charakteristische *littura media* (flava oder albicans) bispida Linne's. —

Die Raupe beschreibt R. gar zu kurz: „schmutzig weiß, mit Streifen, die von länglichen hellbraunen Punkten gebildet werden.“ Die bezeichnenden weißen, schwarz eingefaßten Punkte werden also übergangen, oder vielmehr, sie werden kurz hin hellbraun genannt. Am meisten vermißt man die zwei gelben, schwarz eingefaßten Flecken über dem After. Allein in der Abbildung der Raupe kann man, wenn man will, alle Zeichnungen mit dem Röselschen Bilde übereinstimmend und selbst den Augenspfleck durch einen kleinen Ring — in der halb so großen, also unentwickelten Raupe — angedeutet finden. Den Schmetterling will R. im August erhalten haben, einer ganz ungewöhnlichen Zeit, die sich aber doch nicht geradezu als unmöglich ansehen läßt.

An *Polia herbida* habe ich auch viel gedacht, bey welcher die Zeit des Auskriechens mehr den gewöhnlichen Erfahrungen gemäß ist. Allein hier stimmt die Zeit und das Aussehen der Raupe gar nicht, und ein Blick auf Fig. 15. verbietet auch, an den Schmetterling weiter zu denken.

Die breiten Flügel mit der grünen Färbung und dem zweyflügeligen, weißen Fleck deuten un widersprechlich auf *Trachea atriplicis* hin. Wenn die Raupe nicht passen will, der mag der Schwierigkeit durch die Annahme abhelfen, daß R. einen falschen Schmetterling zu seiner Raupe angibt, was ihm, dem so vielseitig Beschäftigten, so gut begegnen konnte, wie so vielen, die sich einzig und allein mit dem Studium der Schmetterlinge abgeben.

71) \* *Mamestra brassicae*.

R. I. 2. p. 288, 297 et 327. t. 41. f. 1—3.  
p. 298 et 327. t. 40. f. 16. 17.

Linn. Phal. — 852. Fabr. Noctua — 3, 2. p. 67. Degeer II. 1. p. 320. Treitschke *Mamestra* — 5, 2. p. 150.

Degeer ist meines Wissens der erste, der M. Beck bey dieser Art citirt hat, Esper, Fabricius und Treitschke sind ihm nachgefolgt und haben beyde Citate angenommen. Bey so vielen wichtigen Auctoritäten kann kein Zweifel an der Richtigkeit der Citate seyn. R. selbst ist ungewiß, ob die Raupe auf dem Kohl, Taf. 41., dieselbe wie die auf den Rüben (Taf. 40.) ist. Jene bezeichnet er S. 297. bloß als kahl und grün, diese als mehr oder weniger schön grün, mit einer bräunlichen Rückenader, an jeder Seite mit einem kleinen gelblichen Längsstreifen. Von jener hat er I. 1. S. 123 die Lebensweise so beschrieben, daß man *Noct. brassicae* erkennen muß. Er sagt

nehmlich, daß diese Raupen auf den Kohlfeldern Nachts in Menge auf den Pflanzen zu finden seyen, bey Tage aber unter der Erde versteckt liegen. Er fand sie aber nicht allein in grüner Farbe, sondern auch in brauner (il y a de ces chenilles vertes et brunes). — Die aus beyden Raupen kommenden Schmetterlinge bildet er ab und beschreibt sie, jeden besonders. Aus der Beschreibung läßt sich allenfalls ihre Identität vermuthen. Der aus der Kohltraupe hat braungraue Vorderflügel mit Schattierungen von Schwarz und Braungrau; bey dem andern hat „die Oberseite der Vorderflügel verschiedene Nuancen von Ruffarbe, welche wellenförmig sind, und von denen einige, mit dem Hinterrande parallele Streifen bilden.“ — Aus der chenille verte du chou erhielt R. den Schmetterling en moins d'un an, was ich nirgends bestätigt finde.

Esper irrt, wenn er meynet, — wozu ihn vielleicht Taf. 42. Fig. 1. 2. veranlaßt, — Taf. 41. sollte die braune Varietät der Raupe seyn. Denn sowohl S. 297, wie S. 327 heißt sie une chenille verte.

72) *Phal. noctua* — ?

R. I. 2. p. 299 et 328. t. 42. f. 1—4.

Die Raupen leben auf Kohl, Mohr und Ratterwurz. Die Raupe vom Kohl ist holzfarbig braun, wolflig, so daß der Leib mit verschobenen Birecken gezeichnet ist (nué de manière que son corps est marquée par des espèces de lozanges); die andern sind statt braun schieferfarbig. Der Schmetterling gehört zu denjenigen, deren Flügel sich etwas nach dem Körper formen; auf dem Rücken hat er vier Büsche; der vierte ist kaum merklich. Die Flügel sind ziemlich breit, die vordern graubraun, mit Schwarz, Grau und Braun verschiedentlich gezeichnet. — Ich kenne diese Art nicht.

73) \* *Cucullia verbasci*.

R. I. 2. p. 301 et 331. t. 43. f. 4. (5—11.)  
p. 47. t. 21. f. 14.

II. 1. p. 145. t. 3. f. 5?

Linn. Phal. — 850. Rösel I. noct. 2. tab. 28. Geoffr. 2. p. 158. La stricte brune du verbascum. Treitschke *Cucullia* — 5, 3. p. 127.

Von den Raupenbildern der ganzen 43sten Tafel gehört nur Fig. 4. hieher, welche mit Rösels guter, unbezweifelter Abbildung übereinstimmt. Sie zeigt nemlich an der Raupe zu beyden Seiten des Rückens auf den mittlern Ringen zwei große, schwarze, weit von einander getrennte Flecken, das Merkmal der *Cucullia verbasci*. Die Rösche Beschreibung ist so allgemein, daß sie auf die folgende Art auch paßt. Ob aber die Schmetterlinge Fig. 9—11. mit Linne hieher oder zu *Cucull. scrophulariae* zu ziehen sind, das wird, bey der großen Ähnlichkeit beyder Arten im vollkommenen Zustande, stets ungewiß bleiben. Wenn R. an den doch ziemlich auffallend verschiedenen Raupen keinen Unterschied bemerkte; so mußte er natürlich an den sehr ähnlichen Schmetterlingen gar keinen finden, deren Abbildungen auch gar wenig gelingen sind.

Es ist möglich, daß alle Figuren von 9—11. nur nach *Verbasci*, oder nur nach *Scrophulariae*, oder nach beyden Arten genommen wurden; unbezweifelt aber kann nur von diesen

zwey Arten, nicht aber von einer der einfarbigen *Cucullien* die Rede seyn. Wenn also Linne und mit ihm Fabricius Fig. 9 — 11. mit *Verbasci* vereinigen, so kann man keine gegründete Einwendung dagegen machen. Allein Linne führt außerdem Fig. 9 und 11. auch bey seiner *Umbratica* an, und das ist, wie leicht einzusehen, bestimmt falsch. Fabricius hat daher dieses Citat bey *Umbratica* weggelassen.

74) *Cucullia scrophulariae*.

R. I. 2. p. 331. t. 43. f. 3. 12. 13.

Treitschke — 5, 3. p. 130.

Gewiß ist diese Raupe von Fig. 4. verschieden; jeder, der sie im Freyen beobachtet hat, wird ihren Unterschied sogleich erkannt haben. Man darf nur Espers Abbildung, IV. Tafel 139. Fig. 1., die er unrichtig für *Verbasci* hält, vergleichen, um sie mit der Capieuirischen Beschreibung bey Treitschke übereinstimmend zu finden. Hier haben wir auf den mittleren Ringen auf dem Rücken zwey schwarze Flecken, deren jeder einen nach vorn offenen Bogen hinter sich hat und die gewöhnlich zusammenfließen. — Nach meinen Erfahrungen findet sich *Cucull. scrophulariae* zwar auch auf Wollkraut, aber nicht *Cucullia verbasci* auf *Scrophularia*. Da nun R. auch die *Scrophularia* als Nahrungspflanze angibt, so würde schon daraus folgen, daß er *Scrophulariae*-Raupen gehabt habe. — Figur 13., in welcher die Raupe mehr Ähnlichkeit mit Fig. 4. als mit Fig. 3. hat, ziehe ich deshalb hieber, weil sie die Hülfe Fig. 12. im weiter geduckten Zustande vorstellt (S. 332). Da Fig. 12. offenbar *Scrophulariae* ist, so kann Fig. 13. nicht gut *Verbasci* seyn.

75) \* *Acronycta pini*.

R. I. 2. p. 307 et 329. t. 42. f. 5 — 16.

II. 1. p. 143. t. 3. f. 1. 2.

Linn. Phal. — 846. Treitschke *Acronycta* — 5, 1. p. 30.

Die Raupe, und mithin die Art, ist sogleich an dem langen, fleischigen Horne (une pyramide charnue) auf dem letzten Ringe und an der breiten gelben Rückenstrieme (une belle raie jaune tout de long du dos) zu erkennen, wodurch jede Frage über die Richtigkeit des Namens beseitigt ist. Aus der Schmetterlings-Beschreibung allein würde man die Art gewiß nicht erkennen.

Linne und Fabricius, ihm nachfolgend, citiren hier als seltene Ausnahme nicht den Schmetterling, sondern nur die Raupen Fig. 5 und 6. Den Fehler im Wien. Verz., wo S. 67 R. chenille demi-velue de l'abricotier zu *Tridens* gezogen wird, hat Treitschke schon vollkommen berichtigt.

76) *Phal. bombyx* — ?

R. I. 2. p. 312 et 333. t. 44. f. 14. 15.

R. beschreibt nur die Raupe, da ihm der Schmetterling nicht auskam (S. 318). Sie lebte im May auf Eichen und hat „zu jeder Seite einen welligen Streifen von weißen Flecken, die nicht von Haaren herührten; außerdem ist sie rothgelb durch Haare, die nicht büschelartig stehen, sondern einzeln aus ver-

schiedenen Stellen der schwarzbraunen Haut hervorkommen. Ihr Gespinnst wird der Bauart nach mit dem von *Gastrop. crataegi* zusammengestellt.

77) \* *Gastropacha crataegi*.

R. I. 2. p. 313 et 332. t. 44. f. 5 — 13.

Linn. Phal. — 823. Ochsenh. *Gastrop.* — 3, p. 278. Degeer I. 5te Abbb. p. 143. t. 11. f. 18 — 21. II. 1. p. 214. *Bomb. crataegi*.

Eine Raupe fand R. auf Eichen, zwey auf Apfelbäumen. Von jener sagt er: „Das Merkwürdigste, was sie hat, und was sie zu einer ziemlich schönen Raupe macht, ist ein gelber Quersstreif (raie de couleur de souci), welcher den obern Halbkreis eines jeden Ringes einfaßt und sich an jeder Seite zurückkrümmt, um einem Theile der Breite des Ringes zu folgen.“ Die andern hatten einen Längsstreifen aus weißen Flecken, der jener fehlte. Die Schmetterlinge haben (S. 318) „aschgraue Vorderflügel (d'un gris qui tire sur le cendré), und auf jedem nur zwey weißlichere, dem Hinterrande parallele Streifen.“

Es muß wohl ein Versehen seyn, wenn Esper R. chenille demi-velue d'aube-épine citirt und Vorchhausen diese Bezeichnung nebst Taf. 44. Fig. 10. wiederholt. R. erhielt seine Raupen von Apfelbäumen und Eichen, was wir mehrmals gesagt finden. — Ein anderes Versehen kommt bey Fabricius vor.

Linne's Vorgänge folgend citirt er Fig. 10. den Schmetterling richtig bey *Bomb. crataegi* (3, 1. S. 460); aber außerdem führt er Fig. 7 — 10. noch bey seinem *Bomb. mali* (3, 1. p. 434), den er als verschieden von *Bomb. crataegi* beschreibt. F. 5. stellt die Apfelbaumraupe, F. 7. die Eichenraupe vor.

78) *Botys pallidalis*.

R. I. 2. p. 336 et 398. t. 49. f. 11 — 15.

Treitschke — 7. p. 59 et 10, 3. p. 22.

Es ist eben so gewiß, daß Linne sich in seiner Vermuthung irrt, als hier die angegebene, von mir oft erzogene Art beschrieben wird. Linne citirt nehmlich — und sogleich auch Fabricius — im Syst. Nat. 888 die Abbildung bey *Phalaena glyphica*, und gibt daher auch an: *habitat in verbascis*. Die Naturgeschichte von Noct. *glyphica* ist aber bekannt genug; man weiß, daß die Raupe nicht auf Wollkraut lebt, und daß sie und der Schmetterling (Kleemann Taf. 25.) ganz anders aussehen, als R. seine Art beschreibt. Man kann aus R. die Beschreibung der *Pallidalis* bey Treitschke ergänzen.“ Sie ist unter der mittlern Größe verhältnißmäßig ziemlich dick, 16keinig, gewissermaßen wurmähnlich. Die Farbe ist gelblichweiß, auf der obern Seite des Körpers mit 4 Reihen brauner Höckerchen, an den Seiten mit zweyen, und dazwischen stehen verschiedene kleinere Höckerchen. Sie hält sich ziemlich gern nahe am obern Ende des Wollkrautes auf; wenn man eine findet, so kann man auf mehrere rechnen. Sie nähren sich vom Stengel und von der Blattsubstanz, nachdem sie die Wolle entfernt haben. — Mehrere Raupen machten gegen Ende August ein weißes Gespinnst, worin sie erst nach 9 Monaten zu Puppen wurden. Die Schmetterlinge kamen Ende Juny und Anfang July heraus;“ sie tragen die Flügel flach auflegend; die Vor-

der Flügel oben sind zart weißgrau mit etwas Gelblichem: das Ganze bildet Wellen. Die Vorderflügel verbergen die Hinterflügel.“ — Sobald man auf unsere Art gerathen hat, findet man auch die Zeichnungen auf den Vorderflügeln in Fig. 14. ziemlich übereinstimmend.

79) \* *Botys urticae*.

R. I. 2. p. 339 et 398. t. 49. f. 16 — 18.

Linn. Phal. *Urticata* 873. Geoffr. 2. p. 135. *La queue jaune*. Treitschke *Botys Urticae* 7. pag. 106.

Die Ansicht der Abbildung reicht allein zum Erkennen dieser Art hin, weshalb auch R. hinsichtlich der Vertheilung der Flecken, der Wellen, der schwarzen Ränder auf sie verweist. Sonderbar ist, daß er von der Farbe des Leibes nichts sagt. Man sieht hier wieder, wie wenig ihm Farbenbeschreibungen Freude machten. Von *Pallidalis* unterscheidet er den Schmetterling auch durch die Flügelhaltung, die zwar auch ganz flach ist, ist, bey der aber ein Theil der Hinterflügel frey und sichtbar bleibt.

80) \* *Liparis dispar*.

R. I. 2. p. 341 et 390. t. 45. f. 1 — 5.

p. 12 et 48. t. 22. f. 5. 6. 8 — 10.

p. 58 et 87. t. 24. f. 1 — 4.

I. 1. p. 208. t. 3. f. 1. 3 — 5.

p. 212. t. 4. f. 1 — 4. 6 — 8.

II. 1. p. 74 et 140. t. 1. f. 11 — 15.

II. 2. p. 235 et 271. t. 34. f. 3.

Linn. Phal. — 821. Geoffr. 2. p. 112. *Le zigzag*. Ochsenh. *Liparis* — 3. p. 195.

Reaumur nennt die Raupe *chenille à oreille*, du chène et de l'orme, und unter diesem Namen führt sie bey ihm oft wieder, da er an ihr wegen ihrer Gemeinheit die Metamorphosen der Raupen am leichtesten beobachten konnte. Die Schmetterlinge sind schon in der Abbildung so kenntlich, daß man nicht erst die II. 1. S. 74 gegebene Beschreibung vergleichen darf.

81) \* *Saturnia piri*.

R. I. 2. p. 349 et, 365, 370 et 394. t. 47. (excl. f. 4.) t. 48.

p. 199 et 236. t. 22. f. 13. 14. 15. ?

p. 237 . . . t. 33. f. 1. 2. 3. ?

I. 1. p. 211. t. 3. f. 2. 9. ?

p. 216. t. 4. f. 16.

p. 244 et 247. t. 6. f. 18.

p. 317 . . . t. 7. f. 9. 10.

p. 279 et 322. t. 8. f. 16 — 19.

Linn. *Phalaena Pavonia* 810. Geoffr. 2. p. 100. *Le grand-paon de nuit*. Ochsenh. *Sat. Piri* 3. pag. 2.

Die Raupe bezeichnet R. ganz kenntlich, indem er sie die Birnbaumraupe mit türkisblauen Höckern nennt (*La grosse chenille du poirier à tubercules de couleur de turquoise*). Außerdem darf man nur die Abbildung des Schmetterlings ansehen, um keinen Zweifel mehr zu haben.

Die Fig. 9. auf Taf. 3. in I. 1. kann nur mit Wahrscheinlichkeit hieher gerechnet werden. Sie ist nemlich von einer grosse chenille à tubercules) genommen, und dieses Bezwort grosse bezeichnet bey R. gewöhnlich die *Saturn. piri*. Wenn aber diese Figur zu *Sat. piri* gehört, so kann auch an Fig. 2. nicht gut gewweifelt werden. Wahrscheinlich ist es wenigstens nicht, daß R. die Vorderbeine von *Carpini*, die Mittelbeine von *Piri* abgebildet habe. — Das mit einem Knopfe versehene Haar auf Taf. 6. in I. 1. gehört zu *Piri*, wie der Vergleich der Kösselchen Bilder von *Carpini* und *Piri* lehrt. — Viel zweifelhafter ist Taf. 33. Fig. 13., wo ich nur aus den Worten: die Fäden an den Schäften dieser Raupenarten sind fast so dick wie Menschenhaare, auf unsere Art schließe. Der Zusatz „dieser Raupenarten“ schwächt die Sicherheit meines Schlusses sehr; doch sehe ich an 4 *Carpini*-Schäften, die ich eben vor mir habe, daß man ihre Haare wegen größerer Feinheit weit weniger mit Menschenhaaren vergleichen kann. — Figur 14 und 15. erscheinen, wenn man die Erklärung von Fig. 13. liest, schwerlich etwas anderes als Fäden derselben Raupe zu seyn und eben so die Figuren der Tafel 33.

82) \* *Saturnia carpini*.

R. I. 2. p. 365 et 396. t. 49. f. 1 — 10.

p. 399. t. 50.

p. 44. t. 21. f. 4.

I. 1. p. 114 et 134. t. 2. f. 11 — 15.

Linn. Phal. *Pavonia* 810. Geoffr. 2. p. 101. *Le paon-moyen* und *Le petit paon*. Ochsenh. *Sat. Carpini* 3. p. 6.

Reaumur unterscheidet einen mittleren und einen kleinen *Papillon-paon*; aber, wie schon Esper bemerkte, so sind diese Varietäten derselben Art. Das mittlere Nachtpfauenauge hat im männlichen Geschlechte „eine weinartig braune Oberseite der Vorderflügel (brun vineux) mit vielen purpurfarbenen Zügen, Wellen und Flecken. Die Hinterflügel oben sind schön gelb (jaune souci) mit einer schwarzen Binde nahe am Hinterrande. Die Unterseite der Vorderflügel ist bläulich gelb als die Oberseite der Hinterflügel. Die Unterseite der Hinterflügel ist wie die Oberseite der Vorderflügel weinartig braun, mit Purpurfarbe und Schwarz gezeichnet.“ Es ist klar, daß hier nicht an den Mann von *Sat. piri*, der so aussieht wie das Weib, gedacht werden kann. — Den Mann seines kleinen Paon hat R. seiner Meinung nach nicht gehabt (S. 372 je n'ai eu que le petit paon femelle). — Das Weib seines mittlern Pfauenauges und das des kleinen unterscheidet er hauptsächlich nur dadurch, daß das letztere einen größeren rothen Fleck (S. 372) in der Vorderflügelspitze hat. Dieses ist aber kein Unterschied von *Spini* und *Carpini*, und man darf nur auf die Raupen sehen, aus denen R. seine Schmetterlinge erhielt, um zu erkennen, daß er nur unbedeutende Varietäten unterscheidet. S. 396 heißt es: die Raupe vom kleinen Paon ist grün mit rosenfarbenen Höckern und wenigen schwarzen Flecken



auf jedem Ringe; S. 399: Die Raupe vom mittlern Paon hat gelbliche Höcker, und in ausgewachsener Größe ist jeder ihrer Ringe mit einem schwarzen Bande eingefasst und sonst schön grün. — Die Raupe von *Sat. spini* ist aber vom Cy an schwarz.

Die Figuren 8. 9. 10 der Tafel 49 sollen (S. 375 und 397) für alle R'sche Arten gelten, ohne daß angegeben wird, nach welcher derselben sie verfertigt worden sind. Da sie aber bey den Bildern der *Sat. carpini* stehen, so nehmen wir sie mit mehr Wahrscheinlichkeit zu dieser, als zu *Sat. piri*.

REAUMUR Mém. II. 1737. 8. [1736. 4.]

83) \* *Euprepia mendica*.

R. II. 1. p. 78 et 139. t. 1. f. 5. 6.

I. 1. p. 126 et 135. t. 2. f. 16 — 18.  
p. 247. l. 6. f. 14.

I. 2. p. 309.

Linn. Phal. — 822. Fabr. Bombyx — 3, 2. 452,  
O. *Euprepia* — 3. p. 351.

Bei diesem Schmetterling habe ich die Schwierigkeit recht empfunden, die R. seinen Lesern dadurch verursacht, daß er die Beschreibungen der verschiedenen Stände eines Insectes nicht zusammen liefert. Härte ich die Erklärung der ersten Kupfertafel des 2. Theils übersehn, so würde ich, auf die Treue bauend, die Zuverlässigkeit *Esper's*, *Ochsenheimers* und *Borkhausens* in Zweifel gezogen haben. Andere Schriftsteller, namentlich der sorgfältige *Knoch*, haben jene wichtige Stelle nicht bemerkt. Aus derselben erfieht man aber, daß alle mit *Mendica* verwandten Arten, außer *Lubricipeda*, ihren Raupen, und folglich auch ihren Schmetterlingen nach, von R. für einetley gehalten wurden. Sie lautet: „Fig. 1. (der ersten Tafel von II. 1.) stellt eine Art Hasenraupe vor; diese hier ist ganz schwarz, und zwar sehr schön schwarz; nur ihr Kopf ist röthlich oder fast roth. Tom. I. tab. 1. (lies 2) fig. 16. sieht man eine andere Hasenraupe, welche ganz gelbrothlich [tousse], ein wenig ins Braune ist. Man findet noch eine andere, deren Haare beynähe schwarz sind, und die auf dem Rücken einen dunkelgelben Längsstreifen führt. Diese drei Raupen leben auf denselben Pflanzen; ihre Haare sind auf dieselbe Weise vertheilt; sie laufen mit gleicher Schnelligkeit; sie gehen alle drei in die Erde, um sich zu verwandeln; ihre Puppen sind ähnlich, und liefern Schmetterlinge, zwischen welchen man kaum merkliche Verschiedenheiten findet, z. B. einige kleine Abweichungen in der Vertheilung der schwarzen Punkte auf ihren Flügeln.“ — Es ist aber bekannt, daß die Raupe von *Mendica* rothgelbe Haare hat, und folglich gehört nicht allein die Abbildung aus I. 1. hierher, sondern auch die in I. 2. p. 310 gegebene Bezeichnung: *très-converte de poils roux*. Zu dieser Raupe muß man den S. 78 in II. 1. beschriebenen Schmetterling ziehen, von welchem es heißt: „Ich habe aus denselben Raupen Männer erhalten, deren ganze Oberseite der Vorderflügel bräunlich mäusegrau war; ihre Vorderbeine und die ganze Umgebung des Kopfes war röthlich gelb, und das Uebrige des Körpers mit grauweißlichen Haaren besetzt, aber die Unterseite der Vorderflügel und die beyden Seiten der Hinterflügel waren grau.“ So sieht der Mann von *Mendica* aus, und daher sind die zwey männlichen Schmetterlinge der

Fig. 1838. Heft 9.

Fig. 5 und 6 diese Art. Weiter sagt R., er hätte sie nicht für dieselbe Art mit den weißflügeligen Weibchen gehalten, wenn er nicht gesehen hätte, daß ein grauer Schmetterling sich auf einen weißen setzte, wie um sich zu begatten (*comme pour s'y accoupler*) — in der Erklärung der Tafel ist dieses *comme* weggelassen, und mehr als 16 Stunden sitzen blieb. Ganz richtig bemerkt *Knoch* (der von einer *Lubricipeda* mit weißen Flügeln spricht, ohne der so völlig verschiedenen Raupe zu erwähnen, bey dem also einiges zu berichtigen ist), daß die R'schen Abbildungen nichts von einer Begattung zeigen, und daß die abgebildete Stellung überhaupt nicht von Schmetterlingen zu dem Zwecke angenommen wird. Eine vollzogene Begattung drücken auch R's Worte im Texte nicht aus; R. schließt nur aus jener vertraulichen Stellung, daß beyde Schmetterlinge als Gatten zusammen gehörten.

84) *Euprepia menthastris*.

R. II. 1. p. 77 et 139. t. 1. f. 2 — 10. (exc. 5 et 6.)

O. — 3. p. 354. Rüssel I. noct. 2. t. 46. Geoffroy 2. p. 118 la phalène tigre. Linn. Phal. *lubricipeda*, α. p. 829.

Von der Raupe dieses Spinners haben wir bey R. nur eine Diagnose (S. 139): „Man findet noch eine andere Raupe, deren Haare fast schwarz sind, und die auf dem Rücken einen dunkelgelben Längsstreifen führt.“ — (Ob I. 2. t. 21. f. 12. p. 11 et 46. der *Menthastris* oder der *Urticae* angehört, ist ungewiß, weil wir nichts über sie erfahren, als daß sie einer Hasenraupe angehört. Das sehr glänzende Schwarz der Puppe beweist aber, daß sie eine von beyden seyn muß). Um die Schmetterlinge als *Menthastris* zu erkennen, braucht man aus der Beschreibung S. 77 nur zu wissen, daß die Vorderflügel weiß seyn und 4 bis 5 Reihen schwarzer Punkte haben sollen.

R. ertheilt dieser Art eine unmerkliche Zunge (*qui n'ont point de trompe sensible*). Linne fand eine so merkwürdige, daß er *Lubricipeda* (alis albidis *Rösel* tab. 46) unter die *Bombyces spirilingues* stellte, während er *Mendica* einen *Bombyx elinguis* nannte. *Esper* ist ihm darin nachgefolgt, und ich kann mir durchaus keinen andern Grund denken, warum *Stephens* in seinem Catalog aus *Mendica* eine Gattung *Diaphora* (genus 73), und aus *Menthastris*, *Urticae* und *Lubricipeda* eine andere, *Spilosoma*, verfertigt, als den, daß ihm der Linne'sche Unterschied richtig und hinreichend schien. Ich habe die Zungen dieser vier Arten untersucht, und gefunden, daß sie bey allen ungefähr die Kopfeslänge hat, daß ihr Unterschied also ganz unbedeutend ist, und daß die eine Art so gut wie die andere, *elinguis* oder *spirilingus* heißen muß.

*Sabricius* citirt den R. falsch bey seiner *Lubricipeda* als *flavescens*, wie er denn auch das *Cyat* aus *Knoch*, welches zu *Mendica* gehört, zu *Menthastris* gesetzt hat.

85) *Euprepia urticae*.

R. II. 1. p. 139. t. 1. f. 1.

I. 1. p. 247. t. 6. f. 12. 13.

O. — 3. p. 357. *Esper* III. tab. 83. fig. 2.

*Ochsenheimer* beschreibt die Raupe von *Urticae* als einfachig dunkelbraun mit rothgelbem Kopf, ohne Rückenstreif



und hellblaue Würzchen. Diefelbe Raupe bezeichnet R. a. a. D. S. 139 als „ganz schwarz, und zwar sehr schön; nur ihr Kopf ist röthlich oder fast roth“, und Fig. 1. stellt sie vor. Sollte man Anstoß an *Ochsenheimers* „Dunkelbraun“ und R's „Ganz schwarz“ nehmen, so darf man nur bey letzterem weiter lesen, bis man auf die Raupe von *Menthastris* kommt, um aus dem Gegenfage, den seine drey Arten von Raupen bilden, von der Wahrheit meiner Bestimmung überzeugt zu werden. Die Schmetterlinge finde ich bey R. nirgends erwähnt, wahrscheinlich, weil ihm die Zahl der Punkte anzugeben unwichtig schien, oder vielleicht erhielt er aus diesen Raupen keine Schmetterlinge. (Der beste Unterschied von *Menthastris* und *Urticae* besteht darinn, daß jene auf der Unterseite der Hinterflügel immer einen großen schwarzen Fleck hat, der bey dieser durchgängig fehlt.)

86) \* *Bombyx mori*.

R. II. 1. p. 85. 104 et 149. t. 5. f. 1—3. 13.

I. 1. p. 209. t. 3. f. 6—8.

p. 214. t. 4. f. 5. 9. 14. 15.

p. 217. t. 5. f. 1—4.

I. 2. p. 196 et 241. t. 34. f. 12—15.

Linn. — 817. Borkh. 3. p. 45. Geoffroy 2. p. 116. Le ver-à-soie.

Die Benennung ver-à-soie, die in jeder der aus R. angeführten Stellen vorkommt, macht den Schmetterling hinreichend kenntlich.

Num. I. 1. t. 3. f. 8. kommt in dem halben Hakenkranz und der Grube der Fußföhle so gut mit Fig. 7 überein, daß sie wohl dazu gehören muß.

87) \* *Gastropacha neustria*.

R. II. 1. p. 121. 147 et 203. t. 4. f. 1—13.

I. 1. p. 189 et 220. t. 5. f. 5—7.

I. 2. p. 88. t. 24. f. 5.

p. 204 et 235. t. 31. f. 13. 14.

p. 362 et 395. t. 47. f. 4.

II. 2. p. 244 et 276. t. 36. f. 14.

Linn. Phal. 818. O. *Gastropacha* — 3. p. 296. Geoffroy 2. p. 114. La livrée.

Man erkennt diese Art schon genugsam aus den Abbildungen der 4. Tafel von II. 1., außerdem auch an der Raupe, la livrée, unter der sie an vielen Stellen der Memoiren wiederkehrt.

88) † *Liparis chrysorrhoea*.

R. II. 1. p. 126 et 150 t. 5. f. 4—12.

p. 155 et 219. t. 6. t. 7. f. 1. 2.

I. 1. p. 236 et 244. t. 6. f. 1—10.

I. 2. p. 234. t. 31. f. 9—12.

Linn. Phal. — 822. O. 3. p. 202.

Eine ausführliche Beschreibung der Raupe, die bey R. vielfach als la commune vorkommt, findet sich II. 1. p. 155.

Es heißt dort: „Diese Raupe, die nur zu sehr den Namen der Gemeinen verdient, ist 16 beinig, von mittelmäßiger Größe und dicht behaart. In der Anordnung ihrer Haare zeichnet sie sich auf den ersten Blick nur wenig aus; man sieht bloß, daß sie mit ziemlich langen, rothgelben Haaren reichlich besetzt ist. Die durch die Haare hindurchscheinende Grundfarbe ihres Körpers ist braun; zu jeder Seite, in fast gleicher Entfernung von den Beinen und von der Mitte des Rückens, hat sie zwei kleine Binden oder vielmehr zwei Linien von weißen Flecken, die auf der Haut zu liegen scheinen, in der That aber durch kurze Haare gebildet werden. Auf der Mitte des Rückens hat sie zwei rothe Würzchen, das eine auf demjenigen Ring, an welchem das letzte Paar Mittelbeine sitzt, das andere auf dem folgenden. Die Haut der Mitte des Rückens hat auch verschiedene andere kleine röthliche Flecke.“ Für die letzten Worte möchte man, wenn man Nöfels Abbildung vergleicht, andere wünschen. So viel ist aber durch die zwei rothen, fleischigen Würzchen gewiß, daß die Raupe mit *Aurilia* und *Vaigrum* verwandt ist (bey *Salicis* weiß ich jetzt nicht, ob sie vorhanden sind; *Vaigrum* hat sie sehr klein, aber deutlich). Die Bestätigung, daß sie *Chrysorrhoea* ist, gibt der aus ihr entspringende Schmetterling, der S. 126 beschrieben wird: „Dieser Schmetterling ist von mittlerer Größe; er gehört zur fünften Classe der Nachtschmetterlinge, d. h. zu denen, die gekämmte Fühler und keine Zunge haben, und zur Gattung derer, die ihre Flügel dachförmig und gegen das Ende etwas gekreuzt tragen; diese sind weiß, oft sehr weiß.“ S. 127 heißt es von den Eyerhaufen: „Diese Masse ist ganz mit einfärbigen Haaren bedeckt; die der meisten Haufen sind rothgelb, und die von einigen anderen kaffeebräunlich.“ Man sieht also, daß dieser Schmetterling, da er nicht *Aurilia*, von der oben gehandelt ist, seyn kann, *Chrysorrhoea* seyn muß.

Bey Linne und Fabricius, der Linnés Jernthum nachgeschrieben hat, wird aus dem ganzen R. nur I. 1. t. 11. f. 11. zu *Chrysorrhoea* citirt, welches Citat aber, wie ich gezeigt habe, zu *Aurilia* gehört. Erst Esper hat (III. p. 204), obgleich bey ihm die zwei ähnlichen Arten verwirrt werden, richtig und ziemlich vollständig citirt.

89) *Asopia farinalis*.

R. II. 1. p. 96 et 142. t. 2. f. 4.

Linn. Phal. — 881. Treitschke *Asopia* 7—7. 149. Geoffroy II. p. 167. La phalène à ventre relevé.

So dürftig die Auskunft über den hier abgebildeten Schmetterling ist, die R's Worte gewähren, so sicher ist doch der ihm ertheilte Name. Zu dieser Sicherheit trägt die nicht ganz schlechte Abbildung wesentlich bey. Wer *Farinalis* im lebenden Zustande beobachtet hat, wird wegen des aufgerückten Hinterleibes und der zwei hellen Wellenlinien auf den Vorderflügeln leicht auf diese Art denken. Allein so breite Vorderflügel, wie die Abbildung aufweist, hat der Schmetterling nicht. Nun gibt es aber zwei Arten, die mit *Farinalis* nahe verwandt sind und breitere Flügel haben, *Glaucinalis* (Tr. 7, 149) und *Rubidialis* (Tr. 7, 150). Allein keine von beyden hat eine so tief ausgebuchtete hintere Querslinie, oder am Hinterende eine Reihe schwarzer Punkte, wie wir bey *Farinalis* und auf der Abbildung sehen. An der Größe der Figur dürfen wir auch keinen Anstoß nehmen,

indem diese Art dazum eine bedeutende Verschiedenheit zeigt. — R. meldet an beyden angeführten Stellen nichts weiter, als daß es eine kleine Phaläne sey, die, wenn sie den Mann erwartet, den Hinterleib aufwärts gekrümmt trägt. Die Wichtigkeit dieses letztern Umstandes ist sehr zu bezweifeln; vielmehr ist es eine Eigenthümlichkeit mehrerer Zünsler und Spannerarten, den Hinterleib in der Ruhe stets so zu tragen und zwar nicht bloß im weiblichen, sondern auch im männlichen Geschlechte.

90) † *Gastropacha pityocampa*.

R. II. 1. p. 187 et 221. tab. 7. fig. 3 — 7, t. 8. tab. 9. fig. 1.

Fabr. Bombyx — 3, 1. p. 431. Ochsenh. Gastropacha 3, p. 283.

Zuerst hat das Wiener Verzeichniß, darauf Esfer's *Mémoires* in Bezug auf diesen Schmetterling angemerk. *Sasbricius* gedenkt ihrer nicht. Es ist unnöthig, einen weitläufigen Beweis für die Richtigkeit des Namens der R'schen Art zu führen. Der Aufenthalt der Raupen auf den Pinien, die großen Nester, in denen sie gesellschaftlich leben, die Schmetterlinge mit ihren 5 hornartigen Stufen zwischen den Palpen (cinq gradins écailleux et posés dans une espèce de gouttière écailleuse), dergleichen kein andrer Schmetterling hat — es müßte denn die nordische *Pityocampa* eine verschiedene Art seyn — sind schon ein genügender Beweis.

91) \* *Melitaea cinxia*.

R. II. 1. p. 211 et 224. t. 9. f. 2 — 10.

Ochsenh. I. 1. p. 27. Linn. Pap. — 784.

Wenn die günstigen Citate bey zweifelhaften Beschreibungen immer den Ausschlag gäben, so könnte man durch das R'sche den Beweis führen, daß *Delia* des Wiener Verzeichnisses mit *Cinxia* Linn. eins ist. Denn der R'sche Schmetterling, den Linne zu seiner *Cinxia* zieht, ist bestimmt *Delia*. „Die Raupe ist sehr schön schwarz mit rothem Kopfe; sie scheint dornig, bildet aber eine Mittelclasse zwischen den bornigen und haarigen Raupen, indem ihr Körper mit Fleischwarzen bedeckt ist, die eben so viele kleine Kegelpyramiden vorstellen und, wie die Dornen und Höcker der andern Raupen, reihenweise geordnet sind.“ So genau diese Beschreibung sich an die Schenheimsche anschließt und die in Rede stehende Art schon durch den rothen Kopf von der *Artemis* und *Athalia* unterscheidet; so ist doch auch auf *Vorhörsen* in achten, welcher (I. p. 50) versichert, daß die Raupen von *Delia* und *Athalia* in der Färbung nicht immer zu unterscheiden seyen. Wir müssen also, wenn wir nicht darauf Gewicht legen, daß nach *Vorhörsen* die *Delia*-raupe immer in großen Gesellschaften, *Athalia* meist einzeln lebt — R's Raupen lebten aber in großen Nestern — uns an die Zeichnung und Farbe des Schmetterlings halten: „Die Oberseite der Flügel (S. 216) ist blaß Aurora, die Unterseite mancfaltiger gefärbt; die Auroreafarbe und ein gelbliches Weiß bilden hier Binden, wie auf den Tapeten, die man point de Hongrie nennt; Schwarz und Weiß bilden Punkte auf jeder Binde und Wellen und andere Figuren, deren Arbeit dem Auge gefüllt.“ Die Worte du noir et du brun pointillent chacune de ces bandes sehen wir durch die Abbildung verdeutlicht, wo in der letzten Binde vor dem Hinterrande die schwarze,

*Cinxia* vor *Athalia*, *Parthenie*, *Didyma* ufw. ausgezeichnete Punctreihe naturgemäß angegeben ist.

Geoffroy hatte (II. p. 53. *Procris*) die *Hipparchia pamphilus* vor sich und beschrieb als dazu gehörig die R'sche *Cinxia*-Raupe. Dieses hat schon Degeer (II. p. 141 et 146 *Cinxia*) eingesehen, dessen Schmetterling zur Bestätigung des Namens *Cinxia* für *Delia* beytragen kann.

92) \* *Gastropacha processionea*.

R. II. 1. p. 226 et 259. t. 10 et 11.

Ochsenh. 3, p. 280. Linn. Phal — 819.

Schon die Benennung la processionnaire, die R. der Raupe gibt, und die Linne auf die ganze Art übertragen hat, sichert die Richtigkeit der vorstehenden Benennung. Außerdem dürfte man nur auf die Weise achten, wie diese Raupen aus den Nestern ziehen — die ihnen die Aufnahme in jedes Naturgeschichtsbuch verschafft hat — auf die bey ihr im hohen Grade vorhandene Eigenschaft, Tuden und Beulen auf der Haut des Beobachters zu erregen, auf die Futterpflanze, welches die Eiche ist, um bald auf den richtigen Namen hingeleitet zu werden. Den unscheinbaren Schmetterling sehen wir in der 21. Seiten betragenden Schilderung der Art folgendermaßen beschreiben (S. 240): „Männchen und Weibchen unterscheiden sich nicht beträchtlich in der Größe; ihre Farben sind fast gleich; Grau und Schwarz sind auf ihren Flügeln zu Flecken und Wellen gemischt. Kopf und Vordertheil sind im Verhältniß zur Länge dick; sie sehen kurz aus. Es sind Phalänen, die ihre Flügel dachförmig tragen; sie gehören zur Classe derjenigen, deren Fühler gekämmt sind, und die gar keine Zunge haben.“

93) *Yponomeuta malinellus* Zell. mspt.

R. II. 1. p. 250 et 261. t. 12. f. 1 — 8. 10. 11.

Linn. Phal. padella 885 (ex parte).

Wir haben schon oben eine Art aus der Gattung der *Yponomeuten* gehabt; jetzt beschreibt R. eine zweite, die auch um Glogau in Menge auf Apfelbäumen anzutreffen ist, und die ich, wie R., auf keinem andern Baume gesehen habe. Die Raupen (S. 251), „sind kleiner als die von mittler Größe, jedoch nicht gerade von den kleinsten, glatt, weiß, mit einem Anstrich von Gelb (un blanc qui a une teinte de jaune), mit verschiedenen schwarzen Punkten bezeichnet, von denen die größten zu jeder Seite des Körpers eine Längelinie bilden; andere kleinere Punkte sind unregelmäßiger hingeworfen; sie haben 10 Beine.“ Weiter heißt es S. 256: „Nach Verlauf von drey Wochen kommt aus jeder Puppe ein kleiner Nachschmetterling, den man le petit deuil nennen könnte; seine Flügel sind weiß, von einem silberichten Weiß, worauf eine Menge schwarzer Punkte zerstreut ist; sie krümmen sich, um den Leib einzufassen, wie die Flügel der Vögel; er hat zwar feine, fadenförmig konische Fühler, die fast so lang sind wie 3 seines Körpers, und eine Zunge.“ Hier haben wir einen Schmetterling, den man, nach Treitschke 9, 1. S. 221 zu urtheilen, für *Cognatellus* halten sollte, der aber bestimmt davon verschieden ist, und den ich *Malinellus* nenne. Denn *Cognatellus* hat eine schneeweiße Oberseite der Vorderflügel und an denselben auf beyden Seiten schneeweiße Franzen; *Malinellus* hat bloß weiße, im Mittelraume graue (was jedoch etliche Monate nach dem

Auskleiden verläßt) Vorderflügel, deren Franzen auf der Unterseite entschieden grau sind. Man kann auch die Gespinne berücksichtigen, die bei Cognatellus, am Spindelstrauch, oft eine erstaunliche Ausdehnung erhalten, was bei Malinellus nicht der Fall ist (wie auch R. bezeugt, jedoch aus einem natürlichen Grunde: *S. 257 elles sont aussi de plus gros nids, comme le demande un plus grand nombre d'habitants*). Ferner finden wir bei R. die beachtungswürdige Bemerkung, daß die Spindelbaumraupe eher vor Hunger stirbt, als daß sie Apfelbaumblätter fräße. Endlich habe ich mit R. beobachtet, daß die Spindelbaumraupen größer werden und mithin größere Schmetterlinge liefern. Es ist also außer allem Zweifel, daß hier zwei verschiedenartige Schmetterlinge bezeichnet sind, die man auch leicht genug unterscheiden kann. Viel leichter ist eine Verwechslung des Malinellus mit Padellus H. (Padella) fig. 393—95. Beide haben in der Mitte der Vorderflügel einen grauen Schatten und auf beiden Seiten dieser Flügel graue Franzen. Allein bei Padellus ist der Schatten fast immer sehr deutlich und dunkel, und dieses ist, so viel ich bis jetzt zu sagen vermag, an den Schmetterlingen der einzige Unterschied. An den Raupen und Puppen, die ich zu Tausenden gesehen habe, ist er sichtbar. Padellus lebt auf Schleen und, jedoch sehr selten, auf Weißdorn und hat eine maulbeegraue Raupe (wie Kötst. t. 7. abbildet), die sehr weitaufsteige Gespinne webt, sich ein ganz leichtes Puppenghäuse verfertigt und gestreckt hängt. Malinellus lebt auf Apfelbäumen und hat eine gelbe Raupe (wie Kötst. t. 8), die kleinere Nester anlegt und sich, in beträchtlichen, an einander geschlossenen Gesellschaften, ein dichtes, schneeweißes Puppenghäuse (wie Kötst. t. 8) verfertigt. Also sind auch dieses zwei durch ihren ganzen Lebenslauf verschiedene Arten.

Der Grund, warum ich einen neuen Namen Malinellus aufzubringen suche, ist kürzlich der, daß Linne Malinellus und Padellus vermischt, und daß Rorella H. theils zweifelhaft, theils wegen Collision mit einer gleichnamigen Motte nicht zu dulden ist. — Linne citirt im Syst. nat., inbem er die Fauna corrigiert, R's Tafel 12 zu seiner Padella und nicht als Futter die arbores Pomonae an; er meint also Malinellus. Allein er nennt die Motte supra minus alba foreque plumbea, und dieß paßt am besten auf Padellus, der, wenn man, wie ich, mehr als 1000 Stück aus der Raupe erzüchtet, öfters ganz plumbeus gefunden wird (Hbn. fig. 895). Folglich muß die eine Art den von Linne gegebenen Namen behalten, die andere einen andern bekommen. Die Art von Schleen, mit ihren bleifarbig angelaufenen Flügeln, ist den Lepidopterologen von jeher als Padella bekannt gewesen und als diese abgebildet worden. Sie mag also den Namen behalten, der ihr so wenig angemessen ist, wie dem Evonymellus der sonstige. Zübners Rorella fig. 234 (Tr. 9. 1. p. 222) kann einzeln mit Malinellus fern, ist aber mit zu seinen Punkten abgebildet worden, wie er mit sie vorgeformten ist. Wenn beide nun auch einzeln sind, so darf der Name Rorellus nach den Gesetzen der deutschen Lepidopterologen nicht angenommen werden, weil ein Chilo (Crambus) Rorellus existirt.

**Ann. 1.** Die auf Taf. 12 in Fig. 12. 13 abgebildeten Schmetterlinge haben zwar etliche Punkte mehr als die der Fig. 5 und 8, dennoch aber nicht so viel, wie Evonymellus in der Natur hat. Die Schmetterlinge sind auf dieser Tafel überhaupt nicht sonderlich gut abgebildet;

mit etlichen Punkten mehr oder weniger ist es so genommen worden. Hier muß also die Beschreibung entscheiden und nach der Raupe und deren Eigenheiten geurtheilt werden. Demnach ziehe ich Fig. 12. und 13 zu Cognatellus.

**Ann. 2.** Auf S. 258 heist es: „Ich habe auf der Hainbuche (charmill) Gesellschaften von Raupen gesehen, die denen des Spindelbaums vollkommen ähnlich waren; aber ich habe nicht die nöthigen Beobachtungen angestellt, um zu erfahren, ob sie nicht ungeachtet ihrer Aehnlichkeit einer verschiedenen Art angehören.“ Da ich nie auf Hainbuchen Yponomeuta-Raupen gefunden habe, so kann ich hierauf eben so wenig wie R. selbst eine Antwort geben.

**Ann. 3.** Geoffroy, der H. S. 183 unter la teigne blanche à points noirs die oben angegebene Stelle aus R's II. Theile und die Fig. 10. u. 11 der 17. Taf. des I. Theiles vereinigt, zeigt durch die Angabe: *ces chenilles vivent par troupes sur les arbres fruitiers*, daß er Malinellus meinte.

#### 94) Yponomeuta sedellus.

R. II. 1. p. 258.

Ypon. sedella Tr. 9, 1. 223.

„Die Pflanzen, die wir Fetzthenne nennen, nähert eine gefellige Raupeart, welche der des Apfelbaums sehr ähnelt, aber kleiner ist und kleinere Schmetterlinge liefert.“ Das ist die ganze R'sche Nachricht, zu der nur im Allgemeinen hinzugefügt wird, daß alle diese verwandten Schmetterlinge sehr schön weisse Vorderflügel mit schwarzen Punkten haben. Letzteres ist nicht durchaus wahr. Die Raupen, die auf der Fetzthenne leben, verwandeln sich stets in kleine schiefsergraue Schmetterlinge; auch sehen sie den Raupen vom Spindelbaum nicht allzuähnlich. Sie sind nemlich nur an den hintersten, und, was ich bei Treitschke nicht erwähnt finde, an den drei ersten Gelenken gelb, sonst weißlichgrau. Dennoch bin ich sehr überzeugt, daß R. in der chenille de l'orpin den Sedellus gemeint hat, da auf Sedum telephium keine andere Yponomeutenart lebt. — Degeer hat die Naturgeschichte dieses Sedellus (H. 1. p. 354, t. 10. f. 10—16) sehr schön und vollständig beschrieben.

#### 95) Yponomeuta padellus.

R. II. 1. p. 258 et 262. t. 12. f. 9.

Lin. Phal. padella (ex parte). 885.

R. erhielt die Raupen aus Poitou und um Paris, wo sie auf Schleensträuchern lebten. Sie sind „kahl, von einem fast schwarzen Braun oder von einer Farbe, die derjenigen ziemlich ähnlich ist, welche die Raupen des Spindelbaums und des Apfelbaums zu gewissen Zeiten haben.“ — Sie haben sich verwandelt, ohne sich solche Hülsen zu machen, wie die Raupen, von denen wir gesprochen. Die Puppen werden einfach von etlichen Fäden unterfüßt.“ Dieses ist alles vollkommen richtig in Bezug auf den Padellus von Schleen, von welchem oben bei Malinellus die Rede war; nur das Folgende: „daß die Schmetterlinge den Schmetterlingen jener Raupen gleich gewesen seyen“ erleidet eine Correction. Selbst in der Abbildung sehen sie dunkler aus als jene.

96) \* *Tortrix Ameriana*??

R. II. 1. p. 265 et 308. tab. 13. tab. 14. (excl. fig. 10.) tab. 15. fig. 1—10.

Linn. Phal. — 877. Treitschke — 8, p. 49.

Degeer I. t. 27. f. 1 — 6. 8. 12—14. 13te Abhandl. p. 14. — II. 1. p. 344. Rosana.

Es ist fast unmöglich, aus den schlechten Abbildungen des Schmetterlings etwas mehr zu erkennen, als was man schon aus der Raupe und deren Kunstfertigkeit weiß, daß er nelmlich zur reducierten Treitschke'schen Gattung *Tortrix* gehört. Auch der Text gibt sehr dürftige Auskunft. „Die Farbe (S. 280) der Vorderflügel ist aus mehreren Nuancen von gelblichem Braun zusammengesetzt, wovon die einen dunkler, die andern heller sind, und die sich zu Arten von Flecken mischen und einen angenehmen Eindruck hervorbringen. — Es find Nachtalter mit gekörnelten, fadenförmigen Fühlern und mit Zungen, und sie gehören zu der Gattung derer, die wir Breitflügel nennen.“ Diese Beschreibung findet fast auf alle *Tortrices* Anwendung, die auf Eichen leben: *Xylosteana*, *Sorbiana*, *Heparana*, *Corylana*, *Ribeana*, *Cerasana*. *Ameriana* ist mir nie als Raupe oder Schmetterling auf Eichen vorgekommen, obgleich ich wenigstens 30 Stück selbst gefangen habe. Die Raupe lebt hier auf Weißdorn, vielleicht auch auf Erlen, von denen ich die Schmetterlinge nicht selten abklopfte. Dieß möchte aber gewiß seyn, daß sie nirgends so häufig vorkommt, wie R. von seinem Eichenblätzwirler erzählt. Ich habe den Merkmalen der Blattwickler-raupen, die ich erzog, noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, und kann daher nur als ziemlich gewiß angeben, daß die Raupen von den angeführten 6 Arten, wozu noch *Viridana* kommt, die Blätter auf gleiche Weise einrollen, und daß, um sie der Species nach von einander zu unterscheiden, man diese Raupen selbst genau ansehen muß. Die Stellung der Warzen, die Hakenkränze an den Sohlen, die Färbung des Kopfes, des Schwanzschilbes usw. geben wahrscheinlich gute Merkmale. Allein sehen wir darüber unsere Hauptquelle, Treitschke, nach, so finden wir sehr unbefriedigende Auskunft, da bey ihm von den wenigsten Raupen Beschreibungen vorhanden sind. R. beschreibt seine Raupen also: „Sie gehören (S. 278) zu denen unter mittler Größe, sind glatt und 16beinig; ihre Mittelbeine haben vollständige Hakenkränze an den Sohlen. Sie sind schiefergrau (d'un gris ardoisé); manchmal zeigen sie sich jedoch in einem grünlichen Braun; aber ich glaube, daß dieses dann geschieht, wenn sie sich an den Blättern gestützt haben. Vielleicht erscheint auch ihre Haut nach den Häutungen verschieden; denn sie wechseln sie unbezweifelnd mehrmals, wie die abgestreiften Hälte beweisen, die man in den Blattrollen findet; sie sind außerordentlich schnell.“ — Müßte nicht, nach R., ein Schmetterling mit gelbemüschter Farbe daraus hervorkommen, so würde ich darinn die *Viridana*-Raupe erkennen. Häufig habe ich aber auch aus meinen Raupen, die also unter einander ziemlich ähnlich seyn müssen, *Ribeana* erhalten, und diese ließe sich in R's Fig. 5 noch am ersten hineinbeuten. *Ameriana* stellt aber Fig. 3 wohl nicht vor; denn die vielen Querlinien der Abbildung fehlen dort beständig. Bey Fig. 5 läßt der dreieckige dunkle Fleck eher eine Deutung auf *Ameriana* 3, bey Fig. 7 der am Vorderende gegen die Flügeldecke hin so ausgezeichnete Fleck auf *Gnomana* zu. Ueber Fig. 8 und 9 läßt sich nichts sagen.

Zfio 1838. Heft 9.

Woher Linne die *P'sche* Art oder Arten in seiner *Ameriana*, der die Weiße zur Nahrung dient, hat finden können, weiß ich nicht. Degeer's Art wird nicht nur aus den guten Abbildungen, sondern auch aus „dem schwarzen Winkel der Vorderflügel und der goldgelben Farbe der Unterseite aller Flügel als *Ameriana* erkannt. Er erklärt sie im zweyten Theile a. a. D. für Linne's *Rosana*, auf welche ich mich hier nicht einlassen kann.

97) *Tortrix* — ?

R. II. 1. p. 281 et 314. t. 16. f. 5.

Von Ulmen habe ich noch keine *Tortrix*-Raupen erzogen, weshalb ich nur die Vermuthung aufstellen kann, daß R. mit seiner Ulmenraupe, „die sich in Größe und Farbe wenig von der kunstreichen *Wickler*raupe der Eiche unterscheidet,“ und von der er weiter nichts zu erzählen weiß, eine andere Art angedeutet hat, als zu der seine Eichenwickler gehören. Zu bestimmen, welche es sey, darauf kann allein die Futterpflanze hinführen, vorausgesetzt, daß keine zweyte Art die Rüsterblätter zusammenrollt.

98) \* *Botys verticalis*.

R. II. 1. p. 282 et 317. t. 19. f. 1—5.

Linn. Phal. — 882. Treitschke *Botys* — 7, p. 101.

Wenn die eben besprochenen *Wickler*raupen sehr unkenntlich sind, so läßt sich dafür diese *Pyraliden*art und die Nichtigkeit des Linne'schen Citates desto leichter erkennen. „Die auf Nesseln ziemlich gemeine Raupe ist seladongrün, etwas durchsichtig, glatt, nur mit einigen kurzen, weißen Haaren, 16beinig; die Mittelbeine mit fast vollständigen Hakenkränzen.“ Man darf nur Nessel oder auch Treitschke nachsehen, um *Verticalis* hierunter wenigstens zu vermuthen. Die Schmetterlingsbeschreibung ist aber ganz entscheidend: „Die Farbe der Flügel zeigt sich auf den ersten Blick gelblichweiß mit einigen gelblichen Wellen; aber sieht man sie näher an, hauptsächlich wenn sie hinlänglich beleuchtet sind, so scheinen sie wahre Epale zu seyn; sie lassen dasselbe Farbenspiel sehen, wie diese kostbaren Steine.“

99) *Ornix (Gracilaria)* — ?

R. II. 1. p. 283 et 313. t. 15. f. 11—14.

Von einer *Ornix*-Art, die auf Sauerkampfer lebt, finde ich nirgends als hier bey R. Nachricht. Das Verfahren, sich eine Wohnung zu bereiten, hat sie mit der *Ornix* (*Gracilaria*) *phasianipennella* gemein, und da sie mit dieser in vielen Stücken übereinstimmt, so muß sie eine sehr nahe Verwandte derselben seyn, deren Ermittlung, zumal in der Gegend von Paris, keine Schwierigkeiten haben kann. Sie zu erkennen, dienen folgende aus R. entnommene Angaben. Die Wohnung der Raupe besteht in einem Stück eines Sauerkampferblattes, welches zu einem abgestumpften, auf dem Blatte fast senkrecht stehenden Kegele aufgerollt ist. „Die Raupe ist,“ wie alle *Ornix*-Arten mit langen fadenförmigen Nebentastern (*palmi superiores*, *pseudopalmi*, *palmuli*), — „14füßig, dabei glatt, grünlichweiß, mit fast durchsichtiger Haut; unter der Loupe erkennt man ein kleines Halsband aus 3—4 kleinen schwarzen Punkten; sie hat die ganze Lebhaftigkeit der andern windelnden Raupen.“ Man findet sie im September, und die Schmetterlinge

kommen in der Mitte des Octobers hervor. Sie gehören zur Gattung derjenigen, deren Flügel, wenn sie sich nach Art der Vögel der ganzen Länge nach dem Körper angeschlossen haben, sich über dem Hintern in die Höhe richten, und dort eine Art Schwanz bilden, der mit einem Fühnenschwanz eine Aehnlichkeit hat. Sie haben gekrümmte Fühler, welche sie bald vorwärts gerichtet, bald auf dem Körper ruhend tragen, und die dann fast bis zum Ende der Fühler reichen. Die Farbe der Oberseite der Vorderflügel ist ein Braun, das, bei Sonnenschein gesehen, ganz mit Gold gepünktelt scheint; die Unterseite derselben Flügel hat einen kleinen weißen Saum (rebord).

100) *Ornix (Gracilaria) phasianipennella*.

R. II. 1. p. 287.

Tr. — 9, 2. p. 209. Hüb. Tin. fig. 321.

R's kurze Nachricht ist folgende: „B. Jussieu hat mir im September schmale Knötchenblätter gegeben, die auf der einen Seite riemenförmig eingeschnitten waren. Der Riemen war aufgerollt, und die Rolle senkrecht auf die Blattfläche gestellt.“ — Ich habe diese Art zur angegebenen Zeit häufig in einem Erlengehölz auf *Polygonum hydropiper* gefunden (sie soll auch auf der *Persicaria* leben) und mehr als 30 Schmetterlinge daraus erhalten. Daß ich sie als *Phasianipennella* Hüb. ausführe, kommt mehr daher, weil Hr. Fischer von Röslerstamm mir versichert, die Raupenabbildung des Hübners treffe genau zu, als weil Hübners citirte Figur oder Treitschkes Beschreibung vollkommen mit meiner Art übereinstimmt. Beyde lehren lassen die Art nicht erkennen, und die Beschreibung scheint mehr nach Hübners Abbildung, als nach Originalien verfertigt zu seyn. Die mir und Herrn F. v. Röslerstamm als *Phasianipennella* gekommene und von R. gemeinte Motte ist viel kleiner als *Stigmatella Fabr.* (*Upupaepennella* Hüb.) und hat erstgibt glänzende, braune Flügel, an deren Rändern ringsherum 6—7 verloschene, weißlichgelbe Flecken (am Vorderende 3, am Innerrande 2) liegen. Nach dieser Bezeichnung der Flügel kann die Ampfermotte nicht zu *Phasianipennella* gezogen werden, wie man vielleicht aus der Verwandtschaft der Ampfer- und Knötchenarten schließen möchte.

101) *Phalaena Tinea* — ?

R. II. 1. p. 287 et 311. t. 14. f. 10.

Ich kann nicht entscheiden, ob eine Widler- oder eine Mottenraupe sich die abgebildete Wohnung macht; doch ist mir das letztere wahrscheinlich, und ich würde auf *Ornix falconipennella* raten, wenn R. der Raupe nicht 16, sondern 14 Reine gäbe. *Falconipennella* ist die nächste Verwandte von *Stigmatella Fabr.* (*Upupaepennella* Hüb.), einer Art, deren Naturgeschichte wir kennen, und von welcher dasjenige hinsichtlich der Weidenblätter gilt, was R. hinsichtlich der Eichenblätter schreibt. *Falconipennella* fliegt nicht selten in Eichenbeständen, und seit mehr als 12 Jahren habe ich sie stets dort gefangen. Es läßt sich erwarten, daß sie an den Eichenblättern ähnliche Duten verfertigen wird. Nun habe ich daran auch Duten gefunden, wie R. sie beschreibt und abbildet; nur habe ich mir leider nicht die Mühe gegeben, die Räupchen zu beschreiben und zu erziehen. Daher wird noch durch künftige Beobachtungen zu entscheiden seyn, ob R. sich in der Zahl der Reine geirrt hat, und was für eine Art es eigentlich ist, die

als Raupe aus einem Stück Eichenblatt eine Dute macht, deren breites Ende sie durch ein anderes Blattstück verschließt, und die eine weiße durchsichtige Haut und längs der Mitte des Körpers einen braunen Streifen hat, welcher aber nur durch die Farbe der in den Eingeweiden enthaltenen Stoffe hervorgebracht seyn kann.

102) *Phalaena Tinea* — ?

R. II. 1. p. 288 et 314. t. 16. f. 7.

Hier kann ich nichts thun, als R's geringe Nachricht, in der nicht einmal die Raupe erwähnt wird, mittheilen: „Man sieht Eichenblätter, deren Ende nach der untern Seite (nach der Schattirung der Abbildung sollte man eher das Umgekehrte denken) gebogen und daselbst flach angelegt und befestigt ist; nur an der Stelle der Umbiegung bleibt eine merkbare Erhöhung. Ich habe Blätter gesehen, wo der ganze Umriß des gefalteten Blattes in eine Art Rinne, welche die Raupe in mehr als die halbe Dicke des Blattes gegraben hatte, eingefügt war. In andern Blättern desselben Baumes sind große Buchszähne auf diese Weise nach unten gefaltet.“

103) *Phalaena Tinea* — ?

R. II. 1. p. 291 et 314. t. 16. f. 11. — t. 17. f. 1. 2.

Mir unbekannt, aber in dem Verfahren, den Rand eines Blattes etwas nach oben umzubiegen, und den hohlen Raum mit Fäden unregelmäßig zu bespinnen, der den Fischer von Röslerstamm in seinen microlepidopterologischen Beiträgen T. 14 ebenfalls auf Apfelblättern dargestellten *Cerasiella* ähnlich. Sehr wahrscheinlich sind beyde verschiedene Arten, da die R'sche Raupe, „eine kleine Raupe von hellem Grün mit mehreren kleinen schwarzen Körnern auf jedem Ringe“, die Fischers aber (Tr. 9, 2. p. 158), „bläulich mit braunrothem Gürtel über jedes Gelenk und mit bläugeln Punctwärtchen“ versehen ist.

104) *Phalaena Tinea* — ?

R. II. 1. p. 289. 295 et 315. t. 17. f. 3. 4.

„Unter den zuletzt genannten Raupen (die das Blatt nach der untern Seite hin falten) hat der Apfelbaum eine von solcher Eigentümlichkeit, wie ich noch auf keinen andern Blumen, außer auf dem Feigenbaume, beobachtet habe. Rings um den gezähnelten Rand des zurückgefalteten Theils (tout autour du bord de la dentelure de la partie repliée) ist ein welliger Wulst (il y a un bourlet comme cotonneux), der jedoch aus bläugeln Seide besteht; er erhebt sich um etwa eine Linie über den Theil, den er einsaßt; er besäumt ihn wie ein gestochenes Schnürchen (il la borde comme seroit un cordonnet) und ist dicker als breit.“ — Wenn die Raupe die Falte befestigt hat, so „befinden sich die Fäden der ersten Gewebe außerhalb des gezähnelten Blatttrandes (en dehors de la dentelure), und die Raupe schiebt die Fäden der spätern Gewebe eben dahin (y pousse ceux des toiles qui la suivent).“ Daher kommt es, daß diese schlaffen und verschlungenen Fäden, wenn sie über den Rand des gefalteten Theils hinausgeschoben sind, eine Art Wulst bilden, der mit mehr Kunst gemacht scheint als er wirklich ist. Die Raupe ist glatt, bläugeln oder von einer sehr hellen Carabifarbe. Sie gehört zur dritten Classe, d. h. sie hat

nur 6 Mittelheine, und das erste Paar derselben ist vom letzten Paare der Krallenfüße nur durch 2 Ringe getrennt."

### 105) *Phalaena Tinea* — ?

R. II. 1. p. 296.

I. 1. p. 85 et 128. t. 1. f. 2. ?

Alles, was wir von R. über diese Art erfahren, ist, daß es auf dem Feigenbaume eine andere Raupe gibt, welche den Rand des umgefalteten Blatttheiles gleichfalls mit einem wolkichten Wulste umgibt, der aber zarter ist, als bei der Apfelbaum-raupe. Diese Art mag sich in Paris noch leichter wieder auffinden lassen, als die Apfelblattfalterinn.

### 106) *Phalaena* — ?

R. II. 1. p. 296.

Eben so wenig sagt uns R. über diese Art, die, nach ihrer Raupe zu urtheilen, nicht klein seyn kann. „Man sieht keinen solchen Wulst um den Theil eines Kastanienblattes (chataignier), der von einer grünlichweißen, durchsichtigen, verhältnismäßig dicken und wenig unter der mittlern Größe langen Raupe gefaltet worden ist.“

### 107) *Phalaena Tortrix* — ?

R. II. 1. p. 298.

Eine Raupe, die mehrere Blätter zu einem Packete ziemlich unregelmäßig verbindet, findet sich häufig auf Birnbäumen; doch findet man sie auch auf Brombeersträuchern, Schlehdorn u. c. Hier sind unzweifelhaft mehrere Arten zusammengeworfen; denn eine solche Raupe, die auf Brombeersträuchern häufig lebt, ist *Tortrix solandriana* Tr. (Achatana Hübn.) — „Sie ist klein, glatt, 16 beinig, mit ganzen Hakenkränzen an den Mittelbeinen; oft kaffeebraun, verhältnismäßig dick, am Hintern ein wenig zugespitzt.“ Diese Raupenbeschreibung weist auf die Widler hin; eine genauere Ermittlung der Art scheint mir nicht möglich.

### 108) *Penthina cynosbana* ?

R. II. 1. p. 298 et 318. t. 19. f. 6 — 8.

Linn. Phal. cynosbatella 887. Treitschke *Penthina cynosbana* (!) S. p. 38.

Was Linne unter seiner *Cynosbatella* verstanden hat, ist durch das Citat aus Degeer völlig gewiß. Es ist der weiß- und schwarzdunte Widler mit der vordrigen (gelbbraunen bei Degeer in Göse's Uebersetzung) Larven, oder *Cynosbana* Tr. a. a. D. Von dieser Art ist die Raupe in Gärten durch den Schaden bekannt, den sie an den Rosen anrichtet; sie frist besonders die Blüthenknospen aus; doch lebt sie auch zwischen den Blättern. — Es gibt einen ähnlich gezeichneten Widler, *Penthina roborana*, der sich so gleich durch die braunen Palpen unterscheidet, der auch auf Rosen lebt, aber nach meinen bis-herigen Erfahrungen fern von Gärten. Da es nun wahrscheinlich ist, daß R. seine chenille brune et rase auf Gartenrosen gefunden hat, so hat der Name *Cynosbana* für dieselbe mehr Wahrscheinlichkeit als der Name *Roborana*. R. spricht zwar nur von zusammengeschlagen und aneinander gelegten Blättern

(plusieurs feuilles, chacune pliée en deux, et appliquées les unes sur les autres assez exactement), welche die Raupe alle durchfrisst; allein einen bedeutenden Anstoß gibt dieser Umstand nicht; denn R'n scheint hier bloß erwähnenswerth, was mit den Rosenblättern geschieht, nicht aber, was die Raupe alles thut oder thun kann.

Bei Linne finden wir zu dieser Species, *Cynosbatella*, ein Citat aus R., nemlich III. 1. tab. 2. fig. 6, obwohl mit einem Fragezeichen. Dort ist der Schmetterling aus einer ächten Miniraupe der Rose dargestellt, und folglich ist das Citat unbedingt zu streichen.

### 109) *Phalaena Tinea* — ?

R. II. 1. p. 301 et 313. t. 16. f. 1 — 4.

Auch bei dieser Art fehlen Linne und seine Nachschreiber (*Fabricius* III. 2. p. 286. *Latreille* hist. des crust. 14. p. 246), indem sie sie zur Phal. heracliana ziehen. *Heraciana* (Linn. Syst. nat.) oder *Heracleana* (Fn. Succ.) läßt sich nicht mit gänzlicher Gewißheit bestimmen; Linne war über diese Art selbst nicht ganz im Reinen, welches theils aus seinen Citaten, in denen mehrere Arten dargestellt sind, theils aus seinen eigenen Worten hervorgeht: *hujus plures species apud nos sunt, quae magnitudine differunt, sed notis specificis non facile distinguuntur*. Wenn Zinken und nach ihm Treitschke Hübners *Heracleella* für Linne's Art erklären; so widerspricht die Raupe von Hübners Motte, die auf Kornblumenblättern lebt, offenbar gar sehr Linne's habitet in umbellis umbelliferarum — *destructis floribus caules penetrans*, die Verschiedenheit der Schmetterlingsfärbung zu geschweigen. Ich glaube Linne's Art, an der ich den thorax flavicans der Diagnose in den thorax a tergo albicans der Beschreibung umsetze, und mich vorzüglich an die umbellas heraclei halte, die Citate aber außer Acht lasse, besser in einer *Haemylis* erkannt zu haben, welche im July und August auf Pastinak und Bärenklau in Gärten und Gebüsch seltenweise häufig ist, zur Verwandlung sich in den Stengel einbohrt und im October einen Schmetterling alis griseis puncto obsolete fusco (L.), lineolis disci approximatis nigris (Fabr.), d. h. lineolis longitudinalibus parallelis fasciam fere formantibus fuscis liefert, kurz, den Degeer II. 1. p. 294 sehr genau und kenntlich als *Heraciana* L. beschreibt.

Wie dem aber auch sey, daß ist gewiß, Linne's Art gehört zur Treitschke'schen Gattung *Haemylis* und hat unscheinbare, gelblichgrau, kaum etwas punctierte oder gestrichelte Vorderflügel. Dabey kann sie aber auch R's Art nicht seyn. Dessen Schmetterling trägt seine Flügel nach Art der Vögel (die Himmelnadler aber bekanntlich ganz flach); der Vordertheil der Oberseite seines Körpers und der Oberseite seiner Vorderflügel ist gelblich weiß; das übrige der Flügel ist ein beinahe schwarzes Braun. — Linne hat sich dadurch täuschen lassen, daß R's Raupe in Dolben und zwar im Juny, July und August leben. Glatt und durchsichtig ist zwar die *Heracleana*-Raupe auch; aber ihre Farbe würde sehr unpassend bräunlich olivenfarbig (couleur d'olive un peu brun) heißen, da sie oberwärts bräunlichwarau, unten gelblich ist. Auch kommt der Bärenklauenschmetterling schon in demselben Jahr, und nicht erst im May des folgenden aus.

110) *Phalaena* — ?

R. II. 1. p. 301 et 318. t. 19. f. 9—14.

Dieser ausführlich beschriebene Schmetterling scheint leicht erkennbar zu seyn, und doch vermag ich nicht einmal, sein Genus zu bestimmen. Ich kenne zwar Eichenraupen aus der Gattung *Phycis* (*Koborella* Tr. 9, 1. 162 und *Tumidella* Tr. 9, 1. 179), die genau so leben wie die *Phycis*; sie ziehen eine Anzahl Blätter am Ende eines Triebes zusammen und spinnen sich darin eine durchsichtige Röhre aus weißer Seide, in die sie sich bey Gefahren flüchten. Allein *Phycis* Art kann schon bewegen keine *Phycis* seyn, weil sein Schmetterling einen außerordentlich rauhen Kopf hat (Fig. 14), alle *Phyciden* aber glatteköpfig sind. „Sie ist im Frühjahr äußerst gemein, glatt, 16 beinig, mit einem Hakenkranz an den Sohlen, kaffeebraun mit bey weißen Längsstreifen, wovon auf dem Rücken und an jeder Seite einer geht; auf dem braunen Grunde gibt es hellere Flecken, deren Lage, so wie die Höhe des Brauns nach dem Alter und der Mauerzeit sehr ändert. Die Puppen hängen öfters mit zwey Afterhaken an einer Seite des Blatthündels. Der Schmetterling kommt um den 20. Juny hervor. „Er hat gekrümmte Fühler und eine Bunge und trägt seine Flügel fast dem Boden parallel. Tabacksfarbe und ein schmutziges Weiß oder Hellgrau sind die zwey herrschenden Farben auf der Oberseite der Vorderflügel, und mischen und schattiren sich zu niedrig gewellten Quersreifen (de jolies bandes de point de Hongrie); der Kopf ist äußerst zottig; von vorn angesehen, sieht er einem Eulenkopfe ähnlich.“

Ich vermuthete hier eine Noctuenart, die sich bey Paris wahrscheinlich ohne Mühe auffinden lassen wird.

111) *Ornix* (*Gracilaria*) *syringella*.

R. II. 1. p. 303 et 315. t. 17. f. 5—10.

Fabr. *Tinea* — III. 2. p. 328. Treitschke *Ornix ardeaeppennella* 9, 2. p. 205.

Mit Unrecht zweifelt Treitschke, ob seine *Ornix* mit der Fabricischen *Syringella* gleichartig sey. Schon das habitat in *Germaniae Syringa* zeigt es an, noch mehr aber die nicht „allzu kurze“ sondern, richtig verstanden, vollkommen befriedigende Beschreibung der Vorderflügel des Schmetterlings. „Goldbig, d. h. goldbraun (Tr.) mit verschiedenartigen, weißen Querslinien, von denen einige mit einem Punkt versehen (quibusdam puncto auctis), d. h. unterbrochen, und die hintersten schwarz gekäumt sind.“ Damit übereinstimmend schreibt R.: „Die Oberseite der Vorderflügel ist reich gefärbt, nemlich mit Flecken von einer ersparbigen, dem Golde sich nähernden Schattirung, die mit silberweißen und schön schwarzen Flecken gemischt sind. Die Hinterflügel sind schiefergrau und lang gefranzt.“ — Also ist diese Art, deren natürliche Größe Fig. 8 zeigt, mit ihrer sich genau an Treitschkes Beschreibung anschließenden Fledermausraupe, gleich mit *Ardeaeppennella* und *Syringella*.

112) *Ornix* (*Gracilaria*) *cuculipennella*?

R. II. 1. p. 306 et 314. t. 16. f. 8—10.

Hübner. *Larv. lepid. VIII. Tin. VI. Alucitae f. B. a. fig. 2. a—f. Tr. Ornix cuculipennella* 9, 2. p. 204. *Gracilaria ligustrinella* Zell. mspt.

*Phycis* rousset des feuilles du tronc ist von derselben Gattung mit der *Syringella*, wie schon die gleiche Weise, ihre

Wohnung zu bereiten, und zu leben, und dieselbe Zahl von Mittelbeinen vermuthen läßt. Von ihrer Färbung gibt R. weiter nichts an, als daß sie weißlich grün ist; den Schmetterling zu beschreiben oder abzubilden, hält er für unnöthig. — Die Hübnerische Raupentafel habe ich nicht gesehen; allein schon die nach derselben genommene Beschreibung den Treitschke zeigt, daß Hübners und *Phycis* Raupen nicht verschieden sind; nur muß es bey Tr. statt „Weide“ Rainweide heißen. Den Schmetterling des Liguisteräupchens kenne ich sehr gut; ich habe ihn mehfach von Herrn Fischer v. Möllers Stamm mit der Nachricht erhalten, daß Freyer in Augsburg ihn sehr häufig mit Liguifer erzogen hat, und daß die Hübnerschen, oben angegebenen Abbildungen diese Art vorstellen. Diese sieht aber ganz anders aus als die in den Europ. Schmettl. *Tin. fig. 192* abgebildete *Cuculipennella*; die erstere hat nemlich hellbräunlich gewölkte Vorderflügel mit mehreren gelbbraunen Flecken, von welchen der vor der Mitte des Vorderanses der größte ist; Hübners *Fig. 192*, welche Treitschke zu beschreiben scheint, hat weißliche Grundfarbe und gegen den Hinterrand drey schiefe Querlinien. Wenn nun dieser Figur der Name *Cuculipennella* bleiben muß, so kann die ächte Liguistermotte nicht ebenso heißen, und daher habe ich ihr den Namen *Ligustrinella* gegeben, zu welcher dem *Phycis* Art ohne Zweifel auch gehört.

113) *Lemmatophila* *pagella*.

R. II. 2. p. 9 et 35. t. 20. f. 5. 6.

Treitschke — 9, 1. Knöch. *Weytr. III. p. 112. tab. 5 u. 6.*

Von der *Pagella*=Raupe ist bekannt, daß sich die zwey letzten Krallenfüße am Ende kolbenförmig verbinden. Knöch hat den merkwürdigen Bau derselben genau untersucht und S. 116 beschrieben. An dem verdickten vorletzten Gliede, dem Schenkel, befindet sich eine kleine Klaue, und da das Endglied, wie gewöhnlich, auch eine hat, so trägt jedes dieser Beine 2 Krallen. — Zinken behauptet, auch die Raupe von *Galatella* habe eine solche Verdickung; allein Freyer hat ihn genügend widerlegt. Daher ist, so viel wir bis jetzt wissen, *Pagella* die einzige Raupe mit dieser Auszeichnung. Die doppelten Krallen sind aber das sichere Merkmal, daß *Phycis* Raupe auch *Pagella* ist. Er sagt: „Gegen das Ende erweitern und verdicken sich die zwey letzten jambe ecailleuses, erhalten etwas fleischiges und gleichen einigemmaßen einer geballten Faust. Diese Masse, die gleichsam der Fuß oder die Hand der Raupe ist, endigt sich in zwey kurze Hälften.“ Wenn *Phycis* Raupe grün heißt, und also von Treitschkes Angabe abweicht, so darf man nur bey Knöch nachsehen, wo man: „auch bläulichschmutzgrün“ angegeben findet.

114) *Gastropacha* *ilicifolia*?

R. II. 2. p. 10 et 36. t. 20. f. 14—18.

Ochsenh. — 3, p. 244. Treitschke — X. 1. p. 183.

Die Raupe hat an den Haaren etwas sehr Auszeichnendes: „Die einen haben die ganz gewöhnliche Gestalt, die andern ähneln dem Fingerring, indem sie einen dünnen Stiel haben und in eine am Ende gezähnelte Platte (Fig. 16) auslaufen; bey manchen dieser Platten steht vom obern Ende eine lange Spitze hervor (Fig. 17); endlich gibt es auch stiellose Haare. Außerdem hat sie auf dem vorletzten Ringe



**Kurzes, fleischiges Horn und über den Beinen an jedem Ringe einen horizontalen fleischigen Ansatz, am ersten Ringe den längsten; ihre Grundfarbe ist weißgrau, worauf ein schwärzliches Braun weißliche Flecken bildet (des taches ondées en point de Hongrie). In den Farben und deren Vertheilung kommt sie der Raupe der *Catocala promissa* nahe.** — Nach dieser Beschreibung kann kein Zweifel mehr seyn, ob eine *Gastropacha* aus der Abtheilung A gemeint sey oder nicht; wenn man bey keinem Schriftsteller weiter die so merkwürdigen, schuppenförmigen Haare erwähnt findet, so ist das nicht *Rs* Schuld. Die Species vermag ich nicht genau zu bestimmen. Da es höchst wahrscheinlich keine neue ist, so kann die Wahl nur zwischen *Betulifolia* und *Ilicifolia* schwanken. Von *Raupenbildern* kenne ich nur die Eispersen, nach welchen ich mich für *Ilicifolia* entscheiden würde. An dieser sehe ich, auch nach *Dahsenheimers* Beschreibung, etwas der *Promissa* ähnliches; doch wundert es mich, daß *R.* des Rothgelben gar nicht Erwähnung thut. *Rs* Raupe war krank, woher sie so klein und vorn zusammengekrümpt und breit ist.

115) *Cymatophora xanthoceros*.

R. II. 2. p. 12 et 36. t. 20. f. 7. 8.

Treitschke — 5, 1. p. 86. Fabr. Noct. *Ridens* III. 2. p. 119.

Die Körperhaltung der Raupe in der Ruhe, wie sie *R.* beschreibt und abbildet, und die ich bey *Cymatoph. flavicornis* in der Natur öfters beobachtet habe, aber bey *Eper* kaum angedeutet finde, hat mich zuerst auf *Xanthoceros* geleitet. Für diese muß die gelbe Körper- und die rothe Kopffarbe entscheiden (denn *Ruficollis* und *Diluta* sehen nach Treitschkes Beschreibung anders aus). „Die Raupe ist von mittlerer Größe, am ganzen Körper schön gelb und mit zwey leichten Reihen kleiner, brauner Flecken; der Kopf ziemlich dick und rötlich.“ Das ovale, braunseidne Gespinnst, in welchem sich *Rs* Raupen verwandelt, finde ich nirgends weiter erwähnt, sondern die Verwandlung, als in der Erde vor sich gehend, angegeben. Vielleicht ist der Mangel an Erde Schuld, daß die Raupen ein solches Gespinnst, wie Fig. 8., fertigten, dafür sich aber auch in keine Schmetterlinge verwandelten.

In der Erklärung der Fig. 8. ist ein Druckfehler; es soll Fig. 7. statt Fig. 5. heißen.

116) \* *Notodonta camelina*.

R. II. 2. p. 12 et 36. t. 20. f. 9 — 13.

Linn. *Phalaena* — 832. Ochsenh. *Notodonta* — 3. p. 58.

Hier ist das Erkennen durch die drey Abbildungen der Raupe leicht, durch die des Schmetterlings wäre es unmöglich. Die Raupe legt nemlich in der Ruhe (Fig. 10. 11.) den Kopf auf den Rücken, was auch *Dahsenheimer* erwähnt; ihre Farbe ist grün, auf dem Rücken weißlich (la couleur dominante est le vert, celle du dos est blanchâtre); auf dem vorletzten Ringe trägt sie zwey fleischige, rothe Hörner (cornes charnues-d'un assez beau rouge). Sonderbarer Weise schweigt *R.* über den Innenrandahn der Vorderflügel des Schmetterlings: „er hat nichts Eigenthümliches an sich, um die Aufmerksamkeit zu erregen; er gehört zur zweyten Classe der Nacht-  
Zie 1838. Sept. 9.

Schmetterlinge; seine Zunge ist gelblich und bildet wenigstens 3 Epitaxindungen; seine Flügel trägt er als ein erhabenes Dach auf dem Leibe. Die Farbe der Oberseite der Vorderflügel ist rötlicher als Simmet; man sieht auf denselben keine deutlich ausgebrühten Flecken, sondern unterscheidet nur verschiedene rötliche Schattierungen; die Unterseite aller Flügel ist ein helleres Gelblich.“

117) \* *Notodonta ziczac*.

R. II. 2. p. 15 et 40. t. 22. f. 8 — 16.

Linn. *Phalaena* — 827. Ochsenh. *Notodonta* — 3. 48.

Die Raupe dieses Spinners ist so sonderbar geformt, daß eine Abbildung, nach der man sie nicht erkannte, kaum denkbar ist. *Rs.* Figuren sind überdies nicht schlecht, und daher ist eine weitläufige Rechtfertigung des Linneischen Citates überflüssig. Die zwey fleischigen Hörner auf dem 5ten und 6ten Ringe, und die couleur d'une agate vineuse machen die Raupe auch aus der Beschreibung kennbar. Aus den Worten le nom de ziczac etc. (S. 16) und cette chenille de l'osier que nous nommons le ziczac (S. 40) sehen wir, wer der eigentliche Urheber des specifischen Namens dieser *Phalaena* ist.

118) \* *Harpyia vinula*.

R. II. 2. p. 19 et 37. t. 21.

I. 1. p. 86 et 128. t. 1. f. 4.

p. 31 et 39. t. 22. f. 3.

Linn. *Phal.* — 815. Ochsenh. *Harpyia* — 3, 20. Geoffroy 2. p. 104. La queue fourchue.

Das Characteristische der Gattung, die zwey Hörner, in die der Hinterleib ausläuft, mit ihren einziehbaren Fleischspitzen, sehen wir in den Abbildungen gut ausgedrückt. Die Größe der abgebildeten Thiere läßt keine große Wahl unter den Arten des Genus *Harpyia*. Sie paßt nur auf *Vinula* oder *Erminea*. Beyde sind aber als Raupen dadurch von einander unterschieden, daß sich bey der Letzten von der weißen, den Rücken einfassenden Linie, auf dem 7ten Ringe eine breite schneeweiße Linie gegen den zweyten Bauchfuß zieht. Davon sehen wir aber auf Taf. 21. nichts, mithin ist hier *Vinula* unbezweifelt dargestellt. — Von der kleinen Raupe auf Taf. 22. spricht *R.* als von einer ausgemacht verschiedenen Art: „sie ist durch die Länge ihres Gabelschwanzes bemerkenswerth, der wenigstens 2 Dritteln der Körperlänge gleich kommt,“ und durch „zwey Arten von Ohren,“ die aus dem ersten Ringe entspringen; ihre Farbe ist nach der zweyten Häutung ein fast citronengelbes Grün, und auf dem Rücken befindet sich ein großer, dunkelbrauner, rautenförmiger Fleck. — Wenn man auch keine eignen Erfahrungen über diese Raupe hat, so lehrt doch ein Blick auf Mößels Bild (Noct. II. tab. 19.), daß *R.* die jugendliche *Vinula* vor sich hatte. Daß er nicht hinter di. Wahrheit kam, daran hinderte ihn der Umstand, daß ihm sein kleiner Raupen starben. Ihre Abbildungen kann man verunglückt nennen; die Hörner und Fleischspitzen sind viel zu dick gerathen. Eine gleiche Bewandniß hat es mit der Raupe im ersten Theile, die ohne Zweifel hierher gehört, da sie (l. c. p. 87) gleichfalls bey Reaumur in Poitou vom Herrn Bazin gefunden worden ist.



119) *Harpyia erminea*.

R. II. 2. p. 30 et 39. t. 22. f. 1. 2.  
Ochsenh. — 3. 24.

Schon R. hielt diese Raupe für eine verschiedene Art, und zwar wegen derjenigen Auszeichnungen, die ich bey *Vinula* angegeben habe, und die in den Abbildungen gut zu sehen sind.

120) † *Platypteryx hamula*.

R. II. 2. p. 33 et 39. t. 22. f. 4. 5.

Wien. Verz. Phalaena — pag. 64. Laspeyres im 4ten Bande der N. Schr. d. Gesellschaft naturf. Freunde S. 40. *Platypt.* — Treitschke *Plat.* — 5, 3. p. 411.

Nur zu *Platypteryx* gehörig zeichnen sich die Raupen dieser und der folgenden Art aus durch den Mangel der Hinterbeine und den in eine einzige Spitze auslaufenden Hinterleib. Die in Fig. 4 und 5. dargestellte Raupe, le cheval marin von R. genannt, ist „gebt wie abgestorbene Blätter, mit verschiedener Schattirung dieser Farbe an verschiedenen Stellen ihres Körpers. Vom obern Theile des 4ten Ringes erhebt sich eine fleischige Pyramide, die in 2 Spitzen endigt, weil ihr oberes Ende gespalten ist; auch der obere Theil des Kopfes ist gespalten.“ Hiemit vollkommen übereinstimmend wird die Raupe von *Hamula* bey Treitschke und Laspeyres beschrieben, weshalb der Letztere, nach dem Vorgange des Wien. Verz., keinen Anstand nehmen konnte, R. unter seinen Citaten aufzuführen.

Folglich irrt aber Linne, der Fig. 4 und 6. (also *Hamula* und *Spinula*) zusammennimmt und zu *Lacertinaria* stellt (Syst. Nat. 860). Fabricius hat dieses Citat, ohne es verglichen zu haben, in Fig. 4—6. verwandelt (3. 2. S. 135).

121) † *Platypteryx spinula*.

R. II. 2. p. 34 et 40. t. 22. f. 6. 7.

Wien. Verz. Phalaena — p. 64. Treitschke *Platypt.* — 5, 3. p. 400.

Welche Art des Genus *Platypteryx* gemeint sey, verrathen die Worte: „ihre (der Flügel) Farbe und die des Körpers waren weißlich.“ Die Bestätigung finden wir in Folgendem: „sie (die Raupe) hat auf dem Rücken zwey kegelförmige Höcker in der Gestalt von Hönern, die an derselben Stelle stehen, wo die vorige Raupe einen einzigen gespaltenen Höcker hat.“

122) \* *Gastropacha quercifolia*.

R. II. 2. p. 41 et 86. t. 23.

Linn. Phalaena — 812. Ochsenh. *Gastrop.* — 3. 247. Geoffroy 2. pag. 110. *La feuille-morte*.

Die scharfgezähnten Vorderflügelränder in der Abbildung und die dunkle Farbe der ganzen Flügel (braun, etwas röthlich, wie ein trocknes Ulmenblatt) zeigen, daß le papillon paquet de feuilles sèches von Linne *quercifolia* richtig bestimmt worden ist.

123) \* *Acherontia atropos*.

R. II. 2. p. 49 et 88. t. 24. f. 1—8.

I. 1. p. 303 et 327. t. 9. f. 11—17.

p. 345 et 357. t. 10. f. 4. 5.

p. 372 et 422. t. 14. f. 2. 3. et A.

Linn. *Sphinx* — 799. Ochsenh. *Acherontia* — 2. 231. Geoffroy 2. p. 85. *Le sphinx à tête de mort*.

Leicht kenntlich in den Abbildungen und an der Benennung *papillon à tête de mort*.

Num. Im Text S. 345 und in der Erklärung der Figuren von Taf. 10. im 1ten Theile ist ein leicht zu erkennendes Versehen. Es heißt *les ailes des figures 3 u. 4 fluit 4 u. 5*.

124) † *Acidalia brumata*.

R. II. 2. p. 125 et 168. t. 27. f. 6—14.

Linn. *Geometra* — 874. Treitschke *Acidalia* — 6, 2. p. 23. Degeer II. 1. p. 331.

Schon sehr früh hat die Nebenart von *Brumata*, *Boreata* Hbn. die Aufmerksamkeit auf sich gezogen; sie hat aber bis in die neuesten Zeiten als Varietät gegolten. Erst Treitschke beschreibt sie als eigene Art (10, 2. 204); allein die Druck-, Schreib- und andern Fehler werden sie schwerlich bald anerkennen lassen. *Boreata* sind die Stücke, von denen Borkhausen sagt (5. S. 298), daß sie hellgraue Vorderflügel und weißliche Hinterflügel hatten, und hiezu gehört, was ich vielfach beobachtet habe, die schwärzlichgrüne oder grünsschwarze, mit weißlichen und gelblichen, ja auch mit grünlichen Längsstreifen versehene Raupe. Lange hielt auch ich diese Art für eine große, sehr helle *Brumata*-Varietät, bis mich die aufgefundenen Weibchen ins Klare brachten. *Boreata* ♀ hat wenigstens doppelt so lange und breite Flügelklappchen als *Brumata*, auf denen eine deutliche Zeichnung vorhanden ist. Diese Art ist in allen Birkenwäldungen um Glogau im Spätherbst zu Tausenden, im männlichen und weiblichen Geschlecht von den Bäumen zu klopfen, ohne daß ich je eine *Brumata* darunter gefunden hätte. *Brumata* lebt hier, außer in Gärten, auch in Eichengebüschen. Einen Unterschied in der Erscheinungszeit beyder habe ich nicht bemerkt; dergleichen habe ich nie einen von beyden Spannern am Nadelholz gefunden, es müßten denn Birken ganz in der Nähe gewesen seyn.

Hienach läßt sich entscheiden, ob R. nur *Brumata* kennt. Seine Raupe ist gewöhnlich blasgrün oder seladongrün (*d'un verd un peu pâle, d'un verd qui tire sur le céladon*) mit weißen Längsstreifen von unbestimmter Zahl (*Brumata*); es gibt auch Raupen, welche zwischen zwey weißen Streifen schwarze, in zwey Reihen geordnete Punkte haben (*Boreata*), wie oben von Borkhausen der Hauptsache nach angegeben. Die männlichen Schmetterlinge beschreibt R. so: „die Oberseite der Vorderflügel ist aschgrau; man sieht jedoch Stellen, die durch braunere und hellere Schattirungen von Grau gebildet werden. Die Unterseite der vier Flügel ist ein einförmiges Grau; man bemerkt auf denselben keine oder wenig Flecken und Wellen (*Boreata*?). Das Graue auf der obern Seite der Vorderflügel

eines dieser Schmetterlinge, der aus einer Haselraupe gekommen war, hatte etwas mehr Gelbliches, als das der andern; es gab auch Schmetterlinge, deren Grau brauner als das der andern war (*Brumata*); aber alle diese Verschiedenheiten sind so leicht, daß sie kein längeres Verweilen verdienen.“ — Auch Degeer gedenkt der *Boreataraupe* und scheint mir sogar den ♂ in Fig. 13. abgebildet zu haben.

Linne citirt aus R. Taf. 30. Fig. 8. 9., aber bestimmt falsch, wie ich später bey *Desofalaria* beweisen werde. Dieses falsche Citat muß fleißig nachgeschrieben worden seyn; wenigstens finden wir bey Borkhausen mehrere Widerlegungen. Die richtige Stelle aus R. sehe ich nur bey Degeer bemerkt.

## 125) *Acidalia boreata*.

R. II. 2. p. 127 et 129.

Treitschke — X, 2. p. 204.

Die schon bey *Brumata* übersehten und bezeichneten Stellen ziehe ich zu *Boreata*; die zuverlässig nicht allein im nördlichen Deutschland vorkommt.

## 126) *Phal. Noctua*? — ?.

R. II. 2. p. 127.

Es scheint mir nicht unmöglich, diese Art nach Rs. kurzer Auskunft bey Paris aufzufinden. „Es gibt 16beinige Raupen, denen diese List (sich zwischen zwey Blättern zu verstecken) nicht unbekant ist. Der Kastanienbaum (*maronnier*) unserer Gärten hat mir eine der letztern gezeigt, die sich dieser List bedient. Sie ist grün, fast so lang wie die Raupen von mittlerer Größe, aber schlank in Bezug auf ihre Länge. Ihre Ringe sind gleichsam durch ziemlich beträchtliche Einschnitte getrennt; ihre 8 Bauchfüße haben vollständige Hakenkränze.“

## 127) *Phalaena Geometra* — ?

R. II. 2. p. 130 et 170. t. 28. f. 2. 3.

Reaumur weiß nicht, ob seine Spanneraupe einerley mit der folgenden ist; ich weiß es noch weit weniger, zumal da mir die folgende ein sehr räthselhaftes Geschöpf ist. Sie lebt auf Eschen, aber nicht zwischen zwey zusammengeklebten Blättern, wie *Brumata*, obgleich sie einen etwas abgeplatteten, kurzen, und daher den Eulenraupen ähnlichen Körper hat. Ihre Farbe ist ein ziemlich schönes Grün; über den Rücken geht ein hellvioletter (*d'un violet clair* p. 130 — *couleur pourpre* pag. 170) Streif, der auf jedem Ringe nach jeder Seite 2 — 3 Arme rechtwinklig ausstreckt (Fig. 2.). — Da die folgende Raupe eben so aussehen soll, so möchte man wohl in beyden einerley Art vermuthen.

## 128) *Fidonia* — ?

R. II. 2. p. 130 et 170. t. 28. f. 1. 2. 4 — 6.

Linn. *Phal. Fidonia* f. 861.

Offenbar ist Fig. 6. die Veranlassung, daß Linne und alle nach ihm den hier vorgestellten Schmetterling zu *Piniaria* als Varietät *Tiliaria* gerechnet haben. Obgleich ich nicht sagen kann, zu welcher andern Art er gehört, so kann ich doch

versichern, daß, wenigstens bey der Raupe, an *Piniaria* nicht gedacht werden darf. Die Raupe ist nach R. so, wie ich bey der vorübergehenden Art überseht habe. Allein so sieht *Piniaria* als Larve nie aus; der purpurfarbige Rückenstreif fehlt ihr stets; dafür sind mehr weiße Längsstreifen da, und von ihr kann man doch wirklich nicht sagen, daß, um sie als Spanneraupe zu erkennen, man erst auf die Zahl ihrer Beine sehen muß (*premier genre des arpentuses* R. p. 125). Daß sie keine Lindenblätter frisst, was Rs. Raupe that, versichert Borkhausen nach seiner ausdrücklich darüber angestellten Beobachtung (5. S. 243). Hierzu kommt die Erfahrung aller Naturforscher, daß die Kiefernspanneraupe erst im Herbst ausgewachsen ist; Rs. Lindenupe gieng aber vers la mi-mai in die Erde. Dort machte sie ein Erdgehäuse, dessen Inneres sie mit einer dichten Lage Seide tapezierte. Ich habe aber etwa 50 Puppen von *Piniaria* fast freylegend unter den Moospolstern gefunden, die ich in dichtem Kieferngehölz im Frühjahr aufhob. Rs. Schmetterling kam zwischen dem 12ten und 24ten December aus, da doch *Piniaria* im Frühlinge schwärmt. Man könnte hier sagen, was wir jedoch nicht angeben finden, es sey im erwärmten Zimmer geschehen (ob das Auskriechen von *Piniaria* dadurch befördert wird, weiß ich nicht), und also wäre auf diese Abweichung nicht viel zu geben. Die übrigen Verschiedenheiten sind aber so bedeutend, daß eine Trennung beyder Arten augenscheinlich nöthig ist. Daher fällt aber auch die Linde als Nahrungspflanze für *Piniaria* weg. Die Beschreibung des Schmetterlings lautet so: „er hat eine gewöhnliche Zunge, die mehrere Windungen macht; seine Fühler sind konisch fadenförmig; die Unterseite der 4 Flügel ist aschgrau (*d'un gris cendré*); die Oberseite der vorderen hat auch diese Farbe, aber verschobene graue Schattierungen ziehen darauf leichte Wellen.“ Von den Wellen auf der Unterseite der Hinterflügel wird geschwiegen; sie sind aber in Figur 6. so deutlich, und drücken im Verein mit dem weißen Längsstrahl *Piniaria*, wie es scheint, so schön aus!

Allein hat *Piniaria* ♀ wohl — es müßten denn so ausgezeichnete Varietäten seyn, wie Borkhausen und Treitschke (10, 2. S. 187: mit weißem gelben Schiller) anführen — wirklich eine aschgraue Farbe, vorzüglich auf der Oberseite? Hat *Piniaria* jemals auf der Unterseite der Hinterflügel drey wellige Querstreifen statt zweyer? Geht der weiße Strahl je so nahe am Innenrande, wie ihn Figur 6. zeigt? Geht der erste Querstreif auf der Oberseite der Vorderflügel jemals so nahe an der Flügelwurzel wie in Fig. 5.?

Findet sich aber keine Art heraus, mit der sich dieses Alles vereinigen läßt, so werden Fig. 5. und 6. doch als *Piniaria* gelten müssen; allein R. hat dann bestimmt eine falsche Raupe dazu gegeben.

## 129) † *Fidonia conspicuaria*.

R. II. 2. p. 132 et 170. t. 28. f. 7 — 10.

Treitschke *Fidonia* — 6, 1. p. 272.

Esper (wenn es nicht Willers ist, den ich nicht nachsehen kann) ist der erste, bey dem das Citat aus R. vorkommt; alle spätern haben es nicht allein begehauptet, sondern geben auch noch immer die Raupe nach R. Ich hebe also nur die Hauptmerkmale aus Rs. Beschreibung des Schmetterlings hervor. Die

Fühler (des Mannes) schön gekämmt (de belles antennes à barbes), die Flügel werden tagvogelartig gehalten (par le port de ses ailes il devoit être mis au nombre des papillons diurnes). Die Hinterflügel auf der Unterseite haben weißliche Strahlen in braunem Grunde des raies -- d'un jaunâtre presque blanc; le reste est brun et même presque noir). Die Vorderflügel oben sind aurorafarbig mit schwarzem Hinterrande (d'un assez bel aurore; leur base est bordée par une bande noire); die Hinterflügel oben ebenso, aber mit vielen schwarzen Punkten un aurore très-piqué de noir et bordé de noir).

### 130) *Amphidasis betularia*.

R. II. 2. p. 135, 137 et 169. t. 27. f. 15. 16.

Linn. Phal. — 862. Treitschke *Amphidasis* — 6, 1. p. 230. Borkh. Geom. — 5. p. 178.

Die abgebildete Raupe, welche auf Eichen lebt, gehört (S. 135) zu den streifen, stockähnlichen Spannern, die ziemlich glatt aussehen. Die Oberseite (S. 137) hat eine unendliche Menge feiner Querrinnen. Die Flecken (S. 169), die sie auf dem Leibe hat, sind zu gewissen Zeiten nur einfache Flecken, zu andern aber Höcker. Nahe beim letzten Paar Beine ist ein Gürtel aus solchen Höckern. Der Kopf ist vorn glatt und oben gespalten.

Wahrscheinlich hat R. diese Raupe nicht zur Verwandlung gebracht, da er nichts über ihre vollständige Größe sagt, und seine Abbildung sie nur halbwachsen darstellt. Die Raupe von *Betularia*, die nach Borkhausen auf Eichen eichgrau ist, hat einen oben herzförmig gespaltenen Kopf, einige eckige Erhöhungen, welche aber auch fehlen, am übrigen Körper oft mit vielen hellen Punkten besetzt; durch die Raupe gesehen, erscheint sie rauh wie Chagrin. Diese Angaben scheinen mir hinreichend, das Zusammengehören der Rschen Raupe und der *Betularia* zu beweisen.

### 131) *Ennomos illustraria*.

R. II. 2. p. 139 et 169. t. 27. f. 17. 18.

II. 1. p. LIV.

Das Charakteristische der Raupen von *Ennomos* Fam. D und E, nämlich ihr knorriges Aussehen, und vorzüglich die verlängerte dritte Paar Krallenfüße, ist an der Abbildung recht gut zu erkennen. Sieht man darauf die Epherische Abbildung von der Raupe seiner *Tiliaria* (*Erosaria* Tr.) an, so ist man sehr geneigt, die Rsche für gleich damit zu erklären. Die Raupenbilder von *Ilmaria*, *Lunaria* und *Illustraria*, die ich kenne (Wien. Verz., Schwarz, Esper), haben bey weitem diese Aehnlichkeit nicht. Und dennoch kann keine der gelben Arten, *Alniaria*, *Tiliaria*, *Erosaria*, *Angularia*, *Quercaria*, *Quercinaria*, zu R's Raupe genommen werden. Sie leben als Raupen in den warmen Monaten und geben ohne Ausnahme den Schmetterling noch in demselben Jahre, sollte es auch noch spät im October seyn. R. aber fand seine Raupe im October auf Eichen und sie verpuppte sich erst im November. Das folgende, je n'en ai pas encore eu le papillon bezieht sich auf dasselbe Jahr, wie man bey aufmerksamem Durchlesen des Capitels erkennt. Diese Zeit läßt sich aber nur auf die mondfliegigen Spanner anwenden, und folglich muß Fig. 17 und 18.

eine dieser Arten seyn. Auch scheint mir, daß diese Raupen bey den mit bekannten Schriftstellern nicht ganz richtig gegeben sind. „Die Farbe der Raupe ist braun holzfarbig, aberig (d'un couleur de bois assez brune mais veinée).

So gefärbte und gestaltete Raupen habe ich auf Eichen im October gefunden, aus denen einer mit in der warmen Stube eine *Illustraria* ♂ ausgekrochen ist. Nach Esper (S. 72) lebt *Lunaria*, der Inbegriff der drei Arten, auf Eichen, und „die meisten waren gewissermaßen rindenfarbig, manche vorzüglich rothbraun, andere düster oder schwärzlichgrau.“

In seinem Berichte über den Schmetterling enthält uns R. die Farbe des Schmetterlings vor, und meldet nur, daß dieser, mag er gehen oder ruhen, seine Flügel immer aufgerichtet trägt, so jedoch, daß sie oben weit auseinander stehen. Diese Eigenheit haben die gelben, oben genannten Spanner und die mondfliegigen mit einander gemein.

Daß Fig. 18. eine falsche Stellung hat, nämlich mit schwebenden Bauchfüßen, wird jeder Kenner einsehen.

### 132) *Ennomos amataria*?

R. II. 2. p. 142.

Treitschke — 6, 1. p. 20.

„Es gibt Arten, die sich in gefalteten oder zusammengezogenen Blättern ihre Puppengespinne machen, so z. B. eine kleine, braune, stabförmige Spanneraupe des Sauerampfers, die ein Blatt dieser Pflanze zusammenzieht und darin eine kleine Hülse von weißer Seide webt.“

Diese wenigen Worte lassen sich nur mit Noth auf *Amataria* anwenden. Denn *Amataria* spinnt sich in so wenigen Fäden ein, daß man sie nicht flüchtig eine *cogne de soie blanche* nennen kann. R. schreibt obenbrein mit Bedacht, wie die gleich folgenden Worte zeigen: „andere begnügen sich, einige Fäden zu ziehen, die, um eigentlich zu reden, keine Hülse bilden, sondern eben hinreichen, die Raupe am Herabfallen zu hindern.“ Ich wüßte aber nicht, an welche Art man mit größtem Rechte denken könnte.

### 133) • *Geometra miata*.

R. II. 2. pag. 142 et 173. tab. 29. fig. 6 — 13. (exgl. 9.).

Linn. Phal. — 869. Treitschke *Acidalia Psittacata* Tr. 6, 2. p. 94.

*Psittacata* fliegt in der Mark Brandenburg und um Glogau im Herbst, überwintert in nicht geringer Zahl und kommt im Frühjahr von Neuem vor. Bey Tage ruht sie mit flach aufliegenden Flügeln an Baumstämmen. Hiemit übereinstimmend kam R's Schmetterling zu Anfang Novembers aus und trug in der Ruhe die Flügel horizontal. Die Abbildung zeigt auch die mit *Psittacata* übereinstimmende Anordnung der Zeichnungen, deren Farbe so beschrieben wird: „die herrschende Farbe der Oberseite der Vorderflügel ist ein ziemlich schönes Grün, auf welches hellere und braunere Schattierungen von Grün, nebst schwarzer und gelbweißer Farbe gelegt sind.“ Wenn auf der Unterseite der Hinterflügel keine Querrinne beschrieben und abgebildet wird, so bezeichnet dieses, da es in der Deut-

lichkeit derselben eine große Verschiedenheit gibt, nur eine unbedeutende Varietät. Nun stimmt aber auch die Raupenbeschreibung vollkommen mit *Psittacata*: der Kopf platt, die Grundfarbe des Körpers citrongelb, längs des Bauches ein röthlicher Streif; der Hintere in zwei Gabelspitzen auslaufend, mit denen sie sich so gut wie mit zwei Weinen anklammern kann. — Ueber die Richtigkeit der Bestimmung als *Psittacata* kann also nicht der geringste Zweifel Statt haben. Treitschke behauptet zwei Raupengenerationen, im May und July; wir dürfen aber gegen Rs Aussage keinen Zweifel haben, daß er seine Raupe von den letzten Tagen des May bis gegen den 10ten October genährt habe, und da mir im Sommer nie eine *Psittacata* vorgekommen ist, so scheint mir die doppelte Generation sehr verdächtig.

Diese Rische *Psittacata* hat aber Linne unter den wenigen Citaten bei seiner *Phal. miata*. Clerck und Ummiall kann ich nicht nachschlagen; auch weiß ich nicht, was andere, außer Borkhausen, Treitschke und Linne darüber gesagt haben. Treitschke scheint darinn Recht zu haben, daß Linne bei seinen spätern Werken nicht denselben Schmetterling vor sich hatte, wie bey den frühern. Erst im Syst. nat. ed. 12 sehen wir R. erwähnt, und die daselbst vollständiger gelieferte Beschreibung zeigt zugleich, daß Linne Originale vor sich hatte. Denn er bemerkt die Quercinlinien (*fascia et arcus*) auf der Unterseite der Flügel, die bey gehöriger Lage der Flügel ein großes lateinisches M vorstellen. Das dreyfache O in der Mittelbinde (für in medio bis in media) hat Borkhausen mit Recht als Varietät angesehen, dergleichen ich selbst besitze. Sedet alis erectis darf man nicht für eine Beobachtung Bergmans ansehen; sondern diese Bemerkung hat ihre Veranlassung in Rs Fig. 12. Offenbar will Linne damit sagen, daß der Schmetterling die Flügel in der Ruhe so hält. Dieses widerspricht aber Rs Worten: *quand il est en repos, il porte ses ailes horizontalement*, und der Wahrheit ganz und gar. Wie Linne die Flügelhaltung angibt, so ist sie, wenn der Spanner nicht längst aus der Puppe gekommen und seine Flügel noch nicht trocken sind, oder bisweilen, wenn er läuft (*quand le papillon marche, il lui arrive souvent de redresser ses ailes*). Da also diese Linneische Angabe als Irrthum erwiesen, auch sonst von keinem großen Belange ist, da die Beschreibung des Schmetterlings aus Besse übereinstimmt, so gehört *Psittacata* zu *Miata*, und der letztere Name hat einzutreten. Der Name *Psittacata* ist überdies ein Verstoß gegen die Anciennität, der zufolge *Siterata* Hufn. den Vortrang haben muß.

Dieselbe Rische Art, *Miata* = *Psittacata*, finden wir auch im Wiener Verzeichniß citirt, und zwar S. 212 als *la chenille arpeuteuse du frêne*. Daß damit nicht etwa unsere Nr. 127., auch eine Eichenraupe, gemeint ist, geht aus der Gesellschaft hervor, in welcher *Olivata* daselbst, nehmlich unter *Caesiata*, *Psittacata*, *Rectangulata*, und zu denen ein mit *Pinaria* verwandter Schmetterling nicht gehören kann. Hiemit ist Treitschkes Rebe (6, 2. S. 158 unter *Olivaria*) widerlegt, daß man nicht wisse, welche Rische Raupe das Wiener Verzeichn. Wenn nun die *Olivata* Syst. Vind. nicht eine bloße Varietät von *Psittacata*, und also etwas anderes als *Olivaria* Tr. ist; so sind beyde Raupen doch so ähnlich, daß die scharfsichtigen Verfasser des Wiener Verz. sie für einerley hielten. Sollten sie, da Treitschke selbst dem Schmetterlinge von Jüli 1838, Heft 9.

*Olivaria* eine Aehnlichkeit mit *Psittacata* zugesiehet, nicht schon der Raupe wegen zu demselben Genus gehören? Sollte die Trennung beyder Arten, die in den Palpen, der Zunge, der Flügelgestalt, der Zeichnung übereinkommen, in zwey Genera nicht wieder ein Beispiel von dem Umwerthe solcher Gattungen abgeben, die einzig und allein, wie die meisten Treitschki'schen, auf bloßer Färbung beruhen? Sollte man daraus nicht schließen können, wie weit wir noch, wenigstens in manchen Theilen der Schmetterlinge, von einem wissenschaftlichen Systeme entfernt sind?

134) \* *Cabera punctaria*.

R. II. 2. p. 145 et 172. t. 29. f. 1 — 5.

I. 2. p. 8 et 47. t. 22. f. 3. 4.

Phal. punctaria Fabr. 3, 1. 132. Treitschke *Cabera* — 6, 1. p. 352.

Linne's *Amataria* ist eine seit langer Zeit best gestellte und allgemein bekannte Art. Da sie fast überall in Europa eine gewöhnliche Erscheinung ist, so kennt man sie auch nach ihren früheren Ständen sehr genau. Zu diesem Schmetterlinge nun zieht Linne (*Phal. amataria* p. 859) ein falsches Citat, eine falsche Raupe und eine falsche Nahrungspflanze. Rs Spanner gehört nehmlich zu *Punctaria*, wie Knoch, Borkhausen und Esper zuerst eingesehen haben. Denn *Punctaria* lebt als Raupe auf Eichen (*J'en trouvai sur le chêne*), *Amataria* auf Ampfer und Knöterich. *Punctaria* hat oft eine grüne, an den Seiten citrongelb gefleckte Raupe (*d'un beau verd ayant seulement de chaque côté une étroite et légère raie citron*), *Amataria* ist nie grün oder auch nur citrongelb gefleckt. *Punctaria* spinnt sich wie die meisten Gbeinigen Tag-Schmetterlinge, d. h. ohne Hülse, mit einem Faden um den Leib an (*accrochée par la derrière et retenue horizontalement par un lien de fils de soie*); *Amataria* legt sich in ein Gewebe von einigen Fäden zwischen Blättern. *Punctaria* als Puppe ist vorn abgestutzt (*le gros bout, celui qui est arrondi dans les chrysalides ordinaires des phalènes, est applati*); *Amataria* als Puppe läuft nach vorn spitz zu. Bey *Punctaria* als Schmetterling fängt der röthliche Quersreifen beynahe an der Mitte des Vorderandes an (*ces points plus serrés les uns auprès des autres vers le milieu de la longueur de chaque aile y forment une raie qui les traverse toutes quatre*); bey *Amataria* hat er seinen Anfang in der Spitze der Vorderflügel.

Die Raupe bey Linne ist nach R. aufgenommen und gehört demnach nebst dem Citate zu *Punctaria*. Habitat in quercu kommt schon in der Fauna vor, und kann also nur auf Eichengetränk bezogen werden, zwischen welchem Sauerampfer wächst und wo daher der Schmetterling öfter vorkommt. — Fabricius hat das Rische Citat richtig bey *Punctaria* aufgeführt, es aber zugleich bey *Amataria* gelassen. Seine andern Fehler gehören nicht zur Sache. — Degerer citirt (II. 1. S. 262) die Rische *Phaläne* zu seiner *Pendularia*, vermuthet aber selbst schon, daß beyde verschieden seyen.

135) *Geometra aeruginaria*.

R. II. 2. p. 148 et 174. t. 29. f. 14 — 18. 9 (19).

Treitschke — 6, 1. 109.

*Aeruginaria* und *Putataria* sind zwey nahe verwandte Arten, wie sie Treitschke für unsere Gegenden unverkennbar beschrieben hat. Beyde sind zart blaßgrün, mit zwey weißlichen Quercinien über die Vorderflügel; allein *Aeruginaria* ist mehr ins Bläuliche, *Putataria* ins Gelbliche; bey *Aeruginaria* sind die Quercinien durchaus ohne wellige längere Ausbiegungen und fast gerade (*strigae subarcuatae integrae*), bey *Putataria* aber sehr deutlich und scharf wellig gezähnt und mehr gebogen (*strigae arcuatae undulato-dentatae*). Beyde Arten habe ich nun schon in mehreren Gegenden der Mark Brandenburg und Schleissens gefunden. *Aeruginaria* fliegt in Laubwaldungen und Hainen und sitzt auf den Blättern der Bäume und Sträucher; *Putataria* traf ich stets in Wäldungen auf Pfläcken, wo Heidelbeerkraut häufig wächst, von dem ich sie auch immer antrufte. — Da beyde Spanner wohl überall im mittlern Europa vorkommen, so sind sie ältern Schriftstellern wahrscheinlich bekannt gewesen. Weil aber die Unterschiede schon an guten Exemplaren einige Aufmerksamkeit verlangen, an versorgenen oder durch Alter ausgebleichten noch schwerer zu beobachten sind; so ist es fast unmöglich, zu bestimmen, was sie eigentlich vor sich gehabt haben.

Reaumur's Art gehört wegen der bis über die Hälfte doppelt verlängerten Flügel des ♂ (Fig. 14.), der Ecke an den Hinterflügeln (Fig. 15. 17.) und der bläulichen Grundfarbe (*les deux côtés des quatre ailes sont d'un bleu tendre*) ganz gewiß zu einer der beyden Arten, und ich erkläre sie für *Aeruginaria*. In der Beschreibung des Schmetterlings liegt außer der Angabe der Flügelfarbe, die eher auf *Aeruginaria* paßt, nichts weiter, was dafür spräche; viel mehr liegt in Fig. 16., wo man die äußere durchgehende Quercinie ohne Undulation sieht. Die Raupe, auf Brombeeren und Eichen, grün, auf dem Rücken eines jeden Gelenkes mit einem rothen Punkte, der Rost tief gespalten, spricht gleichfalls für meine Erklärung. *Putataria* hat auf jedem Ringe einige zerstreute, kleine, rothe Flecken (Tr.), *Aeruginaria* aber nur einen auf dem Rücken (Tr.).

Wey Linne kommt die Rechte Stelle nicht vor; allein Fabricius hat sie unter *Vernaria* (3, 2. 129). Wollte ich ausführen, was seine *Vernaria* ist, so würde das zu weit führen. Mag sie aber *Aestivaria* oder *Vernaria* Hbn. et Tr. seyn, so kann zu ihr Rs Schmetterling nicht gezogen werden, der kaum die halbe Größe dieser beyden Spanner erreicht.

Das Citat ist also falsch. — Borkhausen hat es bey seiner *Vernaria*, die mit der Linne'schen gleich seyn soll, zu welcher Linne'schen aber Treitschke die Hübner'sche *Vernaria* zählt. Hübner's *Vernaria* (*Aeruginaria* Borkh.) hat die Größe von *Lycæna corydon* oder *Adonis*; *Vernaria* soll nach Linne der *Lactearia*, welche doch als *Aeruginaria* zugefunden wird, *similima*, und folglich wohl in der Größe nicht sehr verschiedenen seyn. *Pallide virescentes* lassen sich die Flügel von *Vernaria* gar nicht gut heißen. Endlich kommt *Vernaria* Hbn. schon in unsern Gegenden nicht vor, und daher wahrscheinlich noch viel weniger in Schweden. Daher kann Linne's *Vernaria* nicht gleich mit der Hübner'schen seyn. Borkhausens Art paßt wegen der „zwey perlmutterartigen, etwas gewässerten Streifen“ recht gut auf unsere *Putataria*. Zu dieser gehört aber, wie oben gezeigt wurde, Rs Art nicht. Linne's *Vernaria* kann nicht wohl zu *Putataria* gezogen werden, weil er

sonst dieselbe Art unter zwey Namen (*Vernaria* und *Putataria*) hätte, obwohl eine große Ähnlichkeit der Beschreibung beyder und die Möglichkeit des Zusammengehörens nicht geradezu abzuleugnen sind. —

Latreille's *Vernaria* (hist. des crust. 14. S. 222) ist zweyen der *deux lignes ondées* zu *Putataria* zu ziehen, und mithin sein Citat aus R. unrichtig. — Eben dahin gehört mit aller Sicherheit Deger's *Vernaria* II. 1. S. 264 T. 6. F. 8. — Dieser hat Rs Art zu seiner *Putataria* gebracht; er beschreibt unsere *Putataria*, bildet aber offenbar *Aeruginaria*, mit nicht welligen Quercinien in beyden Geschlechtern, ab. Da die Beschreibung gelten muß, so citiret auch er falsch. — Wey Treitschke fehlt nicht allein diese Stelle, sondern die meisten aus Reaumur.

### 136) • *Fidonia defoliaria*.

R. II. 2. p. 150 et 175. t. 30. f. 1—16.

I. 1. p. 130. t. 1. f. 11—13.

Fabric. Phalaena — 3, 2. p. 148. Treitschke  
*Fidonia* — 6, 1. p. 315.

Figur 1. (die Raupe), Figur 2. (der männliche Schmetterling), und Figur 9. (das vergrößerte Weibchen) sind augenblicklich als *Defoliaria* Linn. zu erkennen. Die Raupe ist mehr oder weniger braun, oder röthlich holzfarben, gemischt mit einer größeren oder geringen Menge von Gelb. Der männliche Schmetterling hat eine Grundfarbe, die die Mitte zwischen Holzfarbe und Falb hält (*entre la couleur de bois et la couleur fauve*), und in der sich schwarze Wellen und Flecken finden; auch der Hinterleib ist falb und schwarz getigert (S. 155). Das Weibchen ist isabelfelb mit fast regelmäßig vertheilten schwarzen Flecken (S. 153). Daher citirt Fabricius diese Stelle richtig bey *Defoliaria*; allein mit Unrecht nimmt er die ganze Tafel dazu, indem die 4 letzten Figuren zu einer andern Art gehören. Sonderbarer Weise finden wir bey Linne Fig. 8. und 9. unter *Brunata* aufgeführt, deren Weibchen doch viel längere Flügelklappen hat, und braungrau, nicht aber chamois und *régulièrement tigré* ist.

Die Abbildungen im ersten Theile der *Mémoires* sind sehr unkenntlich, aber durch die sehr gute Charakterisierung (S. 131) gesichert.

### 137) *Fidonia* — ?

R. II. 2. p. 154 et 177. t. 30. f. 17—20.

Ich fürchte nicht, zu viel zu sagen, wenn ich behaupte, daß die ungelügelter Schmetterlingsweiber nach ihren vesten Unterschieden noch ganz ungenügend bekannt seyen. Sie sehn den Männern meistens so unähnlich, daß ihr Zusammengehören nur durch die Erziehung aus den Raupen, den gleichen Aufenthaltsort oder die Begattung u. zu erkennen ist. Manche der oft nicht einmal befriedigenden Beschreibungen bey Treitschke bedürfen daher wohl noch der Bestätigung. Unter diesen Umständen weiß ich die vorliegende Art keinem mir bekannten Schmetterlinge als das andere Geschlecht mit Sicherheit zuzutheilen, möchte sie aber doch, ungeachtet der abweichenden Treitschke'schen Beschreibung, noch am ersten zu *Aurantaria* Hbn. bringen. — Rs Schmetterling kann nicht, wie doch Fabricius

meint, zu *Defoliaria* gehören. *R.* selbst unterscheidet ihn davon (p. 177 que ce papillon ne doit pas être confondu avec celui de la fig. 8.) und mit recht gewichtigen Gründen. Obgleich dieses Thier wie *Defoliaria* ♀ isabellgelb und, zwar weniger regelmäßig, schwarz getigert war, so hatte es doch längere Flügel (des ailes un peu plus sensibles) und, was die Hauptsache ist, eine vollkommene Zunge, die wenigstens 2 Spirallwindungen machte.

Die Raupe gibt mir aber den Hauptgrund zu meiner vorhin angegebenen Vermuthung, obgleich auch sie nicht genau mit Treitschke's Beschreibung zusammenpaßt. Nach *R.* lebte sie auf Haseln, und zwar holzfarbig, wie die andern (*Defoliaria*), mit Gelb, welches bennähe wie bey einigen der andern vertheilt, nur stärker aufzutragen war. Es gibt aber zwey der *Defoliaria* nächststehende Arten; *Aurantia* und *Progemmaria*, deren Räupen, zumal die erstere, der *Defoliaria* wahrscheinlich sehr ähnlich seyn werden. Treitschke meldet, diese 3 Arten überwintert oft. Von unsren Gegenden kann ich dreist hinsichtlich der *Defoliaria* und der *Progemmaria* das Gegentheil versichern. Erstere überwintert so wenig wie *Brunata* und *Boreata*; *Progemmaria* erscheint stets im ersten Frühjahr, ein wenig später als *Leucophaearia* eintretend, aber doch mit dieser zusammen, in Eichenwäldern fliegend. Von *Aurantia* weiß ich bloß die Erfahrung anderer, daß sie nur im Herbst fliegt, und dieses ist auch mir wahrscheinlich. Darum vermute ich aber eben, daß *Reaumur's* Schmetterling zu *Aurantia* gehöre.

### 138) *Amphidasis zonaria*.

*R. H. 2.* p. 156 et 178. t. 31. f. 7. 8.

Treitschke — 6, 1. p. 251.

Mich wundert, wie man so leicht kenntliche Abbildungen hat übersehen können. In Fig. 7. sehen wir die natürliche, mit *Zonaria* ♀ übereinstimmende Größe. Wenn es wahr ist, was Treitschke und andere sagen, daß die Hinterleibseinschnitte roth sind, so hat *R.* ein getrocknetes Weibchen beschrieben, dergleichen ich genau übereinstimmend vor mir habe. „Die Ringe sind schwarzbraun; was den Schmetterling außerordentlich ziert, ist, daß diese Ringe mit sehr gedrängten rosenrothen Haaren gefranzt sind; die Ränder der kurzen Flügel haben oben so gefärbte und verhältnismäßig sehr lange Franzen; der Bauch endlich ist mit diesen rosenrothen Haaren so bedeckt, daß man davon die Ringe nicht sehen kann.“ — Mit *Zonaria* gleichfalls zusammenstehend, wird die am 26. Juny auf der *Centaurea jacea* gefundene Raupe als blaß citronengelb angegeben.

### 139) *Amphidasis hispidaria*?

*R. H. 2.* p. 157 et 179. t. 31. f. 9—15.

*I. 1.* p. 215. t. 4. f. 10.

Treitschke — 6, 1. p. 247.

Wenn ich allein auf die Raupe sehe, und annehme, daß unsere Autoren diese im Genus *Amphidasis* alle richtig beschrieben und jeder Art richtig zugehöht haben, so hat *R. Hirtaria* vor sich gehabt. „Röthlich violett, der Länge nach wellig gestreift, mit einem schönen gelben Halsbande und 2—3 kleinen goldgelben Flecken auf jedem Ringe“ (*C. 157*) sind die

von *Reemann* Taf. 37. abgebildeten Räupen auch, welche allgemein zu *Hirtaria* gezogen werden. Allein *Hirtaria* hat, wie bekannt, im weiblichen Geschlechte ganz ausgebildete Flügel; als Raupe hat einen kurzflügeligen Schmetterling und muß also eine andere Art seyn. Ich nehme daher als ausgemacht an, daß *R.* nicht einen in der Entwicklung gestörten verküppelten Schmetterling für eine femina microptera (richtiger microptera oder brachyptera) angesehen habe. Eine solche Annahme wäre in Beziehung auf *Hirtaria* schon darum unstatthaft, weil an dieser der Thorax durchaus keine rothgelben Haare hat (*il a aussi des poils roux*.)

Diese rothgelben Haare sind aber der sprechendste Beweis dafür, daß *Hispidaria* oder *Pomonaria* von *R.* beschrieben wird. Ich kann jedoch nur nach den Beschreibungen urtheilen, da mir beyde Arten in der Natur fehlen. Die sehr höckerige, borstige Raupe von *Pomonaria* paßt durchaus nicht zu *R.* schwach warziger, ganz kahler Raupe, und folglich ist die Wahl auf die einzige Art *Hispidaria*, deren Raupe „der von *Hirtaria* ähnlich seyn soll“ (*Tr.*), eingeschränkt. Treitschke's „kaum merkliche Spuren von Flügeln,“ vielleicht nach *Esper's* Figur beschrieben, an der man gar keine sieht, müssen dann in einem *Reaumur's* Worten: *plus grandes et plus aisées à reconnaître pour des ailes*“ angemessenen Sinne aufgefaßt werden. Da dieß aber nicht ohne Zwang geschieht, so kann der Name *Hispidaria* nur ein Fragezeichen erhalten.

### 140) † *Cabera omicronaria*.

*R. H. 2.* p. 159 et 179. t. 31. f. 16.

Treitschke — 6, 1. p. 358. Borkhausen *Geometra* — 5. p. 262.

Die Abbildung macht den Schmetterling viel kenntlicher als die Beschreibung. In jener sehen wir die charakteristischen Ringe in der Mitte der Flügel, von denen diese kein Wort sagt. Uebrigens stimmt sie genau ein: „die weiße Zunge rollt sich wenigstens zu 3—4 Windungen; die Fühler sind conisch fadenförmig. Er gehört zur vierten Gattung oder zur Gattung derjenigen, deren Vorderflügel die Hinterflügel fast ganz frey lassen; die Oberseite aller ist ein gelbliches Weiß, leicht mit Röthlichem verwaschen. Braune Flecken bilden durch alle vier Flügel einen ziemlich breiten Streif, der dem Hinterrande näher als der Wurzel ist; andere schwächere braune Flecken tragen mit dem genannten Streif zu einer angenehmen Flügelzeichnung bey.“

### 141) *Phalaena Geometra*.

*R. H. 2.* p. 159 et 177. t. 31. f. 1—6.

Die in den Abbildungen vergrößerte Raupe lebt auf Roskastanienblättern. „Die Grundfarbe ihres Rückens ist braungrün, ins Olivenfarbige ziehend, und die des Bauches gelblichgrün. Zu jeder Seite des Rückens hat sie einen schwarzbraunen Streifen. Auf dem Hintern geht ein schwarzer Quersreif von dem einen Längsstreifen zum andern.“ — Diese auffallend gezeichnete Raupe keune ich nicht.

### 142) • *Nymphula potamogalis*.

*R. H. 2.* p. 182 et 198. t. 32. f. 1—12.

Linn. Phal. *Potamogata* 1783. Latreille hist. d. crust. 14. p. 231. *Botys potamogata*.

Treitschke *Nymphula Potamogalis* 7. p. 143.

Ein Zeitraum von 100 Jahren ist vorüber, und noch finden wir in den neuesten Werken die Naturgeschichte von so ganz gemeinen Schmetterlingen, wie *Potamogalis*, *Lemnalis* und *Stratiotalis*, nur nach Reaumur's und Degér's Beobachtungen beschrieben. Daß die Raupen von der sich ovale, aus zwey Stücken bestehende Gehäuse bauen, und von der ihre Wohnung aus mehreren Wasserlinien zusammenlegenden Art, von *R.* richtig beschrieben worden sind, das bezeugt Degér; ob aber die erstere *Potamogata* Linn., die andere *Lemnata* Linn. ist, darüber finden wir bey ihm nichts. Ich selbst habe die Raupen nicht erzogen, und kann, da die Nahrung nicht viel entscheidet, fast nur nach den ausgebildeten Insecten urtheilen.

Von der *R.* an *Potamogeton natans* beobachteten Schmetterling nennt Linne, mit einer eigenthümlichen Verstellung des Stammnamens, der Kürze wegen *Potamogata* statt *Potamogetonata* (oder besser *Potamogetonalis*). Welches Insect er damit meynete, ist jetzt außer allem Zweifel gesetzt. Mit Recht hat er aber die Rische Samenkrautraupe dazu gezogen. Als Beschreibung des Schmetterlings (S. 192) beweist: „es sind ziemlich hübsche Nachtschmetterlinge mit fadenförmigen Fühlern und einer Röllzunge. Die Grundfarbe der vier Flügel oben und unten ist ein Perlgrau, das sich in Flecken von verschiedenen Figuren, nemlich einige fast rund, andere gestreckt und unregelmäßig, theilt; diese perlgrauen Flecken werden aber durch eine bräunlichgelbe Stücker (lüzéé feuille-morte), die selbst wieder stellenweise Flecken bildet, hervorgebracht. Das Gelbliche auf der Unterseite der Flügel ist brauner als auf der Oberseite.“ Die perlgrauen Flecken lassen sich allenfalls auch auf *Nymphaealis* deuten, obgleich sie hier eher silberweiß oder glänzender schneerose sind; aber das lüzéé feuille-morte und die braunere Unterseite (bey *Nymphaealis* ist sie bedeutend blässer als die Oberseite) gehören unstreitig der *Potamogata* Linn. an.

#### 143) *Nymphula nymphaealis*.

R. II. 2. p. 193.

Treitschke — 7. p. 141.

Bedenkt man, daß die *Potamogalis* = Weiber gewöhnlich doppelt so groß als die Männer sind, so leiten die Worte augenscheinlich auf *Nymphaealis*. Der Schmetterling, obgleich weiblichen Geschlechts, „war ziemlich klein und viel kleiner als andere, die ich aus den Wassertrauben derselben Pflanze erhalten habe, was mich geneigt macht zu glauben, daß diese Pflanze zwey ziemlich ähnliche Arten von Raupen nährt, deren Schmetterlinge nur in der Größe merklich verschieden sind.“ — Gewöhnlich fliegen *Potamogalis* und *Nymphaealis* mit einander, und als Vermuthung scheint gegründet, auch wenn kein von Samenkrautpflanzen erhaltener Schmetterling nicht *Nymphaealis* gewesen seyn sollte.

#### 144) *Nymphula* — ?

R. II. 1. p. 194.

Reaumur unterscheidet noch eine andere Art mit folgen-

den Worten von *Nymph. potamogalis*: „das Samenkraut nährt noch eine von der bisher besprochenen verschiedenen Raupe; sie ist bey nahe von gleicher Größe, aber runder und anders gefärbt, nemlich grünlichbraun (*Potamogalis* ist S. 185 weiß mit einigem Glanze). Ich habe sie mit verschiedenen Stücken von Samenkrautblättern, die an ein großes Blatt derselben Pflanze geheftet waren, bedeckt gefunden. Ihre Wohnung ist, im Vergleich mit der von *Potamogalis*, ungestalt und plump.“ — Der Unterschied in der Raupe möchte weniger bedeutend scheinen, wenn man nicht bedächte, daß *R.* von *Potamogalis* wenigstens 50 Raupen sah (S. 184 plus d'une centaine de loges, dont les unes étoient habitées par des chenilles et les autres l'étoient par des chrysalides). Das Bedeutsame ist aber, daß diese braungrünen Raupen die Hälfte ihrer Hülle aus mehreren Stücken zusammenlegten. Wäre es nicht dieselbe Pflanze, sondern eine klein- oder schmalblättrige; so ließe sich denken, daß die Raupe dasjenige, was sie nicht mit wenigen großen Stücken ausführen konnte, mit mehreren kleinern ausführen mußte. Dieses ist aber hier nicht der Fall.

An *Nymphaealis* ist nicht zu denken, weil deren Raupe nicht von bey nahe gleicher Größe seyn kann, und *R.* sie der Größe nach für *Potamogalis* gehalten hatte. Allein was soll diese neue Art für eine seyn? *Stratiotalis* gewiß nicht, wie Degér's Abbildung zeigt; *Lemnalis* auch nicht, wie bey *Lemnalis* gezeigt wird. Sollte sie zu der *Phalaena palustrata* Fabr. (3. 2. 214) gehören, die „in Galliae aquosis“ lebt und mir unbekannt ist?

#### 145 \* *Nymphula lemnalis*.

R. II. 2. p. 195 et 200. t. 32. f. 13 — 16.

Linn. Phal. *Lemnata* 1784. Treitschke *Nymphula Lemnalis* 7. p. 134.

Bey der Wasserlinse-raupe sind die Luftlöcher sehr klein und außerdem von gewöhnlicher Gestalt, während die Samenkrautraupe kleine durchbohrte Warzen hat. Hiernach also kann die vorhin besprochene, mir unbekannte *Nymphula* nicht zu *Lemnalis* gehören. Der Rische Wasserlinse-Schmetterling ist aus der Abbildung nicht zu erkennen; man ersieht bloß daraus, daß, wenn sie ihn vorstellen soll, wofür allenfalls die ganz weiße Unterseite der Hinterflügel in Fig. 17. spricht, sie ein Weibchen vorstellt. Hier könnte nun die Beschreibung in sehr wenigen Worten den Ausschlag geben. Es ist aber merkwürdig, daß *R.* das beste Merkmal, die schönste Zier dieses Schmetterlings, die schwarze mit Silber punctierte Binde am Hinterande der Hinterflügel, wegläßt, indem er bloß schreibt: „sein Körper, die beyden Seiten seiner Hinterflügel und die Unterseite der Vorderflügel sind schon weiß, etwas silbericht.“ So anstößig dieses ist, so bin ich doch überzeugt, daß *R. Lemnalis* vor sich hatte. Wenigstens ist gewiß, daß *Lemnalis* als Raupe an Wasserlinien lebt; sie fliegt hier, ohne die Gattungsverwandten, in größter Menge auf einigen Pfützen, die im Sommer von Wasserlinien einen dichten grünen Ueberzug erhalten.

#### 146) *Phalaena Noctua*.

R. II. 2. p. 207 et 268. t. 33. f. 1.

Sobald von Raupen die Rede ist, die ihres Gleichen fressen, so fallen mir *Cosmia trapezina* und *Heliothis Scu-*



tosa (scutosus) ein, die ich nie mit andern zusammenstecken konnte, ohne daß sie, selbst schon in dem Glase, in welchem ich sie nach Hause trug, sich über sie bergemacht und todtgebißen hätten. In N's Raupe, die auf Eichen lebt, erwartete ich nichts als Trapezina; allein jene ist schwarz oder braunschwarz mit drei schönen Längsstreifen, diese ist stets grün mit mehreren Längslinien, und folglich sind beyde verschieden. An Scutosa, die auf Weisß lebt, ist gar nicht zu denken. Eine andere Euleraupe, auf welche N's ganze Beschreibung paßt, finde ich nicht, und doch ist diese Raupe um Paris nicht selten, da N. gegen 20 Stück sammelte. Sie fragen einander auf, bis eine einzige übrig blieb, und diese starb eines natürlichen Todes.

147) *Cossus terebra*.

R. II. 2. p. 281.

Ochsenh. — 3, p. 92.

Nach Ochsenheimer unterscheidet sich die Raupe dieses *Cossus* durch ihren gelben Rücken von der dunkelrothen Raupe des *Ligniperda*. Wenn dieser Unterschied standhaft ist, so hat N. die *Terebra*-Larve gehabt. Herr Bazin hat in Neaumur eine andere Art (als *Ligniperda*) gefunden, welche eine gelbliche und braun punctirte Haut hatte (jene heißt *rouge ou rougeâtre*).

Hinterher erzählt N. von einer dicken grauweißen Phaläne, die er aus einer in einem jungen Apfelbaum lebenden Raupe dadurch erhielt, daß er um die Stelle ihres Aufenthalts einen Sack gebunden hatte. Da behauptet wird, *Terebra* lebe nur in Pappeln, so kann man hier nicht gut etwas anderes als *Ligniperda* erkennen. N. war, als er das schrieb, schon lange nicht mehr im Besitze des Schmetterlings, und von der Raupe hatte er sich nichts aufgemerkt.

148) \* *Cossus aesculi*.

R. II. 2. p. 282. t. 38. f. 1—6.

Lin. Phalaena — 833. Ochsenh. *Cossus* — 3, p. 99.

Schon in der Abbildung sehr kenntlich. Linne hat die Stelle citirt, und, auffallen genug, fogar die Figuren der Raupe mit angeführt. Fabricius läßt aber, wahrscheinlich ohne Absicht, das ganze Citat weg. Ich hebe zur Bestätigung des Linneischen Citates aus N's Beschreibung nur das langgestreckte Ansehen in der Ruhe und die weißen Vorderflügel mit schwarzen Puncten hervor, welche Puncte aber eigentlich dunkelgrün sind (d'un verd foncé). — Zu den Futterpflanzen dieser Raupe kann aus N. (S. 285) noch die Rainweide hinzugefügt werden.

149) *Phalaena* — ?

R. II. 2. p. 285.

N. fand seine Raupe im Winter zwischen der Rinde und dem Splint der Ulme; sie war schlank, unter mittlerer Größe, graulich, mit zerstreuten Haaren. Ich kenne keine Raupe, die sich darauf deuten ließe. Von N. läßt sich übrigens erwarten, daß er keine zur Ueberwinterung unter Rinden versteckte Raupe für eine Holzraupe angesehen haben werde.

Juli 1838. Heft 9.

150) *Hepiolus sylvinus*.

R. II. 2. p. 285 et 337. t. 39. f. 1—4.

Lin. Phal. sylvina 834. Ochsenh. *Hepiolus sylvinus* 3. p. 109.

Indem ich mit N. alle seine Raupen, aus den Wurzeln der Orobante, aus den Stengeln und Wurzel der Scrophulaire und den Stengeln der Laitues und Chicous für einerley annehme, finde ich hier die unsern neuern lepidopterologischen Schriftstellern unbekannte Naturgeschichte des *Hepiolus sylvinus* ziemlich ausführlich gegeben. Daß es ein *Hepiolus* sey, darauf leitet die im Habitus gut getroffene Fig. 4. In der Beschreibung möchte man gern die kurzen Fühler dieses Genus erwähnt finden. Dieß geschieht aber nicht, und die Beschreibung derselben bedarf selbst einer Erläuterung. Sie sollen lange Sägezähne mit abgerundeten Spitzen und daran etliche Haare haben. In der Wahrheit haben sie Lamellen, die, nur von der Seite angesehen, als Zähne erscheinen, und die Haare daran darf man sich nicht etwa als Büschel bildend vorstellen. Die Verschiedenheit in der Angabe der Zunge (point de trompe R. — Sauger sehr kurz, Ochsenh. 3, S. 103) wird jedermann leicht zu vereinigen wissen. In den getrockneten Exemplaren, die ich nicht zerstören mochte, nahm ich keine wahr. „Ihre Flügel bilden ein gut zugerundetes Dach mit schmaler Basis. Der Thorax sehr haarig, weißlichgrau. Die Wurzel des Flügels von derselben Farbe; ein großer Theil eines jeden Flügels wird von einem dreieckigen Flecke eingenommen, dessen eine Ecke, wenn der Schmetterling ruht, gegen die Mitte des Leibes gerichtet ist; der vordere Theil dieses Dreiecks ist röthlichbraun, der hintere wölft sich allmählich mit hellern Farben. Das Uebrige des Flügels ist brauner und scharf gegen das Dreieck abgeschnitten (une pièce appliquée contre ce qui précède). Ich erkenne aus dieser Beschreibung das Männchen von *Sylvinus*, dessen hinterer heller Querstreif besser in der Figur als in der Beschreibung angezeigt wird. — Treitschkes Vermuthung (X. I. p. 161) wäre demnach richtig.

151) *Myelophila cribella*.

R. II. p. 288 et 337. t. 39. f. 5. 6.

Treitschke — 9, 1. p. 205.

Die Beschreibung der in der Figur gut dargestellten Raupe paßt sehr genau auf meine beyden ausgeblasenen Raupen dieser Motte. „Sie lebt in einem Canale des Markes der *Enula campana* (In. hel.), hat vollständige Hakenkränze an den Bauchfüßen, ist weißlich mit etwas Olivenfarbe, zu beyden Seiten auf jedem Ringe mit zwey, unter der Loupe sichtbaren, schwarzen, auf einem schwarzen Höckerchen stehenden Haaren; ihr Kopf und das Nackenschild sind glänzend schwarzbraun.“ Dunklere Längsstreifen, mit welchen die *Cribrella*-Raupe in der Natur stets versehen ist, sehen wir in der Abbildung angedeutet.

152) *Penthina gentianana*.

R. II. 2. p. 289 et 339. t. 39. f. 7. 8.

p. 249 et 271. t. 34. f. .

Treitschke — 10, 3. p. 50.

Zwar ist N's Beschreibung sehr mangelhaft („eine kleine Raupe, kahl und weiß, 16 beinig, mit vollständigen Hakenkränzen an den Mittelbeinen“) und stimmt wegen ihrer Ober-



flüchlichkeit nicht ganz; dennoch kann man gegen die Richtigkeit des Namens keinen gegründeten Zweifel hegen. „Gartendistel“ bey Treitschke soll wohl nichts anderes als Kardendistel seyn; und die gewöhnliche Farbe der Raupe „beingelb“ wird mit blanche ziemlich gleichbedeutend seyn. Die Lebensweise der Augsburger und der Reamurer Raupe ist ganz gleich und vereinigt sich mit der von einer Eisenach Raupe, welche in Füßli's Naturhistorisch. Magaz. 2. Stück Seite 207 beschrieben wird. In der letzten Stelle werden der Raupe kleine, graue Härchen ertheilt, die sie auch aller Wahrscheinlichkeit nach hat, deren aber weder Freyer, noch Reamur gedenkt. Allein der Schmetterling war eben so gut Gentianana wie bey Freyer.

### 153) *Phalaena* — ?

R. II. 2. p. 295.

In den Schriften des Herrn de la Hire wird eine kleine, grüne, 16beinige Raupe von etwa 4 Linien Länge erwähnt, die sich am 9. August in einer Apricose fand. Sie spann sich am 13. ein kleines, weißes, seidenes Gespinnst, das aber verloren gieng. R. vermuthet, die Raupe habe sich nur in eine vor Ueberreife geplagte Apricose begeben, um sich zu verwandeln, und ich stimme ihm in dieser Hinsicht bey.

### 154) *Phalaena Noctua* — ?

R. II. 2. p. 296 et 340. t. 40. f. 11. 12.

Nach der Größe und der ausgebildeten Zeichnung ist diese Raupe eine Eulenraupe, die mir zu den Gattungen *Hadena* oder *Miselia* zu gehören scheint. An dem Futter, dem Samen der Bohnen, darf man keinen Anstoß nehmen. Gerade diese samenfressenden Raupen habe ich am allerersten an Brodnahrung gewöhnt, die ihnen fast lieber und gewöhnlicher als ihre Neilsamen wurde. So hätte auch R's Raupe wahrscheinlich nicht minder gern Samen von *Lychnis*, *Dianthus* etc. oder Brod gefressen. Allein eine Raupenbeschreibung, die sich bequem auf die feine, die doch sorgfältig genug ist, anwenden ließe, finde ich nicht. „Die Raupe ist kahl, hat jedoch einige ziemlich kurze, entfernt von einander stehende Haare, deren jedes auf einem Höckerchen steht. Sie ist 16beinig, die Mittelbeine nur mit halben Patenträgen. Auf den ersten Blick zeigt sie sich braun; bey genauerer Betrachtung bemerkt man einen olivenbräunlichen Rückenstreif, der zu jeder Seite von weniger deutlich begrenzten Streifen begleitet wird, in denen man ein weinfarbiges Röthlich bemerkt; am übrigen Körper und am Bauche sind die verschiedentlich zu weissen Zeichnungen gemischten Farben hellbraun, grünlich und weinfarbigbraun.“

### 155) *Lycaena baeticus* (a).

R. H. 2. p. 299 et 335. t. 33. f. 7—10.

Lin. Papilio — 789. Ochsenh. *Lycaena* — 1, 2. p. 99. Geoffroy II. p. 57. Le portequue bleu strié.

Auf der Unterseite der Hinterflügel befinden sich zwey Augen mit schwarzer Pupille, die auswärts halb von einer kleinen glänzenden Binde (par une petite bande brillante) und halb von einer blassen Gelbfarbe (couleur d'un or pale) eingefasst werden, und auf der Oberseite dieser Flügel als schwarze Flecke durchscheinen. Außerdem werden hellgraue und weißgahgraue

Wellen auf bräunlichem Grunde beschrieben, wodurch sicher wird, daß R. entweder den *Baeticus* oder den *Telicanus* vor sich hatte. Die Abbildung Fig. 10 entscheidet durch ihre Größe und durch das weiße Band der Hinterflügel, welches an *Telicanus* standhaft fehlt. Daß die Flügel oben blau sind, hat R. anzuführen vergessen.

Da also hier *Baeticus* nach seiner Naturgeschichte beschrieben ist, so kann sie nunmehr in den neuern Werken (vergl. Treitschke 10, 1. S. 77) nachgetragen werden. Dieser Schmetterling muß übrigens nebst *Telicanus* wegen des zugerundeten Schwanzwinkels und des Schwanzhakens, aus der Abtheilung C (*Thecla*) des Genus *Lycaena* entfernt und in A (*Polyommatus*) neben *Amyntas* gestellt werden; mich wundert, daß dieses nicht schon längst geschehen ist.

### 156) *Grapholitha nebrimana*.

R. II. 2. p. 301.

Treitschke — 8, p. 209 et 10, 3. p. 115.

Die Raupenbeschreibungen R's und Treitschke's stimmen überein und ich kann beyde bestätigen, da Raupe und Schmetterling auf Erbsenfeldern sehr gemein sind. Nach R. ist die Raupe weißlich oder grünlichweiß mit schwarzen Punkten; nach Treitschke gelblich (so sah ich sie meistens), zuweilen auch grünlichweiß mit kleinen grauen Punktwarzen.

### 157) *Scardia (Oecophora) betulinella*.

R. II. 2. p. 305 et 338. t. 39. f. 9—21.

Treitschke 9, 1. p. 9 et 10, 3. p. 151.

So manches, was uns wesentlich erscheint, hat R. als unwesentlich weggelassen. Bey der vorliegenden Art halten wir den schneerassen Kopf und Rücken zur Bezeichnung der Art für sehr nöthig; R. schweigt darüber. Allein in Fig. 19 sehen wir beydes gegen die dunkle Flügelfarbe so abstechend, wie es in der Natur der Fall ist. Diese vergrößerte Abbildung ist allein mehr werth als Fig. 18, 20 u. 21 zusammen; sie zeigt uns naturgetreu die langen zurückgekrümmten Palpen (S. 317: *cette tête paroît porter deux cornes semblables aux cornes de bœlier*), die, verbunden mit der Gestalt der Hinterflügel (falsch in Fig. 21), hinreichend sind, zu erkennen, daß *Betulinella* nichts mit den übrigen *Scardien* Treitschke's gemein hat. Das Uebrige der Beschreibung: die ganz flache Flügelhaltung in der Ruhe, die glänzenden sehr hell zimmetfarbenen Vorderflügel, die weißlichgrauen, sehr lang gefranzten, schmalen Hinterflügel, alles dieses paßt sehr schön auf *Betulinella*. — Weil aber in der Beschreibung der weiße Thorax übergangen worden, in Fig. 21 die Hinterflügel in falscher Form dargestellt sind; so müssen wir zur völligen Beweisführung auf die Raupe sehen. Und diese stimmt mit der Treitschke'schen überein. Beyde sind weiß (*toute blanche R.* — gelblichweiß Tr.), haben einen bräunlichen Kopf (*un peu brune R.* — hellbräunlich oder gelbbraun Tr.) und leben vom Mehle (innerhalb der Getreidekörner R. — mit Mehlwürmern zusammen Tr.). — Nach R. ist *Betulinella* ein schädliches Thier (S. 319); ich habe sie stets nur einzeln in den Häusern gefunden.

R. unterscheidet von dieser *Betulinella* ausdrücklich (S. 308) die ächte Getreidemotte (*Granella*), welche nicht inner, halb der Körner selbst lebt, sondern sie von außen anfrisst.

Unsere Stelle wird in Hüßky's N. Mag. (2. Bd. S. 10) als zu einem Insect gehörig citirt, welches das Getreide verzehrt. Die dort gegebenen Nachrichten sind, so weit sie mit den R Thier übereinkommen, richtig; die Zusage vom Ausstrecken, vom Inficte, sind nichts als Fabeln.

Sollte nicht zu *Betulinella* die bey Latreille (hist. d. crust. 14. p. 252) in der Anmerkung unter *Olivella* erwähnte schädliche teigne des bleds gehören?

158) \* *Carpocapsa pomonana*.

R. II. 2. p. 303, 320 et 339. t. 40. f. 1—10.

Linn. Phal. pomonella 892. Treitschke *Carpocapsa pomonana* 8, p. 161. Latreille (hist. nat. d. crust. 14. p. 246. *Pyralis pomonana*.

Der „madige“ Apfel (Fig. 1) und der stehende Schmetterling (Fig. 9) überzeugen sogleich von der Richtigkeit des Linneischen Citates, eine Ueberzeugung, welche durch die Beschreibung (S. 323) nicht weniger gemacht werden kann. Es heißt darin: „Das Braune (gegen den Hinterrand der Vorderflügel) hat auch Gelbliches; 3—4 Flecke dieser letztern Farbe sind dort nach einer Linie geordnet, welche die Krümmung des Hinterrandes hat.“ Dieses Gelbliche hat stets Metallglanz, und mich mündert, daß R. darüber schweigt; auch steht es gewöhnlich in zwei Linien. R. will die im Gespinnst überwinterte Raupe für eine eigene Art halten und unterscheidet sie sogar durch den Mangel der rüchlichen Farbe und die schwarzen Punktlinien. Er berichtet auch eine Beobachtung (S. 325), nach welcher sich die schmuzig fleischfarbene Raupe, die in einer Birne lebte und überwinterte, in einen verschiedenen Schmetterling verwandelte; allein gerade dieser Schmetterling, — mofchusgrau, der Hinterrand etwas goldig (gris musc dont le bout des ailes tiroit sur le doré), — ist die ächte *Pomonana*.

Wenn er aber die Raupe in den Haselnüssen (S. 304), die gewöhnlich weiß oder fast weiß sind, für eine andere Art halten wollte, so würde ich ihm darin sehr gern beppflichten. Denn wenn die *Pomonana*-Raupe Haselnüsse durchnagen kann, warum frist sie sich, da ihr an Äpfeln und Birnen die Samen offenbar das Liebste sind, nicht auch bis zum Kerne der Pfäunen und Schelen, sondern begnügt sich mit dem Fleische? Ich glaube also, daß die Raupe in Haselnüssen, die ich nie sah, zu einer andern Art gehört.

Geoffroy citirt Fig. 9 zu seiner teigne bedeaude aux trois triangles. Diese soll in Eichen leben (?), hat eine große Ähnlichkeit mit *Tortrix roborana* Tr. und zeigt also nicht die geringste Ähnlichkeit mit *Pomonana*. Ohne Zweifel hat Geoffroy sich versehen.

159) † *Tinea glandella*.

R. II. 2. p. 325 et 341. t. 40. f. 13—15.

Schrank — Fr. Nro. 1886.

Mit dem Citate aus Schrank, der den Schmetterling selbst nicht sah, sondern ihn nach R. beschreiben mußte, ist wenig erreicht; wir sind fast in demselben Dunkel wie vorher. — Nach R's Raupenbeschreibung könnte man auf eine große Verwandtschaft mit *Pomonana* schließen, und, indem ich dieses that, rief ich auf *Tortrix splendana* (R. 8, S. 163), welche ich, so selten sie ist, schon viermal in Eichenbeständen

abgeklopft habe. Allein da der Schmetterling seine Flügel horizontal hält (Fig. 15), so muß er von *Pomonana* und *Splendana*, die mit zugerundet dachförmiger Flügelhaltung sitzen, sehr verschieden seyn. Ich halte ihn daher mit Schrank für eine Morle. — Er erscheint gegen Ende July, gehört zur zweiten R'schen Classe und trägt die Flügel horizontal; die Vorderflügel haben auf der Oberseite eine ausgezeichnete Färbung; die Grundfarbe ist graulich, mit verschiedenen Nuancen von hellerem oder dunklerem Braun.

160) *Phalaena* — ?

R. II. 2. p. 329 et 341. t. 40. f. 16—19.

Wie leicht muß es in Nieder-Poitou seyn, diesen Schmetterling wieder aufzufinden! Er lebt dort in den Früchten der ächten Kastanie und verursacht nicht selten Mißwachs. R. gibt seine vollständige Naturgeschichte und beschreibt ihn so: „Er erscheint gegen Ende May, ist klein und hat gebörntel fadenförmige Fühler von mittelmäßiger Länge. Seine Vorderflügel trägt er als ein zugerundetes Dach. Sie sind braun, gegen die Mitte der Oberseite des Körpers mit einigen graulichen Punkten versehen. Es gibt auch drei Punkte von derselben Farbe, die gleichsam in den Spigen eines gleichschenkligen Dreiecks stehen. Der Körper und die Hinterflügel sind aschgrau. Seine Zunge rollt sich kaum zu einer Spiralförmigkeit.“

Die Abbildung muß ganz mißrathen seyn, da sie durchaus nicht auf die Beschreibung paßt. Ob der Schmetterling ein Wiedler oder eine Morle sey, läßt sich weder aus dieser, noch aus jener erkennen.

161) *Phalaena* (*Phycis*?) — ?

R. II. 2. p. 332 et 335. t. 38. f. 15. 16.

Auch diese Art möchte nicht schwer ausfindig zu machen seyn. Sie fand sich innerhalb eines Dattelferns und ist also ein erotisches Geschöpf. Außer daß sie größer war, gleich sie der Apfel- und Kastanienraupe. Aus der im August verpuppten Raupe kam im September oder October der Schmetterling hervor, „welcher unter mittelgroß, aber größer als *Pomonana* war. Seine Farbe sowohl auf den Flügeln, wie auf dem Leibe, war einfarbig hellbraun, ergartig oder glänzend.“ — Vielleicht ist dieses eine *Phycis*; die Abbildung läßt wohl daran denken. Der Name der Art muß ohne Zweifel noch erst geschaffen werden.

REAUMUR, Mémoires Tome III. 1738. [4. 1737.]

162) † *Elachista blancardella*.

R. III. 1. p. 8, 25—31 et 51. t. 4. f. 11—15.

Treitschke 9, 2. p. 186. Degeer I. 14. Abbil. p. 33—36. t. 30. f. 1—13. II. 1. p. 366. Nro. 5.

Die Minierer-Species kennen zur fernern, welche von unsern ältern Beobachtern beschrieben worden sind, möchte mit wenigen Ausnahmen nicht anders geschehen, als wenn wir an den von ihnen angegebenen Bäumen und Sträuchern die Raupen sammeln und sorgfältig zu Schmetterlingen erziehen. Die Raupen sind, weil sie sich ungeachtet ihrer Kleinheit leicht behandeln und betrachten lassen, wahrscheinlich von ihnen kenntlich

beschrieben worden; aber bey den Schmetterlingen ist das nicht der Fall. Diese sind zu klein, als daß sie sie hätten auf Nadeln stecken und gar spannen können. Daher mußten sie warten, bis die kleinen Geschöpfe vor Hunger gestorben waren, um sie dann mit Bequemlichkeit zu betrachten. Wie abgesehen oder vermischt solche Schmetterlinge zum großen Theil sind, weiß jeder Kenner aus Erfahrung. Manche Beschreibungen bey Linne und Fabricius mögen nach aufgespießten Exemplaren verfertigt seyn, was man mit daraus schließen darf, daß sie so unvollkommen stimmen. Durch die dicken Nadeln, den Mangel an Geschicklichkeit im Aufstecken und Ausbreiten waren Zeichnungen vertilgt worden, und solche vermischte Stellen galten nun entweder als neue Zeichnungen oder als gleich mit der Grundfarbe. Um ihre spezifischen Namen, die meistens das Andenken verdienter Naturforscher erhalten sollen, *Blancardella*, *Schreberella*, *Cramerella*, *Bonnetella* etc., nicht untergehen zu lassen, muß man sie jetzt mit einiger Willkürlichkeit verwenden.

Es ist aber in unserer Zeit leichter, die Schmetterlinge als die Raupen der Minierer kennen zu lernen. Die Erziehung der letztern hat große Schwierigkeit, wie mir ein sehr geübter Raupenzüchter versichert. Die zur Beschreibung aus ihrer Wohnung genommene Raupe stirbt leicht, und da mehrere Arten sich in der Lebensweise ähnlich find, so weiß man immer nicht ganz genau, ob man einen ausgekommenen Schmetterling aus der beschriebenen Raupe erhalten hat. Auch lassen sich diese Raupen keine neuen Wohnungen anweisen, sondern sterben, wenn ihre alten vertrocknet, und sie selbst noch nicht erwachsen sind. Die Schmetterlinge aber erscheinen im Freyen gewöhnlich in Menge und lassen sich an Baumstämmen, Zäunen, Gartenhäusern bey jedem Wetter leicht auffinden. Bey schönem Wetter klopft man sie von allerhand Arten von Bäumen und Sträuchern, und bey ihnen ist der Vortheil, den fast alle andern Schmetterlinge nicht gewähren, daß sie sich mit Leichtigkeit während des Fliegens fangen lassen. Daß sie im Fluge nicht zu sehen seyen, ist eine reine Erfindung. Hat man aber seine Schmetterlingschere mit Flor überzogen, und benutzt man die feinsten Insectennadeln, die man jetzt in Wien und Berlin kaufen kann, zum Aufstecken, so wird man mit wenigen Ausnahmen ganz unverletzte Schmetterlinge erhalten. Das Spannen derselben geht, wenn man Spannbretter mit sehr feinen Rinnen hat, bey einiger Uebung mit solcher Schnelligkeit, wie das der größten Arten. Daher habe ich von den hierum gewöhnlichen Arten, gegen 30—40 Exemplare von jeder gespannt, und meine Sammlung enthält etwa 12 Exemplare zu jedem Namen.

In Erwägung des bisher Gesagten wird man Versehen in den ältern Beschreibungen wahrscheinlich, und manches dort als Gewißheit Ausgesprochene, z. B. von 18 füsigen Schmetterlingsraupen, mindestens zweifelhaft und der Bestätigung noch sehr bedürftig finden.

Um nun auf die vorliegende Art zu kommen, so ergänzt Degeer R's Beschreibung, die auch ihm zu kurz scheint, und hält also des letztern Art für die feine. An Degeer's Worte soll in der Abbildung das Weisgelassene silberfarbig, das Dunkle braun und wie das schönste Gold strahlend seyn. Dieß zu der Abbildung hinzugehen, gibt uns ein ziemlich treues Bild der *Blancardella* (welche in der Wahrheit glänzend safrangelbe Vorderflügel und auf denselben eine silberweiße Strieme von der Wurzel aus, ferner am Vorderrande 4, am Innerrande 3 silberweiße, gegen einander gerichtete Querscheideln hat; die zwei

ersten einander gegenüberstehenden sind schlang und laufen zu einem spizen Winkel zusammen; in der Flügelspitze ist ein tief-schwarzes Strichlein. — R. drückt sich über die Motte so aus: „Die Apfelblattschmetterlinge sind mir fast zu gleicher Zeit mit den Ulmenblattschmetterlingen ausgekommen; ihre Flügel sind nicht so reich, wie die der andern; aber man sieht sie nicht mit geringerem Vergnügen an; das Silber ist die Grundfarbe; sie haben ungefähr alles das in schönem Silber, was die andern in Gold haben, und umgekehrt; aber die Goldstreifen sind der Länge nach auf ihren Flügeln gezogen, statt daß bey jenen die Silberstreifen quer gehen.“ — Unter den Worten: „der Länge nach“ hat man sicher nur „schräg“ zu verstehen, und mithin muß man die beiderseitigen Schmetterlinge für eine Art ansehen. Da nun aber die Degeersche Abbildung den besten Wegweiser abgibt, so hat man sich darüber zu beruhigen, daß beyde das Weiße als Grundfarbe ansehen. Die Raupen beyder passen nicht allein zu einander, sondern auch zu Treitschke's Beschreibung. (Bey R. sind sie gelb, qui tire sur la couleur du karabé; — Degeer: recht schön gelb, mit drey Paar Bauchfüßen mit braunen Häutchen; die Bauchfüße einziehbar und dann wie ein Trichter aussehend; — Treitschke: grüngelb mit grüner Rückenader, näher zur Vervandlung gelb.)

Wir finden aber Degeer's und folglich R's Art von Linne zu *Rüsella* (Syst. nat. 898) gezogen. *Rüsella* ist aber durch die guten Hübnerschen Bilder (Tin. 399. 400) und in der Natur so bekannt und der Degeerschen Abbildung so unähnlich, daß kein weiterer Beweis für einen Irrthum von Seiten Linnés erforderlich ist.

#### 163) *Phal. Tinea* — ?

R. III. 1. p. 8. 9. 12. 35 et 46.

Nach R. sind diese Raupen an den Rosenblättern, wo sie große Pläze ohne Falten minieren, fast häufiger, als an jedem andern Strauche. (Ich habe hier noch an Rosen keine Minierer bemerkt.) Sie haben (S. 9) eine etwas grauliche Olivenfarbe (d'un olive un peu grisâtre) und, der Abbildung nach zu urtheilen, 4 Paar Bauchfüße. Die aus ihnen kommenden Schmetterlinge bildet R. höchst unkenntlich ab und beschreibt sie nirgends.

Schon aus der Zahl der Bauchfüße erkennt man die Verschiedenheit von R's und Degeer's Minierern. Bey Degeer nehme ich unbedingt einen Irrthum an (I. 14. Abhandl. p. 41. t. 31. f. 13—21, t. 30. f. 20; II. 1. p. 366. Nro. 7). Der Schmetterling aber, den er erzieht, kann vielleicht zur Fischen Art gehören, und ich möchte eine von den kleinen, mir wohl bekannten Worten darin vermuthen, die Treitschke zu seiner Gattung *Elachista* zieht, und deren Wurzelglied der Fühler eine muschelförmige Erweiterung hat.

Daß Linnés Citat dieser Stelle aus R. bey *Cynosbattella* selbst mit dem Fragezeichen nicht zu buiden ist, darüber sehe man Nr. 108.

#### 164) *Oecophora hermannela*.

R. III. 1. p. 7. 9—12 et 47. t. 2. f. 7. 8.

Treitschke 9, 2. p. 174.

Die Raupe miniert große Pläze in den Blättern des *Chenopodium* (welcher Art?) und einer sehr gemeinen Art *Atriplex*.

Sie hat keine starkabgesetzten Ringe (S. 7) und, zufolge der Abbildung 4 Paar Bauchfische. Ihr Färbung ist schon, nemlich gelblichweiß mit einem rothbraunen Rückenstreif (raie d'un brun rougeâtre plus que vineux) und zwey Reihen röthlicher Flecke zu beiden Seiten. Diese Flecke stehen paarweise auf jeder Seite eines Ringes senkrecht unter einander. Was aus dieser Raupe wird, verschweigt uns K. Allein die Fätscherische Beschreibung bey Treitschke gibt uns genügende Auskunft. Dort ist die Raupe vor der Verwandlung weißgelb mit 8 Längsreihen verschiednen gestalteter Flecke von Fleisch- oder Carmesinfarbe. Von diesen Reihen hat K., wie mir scheint, die mittelften zu einer einzigen Reihe oder Strieme zusammengenommen, eine Annahme, die sich durch das Uebereinstimmen von allem Uebri-gen rechtfertigt.

### 165) *Elachista kleemannella*.

R. III. 1. p. 25. 29 et 50. t. 4. f. 1—10.

I. 1. p. 400 et 428. t. 17. f. 12.

Fabr.

Ich finde nirgends von K. angegeben, von welcher Farbe die 14 füssige Raupe des Ulmenblattminierers ist. Sie miniert zwischen zwey Rippen des Ulmenblattes (orme femelle) hin, und gibt der lockern Oberhaut des Blattes, unter der sie arbeitet, mehrere Längsfalten, die als Kanten hervorstecken. Ihre Verwandlung geschieht an der Stelle, wo sie bisher lebte, in einem sehr gestreckten, eysförmigen Gehäuse von blaugrüner Farbe. Im May erscheint der Schmetterling, der den am reichsten gefleckten Arten gleich kommt; seine Flügel scheinen ganz von Gold und Silber, und das Gold ist das glänzendste, polirteste, schönste. Helle, polierte Silberstreifen gehen quer durch die Flügel und verschönern sie; die Enden und einige andere kleine Stellen der Flügel und des Körpers sind von sammet-schwarzer Farbe, durch die der Glanz des Silbers und des Goldes erst recht erhöht wird. In der Abbildung des ersten Theiles sehen wir, daß der Kopf einen dichten Haarbüsch trägt.

Nach diesem Haarbüsch, wozu Fühler kommen, die kein breites, muschelförmig ausgehöhltes Wurzelglied haben, lassen sich etwa 20 mir bekannte Arten vereinigen, die zu Treitschke's *Elachista* gehören würden, als: *Cramerella*, *Rajella*, *Blancardella*, *Schreberella*, *Kleemannella*, *Ulmifoliella*, *Populifoliella* etc. Sie heißen als Genus zusammen Lithocolletis *Hüb.* Unter diesen genannten Arten zeichnet sich vor allen *Kleemannella* durch hohe Schönheit so aus (siehe nicht in Hübners Fig. 201), daß *Ulmifoliella*, *Blancardella* blaß und matt dagegen erscheinen. Nun hat aber *Kleemannella* zwey silberfarbene Binden und zwey dergleichen Stricheln am Vorder- und eines am Innenrande. Die angegebene Figur zeigt uns von dieser Zeichnung die Rudimente, und man muß die zwey großen Querflecke hinter der hellen Wurzel als die zwey Binden gelten lassen, da die Beschreibung Silberstreifen verlangt. Ich habe daher gegen meine Bestimmung als *Kleemannella* nur einen geringen Zweifel, der darin besteht, daß ich von *Kleemannella* bis jetzt mindestens 40 Stück und nur in Erstgebüßchen an *Sambucus nigra* zu Anfang May gefangen und noch viel mehr gesehen habe. An Rüßtern — wo ich freilich zu der Zeit selten suchte — ist mir etwas später statt ihrer eine viel kleinere, aber ziemlich nahe Art in 5 Exemplaren (*Ulmifoliella* Zell. mspt.) vorgekommen, die sich die Worte

318 1838. Heft 10.

vom Silber nicht bequem anwenden lassen. Die Wiederauf-findung der Raupe von K's Rüßternschmetterling, die nicht schwer seyn kann, wird das Gewisse lehren.

Dieselbe Art aber, die ich für *Kleemannella* erkläre, citirt Linne zu zwey Arten, *Phal. Tin. Merianella* und *Wil-kella*, bey jener I. t. 17. f. 12., bey dieser III. t. 4. f. 8., ganz wie es Geoffroy vor ihm gethan hat. Da K. selbst (S. 82) ausdrücklich sagt, die im ersten Theile der *Memoires* vorkommende Art sey einerley mit der im dritten, so ist daraus schon ein Fehler bey Linne augenscheinlich. Aber noch mehr: K's Art ist keine von beyden Linneischen. *Merianella* L. hat eine schwarze Grundfarbe, die erst nach dem Tode goldbraun (aurato-niger) wird, und ihre mittelfte Binde über die Vorderflügel ist am Ende gabelfaltig. Die Worte unsers Verfassers ist aber gleich vom Erscheinen aus der Puppe am glänzend goldig, und zeigt auch in der Abbildung nichts Gabelfaltiges an den Binden. — Noch weniger kann *Wil-kella* angezogen werden, die auch schwarze Vorderflügel hat und an der Erde wehnt (copiosissime supra terram exsilians). — Fabricius hat Linne's Gtate abgeschrieben, und zu *Wil-kella* nur statt des von Linne angegebenen Aufenthaltes geschrieben: *habitat in ulmo*. — Geoffroy hält (II. p. 199) die Abbildung auf Taf. 4 des 3. Theiles für eine Varietät der im ersten Theile abgebildeten Art, obgleich K. darüber gar keine Andeutung gibt. Die von ihm beschriebenen zwey Rotten sind aber unmöglich von einerley Art; die zweyte muß, da sie einen vergoldeten, glänzenden Kopf hat — sa tête et ses yeux (?) sont dorés —, glatt anliegende Haare und Schuppen auf dem Kopfe haben, ist daher keine *Lithocolletis*, und folglich steht bey ihr die Stelle aus K. mit Unrecht. Welche Art sie ist, weiß ich nicht; die von ihm angeführte Nahrungspflanze gibt gewiß keinen Anhaltspunkt, da sie ohne Zweifel aus K. entnommen ist. Die erste Art, als *Merianella* L. angegeben, paßt recht gut auf *Kleemannella*, wenn man nur in die Worte ses ailes sont d'un noir doré et bronze nicht Linne's color deauratus ex nigredine demortua ortus, sondern etwa den Sinn von ailes à couleur d'or et bronzées avec des bandes argentées et bordées de noir hineinlegt.

### 166) *Elachista* — ?

R. III. 1. p. 28. 29. 31 et 49. t. 8. f. 1—6.

Von Eichenblattminierern hat K. mehrere Arten, deren Beschreibung man sehr zusammenfassen muß. Von ihnen heißt es (S. 8) im Allgemeinen, ihre Raupen seyen grünlichweiß. Die Art, welche die Oberhaut des Blattes an der Stelle, wo sie sich aufhält (Fig. 1), mit einer Carina verzieht, bereitet sich, ohne herauszugehen, zur Verwandlung (S. 29) eine kleine weißseidene Hülle und bedeckt sie mit den schwarzen Körnchen ihres Urathes. Der Schmetterling (S. 31) kommt gegen den Anfang des Frühlings hervor; seine Flügel haben keinen so starken Glanz, wie die des Apfelblattminierers; sie sind zwar auch silbern, aber matter, und haben Flecke von einer gelblichen und versilberten Farbe (d'une couleur jaunâtre et argenteée). — Ich kenne zwey Arten, die bestimmt auf Eichen leben, und sich, mit Zuziehung von Fig. 5, auf diese Angaben anwenden lassen, *Cramerella* Fabr. und *Kuhlweiniella* Zell. mspt.; jedoch würde es der Wahrheit wenig näher führen, wenn ich mich darüber näher auslassen wollte. Das Sicherste bleibt die Beobachtung der Räu-pchen in der Natur.

167) *Elachista* — ?

R. III. 1. p. 32.

„Den Minierer der Bienbaumbblätter findet man nicht so häufig, wie den an den Apfelbaumbblättern. Er faltet, wie jener, die abgelöste Epidermis, ist auch 14 fädig und zur dritten Classe gehörig, aber grünlichweiß, anstatt daß jener gelb ist.“ — Daß dieser Minierer eine andere Art sey, der Meinung bin ich auch; aber sein specifischer Name ist mir unbekannt.

168) *Elachista* — ?

R. III. 1. p. 32.

Die Raupe miniert in Haselblättern große Plätze und versieht die Oberhaut derselben mit einer Falte. Der Schmetterling soll es an Schönheit mit allen übrigen aufnehmen. Diese Schönheit beschreibt R.; ich gestehe aber, daß ich die Einzelheiten besser verstehen würde, wenn ich einen aus Haselblättern erhaltenen Schmetterling damit vergleichen könnte.

169) *Elachista (Lithocolletis) rajella*.

R. III. 1. p. 33.

Linn. Phal. — 898. Degeer I. 14. Abbil. p. 37. t. 31. f. 1 — 12. II. 1. p. 366. Nro. 5. Tin. alnifoliella Hüb. f. 193. ? *Elachista alniella* Ti. in lit.

Von dieser Art sagt R. nichts, als daß die Raupe die Ertenblätter miniert und auf der Oberhaut eine Falte macht, und daß er den Schmetterling daraus nicht erhalten habe. Dieses Wenige reicht aber hin, wenn man die Art ihrer Naturgeschichte nach kennt, sie wieder zu erkennen, so wie sich wahrscheinlich die vorhergehenden Blattminierer fast alle künftighin bestimmen lassen. *Rajella* habe ich erzogen, und sie ist in allen Ertragsbüschen um Glogau in Menge. Daß sie einetley mit *Alniella* Ti. ist, habe ich bey sorgfältiger Vergleichung Degeer's und Linné's eingesehen.

170) *Elachista complanella*.

R. III. 1. p. 36 et 49. t. 3. f. 7. 8.

Treitschke — 9, 2. p. 179. Hübner Tin. f. 428.

Da ich diese Art selbst erzogen habe, so kann die ganz falsche Abbildung, von der nicht einmal gemeinet wird, daß sie eine vergrößerte ist, der Richtigkeit meiner Benennung keinen Abbruch thun. Wir halten uns an die Beschreibung: „Sie tragen ihre Flügel gewöhnlich horizontal (ich kann hinzufügen: das hintere Ende auf dem Boden aufliegend, während der Vorderkörper etwas aufgerichtet ist); die Oberseite der Vorderflügel ist gelb, wie abgestorbene Blätter, aber heller am vordern Theile und dunkler am hintern. Die Fühler sind fadenförmig.“ Die Angabe über die Fühler zeigt das Weibchen an; bey Männchen hätte R. die starken Rämme der Fühler nicht übersehen können. Leichter zu übersehen ist der lange Haarzopf am ersten Fühlergliede bey beyden Geschlechtern. — Daß die minierte Stelle des Eichenblattes keine Falten hat, daß eine ganz undurchsichtige, weiße Stelle des minierten Platzes die Verpuppung verräth, kann ich mit dem Zufasse bestätigen, daß die Puppe beym Auskriechen des Schmetterlings halb aus dem Blatte herausbringt.

171) *Tinea* — nov. sp.

R. III. 1. p. 36 et 50. t. 3. f. 9 — 12.

*Gracilaria quercetella* Zell. msept.

Hier zeigen sogleich die hornähnlich gebogenen Palpen (barbes termin'es en cornes de bélier) einen Schmetterling an, der nicht mit den kleinen glänzenden Minierern zusammengehören kann, deren Palpen kurz, cylindrisch und hängend sind. „Die Vorderflügel werden wie bey den Vögeln in der Ruhe gehalten und sind oben grau, ein wenig ins Gelbliche, mit weißen Quercinien, welche so gehen, daß die sich entsprechenden einen gegen die Flügelwurzel geöffneten Winkel bilden. Die Unterseite der Flügel ist weißlich, etwas silberig.“ — Wir sehen hieraus, was die dunkle Farbe der Abbildung eigentlich für eine Bedeutung hat. Die langen Fühler in der Abbildung, die ganze Beschreibung des Schmetterlings, zeigen mir mit Gewißheit eine Zeit längerer Zeit unter dem Namen *Quercetella* bey vielen Microlepidopterologen bekannte Motte an, die ich schon etliche Male, doch ohne Beobachtung der Raupe, aus so beschaffenen Eichenblättern, wie R. anführt, erhalten habe, und die sich in der Gattung *Gracilaria* (bey Treitschke *Ornix*. Fam. A. ex parte) durch ein kleines schwarzes Schwänzchen in den Franzen des Hinterandes bemerklich macht.

172) \* *Tinea pelliella*.

R. III. 1. p. 53 et 80. tab. 5. tab. 6 (non excl. t. 9. 10).

I. 1. p. 91 et 130. t. 1. f. 7. ?

Linn. Phal. — 888. Treitschke — 9, 1. p. 15.

Geoffroy II. p. 184. La teigne commune.

So gemein die Pelz-, Kleider- und Polstermotten, und so leicht zu beobachten sie sind, so viel bleibt doch aus ihrer Naturgeschichte zu erforschen übrig. Die Naturforscher, von denen wir Nachrichten darüber erhalten, scheinen mehr die Deconomie, als die Anatomie und das äußere Ansehen dieser Thiere berücksichtigt zu haben. Daher müssen die neuern an ihren Nachrichten Anstoß nehmen. Da ich einige Auskunft geben kann, so werde ich, weil es zur Sache gehört, etwas ausführlich über die Arten *Pelliella*, *Crinella*, *Biselliella*, *Sarcitella* sprechen. — *Pelliella* fängt man in den Stuben nach sehr verschiedenen Größen und Zeichnungen. Manche Exemplare sind beynahe dreymal so groß, wie andere, und wahre Rieser. Dieses erklärt sich leicht, da ihnen die Nahrung oft sehr reichlich, oft sehr karg gegeben wird. Die Färbung bleibt bey allen im Grunde gleich, nemlich schmutzig gelblichgrau, in wenig höherer oder tieferer Mischung; sie wird aber manchmal von den Zeichnungen sehr verdeckt und scheint dann etwas anders zu seyn. Die gewöhnlichen Exemplare haben nur hinter der Flügelmitte einen, bisweilen sehr undeutlichen, verloschenen, braunen, kleinen Fleck (Linné's *Pelliella*); bey andern stehen auch zwey Fleckchen vor der Flügelmitte (*Pelliella* Hüb. Fig. 15, Raumur Taf. 6. Fig. 12); bey noch seltenern Stücken sind die ganzen Flügel braun besprenzt. Diese Varietäten verbinden sich sehr deutlich durch Uebergänge und stimmen in dem gelblichen Schimmer der grauen Hinterflügel überein. Man erhält diese Schmetterlinge leicht, wenn man ihre Eide, die in lange nicht geöffneten Kammern häufig sind, einsammelt und aufwehret (R. S. 73: „Es gibt deren, welche sich zur Verwandlung in den Winkeln der Mauern

verflehen oder gar bis an die Decke des Zimmers steigen). Je der Unbefangene wird die Identität der Art zusehen, wenn er nur nicht bloß die Typen der Varietäten nebeneinander stellt. Dieses ist also die Art, welche R. als teigne des laies (S. 55) beschreibt, und von deren Raupe er sagt (S. 56): „Ihr Kopf, ihre Kinnbacken, die 6 Vorderfüße und vielleicht ein Theil des ersten Ringes (S. 83 Fig. 23: Der erste Ring, welcher oben fast hornartig und sehr braun ist) sind alles, was sie hornartiges hat, an dem übrigen Theile des Körpers ist eine weiße, feine, durchsichtige, zarte Haut.“ Von einer Behaarung spricht weder die Beschreibung, noch zeigen die Abbildungen Taf. 5 Fig. 22 und 25 dergleichen. Und doch hat sie weiße, zerstreute Haare, wovon ich mich jetzt, da ich dieses schreibe, durch die eigene Ansicht überzeuge, indem ich zwei Raupen von der Decke einer Kammer herabgeholt habe. An diesen sehe ich auch das Nackenschild, aber durchaus nicht sehr braun, sondern nur eben merklich braun.

Nun gibt es aber einen Aufsatz in Hummel's essais entomologiques, von dem im 10. Heft der Jfis, Jahr 1835, eine Uebersetzung erschienen ist, und worin eine von R's Wolleuschabe verschieden sein sollende *Tinea biselliella* beschrieben wird. Diese *Biselliella* ist, um es kurz zu sagen, *Tinea crinella* Tr. (9, 1. S. 21) und mir sehr wohl bekannt. Nach Hummel ist die Raupe so, wie R. die von *Pellionella* beschreibt; nur hat sie keine braunen Nackenflecke und ist nicht glatt, sondern mit einzelnen weißen Haaren. Diese Verschiedenheit ist nur scheinbar. Ich erzog *Crinella* zuerst aus einem Gehäuse, das ich auf dem Leibe einer erotischen *Colias* gefunden hatte; es ist weißlich, besteht aus Seidenfäden und Haaren und gleicht in der Gestalt der Dessungen R's Fig. 15 auf Taf. 6. Eine zweite *Crinella* erhielt ich aus einer Raupe, deren Wohnung mit dunklen und rothen Haaren von *Euprepillica* besetzt war und eine gewöhnliche Mündung hatte. Viele erhielt ich aber von einem schlecht abgebalgten und mit Köschpapier ausgestopften Tigel. Die Raupen fraßen so lange seine Haare ab, als er deren hatte; ihre Wohnungen sahen demnach wie Taf. 5 Fig. 18, nur noch etwas struppiger, aus. Darauf aber zogen sie sich in das Köschpapier hinein, und da bemerkte ich jetzt, Anfang Februar, folgendes: Das Papier ist zum Theil ganz zermalmt. Dazwischen sitzen kleinere und größere zusammengedrückte Hülsen von weißer Farbe, aber dicht mit kleinen Köschpapierstückchen überzogen. Die Raupchen in den ganz kleinen Hülsen haben einen dunkelbraunen Kopf, zwei deutliche Nackenflecke, und der bräunliche Innhalt des Hagens schimmert deutlich durch (bei Köfel Taf. 17 Fig. 2, mo auch nur eine junge Raupe ist, schimmert er rötlich durch); sie sind ganz deutlich weiß behaart. Zerquetscht geben sie einen sehr unangenehmen Geruch von sich, den ich bei den erwachsenen gar nicht bemerke. Diese erwachsenen Raupen haben einen hellern Kopf und die zwei Nackenflecke in allen Abstufungen der Deutlichkeit. Ihr Gehäuse ist entweder wie bei den kleinen, oder dünn und von weißer Seide; die meisten haben feins. Kurz: wie treffen R's Tuchmotte und Hummel's Polsterfabe ohne allen wesentlichen Unterschied beisammen, und dabei noch den wichtigsten Umstand, daß die Raupe, wenn ihre Nahrung ihr statt Wohnung dient, das Gehäuse sehr gut entwerthen kann. Ich bin daher sehr überzeugt, daß Hummels und R's Raupen sich nicht als verschiedene Species erkennen lassen. Die Schmetterlinge aber zeigen mir bis jetzt keinen entschiedenen Uebergang zu einander; bei *Pellionella* fand ich stets eine trübe Grund-

farbe mit einem dunkeln Fleck, bei *Crinella* s. *Biselliella* eine hellgelblichgelbe — (an Exemplaren, die in einem Sopha erzogen wurden, der *Pellionella* sehr nahe) — stets ohne alle dunkle Flecke. Dennoch zweifle ich kaum an ihrem Zusammengehören.

Köfel hat aber Raupen in Insectenleibern, also ohne Hülsen, angetroffen (Taf. 15) und beobachtet, daß, wenn sie zur Verwandlung herausgingen, sie ein braungraues Gespinnst, also keine Möhre fertigten. Es ist von selbst klar, daß, wenn ich meine ausgewachsenen *Biselliella*-Raupen in eine Schachtel, ohne ihr Köschpapier, einsperre, sie sich zur Verwandlung auch ein freies Gespinnst fertigen werden. Die Lebensweise von Köfels Art leidet also auf *Biselliella* eine vollkommene Anwendung. Hätte er keine Beschreibung gegeben, so würde ich Fig. 1 und 2 ohne Anstand für eine *Biselliella*-Raupe erklären. Allein er sagt: „Die Grundfarbe der Raupe ochergelb, mit vielen schwarzen Punkten besprengt, auf denen zarte Hächen stehen,“ und dieses trennt sie sehr auffallend von *Pellionella* und *Biselliella*. Der Schmetterling hat aschgraue Flügel, zuweilen auf den vordern gegen den äußern Rand hin mit ein paar dunkelpunctirten Querschnitten. Dieses paßt gleichfalls auf die zwei genannten Motten nicht, und somit wäre hier eine bestimmt verschiedene Art vorgestellt. (Bei dieser Gelegenheit sehe die Bemerkung, daß die Widler und Motten bei Köfel in den Hinterflügeln sehr verzeichnet sind, weshalb auf die Gestalt von Fig. 5 nicht sehr zu bauen ist.)

Anm. Die Abbildung aus dem ersten Theile gehört wahrscheinlich hieher, da R. selbst dort sagt, die meisten teignes seien aus seiner siebenten Raupenclasse, und man sehe bisweilen mit Hülsen der Raupe acht Bauchfüße.

### 173) \**Tinea sarcitella*?

R. III. 1. p. 58. 74 et 84. t. 6. f. 9. 10.

Linn. — 888. Treitschke — 9, 1. p. 19.

Was ich über *Sarcitella* zu sagen habe, kann sich als Fortsetzung an das über *Pellionella* und *Crinella* Gesagte anknüpfen.

Dieselbe Köfelsche Art (Taf. 15, von der am Ende von Nr. 172 die Rede war) hat Treitschke unter *Sarcitella* Linn., und dazu die Raubenbeschreibung, ganz aus Köfels Worten und Wörtern entnommen. Wie er beyde verbinden konnte, hätte er billiger Weise erklären sollen. Denn Linné zieht Köfels Taf. 17, aber nicht Taf. 16 zu *Sarcitella*, und da er nicht wußte, daß diese Raupen auch ohne Möhren leben, so konnte er seine *Sarcitella*, intra sollicitum occultata, nicht wohl mit der Köfelschen Taf. 15 vereinigen. An Köfels Schmetterling kommt weder in der Abbildung, noch in der Beschreibung ein weißer Punct zu beiden Seiten des Thorax vor. Demnach gehörte wohl nur Treitschke's Schmetterling zu Linné's *Sarcitella*? Darum will wohl auch Köfels Schmetterling Treitschken misstrauen scheinen? Die *Sarcitella* Linn. ist mir, ungeachtet ich mich bei mehreren Lepidopterologen darum bemüht habe, in der Natur völlig unbekannt geblieben. Linné's Citat aus Köfel, Taf. 17, erläutert nichts, da es schon, und zwar mit Recht, bei seiner *Pellionella* da gewesen ist. Sein zweites Citat ist Neaum. III. 1. t. 6. f. 9. 10. Hier sehen wir einen Schmetterling in natürlicher Größe und vergrößert, ohne alle Zeichnung, abgebildet. S. 58 schreibt R., man sehe an



Lapeten, Stühlen und Betten kleine Schmetterlinge von einem graulichen, aber silberglänzenden Weiß, und citirt dazu Fig. 9 und 10, aber auch Fig. 12. Mithin kamen ihm die einfärbigen und die gezeichneten Schmetterlinge gemischt vor. S. 74 werden sie zusammen beschrieben: „Die Farbe der Flügel, des Leibes und der Beine ist gleich, man bemerkt nur einige kleine Flecke auf den Flügeln einig; alles Uebrige ist ein Grau, mit einer leichten gelblichen Mischung, und silberglänzend.“ Später heist es aber: „Die größten möchten wohl als Art von den kleineren verschieden seyn“ und: „Was noch zu beweisen scheint, daß es unter den Schmetterlingen und folglich auch unter den Schaben (Raupen) der Wolle verschiedene Arten gibt, ist, daß es dergleichen Schmetterlinge gibt, die standhaft weißer sind als die andern.“ Wer die bey *Pellionella* erwähnten vielfachen Abänderungen in der Größe und Zeichnung nach ihren Uebergängen beobachtet hat, wird die R'sche Meinung, wenigstens nach seinen Angaben, nicht theilen. Allein Linné fand doch in R's hellen Schmetterlingen eine *Sarcitella*! Wo erwähnt aber R. mit einem Worte etwas von dem so charakteristischen punctum thoracis album? Figur 9 und 10 sollen nach R. auch nur einfärbig seyn, während ihnen von Linné willkürlich *alae cinereae* (der *Pellionella* *alae canae*, also doch wohl bedeutend hellere) und *abdomen, pedes, caput et tota pars inferior alba*, durchaus gegen die oben angegebenen R'schen Worte, angewiesen werden. Indem ich nun diese Willkürlichkeit nicht gelten lasse, erkläre ich R's in Frage stehende Figuren entweder für *Pellionella* mit sehr undeutlichem Fleck (der leicht übersehen wird), oder etwa für *Biselliella*. Linné's Art *Sarcitella*, halte ich für eine nicht dazu gehörige und mit ganz unbekannte Art.

Wie ich über die Größe und Färbung der Wollmotten verschiedener Ansicht bin, so stimme ich auch gegen R's Meinung, daß die Verschiedenheit der Nahrung eine Verschiedenheit der Art bedingen sollte. Sein Versuch scheint mir das nicht zu beweisen, was er beweisen soll. Das Aussterben einer Art in einem verschlossenen Gefäße läßt sich durch verdorbene Luft, brennenden Rauch, Veralten der Nahrung usw. besser erklären, als dadurch, daß ihr die Nahrung nicht zusagte, da R. doch selbst gefunden hatte, wie gleichgültig diesen Raupen das Futter und der Wechsel des Futters ist.

#### 174) *Ornix (Coleophora) lusciniapennella*.

R. III. 1. p. 129. 164. 174. 178 et 181. tab. 8. fig. 1—18. t. 9. f. 1—8. t. 10. f. 9—14.

Treitschke — 9, 2. p. 213.

In dem 4ten, 5ten und 6ten Mémoire wird die Naturgeschichte der zweiten Familie von Treitschke's Genus *Ornix* oder der Gattung *Coleophora* *Hüb.* im Allgemeinen sehr vollständig und belehrend abgehandelt. Obgleich sich mehrere jetzige Lepidopterologen viel mit diesen kleinen Sackträgern beschäftigt haben, so mag doch unter dem wenigen darüber Bekanntgemachten noch Verbum mit untergelaufen seyn; die Naturgeschichte dieser Thierchen ist zum Theil nicht mit Zuverlässigkeit bekannt. Mehrere Arten sehen sich als Schmetterlinge höchst ähnlich, ihr geringer Farbenunterschied verwißt sich mit Leichtigkeit; bey höchster Einfachheit ändern sie noch in der Farbe, und ihre bis jetzt bekannte Naturgeschichte, die fast nur auf die Kenntniß der Gestalt des Sackes und der Nahrung hinausläuft,

gibt, wie wir aus R. lernen, und wie ich aus eigener Erfahrung weiß, bey manchen keinen sonderlichen Anhalt für die Unterscheidung. Am besten weiß man jetzt die Arten noch an den vollkommenen Insecten zu erkennen. Es ist schade, daß uns R. in deren Beschreibung so sehr im Stiche läßt. Er beschreibt die Raupen im Allgemeinen so (S. 127): „Der erste Ring oder ein Theil des ersten Ringes ist hornartig; einige haben auch einen Hornfleck auf dem obern Theil des letzten Ringes; aber der übrige Körper ist nur mit einer glatten wenig oder nicht behaarten Membran bedeckt; die Farbe des Körpers ist bey einigen weißlich, bey andern braun. Die sechs Vorderbeine erkennt man auf den ersten Blick; aber um zu erkennen, daß im Ganzen 16 Beine vorhanden sind, d. h. daß sie außer jenen sechs noch zehn häutige, wie bey den Raupen der ersten Classe gestellte Beine haben, dazu bedarf man schon einer ziemlich guten Loupe. Die zwei Hinterbeine sind ziemlich leicht zu sehen; von den 8 Bauchfüßen (Bouch; Naturgeschichte der Insecten I. S. 131. *Gryllipennella*, spricht also mit Unrecht von 14 Füßen im Ganzen) kann man nur die Hakenkränze bemerken, welche, wenn der Beobachter sie ängstigt, unmittelbar auf dem Bauche zu liegen scheinen, in welchen das Insect die Beine zurückzieht. Der Körper ist lang und nähert sich der cylindrischen Form.“ Weiter sagt R. S. 128: „Die Größe mehrerer Arten unserer Blattmotten haben eine ziemlich cylindrische Form, z. B. bey denen, die auf den Blättern von Eichen, Birnbäumen, Buchen und gewissen niedern Pflanzen leben. Die beiden Enden des Sackes sind nicht wie bey den Tuchmotten beschaffen; das vordere oder Kopfende ist rund, gebogen, gerandet; da ist auch der Sack stärker, fester als überall anderwärts, und er muß so seyn, um, ungeachtet der verschiedenen Bewegungen, die das Insect mit dem Kopfe bey vielen Gelegenheiten macht, ganz und in seiner Form zu bleiben. Das andere oder Schwanzende ist gewöhnlich geschlossen, dient aber zum Hinausdrücken der Excremente — es wird durch das Zusammentreffen von drei eckigen Gliedern gebildet.“ Ob sich auf dem Rücken des Sackes ein dünner, gesägter Kiel, ein Hahnenkamm, befindet oder nicht, das ist kein Artunterschied (S. 150). Die Raupen machen sich bis zur Verpuppung (S. 151) drei Sack, weil sie den früheren entwachen und sie nicht vergrößern können. In der Jugend hat der Sack eine andere, gebognere Gestalt, als im Alter (p. 172. t. 7. f. 9). Sind die Blätter auf der einen Seite haarig, so hat der Sack auch eine haarige (linke oder rechte) Seite; und ebenso richtet sich seine Farbe nach der der trocknen Blätter (S. 160).

Wenn ich nun die verschiedenen Angaben bey Reaumur, Treitschke, Zinken, Bouché, Schrank und meine eigenen Erfahrungen vergleiche, so müssen entweder Verwechselungen vorgefallen seyn, oder die Gestalt der Sacke ändert noch mehr ab, als nur an dem Rückenamme. Den Schmetterling der R'schen Ulmenraupe habe ich an Ulmen in Menge gefangen in heller und dunkler Färbung, und, so viel ich nemlich bey der genauesten Vergleichung sah, dieselben Schmetterlinge erzog ich in Menge aus Birken- und Eichenraupen, deren Sacke sich gegen das Schwanzende durchaus nicht erweiterten. Ja noch mehr, aus eben so gebauten Sackern, deren Raupen sich aber an Erlen nährten (vergl. Zinken in Germ. Mag. I. S. 39), erhielt ich Treitschke's *Coracipennella* nicht selten (*Coracipennella* Tr., über welche nur die Beschreibung, nicht etwa die Diagnose nachzuweisen ist, und *Lusciniapennella* habe ich sowohl, wie Treitschke selbst, von Herrn Fischer v. Mödlerstamm, in Schmet-

terlingen und Säcken mitgetheilt erhalten, so daß ich bestimmt von denselben Arten, wie er, spreche).

Von den hierher gehörigen, auf Baumbllättern lebenden Arten kenne ich aber folgende: 1) *Hemerobiella* Scop. (*Anseripennella* Hbn.), von der ich mit Sicherheit nur Birn- und Kirschbaumbllätter als Nahrung kenne und die genügend bekannt ist. 2) *Coracipennella* Tr. (et Hbn.?), die dunkelste Art, mit schwärzlich bleifarbenen Flügeln; die Raupe auf Erlen. Hieher gehört vielleicht *Serratella* Linn. (Fn. nr. 1448 — *tota fusco-nigricans* — aber *habitat in pyri foliis*). 3) *Lusciniaepennella* Tr., heller, nemlich lehmgelblichbraun mit groben Schuppen gegen die Flügelspitze. Hieher, nach 3 mir zugeschieden Schmetterlingen, *Gryphipennella* Bouché. 4) *Latipennella* Zell. mspt., viel heller, etwas glänzend lehmgelblich mit groben, dunklern Schuppen. In großer Menge auf Birken, Eichen und Ulmen gefangen und häufig vom Wicken und Eichen gegogen. Eine vielleicht als Art zu unterscheidende, häufige Abänderung ist kleiner und am Vorderende von der Wurzel aus breit, aber ohne scharfe Gränze, weißlich.

Von diesen Arten 2, 3 und 4, wenn es nicht bloße Abänderungen einer einzigen sind, beschreibt R. die dritte und vierte. Der Ulmenschmetterling (S. 164) hat die ganze Oberseite des Körpers und der Vorderflügel von derselben Farbe, nemlich holzbraun, mit einigem Glanze im Sonnenschein. Der Eichenschmetterling (S. 165), der in der Abbildung auf die schimmteste Art misslungen ist, indem er in drei Figuren sogar Knöpfe an den Füßlein zeigt, hat auf der Oberseite der Vorderflügel eine blass gelbliche Färbung.

Anm. Die übrigen Abbildungen, die ich aus Mangel an genauerer Beschreibung, gleich unsicher zu *Lusciniaepennella* oder zu *Latipennella* bringen könnte, füge ich hier an.

- a) tab. 7, fig. 12. 13. tab. 9, fig. 9 — 16. p. 158 et 173 et 179. Die Raupe auf Apfelbäumen.
- b) tab. 7, fig. 14. 15. p. 173. Die Raupe auf Kirschbäumen.
- c) tab. 10, fig. 7. 8. pag. 181. Die Raupe auf Hainbuchen.
- d) tab. 10, fig. 15. p. 163 et 181. Die Raupe auf Ulmen, aber der Saft von den gewöhnlichen bedeutend abweichend.

175) *Ornix* (*Coleophora*) —  
R. III. 1. p. 157, 165 et 171. t. 7. f. 1 — 6.  
*Coleophora* *Latipennella* Zell. mspt.

Warum ich diese Motte für meine *Latipennella* halte, habe ich oben angegeben. Der Grund, den R. anführt, weßhalb die Eichenraupen an ihrem Saft keinen Ramm haben können (S. 157), ist sehr einleuchtend. Wenn er aber daraus, daß sie keine Ulmenblätter fressen wollten (S. 163), auf eine Verschiedenheit der Art schließt, so hat er dazu noch keinen völlig hinreichenden Grund. Auch wiederhole ich, daß ich gerade die allerbesten Schmetterlinge an Ulmen gefangen habe.

176) *Ornix* (*Coleophora*) *Hemerobiella*?  
R. III. 1. p. 157 et 172. t. 7. f. 7 — 9.  
Sns 1838. Sept 10.

Treitschke *Ornix* *Anseripennella* 9, 2. p. 221 et 10, 3. p. 220. *Scopoli* *Tin. Hemerobiella*. Fn. Carniol. 650.

Es ist eine bloße Vermuthung, wenn ich diese Stelle zu *Anseripennella* ziehe. Sie gründet sich darauf, daß die Kirsche Birnblattraupe cylindrische Sacke ohne Hautansätze hat, und daß ich und andere die oben genannte Art stets aus dergleichen auf Birn- und Kirschbaumbllättern gefundenen Säcken erzeugt haben. Nach Kirby und Spence (Einleitung in die Entomol. I. S. 505) und nach Linne (Fn. Suec.) kommt aus der Birnbaumbraupe *Serratella*, wofür ich gern die eigene Erfahrung abwarten möchte. Glaubhaft ist es aber, daß R. auch die *Anseripennella* in der Raupe kennen gelernt habe.

177) *Psyche* (!) *Pseudobombycella*.  
R. III. 1. p. 173. t. 7. f. 10. 11.  
Treitschke — 10, 1. p. 169. Ochsenh. *Psyche* *Glabella* 4. p. 199.

Wie erhalten über diese Art keine andre Auskunft als die, welche die Abbildung gibt, und glücklicher Weise reicht sie hin. Wenn *Pseudobombycella* erwachsen ist, so hat der Saft die Fig. 10, dargestellte Größe, welche keine bekannte, auf Bäumen lebende *Coleophora* erreicht (*espèce différente de celle de la figure 1 et beaucoup plus grande*). Ganz auf *Pseudobombycella* (*Politella* in Fischer v. Rösterstammes Beiträgen Taf. 38. möchte wohl um Paris nicht vorkommen) passend ist die Beschreibung und Abbildung des Afterendes am Saft, *une espèce de pyramide à trois faces*, fig. 11., dabey sehr spitzwinklig, wie bey keiner *Coleophora*. Wenn R. die Raupe auf einem Eichenblatte abbildet, so wußte er nicht, daß sie zur Verwandlung aus dem Grase an Bäumen und Sträuchern hoch steigt und sich an erhabenen Gegenständen verspinnt; zu dieser Zeit ist sie am leichtesten zu finden, und daher fand sie R. auf Eichenlaub. Sehr naturgemäß ist, daß am Blatte keine von ihr angeessene Stelle zu sehen ist; denn Eichenlaub frist sie nicht. Sie kriecht in der Abbildung; im Texte heißt sie *attachée sur une feuille*, und dieses kann sich nur darauf beziehen, daß sie, um sich verzuhalten, im Kriechen Säden spinnt.

Zu dieser Art gehört auch Degeer II. 1. S. 273 Taf. 6. Fig. 13 — 21., wo die Naturgeschichte, soviel mir bekannt ist, bis jetzt am besten und vollständigsten beschrieben ist.

178) *Ornix* (*Coleophora*) —  
R. III. 1. p. 156 et 177. t. 8. f. 19 — 25.

„B. Jussieu hat eine Art auf den Blättern einer *Lichnis* (*feuilles d'un lichnis*) beobachtet und Sorge getragen, sie durch Herrn Aubriet abbilden zu lassen.“ Die Raupe hat auf den ersten Ringen braune Flecken (S. 177). Die Schmetterlinge sind völlig unkenntlich und eine Beschreibung fehlt.

179) *Ornix* (*Coleophora*) —  
R. III. 1. p. 156, 159 et 180. t. 10. f. 1 — 6.

Die Raupe, „die sich an die Blätter der *Eupatoire* heftet,“ erhielt R. aus Luzon in Poitou zugeschied. Die drei  
45\*





worden sind, mir entwichen ist, was durch eine unendliche Menge von Zufällen bey einem so kleinen Thiere begegnet seyn kann, zu einer Zeit, wo ich nicht wußte, daß etwas darauf ankäme, es zu finden."

Wahrscheinlich haben Zinken, Geoffroy, Degeer und Vortbauer (bey *Bombyx nana* S. 283) das Fig. 5. und 6. dargestellte Männchen nicht erkannt, da sie nur die Sacke und das Weibchen citiren. Treitschke hat bloß Zinken nachgeschrieben. Schrank zieht (ich besitze nur die Abschrift von seiner Gattung Fledermotte, weshalb ich nicht bestimmt weiß, ob das Weibchen auf meiner oder Schrank's Seite liegt) nur Fig. 5, 6 und 9. an und läßt die so kenntliche Fig. 7. und die Fig. 8. weg. — Wenn aber Fabricius (III. 1. S. 481) bey *Viciella* aus R. Fig. 7 und 8. anführt, so ist er in einem starken Irrthum, da bey dem im Vergleiche mit *Nitidella* riesenartigen Sacke von *Viciella* die Stengelchen quer und sich kreuzend angeheftet sind.

### 183) *Psyche vestita*.

R. III. 1. p. 191 et 253. t. 11. f. 11.

Zinken in Gm. Mag. I. p. 34. Esper III. tab. 44. p. 225. *Bombyx vestita*.

Ich wundere mich, daß diese nicht schlechte Abbildung von Zinken übergangen wird, obgleich er sie gesehen haben muß. Die gestreckte Form und die Länge ( $1\frac{1}{2}$  Zoll S. 191) stellt den Sack in die Nähe von *Graminella*, deren nächste Verwandte *Vestita* auch ist. „Er war mit Stücken von den kleinsten Zweigen des gewöhnlichen bekleidet; aber diese Stengelstücke waren geordnet wie die Grassblattstücke an dem oben untersuchten Sacke (*Graminella*), d. h. sie waren nur an dem Ende, welches dem Kopf der Raupe am nächsten ist, angeheftet; mit dem andern waren sie frey, und so deckten sie einander (étaient en recouvrement les uns au dessus des autres).“ Die Abbildung, die das Schwanzende unbekleidet zeigt, stimmt mehr mit der Natur überein, als die Epersche überall mit Stengeln bedeckte Hülse. Ich habe zwey Sacke vor mir, die ich an einem Kieferstrauche fand, und die zum Theil mit Grassstengeln, Wickenreisern etc. von ansehnlicher Dicke bekleidet sind. — Im Wiener Verz. (S. 291. Anmerkung) wird auch dieses Sackträgers gedacht.

### 184) *Tinea (Talaeporia)* —

R. III. 1. pag. 241 et 259. t. 15. f. 1 — 6. 17 — 19.

Geoffr. II. p. 204. La teigne des pierres à fourreau rond en capuchon.

Dieses kleine Thier, das ich schon bisweilen an alten Steinen der Grabsmäder fand, aber nicht für eine Schmetterlingslarve hielt, kann nicht mit *Triquetrella* Hbn. (Fischer v. Röhl. Beytr. I. X. 39.) vereinigt werden. Sein Sack ist von Seide, außenwendig mit abgenagten Körnern der Mauer bekleidet (S. 236) und von hornförmig gebogenen Kegelfasern, nach welcher er nicht mit dem dreysackigen Sacke der *Triquetrella* gemein hat. Daß dieses Thier 8 Bauchfüße hat, von denen man freylich in den schlechten Abbildungen nichts erkennt, bezeugt R. ausdrücklich (S. 241), und somit ist es eine Schmetterlingsraupe. Die Verpuppung erfolgt gegen Ende Juny, nach-

dem der Sack an der Mauer befestigt worden ist. Von den daraus erzeugten Schmetterlingen beschreibt R. die geflügelten Männchen nur nach dem Gedächtnisse als sehr klein, den Weibschaben ziemlich ähnlich, aber von einer vergoldeten Erzfarbe (couleur de bronze doré S. 245); die völlig ungeflügelten Weibchen, Fig. 17 — 19., als weißlich, an den mit Schuppen bedeckten Theilen schwarzbraun, so daß es im Ganzen grau aussieht, und mit gelblicher Aftermole.

Die Arten *Triquetrella*, *Clathrella*, *Pseudobombycella* und *Politella* unterscheiden sich von den Fischen außer vielen andern Dingen durch deutlich ausgebildete Palpen, in welchen sie den Linnean *Pelionella*, *Tapezella* etc. sehr nahe kommen. Sie bilden zusammen eine eigne Gattung, *Talaeporia* Hbn., die nun, wie wir hier sehen, einen Zuwachs um eine Art erhält. Da diese nicht einerley mit Linne's *Lichenella* fn. succ. 1451. (schon wegen der *femina aptera nigra*) seyn kann und, obgleich sie seit dem Jahre 1666 bekannt ist, noch keinen Namen trägt, so kann sie *Talaeporia Lapidicella* heißen.

### 185) † *Tinea (Talaeporia) lichenella*.

R. III. 1. p. 238 et 260. t. 15. f. 7. 8.

Linne. Faun. 1451. Degeer II. 1. Phal. *Lichenella* p. 276. t. 11. f. 1 — 8.

Fischer v. Röslerstamm. Beytr. I. p. 87. t. 39. *Psyche Triquetrella*.

Geoffr. II. p. 204. La teigne des pierres à fourreau triangulaire à pans.

„Ihre Höhle hat drey fast gleiche Wände; die an der Bauchseite ist die breiteste von allen, die zwey andern sind gleich; die Kante, welche diese beyden bey ihrem Zusammentreffen bilden, geht längs des Rückens, und ist, wie die zwey andern, die Seitenkanten abgerundet. Die vordere Mündung ist eng in Vergleich mit der bey der vorigen Art (*Lapidicella*).“ — Dieß alles stimmt so treffend mit dem Sacke von *Triquetrella* überein, daß kein Zweifel Statt haben kann. Wenn R. seine Sacke so ausgezeichnet selten fand, 1 *Triquetrella* auf 100 *Lapidicella*, so kommt dieß vielleicht daher, daß er sie nicht an Säunen, sondern auf Mauern suchte; an jenen habe ich selbst sie zu Hunderten gefunden.

Es ist nun völlig gewiß, daß alle oben angegebenen Citate zu *Lichenella* Linne. gehören, und daß diese Art den von Linne gegebenen Namen tragen muß. Diese Gewißheit gibt Degeer. Hätte Linne die Gestalt der Raupensacke angegeben, so hätte man schon früher zu dieser Gewißheit gelangen können.

Anm. Geoffroy's aus R. entnommene Beschreibung der Schmetterlinge gehört zu der vorigen Art *Lapidicella*.

### 186) † *Psyche lichenum*.

R. III. 1. p. 239 et 260. t. 15. f. VIII — X.

Schrank — Nro. 1783.

Die Sacke dieser mir unbekannten Art findet R. bey Säcken von *Lichenella* sehr ähnlich, was doch die Abbildung

gen sehr wenig bestäuben. Er sagt sogar, man könnte sie für einerley Art halten, wenn nicht die Raupe der ersten einen gelben oder grünlichweißen Leib, *Lichenella* einen braunen oder schwarzen hätte. Die Säckel der vorliegenden Art sind an der Rinde verschiedener Bäume befestigt, z. B. der *Eucalypten*, der Apfelbäume, der Ulmen, und sind mit kleinen Fragmenten der Rinde besetzt, die auf der Baumnrinde wachsen. Schrank hat so wenig wie R. die Schmetterlinge gesehen.

187) \* *Ornix (Coleophora) tiliella*.

R. III. 1. p. 263 et 278. t. 16. f. 1—5.

Schrank Tinea — Nro. 1804. Geoffr. II. pag. 201. La teigne à fourreau en crosse.

Treitschke *Ornix Anapipennella* 9, 2. p. 211.

Nach Geoffroy hat zuerst Schrank *Rs teigne à fourreau en crosse* seine Aufmerksamkeit zugewandt und ihr den Namen *Tiliella* gegeben. Hübner hat den Schmetterling als *Anapipennella* abgebildet, und Zinken, dem jene Benennung unbekannt blieb, den Hübnerschen Namen für *Rs* Motte gelassen. Treitschke glaubte, vielleicht wegen seiner Vorliebe für die Endung *pennella*, den Schrank'schen Namen nicht aufzunehmen zu dürfen. Seine nach Zinken gegebene Beschreibung im 10ten Bande paßt auf *Rs* Abbildungen 1—3 genau, und ich selbst kann die Richtigkeit beider aus mehrfacher Erfahrung bestätigen. Da R. die Schmetterlinge von *Tiliella* und *Palliatella* nicht unterscheidet, indem er sie (S. 277) zusammen „kleine weiße Schmetterlinge“ nennt, so müssen wir der Erklärung (S. 278) folgen, daß Fig. 4 und 5. zum *fourreau en crosse* gehöre. — Bemerkenswerth ist, daß die Säckel, die R. auf Eichen fand (S. 264) braun, oft kastanienbraun oder wie trockene Blätter waren, die von wilden Kirschkäulen schwärzlich oder schön schwarz. Eine spezifische Verschiedenheit dürfte dieß wohl nicht bedeuten, obgleich R. es für möglich hält. Eine im Schmetterlinge der *Palliatella* nahe Art, *Curciopennella Fischeri* in lit. unterscheidet sich weder in der Gestalt, noch in der Farbe des Säckels von *Tiliella*, wennnehmlich die mir zur Ansicht mitgetheilten Säckel wirklich dieser neuen Art angehören.

**Ann.** Von Geoffroy kann ich nur die Säckel mit Sicherheit hieher rechnen. Seine Beschreibung des Schmetterlings paßt durchaus nicht auf *Tiliella*, wohl aber auf *Palliatella*.

188) † *Ornix (Coleophora) palliatella*.

R. III. 1. p. 263 et 268. t. 16. f. 6—12.

Zinken in Gm. Mag. I. pag. 40. Tinea *Palliatella*. Geoffr. II. p. 202. La teigne à fourreau à deux lames.

Treitschke *Ornix Pallipennella* 9, 2. p. 212 et 10, 3. p. 218.

Nichtig und mit R. übereinstimmend hat Tr. den Säckel dieses Schmetterlings im 10ten Theile der Schmetterlinge von Europa beschrieben. Er sowohl wie Zinken citirt die Stelle aus R.; bey Zinken heißt es durch einen Druckfehler Figur 6—1; bey Treitschke, der nicht erst nachsehen zu müssen

glaubte, Fig. 1—6., obgleich die Figuren 1. 2. 3. nur so eben zu *Anapipennella* gezogen worden waren.

Außer auf der Eiche traf ich diese Art auch mehrmals auf Haseln, jedoch auf erstere vorzugsweise. Eine Art, welche dieselbe Auszeichnung an ihrer Raupenwohnung hätte, ist mir nicht bekannt, und daher halte ich eine weitere Nachweisung über den Namen für überflüssig, zumal da Reaumur's Benennung *fourreau de teigne à manteau* die Zinken'sche *Palliatella* veranlaßt hat.

**Ann.** Von Geoffroy gehört nur das Raupengehäuse hier; sein Schmetterling scheint *Coraciopennella* zu seyn. Geoffroy dichtet Rn die Behauptung an, als seien die Raupen der *Tiliella* die jungen *Palliatella*-Raupen. R. sagt nur (S. 272), daß die *Palliatella*-Raupen in der Jugend noch keine *Pallia* oder *Indusia* haben; übrigens ist ihm der spezifische Unterschied ungewisserhaft. S. 278 sagt er z. B.: die Figuren 4 u. 5 sind die des Schmetterlings aus einer *teigne à fourreau en crosse*.

189) *Ornix (Coleophora)* —

R. III. 1. p. 277 et 280. t. 16. f. 13—16.

Für diese Art gibt es wahrscheinlich noch keinen Namen. Sie lebt auf Eichen und hat an jeder Seite des braunen, am Ende ziemlich wie ein Wischspieß abgestalteten Säckels, zwey hervorstehende Anhängsel in einiger Entfernung von einander. Der Schmetterling hat weißgraue Vorderflügel mit zwey holzbräunlichgelben Streifen, die von der Basis in gerader Linie bis zum Hinterrande laufen. Diese Zeichnung muß sehr lebhaft seyn, weil R. sich sonst auf ihre genaue Angabe wahrscheinlich nicht eingelassen hätte.

190 \* *Galleria mellonella*.

R. I. 1. a) p. 333 et 357. t. 19. f. 10—18.

b) p. 319 et 356. t. 19. f. 1—9. (?)

Linn. *Phalaena* — 88 et *Cereana* 874. Treitschke *Galleria Cerella* 9, 1. p. 51.

Obgleich über die Bienenmotten schon viel geschrieben ist, so sieht man doch, wenn man den scharfsinnigsten und genauesten Beobachter derselben liest, daß man noch nicht im Reinen über diese Art ist. R. unterscheidet zwey Arten. Seine kleinere hat er sich 7—8 Jahre nach einander in Schachteln und Gläsern fortpflanzen lassen; er muß also wohl Männchen und Weibchen von ihr gehabt und gekannt haben. Von *alis retusis*, die den Mann von *Mellonella* so auszeichnen, sehen wir in der Abbildung nichts; ja die Flügel sind hier so schmal und hinten zugerundet, daß sie eher mit *Colonella* und *Anella* übereinkommen. Das Einzige, worauf man sich stützen könnte, wenn man, wie Zinken und Treitschke mit ihm, Fig. 7—9, für Männchen erklären wollte, wäre der Umstand, daß Fig. 9. — nach R. ein Weibchen wie Fig. 7. — keine Palpen zeigt, während die Weiber aller Gallerien ziemlich lange besitzen. Allein dieß kann ein Fehler der sehr schlechten Abbildungen seyn.

Reaumur ist sogar geneigt, zu glauben, daß er von den kleinern Motten 2 Arten gehabt habe (S. 327 me disposent

à croire que j'ai eu deux espèces que je n'ai pas su distinguer l'une de l'autre), weil er zwei Sorten von Schmetterlingen in Menge erzog. Die eine ist mäufegrau auf den Flügeln und dem Leibe, die Vorderseite ihres Kopfes gelblich, die Augen rotfunkeln. Die andere ist grau, mehr ins Aschgraue ziehend, die Augen braun; die Vorderseite des Kopfes mit anliegenden und abwärts gerichteten Haaren von der Farbe abgestorbener Blätter bedekt.

Diese kleinere Art (Fig. 7—9) nennt Fabricius (Suppl. p. 463) *Galleria alvearia* und zieht dazu seine *Tinea grisella* aus der Entom. syst. 3, 2. p. 289. Diese *Grisella*, bey der kein Citat steht, soll ein caput hirtum fulvum, auf den Flügeln und am ganzen Leibe einen color griseus und alas oblongas haben. Eine rauhe Kopfbehaarung und längliche, einfarbige, dunkelgraue Flügel wird man an *Mellonella* ♂ in der Natur vergeblich suchen, und, da alle Gallerien, folglich auch *N's* kleinere Art, glattrösig sind, diese *Grisella* von der *Alvearia*, gegen Fabricius eigene Meynung, trennen müssen. Auch hat Fabricius diese Verschiedenheit selbst eingesehen und daher das oblongis weggelassen und obscure cinereis in fusco-cinereis und capite sulvo in capite flavo, d. h. fast die ganze Artbezeichnung umgeändert. Arg genug ist, daß er dasselbe Citat (R. 3. tab. 19. fig. 7—9.) bey der vor *Alvearia* stehenden *Galleria cereana* stehen hat, deren Diagnose — *alis postice emarginatis* (nicht im streng botanischen Sinne, sondern gleichbedeutend mit profunde retusis) — offenbar nach einem Manne gemacht ist.

Bey Linne finden wir Fig. 7—9 nebst Röfels unverkennbaren Abbildungen der *Mellonella*. Indem nun Zinken die *Mellonella* Linn. für das Weibchen dieser Art erklärt, so kommt er mit seiner andern Behauptung, daß *N's* Fig. 7—9 Männer seyen, in einen directen Widerspruch; und genau derselbe zeigt sich bey seinem Urtheil über Linne's *Cereana* und *N's* von Linne dazu gezogenen Figuren 14 und 15. Ueber diese Figuren 14 und 15, zu denen die andern von mir angegebenen auch gehören, ist folgendes zu bemerken. Die Größe des Thieres, der innere Theil des Vorderflügels, der in der Ruhe am Leibe liegt und mehr eiförmig graubraun ist, zeigen hinreichend, daß hier die allgemein bekannte Honigmotte vorgestellt wird. *N.* unterschreibt sie S. 333 ff. von der kleineren Art, und zeichnet besonders ihre Flügelhaltung aus, die ihm einen generischen Character zu bieten scheint: „Ein Theil des Flügels liegt der Seite des Thieres an und steht fast senkrecht auf der Fläche, auf der es sitzt; der zweite Theil des Flügels macht mit jenem ersten fast einen rechten Winkel und legt sich an den Leib.“ Diese Flügelhaltung nennt *N.* en toit coupé oder en bateau renversé. Da er sie an der kleinen Art nicht erwähnt, die doch, wenn sie *Mellonella* ♂ wäre, darinn nicht verschieden seyn könnte — man sehe nur Röfels Fig. 5 an, die nach Röfel selbst männlich ist; so scheint von selbst zu folgen, daß diese anders sitzt, und auch dieser Umstand spricht für *N's* Meynung über die Artverschiedenheit.

Das Resultat von allem bisher Gesagten würde dieses seyn:

- 1) Es ist noch auszumachen, ob *N.* nicht wirklich zwei Arten Honigmotten beschreibt. Von *Anella* kann nicht die Rede seyn, da sie sicher nie bey den eigentlichen Honigbienen lebt. An *Colonella* bin ich eher geneigt zu denken, weil

*N's* Raupen im Nothfalle Leder, Papier, trockne Blätter, Zeug fraßen. Auch ist zu bemerken, daß *N.* Raupen in Hummelnestern fand und erzog und nur kleinere Schmetterlinge als gewöhnlich erhielt. Man vergleiche Treitschke 9, 1. S. 49.

- 2) Zu *Mellonella* L., welche durch das Röfelsche Citat gesichert ist, gehört Reaum. Taf. 19 Fig. 10—18, und nicht, wie Linne will, Fig. 7—9.
- 3) Zu *Cereana* L., die bestimmt *Mellonella* ist, gehört *N's* Fig. 14 und 15 mit vollem Recht.
- 4) Zu *Cereana* Fabr. = *Tin. cerella* Fabr. = *Phal. mellonella* Linn. gehört nicht, dem Fabricischen Citate nach, *N's* Fig. 7—9, sondern, wie bey *Cerella* richtig angegeben wurde, Fig. 14 und 15.
- 5) *Alvearia* scheint nach *N's* Beschreibung und Abbildung aufgestellt und Fig. 7—9 richtig citirt zu seyn. Als Synonym ist aber *Grisella* Fabr. auszuschließen.

#### 191) \**Tinea tapezella* (tapetiella\*).

R. III. 1. p. 341 et 358. t. 20. f. 1—4.

Linn. *Phal. tapetella*. Treitschke *Tinea tapetella* 9, 1. p. 22. Geoffroy II. p. 187. La teigne bedeaude à tête blanche.

An der Abbildung 3 sehen wir alles, was Linne's Diagnose von dieser Art verlangt, nemlich einen schneeweißen Kopf und schwarze, hinten weiße Vorderflügel; sie ist so deutlich, daß ein Verkennen unmöglich scheint.

#### 192) \**Pyralis pinguinalis*.

R. III. 1. p. 347 et 359. t. 20. f. 5—11.

Linn. *Phal.* — 882. Treitschke *Pyralis* — 7. p. 39. Fabr. *Phal.* — 3, 2. p. 230. Latreille hist. d. crust. 14. p. 214 et 229. Aglossa — Degeer II. 1. p. 271. *Phal. pinguinalis*. t. 6. f. 9—11.

Hier haben wir wieder eine der wenigen Ausnahmen von der Regel, daß, wo Linne *N's* Werk nicht citirt, dieses auch bey Fabricius unterbleibt. Den besten Beweis für die Richtigkeit seines Citates gibt die *N's*che Beschreibung der Raupe: „16-beinig, fast von mittlerer Größe, überall tief schieferfarbig, manchmal schön schwarz, immer mit Vorn glanz, hier und da mit weißen Haaren.“ Die Beschreibung der Flügel des vollständigen Insekts, „eine röthliche, etwas glänzende Grundfarbe, worauf braune Flecke,“ ist weniger befriedigend, und die Abbildung hilft hinsichtlich der Zeichnungen nur insofern nach, als sie die Querlinien in Fig. 9 roh ausdrückt. Dagegen ist aber die Haltung der Flügel, ihr leichtes Verwischen, der Bau der Palpen und der Zunge richtig und bezeichnend angegeben.

\* Linne schreibt sowohl in der Fauna, wie im Syst. nat. *Tapetella*. Da nun das Stammwort zu diesem Namen *Tapetis*, etis ist, so ist sprachgemäßer, das z. auszuschließen, als das t, und anzunehmen, Linne habe *Tapetiella*, nicht aber *Tapetella* schreiben wollen, wovon sich aber statt i ein z, und nicht ein t einschlich.

193) \**Tinea granella*.

R. III. 1. p. 350 et 359. t. 20. f. 12—16.

Linn. *Phalaena* — 889. Treitschke *Tinea* — 9, 1. p. 13.

Linne's Diagnose läßt sich fast ohne Zwang auf Fig. 15 anwenden, und dennoch wird niemand, wenn er nicht durch Citate aufmerksam gemacht ist, oder die R'sche Beschreibung gelesen hat, diese Bilder für unsere Art erkennen können. R's Raupe lebt auf Kornböden im Getreide, spinnt mehrere Körner zusammen, und ist klein, 16 beinig, weißlich. Dadurch ist sie schon als die bekannte Kornmotte kenntlich, noch mehr bestätigt es die C. 252 gegebene Beschreibung des Schmetterlings.

R. widerspricht der Kewenboeck'schen Beobachtung, daß die *Granella*-Raupe auch Tuch angreife. Ich kann sie nicht bestätigen, bemerke aber, daß ich aus Raupen, die Kort und faules, trockenes Weidenholz fraßen, *Granella* in ziemlich großen Exemplaren erhielt. Auch fanden sich Raupen in den zum Trocknen aufgehängten Morcheln häufig ein, ich konnte aber die Schmetterlinge nicht daraus erziehen, die wahrscheinlich auch nichts als *Granella* waren.

194) *Phycis elutella*?

R. III. 1. p. 353 et 358. t. 19. f. 19—21.

Treitschke — 9, 1. p. 194.

Da ich die Raupe von *Elutella* nicht in der Natur kenne, so urtheile ich nur nach dem Schmetterlinge, den ich dafür desto öfter in Freyen beobachtet habe. R's Beschreibung desselben enthält durchaus keinen Widerspruch: „Die Oberseite der Flügel ist ein etwas gelbliches Grau mit einigen braunen Punkten und kleinen Flecken; sie werden als ein sehr niedergedrücktes und zugeredetes Dach getragen. Die Stellung in der Ruhe kann zum Characteristischem des Schmetterlings beitragen; der Vorderkörper bildet mit der Fläche, worauf er ruht, einen Winkel, indem der Hinterkörper diese berührt. Die Palpen biegen sich mit ihrer Spitze etwas aufwärts; sie wollen sich zu Hörnern umbiegen.“ Die Abbildung 20 — denn 21 möchte wohl niemand für einen Schmetterling erkennen — zeigt die Schatten der beiden Querlinien und dazwischen eine Binde, welche wahrscheinlich die Stelle der zwei Mittelpunkte vertritt. Sie läßt also auch eine Deutung auf *Elutella* zu. Allein die Anwendung der Raupe auf *Elutella* erfordert mehr Gewaltsamkeit. Die weiße Haut soll Linien von braunen Punkten — in der Abbildung von bedeutender Größe — haben, deren jeder unter der Loupe als ein Höckerchen erscheint und ein kurzes Haar trägt; solcher Höckerchen hat jeder Ring sechs, und zwei neben dem Kopfe und zwei neben dem Hintern (vielleicht Nackenschild und Afterklappe?) sind die größten. — In der Puncturierung stimmt die kurze Notiz bei Treitschke schlecht überein; auch die kleine Brodraupe Degeer's (I. 16. Abh. S. 84), die ohne Zweifel *Elutella* ist, heißt bloß: weiß mit braunem Kopfe.

Die Entscheidung, ob meine Vermuthung gegründet ist, kann nicht schwer fallen, wenn man nur die Raupen in der Chocobole aufsucht. Sie scheinen in manchen Gegenden nicht selten darin zu leben, da R'n versichert wurde, daß man in Spanien die von Würmern angegriffene Chocobole für die beste halte.

## Nachlese.

195) *Lepidopt. Phalaena*? — ?

R. I. 1. p. 84 et 128. t. 1. f. 1.

Es ist zwar höchst wahrscheinlich, daß diese Raupe zu einer der früher bestimmten Arten gehöre; allein zu welcher, läßt sich beim Mangel aller Angaben nicht bestimmen. Raupen läßt sich erkennen, ob sie eine Tag- oder Nachfalterraupe ist. Da sie auf keine der R'schen Tagfalterraupen paßt, so halte ich sie für eine Noctueraupe in vergrößerter Abbildung.

196) *Ornix an Elachista* — ?

R. I. 1. p. 85 et 129 t. 1. f. 3.

Eine durchaus generelle, vergrößerte Abbildung einer vierschnfüßigen Mottenraupe\*, dergleichen im dritten Theile der Memoiren beschrieben werden.

197) *Phal. Geometra* — ?

R. I. 1. p. 87 et 130. t. 1. f. 6.

Vergrößerte Abbildung, nach C. 95 zu den wellig gezeichneten Spannerraupen gehörig.

198) *Geometra aestivaria*?

R. I. 1. p. 130. t. 1. f. 8.

Treitschke — 6, 1. p. 117. Rüssel Noct. 3. t. 13.

Eine kleine astförmige Jasminraupe von holzbrauner Farbe und mit hellern raufenförmigen Flecken, von denen auf der Abbildung nichts zu sehen ist. Ueber diese Raupe hat man mehr Vortheilens Beschreibung und Rüssel's Abbildung, als Treitschke's Beschreibung zu vergleichen. Ich erinnere mich, daß meine Raupen, aus denen ich eine *Aestivaria* erzog, dunkel und bräunlich waren. Die wahre *Aestivaria*-Raupe stimmt in der Art des Eisens und der Färbung mit den R'schen Angaben; auch die Nahrungspflanze gibt kein Hinderniß; allein zur Sicherheit fehlt der R'schen Raupe das beste, der gespaltenen Kopf, oder vielmehr, wir finden davon weder in R's Worten, noch in seiner sehr schlechten Abbildung etwas.

199) *Phal. Geometra* — ?

R. I. 1. p. 130. t. 1. f. 9. 10.

Eine stockförmige, zimmetfarbige Windenraupe, deren Kopf in der Jugend (Fig. 9) tiefer gespalten scheint als im höhern Alter.

\* Der Kürze wegen läßt sich die Stellung und Zahl der Bauch- und Hinterfüße durch Ziffern ausdrücken. Bekanntlich haben die Raupen der Schmetterlinge an den Ringen 1, 2, 3 stets, an 6, 7, 8, 9 und 12 gewöhnlich, an 4, 5, 10 und 11 nie Beine. Eine Bezeichnung ist nur für die gewöhnlich mit Beinen versehenen Ringe nöthig. Bezeichnet man mit den Ziffern 6, 7, 8, 9 und 12 die Nummer dieser Ringe, so kann eine fehlende Ziffer das Fehlen eines Paares Beine bedeuten. Hier z. B. läßt sich das, was R. so ausdrückt: qui ont le 4me et le 5me anneau depourvus de jambes, et qui en ont au 6me, au 7me et au 8me, mais qui n'en ont point sur le 9me, le 10me et le 11me —, so ausdrücken: B. 6, 7, 8, 12, d. h. Beine am 6ten, 7ten, 8ten und 12ten Ringe. Hieraus wird sehr leicht die Zahl der Beine überhaupt gefunden, wenn man diese 4 Zahlen als Einheiten betrachtet, sie mit 2 multipliciert und 6 dazu addiert.

200) *Phal. Geometra* — ?

R. I. 1. p. 130. t. 1. f. 14 — 16.

II. 2. p. 137 et 172. t. 28. f. 18.

Ein sehr gestrecktes, weißgraues Grauräupchen (gris-blanc qui tire sur la couleur de la cendre), dem die zwei letzten Figuren der ersten Tafel, vielleicht mit Unrecht, einen herzförmigen Kopf geben. Sein Leib hat viele aneinander gedrängte Quersalten, die erst unter der Loupe sichtbar werden.

201) *Smerinthus tiliae*.

R. I. 1. p. 97 et 133. t. 2. f. 1 — 3.

p. 162 et 216. t. 4. f. 11. 12.

I. 2. p. 4 et 44. t. 21. f. 1 — 3.

Linn. *Sphinx* — 797. Ochsenh. *Smerinthus* — 2, p. 246. Wien. Verz. p. 41. Geoffroy 2, p. 80. Le *sphinx* du tilleul.

Die erste Abbildung kündigt sich durch den dreieckigen Kopf und das Horn auf dem 11. Ringe als zu *Smerinthus* gehörend an. Sie bezeichnet aber, und dafür entscheidet die Nahrungspflanze, den *Sm. tiliae*. Es wäre sehr gut, wenn auf dem Unterschlilde der Höckerkranz zu sehen wäre. Will man ihn nicht als angebeutet anerkennen, so läßt sich sagen, daß in einer so gemessenen Abbildung dergleichen als unwesentlich ausgelassen werden konnte, daß R. nicht die Lindenschwärmer-raupe, sondern ein mit chagrinartiger Haut und einem Horne über dem Hintern versehene Raupe darstellen wollte. Hier muß also le tilleul, an zwei Stellen angegeben, entscheiden.

Zu dieser Art ist auch die Abbildung auf Taf. 21 zu ziehen. R. sagt zwar nicht, daß es die Puppen der Lindenscraupen seien. Allein keiner der bey ihm vorkommenden Abend-schmetterlinge hat als Puppe so deutliche Spuren der letzten zwei Paar Bauchfüße und der zwei Hinterfüße. An der *Tiliae*-Puppe meiner Sammlung sehe ich sie sehr deutlich.

202) *Phalaena* — ?

R. I. 1. p. 147 et 211. t. 3. f. 10. 11.

Kurze Bauchfüße mit vollständigen Hakentränen, von Raupen, die sich in zusammengeworstenen Blättern, in Pflanzensiegeln, in Früchten aufhalten — also der Species nach nicht zu bestimmen.

203) *Phal. an Sphinx* — ?

R. I. 1. p. 181 et 222. t. 5. f. 9.

Roth mit 6 Längsfurchen, von einer großen Raupe, am wahrscheinlichsten von einer *Sphinx*.

204) *Phalaena* — ?

R. I. 1. p. 242 et 247. t. 6. f. 11.

Ein ganz einfaches Haar, oben zugespitzt, un poil unî in der Erklärung der Tafeln.

205) *Phalaena* — ?

R. I. 1. p. 243 et 247. t. 6. f. 17.

Ein gestiebertes Haar, ohne nähere Auskunft als die S. 243 gegebene: „Es gibt Haare mit sehr dichten Bärten, von

denen jedes einen mit feinen und wie bey einer Federfahne zusammengebedrängten Haaren bedeckten Stiel vorstellt.

206) *Vanessa* — ?

R. I. 1. p. 261 et 316. t. 7. f. 3 — 6.

p. 272 et 319. t. 8. f. 4.

Die behaarten Augen auf beyden Tafeln — im Genus *Hipparchia* haben nur die mit *Aegeria* verwandten Arten dergleichen Augen — beweisen, daß die Abbildungen von einer *Vanessa* genommen sind, und da sie wahrscheinlich zu einer der gemeinsten R'n bekannten gehören, so kann die Wahl nur zwischen *Atalanta*, *Urticae*, *Polychlorus* und *Jo* schwanken. Da aber keine weitere Nachweisungen vorhanden, und die Abbildungen nicht genau sind — in Fig. 3 sind z. B. die Fühler viel zu kurz, und der Hinterleib ist gleichsam zweytheilig — so wird diese Wahl nicht leicht entschieden werden. In *Polychlorus* sehe ich die Palpen fast so spitz, wie in der Abbildung, oder doch wenigstens spitziger als an den andern Arten.

207) *Lepidopt.* — ?

R. I. 1. p. 261 et 318. t. 7. f. 13.

Ein vergrößertes Stück eines Schmetterlingsleibes, vielleicht zu dem Taf. 8 Fig. 1 dargestellten Schmetterling gehörig.

208) *Lepidopt.* — ?

R. I. 1. p. 252 et 318. t. 7. f. 1 — 37.

Wahrscheinlich wird sich von den wenigsten dieser Schmetterlingschuppen nachweisen lassen, von welchen Arten sie genommen sind. R. sagt darüber nichts.

209) *Papilio* — ?

R. I. 1. p. 273 et 320. t. 8. f. 5.

Kann nach der länglichen Gestalt des Fühlerknopfes zu sehr vielen Tagsschmetterlingen gehören.

210) *Papilio* — ?

R. I. 1. p. 274 et 320. t. 8. f. 6.

Der Fühlerknopf ist abgestutzt, etwa wie bey *Pontia rapae*.

211) *Sphinx* — ?

R. I. 1. p. 276 et 321. t. 8. f. 11 — 13.

Die Fühler, prismatische in der R'schen Terminologie, kommen „bey mehreren sehr vielen Schmetterlingen“ vor. Offenbar sind darunter Abend-schmetterlinge gemeint.

212) *Phalaena* — ?

R. I. 1. p. 278 et 322. t. 8. f. 14.

Ein borstenförmiger Nachtschmetterlingsföhler (antenne à filet conique et grainé R.), vergrößert, mit umgekehrt kegelförmigen Gliedern.

213) *Phalaena* — ?

R. I. 1. p. 278 et 322. t. 8. f. 15.

Gleichfalls ein borstenförmiger Nachtschmetterlingsföhler, vergrößert, mit cylindrischen, dicht aneinander schließenden Gliedern.

214) *Phalaena* — ?

R. I. 1. p. 285 et 323. t. 8. f. 24.

Ein unbestimmbarer Phalänenkopf.

215) *Phalaena* — ?

R. I. 1. p. 426. t. 16. f. 15.

Ein Phalänenkopf, wahrscheinlich der eines Spinners, ohne merkliche Zunge. Zu den drei Schmetterlingsarten dieser Tafel gehört er bestimmt nicht. Denn *Botys forficatus*, die der fraglichen Figur unmittelbar vorangeht, hat eine beträchtlich lange Zunge; bey *Lithosia jacobaeae* ist sie, wenn auch nicht beträchtlich, doch selbst an getrockneten Schmetterlingen, ohne diese zu zerstören, bemerkbar; *Liparis aurilua*, an die sich am besten denken ließe, hat in beyden Geschlechtern gekämmte Fühler.

216) *Phalaena* — ?

R. I. 2. p. 66. 70 et 88. t. 24. f. 6—8.

Drey Puppen einer glatten Schmetterlingsraupe.

217) *Lepidopt.* —

R. I. 2. p. 352 et 393. t. 46. f. 7.

Offenbar eine ideale Zeichnung der Flügelalten, die für alle Schmetterlinge gilt.

218) *Pterophorus megadactylus* ?

R. II. 1. p. 141. t. 1. f. 16.

*Pterophorus megadactylus* Fabr. 3, 2. p. 348.

*Pteroph. didactylus* ist kleiner und hat am Innenrande — wie in der Figur sichtbaren Zähne gehören nehmlich den Vorderflügeln an — keine hervorstehenden Schuppenzähne; er ist also hier mit Gewisheit auszufallen. Nach der Größe und Beschaffenheit der Vorderflügel passen zwei Arten hierher, *Acanthodactylus* (*Acanthodactyla* Tr. 9, 2. p. 234) und *Megadactylus* Syst. *Vind.* et Fabr. (3, 2. p. 348). Der erstere ist überall sehr selten, auch selten ganz so groß, und möchte daher die R'sche Art nicht seyn. Den zweiten *Pterophorus*, den ich als *Megadactyla Hübn.* Fig. 7. zugeschiedt erhielt (die Hübnerschen Abbildungen der Geißeln besitze ich nicht), fieng ich in ungefahr 60 Exemplaren im Riesengebirge auf Anhöhen zwischen Himbeergebüsch im Jul. Kein einziges Stück hat — wie Treitschke's *Tesseradactyla* — einen weiß bläulichen Grund (selbst Treitschke's Diagnose schweigt darüber), noch etwas bläulichweiß Gewässertes, sondern die Grundfarbe der Vorderflügel ist fahlgelb oder beinzelb, bräunlich unrein; ein großer, dreieckiger, brauner Fleck hängt am braun punctierten Vorderende hinter der Mitte; die zwey Flügelappen sind bräunlich und von einer weißen Querlinie durchschnitten; am Innenrande hinter der Mitte ist ein ziemlich großer, brauner Schuppenhöcker. Auf diese Art paßt *Pteroph. megadactylus* (besser *Megadactylus*) Fabr. recht gut. Wie *Tesseradactyla* darauf paßt, hätte Jünken erst genau nachweisen müssen, ehe man den Namen des Wien. Berz. mit dem Linneischen vertauschte. Den *Megadactylus* bin ich aber geneigt, mit den sehr mißrathenen R'schen Figuren zu vereinigen, deren „Vorderflügel auf der Oberseite mit gewölkten, angenehm vertheilten Flecken von verschiedenen Gelbarten“ geziert sind.

219) *Phalaena* — ?

R. II. 1. p. 101 et 144. t. 3. f. 4.

Genitalien eines unbestimmbaren weiblichen Nachschmetterlings.

220) *Phalaena* — ?

R. II. 1. p. 113 et 146. t. 3. f. 6—8.

Eyer, in der Gestalt eines Kugelabschnittes und gefurcht, an Eichenblätter geheftet.

221) *Phal. Geometra* — ?

R. II. 2. p. 137 et 171. t. 28. f. 11—13.

Eine höherige Spannraupe mit Haaren auf den Höckern; nur gegen den Kopf hin ist sie haarig ohne Höcker. Obgleich das Zusammengehören von Fig. 12 und 13 nicht ausdrücklich angemerkt wird, so spricht doch die gleiche Beschaffenheit beyder Raupen bestimmt dafür.

222) *Phal. Geometra* — ?

R. II. 2. p. 137 et 171. t. 28. f. 14. 15.

R. fand diese Raupe in der Mitte des Novembers auf Gras — welches vielleicht nicht ihre Nahrung war. Sie ist gewölkt kastanienbraun mit undeutlichen Gelenken, auf dem 6ten Ringe mit einem zusammengebrückten Höcker (mammelon plat), der an der Spitze gespalten ist, und den sie nach der Kopfseite überlegen kann (?). Ihr Kopf ist 2spizig und vorn flach.

223) *Phal. Geometra* — ?

R. II. 2. p. 138 et 172. t. 28. f. 16. 17.

Diese große Spannraupe, „deren Farbe derjenigen ziemlich ähnlich ist, die der Kupferstich zeigt,“ hat einen vorn glattgedrückten, oben ausgekerbten Kopf und lebt auf Eichen. Die Raupenbeschreibung der *Prodromaria* paßt einigermaßen hierher.

224) *Lepidopt.* — ?

R. II. 2. p. 250 et 275. t. 36. f. 1.

Diese glatte Raupe läßt sich vielleicht aus ihren Schmarögen erkennen.

225) *Phalaena* — ?

R. II. 2. p. 249 et 275. t. 36. f. 2.

Vielleicht auch aus ihren Schmarögen zu erkennen; doch ist es mir weniger wahrscheinlich, da ich schon mancherley glatte Raupen gefunden habe, die so ausgefogen wurden.

226) *Phalaena* — ?

R. I. 1. p. 85 et 128. t. 1. f. 2.

Eine vierzehnhufige Raupe, aber, nach der von mir gewählten Bezeichnung, B. 7. 8. 9 und 12. Merkwürdig ist, daß bey R. nirgends weiter eine solche Raupe mit ihrer Naturgeschichte beschrieben wird. Auch gestehe ich, keine dergleichen zu kennen, und vermuthet fast, daß es keine solche gebe. [*Noctua glyptica* hat solche. D.]



# Alphabetisches Register über die specifischen lateinischen Namen.

Die mit NB. versehenen Namen bezeichnen Arten, zu denen Reaumur's Memoiren mit Unrecht citirt worden sind.

## Papilio sensu latiore.

Aegeria, Hipparch., . . .	37
Atalanta, Vaness., . . .	2
Baeticus, Lycaena, . . .	155
Brassicæ, Pontia, . . .	40
C. album, Vaness., . . .	36
Cardui, Vaness., . . .	35
Cinxia, Melit., . . .	91
Crataegi, Pont., . . .	43
Delia, Papil., . . .	91
Janira, Hipp., . . .	3
Jo, Vanessa, . . .	33
Jurtina, Papil., . . .	3
Machaon, Papil., . . .	41
Malvae, Papil., . . .	4
Malvarum, Hesper., . . .	5
Napi, Pont., NB., . . .	42
Podalirius, Papil., . . .	4
Polychlorus, Vanessa, . . .	32
Pruni, Lycaena, NB., . . .	38
Quercus, Lycaena, . . .	39
Rapae, Pontia, . . .	42
Urticæ, Vanessa, . . .	34
Walbum, Lycaena, . . .	38

## Sphinx s. lat.

Atropus, Acheront., . . .	123
Bombyliiformis, Macrogl., . . .	7
Convoluti, Sphinx., . . .	10
Euphorbiae, Deileph., . . .	9
Filipendulae, Zygaena, ? . . .	8
Pinastris, Sph., NB., . . .	10
Stellatarum, Macrogl., . . .	6
Tiliae, Smerinith., . . .	201

## Bombyx s. lat.

Aesculi, Cossus, . . .	148
Antiqua, Orgyia, . . .	28
Auriflua, Lipar., . . .	18
Caja, Euprep., . . .	51
Camelina, Notod., . . .	116
Carpini, Saturn., . . .	82
Carpini, Psyche, . . .	182
Chrysorrhæa, Lip., . . .	18
Complanata, Lithos., . . .	24
Cossus, Phal., . . .	21
Crataegi, Gastrop., . . .	77
Dispar, Lipar., . . .	80
Erminea, Harpyia, . . .	119
Fasciella, Orgyia, . . .	49
Glabrella, Psyche, . . .	177
Gonostigma, Bomb., NB., . . .	28
Graminella, Psyche, . . .	181
Graminum, Psyche, . . .	181

Ætis 1839, Sept. 10.

Hamula, Platyp., . . .	120
Hicifolia, Gastrop., ? . . .	114
Jacobææ, Lithos., . . .	17
Lacertinaria, Phal., NB., . . .	120
Lanestrus, Gastrop., . . .	46
Lichenum, Psyche, . . .	186
Ligniperda, Cossus, . . .	21
Lubricipeda, Phal., . . .	84
Mali, Bomb., . . .	77
Mendica, Euprep., . . .	83
Menthastri, Euprep., . . .	84
Mori, Bombyx, . . .	86
Mundana, Lithos., . . .	53
Neustria, Gastrop., . . .	87
Nitidella, Psyche, . . .	182
Pavonia, Phal., . . .	81
Piri, Saturn., . . .	81
Pityocampa, Gastrop., . . .	90
Processionea, Gastrop., . . .	92
Pseudobombycella, Psyche, . . .	177
Pudibunda, Orgyia, . . .	50
Pyri, Saturn., . . .	81
Quercifolia, Gastrop., . . .	122
Quercus, Gastrop., . . .	52
Salicis, Liparis, . . .	47
Sylvina, Phal., . . .	150
Sylvinus, Hæpiol., . . .	150
Spinula, Platyp., . . .	121
Terebra, Cossus, . . .	147
Trifolii, Gastrop., ? . . .	52
Triquetrella, Psyche, . . .	185
Urticæ, Euprep., . . .	85
Vestita, Psyche, . . .	183
Villica, Euprep., . . .	44
Vinula, Harpyia, . . .	118
Zizac, Notodonta, . . .	117

## Noctua s. lat.

Aceris, Acronyct., . . .	48
Atriplicis, Trach., . . .	70
Batis, Thyat., . . .	1
Brassicæ, Mamestra, . . .	71
Cæruleoceph., Episem., . . .	20
Euphorbiae, Acron., . . .	56
Gamma, Plusia, . . .	27
Glandifera, Bryoph., ? . . .	58
Glyphica, Phal., NB., . . .	78
Hamula, Platyp., . . .	120
Lacertinaria, Phal., NB., . . .	120
Linariae, Cleoph., . . .	55
Lusoria, Phal., NB., . . .	12
Meticulosa, Phlog., . . .	14
Oleracea, Phal., NB., . . .	58
Pacta, Noct., NB., . . .	45
Promissa, Catocal., . . .	45
Pronuba, Triphaena, . . .	12
Psi, Acron., . . .	75

Pyramidea, Amphipyra, . . .	13
Ridens, Noct., . . .	115
Rumicis, Acron., . . .	57
Scrophulariae, Cucull., . . .	74
Spinula, Platyp., . . .	121
Sponsa, Phal., NB., . . .	45
Tritens, Noct., NB., . . .	75
Triplasia, Abrostola, . . .	54
Umbratica, Phal., NB., . . .	73
Verbasci, Cucull., . . .	73
Xanthoceros, Cymat., . . .	115

## Geometra s. lat.

Aeruginaria, Geom., . . .	135
Aestivaria, Geom., . . .	198
Alvearia, Galleria, . . .	190
Anataria, Ennom., ? . . .	132
Anataria, Phal., NB., . . .	134
Aurantaria, Fid., ? . . .	137
Betularia, Amphid., . . .	130
Boreata, Acidal., . . .	125
Brunata, Acidal., . . .	124
Cereana, Geom., . . .	190
Conspicuaria, Fidon., ? . . .	129
Crepuscularia, Boarm., ? . . .	16
Defoliaria, Fidon., . . .	124
Hispidaria, Amphid., ? . . .	139
Illustraria, Ennom., ? . . .	131
Lacertinaria, Phal., NB., . . .	120
Lemnata, Phal., . . .	145
Minta, Geom., . . .	133
Olivaria, Cidaria, . . .	133
Olivata, Geom., . . .	133
Omicronaria, Cab., . . .	140
Piniaria, Phal., NB., . . .	128
Potamogata, Phal., . . .	142
Psittacata, Acidal., . . .	133
Punctaria, Cabera, . . .	134
Vernaria, Phal., NB., . . .	135
Zonaria, Amphid., . . .	138

## Pyralis s. lat.

Farinalis, Asop., . . .	89
Forficalis, Botys., . . .	19
Lemnalis, Nymph., . . .	145
Nymphalis, Nymph., . . .	143
Pallidalis, Botys., . . .	78
Pinguinalis, Pyral., . . .	192
Pomana, Pyral., . . .	158
Potamogalis, Nymph., . . .	142
Rostralis, Pyral., . . .	26
Sambucalis, Botys., . . .	142
Strigulalis, Hercyn., . . .	61
Urticalis, Botys., . . .	79
Urticata, Phal., . . .	79
Verticalis, Botys., . . .	98

## Tortrix s. lat.

Ameriana, Tortr., ? . . .	96
Cereana, Geom., . . .	190
Chlorana, Hal., . . .	64
Clorana, Phal., . . .	64
Cynosbana, Penth., ? . . .	108
Cynostatella, Phal., . . .	108
Geutianana, Penth., . . .	152
Lecheana, Tortr., ? . . .	22
Nebritana, Grapholith., . . .	156
Pomonana, Carpocaps., . . .	158
Prasinana, Italas., . . .	63
Prasinaria, Phal., . . .	66
Prasinaria, Pyr., . . .	66
Quercana, Ital., . . .	66
Revayana, Penth., . . .	65
Rosana, Phal., . . .	96
Viridana, Phal., NB., . . .	64

## Tinea s. lat.

Alniella, Elach., . . .	169
Alnifoliella, Tin., . . .	169
Alvearia, Galler., . . .	190
Anapitennella, Ornix., . . .	187
Asciopennella, Orn., . . .	176
Ardeapennella, Ornix., . . .	111
Betulina, Scard., . . .	157
Biselliella, Tin., . . .	172
Blancardella, Elach., . . .	162
Cerella, Galleria, . . .	190
Cognitella, Yponom., . . .	23
Cognatella, Yponom., . . .	23
Colutella, Ornix., . . .	180
Complanella, Elach., . . .	170
Conspicuellæ, Ornix., . . .	180
Coraciopenn., Ornix., 174.	188
Cribella, Myel., . . .	62
Crinella, Tin., . . .	172
Cuculipennella, Ornix., ? . . .	112
Culmella, Phal., NB., . . .	24
Culmella, Tin., NB., . . .	24
Cynostatella, Phal., . . .	108
Elutella, Phycis, ? . . .	194
Evonymella, Phal., NB., . . .	23
Fagella, Lemmatoph., . . .	113
Gallipennella, Ornix., . . .	179
Gallipennella, Ornix., . . .	180
Glandella, Tin., . . .	159
Graminella, Psyche, . . .	181
Granelia, Tinea, . . .	193
Grisella, Tin., . . .	190
Hemerobiella, Ornix., ? . . .	176
Hemmanella, Oecoph., . . .	164
Kleemannella, Elach., . . .	165
Lapicidella, Talepor., . . .	184
Lichenella, Talepor., . . .	185

46 \*

Ligustrinella, Gracil., . . . .	112
Lusciniapennella, Ornix, . . . .	174
Lotipennella, Onix, . . . . .	175
Malinella, Yponom., . . . . .	93
Mellonella, Guller., . . . . .	190
Merianella, Phal., NB., . . . .	165
Nitidella, Psyche, . . . . .	182
Padella, Phal., . . . . .	93
Padellus, Yponom., . . . . .	95
Palliatella, Ornix, . . . . .	188
Pallipennella, Ornix, . . . . .	188
Pellionella, Tin., . . . . .	172
Phasianipennella, Ornix, . . . .	100

Pomonella, Phal., . . . . .	158
Pseudobombycella, Psyche, . . .	177
Queretella, Gracil., . . . . .	171
Rajella, Elach., . . . . .	169
Rüsella, Phal., NB., . . . . .	162
Sarcitella, Phal., NB., . . . .	173
Sedella, Yponom., . . . . .	94
Sedellus, Yponom., . . . . .	94
Serratella, Phal., . . . . .	174
Syringella, Ornix, . . . . .	111
Tapetella, Tin., . . . . .	191
Tapezella, Tin., . . . . .	191
Tiliella, Ornix, . . . . .	187

Verbascella, Rhinos., . . . . .	125
Verbascellus, Ypsoloph., . . . .	25
Wikella, Phal., NB., . . . . .	165

### Alucita s. lat.

Hexadactyla, Alucit., . . . . .	31
Megadactylus, Pteroph., . . . .	218
Monodactyla, Alucit., NB., . . .	30
Pentadactylus, Pteroph., . . . .	29
Pterodactylus, Pteroph., . . . .	30
Tesseradactyla, Phal., . . . . .	218

## Register über die Arten nach der Reihe der Kupfertafeln.

### Erster Theil.

Zof. 1. Fig. 1. Unbestimmbare Raupe	194
2. Unbestimmbare Raupe	226
3. Unbestimmte Mottenraupe	196
4. Harp. vinula	118
5. Plusia gamma	27
6. Unbestimmte Spannerraupe	197
7. Tin. pellionella	172
8. Geom. aestivaria	198
9. 10. Unbestimmte Spanner.	199
11—13. Fidonia defoliaria	136
14—16. Unbestimmte Spanner- raupe	200
Z. 2. §. 1—3. Smer. Tiliae	201
4—5. Van. atalanta	2
6. 7. Van. Jo	33
8—10. Van. urtica	34
11—15. Saturn. carpinii	82
16—18. Euprep. mendica	83
19. 20. Gastrop. quercus?	52
21. Orgyia fascelina	49
Z. 3. §. 1. Liparis dispar	80
2. Sat. piri?	81
3—5. Liparis dispar	80
6—8. Bombyx mori	86
9. Saturn. piri?	81
10. 11. Unbestimmbare Phala- nenraupe	202
12. 13. Pteroph. pterodactyl?	30
Z. 4. §. 1—4. Lip. dispar	86
5. Bombyx mori	86
6. 7. Liparis dispar	80
9. Bombyx mori	86
10. Amphid. hispidaria?	139
11. 12. Smer. tiliae	201
13. Hymenopt.	
14. 15. Bombyx mori	86
16. Saturn. piri	81
17. Cossus ligniperda	21
Z. 5. §. 1—4. Bombyx mori	86
5—7. Gastrop. neustria	87
8. Acronycta aceris	48
9. Raupenfotz, unbestimmt	203
Z. 6. §. 1. 10. Lipar. chrysorrh.	88
11. Unbestimmbares Haar	204
12. 13. Euprep. urticae	85
14. Euprep. mendica	83
15. 16. Acron. aceris	48

17. Unbestimmb. Raupenhaar	205
18. Saturn. piri	81
Z. 7. §. 1. 2. Thyat. batis	1
3—6. Theile einer Vanessa	206
7. 8. Papil. machaon	41
9. 10. Saturn. piri	81
11. 12. Gastrop. quercus	52
13. Hinterleibstheil eines Schm.	207
1—37. Unbestimmte Flügelschup.	208
Z. 8. §. 1. 3. Deilepl. euphorbiae?	9
2. fehlt.	
4. Auge einer Vanessa	206
5. Unbestimmbarer Fühler	209
6. Deggelchen	210
7. 8. Macrogl. stellarum	6
9. 10. Zyg. filipendulae	8
11—13. Fühler eines unbestimm- ten Abendsehmetterlings	211
14. Unbestimmbare Phalaenen- fühler	212
15. Deggelchen	213
16—19. Saturn. piri	81
20—23. Gastrop. quercus	52
24. Unbestimmb. Phalaenenkopf	214
25. 26. Phlogoph. miculosa	14
Z. 9. §. 1—8. Vanessa polychlorus	32
9. 10. Sphinx convolvuli	10
11—17. Acheront. Atropos	123
Z. 10. §. 1. Pontia rapae	42
2. 3. Vanessa jo	33
4. 5. Acher. atropos	123
6. Papil. machaon	41
7. Pont. brassicae	40
8—13. Vanessa atalanta	2
Z. 11. §. 1. 2. Htparch. janira	3
3—5. Papil. podalirius	4
6—12. Hesp. malvarum	5
Z. 12. §. 1—8. Macrogl. stellarum	6
9—12. Macr. bombyliiform.	7
13—16. Zyg. filipendulae	8
17. Zyg. peucedani?	8
Z. 13. §. 1—7. Deil. euphorbiae	9
8. 9. Sph. convolvuli	10
Z. 14. §. 1. Sph. ligustri	11
2. 3. et A. Acher. atropos	123
4. 10. Triph. promba	12
11—13. Phlog. miculosa	14

Z. 15. §. 1—5. Amphip. pyramidea	13
6. Acron. runcica	57
7—9. Botys sambucalis	15
10—13. Geometra, unbestimmt	16
Z. 16. §. 1—7. Lithos. jacobaeae	17
8—11. Lipar. aurilua	18
12—14. Bot. forficulis	19
15. Unbestimmbare Phalaenen- kopf	215
Z. 17. §. 1—8. Coss. ligniperda	21
9. Tortr. lecheana?	22
10. 11. Yponom. cognatellus	23
12. Elach. kleemannella	165
13. 14. Coss. complana	24
Z. 18. §. 1—10. Epis. caeruleocephala	20
11—15. Ypsol. verbascellus	25
16—20. Hypen. rostralis	26
Z. 19. §. 1—3. Plusia gamma	27
4—18. Org. antiqua	28
19—23. Alucita hexadactyla	31
Z. 20. §. 1—6. Pteroph. pentadactylus	29
7—18. Pter. pterodactylus	30
Z. 21. §. 1—3. Smerinth. tiliae	201
4. Saturn. carpinii	82
5. Pter. pterodactylus?	30
6. 7. Sphinx ligustri	11
8. Org. antiqua	28
9. Macrogl. stellarum	6
10. 11. Coss. ligniperda	21
12. Euprep. menthastris?	84
13. Liparis salicis	47
14. Cucull. verbasci?	73
Z. 22. §. 1. Pont. brassicae	40
2. Van. C album	36
3. 4. Cab. punctaria	134
5. 6. Lipar. dispar	80
7. Deileph. euphorbiae	9
8—10. Lip. dispar	80
11. Sphinx ligustri	11
Z. 23. Vanessa polychlorus	32
Z. 24. §. 1—4. Lip. dispar	80
5. Gastrop. neustria	87
6—8. Unbestimmte Phalaene	216
9—12. Deil. euphorbiae	9
Z. 25. Vanessa jo	33
Z. 26. §. 1—7. Vanessa urticae	34
8—12. Vanessa cardui	35

Σ. 27. §. 1—10. Van. C album	36	Σ. 36. §. 1—7. Euprep. caja	51	Σ. 42. §. 1—4. Phal. Noct., unbest.	72
11—17. Hipp. aegeria	37	8—12. Lithos. mundana	53	5—16. Acron. psi	75
Σ. 28. §. 1—7. Lyc. W album	38	Σ. 37. §. 1—3. Abrost. triplasia	54	Σ. 43. §. 1, 2. Phalaena, unbestimmt	69
8—13. Pont. brassicae	40	4—7. Cleoph. linariae	55	3. Cucull. scrophulariae	73
Σ. 29. §. 1, 2. Pont. brassicae	40	8—10. Acron. euphorbiae	56	4. Cucull. verbasci	74
3. Pont. crataegi	43	11, 12. Acron. runcicis	57	5—11. Cuc. verbasci?	73
4—8. Pont. rapae	42	13, 14. Bryophil. unbestimmt	60	12, 13. Cuc. scrophulariae	74
9. Papil. machaon	41	15. Cleoph. Linariae	56	Σ. 44. §. 1—4. Tinea, unbestimmt	68
Σ. 30. Papilio machaon	41	Σ. 38. §. 1—6. Pyr. strigularis	61	5—13. Gastrop. crataegi	77
Σ. 31. §. 1—8. Eupr. villica	44	7—9. Tortrix?	62	14, 15. Bombyx, unbestimmt	76
9—12. Lip. Chrysorrhoea	88	Σ. 39. §. 1—4. Bry. glandifera?	58	Σ. 45. Liparis dispar	80
13, 14. Gastrop. neustria	87	5, 6. Hal. chlorana	64	Σ. 46. §. 1—5. Liparis dispar	80
Σ. 32. §. 1—7. Catoc. pronissima	45	7. Hal. prasinana	63	6. Sphinx ligustri	11
8—10. Org. fascelina	49	8, 14. Hal. quercana	66	7. Unbestimmt	217
11, 12. Gastrop. lanestris	46	Σ. 40. §. 1—6. Hal. quercana	66	8—13. Van. polychlorus	32
13—15. Saturn. piri?	81	7—9. Hal. prasinana	63	Σ. 47. §. 1—3. Saturn. piri	81
Σ. 33. §. 1—3. Sat. piri?	81	10. Hal. quercana	66	4. Gastrop. neustria	87
4—17. Org. pudibunda	50	11—13. Phal. Noct., unbestimmt	69	5—7. Saturn. piri	81
Σ. 34. §. 1—6. Lip. salicis	47	14—15. Trach. atriplicis	70	Σ. 48. Saturnia piri	81
7—11. Acron. aceris	48	16, 17. Mam. brassicae	71	Σ. 49. §. 1—10. Sat. carpini	82
12—15. Bomb. mori	86	Σ. 41. §. 1—3. Mam. brassicae	71	11—15. Bot. pallidalis	78
Σ. 35. §. 1—11. Gastrop. quercus	52	4—14. Triph. pronuba	12	16—18. Bot. urticae	79
12—15. Gastrop. quercus?	52			Σ. 50. Saturnia carpini	82

## Dweiter Theil.

Σ. 1. §. 1. Eupr. urticae	85	Σ. 16. §. 1—4. Phal. Tinea, unbest.	109	Σ. 29. §. 1—5. Cab. punctaria	134
2—10. Eupr. menthastri	84	5. Tortrix, unbestimmt	97	6—8. Geom. miata	133
11—15. Lip. dispar	80	6. Vanessa atalanta	2	9 (19). Geom. aeruginaria	135
16. Pteroph. megadactyl?	218	7. Phal. Tinea, unbestimmt	102	10—13. Geom. miata	133
Σ. 2. §. 1, 2. Zyg. filipendulae	8	8—10. Ornix ligustrella	112	14—18. Geom. aeruginaria	135
3. Pontia rapae	42	11. Phal. Tinea, unbestimmt	103	Σ. 30. §. 1—16. Fidonia, defoliaria	136
4. Asop. formalis	89	Σ. 17. §. 1, 2. Phal. Tinea, unbest.	103	17—20. Fidonia, unbestimmt	137
5—9. Pontia crataegi	43	3, 4. Phal. Tinea, unbestimmt	104	Σ. 31. §. 1—6. Phal. Geom., unbest.	141
Σ. 3. §. 1, 2. Acron. psi	75	5—10. Ornix syringella	111	7. 8. Amphid. zonaria	138
3. Van. atalanta	2	Σ. 18. §. 7. Hal. chlorana	64	9—15. Amphid. hispidaria?	139
4. Genitien. ciner. unbestimmt	219	8. Tentinia revayana	65	16. Cab. omicronaria	140
5. Cucull. verbasci?	73	9—14. Diptera.		Σ. 32. §. 1—12. Nymph. potanogalis	142
6—8. Phalaenocory. unbest.	220	Σ. 19. §. 1—5. Bot. verticalis	98	13—16. Nymph. femoralis	145
9—10. Acron. aceris	48	6—8. Penth. cynosbana?		Σ. 33. §. 1. Phal. Noct., unbestimmt	146
11. Vanessa polychlorus	32	9—14. Phal., unbestimmt	110	2. Pontia brassicae	40
12—14. Pont. rapae	42	Σ. 20. §. 1—4. Sphinx ligustri	11	3—17. Hymenoptera.	
15—17. Gastrop. lanestris	46	5. 6. Lemmat. fagella	113	Σ. 34. §. 1, 2. Pontia brassicae	40
Σ. 4. §. 1—13. Gastr. neustria	87	7. 8. Cymat. xanthoceros	115	3. Lip. dispar	80
14—16. Acron. euphorbiae	56	9—13. Notod. camolina	116	4. Phal. gentianana	152
Σ. 5. §. 1—3. Bomb. mori	86	14—18. Gastrop. ilicifolia?	114	5. 6. Hymenopt.	
4—12. Lip. chrysorrhoea	88	Σ. 21. Harpyia vinula	118	7. Gastrop. quercus	52
13. Bombyx mori	86	Σ. 22. §. 1, 2. Harp. erminea	119	8. Acron. runcicis	57
Σ. 6. Liparis chrysorrhoea	88	3. Harp. vinula	118	Σ. 35. Hymenoptera.	
Σ. 7. §. 1, 2. Lip. chrysorrhoea	88	4. 5. Platyp. hamula	120	Σ. 36. §. 1. Raupe, unbestimmt	224
3—7. Gastr. pityocampa	90	6. 7. Platyp. spinula	121	2. Raupe, unbestimmt	225
Σ. 8. Gastrop. pityocampa	90	8—16. Not. ziczac	117	14. Gastrop. neustria	87
Σ. 9. §. 1. Gastrop. pityocampa	90	Σ. 23. Gastrop. quercifolia	122	Σ. 37. Hymenoptera et Coleoptera.	
2—10. Melit. cinxia	91	Σ. 24. Acheront. atropos	123	Σ. 38. §. 1—6. Harpyia aesculi	148
Σ. 10. Gastrop. processionea	92	Σ. 25. Hemipt. et Coleoptera.		7—10. Lycaena baeticus	155
Σ. 11. Gastrop. processionea	92	Σ. 26. Plusia gamma	27	11—14. Diptera.	
Σ. 12. §. 1—8. Ypon. malinellus	93	Σ. 27. §. 1—5. Plusia gamma	27	15, 16. Phalaena, unbestimmt	161
9. Yponom. padellus	95	6—14. Acid. brumata	124	17—22. Diptera.	
10, 11. Yponom. malinellus	93	15, 16. Amphid. betularia	130	Σ. 39. §. 1—4. Heph. sylvinus	150
12, 13. Yponom. cognatellus	23	17, 18. Ennomos illustraria?	131	5. 6. Myel. cribelli	151
Σ. 13. Tortrix americana?	96	Σ. 28. §. 1, 2. Fidon. pinaria?	128	7. 8. Penth. gentianana	152
Σ. 14. §. 1—9. Tortrix americana?	96	2, 3. Fidonia, unbestimmt	127	9—21. Oecoph. betulinella	157
10. Phal. Tinea, unbestimmt	101	4—6. Fidon. pinaria?	128	Σ. 40. §. 1—10. Carp. pomonana	158
Σ. 15. §. 1—10. Tortrix americana?	96	7—10. Fidon. conspuraria	129	11, 12. Phal. Noct., unbest.	154
11—14. Ornix, unbestimmt	90	11—13. Phal. Geom., unbest.	221	13, 15. Tinea glandella	159
		14—15. —	222	16—19. Phal., unbestimmt	160
		16, 17. —	223		

## Dritter Theil.

Σ. 1. Enthält Mucken. . . . .	Σ. 10. Psyche pseudobombyc. . . . .	Σ. 15. Σ. 1—6. Talaep. lapicidella . . . . .
Σ. 2. Σ. 1—6. Phal. Tin. . . . .	12. 13. Orn. lusciniæpennella ? . . . . .	7—8. Talaep. lichenella . . . . .
7. 8. Oecoph. hermannella . . . . .	13. 15. Orn. lusciniæpennella ? . . . . .	VIII—X. Psyche lichenum . . . . .
9—21. Coleopt. et Diptera. . . . .	Σ. 8. Σ. 1—18. Orn. lusciniæpenn. . . . .	9—15. Neuroptera. . . . .
Σ. 3. Σ. 1—6. Elachista. unbestimmt . . . . .	19—25. Ornix. unbestimmt . . . . .	17—19. Talaep. lapicidella . . . . .
7—8. Elach. complanella . . . . .	Σ. 9. Σ. 1—8. Orn. lusciniæpennella . . . . .	20—22. Coleoptera ? . . . . .
9—12. Ornix quercetella . . . . .	9—16. Orn. lusciniæpennella ? . . . . .	Σ. 16. Σ. 1—5. Ornix tiliiella . . . . .
Σ. 4. Σ. 1—10. Elach. kleemannella . . . . .	Σ. 10. Σ. 1—6. Ornix. unbestimmt . . . . .	6—12. Ornix palliatella . . . . .
11—15. Elach. blanchardella . . . . .	7. 8. Ornix lusciniæpennella ? . . . . .	13—16. Ornix. unbestimmt . . . . .
Σ. 5. Tinea pellionella . . . . .	9—14. Ornix lusciniæpennella . . . . .	Σ. 19. Σ. 1—9. Galleria colonella ? . . . . .
Σ. 6. Σ. 1—8. Tinea pellionella . . . . .	15. Ornix lusciniæpennella ? . . . . .	10—18. Galleria mellonella . . . . .
9. 10. Tinea sarcitella ? . . . . .	Σ. 11. Σ. 1—1. Ornix colutella . . . . .	19—21. Phycis elutella ? . . . . .
11—16. Tinea pellionella . . . . .	5—9. Psyche nitidella . . . . .	Σ. 20. Σ. 1—4. Tinea tapetiella . . . . .
Σ. 7. Σ. 1—6. Orn. lutipennella . . . . .	10. Psyche graminella . . . . .	5—11. Aglossa pinguinalis . . . . .
7—9. Orn. hemerobiella . . . . .	11. Psyche vestita . . . . .	12—16. Tinea granella . . . . .
	Σ. 12. 13. 14. Neuroptera. . . . .	

## Preisangabe auf Reaumur.

Da nun die Schmetterlinge größtentheils bestimmt sind; so setzt die Ffs einen Preis auf alle übrigen Kerse in Reauments Werk.

Sie zahlt für die Bestimmung eines jeden noch nicht richtig bestimmten Kerfs eine Krone, oder 1½ Thaler; für die Bestätigung eines schon bestimmten die Hälfte und ebenso für den Beweis, daß eines nicht bestimmbar sey. Es gelten Larve, Puppe und Fliege.

Für bestimmt wird nur betrachtet, was in Linne (Edit. XII.), Fabricius und Latreille steht.

Begen der Art der Bearbeitung hat man sich zu halten an Ffs 1835. S. 479, oder an die vorstehende Abhandlung; doch muß noch ein Register von Reauments Namen dazu.

Uebrigens bestimmt jeder eine Ordnung oder Zunft, welche ihm beliebt.

Damit nicht leicht jemand umsonst arbeite; so werden zwey ganze und drey halbe Preise erteilt, wenn die Arbeiten es werth sind.

# Reaumur's Schmetterlinge.

Erläutert und systematisch bestimmt

von C. J. Freyer in Augsburg. \*

Aufmerksam gemacht durch die Aufforderung im 5. Heft der Isis vom Jahr 1835. S. 479 wollte ich es schon früher unternehmen, diejenigen Schmetterlinge nebst ihren Raupen systematisch zu bestimmen, und, so weit es mir möglich wäre, zu erläutern, welche der französische Naturforscher Reaumur, in dessen

## MEMOIRES

pour servir

### A L'Histoire des Insectes

Tom. I. et II.

A Paris 1734. — 1837. 8.

abgebildet und theilweise beschrieben hat. Aber ich konnte dieses so eben bezeichnete Werk nirgends erhalten, und erst vor kurzer Zeit hatte ein theurer Gönner die Güte, mir solches auf einige Zeit zur Durchsicht mitzutheilen. Ich verglich die Kupfer, und fand leider! daß die Figuren wegen der schlechten Zeichnung, und da sie nicht illuminiert sind, sehr schwer zu erkennen sind. Die Lösung der aufgestellten Frage in der Isis ist um so schwieriger, als auch Reaumur, was die Zeichnung, Farbe und den Habitus seiner Insecten betrifft, wenig oder doch nichts Genügendes in seinem Werke sagte, und ich nur durch die mitunter gegebenen öconomischen Nachrichten hin und wieder Licht erhielt. Aber auch dies machte mir, da ich der französischen Sprache nicht ganz mächtig bin, viel zu schaffen. Ich erlaube mir daher, den Entomologen im Nachstehenden, soweit es mir möglich war, die systematischen Namen der abgebildeten Schmetterlinge Reaumur's in fortlaufender Ordnung nach dem 1ten und 2ten Bande seiner Mémoires kund zu geben, und habe, wo ich nicht klar wurde, solches unverholen gesagt. Um nicht zu weitläufig mit der Synonymie zu werden, führe ich nebst Hübner nur Treitschke und Ochsenheimer an, da deren Werk jetzt völlig geordnet und fertig

ist, und solches nicht nur alle bekannten Arten, sondern auch die Citate der meisten Schriftsteller, namentlich Linne, Fabricius und Schrank u. enthält:

Wo ich den systematischen Namen einfach, unter Citirung Ochsenheimers und Treitschkes ohne besondere Bemerkungen angab, da bin ich meiner Sache wohl ganz gewiß. Wo ich die Worte: „wahrscheinlich“ oder „höchstwahrscheinlich“ gebraucht habe, glaube ich richtig bestimmt zu haben, ohne die Richtigkeit der Bestimmung jedoch behaupten zu wollen. Ich fand während dieser Arbeit, daß Fabricius, wo er Reaumur anzog, öfters große Fehler und Irrthümer gemacht hat. Da auch Oken in seiner Naturgeschichte 5. Bd. 3te Abth. sich nach Fabricius, theilweise, gerichtet zu haben scheint, so habe ich dies überall bemerkt. \*\* Ich bitte die verehrlichen Entomologen, meine Arbeit zu prüfen, und sehe etwaiger Belehrung in dieser Zeitschrift mit Vergnügen entgegen.

## Tom. I.

### Platte 1. S. 101.

Fig. 1 — 17. Sind verschiedene Raupen abgebildet, aus welchen man die früheren Classen, in welche sie fallen, erkennen soll. Eine Art-Bestimmung ist wohl nicht möglich, da über diese Arten vom Verfasser zu wenig gesagt wurde. Fig. 18 — 20. gehören einer Wespenart.

### Platte 2. S. 106.

\* Fig. 1 — 3. Die Raupe von *Sp. Populi*. Ochsenheimer 2. Bd. S. 252. 10. Bd. 1. Abth. S. 141. Hübner Sp. Fig. 74.

Fig. 4. 5. Die Raupe von *Pap. Atalanta*. Ochsenh. 1. Bd. 1. Abth. S. 104. 4. Bd. S. 127. Hübner. Pap. Fig. 75. 76.

Fig. 6. Die Raupe von *Pap. Jo.* Ochsenh. 1. Bd. 1. Abth. S. 107. Hübner. Pap. Fig. 77. 78.

\* Nach der Ausgabe in 8. Es ist die Beantwortung der von der Isis gestellten Aufgabe, welche den zweyten Preis erhalten hat, weil nicht alle Gattungen bestimmt und keine Gründe angegeben worden. D.

\*\* Ich habe, wo es möglich war, nach den Wiener Schmetterlingen von Denis und Schiffmüller bestimmt. D.  
Ein Stern vor einer Figur zeigt an, daß Freyer von Zeller's Bestimmung abweicht. D.

Isis 1838. Heft 10.

Fig. 11. Die Raupe von *Bomb. carpini*. Döfnerh. 3. Bd. S. 6. Hüb. *Bomb.* Fig. 53 u. 54.

\* Fig. 14 und 15. Wahrscheinlich *Bomb. Lubricipeda* im jugendlichen Alter.

\* Fig. 16 — 19. Unkenntlich. Wahrscheinlich *B. Rubi*.  
Fig. 21. Die Raupe von *B. fascelina*. Döfnerh. 3. Bd. S. 214. Hüb. *Bomb.* Fig. 81.

### Platte 3. S. 164.

Stellt mehrere Füße von verschiedenen Arten vor.

### Platte 4. S. 168.

Fig. 1 — 9. Die Raupe von *Bomb. dispar* im halberwachsenem Zustande. Döfnerh. 3. Bd. S. 195. Hüb. *Bomb.* Fig. 75. 76.

\* — 10. Wahrscheinlich *G. Alpinaria*. Treitschke 6. Bd. 1. Abth. S. 244. Hüb. F. 178. 513.

— 14. Die Raupe von *B. mori*. Erotisch.

### Platte 5. S. 172.

Fig. 1 — 6. Aufgeschnittene Raupenbälge.

— 7. Die Raupe von *B. neustria*. Döfnerh. 3. Bd. S. 296. Hüb. F. 179. 180.

### Platte 6. S. 193.

Fig. 1. Die vergrößerte, Fig. 2 u. 10. die natürliche Raupe von *B. Chrysorrhoea*. Döfnerh. 3. Bd. S. 202. Hüb. Fig. 67.

### Platte 7. S. 249.

Fig. 1 u. 2. Die Raupe und der Schmetterling von *Noct. Batis*. Treitschke 5. Bd. 2. Abth. S. 162. Hübner, *Noct.* 65.

— 7. Ein Flügel von *Pap. machaon*.

— 11. Vergleich von *Bomb. quercus*.

Die übrigen Figuren bis 37. stellen einzelne vergrößerte Flügelschuppen vor.

### Platte 8. S. 251.

Fig. 1 — 23. zeigen mehrere Fühler und Antennen vergrößert.

— 24 — 26. ist *Noct. meticalosa*. Treitschke 5. Bd. 1. Abth. S. 373. Hüb. Fig. 67.

### Platte 9. S. 255.

Stellt verschiedene Saugrüssel vor.

### Platte 10. S. 280.

Fig. 1 — 6. verschiedene Flügelformen.

— 7. *Pap. brassicae*. Döfnerh. 1. Bd. 2. Abth. S. 144. Hüb. Fig. 401 — 403.

— 8 — 11. *Pap. Atalanta* als Schmetterling, Raupe und Puppe. Döfnerh. 1. Bd. 1. Abth. S. 104. Hüb. Fig. 75. 76.

### Platte 11. S. 281.

Fig. 1. *Pap. janira* vielleicht die Var. *Hispania*. Döfnerh. 1. Bd. 1. Abth. S. 218. Hüb. Fig. 161. 162.

— 3 und 4. *Pap. podalirius* auf der Unterseite und Oberseite. Döfnerh. 1. Bd. 2. Abth. S. 118. Hüb. Fig. 88.3 889.

Fig. 5. Erotisch.

— 6 — 12. *Pap. malvarum*. Döfnerh. 1. Bd. 2. Abth. S. 195. Hüb. Fig. 450. 451.

### Platte 12. S. 283.

Fig. 1 — 6. Raupe, Puppe und Schmetterling von *Sph. stellatarum*. Döfnerh. 2. Bd. S. 193. Hüb. Fig. 57.

— 9. 10. *Sph. bombyliiformis*. Döfnerh. 2. Bd. S. 189. Hüb. F. 55. Fuciformis.

— 13 — 16. *Zyg. filipendulae*. Döfnerh. 2. Bd. S. 54. Hüb. F. 31. 17.

\* — 17. *Zyg. lonicerae*. Döfnerh. 2. Bnd. S. 49. Hüb. F. 7.

### Platte 13. S. 329.

Fig. 1 — 7. *Sph. euphorbiae*. Döfnerh. 2. Bd. S. 223. Hüb. F. 66.

— 8 und 9. *Sph. convolvuli*. Döfnerh. 2. Bd. S. 236. Hüb. F. 70.

### Platte 14. S. 329.

Fig. 1. *Sph. ligustri*. Döfnerh. 2. Bd. S. 240. Hüb. F. 69.

— 2. 3. *Sph. Atropos*. Döfnerh. 2. Bd. S. 231. Hüb. F. 68.

— 4 — 10. *Noct. pronuba*. Treitschke 5. Bd. 1. Abth. S. 260. Hüb. F. 103.

Die Fig. 10. ist eine Abart. Diese Erse variiert übrigens in den Raupen und Faltern so sehr, daß Herr Treitschke zwei Arten unter den Namen *Inuba et Pronuba* früher aufgestellt hat.

— 11 — 13. *Noct. meticalosa*. Treitschke 5. Bd. 1. Abth. S. 373. Hüb. F. 67.

Reaumur hat schon auf der 8. Platte F. 24 — 26. dieselben Falter abgebildet.

### Platte 15. S. 330.

Fig. 1 — 5. *Noct. pyramidea*. Treitschke 5. Bd. 1. Abth. S. 285. Hüb. F. 36.

\* — 6. Ist *Noct. auricoma* als Schmetterling. Treitschke 5. Bd. 1. Abth. S. 36. Hüb. F. 8.

Siehe Platte 37. F. 11. und 12.

Ofen citirt in seiner Naturgeschichte 5. B. 3. Abth. S. 1090 irrig *Noct. rumicis*, von welcher jedoch auf Platte 34. des 2. Theils die Raupe deutlich abgebildet ist.

Fig. 7 — 9. *Pyral. sambucalis* in allen Ständen. Tr. 7. Bd. S. 83. Hüb. F. 81.

\* — 10 — 13. *Geom. repandaria* ♂. Treitschke 6. Bd. 1. Abth. S. 208. Hüb. F. 161.

### Platte 16. S. 332.

Fig. 1 — 7. *Bomb. jacobaeae* in allen Ständen. Döfnerh. 3. Bd. S. 154. Hüb. F. 112.

— 8 — 11. *B. auriflua*. Döfnerh. 3. Bd. S. 205. Hüb. F. 68. 69.

— 12 — 14. *Pyral. forficulis*. Treitschke 7. Bd. S. 122. Hüb. Fig. 58.

### Platte 17. S. 333.

Fig. 1 — 8. *B. cossus ligniperda*. Döfnerh. 3. Bd. S. 90. Hüb. F. 198.

\* Fig. 9. Wahrscheinlich *Tortr. Abildgaardana*. *Zeitschf.* 8. Bd. S. 268. *Hb. Christiana* S. 55.

\* — 10. 11. *Tin. padella*. *Tr.* 9. Bd. 1. Abth. S. 217. *Hb.* S. 393 — 395.

Den citirt in seiner Naturgeschichte 5. Bd. 3. Abth. S. 1093 nach Linne irrig *Evonymella*, welche Reaumur Bd. 2. Pl. 12. S. 10 — 13. abgebildet hat.

\* Fig. 12. (Unbekannt)  
*Merianella* Den 5. Bd. 3. Abth. S. 1093?

\* — 13. 14. Wahrscheinlich *Tin. perlella* oder *Inquinatella*. *Zeitschf.* 9. Bd. 1. Abth. S. 121 und 129. *Hb.* Fig. 40.

Den in seiner Naturgeschichte 5. Bnd. 3. Abth. S. 1093 cit. *Tin. culmella*.

#### Platte 18. S. 335.

Fig. 1 — 10. *Noct. caeruleocephala*. *Dshsenh.* 5ter Bd. 1. Abth. S. 112. *Hb. Bomb.* Fig. 196.

Die 9. Figur könnte vielleicht eine *Noct. flavicornis* seyn.

Fig. 11. u. 15. *Tin. verbascella*. *Tr.* 9. Bnd. 1. Abth. S. 253. *Hb.* S. 98.

Den citirt in seiner Naturgeschichte 5. Bnd. 3. Abth. S. 1094 irrig *Tin. porrectella*.

Die Reaumur'sche Figur des Schmetterlings zeigt sehr deutlich die zwei schwarzen Punkte.

— 16 — 20. *Pyr. rostralis*. *Tr.* 7. Bnd. S. 29. *Hb.* S. 10.

#### Platte 19. S. 338.

Fig. 1 — 3. *Noct. gamma*. Gespinnst und Schmetterling sammt dem Schopf. *Tr.* 5. Bd. 3. Abth. S. 185. *Hb.* Fig. 233.

— 4 — 18. Raupe, Puppe, weibliche und männliche Falter, von *Bomb. antiqua* sammt mehreren einzelnen vergrößerten Gliedmaßen, Gespinnst und Eyer.

*Dshsenh.* 3. Bd. S. 221. *Hb.* S. 77. 235.

— 19 — 23. Der Schmetterling sammt einem vergrößerten Flügeltheil von *Alucita hexadactyla*. *Tr.* 9. Bd. 2. Abth. S. 255. *Hb.* S. 30. 31.

#### Platte 20. S. 340.

Fig. 1 — 6. Die Falter sammt Raupen von *A. pentadactyla*. *Tr.* 9. Bd. 2. Abth. S. 249. *Hb.* S. 1.

— 7 — 17. *Al. pterodactyla*. *Tr.* 9. Bd. 2. Abth. S. 242. *Hb.* S. 4.

Den citirt 5. Bd. 3. Abth. S. 1096. *Al. monodactylus*.

#### Platte 21. S. 375.

Diese ganze Tafel enthält Puppen von verschiedenen Arten.

\* Fig. 1 — 3. Puppen von *Sph. Populi*.

— 4 Puppe von *Bomb. carpin.*

— 5. Puppe von einer *Federmotte*.

— 6 — 8. Puppe von *Sph. Ligustri*.

— 9. Puppe von *Sph. Stellatarum*.

— 10. 11. Puppe von *B. cossus*.

— 12. mir fremd.

\* — 13. Eine *Federmottenraupe*.

— 14. Puppe von *Noct. verbascel*.

#### Platte 22. S. 377.

Fig. 1. Puppe von *Pap. brassicae*.

— 2. Puppe von *Pap. C. album*.

\* — 3 u. 4. Puppe von *G. pendularia*.

— 6 — 11. Mir fremd. Reaumur sagt S. 373, daß diese Puppe von einer geöhren Raupe ist, welche auf der Eiche und Ulme lebt. Wird *B. dispar* seyn.

#### Platte 23. S. 380.

Fig. 1 — 11. Raupe, Puppe und Falter, dann einzelne vergrößerte Glieder von *P. polychloros*. *Dshsenh.* 1. Bd. 1. Abth. S. 114. *Hb.* S. 81. 82.

#### Platte 24. S. 410.

Fig. 1 — 4. Raupe und Puppe von *B. dispar*. Zu Platte 4. S. 1 — 9.

\* — 5 — 10. Mir fremd.

#### Platte 25. S. 441.

Fig. 1 — 17. *P. jo.* in allen Ständen sammt einzelnen vergrößerten Gliedern. *Dshsenh.* 1. Bd. 1. Abth. S. 107. *Hb.* S. 77. 78.

#### Platte 26. S. 443.

Fig. 1 — 7. *P. urticae* in allen Ständen.

— 5. ein Nest mit jungen Raupen dieser Art. *Dshsenh.* 1. Bd. 1. Abth. S. 120. *Hb.* S. 87 — 89.

— 8 — 12. *P. cardui* in allen Ständen. *Dshsenh.* 1. Bd. 1. Abth. S. 102. *Hb.* S. 73. 74.

#### Platte 27. S. 444.

Fig. 1 — 10. *P. C. album* in allen Ständen. *Dshsenh.* 1. Bd. 1. Abth. S. 125. *Hb.* S. 92. 93.

— 11 — 17. *P. egeria* in allen Ständen. *Dshsenh.* 1. Bd. 1. Abth. S. 238. *Hb.* S. 181. 182.

Könnte vielleicht auch *P. meone* seyn, die im südlichen Frankreich fliegt. Die Beschreibung gibt keine klare Auskunft.

#### Platte 28. S. 482.

\* Fig. 1 — 7. *P. ilicis*. *Dshsenh.* 1. Bd. 2. Abth. S. 105. *Hb.* S. 378. 379.

Es könnte dieser Falter wohl auch *P. pruni* seyn, jedoch Reaumur's Beschreibung, so wie der Umstand, daß die Figur 7. dreifach klein geschwänzte Hinterflügel zeigt, sprechen mehr für *P. ilicis*, um so eher, als die Raupe auf der Eiche gefunden wurde, auf welcher *Pruni* nicht vorkommt. Uebrigens führt die Raupe von *P. pruni* 8 carminrothe Punkte auf dem Rücken, was Reaumur gewiß bemerkt haben würde. Reaumur's vergrößerte Raupe N. 1. hat übrigens große Ähnlichkeit mit *P. quercus*, doch stimmt die Beschreibung des Schmetterlings nicht damit überein.

— 8 — 14. Raupen von *P. brassicae* in verschiedenen Stellungen.

#### Platte 29. S. 483.

Fig. 1 — 3. *P. brassicae* als Puppe und Falter. *Dshsenh.* 1. Bd. 2. Abth. S. 144. *Hb.* S. 401 — 404.

— 4 — 8. *P. rapae* in allen Ständen. *Dshsenh.* 1. Bd. 2. Abth. S. 146. *Hb.* S. 404. 405.

— 9. *P. machaon* als Falter.



# Platte 30. S. 484.

Fig. 1—13. *Pap. machaon* in allen Ständen. Dshsenh. 1. Bd. 2. Abth. S. 121. Hb. F. 390. 391.

# Platte 31. S. 524.

Fig. 1—8. *Bomb. villica* in allen Ständen. Dshsenh. 3. Bd. S. 330. Hb. F. 136.

— 9—14. Gespinnste und Puppen von *B. Neustria*.

# Platte 32. S. 526.

Fig. 1—7. *Noct. promissa* in allen Ständen. Treitschke 5. Bd. 3. Abth. S. 349. Hb. F. 334.

Oken citirt in seiner Naturgeschichte 5. Bd. 3. Abth. S. 1115 irrig *Noct. sponsa*, *N. sponsa* ist es gewiß nicht, wie die Raupe zeigt.

Fig. 8. Gespinnst von *B. fascelina*.

— 9. 10. Soll nach Reaumurs Nachrichten und dessen Angabe der Falter von der Raupe Platte 2. F. 21. und dem Gespinnst, Platte 32. F. 8., mithin *B. fascelina* sein, obgleich die Abbildung der Schmetterlinge ganz unkenntlich ist.

— 11. 12. Raupe und das Lännchen von *Bomb. lanestria*.

Dshsenh. 3. Bd. S. 289. Hb. F. 169. 170.

Die klare Beschreibung Reaumurs S. 502 läßt keinen Zweifel mehr übrig, daß er diesen Spinner als Raupe gehabt hat.

Oken citirt S. 1313 die Fig. 11. irrig bey *Tridens*.

# Platte 33. S. 528.

Fig. 4—17. *B. pudibunda* in allen Ständen. Dshsenh. 3. Bd. S. 209. Hb. F. 84. 85.

# Platte 34. S. 530.

Fig. 1—6. *Bomb. salicis* in allen Ständen. Dshsenh. 3. Bd. S. 198. Hb. F. 70.

— 7—11. *Noct. aceris* in allen Ständen. Treitschke 5. Bd. 1. Abth. S. 11. Hb. F. 13. 14.

# Platte 35. S. 531.

Fig. 1—15. *B. quercus* in allen Ständen. Dshsenh. 3. Bd. S. 266. Hb. F. 172. 173.

# Platte 36. S. 533.

Fig. 1—7. *B. caja* in allen Ständen. Dshsenh. 3. Bd. S. 335. Hb. F. 130. 131.

\* — 8—12. Wahrscheinlich *B. Eborina*. Dshsenh. 3. Bd. S. 152.

Es wurden bey diesem Falter zu wenig hieher bezügliche Merkmale angegeben, doch glaube ich, ihn richtig bestimmt zu haben, da auch die Nachrichten, welche Reaumur von den Raupen gab, hieher passen.

# Platte 37. S. 590.

Fig. 1—3. *Noct. triplasia* in allen Ständen. Treitschke 5. Bd. 3. Abth. S. 138. Hb. F. 269.

— 4—7. *N. linariae* in allen Ständen. Treitschke 5. Bd. 3. Abth. S. 77. Hb. F. 252.

— 8—10. u. 15. *N. euphorbiae* als Raupe mit Gespinnst. Tr. 5. Bd. 1. Abth. S. 40. Hb. Fig. 12.

\* — 11. 12. *N. auricoma*.

Siehe Platte 15. Fig. Hüb. F. 8.

Reaumur weist auf diese bezeichnete Figur mit der Bemerkung hin, daß aus dieser Raupe der Schmetterling Platte 15. Fig. 6. kam.

\* Fig. 13. 14. Höchstwahrscheinlich die Raupe von *Noct. ypsilon*. Treitschke 5. Bd. 2. Abth. S. 210.

Reaumur fand sie auf bemoosten Bäumen, doch gab er die Baumart nicht an. Die Farbe, welche er von dieser Raupe beschreibt, paßt ganz, und der Umstand, daß die Raupen von *N. ypsilon* in den Rinden und zwischen dem Moos der Stämme stecken, bestärkt meine Vermuthung.

# Platte 38. S. 592.

Fig. 1. 2. Gespinnst von *Pyrl. strigularis*. Treitschke 7. Bd. S. 187. Hb. F. 16.

\* — 7—9. Puppe und Schmetterling von *Tort. revayana*. Treitschke 8. Bd. S. 22. Hb. F. 6—8.

Hüb. *Dilutana*, *Undulana*.

# Platte 39. S. 593.

\* Fig. 1—4. *Noct. perla* in allen Ständen. Treitschke 5. Bd. 1. Abth. S. 61. Hb. F. 25.

Reaumurs Beschreibung paßt ganz gut.

\* — 5. Raupe und Gespinnst von *Tort. degerana*. Tr. 8. Bd. S. 22.

Oken citirt für Fig. 7. 5. Bd. 3. Abth. S. 1127 seiner Naturgeschichte irrig *Tort. viridana*, deren Raupe kein solches Gespinnst macht.

— 8—14. *Tort. quercana* in allen Ständen. Tr. 8. Bd. S. 7. Hb. F. 159.

Oken citirt S. 1128 am obigen Ort irrig *Prasinana*, welche Platte 40. abgebildet ist.

# Platte 40. S. 594.

Fig. 1—6. Gespinnste und Puppe von *Tort. quercana*.

— 10. Raupe und Puppe von *Tort. prasinana*. Tr. 8. Bd. S. 4. Hb. F. 158.

\* — 11. 12. Wahrscheinlich *N. contigua* als Raupe und Schmetterling. Treitschke 5. Bnd. 1. Abth. S. 352. Hb. Fig. 85.

— 14. 15. Ist, sowohl der Abbildung und Beschreibung nach, *N. atriplicis*. Tr. 5. Bnd. 2. Abth. S. 66. Hb. Fig. 83.

Reaumur hebt vorzüglich die grüne Farbe heraus (*Le verd est la couleur qui domine sur ses ailes*), welche kein anderer Schmetterling so auffallend besitzt als *Atriplicis*, und was einer der schönsten Belege für meine Angabe ist. Die Abbildung des Schmetterlings ist sehr schlecht, doch stimmen die Zeichnungen ebenfalls überein.

— 16. 17. Ist *Noct. brassicae* als Raupe und Schmetterling. Treitschke 5. Bnd. 2. Abth. S. 150. Hb. Fig. 88.

# Platte 41. S. 596.

\* Fig. 1—3. Höchst wahrscheinlich der Raupe nach, *Noct. or*, oder *octogesima*. Treitschke 5. Bd. 1. Abth. S. 98. Hb. Fig. 210.

Reaumur sagt zwar, daß er die Raupe auf Kraut (*du chou*) fand, obgleich *Or*, und *Octogesima* nur auf Weiden oder Pappeln leben. Aber die Gestalt der Raupe sowie auch

die Zeichnung des Falters stimmen mit *Or* oder *Octogesima* überein. Vielleicht das er sie nur zufällig auf Kraut gefunden hat, wie Kösel die Raupe von *P. podalirius*. Diese Arten führen zwar die Nierenmakeln sehr auffallend, und, obgleich die Figur 3. solche nicht deutlich zeigt, so könnte, bey dem Umstand, daß ich auch Schmetterlinge dieser Arten zog, welche fast keine Spur von einer Makel zeigten, dennoch dieser Schmetterling gemeint seyn.

Fig. 4—12. *Noct. pronuba* in allen Ständen. Tr. 5. Bd. 1. Abth. S. 260. Hb. F. 103.

#### Platte 42. S. 598.

\* Fig. 1—4. Raupe, Puppe und Falter von *N. nebulosa*, Hütners Plebeja. Treitschke 5. Bd. 2. Abth. S. 48. Hb. F. 78.

Es ist kein Zweifel, daß Reaumur diese Eule gemeint habe. Die Beschreibung der Raupe paßt ganz, nur ist die Zeichnung des Falters höchst unkenntlich, und nach solcher könnte man eher *N. nigrocincta* vermuthen.

— 5—16. *St N. psi* in allen Ständen. Tr. 5. Bd. 1. Abth. S. 30. Hb. F. 30.

#### Platte 43. S. 599.

Fig. 3—13. *Noct. scrophulariae* in allen Ständen. Treitschke 5. Bd. 3. Abth. S. 130. Hb. F. 267.

*N. verbasci* ist es der Zeichnung der Raupe F. 4. nach ebenfalls. Fig. 3. ist eine *Scrophulariae*; Fig. 4. ist eine *Verbasci*-Raupe.

#### Platte 44. S. 601.

Fig. 1—4. Mir fremd. Sind bloß Sackträgerlarven. Fig. 5—10. *St Bomb. crataegi*. Döfseh. 3. Bd. S. 278. Hb. F. 162.

\* 14—15. Die Raupen von *B. catax*. Döfseh. 3. Bd. S. 285. Hb. F. 168.

Könnte auch die Raupe von *B. populi* seyn. Reaumur's Beschreibung paßt auf beyde Arten, und beyde leben auf der Eiche. Doch die Fig. 15., welche das Lönnchen vorstellt, spricht mehr für *catax*.

#### Platte 45. S. 644.

\* Fig. 1—11. Stellen Abbildungen verschiedener nicht zu erkennender Puppen vor.

#### Platte 46. S. 647.

Fig. 1—6. Stellt *B. dispar* et *Sp. ligustri* frisch oder krüppelhaft aus der Puppe entwickelt vor.

— 8—13. Puppen von Tagfaltern. [*P. polychlorus*.]

#### Platte 47. S. 648.

Fig. 1—6. *B. pyri* als männlicher und weiblicher Falter sammt einzelnen vergrößerten Theilen. Döfseh. 3. Bd. S. 2. Hb. F. 56.

#### Platte 48. S. 649.

Fig. 1—8. Raupe, Falter, Puppe und Gespinnst von *Bomb. pyri*.

#### Platte 49. S. 650.

Fig. 1—7. Raupe, Gespinnst, Puppe und Schmetterling 1838. Heft 10.

ling von *Bomb. carpinii*. Döfseh. 3. Bd. S. 6. Hb. F. 53. 54.

Fig. 8—10. vergrößerte Glieder.

\* 11—15. Nach der Beschreibung höchst wahrscheinlich *Pyr. verbascalis*, obgleich die Figur des Schmetterlings nicht ganz paßt. Treitschke 7. Bd. S. 88. Hb. F. 80.

Den citirt in seiner Naturgeschichte 5. Bd. 3. Abth. S. 1133 irrig *N. glyptica*, deren Raupe eine ganz andere Gestalt, Form, Farbe und Nahrung hat, und mit Reaumur's Beschreibung und Abbildung durchaus nicht übereinstimmt.

— 16—18. *St Pyral. urticae*. Treitschke 7. Bd. S. 106. Hb. F. 78.

#### Platte 50. S. 651.

Fig. 1—12. *Bomb. carpinii* in allen Ständen. Die Raupe mit schwarzen Gürteln und rothgelben behaarten Warzen besetzt. Döfseh. 3. Bd. S. 6. Hb. F. 53. 54.

### Tom. II.

#### Platte 1. S. 108.

\* Fig. 1—10. *Bomb. mendica* in allen Ständen. Döfseh. 3. Bd. S. 351. Hb. F. 148. 149.

Reaumur's Beschreibung ist so klar und deutlich, daß über diese Art kein Zweifel herrscht. Vorzüglich ist es die Verschiedenheit der Farbe zwischen dem männlichen und weiblichen Falter, was meine Bestimmung rechtfertigte. Der Mann ist nehmlich braunrau, das Weib schön weiß mit schwarzen Punkten.

Die behaarte Raupe ist nach Reaumur's Angabe glänzend schwarz mit rothbraunem Kopf.

Den citirt in seiner Naturgeschichte 5. Bd. 3. Abth. S. 1146 und 1352 irrig *Bomb. lubricipeda* et *menthastri*, welche letztere in Farbe zwar ähnlich, in der Größe jedoch sehr verschieden von *Mendica* sind. Auch sind von *B. menthastri* beyde Geschlechter weiß.

— 11—15. *B. dispar* in beyden Geschlechtern. Döfseh. 3. Bd. S. 351. Hb. F. 148. 149.

\* — 16. *Alucita Rhododactyla*. Treitschke 10. Bd. 2. Abth. S. 228. Hb. F. 8.

#### Platte 2. S. 110.

Fig. 1 und 2. *Zyg. filipendulae*. Döfseh. 2. Bd. S. 54. Hb. F. 31.

\* — 3—9. *Pap. brassicae* in allen Ständen. Döfseh. 1. Bd. 2. Abth. S. 144. Hb. F. 401—403.

Den citirt irrig S. 1148 *Pap. rapae*, welcher Bd. 1. Platte 29. Fig. 4—8. abgebildet ist.

— 4. *Pyral. farinalis*. Treitschke 7. Bd. S. 147. Hb. Fig. 95.

Reaumur gibt von diesem Falter keine Beschreibung. Doch seine Stellung so wie seine Zeichnung stimmen mit *Farinalis* ganz überein.

#### Platte 3. S. 111.

Fig. 1—5. Einzelne vergrößerte Zeugungstheile von verschiedenen Faltern.

— 6—17. Vergrößerte Eyer verschiedener Schmetterlings-Arten.

### Platte 4. S. 115.

Fig. 1. 2. Die innere Ansicht des Hinterleibes von zwey weiblichen Spinnerarten wahrscheinlich von nachfolgender Art.

— 3—13. *Bomb. neustria* in beyden Geschlechtern sammt deren Eiern. Dshenh. 3. Bd. S. 144. Hb. F. 103.

— 14—16. Da Reamur auf Tom. I. Platte 37. Fig. 8. u. 15. verweist und auch diesen unter Fig. 14. auf vorstehender Tafel abgebildeten Schmetterling grauweiß beschreibt, so ist es *Noct. euphorbiae*. Diese Figur ist übrigens in Gestalt und Zeichnung ganz unkenntlich und nur die Beschreibung gab mir Aufklärung.

### Platte 5. S. 117.

Fig. 1—3. Puppe, Eyer und die beyden Falter von *B. Mori*.

(Gehört nicht unter die Eucopiden.)

— 4—13. *Bomb. chrysorrhoea* ♂ u. ♀.

(Sieh I. Tom. Pl. 6. Fig. 1—10.)

### Platte 6. S. 173.

Fig. 1—5. Stellen verschiedene Raupennester vor sammt der in solchen befindlichen jungen Brut.

### Platte 7. S. 174.

\* Fig. 1—7. Das Nest, die Raupe und einzelne vergrößerte Ringe derselben von *Bomb. pityocampa*. Dshenh. 3. Bd. S. 283. Hb. F. 161.

### Platte 8. S. 175.

Fig. 1—12. Gleichfalls *B. pityocampa* mit dem Nest, den Puppen und den Faltern in beyden Geschlechtern.

### Platte 9. S. 177.

Fig. 1. Wiederholt ein Nest der Fichtenraupe *B. pityocampa*.

— 2—10. *Pap. didyma*, Hübn. *Cinxia* in allen Ständen sammt dem Raupennest. Dshenh. 1. Bd. 1. Abth. S. 30. Hb. F. 9. 10.

### Platte 10. S. 205.

Fig. 1—6. Ein Nest mit einer Menge Raupen von *B. processionea*. Dshenh. 3. Bnd. S. 280. Hübn. Fig. 159. 160.

### Platte 11. S. 206.

Fig. 1—7. Ebenfalls ein Zug dieser Raupen in Procession sammt der Puppe und den Schmetterlingen.

### Platte 12. S. 207.

\* Fig. 1—9. *Tin. padella* in allen Ständen. Treitschke 9. Bd. 1. Abth. S. 217. Hb. F. 393—395.

\* — 10—13. *Tin. evonymella* in allen Ständen. Tr. 9. Bd. 1. Abth. S. 215.

### Platte 13. S. 230.

Auf dieser und den folgenden 2 Tafeln hat Reamur mehrere Widler abgebildet, welche er auf Eichen fand. Es ist

schwer, zu errathen, was er meynt. Nach seiner Aeußerung waren die Raupen schiefergrau, grünlich und sehr lebendig (wie alle Widlerarten).

Fig. 1—3. Einzelne Blätter sammt 2 Widler-raupen.

### Platte 14. S. 245.

Fig. 1—5. Widler-raupen, in der Beschäftigung, seine Fäden zu spinnen.

Fig. 6—10. Eingerollte Blätter, worinn sich Widler-raupen auf Eichen befinden.

### Platte 15. S. 246.

Fig. 1—4. Ein eingerolltes Blatt sammt 3 Puppen.

\* — 5. Höchst wahrscheinlich *Tort. ribeana*. Treitschke 8. Bd. S. 67. Hb. F. 114.

\* Fig. 6: 7. Höchst wahrscheinlich *Tort. laevigana*. Tr. 8. Bd. S. 62. Hb. F. 117. 118.

\* — 8. 9. hat Reamur nicht näher bezeichnet. Es ist wohl möglich, daß unter den Widler-raupen, welche Reamur auf Eichen fand, sich noch andere, vorzüglich *Tort. sorbiana* etc. befunden haben, denn die Eiche nährt, wie jeder Entomolog weiß, ein Heer von Raupen, und eine Menge Widler- und Schaben-Arten. Man kann hier bloß vermuthen und nicht behaupten. Die Figuren 5—7. glaube ich richtig errathen zu haben.

— 11—14. Widler sammt den Blättern des Sauerampfers.

### Platte 16. S. 248.

Fig. 1—4. Eine Widler- oder Schabenart auf einem Fenchelzweig.

Reamur beschreibt ihn gelb, und den Rest des Flügels braun, bennähe schwarz: est d'un blanc jaunâtre, le reste des ailes est d'un brun presque noir.

Vielleicht gar *Tort. abildgaardana*, Hübn. *Christana*, Fig. 55. und 240.

— 5—11. Verschiedene Widler- oder Schabenarten in Blättern gerollt.

### Platte 17. S. 249.

Fig. 1—10. Eine Schabenart in eingerollten Apfelblättern. Reamur beschreibt ihn reichfarbig, gemischt mit bronze und goldfarbigen Flecken, einem weißen Silberglanz und schönem Schwarz. Die Unterflügel schieferfarbig. Diese Beschreibung paßt auf *Tin. goedartella* oder Hübners *Micella*, doch mangelt hier das Schwarz.

### Platte 18. S. 250.

Fig. 1—3. Eingerollte Blattwickler auf Weiden.

\* — 4—7. *Tort. chlorana*. Treitschke 8. Bd. S. 10. Hb. F. 160.

\* — 8. *Tort. degenerana*. Treitschke 10. Bd. 3. Abth. S. 45. Hb. F. 9. 10.

Diese beyden Schmetterlinge sind sehr kenntlich abgebildet, und auch die Beschreibung paßt ganz gut.

### Platte 19. S. 251.

Fig. 1—5. *Pyrl. verticalis*. Treitschke 7. Bd. S. 161. Hb. F. 57.

\*Fig. 6 — 8. Wahrscheinlich *Tort. bergmanniana*, Hbbs. Rosana. Treitschke 8. Bd. S. 121. Hb. F. 137.

— 9 — 14. *Noct. Oo. Hüblers Ferruginago*.

Treitschke 5. Bd. 1. Abth. S. 84. Hb. F. 195.

Reaumur hat diese Eule nicht nur gut beschrieben, sondern auch kenntlich abgebildet.

Oken hat sehr unrichtig diese Eule in seiner Naturgeschichte 5. Bd. 3. Abth. S. 1255 für einen Wicker angesehen und fragweise *Tort. roborana* citirt.

#### Platte 20. S. 277.

Fig. 1 — 4. *Sph. ligustri* in allen Ständen. Dshsenh. 2. Bd. S. 240. Hb. F. 69.

— 5. 6. Wahrscheinlich ein Wicker.

Reaumur beschreibt ihn grün und näherte ihn mit Hagenbachblättern.

— 7. 8. Die Raupe und das Gespinnt von *Noct. xanthoceros*. Treitschke 5. Bnd. 1. Abth. S. 86.. Hübn. Fig. 205.

Reaumur's Beschreibung trifft mit vorstehender Tafel ganz überein.

— 9 — 13. *B. camelina* in allen Ständen. Dshsenh. 3. Bd. S. 58. Hb. F. 19.

Die in dreierley Stellungen abgebildeten Raupen sind sehr kenntlich.

Die Raupe von *B. camelina* wird vor der Verwandlung gewöhnlich purpuroth, was Oken versähte, sie S. 1164 seiner Naturgeschichte besonders aufzufühnen.

\* — 14 — 18. Eine halbbehaarte Spinner-Raupe sammt einzeln vergrößerten Haaren, die Reaumur auf Apfelbäumen fand. Er beschreibt sie grauweiß, mit braun, beynahe schwarz gefleckt. Wird wahrscheinlich eine junge Raupe von *Bomb. pruni* seyn.

#### Platte 21. S. 279.

Fig. 1 — 10. *B. vinula* deutlich und in allen Ständen. Dshsenh. 3. Bd. S. 20. Hb. F. 34.

#### Platte 22. S. 281.

Fig. 1. 2. Die Raupe von *B. erminea* sehr deutlich. Dshsenh. 3. Bd. S. 24. Hb. F. 35.

Also schon vor Hundert Jahren war diese Raupe abgebildet, und unsere neueren Entomologen, darunter Esper und Hübn., konnten solche nicht erhalten und auffinden. Was Esper als *Erminea* abgebildet hat, ist eine gewöhnliche, der Verwandlung nahe *Vinula*. Ich gab die erste Abbildung und Beschreibung von der *Erminea*-Raupe, und von mir erhielt Hübn. das Original seiner Abbildung.

E. F. Frey's Beytr. 1. Bd. XIV. Taf. S. 43.

= = Neuere Beytr. Bd. 1. Taf. 92. S. 165.

Fig. 3. Eine kleine junge Raupe von *Vinula* oder *Farcula*.

\* — 4 — 6. Raupe in dreierley Stellungen von *Noct. Sicula*. Treitschke 5. Bd. 3. Abth. S. 403. Hübn. B. Sicula. F. 41.

Sowohl die Abbildung als Beschreibung Reaumur's läßt keinen Zweifel, daß er diese Raupe vor sich gehabt hat.

— 7 — 16. *Bomb. ziczac* in allen Ständen. Dshsenh. 3. Bd. S. 48. Hb. F. 26.

#### Platte 23. S. 317.

Fig. 1 — 16. *Bomb. quercifolia* in allen Ständen. Dshsenh. 3. Bd. S. 247. Hb. F. 187. 188.

#### Platte 24. S. 319.

Fig. 1 — 8. *Sph. atropos* in allen Ständen. Dshsenh. 2. Bd. S. 231. Hb. F. 68.

#### Platte 25. S. 320.

Fig. 1 — 21. Abbildung einer kleinen Minierraupe sammt deren vollkommenem Insect. Ich halte das auf vorstehender Tafel abgebildete Insect für keine Raupe- oder Schmetterlingsart.

#### Platte 26. S. 345.

Fig. 1 — 19. Ist *Noct. gamma* in allen Ständen, mit einzeln vergrößerten Gliedern. Treitschke 5. Bd. 3. Abth. S. 135. Hb. F. 283.

#### Platte 27. S. 381.

Fig. 1 — 5. Wiederholt vorstehende *N. gamma* in allen Ständen.

— 6 — 11. *Geom. brumata* in allen Ständen. Tr. 6. Bd. 2. Abth. S. 23. Hb. F. 191. 415. 509.

— 12 — 14. Einzeln vergrößerte Antennen.

— 15 — 16. Höchst wahrscheinlich eine Raupe von *Geom. betularia* sammt vergrößertem Kopf. Treitschke 6. Bd. 1. Abth. S. 230. Hb. F. 173.

— 17 — 18. Raupen von *G. illustraria*. Tr. 6. Bd. 1. Abth. S. 63. Hb. F. 35.

#### Platte 28. S. 383.

\*Fig. 1 — 6. Wahrscheinlich *G. dilutata*. Tr. 6. Bd. 2. Abth. S. 26. Hb. F. 188.

Oken citirt 5. Bd. 3. Abth. S. 1267. *G. olivata*.

— 7 — 10. *G. conspicuaria*. Treitschke 6. Bnd. 1. Abth. S. 272. Hb. F. 117. 118.

\* — 11 — 14. *G. carbonaria*. Tr. 6. Bd. 1. Abth. S. 184. Hb. F. 151.

\* — 15. Wahrscheinlich die Raupe von *G. crataegata*. Tr. 6. Bd. 1. Abth. S. 41.

\* — 16 — 18. Raupe von *G. dentaria*. Tr. 6. Bd. 1. Abth. S. 76. Hb. F. 12.

#### Platte 29. S. 385.

Fig. 1 — 5. *G. punctaria* in allen Ständen. Tr. 6. Bd. 1. Abth. S. 352.

Oken citirt irrig S. 1279 *G. pendularia*.

Der Hohnspanner, welchen Oken erwähnt, ist *G. omicronaria*, und gehört nicht zu *Punctaria*.

\* — 6 — 14. Ist *G. psittacata*. Tr. 6. Bd. 2. Abth. S. 94. Hb. F. 227.

Reaumur's Beschreibung paßt besser als seine Abbildung. Der Hauptcharacter sind die 2 Spitzen der Raupe am After.

Oken citirt 5. Bd. 3. Abth. S. 1269. *G. miata*.

— 15 — 19. *G. aeruginaria* in allen Ständen. Tr. 6. Bd. 1. Abth. S. 109. Hb. F. 46.

Den citirt 5. Bd. 3. Abth. S. 1270 irrig *G. vernaria* und *viridaria*, welche nicht auf Reaumur's Abbildung und dessen Figur passen.

#### Platte 30. S. 387.

Fig. 1—20. Diese ganze Tafel stellt *G. desoliaria*, in allen Ständen sammt einzeln vergrößerten Gliedern und Schuppen vor. Tr. 6. Bd. 1. Abth. S. 315. Hb. F. 182.

#### Platte 31. S. 389.

Fig. 1—8. Die Raupe und der weibliche Schmetterling von *Geom. zonaria*. Tr. 6. Bd. 1. Abth. S. 251. Hb. F. 179. 511. Den citirt 5. Bd. 3. Abth. S. 1273 irrig *G. aescularia*.

\*—9—15. Weibliche Schmetterlinge von *G. alpinaria* sammt vergrößerten Schuppen. Tr. 6. Bd. 1. Abth. S. 244. Hb. F. 178. 513.

Sieh Tom. I. Platte 4. Fig. 10.

—16. *G. omicronaria*. Tr. 6. Bd. 1. Abth. S. 358. Hb. F. 65.

#### Platte 32. S. 405.

—1—12. *Pyr. potamogalis*, oder Hübners *nymphaealis* in allen Ständen. Treitschke 7. Bd. S. 143. Hb. Fig. 85.

Reaumur fand diesen Zünsler in Menge in einem Sumpf bey'm Boulogner Hölzchen.

—13—17. Nicht *Pyr. lemnalis* sondern *Pyr. stratiotialis* in allen Ständen.

Die Raupe lebt nach Reaumur in den sogenannten Meerlinsen, welche gerne in Sümpfen wachsen. Sie ist olivenfarbig. Sowohl die Größe der Reaumur'schen Abbildung, als auch die Beschreibung paßt mehr auf *Stratiotialis* als auf *Lemnalis*, die kaum die Hälfte ihrer Größe hat.

Treitschke 7. Bd. S. 137. Hb. F. 87.

= = 7. Bd. S. 134 *Lemnalis*. Hb. F. 83. 84.

#### Platte 33. S. 458.

\* Fig. 1. 2. Wahrscheinlich *Noct. pisi*. Tr. 5. Bd. 2. Abth. S. 128. Hb. F. 429.

Die Raupe, welche Reaumur auf vorstehender Tafel gab, bezieht er als eine *Mordraupe*, die er im May auf Eichen fand. Seine Beschreibung paßt ganz auf *Pisi*, während die Futterpflanze abweicht. *Pisi* fand ich nur auf niedern Pflanzenarten und der Weide. Auf Eichen habe ich sie nie gesehen, auch kenne ich sie nicht als eine *Mordraupe*. Vielleicht dürften Reaumur's Raupen auch *Noct. miniosa* seyn, doch wage ich nicht, sie hiesig zu erklären, weil die Beschreibung nicht paßt: denn Reaumur hätte gewiß die blaue Grundfarbe nicht übersehen, die *Miniosa* als Raupe führt.

—3. Eine mit Maden besetzte Raupe von *P. brassicae*.

—3—16. Keine Schmetterlinge.

#### Platte 34. S. 460.

Fig. 1. 2. Zwey vergrößerte aufgeschnittene und mit Maden besetzte Raupe von *Pap. brassicae*.

Fig. 3. Eine mit einer *Ächneumon*-larve besetzt gewesene Raupe von *Dispar* oder *Auricoma*.

\*—4. 5. Eine mit einer Made besetzte Wickler-raupe in der Kartendistel sammt der vergrößerten Made.

Fig. 6. 7. Eine Schlupfwespe, welche aus einem Gespinnst von *B. quercus* kam.

\*—8. Die Raupe von *N. rumicis*. Tr. 5. Bd. 1. Abth. S. 38. Hb. F. 9.

#### Platte 35. S. 462.

Fig. 1—22. Verschiedene Schlupfwespenarten und —

#### Platte 36. S. 464.

Fig. 1—20. Verschiedene Fliegenarten, welche sich aus größern Larvenarten entwickelten.

#### Platte 37. S. 465.

Fig. 1—19. Verschiedene Schlupfwespen, dann eine Käferlarve sammt ihrem Käfer.

#### Platte 38. S. 508.

Fig. 1—6. *Bomb. aesculi* in allen Ständen. Döschg. 3. Bd. S. 99. Hb. F. 202.

Sehr treu und gut abgebildet und beschrieben.

\*—7—10. *Pap. Iphis* in allen Ständen.

Die Raupen fand Reaumur in den Bohnen des Blasenbaums. Döschg. 1. Bd. 1. Abth. S. 310. Hb. F. 249—251.

Reaumur beschrieb diesen Falter sehr gut.

Den citirt in seiner N. G. 5. Bd. 3. Abth. S. 1109 und 1202 irrig *P. quercus*, auf welchen weder die Reaumur'sche Raupe noch der Schmetterling paßt.

—11—22. Wespen- und Mückenarten.

#### Platte 39. S. 510.

\* Fig. 1—3. Ein Wicker, mir fremd, in den Stengeln des Lattichs.

\*—4. Vielleicht eine verflogene oder verwischte *N. detersa*.

Den citirt in seiner N. G. 5. Bd. 3. Abth. S. 1195 *N. oleracea*. Da jedoch die Reaumur'schen Figuren 1—3. deutlich eine Wickler-raupe vorstellen, wie auch die Beschreibung sagt, so ist hier ein offenkundiger Fehler unterlaufen. Selbst die Figur 4. paßt nur sehr schwer auf *Oleracea*.

\*—5. 6. Eine mir fremde Wickler-raupe.

\*—7—10. Eine Wickler-raupe in den Köpfen der Kartendistel. Meine, auf Taf. 120. meiner neuen Beiträge abgebildete *Tortr. gentianana*. Tr. 8. Bd. S. 36. Hb. F. 12.

#### Platte 40. S. 512.

Fig. 1—10. *Tortr. pomana* in allen Ständen. Tr. 8. Bd. S. 161. Hb. F. 30.

—11. 12. Wahrscheinlich eine Raupe von *N. peltigera* oder *dipsacea*. Tr. 5. Bd. 3. Abth. S. 220. Hb. F. 311.

Reaumur gab von dieser Art keine nähere Beschreibung.

—13—19. Zwey mir unbekannte Schadenarten.

Der dritte Band von M's. *Memoires* enthält nur Microlepidoptern. Da jedoch die Abbildungen der Raupen und Schmetterlinge nicht treu und deutlich, so wie die Beschreibungen nicht klar genug sind, so wage ich es nicht, über diese kleinen Arten etwas zu sagen, um so mehr, als es mir durchaus an Zeit mangelt, mich dieser schwierigen Arbeit zu unterziehen. Möchten erfahrene Entomologen sich über diese Arbeit machen und ihr Resultat gleich mit theilen.

Augsburg.

C. S. Freyer.

## C o r n e l i a,

Taschenbuch für deutsche Frauen auf das Jahr 1839. Herausgegeben von A. Schreiber.

Heidelberg bey Engelmann.

Wir freuen uns immer, unsern Lesern die Erscheinung dieses schönen, herzlichen und nützlichen Taschenbuches anzeigen zu können. Es enthält sehr schöne Stahlstiche von Schüller, Fleischmann und Kosmäsler, Scenen aus den Gedichten und Erzählungen und das Abbild der Herzogin von Orleans. Die lieblichen Gedichte sind: auf dieses Bild, das Erwachen der Liebe, Laura, Heuchler, der Liebe Schwanenlied,

die Rache, die vermittelte Mutter. Die Erzählungen sind: die weiße Frau von Lina Reinhard; die Fremde, Novelle von W. Blumenhagen; eine einfache Geschichte von Curio; Liebe und Vaterland; historische Novelle von A. Schreiber; das befreite Rhodus, romantisch historische Sage von E. Zaminski. Das Taschenbuch ist ein angenehmes Geschenk für die Frauen.

## D i e D o n a u r e i s e

von der Eimündung des Ludwigscanals nach Constantinopel.  
Handbuch für Reisende von Ulm usw.  
von A. Schreiber.

Heidelberg bey Engelmann 1839. 8. 420 und 88.  
2 Gärten.

Die Dampfschiffahrt auf der Donau dient gegenwärtig nicht bloß dem Handelsstand, sondern dem Reisenden überhaupt. Die Bequemlichkeit, in kurzer Zeit nach Constantinopel und Griechenland zu kommen, und die Gelegenheit, so viele schöne Gegenden und interessante Orte zu sehen, fangen an, die Bereisung der Donau zur Mode zu machen. Daher war es an der Zeit, einen Wegweiser zu bearbeiten, welcher diese Reise lehrreich machen kann. Mit diesem Werk ist auch alles geschehen, was seine Absicht zu erreichen im Stande ist. Die Angaben der Merkwürdigkeiten sind zahllos, kurz und doch hinreichend. Man findet hier nicht bloß die Beschreibung der ganzen Donau, sondern auch eines großen Theils der Türkei, vorzüglich Constantinopels; so dann von ganz Griechenland und von den Inseln des Archipels. Eine Charte gibt den Donaulauf, eine andere die europäische Türkei nebst Griechenland und Italien. Wer diese Reise macht, kann dieses Handbuch nicht entbehren.

## V o l l s t ä n d i g e s L e h r b u c h

der gesammten Baukunst von L. Fr. Wolfram. Stuttgart bey Hoffmann. 1838. 4. III. 168, 44 Tafeln.

Von diesem umfassenden Werk haben wir schon mehrere Mal zu reden Gelegenheit gehabt. Dieser Band enthält die Jhs 1838. Heft 10.

Lehre von den Hochgebäuden, von ihren Formen und Größenverhältnissen in allen ihren massiven Theilen, in Abticht auf Schönheit, Zweck, Festigkeit, Dauer, Wohlfeltheit usw.; mit 644 Figuren, welche sehr sauber lithographiert sind. Es handelt von den krummlinigen Gestalten, von der Schönheit der Bauwerke insbesondere, von den Mauerkörpern, den Mauerwerken, insbesondere den Thüren und Fenstern, Feuerungen, Abtritten, Gewölben, von den verschiedenen Bauarten aller Völker und von der Stabilität der Futtermauern und Gewölbe.

## T a s c h e n b ü c h l e i n

der Dampfschiffahrt zwischen Rotterdam und Basel; für Schnellreisende. Von demselben.  
Ebenfalls. 1839. 8. 90. 12 Gärten.

Gibt kurz die Dinge an, welche an einem Orte merkwürdig sind; Gasthöfe, Zahl der Einwohner, Kirchen, Sammlungen, Fabriken, Taren, Afscher. Die 12 Gärten stellen den Rhein vor mit den Orten, welche beyderseits 3—6 Stunden davon entfernt liegen.

## H a n d b u c h

für Reisende nach Heidelberg und in seinen Umgebungen von Helmina von Hegy. Eben. 8. 164. 5 Tafeln.

Dieses ist die 3te Auflage von diesem bequemen und brauchbaren Wegweiser für Fremde und für Einheimische. Das Geschichtliche der Stadt mit einem Panorama, das Schloß, die

Umgebungen, Schwefingen und Mannheim, nebst Plänen der genannten Orte; außerdem Sagen und Gedichte.

### Freysburg im Breisgau

mit seinen Umgebungen, von Prof. Heinrich Schreiber. Freysburg bey Herder. 1838. Taschenformat. 444. 9 Stahlstiche, eine Karte und ein Plan.

Der für die Geschichte seines Vaterlandes ungemein thätige Verfasser bearbeitete diese Topographie im Auftrage der Bürgerschaft von Freysburg, um damit den Naturforschern bey der Versammlung 1838. ein Geschenk zu machen. Man hätte auch in der That keine bessere Wahl treffen können weder in Beziehung auf den Verfasser noch in Beziehung auf den Gegenstand. Niemanden sind sowohl die älteren als die neueren Verhältnisse der Stadt und der Gegend so bekannt, wie diesem Geschichtsforscher des Breisgaus, und nichts konnte den fremden Gästen von solchem Nutzen seyn, wie ein Wegweiser durch diese schöne und mannichfaltige Landschaft, zugleich so reich an Denkmälern der Geschichte und der Kunst, an alten Grabhügeln, an Burgen, Kirchen, an Anstalten des Gewerbfleißes, an Wasserwerken und Fabriken, an mineralogischen Merkwürdigkeiten, an milden Anstalten und an wissenschaftlichen Sammlungen. Die Schrift beginnt mit der Geschichte der Stadt und ihren mannichfaltigen Schicksalen. Sie wurde gegründet unter Berthold dem III. von Zähringen im Jahr 1120. und bekam eine Verfassung nach dem Muster von Göln. Dann folgt die Schilderung der natürlichen Beschaffenheit, Lage, Klima, Geognosie, Pflanzen- und Thierreich von den Professoren Perleb, Fromberg und Spenner. Darauf folgt die Beschreibung der Stadt selbst mit ihren Gebäuden, Gassen, Bächen usw.; sodann die Verhältnisse der Bevölkerung (Seelenzahl 12523), Erwerbszweige, Behörden und Unterrichts-Anstalten (die Universität wurde gegründet 1454), Wohlthätigkeits-, Sicherheits- und Unterhaltungsanstalten, wie Lesegesellschaften, Theater, Musik usw. Dann folgt die Beschreibung der Gegend, Spaziergänge, Vergnügungsorte, entferntere Ausflüge usw. Die Stahlstiche stellen vor: die Stadt, merkwürdige Gebäude und Gegenden; dabey ist noch ein Plan der Stadt und eine schöne Karte mit der Umgegend im Durchmesser von sechs Stunden von dem berühmten Geographen Wörl, mit Benutzung der von Michaelis aufgenommenen Karte. Sie leistete den Naturforschern bey ihren vielen Excursionen wesentliche Dienste, besonders da die meisten Wege und Bäche angegeben waren, was bey einer Excursionen-Karte das Wesentliche ist. Nur hin und wieder über man in der Ferne und zwar grad in der Nähe der Stadt. Bey einem neuen Abdruck ist zu rathen, diese Auslassungen zu verbessern. So fehlt der Weg von Dyingen nach Madingen im alten Wege nach Brieslach, der Weg vom Hoheneckbuck nach St. Nicolaus, der von Buchenbich über Neßellachen nach Breitnau, jeder Weg auf den Schauinsland und den Feldberg; die Bäche im Moos liegen unrichtig usw.

### Das Wesen

des Menschen und sein Verhältniß zu der Außenwelt. Aus dem Englischen des H. Combe von Dr. C. Hirschfeld. Bremen bey Pops. 1838. 8. 423, mit Holzschnitten.

Dieses Werk ist in philanthropischem Sinne geschrieben und mehrmals aufgelegt worden, und zwar in Folge eines dafür bestimmten Vermächtnisses. Es ist in England unter allen Volksschlägen verbreitet, und scheint auch in hohem Grade geliebt, dieselben über ihre Bedürfnisse und Hülfsmittel aufzuklären, und bey ihnen einen gestifteten und glücklichen Zustand hervorzubringen. Der Verfasser legt großen Werth auf die gallische Gehirnlehre, und gibt mehrere Holzschnitte, welche sich darauf beziehen. Er hat große Kenntnisse von dem Leben und Wesen der Menschen wie auch der Thiere, und weiß dasselbe mit Interesse darzustellen. Voran geht ein allgemeiner Ueberblick über das Wesen der menschlichen Natur und über die Verhältnisse derselben zu den Gegenständen außer ihr. Dann folgt eine Darstellung der Naturgesetze und ihrer Anwendung auf die practischen Einrichtungen des Lebens, des Etens unter den Menschen durch Uebertretung der Naturgesetze; über die Quellen des menschlichen Glücks, über die Strafe, das Verhältniß zwischen Wissenschaft und Offenbarung usw. Wir glauben, daß die Verbreitung dieses Werks unter dem Volke, so wie unter den Gebildeten von großem Nutzen seyn wird.

### Ausflug nach Böhmen

und die Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte in Prag im Jahr 1837. aus dem Leben und der Wissenschaft von Professor Jacob Bögger a. d. Bonn bey Weber. 1838. Taschenformat. 480.

Diese Schrift wurde veranlaßt durch des Verfassers Reise zur Versammlung der Naturforscher, wozu er sich mehr Zeit genommen hat als gewöhnlich.

Er hielt sich daher überall, wo etwas Merkwürdiges zu sehen war, so lang auf als nöthig war, um seine Wissbegierde zu befriedigen, sey es bey historischen Denkmälern oder in naturhistorischen Sammlungen oder in geognostisch-wichtigen Gegenden. Die Erzählung ist in Briefen aufgeführt und schon in dieser Form angenehm zu lesen, mehr aber durch ihren lehrreichen Inhalt jeder Art, sowohl für den Freund schöner Gegenden und der Kunstgegenstände überhaupt, als für den Gewerbsmann, den Fabrikanten und Bergmann, und endlich für den Geognosten insbesondere. Der erste Brief ist von Frankfurt und enthält manches über die dortigen Sammlungen, welche besonders Rappell und Hermann v. Meyer zusammengebracht haben; über die Basalte der Umgegend, über die Gemälde im Sächsischen Kunst-Institut unter Welt, die Banlust und die schönen Anlagen. Ebenso handelt der zweyte Brief von den Sammlungen, Anstalten und alten Gebäuden zu Würzburg, Bamberg und Bayreuth; der dritte vom Fichtelgebirge, der Perlenschnecke, Wunsiedel, Alexandersbad, Urfeld, porphyrischer Granit, crystallisierter Speckstein. Der vierte Brief handelt von Eger, Marienbad, und zwar ziemlich ausführlich



über die Natur des dortigen Bobens und der Quelle; der Ste wieder von Eger, besonders von Wallenstein's Ermordung und dem vulcanischen Kammerbühl; der sechste von den Mineralquellen zu Franzensbad; der siebente von Elbogen, der dortigen Meteorite; Haibingers Porcellanfabrik, Stark's chemische Fabriken; der Ste von Karlsbad, seinen Quellen und Gebirgsarten; der neunte von Prag und den Vorbereitungen zur Versammlung; der zehnte von den Versammlungen selbst; der elfte von den vielen Anstalten und Sammlungen in Prag; der zwölfte wieder von den Vorträgen in den Versammlungen, besonders aus dem physikalischen und geologischen Fach; der dreizehnte von den Festlichkeiten zur Ehre der Naturforscher; der vierzehnte von den Abschiedsreden. Der fünfzehnte gibt eine Uebersicht der Verhandlungen in den Fachabtheilungen. Der sechzehnte handelt über die böhmische Industrie; die siebenzehnte von Bauwerken in Prag; der achtzehnte vom Bergbau zu Příbram; der neunzehnte von einem Besuche beim Grafen von Sternberg zu Brzežina, die Eisen- und Kohlengruben daselbst; die zwanzigste und 21ste von Bilin, den böhmischen Bergwerksgelegen; der 22ste von Těplá, der sächs. Schweiz und von Dresden; der 23ste von Tharand, Meissen usw. besonders in geognostischer Hinsicht; der 24ste von Freiberg, Eisenach, dem Basalt des Staffelsbergs usw.

Diese Schrift ist daher ein angenehmes Geschenk für jeden Freund unterthätlicher und lehrreicher Kenntnisse, besonders für die Mineralogen.

### Gemeinnützige Naturgeschichte

von Dr. H. D. Lenz. Gotha bey Becker. IV. 1. 1838. 8. 710. 10 Tafeln.

Die zoologische Abtheilung dieses besonders dem Volke nützlichen Werkes haben wir schon nach Verdienst angezeigt. Der vorliegende Band enthält die Pflanzen mit Blüten, von denen die nützlichen weitläufiger behandelt sind. Besonders ist die Einleitung über die Terminologie, die Physiologie und hauptsächlich über die Behandlung der Pflanzen interessant. Dem besondern Theil ist das sinnliche System zum Grunde gelegt, was wir bey Werken, welche das ganze Pflanzenreich umfassen und zunächst nicht bestimmt sind zur schnellen Aufsuchung der Namen, sondern zur Einsicht in das Pflanzenreich selbst, nicht billigen möchten. Hier wäre das natürliche Pflanzensystem ganz an seinem Platze, weil es darauf ankommt, die übereinstimmenden Kräfte, Wirkungen und Benutzungen beyammen zu haben, auch das Volk wirklich das Aehnliche zusammen stellt, ohne alle Rücksicht auf künstliche Unterschiede, von denen es nichts weiß und die es auch nicht behalten kann. Dann sind unsers Erachtens viel zu viel Pflanzen aufgenommen, was zu nichts taugt als zu Verstreckung der brauchbaren Pflanzen und zur Erschwerung des Gedächtnisses. Was soll dem Volke der bloße Name mit dem Character, wenn weiter nichts davon zu sagen ist. Auch ist es nicht gut, daß die Gattungen im Texte fortlaufen und nicht abgesetzt sind. Man muß auch auf die Bequemlichkeit in der Benutzung des Buches sehen. Dieses abgerechnet kann man der Schrift nicht anders als Lob zollen. Bey jeder

brauchbaren Pflanze ist alles Nützliche angegeben und besonders ist Rücksicht auf diejenigen genommen, welche angepflanzt werden, oder welche irgend ein brauchbares Material liefern; selbst die Behandlung ist nicht vergessen. Die Schrift wird daher gewiß ihren Zweck erfüllen und den beabsichtigten Nutzen stiften ungeachtet der kleinen Unbequemlichkeiten, welche wir glauben anzeigen zu müssen.

### Verhandlungen

der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen in der sechsgehten allgemeinen Versammlung am 18ten April 1838. Prag. 1838. 8. 711/6 Tafeln.

Die Thätigkeit dieser Gesellschaft, welche in so wenig Jahren eine wirklich ersauenswürdige Sammlung von allen Gegenständen der Natur, Kunst und Wissenschaft hergestellt hat, ist hinlänglich bekannt.

Die Versammlung der Naturforscher und Aerzte im Jahr 1837. hat Gelegenheit gehabt, sich zu ihrer Freude davon zu überzeugen. Es hat sich in Prag ein Centrum gebildet, welches nicht bloß den Böhmen, sondern auch allen Natur- und Geschichtsforschern einen sichern Halt geben und reichhaltigen Stoff für alle Zukunft liefern wird.

Dieses Heft beginnt mit einem Vortrag des Geschäftsleiters, Grafen F. von Mollitz, worin Rechenschaft über die Arbeiten und die Vermehrung der Sammlungen abgelegt wird. Das Capital beträgt gegenwärtig über 123,000 fl. Im vorigen Jahr wurden ausgegeben über 10,000 fl.

Dann folgt eine Rede des Präsidenten R. Grafen Sternberg über die Fortschritte in der Naturgeschichte, über die Zahl der gegenwärtig bekannten Thiere, sowohl lebenden als versteinerten; von versteinerten Pflanzen hat bloß Sternberg gegen 700 beschrieben. Der Verfasser schlägt die ganze Zahl auf 1000 an.

Dann folgen einzelne Vorträge.

S. 26. R. B. Presl, Beiträge zur Kunde vorweltlicher Pflanzen L. 1. 2. *Volkmania elongata, sessilis*; *Rotalia marsileae folia*, characterisirt und genauer beschrieben.

S. 31. Zippe, die Mineralien Böhmens, nach ihren geognostischen Verhältnissen geordnet. Aus den Endeten viele Mineralien, meist crystallographisch bestimmt.

S. 48. W. Hanka, Münzen und Medaillen des hochgräflich Schlickischen Hauses. 24. Stück, abgebildet auf Tafel 3—6.

S. 66. W. Haidinger, über ein interessantes Vorkommen von Kalkspath im Basalttuff bey Schlackenwerth, mit einem Holzschnitt nebst einem Zusatz vom Grafen Sternberg über Baumstämme in demselben Tuff.

## Mittheilungen

aus den Verhandlungen der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. 2. Jahrgang. 1837. Berlin bey Nicolai. 8. 36.

### Bericht

über die Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Zürich vom April 1836, bis Ende 1837; vom Actuar der Gesellschaft Ferd. Keller. Zürich bey Dreß. 1838. 8. 90.

### Bericht

über die Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel von 1836, bis Mitte 1838. III. 8. 96.

Diese drei Berichte geben ein löbliches Zeugniß von der Thätigkeit und dem Nutzen dieser Gesellschaften. Die Vorträge erstreckten sich auf alle Theile der Naturwissenschaften, Physik, Chemie, Naturgeschichte, Anatomie, Physiologie, Medicin und Economie, und entfalteten nicht selten neue Entdeckungen, welche beachtet zu werden verdienen.

## Mémoires

de l'Académie impériale des Sciences de St. Petersbourg VI. 6. serie. Tom. IV. partie 2. Sc. nat. II. Livr. 1—3. 1836. Leipsic chez L. Voss. 4.

Livr. 1. p. 107.

Trinius, graminum in hisce actis a se editorum generibus ac speciebus supplementa.

Ein großer Aufsatz, der bis zum Ende läuft, mit einer Uebersicht der Sippen, ihrem Character und dem der Gattungen nebst Citaten und Beschreibungen.

Livr. 2. p. 1—94. 8 tab. col.

Parrot, académicien. Essai sur les Ossements fossiles des bords du lac de Burtnick en Livonie.

Ebenfalls ein sehr großer Aufsatz, der durch das ganze Heft läuft. Zuerst die geognostische Beschreibung, dann die Schilderung der Knochen, sehr genau nebst Abbildungen.

Dabei kommen auch Corallen vor und zwar von sehr verschiedenen Sippen. Den Schluß machen Folgerungen. Es sind colossale Säugethiere, Lurche und Fische, welche aber nicht näher bestimmt sind. Auch sind Zeugmente darunter.

Livr. 3. p. 97—235. 1 Carte.

R. E. von Baer, anatomische und zoologische Untersuchungen über das Walroß und Vergleichung dieses Thieres mit andern Seesäugethiere.

Ebenfalls ein großer Aufsatz, welcher durch das ganze Heft läuft und die gesammte Naturgeschichte dieses merkwürdigen, noch keineswegs hinlänglich bekannten Thieres in sich begreift, mit einer Gründlichkeit, wie man sie längst von diesem thätigen und geistreichen Schriftsteller gewohnt ist. Sowohl das Zoologische als das Historische ist mit ungemeiner Voll-

ständigkeit behandelt, wie es noch kaum bey einem andern Thier gesehen ist. Die Kenntnisse davon aller Schriftsteller seit den ältesten Zeiten sind ausführlich angegeben. Die Veranlassung zu dieser Arbeit gab ein junges Walroß, welches lebendig nach Petersburg gebracht wurde, aber leider bald starb. Der Verfasser hat es, soviel als thunlich war, anatomirt, und mit andern Thieren, besonders Robben, Kamantinen und Pachydermen verglichen.

Er schildert die Lebensart und zeigt besonders, daß es kein Wasser aus der Nase bläst, wie es Martens gesehen haben will. Man fütterte es mit einer dicken Suppe aus Hafergrübe und zerschnittenen Möhren. Es kannte seine Wärter und zeigte ihnen Anhänglichkeit; war überhaupt sehr zahm, wie man auch solche Beispiele von Robben und Kamantinen hat. Er glaubt, daß ihre Hauptnahrung in Muscheln bestehe.

Nach Darstellung der Geschichte bestimmt er besonders genau die Verbreitungsbezirke im Osten von Asien und im Westen von Europa. Dazu die Karte, auf der man aber mehr Namen, besonders der Flüsse, zu sehen wünscht. Die speciell Anatomie ist noch nicht gegeben.

## Mémoires

présentés à l'Académie impériale des sciences de St. Petersbourg, par divers savants. Petersbourg chez Graeff. (à Leipsic chez Voss) III. 1837. 4. 774. 31 planches.

Dieser Band enthält mehrere, meistens sehr große und wichtige Abhandlungen, wovon wir das uns Betreffende näher angeben werden.

§. 1. Lütke, Observations du pendule invariable. 4 planches.

— 243. Lütke et Haelström: observationes barometricae et sympiesometricae.

— 269. *idem*: Calor tropicus.

— 279. Löwenstern: Anwendung der gaußischen Integrationsmethode auf die vielfachen Integrale.

— 291. H. Rathke: Beytrag zur Fauna der Krpm. 10 Tafeln.

Der Verfasser machte seine Reise im Jahr 1833. Wirbellose Wasserthiere gibt es daselbst wenig, nur zwei Escharen, nur eine Actinia, 3 Scheibenqualen, wenig Dorsienwürmer, aber viele Crustaceen und Mollusken, welche letztere nebst den Insecten Dr. Kutorga beschreiben wird. Keine Doris, Ascidia, Aplysia oder andere nackte Mollusken, nur 3 Ecton; dagegen mehrere Schalenmuscheln und Muscheln, alle klein. Die Mytili kommen in Menge auf die Klippen und werden von den Griechen gegessen, so wie Patellen. Nach Swastopol kommen auch gute, aber kleine Austern auf den Markt. Käfer und Schrecken sehr viele, wenig Falter, Wolbe, Immen und Muden; besonders wenig Schmetterlinge, weil es wenig stehendes Wasser gibt. Wanzen wenig, aber viele Bettwanzen, so wie Kibbe, und zwar auch ein gelb und schwarz gefleckter. Julius

sabulosus; Scolopendra morsitans; Scutigera longipes; Scorpio occitanicus; Tarantel. Land- und Süßwasser- Schnecken sehr viele.

### I. Säugethiere.

- 1) *Vespertilio barbastellus*.
- 2) *Sorex suaveolens* Pallas (*etruscus*?).
- 3) *Arctomys citillus*.
- 4) *Cervus elaphus*, sehr selten.
- 5) *Capra hircus*.
- 6) *Ovis aries*.
- 7) *Delphinus phocaena*, *tursio*; seltener *D. delphis*.

### II. Lurche.

- 8) *Bufo variabilis*.
- 9) *Testudo orbicularis* (europaea).
- 10) *Lacerta viridis*, ausführlich beschrieben.
- 11) *Lacerta taurica* (Podarcis), dergleichen, Tab. 2, Fig. 1—4. Kopf; der *L. muralis* sehr nahe verwandt.
- 12) *L. grammica* (Podarcis), dergleichen.
- 13) *L. apoda* frisst Käfer und Landschnecken.
- 14) *Coluber hydrus*, Tafel 1. Figur 1—7. Kopf, dergleichen.
- 15) *Col. trabalis* (Haemorrhoidis). Taf. 1. Fig. 8.

### III. Fische.

- 16) *Raja pastinaca* wird nicht gegessen; 17) *pontica*. Taf. 9 u. 10. ausführlich beschrieben.
- 18) *Spinax acanthias*.

Syngnathus müssen in mehrere Sippen getheilt werden: der *S. ophidion* und die ihm ähnlichen dünnen und langen Fische weichen nicht bloß in ihrer Organisation, sondern auch dadurch ab, daß sie ihre Eier nicht unter dem Schwanz, sondern unter dem Bauche ausbrüten. Nisso hat sie daher mit Recht als besondere Sippe, *Scyphius* aufgestellt. Wey allen andern ist die hintere Hälfte des Schwanzes vierkantig, auch bey *S. acus*; ferner am Rumpfe siebenkantig, nur ist die ungerade Bauchkante nicht immer deutlich ausgebildet. Die besten Charaktere für die Gattungen sind Farbe, Zahl der Flossen, Form und Länge des Rüssels, Form der Seitenschilder, Unterbrechung der Seitenkante in ihrem Uebergang zur oberen Schwanzkante; Rückenflosse vor oder über dem After.

Die Kiemen sind gebaut wie bey andern Fischen, nur viel dicker und weniger, aber nicht quastenförmig. Schwimmblase einfach ohne Gang, Harnblase lang. Das Organ, worinn die Eier ausgebrütet werden, wird gebildet, indem unten an der vordern Hälfte des Schwanzes rechts und links eine Hautfalte entsteht, die dann allmählich breiter und dicker wird und der ihr gegenüber liegenden entgegenwächst, bis sie dieselbe endlich berührt. Zugleich mit den Eiern gelangt in die Höhle, die von diesen beyden Falten an der untern Seite des Schwanzes gebildet wird, eine von den Eierstöcken abgesonderte Flüssigkeit, die, wenn sie mit dem Wasser in Berührung kommt, gerinnt, und

Stfö 1838. Heft 10.

theils die Ränder der beyden Falten unter einander verklebt, theils die Eier unter einander und mit ihrer Umgebung zusammenkittet. Haben die Jungen ihre Ephyllie verlassen: so wird, jedoch erst geraume Zeit nachher, jene geronnene Substanz wieder aufgelöst und erweicht, worauf die beyden Falten auseinander weichen und nun allmählich auch, wann die Jungen die Bruthöhle verlassen haben, wieder dünner und schmaler werden, bis sie zuletzt gänzlich verschwinden.

Alle achten Syngnathen aus dem schwarzen Meer haben Brust-, Rücken-, Schwanz- und Afterflossen.

19) *Syngnathus tenuirostris* n. pl. 2. f. 11. 12.: Rostro longo compresso, angusto, scutorum carinis crenulatis, trunci scutis lateralibus hexagonis, angulis lateralibus continuus.

Färbung rothbraun, mit dunkelbraunen Binden, Kiemenbedeck silberig, Bauch und Schwanz weißlich. R. 37. Br. 13. Sch. 10. St. 3. Länge  $8\frac{1}{2}$ ", Gürtel 18 am Rumpfe, 44 am Schwanz. Vielleicht *S. ponticus* Pall.

20) *S. variegatus* Pall. tab. 2. f. 78: Rostro longo compresso, latiore, scutorum carinis subcrenulatis; trunci scutis lateralibus rhomboideis; angulis lateralibus postice interruptis.

Größer als *S. tenuirostris*,  $12\frac{1}{2}$ ", Gürtel am Rumpfe 18, am Schwanz 38.

21) *S. argentatus* Pall. t. 2. f. 6.; Rostro longo, late cultrato; scutis lateralibus discoideis; trunci angulis lateralibus postice interruptis.

Länge 11", Gürtel 18 und 35, ähnlich dem *S. viridis*.

22) *S. bucculentus* n. t. 2. f. 9. 10: Rostro brevi, subcylindrico, trunci scutis lateralibus hexagonis, angulis lateralibus continuis; operculis branchialibus turgidis.

Länge 6", Br. 13, R. 36, Sch. 10, St. 3; dem *S. rondeletii* de la Roche sehr nahe verwandt.

23) *Scyphius teres* n.: corpore tereti, flavesciente, punctis nigricantibus confertissimis adperso, rostro subconico; cauda acutissima.

Färbung strohgelb. Länge 6", Gürtel 30 am Rumpfe; Rückenstrahlen 32; vielleicht *Sc. papacinus*.

24) *Cottus anostomus* Pall. In Menge auf dem Markte zu Sebastopol; ist kein *Uranoscopus*; ähnlich dem *Cottus scorpius*.

25) *Callionymus festivus* Pall. selten und schön. Länge  $3\frac{1}{2}$ "; Färbung grau; Schwanzseiten gelblich mit bläulichen und schwarzen Binden. Wahrscheinlich *C. admirabilis*.

26) *Gobius batrachocephalus* P. Länge  $6\frac{3}{4}$ ".

27) *G. ophiocephalus* P. R. 6. 13. Länge 7".

28) *G. platyrostris* P. Länge  $4\frac{3}{4}$ ".

29) *G. cephalarges* P. Länge  $6\frac{1}{2}$ "; *melanostomus* P. Länge 5"; *exanthematosus* P. — Br. 17, R. 10. St. 16. Sch. 18. 2te Rückenflosse 18. Länge  $3\frac{1}{2}$ ".

32) *P. melanio P.*; *marmoratus P.*, verschieden von dem gleichnamigen im Mittelmeer des Risso. Länge  $2\frac{3}{4}$ ''.

Die Gobii des schwarzen Meeres sind alle verschieden von denen des Mittelmeers; alle haben 5 Kiemenstrahlen.

34) *Blennius lepidus P.* Länge  $4\frac{1}{4}$ ''; *Bl. sanguinolentus P. R.*  $5\frac{1}{2}$ ''; keine Schwimmblase, Sch. 16. St. 21.

36) *Bl. minutus n.* *Cirris supraciliaribus bifidis*; *corpore virescente, maculato*; *pinnis ventralibus longiusculis*.

Länge  $2\frac{1}{2}$ ''; Br. 2. B. 13. R. 34. Sch. 12. St. 22.

37) *Bl. ventrosus n.*: *Cirris supraciliaribus quadrifidis*, *narium bifidis*; *corpore virescente, maculato, ventroso*; *dorso carinato*.

Länge  $3\frac{1}{2}$ ''; Br. 2. B. 13. R. 33. Sch. 13. St. 21. Vielleicht einerley mit *B. minutus et auritus*.

38) *Gadus jubatus P.* Länge  $2\frac{1}{2}$ ''; hat das Geßiß von *Lota*.

39) *Scomber trachurus P.* Ist der kleine *Caranx trachurus*. St. 3 stachelige und 26 weiche, Br. 21 weiche, zweite Rückenflosse 1 stacheliger und 30 weiche. Länge  $5\frac{1}{2}$ ''; Schilber 41.

40) *Sc. ponticus P.* Gehört unter *Pelamys*.

41) *Sc. glauciscus P.* = *Sc. scomber P.* 12 u. 12.

42) *Mugil atherina P.* = *Atherina hepsetus*.

43) *Scorpaena porcus*.

44) *Sciaena gymnodon P.* = *Smaris vulgaris*.

45) *Sc. melanura P.* = *Sargus annularis* Sch. 17. St. 10 oder 11 weiche.

46) *Coracinus chalcis P.* = *Corvina nigra*.

47) *Labrus rufus n.*: *Corpore rufo, fusco reticulato*; *pinnis pectoralibus flavescensibus*; *maxilla inferiore operculisque colore argenteo maculatis*.

Länge 20'', R. 18 harte, 12 weiche, St. 2 harte, 10 weiche, Br. 15 weiche, B. 1 harter, 5 weiche, Sch. 14 weiche.

48) *L. polychrous* = *Crenilabrus lapina*.

49) *L. aeruginosus P.* Ist ein *Crenilabrus*, wie *Cr. venosus*. Länge  $4\frac{1}{2}$ ''; R. 15, 9, St. 3 + 10, Br. 13, B. 1 + 5, Sch. 15.

50) *L. perspicillatus P.* Ein *Crenilabrus*. Länge  $4\frac{1}{3}$ ''; R. 14 + 10, St. 3 + 10, Br. 12, B. 1 + 5, Sch. 15; vielleicht *Crenilabrus olivaceus*.

51) *L. fuscus P.* Ein *Crenilabrus*, fast 4'', R. 14 + 10, St. 3 + 9, Br. 13, B. 1 + 5, Sch. 13, R. 5. Ist einerley mit *L. capistratus et fraenatus P.*; vielleicht alle 3 = *Cr. cinereus*.

*L. simus et prasostictes* sind *Crenilabri*.

Die Spazi des schwarzen Meeres gehören zu *Chromis*.

52) *Cyprinus persa P.*? Gehört zu *Leuciscus*, und

zwar zu derjenigen Abtheilung, bey welcher die Rückenflosse zwischen der Bauch- und Steißflosse steht. Länge  $5\frac{1}{2}$ ''; Rücken bläulich; Seiten silberig, Bauchflossen weiß, die Ränder der andern blau. Br. 1 + 15, R. 1 + 9, Sch. 21 nebst viel kleineren oben und unten, St. 2 + 16, B. 1 + 9.

53) *C. chrysoprasiu P.* zu *Leuciscus*, wie *C. phoenix*; R. 1 + 7 zwischen B. u. St.

54) *Pleuronectes nasutus P.* wie *Solea lascaris*, aschgrau, rechte Brustflosse, vorn grau, hinten schwarz. R. 68, Br. 18, B. 5, St. 58, Sch. 18. Länge  $6\frac{1}{2}$ ''.

55) *Pl. luscus P.* zu *Platessa*. L.  $6\frac{1}{3}$ ''; R. 60, St. 42, Br. 13, B. 6, Sch. 18.

56) *Pl. maeoticus P.* zu *Rhombus*. L. 2'; in beyden Bauchflossen 6 Strahlen.

57) *Rhombus torosus n.*: *Oculis sinistris, latere sinistro sparsis scutulis, ellipticis parum prominulis verrucoso*. In Menge. Etwas kleiner als der vorige, 14''. R. 64, St. 45, Sch. 17, B. 6, Br. 11.

58) *Rh. rhombitis n.*: *Oculis sinistris, latere sinistro spatulis conoideis verrucoso*. Länge 5'', R. 62, St. 48, Sch. 17, B. 6, Br. 11.

59) *Platessa glabra n.*: Größe wie *Pleuronectes luscus*. Augen rechts. Br. 10, St. 42, Sch. 18, R. 59. Rechte B. 6, linke 5.

60) *Lepadogaster biciliatus*, Risso. Länge  $2\frac{2}{3}$ ''; Br. 18, B. 4, Sch. 20, St. 10. Häufig.

#### IV. Crustaceen.

61) *Carcinus maenas* kommt im Frühjahr häufig auf den Markt.

62) *Grapsus varius*, am meisten verbreitet.

63) *Eriphia spinifrons*, der größte dortige Krebs, kommt in Menge auf den Markt.

64) *Portunus dubius n.?* t. 3. f. 1 — 3. *Testa subgranulata, fronte quinque dentato, dente intermedio minori, carpis interne unispinosus*; gleicht dem *P. holsatus* et *vernalis*. Länge 1'', Br.  $1\frac{1}{4}$ ''; *Leachs P. depurator* = *P. plicatus*. *Portunus lividus Leach* sey einerley mit *P. holsatus*; ist aber verschieden von der neuen Gattung.

65) *P. longipes*, t. 3. f. 4 — 6. Rückenschild  $\frac{3}{4}$ ''; Br. 1.

66) *Cancer (Xantho) rivulosus* t. 3. f. 7 — 9. Selten.

67) *Telphusa fluviatilis*. In Menge in Gießbächen.

68) *Porcellana (Pisidium) longicornis*. Häufig in den Buchten.

69) *Pagurus diogenes*, nur 7''' lang; stecken in einem kleinen *Cerithium*; nicht selten.

70) *Astacus leptodactylus* Eschscholtz t. 4. f. 1. 2. *Clypeo thoracis muricato turgido, chelis depressis, marium elongatis*. Länge 6''. Im Bug.

71) *Astacus angulosus* n. t. 4. f. 3. Clypeo thoracis ad latera muricato, anguloso; Chelis depressis latis. In der Krümme. Gaßt wie der vorige, und beyde wie der gemeine. Länge  $4\frac{1}{4}$ ''.

72) *Astacus pachypus* n.; Clypeo thoracis glabro, chelis magnis crassiss, robustis. Länge 4''. Vom gemeinen kaum verschieden.

73) *Crangon maculosus* n.: Thorace pone rostrum et utrinque unispinoso, rostro brevi edentulo, abdomine maculis fuscis, majoribus.  $2\frac{1}{2}$ ''.

74) *Palaemon adpersus* n., t. 4. f. 4. Rostro longo, sursum inflexo, supra 5—6 dentato, infra 3—4 dentato, corpore impellucido, minutissimis maculis fuscis ornato. Länge  $2\frac{2}{3}$ ''.

75) *P. elegans* n. t. 4. f. 5.: Rostro longo, sursum inflexo, supra 6—9, infra 3—4 dentato, corpore diaphano. Länge  $1\frac{2}{3}$ '. Häufig.

76) *Orchestia littorea* t. 5. f. 1—6, Theile. Länge 7'''. Ist abgebildet in Description de l'Egypte t. 2. f. 7.

77) *Gammarus pulex*. In Menge.

78) *G. locusta* t. 5. f. 11—14. Theile, 10'''. In Menge im Meer.

79) *G. gracilis* n. t. 5. f. 7—10. Theile. Corpore depresso, gracili, stylis abdominalibus ultimis longissimis, ramis eorum admodum inaequalibus. Länge  $4\frac{2}{3}$ '''. In Menge im Meer.

80) *Amathia novum Amphipodum* genus; wie *Gammarus*, aber die untern Füßhörner länger.

Thorax subelyndraceus, abdomen compressum. Antennae quatuor inaequales; superiores inferioribus paulo breviores, earum quaevis ex articulis tribus atque flagello composita; superiores cum ramo parvo accessorio juxta flagelli basin. Oculi magni, reniformes. Pedes quatuordecim; duo eorum paria antica chelis monodactylis complanatoribus, subaequalibus. Stylorum abdominalium paria tria. Abdominis appendicula terminalis simplex, erecta, lamelliformis.

Länge 7''', im Meer. Abgebildet Ganzes und Theile.

81) *Hyalæ novum Amphipodum* genus.ähnlich der *Melitta* et *Maera*, aber die obern Füßhörner kürzer als die untern.

*Corpus elongatum compressum. Antennae inferiores superioribus aliquantulum longiores; earum quaelibet e tribus articulis atque flagello composita. Oculi disciformes. Pedes quatuordecim: duo eorum paria antica chelis monodactylis complanatis, secundi paris multo majoribus. Stylorum abdominalium paria tria. Abdominis appendicula terminalis simplex, erecta verruciformis.*

*Hyalæ pontica* t. 5. f. 20—28. Ganzes und Theile. Länge 4'''. Im Meer.

82) *Amphithoe picta* n. tab. 5. fig. 15—19. Theile: Corpore laevi; pedum duobus paribus anticis subaequa-

libus, chelis eorum minimis. Länge 5'''. In Menge im Meer.

83) *Idothea basteri* Audouin. Ist eines der verbreitetsten und überall in Menge unter Steinen, des Winters und Frühlings, tiefer im Meer im Sommer. I. variegata, tricuspidata, emarginata, nicht verschieden; I. cuspidata das Männchen. Länge 9''.

84) *Leptosoma capito* n. t. 6. f. 7—9.: corpore attenuato, subelyndraceo; capite supra turgido; thoracis articulis utrobique tumidis; abdomine hastiformi, obtuso, aequo. Gleich dem *Leptosoma lanceolatum*.

85) *Ligia brandtii* n. t. 6. f. 6.: Antennis exterioribus corpore brevioribus; corpore ovato; appendicum caudalium articulo basali longiore tetragono. Länge 5'''. Häufig im Meer.

86) *Porcellio pallasii* Brandt.

87) *Armadillidium pallasii* Brandt. In Menge, unter Steinen, und oft darunter einige *Scorpio occitanicus*, welche sich wahrscheinlich davon ernähren.

88) *A. commutatum* Brandt.

89) *Armadillidium* Br.

90) *Armadillo officinarum* Br. Nicht selten.

91) *Janira nordmanni* n. t. 6. f. 1—5.: Corpore lato, diffuso, incolorato pellucido. In Menge im Meer an Kalksteinen, kugelt sich nicht. Länge 3''', sehr breit; Eyer unter dem Bauche in einer Bruthöhle.

92) *Sphaeroma serratum* s. cinereum; häufig im Meer. Länge 5'''; verschieden gefärbt.

93) *Campecopea bicolor* n. t. 6. f. 12. 13.: Corpore glabro, nitido, convexo; thorace flavescens; capite et abdomine fuscis; thoracis sexto segmento spinis tribus inaequalibus et abdominis ultimo segmento bituberculato, tuberculis obsoletis; appendicum caudalium ramo inferiore subtriangulari. Länge 2'''. Seiten.

94) *C. versicolor* n. t. 6. f. 10. 11.: Corpore glabro, convexo, fusco, flavo viridique colore picto; abdominis extremitate profunde sinuata; appendicum caudalium ramis ambobus subovatis.

Länge  $2\frac{1}{3}$ '''. Seiten.

95) *Cymothoa oestrum*. In der Mundhöhle von *Olepea pilchardus*.

96) *Bopyrus squillarum*. Häufig im schwarzen Meer. Nistet sich bei *Palaemon adpersus* et *elegans* zwischen Kiemen und Kiemendeckel (dem Seitentheile des Rücken-schildes) ein. Lebensweise in meinen *Miscellanea anat. physiologica* II. Das Weibchen ist im reifen Zustande wegen seiner kurzen Beine unfähig zu kriechen und zu schwimmen, wohl aber das schlanke Männchen. Es ist nur  $\frac{1}{5}$  so lang und sitzt immer ganz unbeweglich zwischen den beyden Kiemenreihen des Weibchens selbst, wenn dieses seine Eyer brütet. Von Greifwerkzeugen bey beyden nichts als eine Unterlippe. Die sogenannten Kiefer sind nichts anders als die beyden Paare kleinen

**Fühlhörner an der untern Seite des breiten Kopfes**, bestehend aus 2 Gliedern. Das Weibchen liegt an der Kiemenbede, den Kopf vorwärts, verbrundet wahrscheinlich mit der spitzigen Unterlippe, die weiche, hautartige Auskleidung derselben und saugt. Das Männchen berührt mit der Lippe den schmalen Damm zwischen After und Eiermündung des Weibchens und ernährt sich vielleicht von dem Darmurath desselben. Innerhalb der fünf vorderen Fußpaare des Weibchens finden sich eben sovielle Paare verschiedentlich geformter Platten oder Klappen, die eine Bruthöhle bilden helfen, welche jedoch gegen die Kiemenbede des Krebses offen ist. Wahrscheinlich fällt nach dem Brüten das Weibchen heraus und stirbt. Im jüngeren Lebensalter besitzen beide Geschlechter Augen, im spätern aber nur die Männchen. Weibchen weiß und schwarz oder grau gefärbt; Männchen einige braun, andere mit einem gelben Streifen auf dem braunen Grunde.

97) *Artemia salina* Leach t. 6. f. 14—21.

In dem Salzsee beym Dorfe Laak zwischen Sympheropol und Kostof im Sommer in überaus großer Menge, verschwindet aber im August, wann das Wasser fast ganz verdunstet ist. Dieses Thier ist 3—4 Linien lang und wurde von G. Fischer im Bulletin de Moscou VII. unter dem Namen *Branchipus milhausii* beschrieben und abgebildet.

Hier ist eine vollständigere Beschreibung mit genaueren Abbildungen. Der Darm ist mit einem ziegelrothen Stoff angefüllt: an der Bauchseite 1 Sack mit rothen Eiern, ein Brutorgan, nicht Eyerstock. Wovon sie sich nähren, ist unbekannt, da in dem Wasser keine Pflanze und kein anderes, noch kleineres Thier ist; auch begreift man nicht, wie dieses zarte Thierchen in dem wie Braunkien dicken und klebrigen Wasser sich erhalten und bewegen kann, besonders da dieses Wasser die Haut sehr reizt und sogar anfrisst. Es enthält nach Göbel

0,7453	Schwefelsaures Kali
2,4439	— — Natrum
7,5500	Chlormagnesium
0,2760	Chlorcalcium
16,1200	Chlornatrium (Kochsalz)
27,1352	

Nach Pallas findet sich der *Cancer salinus* von zinnoberrother Farbe in den Salzseen des südlichen Sibiriens und in der Provinz Jeketsk mit einem Thier wie *Cancer pulex* in einer solchen Menge, daß sich *Ayas tadorna* und eine weiße Möve einige Zeit davon ernähren. Reise II. 1. 282, 357, 359.

Es findet sich auch in einem Salzsee bey Lyngington in England. Leach und Rackett in Linn. Transactions XI. 205. Der Kopf ist durch einen Hals vom Rumpfe geschieden, auf der Stirn ein kleines schwarzes Auge, und an den Seiten 2 andere größere auf einem langen Hautfleck; sie sind gefälscht; vor der Stirn zwey Fühlhörner viergliedrig, am Ende mit 3—4 Borsten; darunter 2 dreigliedrige Gliedmaßen nach unten und hinten gerichtet, wahrscheinlich ebenfalls Fühlhörner. Dazwischen ein dicker Rüssel, einfach; weiter keine Greifwerkzeuge. Hals ringeligt, Leib dünn und 11ringelt mit 11 Fußpaaren, anfangs platt und am Ende fischelförmig mit klammförmigen Borsten. Hinten an jedem Fuß, ziemlich in der Mitte, hängt eine Blase, wie bey den Amphipoden, an den Wurzeln

der Füße und sind wohl Athembälgen. Schwanz fast halb so lang als der Leib, walzig, nach unten und vorn gebogen, ohne Blättchen. Hinten daran der After.

98) *Dichelesthium sturionis*. In Menge an den Kiemen der Störe; gut beschrieben von Hermann.

Von Augen keine Spur. Die beyden Klammerorgane vorn am Kopf zwischen den fadenförmigen Fühlhörnern scheinen den hintern Fühlhörnern anderer Crustaceen zu entsprechen. Von den zwey Fußpaaren, welche nach Hermann mit dem 2ten Leibestriegal zusammenhängen sollen, gehört das Eine zum ersten Ringel oder dem Kopf; Kiemen fehlen, wie es auch bey den Lernaäben der Fall ist; After am Ende zwischen den beyden kleinen Anhängen, Eyerstöcke im Innern; was Hermann dafür gehalten, sind die zwey hintersten verkümmerten Beine, Mundtheile, richtig von Nordmann beschrieben. Beyträge II. S. 43. Die Geschlechtstheile münden durch zwey Oeffnungen an der Bauchseite des vorderen Gürtels des Hinterleibs, und zwar nach am Hinterende. Mit ihnen hängen bey manchen Exemplaren zwey dünne und fadenförmige Eyertrauben zusammen, die etwas länger sind, als der ganze Leib; die Eyer bilden darinn eine einfache Reihe und liegen getrennt hintereinander.

99) *Lernaepoda stellata* (Mayor, Bulletin philomatique 824. Fevrier), fand sich sparsam auswendig an der Haut der Stierin. Gehört mit *Achtheres*, *Trachelastes* et *Brachiella* in eine Familie.

Hinterleib viel größer, vom vordern abgegränzt, ringeligt; After hinten; die Geschlechtswerkzeuge münden sich jederseits unten und hinten; keine Gliedmaßen aber zwey hornige Platten unten zwischen den Geschlechtstheilen. Die vordere dünne Leibeshälfte besteht aus 2 Theilen, wovon die vordere kegelförmig ist und den Mund enthält, von Wimpern umgeben; daneben 2 dreigliedrige Fühlhörner und dahinter nach unten 2 Paar kleine Gliedmaßen, wie *Achtheres percaurum*; dahinter 2 längere dreigliedrige Gliedmaßen ohne Haare, wie eine Palpe; auswendig daran die Mandibeln, bestehend aus einem 2-gliedrigen Stamm und zwey zweigliedrigen Ästen, wovon der innere eine Kralle hat, der äußere mehrere Spigen; im etwas rüssel förmigen Munde die Maxillen. Keine Augen. Unter dem zweyten Stück des Vorderleibes hängen zwey lange Gliedmaßen nach vorn gerichtet, und daselbst verwachsen in eine sternförmige Platte, zu der Gefäße aus dem Herzen gehen; vielleicht Kiemen. Zwischen diesen großen Gliedmaßen zwey sehr kleine. An jeder Geschlechtsoffnung hieng ein Eyerfaden.

## V. Würmer.

100) *Serpula*. Nur wenige, alle vereinzelt, nicht in Massen gruppiert, auf andern Körpern. Ähnlich der *Serpula vermicularis*.

101) *Spirorbis pusilla* n.: *Testa discoidea, subumbilicata, anfractus supra carinatis, transversim sulcatis*.

Die meisten lagen mit der Mündung des Gehäuses nach der Linken; die Schale hat nur 2 Windungen; Breite 2<sup>lin</sup>. Der Fleischappen, welcher die Mündung verstopft, und die

Kiemens frib halb durchfichtig und fchwach fleifchfarben; der übrige Leib dunkelbraun; er kann fih weit einziehen. Hängt häufig an Steinen, Mytilis und Tangen.

102) *Polynoë granulosa* n.: Elytris 28 coriaceis granulatis, appendicibus caudae longis. Im April unter Steinen, felden. Gleicht *P. laevis* Audouin (Ann. sc. nat. 27. 1832.), hat aber nicht 37, fondern 32—34 Paar Füße, und das letzte Paar Elytren hängt nicht am achten fußtragenden Ringel von hinten, fondern am dritten oder fünften. Länge 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>“, Rüffel 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>“, hinteres Paar Anhängel 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>“. Im Juny, wo das Wasser warm war, zeigten fih keine mehr.

103) *Lycoris* (Nerëis), finden fih drey Gattungen.

Die Eyer werden je eines in fehr kleinen Schläuchen erzeugt, fallen in die Höhle des Leibes, welche durch viele häutige Scheidwände in hinter einander liegende Kammern abgetheilt ift, verweilen darin, häufen fih ftark an und gelangen endlich zwifchen den beiden Neften der Kiemens, alfo durch die Kiemens felbft nach Außen. Einem Paar der befchriebenen Eperftöcke gegenüber habe ich zwey ähnliche, jedoch kleinere Organe bemerkt, in denen ich immer nur einen dicken Saft vorfand, und die ich deßhalb für Keßel zu halten geneigt bin. Einmal leerte eine *Lycoris* erdige und vefte Excremente durch den After aus, was fchon D. Müller an *Lycoris versicolor* beobachtet. Im Darm findet man eine fchlammige Erde neßft etwas Schleim und auch kleine Pflanzentheile wie von Tang; nie aber einen unverdauten Theil eines Thieres. Nicht felden trifft man folche Würmer an, welche ein Stück vom Schwanz, bis 9 Ringel, verloren und wieder neue erhalten haben. Den jüngern Exemplaren fehlen die blattartigen Anhängel neben den Cirren an den Kiemens, obfchon fie im Alter dergleichen haben. Die beften Kennzeichen der Gattungen nimmt man von den Hornfpitzen, der Gefalt des hinterften Ringels und der Größe des vorderften, welches keine Kiemens trägt.

*L. pulsatoria*? t. 7. f. 1. 4—8. Länge 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>“, Br. 1“. Kiemens 1“; Ringel 94 mit Kiemens. Dahinter 3 kleinere, davor 2 für den Kopf; aus dem zweyten fchiebt fih der Rüffel vor. Anatomiert Miscellanea II.

104) *Lycoris lobulata* t. 7. f. 2. 9—15. Länge 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>“, Breite 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>“, Ringel 94 mit Kiemens, dahinter 2 ohne folche. Im hinterften Ringel eine Menge Blättchen und zwey lange Cirren. Sie fwimmen nach Art der Bluteigel in Menge unter einander. Riffos *Lycoris lobulata* ift eine andere Gattung.

105) *L. dumerilii* t. 7. f. 3. 16. 17. Länge 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>“, Ringel 74, Augen faft nierenförmig, Pupille oval; bey den andern die Augen kugelförmig ohne Pupille. Leben im Schlamm verfteckt in Schlammröhren mit Steinen untermifcht.

106) *Spio laevis* n. t. 8. f. 1—6.: Capitis cirris duobus longis, laevibus, sulcatis, fuscis; oculis quatuor nigris minutissimis; branchiis bifurcatis, ramis earum foliaceis, simplicibus; tuberculis sex ovatis circa anuum.

Steht am nächften dem *Spio vulgaris* Johnston (Zool. Journal III. 385). Die von delle Chiaje follen 3fte 1838. Heft 10.

zu den Nerëiden gehören; des Fabricius *Spio seticornis* et *silicornis* fcheinen eine eigene Gippe zu bilden. Länge 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>“, Breite 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>“, Ringel 120. Augen fehr klein, als vier fchwarze Düpfel. Keine Fuchswortzeuge. Auch fchiebt fih kein Rüffel vor. Lebt auf Felfen in Schlamm unter Conferven in einer dünnen Schlammröhre.

107) *Amphitrite taurica* n. t. 8. f. 8—15. Gehört unter Amphitrite oder Sabella anderer Schriftfteller [Eine Amphitrite ift es auf keinen Fall]. Länge 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>“. Mund vorn eine weite Spalte. Daneben 2 breite Stiele, welche fih in Kiemensbüfel zertheilen; im vordern Ende ftehen viele gelbliche und metallifh glänzende Körperchen, die brennabe urnenförmig zu nennen find, und alle zufammen einen einfachen Kranz bilden. Ein jedes läuft in einen langen und fpiz geendigten Stiel aus, der nach feiner ganzen Länge in dem Stiele der Kieme verborgen ift: das ganze Körperchen aber befteht aus einem Bündel von zarten Vorften, die durch eine hornige Scheibe zufammeng gehalten werden. Aus der Mitte des erwähnten Kranzes ragen 5—6 ganz gerade, ftarke, feife, fehr fpize und gleichfalls metallifh glänzende Stacheln weit hervor, deren abgeftumpftes Ende bis zu der Bafis des Kiemensftiels hinreicht, die alfo durch diefen ganzen Stiel hindurchlaufen. Von der untern Seite des Kiemensftiels geht eine große Anzahl langer, bandartiger, einfacher, häutiger und fih wurmartig bewogender Theile ab, die Kiemens. Der Leib befteht aus 35 Ringeln mit Cirren; dann folgt noch ein ganz glatter Schwanz über 1/3 der Leibeslänge. Seiten, zwifchen Steinen ganz frey.

108) *Hirudo medicinalis*.

109) *Nephefis* (*Hirudo*) *vulgaris*.

110) *Clepsine complanata*.

111) *Planaria* verfchiedene Gattungen in füßem Wasser.

Die meiften diefer Thiere, befonders die abgebildeten, find fehr genau befchrieben.

## VI. Strahlthiere.

112) *Actinia zonata* n.: Fusca aut rubra, basi colore coeruleso marginato; extus glabra; contracta subconica, expansa depressior pollicaribus; pede lato; tentaculis conoideis brevioribus, subaequalibus, perforatis; serie simplici papillarum marginalium imperforatarum.

Ift wohl eierley mit *A. mesembryanthemum* und Mißos *A. corallina* und gehört zu Ehrenbergs *Ectactmaea*. Diefe 1“; häufig auf Felfen.

113) *Oceania blumenbachii*: Campanulata, margine integerrimo tentaculis 24. ad peripheriam,

Befchrieben und abgebildet in Mémoires étrangers II. Breite 3“. Im großen Menge an warmen Frühlingsabenden; verursacht ein ftarkes Leuchten.

114) *Medusa aurita*. In Menge.

Durchmeßer 1“, im März neßft viel kleinern. Ein Exemplar hatte 5 Kiemensfäcke und ebenfoviel Arme.

115) *Coluber maeoticus* Pall. tab. 1. fig. 9—12.



Gehört *Tropidonotus*, hat jederseits oben und unten 7—10 Zähne in Abständen. Schuppen glatt, Bauchschilde 207, Sch. 58. Färbung aschgrau oder graubraun; auf dem Vorderkopf zwey sehr schmale schwarze Streifen. Länge 27". Die meisten dieser Thiere, besonders die abgebildeten sind sehr genau beschriebenen und dann folgt eine Erklärung der Abbildungen und 8 Tabellen über die Länge der neuen Fische und Krebse.

S. 455. Fr. Gebler, Uebersicht des kasumischen Gebirges, der höchsten Spitze des russischen Ural.

Mineralogisches, Höhen, Flüsse, heiße Quellen, Seen, Vegetation, Zoologie. Bewohner, benachbarte Gebirgsketten. Dabey eine sehr große Charte.

Das Gebirge liegt zwischen 50 und 51° Breite und 103° bis 106° Länge von Ferro, hat Gletscher und ewigen Schnee. Nirgends rother Schnee (*Palmella nivalis*). Regenwälder nur in breitem Thälern, werden von den Fischen benützt.

Auf der Südseite gibt es viel mehr Insekten, besonders *Decticus verrucivorus*, der zur wahren Plage wird. Wenig Schnaken und Moskiten (*Pulicis et Simulii species variae*), Bremsen (*Tabanus*); keine Stachfliegen.

Wenig Falter: *Papilio cardui*, *urticae*, *populi*, *cinxia*, *lucilla*; mehr Gattungen von *Satyrus* et *Polyommatus*, am häufigsten *Papilio apollo*; Abend- und Nachtfalter fast keine; fliegen nicht zum Feuer, wie am Jetysch und Dby.

Die Honigbienen gedeihen nur mittelmäßig. Blattwespen häufig, und verschiedene Ameisen in den Wäldern und an Ufern. Ihre Eyer sind eine Lieblingsnahrung der Bären.

Bettwanzen und Küchenschaben (*Blatta orientalis*) häufig in den Dörfern; auch *Lygaeus apterus*, andere selten.

Thruwemer nur einzeln; Grillenarten häufiger und schädlich dem Getraide; *Oedipoda salina* zeichnet sich durch lauten Gesang und anhaltenden, über 5 Ellen hohen Flug aus. In warmen Thälern auch *Oed. barabensis* nebst zwey neuen *E. gebleri et rhodopa*; ferner *Tentyra lanata*.

Käfer selten; hin und wieder ein *Elatr sericeus*. *Drapetes equestris*, *Cantharis alpina*, *Cetonia aenea*, *Oedemera coarctata*, *Larinus impressus*, *Clyti*, *Lepturae*, *Luperus altaicus*, *Chrysomela basilea*, *Dorcadion carinatum*.

Einige kleine Carabiden; kein Mistkäfer; über der Waldgränze keine Käfer. In den Thälern *Staphylinus politus*, *Buprestis appendiculata*, *Elatr fasciatus*, *Monochamus sutor*, *Clytus adpersus*, *Pachyta variabilis*, *cincta*, *sexmaculata*, *interrogationis*, *Galleruca tanacetii*, *Cryptocephalus flavipes*, *Chrysomela limbata*, *adonidis*, *Cicindela tricolor*, *descendens*, *maritima*, *Harpalus lumbalis*, *Cymindis binotata*, *Tentyria strigosa*, *Purpuricinus holodendri*, *Pachyta lamed*, *Galleruca absinthii*, *Keliophilus hypolithus* n., *Clytus altaicus* n., *Chrysomela kowalewskii*.

Sehr wenig Spinnen und Lurche, kein Frosch, nur ein Paar Bispren und Ephyren.

*Gadus lota*, *Salmo fluviatilis* (Talmene), *coregonoides* (Uskutschke), *thymallus*.

Wenig Wasser- und Sumpfbögel, Sing- und Raubvögel.

*Mergus merganser*, *Anas rutilla*, *acuta*, *crecca*, *clangula*, *Scelopax gallinago*, *Ciconia nigra*, *Grus cinerea*, *Tringa alpina sive variabilis*, *Tetrao lagopus*, *alba*, *Coturnix dactylosomans*, *Perdix cinerea*, *altaica*, fast so groß wie der Auerhahn, vorn aschgrau, Rücken schwarz, Kehle und Bauch weiß; *Tetrao tetrix*, *urogallus*.

*Hirundo alpestris*, *rustica*.

*Alcedo ispida*, *Upupa epops*, *Picus martius*, *leucosus*, *tridactylus*, *Cuculus canorus*.

*Fringilla linaria*, *longicauda*, *domestica*, seit kurzer Zeit; *Emberiza pityornus*, *nivalis*, *Parus niger*, *ater*, *Alauda arvensis*.

*Anthus temminckii*? *Motacilla alba*, *boarula*, *citrinella*, *Sylvia phoeniceus*, *coerulecula*, *leucomela*, *trochilus*, keine Nachtigallen; *Muscicapa fuscata*? *Cinclus aquaticus sive pallasi*? *Turdus musicus*, *fuscatus*, *Sturnus vulgaris*.

*Corvus monedula*, *infaustus*, *corcothraustes* lebt besonders von Zernernüssen; *C. graculus*, *dahuricus*, *cornix*, *frugilegus*, *corax*.

*Strix nyctea*, *bubo*, *Falco tinnunculus*, *subbuteo*, *milvus*, *lagopus*, *Aquila haliaetos*, *nobilis*; wahrscheinlich *Gypaetus barbatus*.

Unter den Säugethieren sind diejenigen am meisten bekannt, welche wegen ihres Fells oder sonst einem Werth haben. Sie sind am leichtesten im Winter zu bekommen.

Im Sommer sieht der Reisende außer Rehen und Borken selten einen Hirsch oder Bären.

*Oris argali* auf Felsen und Steppen, nicht selten, ist aber vorsichtig.

Der altaische Steinbock (*Capra ibex sive altaica*) ist im Hochgebirge häufig, jedoch nur an beschränkten Orten, viel leicht wegen der Salzlecken; ehemals in Herden zu 100, jetzt noch zu 50—70 Stück. Sie mäkern nicht wie die Hausziege, sondern geben einen lauten Warnungsschrei von sich, worauf die ganze Herde entflieht. Von lauten Kämpfen weiß man nichts. Sie paaren sich im October und werfen im April. Die Länge der Hörner steht nicht im Verhältniß mit der Zahl der Knorren. Eines hatte oben eine Elle mit 16 Knorren, unten 14"; ein anderes eine Elle, 4" mit 13 Knorren; Abstand der Spitzen bey jenem 14, bey diesem 10. Paar im Sommer kürzer und röthlicher, im Winter länger und grauer. Die alten Böcke streifen wegen ihrer langen Hörner nicht hoch. Ihr Fleisch soll schmackhaft seyn, und ihr Winterfell gibt einen warmen Pelz und gegerbt dauerhafte Hosen.

Eine Antilope, welche die Kalmücken Oseren nennen, scheint eher *Antilope gutturosa* zu seyn, als *A. saiga*.

Das sibirische Reh (*Cervus pygargus*) ist eines der gemeinsten Thiere dieser Gegend, zuweilen in kleinen Herden, besonders auf den Wanderungen des Winters nach den Bergen, des Sommers nach den Thälern. Die Winterpelze mit den

Haaren nach oben, leiben nicht von der Masse, sind sehr warm, und eine gewöhnliche Winterkleidung der Bauern auf Reisen.

Das Renntier, jenseits des Gebirgs.

Das Elennthier in sumppigen dichten Wäldern.

Der Hirsch ziemlich häufig.<sup>1</sup>

Das Bismantier (*Moschus moschiferus*), nach Eschscholz eine von den tibetanischen verschiedene Gattung, lebt vorzüglich in dichten Wäldern am Zugash, obern Argut, an der Katun, an den Zuflüssen der Kofsa und Kofsu, besonders am Zuguruk einsam und versteckt, und geht nie heraus auf freye Plätze. Wird es aufgeschreckt, so macht es erst einige große, ein paar fadenlange Sprünge; dann läuft es mit mäßiger Schnelle weiter, springt öfters, vom Hunde verfolgt, über 3 Ellen hoch auf Felsen und sieht ihn an, so daß der heranschleichende Jäger es schießen kann. Öfters wird es durch Selbstschüsse mit Pfeilen getödtet, oder in starken Schlingen gefangen, die man an reich mit Flechten, ihrer Hauptnahrung, behangenen und bewogen gefällten Bäumen aufstellt. Das Männchen soll sie zuweilen mit der scharfen Hinterseite seiner Zähne zerschneiden und sich retten. Es gibt ebenfalls einen Pfiff von sich, der aber kürzer und feiner, als der des Steinbocks seyn soll. Sie häuten sich nur einmal des Jahres; daher hat ihr Haar im Winter und Sommer dieselbe Farbe. Es ist borstig, sitzt nicht sehr fest und geht daher leicht aus, wenn das Thier nicht vorsichtig getrocknet wird. Die jüngern sind heller gefleckt als die alten. Außer dem Bism, dessen Geruch bekanntlich mehr dem des Bibergeiß, als dem des angenehmen orientalischen Bismas ähnelt und diesem an Wirkung nachsteht, wird sein Fell wie die Rehfelle zu Pelzen benutzt.

Das Wildschwein kommt sehr selten an den Seen vor, wird aber nach und nach ausgerottet.

Der Steinhase (*Lagomys alpina*) ist hier wie im übrigen Altai überall gemein, wo große Trümmerhaufen auf und an den Bergen vorkommen. Unsehn lebt er auf und unter ihnen, versteckt sich, wenn man sich nähert, nach einem kurzen, starken Pfiffe, summt sich fleißig und trägt im Herbst, wie man sagt, bis 3 Ellen hohe Heuhaufen zusammen, unter denen er den Winter, öfters von einem Haufen zum andern wandern, in Gesellschaften bis 20 und mehr Stück zubringt. Sie sind nicht so phlegmatisch, wie ihre Nachbarn, die Bobak, und müssen sich wohl stark fortpflanzen: denn sonst könnten sie ihrer zahlreichen Feinde wegen nicht so häufig vorkommen. Zu diesen gehören, außer den Raubvögeln, die ihnen wohl selten bekommen, die Jäger, die sie als die beste Lockspeise für die Bobel entweder in Fallen fangen, die zwischen ihrer Heuhaufen gestellt werden, oder in den Haufen selbst aufsuchen und erschlagen. Andere Feinde sind der Bobel, der sibirische Marder, der Fitis, selten der Fuchs. Am gefährlichsten ist ihnen das Hermelin, weil es sie auch unter die Steintrümmer verfolgt, wohin andere Thiere nicht eindringen können. Das von ihnen gesammelte Heu wird hier wohl nur selten von den Jägern als Pferdesutter gebraucht (wie es Pallas versichert), denn nicht alle Pferde freffen die von den Alpenhasen gesammelten, theils unschmackhaften, theils durch Excremente verunreinigten Pflanzen.

Es kommt auch eine Art vor von ganz schwarzer, ein wenig ins Bläuliche spielender Farbe, die im Sommer und

Winter mit der grauen gemeinschaftlich lebt, und sonst nichts Unterscheidendes hat. Mittelfarben gibt es nicht.

Der weiße Hase (*Lepus variabilis*) ist hier nicht so gemein, als in den Vorbergen des Altai und kein Gegenstand der Jagd. An der Tschuja soll ein Hase vorkommen, der auch im Winter grau bleibt. Da jene Gegend so manche mongolische Thiere besitzt, so möchte dieses eher Lepus tolai seyn, als *Lepus timidus*.

Fliegende Eichhörnchen (*Pteromys volans*) gibt es einzeln in Wäldern.

Gestreifte Eichhörnchen (*Tamias striatus*) sind häufig. Im Spätherbst und Winter leben sie gemeinschaftlich in Heuden, werden zuweilen ausgegraben, und dann von den Bewohnern, nebst ihrem Vorrath von Cemberrüssen, verzehret.

Das gemeine Eichhörnchen ist hier kleiner und im Winter dunkler grau, als am Dby und Tetsch; aber sein Fett ist sehr geschätzt.

Die braunen und schwarzen Abarten, welche in Deutschland so häufig sind, sah ich hier nicht; wohl aber graue, selten weiße Felle mit rothen Ohren.

Die Bieselmaus (*Arctomys citillus*) findet sich bey Umonsk, aber bey weitem nicht so häufig als am Tetsch. Am Argut ist sie besonders groß, 12" englisch, und der Schwanz  $3\frac{1}{2}$ ; Kopf und Rücken sind fein wellenförmig schwarz und gelblich, Hals und Schultern etwas bläulich, Augensieder und Kehle etwas mehr oder weniger weißlich; Seiten, Schenkel und Bauch braungelblich, die Schienen weißlich, die Nägel schwarz. Körper und Schwanz breit gedrückt; die Haare des Rückens und des Schwanzes an seinen Wurzeln gelblich, in der Mitte schwarz, am Ende weiß, an den Seiten ganz weiß, unten die mittlern Haare fuchsroth. Mit denen vom Tetsch verglichen, würde man sie für eine eigene Art halten; denn diese haben große, braunrothe Flecken über den Augen und Ohren und auf den Backen, eine weiße Kehle und Unterseite der Vorderbeine, und sind nur 10" lang. Ihr Schwanz ist  $2\frac{1}{2}$ " lang, doppelt schmaler, und hat weit kürzere und weniger schwarze Haare. Da aber die Bieselmäuse so häufig variiren und es wohl an andern Orten Mittelglieder geben könnte, so wage ich nichts zu entscheiden. Sie leben hier in einem trocknen, kesseln, thonigen, zum Theil steinigten Boden, sind im Sommer sehr fett und glatt, laufen nicht sehr schnell und dienen den Kalmücken, die sie mit Schlingen fangen, ausgraben oder durch Wasser herausstreiben, zur Speise.

Der Bobak (*Arctomys bobac*). Am häufigsten trifft man ihn in offenen Thälern, oder, friedlich neben Steinhasen lebend, auf Felsenblöcken und Trümmern des Südhanges kahler Berge am dem Süd- und Westabfalle des Gebirges, besonders am Turgusu, oder Tschapaga, Kofsa usw. Auf dem Nordabfalle sah ich ihn nicht, hingegen am Glätscher der Katun und auf dem über 6000 Fuß hohen Gipfel der Alpe zwischen dem schwarzen Meer und der Radmanowka, wo der Schnee erst im Juny gehauet seyn mochte, denn es fanden sich am Ende July noch Spuren davon. Er ist wohl das trügste unter allen sibirischen Säugethiern; wenn er seinen, besonders im Hochgebirge, sehr langen Winterschlaf gehalten hat, spaziert er an hellen, warmen Tagen mäßig schnell und unbehäuflich

ein wenig um seine Höhlen, die er gewöhnlich unter Steinen und Felsenblöcken anlegt, herum, liegt aber noch mehr vor und in ihrer Mündung, und zieht sich, wenn man sich nähert, nach einem lauten, dem Worte *küpi küpi* ähnlichen Pfiffe, in sie zurück. Nach Sonnenuntergange legt er sich wieder schlafen, steht des Morgens eben nicht früh auf, und ist bey Nebel und Regenwetter auch wenig zu sehen; es versteht sich, daß er dabei recht fett wird. Sein Fell ist wenig geachtet, und das Fleisch wird von den Russen nicht gegessen, von den Kalmdücken aber, die ihn häufig belauern und schießen, des reichlichen Fettes wegen geachtet.

Außer der Hausmaus sah ich *Myodes saxatilis* auf einer Kippe über der Waldgränze und *Georhynchus aspalax*.

*Sorex pygmaeus* ist im Gebirge sehr häufig und thut unvorsichtigen Jägern großen Schaden, indem er die Jagdhütten und die Sobelfelle verderbt.

*Felis manul* kommt am Argut und an der Tschuja zuweilen vor.

Der Fuchs (*Felis lynx*) kommt nur einzeln vor; er lebt und nistet in Felsen und geht in die Wälder auf Beute aus, ist furchtsam, scheu und nicht zu zähmen; sein Winterpelz ist weißgrau mit vielen kleinen, schwarzen Flecken.

Der Irtis (*Felis pardus Pall.*, *F. uncia Linn. et Gmel.*), den Pallas von *F. panthera s. pardus Linn.* trennt, mit welchem ihn aber Fischer vereinigt, findet sich sehr selten am Jassater und an der Tschuja. Das im Barnaulischen Museum befindliche Exemplar ist ein junges, im Winter an jenem geschossenes Thier. Seine Farbe ist graulich weiß, mit schwarzen Flecken; die des Kopfes und Rückens sind klein und ungeringelt. Die Nase, der Bart, die untere Seite des Halses ungesleckt. Die Flecken auf der Mitte des Rückens bis zum Schwanz laufen in unregelmäßigen Längsstreifen zusammen; auf beiden Seiten bilden sie Ringe mit weißgrauen Haaren in der Mitte. Näher nach dem Bauche zu und besonders an der äußern Seite der Beine sind sie größer, rundlich, nicht geringelt und wenig mit grauen Haaren vermischt, daher schwärzer. Die innere Seite der Beine hat nur wenige Flecken. Am Schwanz sind undeutlich geringelte Querflecken, sein Ende ist größtentheils schwarz. Die Länge des Thieres ohne den Schwanz 1 Elle 6 Zoll, des Schwanzes 12" (Werchow) russ. Maß.

Der Fuchs (*Canis vulpes*) ist im Gebirge nicht häufig und sein Fell hat keinen besondern Werth. An der Tschuja soll eine besondere Art Füchse, vielleicht der Karagan (*C. melanotus Pall.*) vorkommen.

Der Wolf (*C. lupus*) findet sich dagegen häufig und besonders vor Herden sind. Im Gebirge ist er für die Hirsche, die er in Gesellschaft jagt, eine große Plage.

Der Alpenwolf (*C. alpinus Pall.*). Sie leben truppweise am Argut in felsigen Gegenden, besonders näher nach seinen Quellen hin; wahrscheinlich auch an der Tschuja. Seit Kurzem soll sich ein Trupp derselben im Gebirge der in die Katunj fallenden Terektta angesiedelt haben und den Hirschen Schaden. Sie sind sehr beißig und wenn man 4—5 bey einer Mählgelt antreffe, sollen sie sich nicht leicht vertreiben lassen, sondern eher den Menschen anfallen. Ihr Geheul ist feiner,

als das des gemeinen Wolfs. Den Pferden stellen sie weniger nach als den Steinböcken, Hirschen und Schafen. Sie sind schwer zu schießen; am besten bekommt man sie, wenn man ihnen eine mit der Frucht der Brechnuß (*Strychnos nux vomica*) oder der Wurzel der Nieswurz (*Veratrum album*), die man dadurch kräftiger macht, daß man die aufsteigende Pflanze durch eine schwere Bedeckung in ihrem Wachsthum zurück hält, vergiftete Lockspeise einwirft. Die Beschreibung, welche Pallas vom Alpenwolfe der Kena und des Ubi gab, kommt nicht ganz mit dem altaischen überein, der aber wohl eins mit dem von Pesterem an den Quellen des Jenissei entdeckten ist; da aber seine Farbe sehr variiert, so mögen wohl alle diese Abarten einer Art seyn. Immer ist er kleiner als der gemeine Wolf und sein Schwanz haariger; zuweilen ist er fuchsroth mit weißem Bauche und weißer Innenseite der Beine, und hat am Schwanz viele lange schwarze Haare, besonders gegen das Ende hin, wo sie wieder mit weißen vermischt sind. Gewicht ein Pud (40 P.). Häufig aber ist seine Farbe weit blässer, nur mit fuchsrothen Loden, übrigens gelblich grau, mehr oder weniger ins Röthliche spielend, die Spitzen der längsten Haare öfters schwärzlich, die Seiten und der untere Theil des Halses, des Körpers und die innere Seite der Beine heller; die äußere Hälfte des Schwanzes und der größte Theil seiner Unterseite dunkelgrau mit einzelnen gelblichen, an seinem Ende mit weißen Haaren. Von der Jahreszeit hängt die Farbe nicht ab; schwerlich auch vom Alter.

Die Fischotter (*Lutra vulgaris*) führt in den Gebirgsflüssen ein herumstreifendes Leben, so daß sie nicht leicht zu fangen ist; sie kommt nicht häufig vor, am meisten noch in der Buchtarna und ihren Zuflüssen.

Wiesel, Irtisse und Hermeline (*Mustela vulgaris*, *M. putorius*, *M. erminea*) findet man auch hier, besonders letztere.

Der im Rißdelf bemerkte altaische Marber (*M. altaica Pall.*), von dem Pallas einige Notizen gab und den ich in den Annalen der kais. moskowschen naturforschenden Gesellschaft genauer beschrieb, findet sich häufig um Uimonsk vor. Er dringt selbst in die Vorathshäuser der Bauern ein. Im Hochgebirge soll er nicht vorkommen. Die Nähe der Bäche ist sein Lieblingsaufenthalt.

Der sibirische Marber (*M. sibirica*) lebt an denselben Orten, wie der Bobel, in dessen Fällen er öfters gefangen wird. Am Argut soll noch eine besondere Marberart vorkommen, wahrscheinlich *M. soina* oder *M. martes*, die Pallas Sibirien abspricht.

Der Bobel (*M. zibellina*) ist die berühmteste unter den hiesigen Marberarten, meist schön schwarz gefärbt. Im Sommer ist er selten zu sehen; im Winter wird er in Fallen gefangen, und ist dabei so furchtsam, daß er es, wenn nur ein Bein eingeklemmt ist, nicht wagt, sich loszureißen; daher wird er zuweilen lebendig gefangen und an Ketten geschmiedet. Im Futter ist er eigen, so daß man die Köder öfters wechseln muß. Ich sah selbst einen Gehäimten, der außer Hasen und Viehhühner nichts fressen wollte. Seine Nahrung besteht aus diesen, sowie aus gemeinen und gestreiften Eichhörnchen, Auer- und Viehhühnern, vorzüglich aber aus Steinhasen, wiewegen er sich vorzüglich in der Nähe ihrer Wohnungen, also nicht in moosigen, dichten Wäldern, sondern in der Nähe von Steintrümmern und mit Bäumen besetzten Felsen, in denen er auch nistet,

aushält. Pallas hat in seinen vortrefflichen Werken die Lebensart dieser und anderer Thiere bereits beschrieben.

Dachse (*Meles taxus*) trifft man mehr in den Vorbergen, sie werden aber nicht geachtet, nur allenfalls ihre Felle zu Büchsenfutternal gebraucht.

Der Vielfraß (*Gulo borealis*) ist ein einsamer Bewohner der Wälder.

Der Bär (*Ursus arctos*) ist in dichten Wäldern häufig, kommt aber auch in felsigen Gegenden vor und geht bey seinen Zügen über Gletscher und ewigen Schnee. Häufiger noch ist er am Süd- als am Nordabfalle, wahrscheinlich weil es da mehr Wurzeln, Beeren und Ameisen gibt; besonders häufig sah ich seine Spuren an der in den Berel fallenden Koluschka. Er ist furchsam, meidet den Menschen, dem er nur verwundet gefährlich wird, und thut hier selbst dem Rindvieh und den Pferden selten Schaden.

Von größern Säugthieren hat also das katunische Gebirge mit den europäischen Alpen gemein: den Bären, den Dachs, den Vielfraß, den Fuchs, den Wolf, den Fuchsh, die Fischotter, den Zitis, den Stein- oder Baummarder, den weißen Hasen, das Elenthier, den Hirsch, den Steinbock, das wilde Schwein. Es fehlen ihm eine Wardecar, das Murmeltier, der graue Hase, das Reh, das Kenntier?, der Russimon, der europäische Steinbock, die Gemse; dafür besitzt es aber den sibirischen Wardecar, den Bobak, den Tolai?, das sibirische Reh, den Argali, den altaischen Steinbock, die Saiga? ober den Dseken, und außerdem noch den Irbis, den altaischen Marder, den Zobel, den Alpenwolf und das Moschusthier.

Als Hausthiere finden sich Hühner und Tauben, letztere jedoch nur in geringer Menge, weil ein Vorurtheil dem gemeinen Russen ihren Genuß verbietet.

Trampeltiere sind häufig an der Tschuja; aber nicht im übrigen Gebirge, weil felsige Gegenden nicht für sie passen; ja auf vielen Steigen am Argut würden sie gar nicht fortkommen. Selbst die Kirgisen treiben ihre Kameels, die Mündung des Berel ausgenommen, nicht bis hieher.

Die Schafe der Kalmücken haben wohl Fettschwänze, aber weit kleinere als die der Kirgisen. Ihre Wolle ist feiner, als die der russischen Schafe; sie werden aber von ihnen nicht geschoren, jedoch erlaubt man es den zuweilen mit ihren Scheeren hieher kommenden Russen.

Ziegen halten sie in Menge, weil sie ihre Nahrung auf den steilsten Bergen zu suchen wissen. Sie haben die verschiedensten Farben, werden aber von den Kalmücken nicht so geachtet, wie die Schafe. Ihr Fleisch ist fett und schmackhaft.

Das Rindvieh der Kalmücken ist groß, schön und trotz der Freiheit, in der es lebt, nicht wild; nur läßt sich die Kuh nicht melken, wenn sie ihr Kalb oder sein ausgestopfttes Fell nicht sieht. Ihr Fleisch ist sehr schmackhaft. Die Kühe geben im Verhältniß ihrer Größe wenig Milch.

Die kalmückischen Pferde sind weder groß, noch schön gebaut; auch traf ich weder ausgezeichnete Trabrer, noch Passagänger, die unter den Pferden der sibirischen Russen so häufig sind, wohl aber einige mit ungewöhnlich tief eingebrücktem Rücken  
Jhs 1838. Heft 10.

und höherm Wittern an; dagegen sind sie sehr sicher und vorsichtig bey Gebirgsreisen auf schmalen, halzbrechenden Steigen an den Bergabhängen und Felsenabstürzen hin und bey dem Uebergange über reisende, steinige Flüsse. Sie thun mit Vorsicht jeden Schritt, und stolpern sie früher auf gewöhnlichen Steigen öfters, so geschieht es hier äußerst selten. Die kirgischen sind wohl größer, schöner, bessere Käufer, aber für Gebirgsreisen möchten die kalmückischen vorzuziehen seyn. In die niedrigen Gegenden gebracht, müssen jedoch die letztern mit großer Schonung und Vorsicht an die Arbeit im Wagen und auf dem Felde gewöhnt werden, sonst halten sie nicht lange aus.

Hunde kommen bey jeder Furte in Menge vor. Sie sind von der Klasse der Schäferhunde, nicht groß, meist schwarz, zuweilen mit weißen und gelben Flecken, sehr wachsam, aber nicht bössartig. Sie sind die Wächter der oft leeren Furten und der Heerden, ebenso wie die Begleiter auf der Jagd, wo sie das angeschossene Wild verfolgen, und die Anwesenheit eines Jodels oder Sighörndchens auf einem Baume durch Rellen zu erkennen geben. Für alle diese Dienste werden sie sehr schlecht und schmutzig ernährt.

Schweine werden in den Dörfern gehalten, sie sind aber klein und unansehnlich.

Auch Ragen findet man in denselben.

S. 561. Argelander, über eigene Bewegung des Sonnensystems, hergeleitet aus den eigenen Bewegungen der Sterne.

S. 607. L. K. Trautvetter: *Salicetum sive Salicum formae, quae hodie innotuere, descriptae et systematice dispositae*. Fasc. I. *Salices pleiandrae et monandrae*.

Dieser Auffatz enthält kurze Beschreibungen nebst den Synonymen von 32 Gattungen. Abgebildet sind: *Salix kochiana* n. salsaf, *wilhelmiana*, *microstachya*.

S. 637. L. A. Meyer, Bemerkungen über einige *Hymenobrychis*-Arten. Ausführlich beschrieben sind:

O. *vaginalis*, *pallasii*, *circinata*, *hohenackeriana*.

S. 649. J. Griseb., über den Pollen.

Eine sehr wichtige Abhandlung, welche sich wirklich an die von Noth anschließt. Sie handelt vom Bau des Pollens im Allgemeinen, von seinem Innhalt, der Hülle, von den Zwischenkörpern und sodann von den Formen desselben, und geht bis 770. Der Verfasser hat nicht weniger als 14 Hundert Pflanzen untersucht, und den Pollen auf 13 Tafeln wunderschön illuminiert abgebildet.

## Fauna japonica

authore PH. FR. DE SIEBOLD, TEMMINCK, SCHLEGEL et W. DE HAAN, Regis auctoris edita. Lugd. Batav., apud auctorem Amstelod. apud Müller, Lips. apud Fr. Fleischer. 1833. fol.

Von diesem Werke, welches zu den schönern Prachtwerken der neuern Zeit gehört und wohl mehr Neues enthalten

weid, als irgend ein anderes, auch in jeder Hinsicht ganz vorzüglich bearbeitet ist, haben wir drei Hefen oder Abtheilungen. Die eine betitelt: Fauna japonica. a. Ph. Fr. de Siebold. Reptilia, elaborantibus Temminck et Schlegel 1838, p. 1—80; die zweite Abtheilung: Ophidia p. 81—96; die dritte: Saurii et Batrachii 97—144. Man sieht hieraus, daß das Werk im Jahr 1833 angefangen wurde; leider erfährt man aber nicht, wann die betreffenden Aufzüge oder Tafeln ausgegeben worden sind. Wir müssen daher auch hier den Wunsch vorbringen, daß die Jahrszahl zu jedem Aufzuge oder noch besser zu jeder Tafel gesetzt werden möchte, was besonders in unserer Zeit, wo fast täglich neue Entdeckungen gemacht und in einer Menge Zeitschriften mitgetheilt werden, um so nöthiger ist, als dadurch die Synonymie vereinnet und die Streitigkeiten über die erste Benennung hervorgerufen werden.

Obgleich manches über die Naturgeschichte von Japan bekannt geworden ist, wie von Kämpfer und Thunberg; so kann man doch dieses Werk als die erste Darstellung derselben betrachten, nicht bloß hinsichtlich der Abbildungen, sondern auch vorzüglich des Textes wegen, welcher glücklicherweise in keine bessern Hände hätte fallen können. Auch steht den Bearbeitern die Sammlung in Leyden zu Gebote, welche hinsichtlich der östlichen Thiere wohl die vollständigste in Europa seyn mag. Die Verfasser haben sich mit augenscheinlicher Liebe und Eifer der Bearbeitung unterzogen, und sowohl die äußern als innern Theile, wo es thunlich war, mit ihrer bekannten Genauigkeit beschrieben, mit besüßlicher Vergleichung der verwandten Thiere.

Voran geht ein historischer und physischer Ueberblick über die japanischen Lurche von Siebold, datirt im May 1838. pag. 1—33.

Er hat sich mit Bürger mehrere Jahre in Japan aufgehalten und der letztere ist noch dafelbst geblieben, und hat seitdem wieder vieles eingeschickt, worunter zwar nicht vieles, was nicht schon in den ersten Jahren gesammelt war, aber doch viele Stücke, welche zu Vergleichung dienen können. Es wurden alle Lurche gefunden, welche in japanischen Schriften erwähnt sind, so daß, mit großer Wahrscheinlichkeit, nicht mehr viel Neues entdeckt werden wird. Da Schlegel sich gerade mit der Bearbeitung der Lurche beschäftigt und die Physiognomie des Serpens 1837 herausgegeben hat; so hat er sich zugleich mit völliger Sachkenntnis der Bearbeitung dieser Fauna unterzogen. Kämpfer und Thunberg haben fast nichts geleistet. Früher hatte Blomhoff, Vorstand der Factory zu Dejima, eine Sammlung von Lurchen zusammengebracht, welche Boie in der Isis 1826. p. 206. beschrieben hat. Es sind übrigens nur 12 und darunter mehrere wahrscheinlich aus andern Ländern. Uebrigens gibt es wenig Lurche in Japan, wenn man die ausnimmt, welche im Meere vorkommen. Siebold gibt ein Verzeichniß mit den systematischen Namen und den chinesischen Worten nebst der Aussprache, wofür letzteres Herr Hoffmann besorgt hat. Da es so viele Schriftsteller unter diesem Namen gibt, so hätte er näher bezeichnend werden sollen. Die Namen sind nach französischen Art geschrieben, was unsers Lesers sehr unrichtig ist, da man nicht weiß, wie mehrere Buchstaben ausgesprochen werden sollen, z. B. H, Z, Ch vor o und i. Bei fremden Sprachen muß man immer das Lateinische wählen. Meistens ist die Bedeutung des chinesischen oder japanischen Wortes erklärt. Die Zahl dieser Lurche 29, und davon leben 7 im Meer, Schildkröten und Schlangen, welche sich nur zur heißen Jahreszeit

an den Küsten zeigen und wahrscheinlich nicht nördlicher gehen als 34 Grad; den Winter über halten sie sich zwischen den Wendekreisen, und machen daher oft große Wanderungen, um der Kälte zu entgehen. Sphargis sah er nur zweimal; dennoch sind im Werke alle Meeresschildkröten und alle Salamander verglichen. Die Gattungen der Eidechsen und Schlangen finden sich nicht in Europa, wohl aber Kröten und Schildkröten. Dann folgt eine Darstellung der Wohnörter. Die Molche sind die zahlreichsten und die Salamandra maxima findet sich in den Höhen der höhern Gebirge zwischen 34 und 36 Grad, auch in Trümmern der Vulcane 5000' hoch.

Dann folgt das Werk selbst, und beginnt mit den Meeresschildkröten. §. 1. mit ausführlicher Beschreibung der äußern und innern Theile, besonders der Knochen. Hinter diejenigen Gattungen, welche bey Japan vorkommen, setzen wir ein j.

§. 6. Sphargis, Testudo coriacea j. ganz umständlich beschrieben, auch mit der Anatomie. Länge 4½; eine andere 7' lang und doch nicht ausgewachsen. Die ganze Geschichte ist dabei.

§. 12. Chelonia imbricata j., viridis j., cephalo.

§. 27. Trionyx ferox, niloticus, stellatus j. (cartilaginea, boddaertii, membranacea, rostrata, javanica), subplanus, gangeticus, granosus.

§. 36. Emyd serpentina, fimbriata (Chelys), tetraonyx, longicollis (Chelodina, Hydraspis), galeata, platycephala (Rhinemys, Hydromedusa, Platemys, Phrynops, planiceps, nasuta, geoffroyana, stenops, depressa, canaliculata, rufipes, viridis, maxilliana, radiolata, terekay, pachyura), expansa (Podocnemys, amazonica), erythrocephala, arrau, dumeriliana (tracaxa, macrocephala), megacephala, spengleri (diox, crassicolis, spinosa, thuiji, basca, reevesii), tectum (dhongoka, kachuga), europaea, vulgaris j. (marmorea, rivulata), punctularia (scabra), picta, mühlenbergii, scoparia (concentrica), serrata, reticularia, geographica, scortipoides (Kinosternon), odorata (pennsylvanica, glutinata, Staurotypus triporeatus, boscii), punctata, couro (amboinensis, bicolor, Sternotherus trifasciatus), trijuga, clausa (virgulata).

§. 66. Testudo tabulata (denticulata, sculpta, carbonaria, hercules, cagado, boiei, erosa, tessellata, gigantea, foveolata), graeca (marginata, Jolhaeae, Chersus), angulata (bellii, Kinyxis castanea, homeana), areolata (tetradactyla), pardalis (armata), geometrica (tentoria, stellata), Pyxis arachnoides, radiata (coui), indica (dussumieri, nigra).

Abgebildet sind:

Sphargis mercurialis mit einzelnen Theilen T. 1—3.  
Chelonia cephalo, viridis, imbricata; Trionyx granosus, ferox, Köpfe und Schüdel T. 4—6.  
Trionyx stellatus ganz T. 7.  
Emys palustris ganz T. 8 u. 9.

Dabei liegt eine große Charte zur Verbreitung der Meeresschildkröten.

Abtheilung II. 1838. Schlangen S. 81—96.

Diese Abbildungen sind sehr gezierlich und genau bis auf die einzelnen Schuppen, enthalten auch einzelne Theile, wie Kopf, After, Durchschnitte.

Japan enthält, wie schon früher bemerkt, sehr wenig Schlangen, und diejenigen, welche Seba dahin gesetzt, sind zum Theil aus andern Gegenden. Erst im Jahre 1824. brachte Blomhoff eine Sammlung nach Holland, welche Boie in der Jfis 1826. S. 206 bestimmt, aber auch andere darunter gemengt hat, was nun durch Siebolds und Bürgers Sammlungen entschieden werden konnte.

Es gibt dasebst nur 6 Gattungen, alle neu, und 4 im Meer, schon bekannt, aber schlecht abgebildet. Hier bekommen wir von allen gute Abbildungen.

S. 83. *Coluber virgatus* ist die größte Schlange in Japan. Gegen 6' lang, entspricht der vierstreifigen Gattung in Europa.

S. 84. *C. quadrivirgatus* L. 1. Boie Jfis 1825. 209., ziemlich wie die vorige.

S. 85. *C. conspiciatus* L. 3. Boie Jfis 1826. 211., mahnt an *C. leopardinus*.

S. 86. *Tropidonotus tigrinus* L. 4. Boie Jfis 205., ähnelt dem *Coluber natrix*.

S. 87. *Tropidonotus vibacari* L. 5. Boie Jfis 207.

S. 88. *Trigonoccephalus blomhoffii* L. 6. Boie Jfis 214.

S. 89. *Hydrophis striata* L. 7.

S. 90. *H. pelamis* L. 8. (*Anguis platura*, *Pelamis bicolor*.)

S. 91. *H. pelamoides* L. 9. (*Hydrus major*, *Lapemis hardwickii*.)

S. 92. *H. colubrina* L. 10. (*Platurus fasciatus*.)

Länge 4', soll jedoch viel größer werden. Hat Aehnlichkeit mit *Bungarus*, besonders in den Schuppen. Die Bauchtafeln sind größer als bei den andern *Hydrophis* und könnte deshalb wohl als eigene Sippe bleiben.

### Abtheilung III. Eidechsen und Frösche 95.

Eidechsen gibt es nur drei Gattungen.

S. 99. *Scincus quinquelineatus* L. 1. F. 1—4. Auch in Nordamerika.

S. 101. *Lacerta tachydromoides* n. F. 1—7; kleiner als unsere.

S. 103. *Platydictylus jamori* (japonicus) n. Taf. 2. F. 1—4.

S. 105. Froscharten. Sind die zahlreichsten, und stimmen zum Theil mit den europäischen und nordamerikanischen überein.

1) *Bufo vulgaris japonicus* (praetextatus) L. 2. F. 5 und 6.

Hier kommen nützliche Bemerkungen über die Synonyme vor.

Eierlegen sind:

*Bufo aqua*, *marinus*, *maculiventer*, *scaber*, *dorsalis*, *ornatus*, *albicans*, *ictericus*, *scabiosus*, *semilineatus*, *cinctus*.

*Bufo vulgaris*, *roeselii*, *roseus*, *spinosus*, *arabicus*, *pantherinus*.

*Hemiphractus* ist eine junge *Ceratophrys*.

*Rana marginata*, *ocellata*, *sibilatrix*, *gigas*, *coriacea*, *pachypus*; *Doryphorus*.

*Rana rugiens*, *pipiens*, *virginica*.

*R. cancrivora*, *limnucharis*, *rugulosa*, *vittigera*.

*Hyla palmata*, *venulosa*.

*H. tinctoria*, *nigerrima*, *trivittata*.

*H. bicolor*, *femorialis*, *hypochondralis*.

*H. punctata*, *variolora*, *luteola*.

*H. leucomystax*, *quadrivirgata*, *leucopogon*, *quadrilineata*, *maculata*.

S. 100. *Rana esculenta* L. 3. F. 1., wird dasebst gegessen.

*R. temporaria* F. 2.

S. 110. *R. rugosa* n. F. 3 u. 4.

S. 112. *Hyla arborea* F. 5 u. 6.

S. 113. *H. bürgeri* n. F. 7 u. 8. Hat Aehnlichkeit mit *H. versicolor* in Nordamerika; hinten eine Schwimmhaut, vorn keine.

S. 114. *Salamandra*.

Schlegel glaubt, man müsse die Wasser- und Landsalamander wegen der Uebergänge vereinigen. Sie scheinen bloß auf der nördlichen Erbhälfte vorkommen.

Die europäischen sind folgende drei:

1) *Salamandra terrestris*, *maculata*, *atra*.

2) *S. genei* (Geotriton).

3) *S. perspicillata* (*Salamandrina*).

Wassersalamander auch nur drei:

1) *S. cristata*, *alpestris*, *ignea*, *gesneri*, *marmorata*.

2) *S. taeniata*, *punctata*, *palmata*, *abdominalis*, *exigua*, *carnifex*.

3) *S. pleurodeles*.

In Nordamerika finden sich:

1) *S. punctata*, *subviolacea*, *venenosa*.

2) *S. glutinosa*, *cylindrica*, *variolata*.

3) *S. cinerea*, *fasciata*, *erythronota*.

4) *S. longicauda*.

5) *S. scutata*, *picta*.

6) *S. attenuata*.

Zu Wassersalamandern gehören:

7) *S. subfusca*.

8) *S. nigra*.

9) *S. symmetrica*.

10) *S. jeffersoniana*, *ensata*?

Dann könnte wohl der Hellbender (*Menopoma*) folgen.

Die folgenden könnte man unter eine Sippe stellen: *Proteus*, nehmlich: *Axolotl*, *Menobranchus* (*lateralis* = *tetradactylus*); *Proteus anguineus*; *Siren*, *Amphiuma*; *Lepidosiren*.

In Japan gibt es fünf Gattungen.

S. 122. *S. naevia* n. L. 4.

S. 123. *S. unguiculata* L. 5. Hat in der Jugend Nägel.

Folgende sind Wassermolche:

S. 125. *S. subcristata* L. 4.

S. 127. *S. nebulosa* L. 4.

*S. maxima* L. 6—8.

Von diesem merkwürdigen Thier hat Siebold mehrere todt und einen lebendig nach Hause gebracht. Er hatte zwei, wovon aber das Männchen das Weibchen unterwegs aufgefressen hat. Er hat Aehnlichkeit mit dem Deninger Molch und mit *Menopoma*, aber keine Kiemenlöcher; lebt im Wasser und hat einen sehr zusammengebrückten Schwanz, kleine Augen oben auf der Stirn, Naslöcher vorn an der Schnauze, Kopf sehr breit und platt; Seitenflosse zum Schwimmen.

Das kleinste Stück war 1' lang, und hatte keine Spur mehr von Kiemen, andere von Bürger eingeschickt, messen 2'.

Der lebendige hatte 1829 einen Schuh, wuchs schnell und hatte 1835 fast 3'; seitdem wuchs er nicht mehr.

Es ist ein trübes, dummes und langames Thier, welches immer auf dem Boden seines Behälters bleibt, und nur alle 5 oder 10 Minuten heraufkommt, um Luft zu schöpfen, anfangs mit der Nase, dann mit dem Maul; wenn Senken treibt er Luft aus den Lungen, wodurch ein Gurgeln entsteht. Er kann übrigens eine halbe Stunde unter Wasser bleiben. Anfangs war er gutmüthig; da er aber oft herausgenommen wurde, so wurde er endlich böse und suchte zu beißen, indem er langsam heraufstieg und plötzlich den Kopf aus dem Wasser schnellte. Auf der Reise wurde er mit Flossfischen ernährt; zwei Monate lang mußte er hungern. Er bekommt jetzt auch kleine Weisfische; frisst auch Frösche. Gewöhnlich verschluckt er 20 um ihn herumschwimmende Fischlein; dann faßt er 8 bis 14 Tage. Er verdaut so gut, daß selten ein Knochen abgeht. Er häutet sich beständig in Felsen. Außer dem Wasser schwißt aus den Hautporen etwas wenig sinkender Saft aus. Des Winters erstarrt er nicht, vielleicht, weil er in einem warmen Zimmer ist. Uebrigens haben ihn Eisrinden, welche sich in manchen Nächten des Janners 1838 bildeten, nichts gethan. Verlorene Finger oder Schwanzspitze erlesen sich bald wieder. Er kann fast gar nicht laufen. Gewicht 18 Pfd. Er hat vorn 4 Behen, hinten 5 frey; Schwanz  $\frac{1}{3}$ ; Zunge ganz mit der Maulhaut verwachsen; kleine Augenlider. Färbung dunkelbraun.

Dann folgt die Beschreibung des Knochengerüsts. Schädel ziemlich wie bey *Menopoma*. Das Pflugschaarbein vor dem Keilbein ist doppelt, vielleicht Gaumenbein, und hat am vorderen Rande eine Reihe Zähne, walzig, hohl mit Schmelz, dicht beisammen, im Oberkiefer und Zwischenkiefertrand; ebenso im Unterkiefer steht eine ähnliche Zahnreihe. Rumpfwirbel 20,

Schwanzwirbel 24 (25); wie bey *Menopoma*; sie sind vorn und hinten hohl, wie bey den Fischen und Proteiden; an allen und selbst noch an den 9 ersten Schwanzwirbeln hängt ein Rippenstummel; Brustbein, Schulter und Beckenknochen sehr abweichend. Ueberhaupt scheinen uns diese Theile noch nicht richtig erklärt. Oberarm, Speiche und Elle getrennt; ebenso Schenkel-, Schien- und Wadenbein; nirgends Fußwurzel und Mittelfußknochen; überall drey Zehenglieder, vorn die dritte mit vier, hinten die dritte und vierte [in der Abbildung hat die dritte nur drey]. Die Schwanzwirbel haben untere Stachelfortsätze, die andern nicht, aber kurze obere; die Querfortsätze überall stark. — Das Becken hängt am 21 sten Wirbel. [Die Schulter etwa am 4 ten.] Zungenbein ziemlich wie bey den Wassermolchen, hat drey Hörner, wovon das hintere zweygliebrig.

Beym Deninger-Molch findet sich viel Aehnlichkeit, besonders in der Gestalt und Zahl der Wirbel; hat auch keine Fußwurzel- und Mittelfußknochen.

Alle Abbildungen sind vortreflich gezeichnet von Doctor A. Müller, lithographirt in Siebolds eigener Anstalt. Von der *Salamandra maxima* ist abgebildet ein Junges, das ausgewachsene in natürlicher Größe, das Knochengerüst ganz, Schädel, Schultern, Becken, Zungenbein und Zähne besonders. Man muß diesem Werk in jeder Hinsicht den vollsten Beyfall göllen.

### Lethaea geognostica

über Abbildungen und Beschreibungen der für die Gebirgsformationen bezeichnendsten Verfeinerungen von Prof. H. S. Bronn. Stuttgart, bey Schweizerbart. 1835. 8. Bd. II. Bog. 61—84.

Mit dieser Lieferung ist nun dieses reichhaltige und nützliche Werk geschlossen. Es enthält das Register und das Verzeichniß der Abbildungen. Die Zahl aller Tafeln in Quart ist 47; dabey eine in Folio und 2 Tabellen. Diese Lieferung enthält Schnecken, und nachträglich Crustaceen, Spinnen und andere Insecten, Fische, Kurchen, Vögel und Säugethiere. Die Behandlung ist von uns schon früher angegeben worden; überall die Synonyme und die Fundorte mit großer Vollständigkeit. Das Werk ist einzig in seiner Art und büßt einem großen Bedürfnisse ab. Da die Entdeckungen in diesem Fache nicht aufhören, so wird der Verfasser von Zeit zu Zeit Nachträge liefern.





# Erst

## Encyclopädische Zeitschrift,

vorzüglich

für Naturgeschichte, vergleichende Anatomie und Physiologie,

von

Erst

1838.

Heft XI. u. XII.

Der Preis von 12 Heften ist 8 Thlr. sächs. oder 14 fl. 24 Kr. rheinisch, und die Zahlung ist ungetheilt zur Leipziger Ostermesse des laufenden Jahres zu leisten.

Man wendet sich an die Buchhandlung Brockhaus zu Leipzig, wohin auch die Beiträge zu schicken sind. Es wird gebeten, dieselben auf Postpapier zu schreiben.

Unfrankirte Bücher mit der Post werden zurückgewiesen.

Einschickgebühren in den Text oder Umschlag die Zeile sechs Pfennige.

Von Anticritiken (gegen Fests-Revisionen) wird eine Quartseite unentgeltlich aufgenommen.

Leipzig, bey Brockhaus.

## A n z e i g e n.

In der unterzeichneten Buchhandlung ist erschienen und in allen soliden Buchhandlungen zu haben:

### S u p p l e m e n t

zu

### Schillers sämtliche Werke.

Neue Taschenausgabe.

#### Inhalt:

- 1) Friedrich von Schillers Briefwechsel an den Freyherrn Heribert von Dalberg.
- 2) Demetrius. Ein Trauerspiel, nach dem hinterlassenen Entwurfe des Dichters bearbeitet von Franz von Maltiz.

Dieses interessante Supplement ist der in der Gotta'schen Buchhandlung erschienenen neuen Taschenausgabe von Schillers Werken in 12 Bänden ganz gleich, in Umschlag broschirt und kostet 27 fr.

D. R. Marrische Buchhandlung  
in Carlstraße und Baden.

### Histoire naturelle des Poissons

d'eau douce de l'Europe centrale par LOUIS AGASSIZ.

Der Verfasser sammelt bereits seit dem Jahr 1830 an den Süßwasserfischen von Europa. Er hat sie nach dem Leben malen lassen, und sie werden mit Farben gedruckt. Davon hat er bey der Versammlung der Naturforscher zu Freyburg im Breisgau Muster gezeigt, welche allen Beyfall eingearntet haben. Jede Gattung wird wie eine besondere Monographie bearbeitet mit Bemerkungen über ihre geographische Verbreitung, Lebensart, das Laichen, die Entwicklung, den Gang und den Nutzen.

Am Schlusse des Ganzen werden allgemeine Betrachtungen über die ganze Classe folgen. Herr Dinkel hat sie alle gezeichnet, und Herr Nicolet wird sie drucken. Dazu kommen Durchschnitte und Abbildungen der Schuppen, so wie der Flossen u.dgl. Sie erscheinen Heftweise, die Tafeln in 4., der Text in 8. Jede Tafel von gewöhnlichem Belinpapier nebst Text kostet 3 Fr.; auf besserem Papier 4., auch der Text in 4. 6. Die schwarze Tafel kostet die Hälfte. Die Zahl der Tafeln ist 90, wird in 2 Jahren fertig seyn und ungefähr 250 Fr. kosten. Das erste Heft enthält die Salmen. Man unterzeichnet beym Verfasser zu Neuenburg in der Schweiz und bey Schmerber zu Frankfurt.

Im Verlage der unterzeichneten Buchhandlung ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen vorrätig:

### Ernst und Laune

aus meinen alten Papieren.

Von W. Reinhard, ehemal. Staatsrath. Zwey Bändchen. Elegant broschirt. Preis fl. 4. in D. R. Marrische Buch- und Kunsthandlung in Carlstraße und Baden.

Bev D. M. Rasenhauer zu Erlangen, der kürzlich eine Reise nach Ungarn machte, sind Vögel von nachstehenden Vögeln um die beygesetzten Preise zu haben:

Ardea purpurea juv.	2 fl. 30 fr.	Carbo cormoranus	4 fl.
A. garzetta mit den Federn	7 fl.	Glareola torquata	2 fl.
— juv. ohne Federn	2 fl. 30 fr.	Pelecanus onocrotalus	18 fl.
— ralloides	2 fl.	idem etwas defect	12 fl.
— nycticorax	2 fl.	Ciconia nigra	3 fl.
— juv.	1 fl. 30 fr.	außerdem noch	
Ibis falcinellus	3 fl. 30 fr.	Arctomys citillus	1 fl. 30 fr.
— juv.	2 fl.	Spalax typhlus in Weingeist	5 fl.



Seite	
785	Buquoy, Skizze der Thierwelt.
790	Derselbe, Beantwortung über Unfreyheit.
792	Bücher: F. Schreiber (Taschenbuch), Rupp, Perty, Prinz Mar von Bied, Fürnrohr, Bulletin de Moscou, Liebig und Poggendorf, Geognostische Charte von Sachsen, Humboldt, Ehrenberg und Rose, Bockland. — Verleb, Endlicher, Lindley u. Bauer, Corda, Rotaris, Bruch und Schimper. — Schulz, de Candolle, Agardh, Meyen, Treviranus, Rappail, Dutrochet, Link, Kunth, Berchold u. Dpiz, Forsten, Heget- schweiler, Sturm, Link. 847 Zetterstedt, Fischer, Agassiz, Gould, Zander, Tschudi, Guérin, Germar, Grube, Mayer, Herold, Plattner, Lessing, Grabau, Wilhelmi, Kerthoven, Gutschhoff. 798 Chaudoit, Feronia. 800 Eichwald, Fauna des caspischen Meers. 802 Harzverein. Ahrend, Gebirgs geschichten am Adenberg. 803 Carefen, Blatt- und Holzwespen; Elater heyeri, Fig. 820 Zoological Transact. II. 2. — Garner, Anatomie der Muscheln. 831 Owen, seltene Dintenschnecken. 838 F. Cuvier, Springmäuse. 842 Waterhouse, Myrmecobius. 845 Westwood, heilige Käfer. 849 Gould, Vögel aus Australien. 852 Tschudi's Classification der Batrachier. 860 Gedichte auf die Versammlung zu Prag von Kump, Die- trich, Taucher. 865 Register über die Vorträge in allen Versammlungen der Na- turforscher und Aerzte von 1822 — 1837. 941. Hauptregister des ganzen Jahrgangs 1838.

**XI. u. XII. Supplement zu Schillers sammtl. Werke; Agassiz, Histoire naturelle des Poissons; W. Reinhard, Ernst und Laune; Vögelbalg-Verkauf von D. W. Rasenhauer.**

## Verfess'r.

Wegen vieler Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten in der Versendung wird künftig kein Frey-Exemplar mehr an die Mitarbeiter geschickt, sondern nach getroffener Uebereinkunft der Druckbogen mit sechs Reichsthalern Conv. Münze honorirt.

## Eingegangen:

### An Zeitschriften.

Poggendorfs Annalen der Physik 1837. Nr. 13. 1838. Nr. 2—8.  
Brandes Archiv der Pharmacie 1837. 10. 11. 12. 1838. 1—3.  
Pharmaceutische Zeitung 1838. Nr. 8—18.  
Richters preussische Provinzialblätter 1838. Mai.  
Blätter für literarische Unterhaltung 1838. April—October.  
Savoye, Panorama de l'Allemagne I. 1838. 10. 2 Tafeln.  
Guérin, Revue Zoologique Paris 1838. No. 1—8. 10.  
Bulletin de la société des Naturalistes de Moscou 1838. 8. No. II. III. p. 111—334. 1 tab.  
Germar, Zeitschrift für die Entomologie. Leipzig bey Fleischer. I. 1839. 8. 196. 2 Taf. (1 tfl. 4 gr.)

1838.

H e f t X I.

## S k i z z e d e r T h i e r w e l t .

Vom Grafen Georg von Buquoy.

Aus der stetig fortgesetzten Zusammentragung und Systemisirung des an der wirklichen Erscheinungswelt empirisch Erfaßten, im schlichten Sinne bloßer Beobachtung, ohne Verunreinigung derselben durch Hypothesen oder irgend vorgefaßte Ansichten, geht unterm Innern ein Totalbild auf, das, als ein harmonisches Ganzes in Eines zusammengefaßt, uns einen gewissen richtigen und dabey äußerst feinen Naturtact verleiht, und an sich — als Urnorm unseres Philosophirens über Natur — dienen kann, das zu solchem Principe um so tauglicher ist, insoferne doch die Resultate des Philosophirens Wahrheiten und nicht Chimären seyn sollen, als jenes Totalbild aus der Wirklichkeit unmittelbar hervorgieng, und folglich wieder zurück auf die Wirklichkeit passen muß.

Ich begnüge mich hier, aus dem unübersehbaren Bilde der Erscheinungswelt bloß jenes der tellurischen Thierwelt auszuheben, dieses nur zu skizziren, und zwar wesentlich mit Beziehung auf vergleichende Anatomie.

Das gesammte Thierreich unseres Planeten erscheint dem im Sinne vergleichender Anatomie des Beobachtenden — unter zwey Hauptabtheilungen, als Anverbraten und als Vertebraten; erstere sind (mit Ausnahme einiger Würmer) weißfalteblütig; letztere theils rothfalteblütig (Fische und Reptilien), theils rothwarmblütig (Vögel und Säugethiere). Die Anvertebraten oder Skeletlosen athmen theils durch Tracheen, und besitzen dann kein eigentliches Herz und Circulationsystem, theils durch Kiemen, und besitzen dann Herz so wie Circulationsystem; keinen von beeden kommt Stimme zu. Die Vertebraten oder Skeletthiere athmen entweder durch Kiemen und haben dann keine Stimme, oder durch Lungen und haben dann Stimme; beeden entspricht Herz und Circulationsystem. Die

Anvertebraten haben ein bloßes Gangliensystem, einen Bauchmarkstrang (Analogon des großen Sympathicus); die Vertebraten nebstdem auch ein Cerebralsystem, das mit dem Gangliensystem durch den Vagus verbunden ist. . . Bey erstern versorgt das Gangliensystem sowohl die vegetativen als die Sensibilitäts-Organe, bey letztern hingegen versorgt das Gangliensystem wesentlich die Organe der Eigen- und Gattungs-Reproduction, das Cerebralsystem wesentlich die Sinneswerkzeuge und spontoseisfischen Muskeln; \* an diesem Cerebralsystem manifestiert sich wesentlich die Selbstbewußtseynsthätigkeit, welche am Menschen ihren Culminationspunct erreicht. Insoferne der Kopf sich durch Hirneinschließen charakterisiert, haben eigentlich bloß die Vertebraten einen Kopf, einen mit Greifwerkzeugen versehenen Knaul, den wir Greifknaul nennen wollen, \*\* nach dessen Kostenkung vom übrigen Körper das Thier oft noch einige Zeit fortlebt, und zwar mit Aeußerung von Spontoseisemus. Das Knochensystem der Vertebraten gehört dem spontoseisfischen Muskel- und Nervensystem an, hingegen fallen die äußern harten Theile mancher Anvertebraten, z. B. der Testaceen, Crustaceen, Insecten, dem Hautsystem zu. Hinsichtlich der Zeugung bestehen bey den Anvertebraten theils Monogenisten, theils Hermaphroditen, theils Digenisten, hingegen bey den Vertebraten bloß Digenisten (Ovipare mit theils äußerer, theils innerer Zeugung und Vivipare). Bey den Vertebraten prädominirt das Sinnen-, das Willen- und Verstandleben, besonders am Men-

\* Spontoseisfische oder willkürlich bewegliche Muskeln stehen im Gegensatz zu antspontoseisfischen oder unwillkürlich bewegten, z. B. die Armmuskeln zu den Herzmuskeln am Menschen.

\*\* Bilden hier nicht die Cephalopoden eine Ausnahme?

sehen, hingegen bey den Unvertebraten das reproductive Leben, besonders an den Zoophyten und namentlich an den Polypen; nur an den Insecten besteht nebstdem auch noch ein ausgezeichnetes (mit dem hoch entwickelten Gangliensystem harmonisierendes) Instinctleben. Der Taft- und Geschmacksinn findet sich bey allen Thieren, die übrigen drey Sinne fehlen häufig, jedoch nie bey den Vertebraten. Die äußern Feßwerkzeuge sind bey den Vertebraten stets zwey horizontale ab- und aufwärts bewegliche Kinnladen; nicht so ist es bey den Unvertebraten. Mund und After sind bey den Vertebraten stets einander entgegengesetzt; bey manchen Unvertebraten gibt der Mund zugleich den After ab, z. B. bey Meersternen, Quallen usw.; bey andern ist er an einer Seite des Körpers usw. Zwey Nieren und zwey Hoden kommen allen Vertebraten zu. Nieren finden sich nie bey Unvertebraten, auch kein Harn.

**Säugethiere.** Prädominierendes Selbstbewußtseynsleben. Lebendgebärend. Zweyfärmige Gebärmutter und stets eine Nische. Complicirtes Gehirn. Zwerchfell trennt lungenfassende Brusthöhle von Bauchhöhle; nur ein Kehlkopf am obern Theile der Trachea; stets Lippen. Ghytus der Milchgefäße milchweiß und undurchsichtig. Milz allemal links. Die Fleischfressenden haben vollkommenes Gebiß und kürzern Darmcanal als die Pflanzenfressenden; \* erstere sind mit Klauen, letztere mit Hufen versehen; erstere haben kleinere vordere Bierhügel (im Gehirn) als letztere. \*\*

**Vögel.** Prädominierendes Lungen- und überhaupt Irribilitäts-Leben. Eyerlegend. Nur ein einziger Oviductus. Gehen auf Hinterfüßen; die Arme sind zu Flügeln entwickelt. Luftröhren. Kehlkopf doppel, nemlich oben und unten an Trachea. Federbedeckung. Zahnloser Schnabel. Ghytus der Milchgefäße durchsichtig. Kloake gemeinschaftliche Höhle für Harn, Excremente und Eyer. Bey Raubvögeln kürzerer Darmcanal und durchaus häutiger Magen; bey übrigen Vögeln häufig musculöser Magen, besonders bey Körnerfressenden.

**Reptilien.** Prädominierende Venosität. Auffallende Verschiedenheiten in dieser Classe. Kleines Gehirn. Nur ein Theil des venösen Blutes gelangt in die Lungen, daher kaltes Blut. Zwey Ovarien, zwey Oviducte. Kröte und Salamander athmen anfangs durch Kiemen, erst später durch Lungen (Larvenzustand).

**Fische.** Prädominierendes Leberleben. Athmen durch Kiemen, daher kaltes Blut. Zwey Ovarien. Schuppenbedeckung oder nackte knochige Zunge. Knorpelfische, Knochenfische.

**Cephalopoden,** z. B. Sepien, sind als der Uebergang zu betrachten von den Vertebraten zu nachfolgenden Unvertebraten; dreyfaches Herz.

**Insecten und Arachniden.** Prädominierendes Tra-

cheal-Respirationsleben und Spontoseitliches Muskelleben, dann Ganglien- und Instinctleben. Metamorphose (Larve, Puppe, vollkommenes Insect). Fast durchgehends häutige Flügel. Häufig harte Flügeldecken. Tracheenathmung, weder Herz noch Circulation. Langer knotiger Bauchmarkstrang. In den drey Zuständen der Metamorphose sind besonders die äußern Feßwerkzeuge und der Darmcanal auffallenden Veränderungen unterworfen; dieß zeigt sich vorzüglich bey Scarabäen und Schmetterlingen.

**Krustaceen.** Prädominierendes Hautleben; die Haut erscheint in ihren oftmaligen Metamorphosen bald weich, bald erhärtet. Schuppenstücke äußerlich, die häufig sehr künstlich in einander gefügt sind. Manche Krustaceen haben viele artikulirte Glieder. Langer, knotiger Bauchmarkstrang. Fühlhüner und Feßspitzen. Kiemenathmung; oft sehr viele Kiemen, selbst an den Füßen. Transversale Kinnladen. Mit zahnartigen Verhärtungen besetzter Magen. Zwey Ovarien; zwey Ruten.

**Mollusken.** Prädominierendes Drüsenleben. Kiemenathmung. Fleischtig weicher Ganglienkranz um Oesophagus und zerstreute Ganglien nach der Bauchseite zu. Mehrere Acephalen bleiben beständig an Felsen befestigt. Zu den Mollusken lassen sich auch die Cirripeden zählen.

**Würmer.** Prädominierendes Ganglienleben bey den höheren, hingegen Pflanzenleben bey niederen \* Viel Aehnliches mit Insectenlarven, aber keiner Metamorphose unterworfen und mit unentwickelteren Organen des Spontoseismus versehen. Manche so nervenarm beynahe wie Zoophyten.

**Zoophyten.** Prädominierendes Pflanzenleben. Sternförmig, Mund in der Mitte der Radien. Weder Herz noch Circulationsystem. Keine Spur von Nerven. Entstehen häufig ursprünglich durch generatio aequivoca. Die zu dieser Classe gehörigen Thiere weichen im Bau sehr von einander ab.

Wenn ein nicht mißgebildetes, sondern normal gebildetes Thier in einer der mannichfachen Beziehungen von den übrigen Thieren derselben Classe abweicht, so ist solche Abweichung allemal nur äußerlich scheinbar; die Analogie des Baues tritt sogleich wieder hervor, so wie man den innern Bau anatomisch würdigt, z. B. bey Cetaceen, die Säugethiere sind bey äußerer Fißhform. Die Thiere characterisiren sich vorzüglich durch ihre Innerlichkeit, die Pflanzen hingegen vorzüglich durch ihre Außerlichkeit. Dem Menschen, als höchstes Thier — entspricht die vollendetste — Innerlichkeit; Superlativ von Selbstbewußtseynsthätigkeit.

Eigentliche Zähne besitzen nur die Säugethiere, \*\* Repti-

\* Am ganzen Thierreiche ist der Darmcanal der Fleischfresser kürzer als jener der Pflanzenfresser.

\*\* Aehnliches Hirnverhältniß bey Fleisch- und pflanzenfressenden Fischen.

\* Die höheren wären den Mollusken vorzusetzen, die niederen nachzusetzen.

\*\* Es gibt indeß auch gänzlich zahnlose Säugethiere, als die Ameisenfresser, Schuppenthiere, Walfische.

ten \* und Fische in Kiefern, endlich die Schinodermen (zu Zoophyten gehörig) in eigenen, nicht als Kiefern zu betrachtenden Organen. \*\* Zahnartige Erhabenheiten und Verhärtungen z. B. innerhalb des Schnabels mancher Vögel, oder innerhalb des Magens der Krebse usw. gehören nicht hieher. Der eigentliche Zahn entwickelt sich, als Krone und Wurzel, aus der in der Zahnhöhle schon am Fötus sich bildenden weichen Gallert; solche Zahnentwicklung erfolgt von außen nach innen zu. Es gibt einfache und zusammengesetzte (aus mehreren Theilen zusammenge kittete) Zähne. Die Zähne der Fische stecken theils im Zahnfleisch, theils in den Kieferknochen, und verwachsen dann bis zur Untrennbarkeit mit denselben; daher geschieht hier der Zahnwechsel durch Abbrechen des alten Zahnes von seinen Wurzeln und durch Hervorschießen des jungen hinter jenen oder mitten durch jene Wurzeln. Die Zähne der Carnivoren entwickeln Krone und Wurzeln zugleich und behalten fortan ihre Gestalt; die Zähne der Herbivoren hingegen ändern bald ihre Gestalt durch Abnutzung, und erst nach beynahe abgenutzter Krone entwickelt sich die Wurzel. Bey der fortwährenden Entwicklung der Kinnladen der Säugethiere füllt sich allmählich die Zahnhöhle von unten hinaus aus, hiedurch wird der Zahn nach und nach gehoben, wird scheinbar länger und fällt endlich im Alter aus.

In Uebereinstimmung mit dem Gesehe, daß der sich entwickelnde Embryo allmählich die Stufenleiter der gesammten Thiergruppe in aufsteigender Richtung wiederhole, steht folgende Erscheinung: bey der aufsteigenden Thierreihe erscheint zu unterst das Männliche und Weibliche nur verworren characterisirt; mehr entschieden characterisirt bey den höheren Thieren, bis endlich am Menschen, Mann und Weib vollkommen characterisirt, jedes für sich hervortreten. Dieser Reihe analog ist der männliche Menschenembryo anfangs, den Genitalien und dem Gesammthabitus nach, unentschiedenen Geschlechts, wird aber allmählich mehr und mehr entschieden männliches. Der weibliche Menschenembryo ist anfangs, den Genitalien und dem Gesammthabitus nach, unentschiedenen Geschlechts, wird aber allmählich mehr und mehr entschieden weibliches. Selbst der sich entwickelnde Knabe streift allmählich die noch rückgebliebenen Züge der Weiblichkeit von sich ab und erhebt sich zur vollen Männlichkeit; und eben so besrept das sich entwickelnde Mädchen sich allmählich von den noch rückgebliebenen Zügen der Männlichkeit und erhebt sich zur vollen Weiblichkeit. Junge Mädchen haben noch etwas Knabenhaftes; junge Knaben noch etwas Mädchenhaftes. Letzteres veranlaßt von Alters her Päderastie.

Bey auf niederer Stufe des Thierlebens Stehenden und dafür vegetativ höher Gestellten, ist die Fruchtbarkeit größer als bey auf höherer Stufe des Thierlebens und dafür vegetativ niedriger Stehenden; \*\*\* ferner bey Wassertieren größer als

bey Landthieren; ferner bey plastischen Thieren (wo Reproduction prädominirt) größer als bey irritabeln (wo Ateriosität und spontaneifische Muscularität prädominirt), z. B. bey Herbivoren größer als bey Carnivoren, unter den Säugethiern.

Kunsttriebe entsprechen unter den Säugethiern beynahe nur einigen Nagern, z. B. dem Biber, dem Pfeisfahen usw.; weit mehr entsprechen die Kunsttriebe den Vögeln; ganz vorzüglich aber den Insecten, z. B. den Ameisen, Bienen usw.

## Beantwortung

des meine Ansichten über menschliche Unfreyheit bekämpfenden Aufsatzes (Zf. II. Heft III. 1838, S. 161).

von Grafen Georg von Buquoy.

Übermals des Genusses theilhaft, mich mit Herrn L. in philosophisch wissenschaftlichen Diapport setzen zu können, erwidere ich auf dessen oben citirten Aufsatz Folgendes:

Leider lassen sich die, aus meinem großen philosophischen Werke, bloß ausgehobenen Sätze — erst dann recht verstehen, wenn ich jenes Werk werde öffentlich bekannt gemacht haben. Da jedoch dieses sobald nicht geschehen dürfte, so gedente ich, binnen Kurzem, einen systematischen Ueberblick des Allerwesentlichsten aus jenem Werke, als Prodomus zu einer Reform in der seit Jahrtausenden üblichen Philosophierens-Methode, an die Redaction der Zf. einzuwenden, und hoffe dann richtig verstanden zu werden, und so — Einverständnis mit meinen Behauptungen bey meinen Lesern zu erlangen. Bis dahin — bitte ich dieselben, namentlich den von mir hochgeehrten Herrn L., sich an folgende — Sätze, ihrer tiefen Bedeutung nach, zu gewöhnen; ich sage, zu gewöhnen, denn sie passen in die bereits durch Obervanz sozusagen legitim gewordene Philosophierensweise durchaus nicht, vorzüglich nicht in die seit Plato üblich gewordene, der dem Dunkel des Menschen, in portigem Pathos, manch Hinreißendes zwar vordclamirte, aber häufig — mehr als Dichter denn als Philosoph sprach, und sich — allzulehst hingeworfener Nachsprüche — schuldig machte. Meine nächsten profaischen Sätze lauten so:

Der Mensch — steht nicht über der Natur, nicht außer der Natur, — er ist integrierender Theil nur — der Natur; er ist durch und durch bedingt beschränkend; natürlich naturhaft grozischhaft. Unbedingt unbeschränkt unendlich, nicht mehr naturhaft, nicht mehr grozischhaft, metaphysisch — ist nur das Univerfum, dieß, dem Raum und der Zeit nach, als Unendliches genommen, welches dann Gott das Absolutum zu benennen ist, die unendliche All-Leiblichkeit und All-Selbstbewußtheit. Am Menschen ist Alles, selbst das transcendente Denken, bestimmten

\* Die Schildkröten besitzen keine Zähne. Die Kinnladen bedeckt ein hörnerner Ueberzug, der öfters durch Einschnitte zahnnähnliche Hervorragungen bildet.

\*\* Die knöcherne äußere Hülle dieser Thiere hat eine Dehnung, welche durch die Mundmasse verschlossen wird; die knöcherne Grundlage dieser Masse, ähnlich einer fünffleisigen Laterne, trägt 5 bewegliche Zähne usw.

\*\*\* Das höchste Beyspiel der Fruchtbarkeit am menschlichen

Weibe fürs ganze Leben ist 60 Kinder, indeß ist die gewöhnliche Anzahl Junge bey gewissen Vögeln bis 20,000.



Gesetzen (besser Naturnothwendigkeitsnoemen) unterworfen, nämlich das Denken — den logischen Gesetzen; wie das Denken — ist auch das jedesmalige im Menschen sich gestaltende **Wollen** — Gesetzen der **Nothwendigkeit** unterthan, das **Wollen**, das nicht der Mensch in sich — selber schafft, sondern — das dem Menschen sich aufzwingt so oder so, nach Maßgabe der jedesmaligen Combination aus seiner individuellen **Geartung** und aus der **Summe von** **Influenzen** auf ihn. Der Mensch handelt insofern **frei**, als er nach seinem Willen (dem primären oder secundären) handelt; aber der Mensch ist, hinsichtlich des Zustandbringens seines **Wollens** — gänzlich unfrei. Der Mensch vermag **Metaempirisches** aus sich heraus zu produciren zwar, aber nie — **Metaphysisches**, d. h. nicht mehr **Naturhaftes**, nicht mehr **göttliches**. Von Gott dem Absolutum, vom **Metaphysischen**, kann der Mensch bloß den **Einsatz** haben; daher sage ich als Mensch: **Alles meine Metaphysik** — reducirt sich auf bloß gläubig von mir erhörte göttliche Offenbarung, wenn es doch ja eine solche Offenbarung für mich gibt; gibt es keine, so reducirt sich all meine **Metaphysik** — auf ein **leeres Nichts**. Da Gott das Absolutum, als Unbeschränktes, durch kein zweytes Seyn — in seinem Seyn — beschränkt seyn kann, sondern nothwendig das einzige Seyn ist, — so ist entweder das als **unendlich gedachte Universum selbst** — Gott, oder — es existirt nur Gott, und dem Universum — kommt dann Fein Daseyn zu. Gott und Welt annehmen, — dieß ist ein **Abwurdum**. Entweder ist die **Welt selbst** — Gott, oder nur Gott besteht, und die **Welt** ist **existenzlos**, sie ist dann gleichsam ein aus Gott heraus emanirter ewiger Gedanke ufw. Doch! ich verliere mich hier in Sätze, die nicht zu meinem Thema mehr gehören; ich eile daher zur **unmittelbaren** Beantwortung des oben erwähnten Aufsatzes selbst.

Die **Unfreyheit** des Menschen sehe ich **eben nicht** **darein**, daß er, über gewisse **Grenzen** hinaus, nicht mehr **frei** seyn soll, wie man sagt, sondern **darein**, daß, auch bey der tugendhaftesten Weise seines **Wollens** und **Handelns**, bey dem staunenswerthesten Grade durch ihn kund gegebener **Selbstbeherrschung** (wie man sich **unrichtig** ausdrücken pflegt), er keineswegs als **frei**, sondern — als **sepend** von **würdevoller Geartung**, sich erwiesen habe. Wenn ein bestimmtes **Wollen** in mir zu **Stande** kommt, so geht allemal **solchem Zustande** kommen, meinerseits, ein **Wahlact** voran, wo **zwey** einander **widersprechende** **Lectionen** (z. B. nach — Nachgeben an meinem Feinde, oder nach — Gutes Erweisen meinem Feinde) meinem **Begehrungsvermögen** vorschweben; geht nun als **Resultat** eines **Wahlactes** ein solches **Wollen** und **Handeln** meinerseits hervor, daß, mit **Hinansehung** der bösen Anlockung, die der **Tugend** entsprechende **Lection** — in mir das **Uebergewicht** erhält, welches **Resultat** so und nicht anders — **sich mir aufdringt**, **nicht** **etwa** nach meinem **Belieben** — **so** und nicht anders **ausfällt**, — so habe ich **nicht** eine mir **inwohnende Freyheit** beurlundet, sondern — eine mir **zukommende** **würdevolle Geartung**, laut welcher — die **Lection** zum **Bösen**, in mir, gar nicht die **Ueberwucht** erlangen kann, man merke wohl, **gar** nicht kann, und dieß gar — **meiner Geartung** nach. Wollte ich da sagen: Ich bin ein **freyes Wesen**, denn das **gute Princip** hat in mir das **böse Princip** be-

siegt, — so könnte derjenige, an dem, in gleichem Falle als ich, ein **entgegengesetztes Wollen** und **Handeln** als **Resultat** seines **Wahlactes** hervorgegangen wäre (der sich z. B. an seinem Feinde rächen möchte), mit eben dem **Rechte** ausrufen: Ich bin ein **freyes Wesen**, denn das **böse Princip** hat in mir das **gute Princip** besiegt; in **frechem** **Hohne** könnte er noch hinzusetzen: Ich war **nicht schwach** genug, um mich durch **Gefühlsfascley** einlullen zu lassen ufw.

Wollte man jedes **Wesen** — **frei** nennen, das innerhalb gewisser **Grenzen** einen gewissen Grad **innerer Selbstbestimmung** äußert; so wäre auch die, nach bestimmter **geometrischer Form** zu **Erstallen** anschließende **Mutterlauge** — als ein **freyes Wesen** — zu erklären, da sie ihren **Erstallisationsstypus** sehr **bestimmt** jedesmal äußert (hieft z. B. das **Kochsalz** stets in **Würfeln** an), wo nicht allzu große **Hemmnisse** von außen eintreten; geringere **Hemmnisse** überwältigt sie sogar, indem sie, ist sie während des **Erstallirens** ringsum eingeschlossen, nicht selten die **Hülle sprengt**.

Einen noch **höhern Grad** von **Freiheit** in eben erwähntem Sinne (nämlich **Freiheit** — falsch ausgedrückt) äußert die **Pflanze**, die, wenn äußere Umstände nicht allzu ungünstig auf sie einwirken, aus **manchfachen** verwesenden **animalischen** und **vegetabilischen** Stoffen im **Humus** — stets ein und dieselben **Säfte** nur — **bereitet** ufw.

Ich denke, mit dem **wenigen** hier **Ge-sagten** — **sattsam** erwiesen zu haben, daß zwischen Herrn L. und mir — nicht **Verschiedenheit** der **Ansicht** herrsche, sondern, daß Herr L. bloß, statt des **Ausdruckes** **moralische Würdigkeit**, — nicht ganz richtig des **Ausdruckes** **moralische Freyheit** — sich bedient. **Hiernach** möchte aber Herr L. sich leicht mir **verständigen** hinsichtlich der **sämmtlichen** **Einwürfe**, die sein Aufsatz gegen meine **Ansichten** enthält; es deucht mich daher **überflüssig**, noch **weiter** über diesen **Gegenstand** zu **sprechen**.

## Taschenbuch

für **Geschichte** und **Alterthum** in **Südbuttsland**. Herausgegeben von Dr. **Heinr. Schreiber**. **Freyburg** bey **Emmerling**. 1839. 392. 1 **Tafel**.

Ueberall haben sich in **Deutschland** **historische**, vorzüglich **antiquarische** **Gesellschaften** **zusammengethan**, um das **Dunkel** unserer **Geschichte** aufzuhellen und die **Belege** dazu aus der **Erde** zu **graben**. Häufig erscheinen in allen **Provinzen** **Berichte** über die **Thätigkeit** dieser **Gesellschaften**. Es ist daher an der **Zeit**, die **Ergebnisse** dieser **rafflosen** **Forschungen** **zusammenzustellen** und daraus **Folgerungen** für den **ehemaligen** **Zustand** unseres **Vaterlandes** zu **ziehen**. Für das **südtliche** **Deutschland** ist dieses **Taschenbuch** ein **willkommener** **Vereinigungspunct** für alle, welchen die **Vorzeit** am **Herzen** liegt und welche ein **Scherfflein** aus derselben bezutragen haben. Dieser erste **Band** enthält zwar nur **Aufsätze** von dem **Herausgeber**; das **Werk** steht aber jedem **offen**, der **darein** **arbeiten** will.

Voran eine ausführliche Geschichte von Balthasar Hubmaier, Stifter der Wiedertäufer auf dem Schwarzwalde, größtentheils aus ungedruckten Quellen in den Archiven von Freiburg, Basel, Waldshut, Schaffhausen und Zürich. Es ist ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der Religionskämpfe in Deutschland.

S. 131 folgt eine sehr lehrreiche Untersuchung über die Keltengräber am Oberrhein mit einem Vorwort über die ältesten Nationalwaffen der Kelten und Germanen. Es wird wenig Alterthumsforscher in Deutschland geben, welche selbst so viele Ausgrabungen und in so verschiedenen Gegenben veranstaltet haben, wie der Herausgeber. Er selbst besitzt eine reiche Sammlung von solchen Alterthümern, theils aus Gräbern, theils aus untergegangenen Städten, sowohl aus dem Weissgau als dem Elsaß, aus Schwaben und der Schweiz. Es war ihm daher möglich, die gefundenen Gegenstände zusammenzustellen und daraus auf die Völker zu schließen, denen sie angehören. Er hat ein Unterscheidungszeichen gefunden, welches, wenn es sich bewährt, von großer Wichtigkeit seyn wird für die Entscheidung, ob ein Grab keltisch oder germanisch ist, und welches Volk mithin in diesem oder jenem Lande gelebt, wie weit es sich ausgedehnt, in welchem Culturzustande es sich befunden hat u. s. w. Dieses Zeichen besteht in der Hauptwaffe eines jeden Volks; die Kelten hatten nemlich nach ihm den Streitmeißel (Celtis) aus Erz; die Germanen dagegen den Streithammer aus Stein. Die Kelten waren ein in Metallarbeiten sehr geschicktes und zugleich sehr schmuckfüchtiges Volk. Er unterscheidet Hügel- und Furchengräber, und hält die letztern für solche, worinn schon christliche Spuren vorkommen.

Dieser Aufsatz enthält einen Reichthum von Gelehrsamkeit und ist für das Alterthum des Oberrheins sehr wichtig. Fast möchte man aber bedauern, daß nach diesen Untersuchungen soviel wie gar keine Ueberbleibsel der alten Germanen am Oberrhein vorkommen. Es bleibt noch genau auszumachen, um welche Zeit die Deutschen diese Gegenden besetzt und die Kelten verdrängt haben. Die Völker, welche mit Vadomar, Chnodomar ufw. gegen die Römer kämpften, lange vor der eigentlichen Völkerwanderung um 400, waren doch wohl ohne Zweifel Deutsche.

S. 233. Das Weissgau im Bauernkrieg um 1525.; ebenfalls ein wichtiger Beitrag zu dem schlechten und despotischen Regiment jener Zeit. Man muß indessen gestehen, daß es besser geworden ist.

Dann folgen S. 311 kleinere Mittheilungen über die ältesten Familien in Süddeutschland; zur Geschichte und Statistik des Aberglaubens; Bettler-Industrie 1475. Volkssagen, Minne- und Meisselieder; merkwürdige Briefe von Carl von Wurzburg, dem Theologen Konigerus und dem Juristen Zasius; von der Uebergabe Freiburgs an Bernhard von Weimar.

## Das Nichtentstandene und das Entstandene

von J. G. Napp. Zürich bey Drell. 1839. 8. 51.

Es ist schwer, über diese Schrift ein Urtheil zu fällen, weil sie Sag für Sag studirt werden müßte, wozu wir jetzt keine Zeit haben. Daher können wir jetzt nur darauf aufmerksam machen und den Inhalt anzeigen. Sie enthält philosoph. Sätze über die allgemeinsten Begriffe der Dinge, namentlich über das Urwesen und sein Verhältniß zu den Dingen, die Entstehung der Himmelskörper, Entwicklung der Wärme, des Feuers und des Lichts; Scheidung der Massen in solide, flüssige und gasartige Körper, wie Luft und Aether; Entstehung und Wachsthum der organischen Körper; das Menschengeschlecht mit seinen geistigen Verhältnissen, Sensibilität, Ideen, Sympathie, Sprache, Verstand, Freyheit, Tugend, Glück ufw.

## Ueber die höhere Bedeutung

der Naturwissenschaften und ihren Standpunct in unserer Zeit. Eine academische Eröffnungssrede von M. Perty, Professor. Bern bey Jenni. 1835. 8. 36.

Ein interessanter Vortrag, welcher gegenwärtig besonders an der Zeit ist, wo diese Wissenschaften anfangen, ins Leben überzugehen und selbst die Schulmänner daran denken, dieselben in ihre Anstalten einzuführen. Man muß der Tugend alles vorlegen, damit sie erkennen und wählen kann, was ihrem Naturell gemäß ist. Wird ihr 6 Jahre lang nichts anderes als Sprachen vorgekaut, so muß sie endlich glauben, es gebe nichts anderes, und daher kommt es, daß sie auf der Unversität nicht weiß, wie sie ihren Bildungsgang einzurichten hat, oder vielmehr sogleich sich in das Brodth stellt, mit Vernachlässigung aller Wissenschaften, welche zur allgemeinen Bildung gehören und den Studierten billig auszeichnen sollten. Daher muß man nicht selten die Unwissenheit von sogenannten Studierten wirklich bewundern, als welche sich nicht schämen, ganz naiv zu sagen, daß sie das und jenes nicht zu wissen brauchten, ja selbst Geschichte und Geographie nicht in ihren Kreis gehörten. Viele halten es sogar für ein Verdienst, das nicht zu wissen, was nicht unmittelbar zu ihrem Amte gehört. Sie fühlen nicht, daß man sie in der guten Gesellschaft stehen läßt: denn sie finden immer andere. Das sind die Folgen der ehemaligen schlechten, d. h. beschränkten Erziehung, welche hoffentlich bald ausbleiben werden, da man doch anfängt, die allgemeine Bildung von der Uebrigtheit zu einem Handwerk zu unterscheiden.

## Reise des Prinzen Maximilian von Wied

durch Nordamerika. Coblenz bey Hölcher. 1838. Heft 3. 4. 1. Bogen 13—33. 8 Tafeln in Fol.

Von diesem großartigen Werke haben wir die erste Erscheinung schon begrüßt. Ungeachtet mancher über die noch wil-

den Gegenden von Nordamerika erschienenen Werke hatten wir doch kein einziges, welches dieselben nebst ihren Inwohnern vollständig schilderte, oder auch nur erträgliche Abbildungen von den letztern gäbe. Die unterrichteten Männer zogen gewöhnlich wie auf einer Jagdpartie durch die ungeheuren Strecken und sahen die Wilden einige Tage; diejenigen, welche Jahre lang unter denselben lebten, thaten es meistens gezwungen und hatten nicht die nöthigen Vorkenntnisse, und deshalb auch nicht den Willen, alles planmäßig zu beobachten. Der Prinz war besetzt nicht bloß die erforderlichen Kenntnisse eines allgemeinen Reisenden, sondern auch die naturhistorischen in hohem Grade; hat sich außerdem Jahre lang auf diese Reise und das Studium der nordamericanischen Wilden vorbereitet, gestützt auf die Erfahrungen seiner berühmten Reise in Südamerika, und eigentlicher dadurch veranlaßt, nemlich durch den Forschungsdrang, das Leben und Wesen der südlichen Wilden mit dem der nördlichen zu vergleichen und daraus Schlüsse für die Urvölkerung Americas zu ziehen und die Geschichte der Menschheit überhaupt zu erweitern. Was man unter solchen Umständen leisten kann, liegt am Tage. Auch hatte der Prinz einen sehr geschickten Zeichner, C. H. Bodmer, bey sich, welcher nicht bloß die merkwürdigen Landschaften aufgenommen, sondern eine Menge Portraits verschiedener Wilden nebst ihren Spielen und Geräthschaften meisterlich geliefert hat, augenscheinlich mit einer Treue und in einem Maßstabe, wie wir noch nichts ähnliches besitzen. Die Gesichter sind Zug für Zug dargestellt. Die großen Fotiotafeln sind meistens in Paris von berühmten Künstlern geschnitten und auch daselbst gedruckt.

Wie rasch das Werk vorwärts schreitet, beweist schon die Menge der großen Tafeln, wovon jede viele Monate lange Arbeit fordert, wie auch vorzüglich die zahlreichen Bogen des ungemein reichhaltigen Textes, gedrängt voll von den mannichfaltigsten Beobachtungen über Menschen, Gegenden, Cultur, Geographie, Botanik und Zoologie.

Der Prinz beschreibt hier die Steinkohlenwerke von Mauch-Schun, reist sodann nach Bethlehem und von da über Allentown, das Alleghany-Gebiet nach Pittsburg, woben die Thiere und Pflanzen des Landes und besonders die Merkwürdigkeiten am Ohio beschrieben werden, auch Seltenheiten wie *Trionyx*, *Menopoma* und *Menobranchius*; jener oder der Alleghany-Salamander lebt in Menge im Ohio und heist daselbst Alligator, ist sehr gefräßig und schadet besonders der Fischbrut, wird auch an der Angel gefangen mit kleinen Krebsen; des Winters verkriecht er sich in den Schlamm. Der größte maß gegen 14". Der *Menobranchius lateralis* hat dieselbe Größe und Lebensart. Der dortige *Corvus corone* scheint von dem unferigen verschieden zu seyn.

Dann gieng die Reise auf dem Flusse nach Neu-Harmonie über Cincinnati, Louisville und das übrige Stück zu Lande, wo wieder die merkwürdigen Thiere und Pflanzen, so wie die Landescultur beschrieben werden, vorzüglich aber die Umgebung von Neu-Harmonie am Abasch, wo der Winter 1832 — 1833. zugebracht wurde. Der Ort gehört dem berühmten W. Macrure, und wird gegenwärtig benützt von den bekannten Naturforschern Say und Lesueur. Bison, Elk (*Cervus canadensis sive major*), der schwarze Bär, der Wiber und *Felis concolor* sind ausgerottet. Häufig aber noch der virgi-

nische Hirsch, Wolf (*Canis lupus*), der graue Fuchs (*Canis cinereo-argenteus*); die Wild-Cat (*Felis rufa*), der Rasthuhn (*Procyon lotor*), das virginische Beutethier (*Didelphys virginiana*), Stinkthier (*Mephitis mesomelas*); Fischotter (*Lutra canadensis*), der Mink oder Foutereau (*Mustela vison*), der Fisker (*Mustela canadensis*), Semelin, Murrethier oder Ground-Dog (*Arctomys pruinosus*), Ondatra (*Fiber zibethicus*), *Lepus americanus*, *Sciurus cinereus*, *rufiventris*, *Tamias striatus*, *Pteromys volucella*, *Gerbillus canadensis*, *Mus leucopus*, *Scalopus canadensis*, *Hystrix dorsata*.

Unter den Vögeln der Truthahn wild und häufig, Kraughuhn (*Tetrao Umbellus*), Haidenhuhn (*Tetrao Cupido*), Kepphuhn (*Pardix virginea*), Papagen (*Psittacus carolinensis*), überwintert bey Schnee und Eis, selbst bey 11 Grad Kälte; liebt besonders die Früchte der Platanen und die Aepfel. Ueber den Winterstand der Vögel liegt eine Tabelle bey. Verschiedene Lurche, Fische und Muscheln. Vollständige Schilderung der dortigen Einrichtungen und Verhältnisse, der Jagden, der Arbeiten von Say und Lesueur. Verzeichniß der Waldbäume mit den dortigen Namen, was sehr wichtig ist. Die Thiere werden critisch beschrieben.

Im März 1833. gieng die Reise nach St. Louis am Mississippi; Schilderung der Indianer, des Pelzhandels usw. Nach einem längeren Aufenthalt gieng der Zug nach Leavenworth an den Grenzen der Ansiedelungen, woben wieder Schilderungen der Wilden vorkommen, des Geländes, der Thiere und Pflanzen.

Das Werk ist für jederman geschrieben, für den Menschen überhaupt wie für den Naturforscher, für den Landschaftsmaler wie für den Geognosten; es wird jeden Leser unterhalten und seine Wissbegierde befriedigen.

Unter den Tafeln find 4 in einfachem Folio. Sie stellen vor eine Waldansicht am Zebihanya im Alleghany-Gebirge; einen Opferplatz der Mandan-Indianer; Felsen, genannt die Citabellen am obern Missouri; einen Häuptling der Grish-Indianer, höchst charakteristisch dargestellt.

Die andern 4 Tafeln sind in Doppel-Folio. Ein Facsimile einer indianischen Malerei, zween Kämpfer; Scalpplanz der Mönniatieris, eine mannichfaltige und sonderbare Scene, woben übrigens wenig getanzt wird und die Leute sich vielmehr nur sehr ernsthaft ansehen; Vereinigung des Fellow-Stone-Flusses mit dem Missouri, eine hügelige weite Landschaft, ein Dakota-Krieger in Lebensgröße in seiner sonderbaren Kleidung und mit dem gewöhnlichen ernsthaften Gesicht, voll scharfer Leisten und Ecken. Es sind Tafeln, welche würdig wären, unter Glas gehängt zu werden.

### Naturhistorische Topographie

von Regensburg, bearbeitet von Dr. F. Kurnrohr. Regensburg bey Manz. 1. 1838. 8. 302. 1 Tafel.

Regensburg hat sich bekanntlich seit den ältesten Zeiten in der Geschichte ausgezeichnet, als römische Stadt, später als

Sitz der bayerischen Herzoge, berühmter Bischöfe, zuletzt des Reichstags; ferner durch die Schiffahrt auf der Donau, durch Handel und Gewerbe, und endlich durch viele ausgezeichnete Gelehrte, besonders in der Naturgeschichte. Zwar hat der berühmte Leibarzt Schäffer eine medicinische Beschreibung dieser Stadt geliefert: allein schon vor 50 Jahren, und daher war es sehr wünschenswerth und nützlich, eine neue zu erhalten. Die vorliegende scheint auch billigen Forderungen vollkommen zu entsprechen. Sie gibt ein vollständiges und treues Bild der einschlägigen Anstalten und Leistungen, wobei der Verfasser sehr thätig durch Forster, Herrich, Koch, Schmöger und Voith unterstützt worden ist. Es werden 3 Bände: der vorliegende enthält den geschichtlichen, climatologischen und geognostischen Theil.

Die Pflege der Naturwissenschaften wurde, abgesehen von Albertus Magnus, erst nach im 18ten Jahrhundert, aber dann auch sogleich mit sehr lebhafter Thätigkeit, besonders durch den Leibarzt Schäffer, welcher große zoologische Kupferwerke herausgegeben, durch Zoppe in der Botanik, Reinrich in der Physik und durch mehrere andere. Gegenwärtig ist eine bedeutende Zahl von tüchtigen Männern fast in allen Fächern der Naturkunde daselbst in großer Thätigkeit. Das Geschichtliche beginnt mit den astronomischen und meteorologischen Forschungen, welchen die zoologischen, botanischen und mineralogischen folgen. Ueberall werden die Sammlungen, Schriftsteller und ihre Werke mit Schenkentniss geschildert. Was den Maindurg betrifft, so müssen wir bemerken, daß das ungedruckte Werk: „de naturis rerum,“ nicht von ihm seyn kann, weil es schon von Vincentius beluacensis citirt wird. Darauf folgt S. 191 der climatologische Theil, bearbeitet vom Professor Schmöger, worin 65 jährige Beobachtungen zusammengestellt werden. Seite 257 der geognostische Theil vom Oberst-Berg Rath Voith, kurz aber bündig dargestellt mit allen vorkommenden Formationen. Das Werk ist in jeder Hinsicht gründlich und lehrreich, und verdient die Beachtung der Gelehrten in vollem Maaße.

## Bulletin

de la société impériale des Naturalistes de Moscou 1837. V. 1838. I. II. III. 8.

Diese reichhaltige Zeitschrift fährt fort, die Arbeiten der Moscauer Naturforscher mit vielem Eifer bekannt zu machen. Die vorliegenden Hefte enthalten für Physik und Naturgeschichte mehrere wichtige und zum Theil große Abhandlungen in lateinischer, französischer und deutscher Sprache.

1837. V. 1824. 7 Tafeln.

Enthält zuerst eine botanische Abhandlung in russischer Sprache, t. 1. 2. Stellen Größe und Samen zerlegt vor.

S. 59. Zoubkoff, Description de quelques Coléoptères nouveaux de la mer caspienne, t. 3. 4. ill.

Abgebildet, charakterisirt und beschrieben sind

*Cymindis imperialis*; *Scarites impressicollis*; *Pro-*

*crustes luctuosus*; *Carabus strigatohii*; *Cephalotes karlinii*; *Eunectes punctatus*; *Acis zablotzkii*, *depressa*; *Mylabris elegantissima*; *Cleonis imperialis*.

73. Krynicky, Arachnographiae rossicae Decas prima, t. 5. 6. illum.

Charactere und Beschreibungen von folgenden Gattungen.

*Tegenaria scalaris*; *Drassus chinensis*; *Latrodectus 5guttatus* fig.; *Epeira speciosa*, *lobata*, *lepechini*, *melo*, *ancora*; *Thomisus delicatulus*; *Lycosa rossica*, *cherasonensis* fig.; *Cicada stevenii* fig.

89. G. Fischer de Waldheim, Notice sur la nouvelle espèce, *Lagotis pallipes*, von Bennett beschrieben.

97. Lettre de Motschoulsky.

Ueber seltene Kerfe, welche er auf einer Reise von Polen, Deutschland und Italien gefunden hat, sowie über die Kerfsammlungen, Taf. 7. ill.

Er stellt die neue Käfersippe auf, *Thoraxophorus corticinus* (neben *Proctinus*) und bildet sie ab; ebenso *Spartycerus rondani* (*Monotoma*), *Monotoma quadrisfoveolata*, *Scydmaenus motschoulskyi*.

1838. I.

S. 3. Baron de Chaudoir, tableau d'une nouvelle subdivision du genre *Feronia* Dejean.

Eine sehr genaue Classification mit kurzen Characteren und mit Angabe der Gattungen, welche zu den zahlreichen neuen Sippen gehören. Es sind folgende:

I. Erstes Glied der vorderen Beinen des Männchens nicht quer.

- 1) *Sogines*, *Poecilus punctulatus*.
- 2) *Poecilus cupreus*, *erythropus*, *versicolor*, *lucublandus*, *chalcites*, *cursorius*, *dimidiatus*, *viaticus*, *marginalis*, *lepidus*, *gebleri*, *gressorius*, *striato-punctatus*, *crenatus*, *chalybeipennis*, *puncticollis*.
- 3) *Carenostylus*, *Poecilus infuscatus*.
- 4) *Trirammatus fulgidus*, *P. unistriatus*.
- 5) *Hypherpes*, *Platysma amethystinum*, *castaneum*, *brunneum*.
- 6) *Haplocoelus*, *Platysma triste*.
- 7) *Dysidius*, *Omasus morosus*.
- 8) *Cyclomus*, *Poec. conformis*.
- 9) *Argutor strenuus*, *pullus*, *obscuripes*, *eruditus*, *dorsalis*, *chilensis*, *rubripes*, *negligens*, *rufus*.
- 10) *Orthomus*, *Arg. hispanicus*, *barbarus*, *punctulatus*.
- 11) *Bothriopteris*, *Platysma oblongo-punctatum*, *angustatum*, *lucetii*, *adstrictum*, *vitreum*.
- 12) *Pterostichus parumpunctatus*, *auratus*, *rutilans*, *truncatus*, *dilatatus*, *picipes*, *lasserrei*, *italicus*, *pyrenaicus*, *niger*, *affinis*.
- 13) *Metallophilus*, *Abax interruptus*.

- 14) *Oreophilus*, *Pterostichus multipunctatus*, *sinnato-punctatus*, *bilineatus-punctatus*, *externe-punctatus*.
- 15) *Psychobius*, *Pterostichus spinolae*, *flavo-femoratus*.
- 16) *Petrophilus*, *Platysma findelii*.
- 17) *Arachnoideus*, *Pterostichus fasciato-punctatus*.
- 18) *Agonodemus*, *Pl. picimanum*, *graium*.
- 19) *Lyrothorax*, *Pl. caspium*.
- 20) *Pseudosteropus*, *Steropus schmidtii*.
- 21) *Steropus aethiops*, *rufitarsis*.
- 22) *Pseudomaseus*, *Omaseus nigritus*, *anthracinus*, *luctuosus*, *minor*, *gracilis*.
- 23) *Lagarus*, *Argutor vernalis*, *cursor*.
- 24) *Lissotarsus*, *Argutor depressus*.
- 25) *Haptoderus*, *Arg. spadiceus*, *subsiniatus*.

## II. Erstes Tarsusglied quer.

- 26) *Brachystylus*, *Poecilus californicus*, *Platysma validum*.
- 27) *Bryobius*, *Pterostichus jurinei*, *bicolor*, *xatartii*, *heydenii*.
- 28) *Glyptopterus*, *Pterostichus scrobiculatus*, *schoenherrii*, *variabilis*.
- 29) *Platypterus*, *Pterost. panzeri*, *cribratus*.
- 30) *Coscinopterus*, *Pt. velensis*.
- 31) *Calopterus*, *Pt. duvalii*, *prevostii*, *fossulatus*, *minowitzii*, *variatus*, *klugii*.
- 32) *Cophosus magnus*, *cylindricus*, *filiformis*.
- 33) *Percus lacertosus*, *parallelus*, *passerinii*, *corsicus*, *paykullii*, *siculus*, *navaricus*.
- 34) *Cryobius*, *Platysma ventricosum*, *pinguedineum*, *empetricola*, *frigidum*.
- 35) *Diorychoderus*, *Molops alpestris*?
- 36) *Omaseus melas*, *depressus*, *magus*, *altaicus*, *corpulentus*, *melanarius*, *ater*.
- 37) *Pachymorphus*, *Omaseus aereus*.
- 38) *Lyperus*, *O. aterrimus*, *nigerrimus*, *elongatus*, *tenebrosus*.
- 39) *Pseudorthomus*, *Argutor amaroides*.
- 40) *Abax ovalis*, *subovalis*, *carinatus*, *porcatus*, *latus*, *beckenhauptii*, *parallelus*, *parallelipedus*, *exaratus*, *oblongus*, *subpunctatus*, *striola*, *schuppelii*, *mellyi*.
- 41) *Cheporus*, *Molops striolatus*.
- 42) *Molops robustus*, *elatus*, *terricola*.

Noch mehrere ohne bestimmten Platz. Jede Sippe ist charakterisirt.

§. 20. Derselbe, Charaktere einiger Sippen aus der Zunft der Geronien.

- 1) *Scaphiodactylus* neben *Dyscolus*. *Feronia moesta*, *funesta*, *opaca*.

- 2) *Chalcochrous* neben *Camptoscelis*. *Steropus lenia*.
- 3) *Cyclotrachelus* neben *Cephalotus*. *Steropus tenebricosus*.

Die Sippencharactere ganz ausführlich.

§. 33. Le Comte de *Mannerheim*, nouveau genre de Coléoptères du Mozambique.

*Eupyga* beschil.

Neben *Cetonia*, ausführlich lateinisch beschrieben.

§. 37. *Ouchakoff*, Notice sur un Termes fossile. Tab. 1.

In Bernstein, welchen er von Königsberg erhalten hat. Hat Aehnlichkeit mit der Larve von *Termes lucifugus*.

§. 43. *C. Steven*, de *Pinus taurico-caucasica*.

Es sind folgende ausführlich beschrieben.

*Pinus picea* Linn., *nordmanniana* n. t. 2., *orientalis*, *maritima* Lamb., *laricis*, *sylvestris*.

§. 54. *Th. Schmidt*, über ein neues Reagens auf das Zed.

§. 58. *Th. Landmann*, über ein neues Verfahren zur Bereitung des kohlensauren Kalis und des Essigsäthers.

§. 62. *Mannerheim*, Revue critique de quelques ouvrages récemment parus. *Percherons Passales*; *Laporte's Coléoptères*; *Guerin's Genera des Insectes*.

§. 85. *Turczaninoff*, Catalogus plantarum in regionibus baicalensibus et in Dahuria.

II. §. 113. *A. Richter*, über die neue *Centaurea calva*, kritisch verglichen mit den andern.

§. 125. *E. Eichwald*, Faunae caspii maris primitiae.

Voran geht ein Ueberblick über das, was die Alten darüber gewußt haben. Es ist merkwürdig, daß man fast keine Thiere des schwarzen Meeres im caspischen findet. Es fehlen ihm die *Rajae*, *Squali*, *Gadi*, *Pleuronectes*, *Scombri*, *Engraulides*, *Mugili*, *Labri*, *Spari*, *Callionymii*;

Unter den Schalthieren *Cerithia*, *Buccina*, *Coni*, *Mitrae*, *Trochi*, *Littorinae*, *Phasianellae*, *Patellae*, *Ostreae*, *Pectines*, *Tellinae*, *Lucinae*, *Balani*; und hat nur in größter Menge *Mytili*, *Cardia*, *Donaces*, *Rissoae*, *Paludinae*.

Keine *Palamones*, *Carcini*, *Canceri*, *Paguri*, *Orchestii*, *Amphithoës*, *Ligae*, *Sphaeromata*.

Dann werden folgende neue Gattungen aufgeführt, charakterisirt und weiter beschrieben.

*Cyprinus persa* Pall.; *Cobitis caspia*; *Clupea caspia*, *pontica*; *Atherina caspia*, *pontica*; *Bentophilus macrocephalus*; *Gobius sulcatus*, *affinis*, *caspicus*; *Syngnathus nigrolineatus*, *caspicus*; *Astacus leptodactylus*, *caspicus*, *Paludina variabilis*, *triton foss.*, *exigua f.*, *pusilla*; *Rissoa caspia f.*, *conus f.*, *dimidiata f.*; *Neritina liturata*;

*Bullina usturtensis* f.; *Spirorbis serpuliformis* f.; *Cras-  
satella caspia* f.; *Maetra caragana* f.; *Cyclas usturtensis*  
f.; *Cyrena orientalis*, fuscata; *Dreissena polymorpha*;  
*Mytilus edulis*; *Donax priscus* f.; *Venus gallina*; *Cardi-  
um edule*, rusticum; *Didaena* n. (*Cardium*) *trigonoides*,  
crassa; *Monodacna* n. *caspia*, pontica; *Adacna* n. *colora-  
ta*, laeviuscula, plicata, vitrea.

Wir theilen hier die Charaktere der neuen Sippen mit:

*Bentophilus*: Caput depressum, dilatatum, trunci  
alepidoti instar verrucis aculeatis undique obsitum; oper-  
culum branchiale verrucoso-aculeatum; apertura bran-  
chialis exigua lateralis; pinnæ abdominales sub pectorali-  
bus infixæ, medio connatæ; pinna dorsi duplex, priore 3ra-  
diata. *Gobius macrocephalus*.

*Didacna*: Testa inaequilateralis, vertice carinato-  
acuto; dentes cardinales duo, approximati, profundam fo-  
veam includentes, laterales nulli. Genus *Cardio* affine  
dentibus lateralibus lamellosis nullis ab eo recedens. *Cardi-  
um* *trigonoides*.

*Monodacna*: Testa transversa, concava, longitudina-  
liter subtiliterque costata, dente cardinis simplici, exiguo,  
distincto, lateralibus nullis, elongata lamella passim  
postice accessoria; testa antice subhians. *Corbula caspia*.

*Adacna*: Testa planior, transversa, longitudinaliter  
plicata aut striata; cardo edentulus aut callus dentis lo-  
co, foreola adjecta laminaque post callum elongata, in-  
crassata, ligamentum externum figens; hæc testæ pars  
producta et hians. *Glycymeris colorata*.

§. 175. *T. Victor*, Coléoptères du Caucase et  
des Provinces transcaucasiennes, t. 3.

*Agaricophilus* n. (*Tritoma pilosa*), reflexus. *Cholo-  
vocera* n. *formicaria*; *Luperus dubius*; *Haltica conducta*;  
*Cassida habitzia*; *Toxotus mirabilis*; *Rhagium rufipes*;  
*Dorcadion nitidum*, dimidiatum; *Prionus serricollis*.

§. 189. *K. Schlippe*, über die Dolomitlager des  
moskowschen Gouvernements und ihre Benutzung.

§. 197. *St. Gebler*, barometrische Höhenbestimmun-  
gen im nordwestlichen Altai.

§. 205. *Mannerheim*, Revue critique de quelques  
ouvrages entomologiques de Gistel.

III. §. 225. *Mannerheim*, Lettre sur les Insectes.

*Sabricius* hatte 5250 Gattungen Käfer im Jahr 1801,  
Dejean in seinem Catalog 22399; de Laporte schätzte die in Frank-  
reich aufbewahrten auf 30,000, und glaubt, es gebe 150000.

Es ist merkwürdig, daß man von den großen Käfern,  
welche so häufig in den alten Sammlungen vorkommen, fast  
keine mehr findet. Der *Hercules* lebt nach Forsström im  
faulen Holz auf den Antillen; der *Actæon* nach Lacordaire  
auf Cayenne in Erdböchern, wo sich die Larven von hölzernen  
Wurzeln ernähren. Fast alle andern großen fehlen in Dejeans  
Sammlung.

In Paris findet sich *Goliathus cacicus* et *polyph-  
mus*. Für einen *G. magnus* zählte man kürzlich in England  
12,000 Franken. Man weiß nicht einmal recht, wo sie zu Hause  
sind, wahrscheinlich in Africa, weil sich am Senegal *G. mi-  
cans* findet und nach *A. Erman* *G. regius* auf Zèle du  
Juli 1838. Heft 11.

Prince im Gelf von Guinea. In Petersburg hat man *Longi-  
manus* et *Elephas*, wahrscheinlich aus der Sammlung der  
Frau Merian. In Brasilien hat *Besche* den *Anubis cher-  
vrolat* oder *Scarabæus hector* entdeckt.

§. 231. *Fr. Hohenacker*, Enumeratio plantarum in  
provincia Talsch ad mare caspicum.

Die Namen mit den Arten; die neuen mit Charakteren.

Ein sehr großer Aufsatz bis S. 330.

## Der naturwissenschaftliche Verein des Harzes

hielt am 25. July d. J. seine 8te (jährliche) Versam-  
lung zu Goslar. Der 3. Präsident des Vereins, Hr. Ober-  
berggrath Zinden aus Mägdeburg, eröffnete die Versammlung,  
welche, des schlechten Wetters ungeachtet, doch 43 Mitglieder  
zählte und an Glanz der Namen keiner der früheren nachstand.

Herr Bergmeister Ahrend aus Goslar sprach über die  
Gebirgsschichten am Auenberge hinter der Mör, namentlich über  
die Aufeinanderfolge derselben, wie sie durch die Anlegung eines  
durch das Grauwackengebirge, die Formation des bunten Sand-  
steins, den Muschelsalk, den Kruper und die Kias-Formation  
sich erstreckenden Wasserlaufs aufgeschlossen worden, und über  
die in den 3 letzten Formationen beobachteten Verfeinerungen.  
Es sind diese Untersuchungen die Frucht einer gewiß sehr ver-  
dienstlichen 5jährigen Beobachtung, veranlaßt durch die dem  
Hrn. Bergmeister übertragene Direction des Wasserlaufsbe-  
triebs. — Das Flözgebirge an der Nordseite des Harzes ist  
überhaupt für die Geognosie sehr interessant, theils wegen der  
sich darbietenden Gelegenheit in einer Breite von einigen tau-  
send Fuß die Gebirgsschichten von der Formation des bunten  
Sandsteins an bis zur Kreide verfolgen zu können, theils weil  
die senkrechten, ja größtentheils übergekippten Lagen die spätere  
Erhebung der Harzgebirge zu beweisen scheinen. Die Gegend  
an der Mör ist aber vorzüglich in dieser Hinsicht ausgezeichnet,  
weil die Erhebung des Granits so gewirkt hat, daß die Ge-  
birgsschichten bis zu einem Winkel von 45° übergekippt sind,  
und daß dem Ansehen nach die Grauwacke auf der Formation  
des bunten Sandsteins, diese auf dem Muschelsalk u. ruht.

Hr. Regierungsrath Sporleder aus Wernigerode trug im  
Namen des abwesenden Hrn. Apothekers Hampe aus Blanken-  
burg einige Notizen über eine neue Bürgerinn des Harzes,  
*Prunella alba*  $\beta$  *lacinata* L., vor, und gab ein Verzeichniß  
der von ihm selbst seit länger Zeit auf dem Harze gesammelten  
Pflanzen zur Ansicht.

Hr. Weymann sprach über eine von der Insel Anglesea  
entlehnte neue Köstmethode der Rammelsberger Erze.

Hr. Bergcommissair Dr. Jache aus Ilfenburg sprach  
über mehrere interessante Gebirgsarten des östlichen Harzes,  
namentlich aus den Flözformationen der Grafschaft Wernigerode,  
und zeigte viele ausgezeichnete Verfeinerungen.

Hr. Regierungsrath Stiehler aus Wernigerode sprach über  
die in der Nähe seines Wohnorts gefundenen Kohlen.

Hr. Superintendent Dr. Demici aus Goslar gab in ei-  
nem glänzenden Vortrage eine neue Theorie der Wärme und  
geistreiche Bemerkungen über das Licht und verwandte Objecte

Hr. Bergfactor Kosi aus Clausthal entwickelte einen Vorschlag zur Darstellung eines Krafteservoirs (Behälters von zusammengedrückter Luft).

Hr. Pastor Rimrod aus Quensiedt trug Beobachtungen über Höhenrauch und neben Widerlegung der gangbaren Hypothesen eine neue vor, welche den Höhenrauch aus dem Innern der Erde ableitet, so daß er eine vulcanische Erscheinung sey.

Hr. Oberberggrath Zinken las eine sehr ausführliche Abhandlung über die von ihm in dem verfloßenen Winter auf dem Eise sehr mühsam bewerkstelligte geognostische Untersuchung des Bodenthal's zwischen Thale und Treseburg, welche viele und höchst interessante Resultate gegeben hat.

Hr. Sarefen, Lehrer an der Berg- und Forst-Schule zu Clausthal, reichte ein:

a) ein Verzeichniß der bis dahin am Harze gefundenen Blatt- und Holzwespen, welches in 12 Gattungen 164 Arten aufzählt und viele derselben mit kritischen oder die Lebensart betreffenden Bemerkungen begleitet. Die Bestimmungen aller Arten sind von Hrn. Sarefen in Gemeinschaft mit dem Hrn. Forstgrath Hartig in Braunschweig gemacht. 30 Arten sind neu, von Hrn. Sarefen zuerst gefunden und von Hrn. Hartig in dessen v. Z. erschienenem Werke über Blatt- und Holzwespen beschrieben. — Wir heben Folgendes aus: *Cladius alpinus* Kl. In den Gärten bey Clausthal oft so häufig an Kirschbäumen, daß diese durch den Fraß der Raupe leiden. — *Nematus erichsonii* Hart. n. sp. Die Raupe, oben aschgrau, unten weißlich mit schwarzem Kopfe, frisst klumpenweise an den jungen Trieben der Lärchen, und scheint unter Umständen merklich schädlich werden zu können. — *Nem. laricis* H. n. sp. Die Raupe grün, frisst mehr einzeln am Zweige vertheilt als *N. erichsonii*. — *Nem. fraxini* H. n. sp. Vor mehreren Jahren wurden die Eschen in der Nähe Clausthal's von einer grünen Tentreden-Raupe arg abgefressen, die wahrscheinlich dieser Art angehört. — *Nem. parvus* H. Unter allen Blattwespen der Fichte die häufigste, wenigstens am Oberharze. Die Raupe frisst die Spizzen der jungen Triebe noch unter den Schuppen aus. Der Trieb selbst verlängert sich nicht, bleibt gewöhnlich nur 1 Zoll lang, mit dicht zusammengebrängten Nadeln. — *Nem. scutellatus* H. n. sp. Einzeln an der Fichte des Oberharzes. Die Angabe Hartigs, als solle diese Art die an der Fichte am häufigsten vorkommende seyn, muß auf einem Mißverständniß beruhen. — *Gen. Dolerus* Kl. Obgleich einige Arten mitunter an Bäumen und Sträuchern sitzend gefunden werden, so scheinen doch die Raupen nie an solchen zu fressen, daher die ganze Gattung für Forste und Gärten ohne Bedeutung seyn möchte, zumal es nicht unwahrscheinlich ist, daß die Futterpflanzen aller Arten in die große Familie der grasartigen Gewächse, im weiteren Sinne des Wortes, gehören. — *Dolerus coracius* Kl. Diese und andere Arten sehen sich nicht selten an junge Fichten und geben dadurch leicht Veranlassung zu dem Glauben, daß sie sich im Raupenstande an denselben nähren. — *Tenthredo scalaris* Kl. Einige, auf der Spitze des Rahlensberges (2300' hoch) an Büschen gefangene ♂ unterscheiden sich alle durch geringere Grööße und dunklere Färbung; vielleicht eigene Art. — *Tenthredo viridis* L. Diese u. a. verwandte Arten, wie *T. flavicornis*, *T. atra* u. sind räuberischer Natur; oft fand ich sie andere Insecten (Fliegen, Mücken, auch Nematod-Arten) verzehrend, jedoch dieselben Arten auch Blumen fressend. — *Lyda saxicola* H. n. sp. und *L. abietina* H. sp. sind wahrschein-

lich die ♂ zu *L. annulata* ejusd. n. sp. und *L. annulicornis* ejd. n. sp. — *L. suffusa* Kl. In den Gärten bey Clausthal an Rosen, von deren Blättern die grüne Raupe frist. Die Angabe Hartigs, daß sie an Fichten lebe, beruht auf einem Mißverständniß. — *L. straminipes* H. n. sp. Der vorigen Art nahe verwandt, vielleicht nur Spielart, und bis dahin nur am Vorcharze im freien Felde an Sträuchern gefunden, wo sich auch an wilden Rosen eine ähnliche grüne Raupe als die der *L. suffusa* findet, daher zu vermuthen, daß auch die *Straminipes* an Rosen frist.

b) Die Beschreibung einer am Harze aufgefundenen neuen Käferspecies, *Elater heyeri*. (Sieh folgende Spalte S. 805.)

Hr. Apotheker Lohmann aus Goslar brachte eine Abhandlung über die Zugutemachung der Rammelsberger Erze.

Der Zeichenlehrer Hr. Ardenhausen aus Goslar (früher in Holland angestellt) zeigte zahlreiche, von ihm gefertigte, farbige Pflanzen-Abbildungen, welche ihrer Treue und Sauberkeit wegen großen Beyfall fanden. Besonders zeichneten sich darunter die Pilze und unter diesen wieder die zahlreichen Arten der Gattung *Agaricus* aus. Diese höchst schwierige und vaste, an Umfang viele natürlichen Familien weit übertreffende Gattung hat Hr. Ardenhausen mit besonderer Liebe botanisch studiert, und seine Abbildungen der Agarici erreichen und übertreffen an Treue die besten veröffentlichten, z. B. die von Greville und Krombholz. Mehrere derselben, welche noch unabgebildete Arten darstellen, verdienen die Berücksichtigung sehr. Ueberhaupt wäre dem fleißigen Manne ein höherer Wirkungskreis zu wünschen.

Der Verein wird sich das nächste Jahr in der zweiten Braunschweiger Messwoche (um den Naturforschern Braunschweigs die Theilnahme zu erleichtern, und weil auch manche andere öffentliche Anstalten in dieser Zeit Ferien haben) versammeln, und zwar (durch große Stimmenmehrheit beschlossen) zu Blankenburg.

In einem aus den Beamten des Vereins (die für das nächste Jahr in ihrer Function beständig sind), dann den Herren s. t. Ahrend, Rimrod, Sarefen und Sporleber, so wie Prof. Blasius aus Braunschweig und Berggrath von Unger aus Salzliebenhall gebildeten Ausschusse wurde noch beschlossen, daß bey den künftigen Versammlungen des Vereins Sectionen, namentlich eine zoologische, eine botanische und eine mineralogisch-geognostische, gesondert arbeiten, alle nicht in das Gebiet der Naturgeschichte gehörenden Objecte jedoch der allgemeinen Versammlung verbleiben sollen. Auch wurden zur Veranlassung fortlaufender meteorologischer und besonders magnetischer Beobachtungen auf dem Brocken Einleitungen getroffen.

Den ersten Verhandlungen folgte ein heiteres Mahl. Nach demselben blieb noch ein Theil der Botaniker und Zoologen des Vereins theils auf einer Excursion, theils in mannichfach belehrender Unterhaltung im Zimmer, bis fast gegen Mitternacht bepfamman.

Auf den folgenden Morgen hatte Herr Bergamts-Assessor Sagemann ein Einfahren in den Rammelsberg und in diesem ein Feuerfesten veranstaltet, wozu der Geschworne, Herr Wessig, den künftigen Führer und Commentator machte.

Die Gäste schieden voll Dankes für die freundliche Aufnahme, welche sie in Goslar gefunden.



**Elatér heyeri n. sp.**

Von W. Saxeisen.

Benennung zu Ehren des als Entomolog und vorzugsweise als unermüdlicher Sammler verdienten Hrn. Stadtschreibers *Heyer* zu Lüneburg.

*Elatér (Ludius Latr.) heyeri*. Ueberall dunkelgrün, ins dunkel purpurothe übergehend, metallisch glänzend. Fühler des ♂ gekämmt, jedes Glied nur halb so lang als der seitliche Fortsatz desselben. Fühler des ♀ gesägt, jedes Glied nach außen stumpfwinklig abgestutzt (Fig. 3. 4.). — An dem kaum entfalteten Laube verschiedener Laubholz-bäume (Ebereschen, Erlen etc.) in den Thälern des Oberharzes.

Spiegelarten sind mir nicht vorgekommen, außer in Hinsicht der Farbe, die kaum an 2 Stücken völlig übereinstimmt, indem wie bei *E. aeruginosus F.* bald das Grün, bald das Purpuroth vorherrscht. Das Grün verschwindet zuweilen ganz, das Roth dagegen nicht, indem wenigstens am Thorax und in der Nähe des Scutellum ein rother Schein immer sichtbar bleibt.

Der in der Farbe fast vollkommen mit dieser neuen Art übereinstimmende *E. aeruginosus F.* kommt nur selten an Bäumen, häufiger schon an niederem Gesträuch, gewöhnlich aber nur an Gräsern und Kräutern vor, und unterscheidet sich theils durch verhältnißmäßig weit breiteren, minder gestreckten Thorax, theils und hauptsächlich durch die Form der Fühler (beym ♂ jedes Glied eben so lang als der seitliche Fortsatz desselben; beym ♀ jedes Glied nach außen rechtwinklig abgestutzt; Fig. 1. 2.). — Der in der Form fast vollkommen mit *E. heyeri* übereinstimmende *E. pectinicornis F.* kommt an Bäumen nicht leicht vor und unterscheidet sich durch den Mangel des Rothens (nur einen etwas ersparbenen Schein sah ich bisweilen) und durch ein tieferes Grün; auch laufen beym ♂ die Seitenränder des Thorax mehr parallel. — Der ebenfalls in der Form fast vollkommen übereinstimmende *E. signatus F.* unterscheidet sich constant durch den gänzlichen Mangel des Rothens und durch die strohgelben, nur an der Spitze mit einem grünen Längsfleck gezeichneten Flügeldecken.

Fig. 1. 2. *E. aeruginosus F.* — Fig. 3. 4. *E. heyeri S.*

**Dr. Siebig und Dr. J. C. Poggendorf,****Handwörterbuch**

der reinen und angewandten Chemie. In Verbindung mit mehreren Gelehrten herausgegeben. Braunschweig, bey Vieweg und Sohn. 1 Bd. 1. u. 2. Liefer.

Mit der Erscheinung dieses Werkes wird ein wirkliches Zeitbedürfnis befriedigt, da ähnliche Werke längst veraltet sind. Daß wir hier etwas Lütchiges zu erwarten haben, dafür bürgen die Namen der berühmten Herren Herausgeber zum Voraus, und der Anzeige zufolge gefellen sich zu ihnen noch Männer, deren Namen im Bereiche der Chemie und Physik einen guten Klang haben, unter andern ein *Gay-Lussac*, *Henry*, *Wöhler*, *Turner* und *Erdmann*, und vom 3ten Hefte an wird *Schweiger-Seidel* die Herausgabe mit besorgen. So müssen denn die Erwartungen nicht mehr steigen, und in der That berechnen die 2 ersten Hefte etwas Ausgezeichnetes zu erwarten. Wenn wir uns im Nachfolgenden einige Bemerkungen erlauben, so geschieht es einzig aus wahrer aufrichtiger Achtung gegen die um die Wissenschaft hoch verdienten Herren Herausgeber, da sie einzig aus dem Wunsche hervorgehen, daß das Werk, das sich in so mancher Hinsicht rühmlich ausgezeichnet, auch an leichter Uebersicht und practischer Bequemlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen möchte. Wir bemerken zuerst, daß es gewiß sehr wünschbar gewesen wäre, wenn bey den Atomengewichten die Zahl nicht bloß einseitig nach *Berzelius*, den Sauerstoff zu 100 gerechnet, sondern neben ihr auch die Zahl nach derjenigen Scala angegeben worden wäre oder zukünftig gegeben würde, welche den Wasserstoff = 1 setzt und die wir vorzugsweise die deutsche nennen möchten, da sie von *Döbereiner*, *Meincke*, *Geiger* und andern aufgestellt und angenommen worden ist, und den großen Vorzug hat, einfacher zu seyn und sich daher dem Gedächtnis weit besser einzugraden. Wir glauben, daß nach dem jetzigen Stande der chemischen Analyse nicht einmal behauptet werden kann, daß die aus 3—6 Zahlstellen bestehenden Zahlen nach *Berz.* wirklich genauer seyen oder der Wahrheit näher kämen, da die letzten Zahlstellen im Bereich der bis jetzt noch unvermeidlich gewesenen Abweichungen und Irrthümer der chemischen Analyse liegen. Mag man jedoch auch entgegengesetzter Ansicht seyn, immerhin glauben wir, könnte die Atomenzahl der Deutschen wenigstens in Parenthese beigelegt seyn: und gewiß mancher Käufer des Werkes würde es den Herausgebern danken. An diese Bemerkung schließt sich denn die zweyte verwandte an, es möchte doch, so viel immer möglich, jede einseitige Behandlung eines Gegenstandes vermieden werden; von der, wie es uns scheint, die 2 ersten Hefte in den physikalischen Artikeln, die mit ganz besonderer Ausführlichkeit behandelt sind, nicht ganz frey sind. Wir wollen hier nur auf den Artikel „Absorption“ verweisen: *Hr. Poggendorf* entwickelt hier mit großer Vorliebe die Ansichten und Ausführlichkeit *Daltons*, ohne jedoch die gewichtigen Einwürfe so mancher berühmter Physiker ebenso zu entwickeln, z. B. eines *Laplace*, der *Daltons* Meinung: „daß ein Gas (oder Dampf) auf ein andres Gas keine Elasticität ausübe und ein damit erfüllter Raum gleich einem leeren Raume wirke“ nicht nur für unwahrscheinlich, sondern geradezu als im Widerspruch mit bekannten Thatsachen erklärt! Raum im Vorbeygehen wird dieser Einwürfe gedacht und als theilweise Ursache unrichtiges Auffassen und Verständniß angegeben! — Eine ähnliche Bemerkung hat sich uns beym Artikel



„Altimetrie“ aufgedrängt. Dieser Artikel, der **un-  
gemein weitläufig** behandelt ist und von Seite 212—265  
geht, also 53 Seiten einnimmt, der eine Menge von Tabellen  
enthält, gedenkt dennoch der in einem großen Theile Deutsch-  
lands und der Schweiz gerade am **meisten** üblichen Aërometer-  
grade nach **Beck** mit seiner Spitze; außer **Richter** und **Tralles**  
findet bloß noch **Cartier** (also auch **Beaume** nicht) eine  
Ermahnung! — Unangenehm fällt es auch auf, daß bey **Be-  
nennung** und **Anführung** englischer Physiker die Temperaturgrade  
nach **Fahrenheit** ohne **Reduction** wieder gegeben sind, während  
doch in Deutschland niemand mehr nach solchen rechnet und so  
der Leser fortwährend genöthigt ist, erst Berechnungen vorzu-  
nehmen! (Bey den Arbeiten der Franzosen mag es wohl gehen,  
da die Grade nach **Celsius** in so **einfachem** Verhältnis zu  
benutzen nach **R.** sehen.) Ebenso verhält es sich mit dem eng-  
lischen Längenmaße und bergl. Wir glauben, ein solches Werk  
sollte wie aus **einem** Guß bestehen und nicht Angaben bald  
nach **R.**, bald nach **C.**, bald nach **F.**, bald nach **Pariser**, bald  
nach **englischen**, bald nach **Nürnberg** u. s. Fuß enthalten: so  
etwas lieber sonst nur Compilationen an. — Durch **Vermeidung**  
vergleichener Uebelsände würde das Werk gar sehr an **Bruch-  
barkeit** und **Nützlichkeit** gewinnen: es werden uns, daß sind wir  
gewiß, eine große Zahl Abonnenenten bestimmen. Wir wünschen  
schließlich dem Werke, dessen Vortrefflichkeit wir, ungeachtet der  
gemachten Bemerkungen, vollkommen anerkennen, die größ-  
mögliche Verbreitung. C. St.

## Geognostische Charte

des Königreichs Sachsen. Section X. und Section VI.

Dieses großartige Werk schreitet, wie man sieht, rasch vor-  
wärts und bleibt sich in der fleißigen und kenntnißreichen Be-  
handlung, sowie in der genauen und schönen Ausführung immer  
gleich. Die Section X. ist im Sommer 1838 erschienen, und,  
so viel wir wissen, vorzüglich von Professor **Taunay** be-  
arbeitet. Sie enthält die außerordentlich interessanten Umgebungen  
von Dresden, und beginnt nördlich bey **Wahrensdorf** und **Ortrand**,  
endigt südlich bey **Tharand**, **Rabenau** und **Pirna**, beginnt westlich  
bey **Riesa**, **Lommasch**, **Possen**, und endigt östlich bey **Camenz**  
und **Stolpen**; begreift mithin **Großenhain**, **Meißen**, **Dresden**,  
**Wehlen**, **Hohnstein**, **Radeberg**, **Pulsnitz**, **Königsbrunn** ufw.

Auf dem linken Elbufer überseht man das nördliche Ende  
des großen Erzgebirgischen Gneisbedens, die dasselbe umgebende  
Thonschieferbildung, die bedeutende **Syenit-Granit**bildung zwi-  
schen **Lommasch** und **Wahrenstein**, das **Porphyr**gebirg von **Meißen**  
und dem **Tharander Wald**, und die **Bildungen** des **Steinkohlen**-  
gebirgs und des **rothen Thon**liegenden in dem Becken zwischen  
**Wilsdruff** und **Waren**.

Auf dem rechten Elbufer erblickt man die **Grauwacken**-  
formation zwischen **Großenhain** und **Camenz**, die **lausitzer Gneis**-  
**Granit**bildung, die sich bis in die Gegend von **Dresden** erstreckt,  
und die **Syenit**-Bildung, nach **Nordwesten** von **Porphyr**massen  
durchsetzt und begleitend die am linken Elbufer. Im **Elbtale**  
selbst die **Formationsgruppe** des **Grün**andes und der **Pläner**-  
teide, deren unteres Glied aus **Quadersandstein** bis in die Ge-  
gend von **Freiberg** verfolgt werden kann.

Oben und unten sind **Durchschnitte** von **Großschirma** über  
**Lampersdorf** und **Moritzburg** nach **Mebingen**; von **Weinböhla**  
nach **Niederbären**; unten von **Naundorf** über **Tharand** durch  
den **Plauischen Grund** nach **Dresden**; von **Wendisch-Carlsdorf**  
über **Pillnitz** nach **Weißen**; von **Manegast** über **Pirna** nach  
**Stolpen**. An einem **Rande** sind die **Farben-Schemata**; am  
andern eine **Menge** **Meereshöhen**.

Die Section VI. ist unsers Wissens vorzüglich vom **Doctor**  
**Cotta** bearbeitet, augenscheinlich mit demselben Fleiß und der-  
selben Genauigkeit. Sie enthält das Land zwischen **Bauzen**  
und **Görlitz** und erstreckt sich von **Pissa** und **Muskau** im **Norden**  
bis **Rumburg** im **Süden**; von **Bischosswerda** im **Westen** bis  
**Görlitz** im **Osten**. Der **Granit** nimmt den größten Theil der  
**Oberlausitz** und des zunächst angränzenden **Sachsens** und **Böh-**  
**mens** ein. Darinn zeigt sich an verschiedenen Orten **Grün**stein;  
hin und wieder auch kleine **porphyrische Massen**, lange **Züge**  
von **Quarz**fels; wenig **Erzgänge**.

Im **Norden** schließt sich der **Gneis** an, und **sobann** in  
weiter Ausdehnung die **Grauwacke**. Im **Südwesten** der **Charte**,  
in der Gegend von **Saupsdorf** und **Hinterhermsdorf** findet sich  
der **Granit** auf dem **Quaderstein** aufgelagert. **Basalt** und **Kling-**  
**stein** ragen in zahlreichen **Kuppen** hervor von **800—1800'**.  
Der **Norden** des Landes ist mit **Sand** bedeckt. An **Torf**- und  
**Raseneisenstein** fehlt es nicht.

**Durchschnitte** sind gegeben von **Saupsdorf** nach **Oltra**,  
von **Seif-Hennersdorf** über **Herrenbuth** nach **Görlitz**; von **Gos-**  
**dorf** über **Puskau** nach **Wendisch-Basitz**; von **Sternberg** über  
**Neusalza** und **Weißenberg** nach **Großradisch**. Die **Farben**-  
**schemata** und **Meereshöhen** wie bey den andern **Blättern**.

## Reise

nach dem **Ural**, dem **Altai** und dem **caspischen Meer**, von **Alexander**  
von **Humboldt**, **G. Ehrenberg** und **G. Rose**. **Mineralo-**  
**gisch-geognostischer** Theil und **historischer** Bericht der **Reise** von  
**Rose**. Berlin, bey **Sander**. 1837. 1. 8. 641.  
10 Tafeln und eine **Charte**.

**Berichte** über die **Ausbeute** dieser auf **Verlangen** des  
Kaisers **Nicolaus** von **Rußland** im Jahr 1829 ausgeführten  
**Reise** machten schon lang die **Welt** auf das Werk selbst **begierig**.  
Der **reiche** **Inhalt** besitzen und die gründliche **Bearbeitung**  
macht aber nun auch die **lange** **Zeit** **begreiflich**, welche seitdem  
verflossen ist.

Die **Reise** selbst nach **Petersburg** und von da über **Moskau**  
zur **weiten** **Bestimmung** wird **kurz** aber **bündig** **geschildert**.  
Dasselbe gilt von den **Mineraliensammlungen** in **Petersburg** und  
**Moskau**, sowie von andern einschlägigen **Gegenständen**, wie  
**geognostische** **Ueberblicke**, **Höhenlage** und dergl. Ebenso bey  
**Kasan**, **Perm**, wo die **mineralogischen** **Untersuchungen** schon **ernst-**  
**hafter** werden. Bey **Catharinenburg** wird nun das **Vorkommen**  
des **Goldes** **geschildert** nebst den dortigen **Gebirgsarten**; **sobann**  
die **Goldgruben** von **Berejowka**, die **Kupfergruben**. Darauf geht  
**C. 275** die **Reise** weiter in den **nördlichen Ural** nach den **Gold**-  
**gruben** von **Naujanf**, **Nischne**-**Tagilsk**, wo besonders viel  
**Kupfer** **vorkommt** und **zuerst** das **Platin** sich zeigt nebst einer  
**Menge** **anderer** **Mineralien**, wie **Magneteisen** ufw. **Bey** **Wissert**

die Lagerstätten der Diamanten. Es folgen nun die Gegenden von N. Turinsk, Bogoslawoff, wo auch die Flora und Fauna berücksichtigt werden nebst den Kupfergruben. Die Rückreise nach Catharinenburg geht nun über Mussinsk, S. 430, und sodann nach dem Altai S. 471 über Tobolsk. Es werden S. 503 die Silber- und Kupfergruben geschildert bey Barnaul, Schlangenbergl, die Steinkohle bey Kaspowank, und dann gieng es wieder nach Schlangenbergl zurück.

Nicht bloß das Aussehen der Länder und das Geognostische sammt dem Bergbau, sondern auch die große Menge der einzelnen Mineralien wird aufs Genaueste beschrieben; viele Crystallabänderungen sind abgebildet von Diamant, Brochantit, Kupfer, Rothkupfererz, Kupferasur auf Octav-Tafeln. Dann folgen Pläne, Durchschnitte und Charten in Folio der Kupfergruben von Turinsk; Charte des altaischen Hüftenbezirks. Besonders liegt bey eine große Charte des ganzen Uralgebiets von Kasan oder der Wolga an bis östlich über Tobolsk am Trisch hinaus; ferner von Drenburg über Perm bis Tscherdyn mit sehr viel Einzelheiten. Der fonderbare Lauf und die völlige Umkehr vieler Flüsse ist auffallend. Das Werk ist eine große Bereicherung für die Geographie, Geognosie, den Bergbau und die Mineralogie überhaupt.

### Geologie und Mineralogie

in Beziehung zur natürlichen Theologie von Dr. W. Buckland, Professor zu Oxford; übersezt und vermehrt von Dr. A. Agassiz. Bern und Leipzig, bey Dalp. 1838. 8. I. 1. 200. II. 69 Taf.

Dieses Werk hat in England schon die zweyte Auflage erlebt, was sich wohl nach dem Ruhme seines Verfassers erwarten ließ. Buckland ist in diesem Felde und besonders in dem der Verfeinerungen einer der thätigsten und geistreichsten Arbeiter, hat nicht nur selbst vieles und Neues entdeckt, sondern auch geordnet und rastlos der Welt mitgetheilt, was bey allen Dingen die Hauptsache ist; denn die Weisheit hinter dem Ofen erwärmt niemanden. Dem großen Publicum gegenüber hat aber Buckland als Theolog bey diesem Studium noch einen andern Vortheil, welcher den Alterthumsforschern der Erde aus andern Ständen nicht bloß fehlt, sondern denselben sogar zum Nachtheil gereicht, indem die Frommen und besonders die Fromm-macher immer mit der größten Angst dem Studium der Antiquitäten der Erde zusehen, als einem Geschäfte, welches nothwendig ihre Meynungen oder gar ihren Glauben zerstören müßte. Wir sagen, zusehen; denn würden sie diese Antiquitäten selbst studieren, statt sie nur mit scheelen Augen halb und ärgerlich anzusehen; so würden sie Trost und Befriedigung für ihren Glauben darin finden. Da sie nun einmal nicht selbst in diesem Felde arbeiten wollen, weil auf ihren Schulen das Studium der Naturgeschichte entweder vernachlässigt oder gar verpönt war und sie daher keine Einsicht davon bekommen konnten; so ist es sehr menschenfreundlich und ohne Zweifel Gottgefällig, daß von Zeit zu Zeit Theologen, welche in ihrer Jugend nicht vernachlässigt wurden, aufstehen und dem größten Werke Gottes, nemlich der Natur seine Ehre und Würde einräumen und die Schwachen überzeugen, daß ihre Erfindungen vollkommen in Harmonie stehen mit der wahren Religion, d. h. mit einer solchen, welche nicht unter wilden, sondern unter geübten Völkern entstanden ist. Unter diese wohlthuenden Männer gehört

Stie 1838. Heft 11.

Buckland. Er steht allen frühern voran, nicht bloß wegen seiner guten Absicht, sondern weil er über ein viel größeres Gebiet der Entdeckungen zu verfügen hat, in dessen Mitte bereits der Berg steht, von dem aus sich ziemlich die alte Schöpfung überschauen läßt, was seinen Vorgängern noch nicht nöthig gewesen, da sie nur in einzelnen Höhlen herumkriechen konnten, um die Reste der ersten lebendigen Wesen auszugraben. Nun ist es anders. Man kennt die meisten Schichten, welche sie verbergen, und man weiß nach ihrer Ablagerung das relative Alter beyder zu bestimmen. Diese Schichten sind die Blätter in dem Buche der Natur und mithin auch in dem Buche Gottes. Davon hat Buckland gezeigt, daß es in keinem Widerspruch mit den Lehren der heiligen Schrift stehe, ja, daß es sich an dieselbe anschleße und ihre Lehren, welche nothwendig wegen ihrer Kürze dunkel sind, erklären helfe.

Das Buch ist jedoch nicht etwa als eine geologische Theologie zu betrachten, sondern als eine wirkliche Geschichte der Versteinerungen im eigentlichen Sinne des Naturforschers. Es wird darinn alles aufgeführt, was bis jetzt entdeckt wurde, beschrieben, geordnet und abgebildet. Der deutschen Ausgabe sind die englischen Originale beigegeben und die Figuren sind auf je einem beyliegenden Blatte erklärt.

Unter vielen andern Gegenständen sind abgebildet: Dinosaurium, Megatherium, Ichthyosaurus, Plesiosaurus, Mosasaurus, Pterodactylus, andere Lurche, Fische, Fußstapfen, Dämme, versteinerte Koth, Dintenrücke; viele Schalthiere, Kerse und Pflanzen. Dabey ist eine Charte, welche einen idealen senkrechten Durchschnitt der Erdrinde darstellt, sowohl mit den Schichten als mit den daraus hervorgebrochenen Schladen. Darüber verkleinerte Thiere und Pflanzen aus jeder Periode. Man muß dem Professor Agassiz Dank wissen, daß er dieses Werk auf deutschen Boden verpflanzt hat. Er hat den zweyten Band, welcher nur die Abbildungen enthält, sogleich vollständig geliefert: der Text des ersten Bandes folgt in Heften.

### Clavis

classium, ordinum et familiarum atque index generum regni vegetabilis. Auctore Professore PRAEB. Friburgi apud Emmerling. 1838. 4. 94.

Der Verf. hat schon in seiner Naturgeschichte des Pflanzenreiches 1826 seine Anordnung aufgestellt. Sie unterscheidet sich von den andern vorzüglich dadurch, daß er zwischen die Classen und Familien Mittelgruppen oder Ordnungen eingeführt hat, wodurch das System auch eine Gliederung im Großen erhält und dadurch übersichtlicher wird. In dieser Schrift sind nun die Arbeiten und Entdeckungen der Neuern hinzugekommen. Sie enthält zugleich in tabellarischer Form die Charaktere der Classen, Ordnungen und Familien. Die Zahl der erstern ist 9; der zweyten 48; der dritten 330. Wir theilen hier das allgemeine Schema mit:

#### Classis I. Protohyta.

- Ordo 1. Fungi. Fam. 1. Coniomycetes; 2. Hyphomycetes; 3. Gastromycetes; 4. Pyrenomycetes; 5. Hymenomycetes.
- Ordo 2. Lichenes. Fam. 6—9.
- Ordo 3. Algae. Fam. 10—15.

**Classis II. Muscosae.**

- Ordo** 1. Hepaticae. *Fam.* 16—19.  
 " 2. Operculatae. *Fam.* 20 et 21.

**Classis III. Filicinae.**

- Ordo** 1. Diclidopterides. *Fam.* 22—23.  
 " 2. Epiphyllispermae. *F.* 24—27.  
 " 3. Thylacopterides. *F.* 28—30. (Marsil.)

**Classis IV. Ternariae.**

- Ordo** 1. Spadicinae. *Fam.* 31—41.  
 " 2. Glumaceae. *f.* 42—46.  
 " 3. Tripetaloidae. *f.* 47—56.  
 " 4. Palmae. *f.* 57—62.  
 " 5. Liliaceae. *f.* 63—74.  
 " 6. Gynandrae. *f.* 75—78.

**Classis V. Monochlamydeae.**

- Ordo** 1. Coniferae. *fam.* 79—81.  
 " 2. Amentaceae. *f.* 82—87.  
 " 3. Urticinae. *f.* 88—96.  
 " 4. Piperinae. *f.* 99—102.  
 " 5. Oleraceae. *f.* 103—107.  
 " 6. Laureolinae. *f.* 108—117.  
 " 7. Stylandrae. *f.* 118—121. (Cytineae.)

**Classis VI. Thalamanthae.**

- Ordo** 1. Cyathinae. *fam.* 122—127. (Primul.)  
 " 2. Personatae. *f.* 128—135.  
 " 3. Pyrenaceae. *f.* 136—141.  
 " 4. Tetracarpae. *f.* 142—147.  
 " 5. Luridae. *f.* 148—154.  
 " 6. Picrochyleae. *f.* 155—164. (Gentianeae etc.)  
 " 7. Ataxae. *f.* 165—173. (Ericaceae etc.)

**Classis VII. Calycanthae.**

- Ordo** 1. Rigidiae. *fam.* 174—179. (Stellatae etc.)  
 " 2. Aggregateae. *f.* 180—182.  
 " 3. Synanthereae. *f.* 183—188.  
 " 4. Ranunculae. *f.* 189—194.  
 " 5. Peponiferae. *f.* 195—199.

**Classis VIII. Calycopetalae.**

- Ordo** 1. Umbraculariae. *fam.* 200—206.  
 " 2. Resinariae. *f.* 207—220. (Rhamneae etc.)  
 " 3. Leguminosae. *f.* 221—224.  
 " 4. Rosaceae. *f.* 225—238.  
 " 5. Pleurosperrae. *f.* 239—245. (Samydeae etc.)  
 " 6. Succulentae. *f.* 246—259.

**Classis IX. Thalamapetalae.**

- Ordo** 1. Caryophylleae. *fam.* 260—262.  
 " 2. Violariae. *f.* 263—271.  
 " 3. Rutariae. *f.* 272—282.  
 " 4. Tribilatae. *f.* 283—291.  
 " 5. Columniferae. *f.* 292—298.  
 " 6. Hesperideae. *f.* 299—307.  
 " 7. Samentaceae. *f.* 308—313.  
 " 8. Cruciflorae. *f.* 314—317.  
 " 9. Multisiliquosae. *f.* 318—330.

Es ist auf diese Classification und besonders auf die Bestimmung der Charactere offenbar sehr viel Fleiß verwendet, und

diese Schrift wird daher den Botanikern ein angenehmes Geschenk seyn. Sie enthält überdies ein Register der Gattungen mit Angabe der Familien, wohin sie gehören.

**Genera Plantarum**

secundum ordines naturales disposita. Auctore **ST. ENDLICHER.**  
 Vindobonae apud Beck. 1836. 8. 560.

Dies ist wirklich ein ungeheures Unternehmen; für einen einzelnen rückt es mit außerordentlicher Schnelligkeit vor: Seit dem Jahre 1836 sind bereits 7 Hefte erschienen, was beweist, daß der Verfasser das Meiste muß vorgearbeitet haben. Es enthält die kurzen Charactere mit einer Angabe der Tracht und der Abbildung. Der Verfasser fängt mit den Aigen an, geht sodann zu den Flechten und Pilzen über, worauf die Moose, Farren, Gräser, Liliaceen, Amentaceen, Dieraceen, Syngenesisten, Rubiaceen folgen. Die Zahl der Sippen beträgt schon 3298. Es ist eine erfreuliche Arbeit, welcher an Fleiß und Vollständigkeit gegenwärtig wohl keine gleich kommt; überdies nimmt das Buch einen kleinen Raum ein und läßt sich leicht mit sich führen. Zur größeren Bequemlichkeit folgt von Zeit zu Zeit ein Register; dem ohne Zweifel zum Schluß ein allgemeines folgen wird.

**Iconographia**

generum plantarum editis **ST. ENDLICHER.** Vindobonae apud Beck. 1837. Nro. 1. Tabulae 12.

Diese Abbildungen sind schön, genau und wohlfeil, weil es nur Umrisse mit wenig Ausschattierung sind; sie sind wichtig, weil sie meistens seltene Pflanzen vorstellen, oder wenigstens auf eine neue Art, gewöhnlich die Tracht und die einzelnen Theile sorgfältig zerlegt und geprüft.

Auf diese Weise kann sich auch das große Publicum Abbildungen anschaffen und sich mit dem Pflanzenreich bekannt machen. Auf jeder Tafel steht der Name der Gattung, der Familie und der Gruppe, z. B. Liliaceae; Asparageae; Eustrephus latifolius.

Was jetzt sind geliefert:

Ascroë pentactina;	Lyperanthus nigricans;
Coelachne pulchella;	Caleya major;
Anguillaria dioica;	Gymnostachys anceps;
Eustrephus latifolius;	Doryphora sasafra;
Gastrodia sesamoides;	Pimelea punicea;
Eriochilus autumnalis;	Symphyonema montanum.

**The genera and species**

of Orchideous Plants by **J. LINDLEY**, illustrated by **DRAWINGS** on stone from the sketches of **FRANCIS BAUER.** London. I. II. 1830—1832. 4. Tabulae 15 et 9.

**Franz Bauer**, der berühmte Pflanzenmaler aus Würzburg, wohnhaft aber in Kew, hat seit 1791 prächtige Gemälde

gemacht von seltenen Pflanzen mit ihren einzelnen Theilen und selbst mit microscopischen Untersuchungen, welche von allen Männern des Faches bewundert werden. Es sind aber so viele und so prachtvoll und bis ins kleinste ausgeführte Zeichnungen und Gemäthe, daß nur eine erleuchtete und liberale Regierung im Stande wäre, dieselben in Kupfer stechen zu lassen. Damit nun nicht gar Alles zu Grunde geht, so hat Lindley die ungemessene Liberalität von Bauer benutzt und angefangen, die so sonderbaren, seltenen und lehrreichen Orchideen lithographieren und illumieren zu lassen. Dabei ist eine Erklärung der einzelnen Theile, besonders des Baues, des Blütenstaubes, der Beutel, Narbe, Frucht und des Samens. Die Daten der Vervielfältigung dieser Abbildungen beweisen, daß Bauer schon lang die Natur und die Einheit des Baues der Orchideen erkannt hatte, ehe Andere daran dachten. Die Tafeln sind in zwei Reihen getheilt: die eine enthält die Fruchttheile mit anatomischen und physiologischen Beziehungen; die zweite enthält die Sippennamen im ganzen abgebildet. Es werden ungefähr 50—60 Tafeln werden. Am Ende wird Bauers Ansicht über die Befruchtung dieser abweichenden Gewächse mitgetheilt werden.

Taf. 1. der Fructificationen enthält die Beutel und Pollenmassen von *Bletia* ill., gemalt schon im Jahr 1801.

Die 2te die Säule mit den Geschlechtstheilen von *Prasia* 1807.

Die 3te dieselben Theile von *Orchis* 1792.

Die 4te ist noch nicht geliefert.

Die 5te die Geschlechtstheile von *Epidendrum* 1821.

Die 6te die Anatomie der Narbe von *Bletia*, Zellgewebe sehr vergrößert, 1802.

Die 7te.

Die 8te Pollenmassen von *Bletia* 1801.

Die 9te ein Querschnitt des Eyerstocks von *Bletia*, sehr vergrößert, 1801.

Die 10te Längsschnitte der Säule und des Eyerstocks von *Epidendrum* et *Bletia*, ungeheuer vergrößert.

Die 11te noch nicht geliefert.

Die 12te Geschlechtstheile von *Satyrion* 1800.

Die 13te dasselbe von einem andern *Satyrion* 1800.

Die 14te dasselbe von einem andern 1800.

Die 15te dasselbe von *Apostasia* 1832.

Von den Tafeln, welche die Sippennamen darstellen, zeigt:

Tafel 1. die Fruchttheile von *Malaxis* 1801.

— 2. dieselben von *Liparis* 1801.

— 3. dieselben von *Coelia* 1810.

— 4. dieselben von *Octomeria* 1820.

— 5. noch nicht da.

— 6. dieselben von *Dendrobium* 1793.

— 7. dieselben von *Oncidium* 1804.

— 8. dieselben von *Galeandra* 1804.

— 9. dasselbe von *Sarcanthus* 1813.

Man kann nicht anders, als die Mühe, die Genauigkeit im Vergleichen und die Geschicklichkeit im Zeichnen bewundern.

### Icones Fungorum hucusque cognitorum

Auctore A. C. J. CORDA. Pragae apud Calve. fol. I. 1837. tab. 7.

Corda's genaue Untersuchungen und viele Entdeckungen dieser Abtheilung des Pflanzenreichs sind rühmlichst bekannt,

zunchst in Sturm's Flora. Hier stellt er nun den Reichthum seiner Entdeckungen zusammen und theilt ihn der Welt durch sehr genaue microscopische Zeichnungen mit. Die Foliotafeln sind in Felber abgetheilt je nur für eine Gattung, wovon auf jeder Tafel oft über 3 Duzend stehen, im Ganzen nicht weniger als 300. Dieser Band enthält in 103 Sippennamen 316 Gattungen, wovon nicht weniger als 258 neu sind, alles nach eigenen Beobachtungen. Auch die Sporen sind sehr vergrößert abgebildet.

Die Pflanzen sind nach Familien geordnet; die Sippen und neuen Gattungen haben einen kurzen Character; jeß den anderen ist auf Sturm verwiesen. Es ist unmöglich, die vielen Sippen hier aufzuführen: wir wollen daher nur einige Beispiele wegen der Anordnung angeben.

#### I. CONIOMYCETES.

##### Caeomaceae.

1 Uredo etc. 19 genera,

##### Phragmidaceae.

20 Puccinia.

##### Torulaceae.

29 Torula.

#### II. HYPHOMYCETES.

##### Sporotrichaceae.

37 Myxonema.

##### Bactridiaceae.

57 Trichothecium.

#### Helminthosporiaceae.

61 Myrosporium.

##### Psilomiaceae.

75 Menispora.

##### Aspergillini.

89 Polyactis.

*Mucoroidae* und noch einige andere. Dabei ist ein Register der Gattungen. Der Verfasser hätte wohlgerathen, wenn er eine kurze Terminologie vorausgeschickt hätte.

Tom. II. 1838. tab. 8—15.

Es werden wieder Gattungen nach derselben Ordnung abgebildet. Die Charactere lateinisch, die weiteren Erklärungen deutsch. Dabei ist wieder ein Register.

Dieses schöne und reichhaltige Werk verdient alle Unterstützung. Es ist zugleich wohlfeil und kann von jedem Privatmann angeschafft werden. Die andern Werke der Art sind ungemein theuer und enthalten meistens nur größere Pilze, ohne microscopische Darstellung des inneren Baues, haben daher bey weitem nicht den innern Werth wie das vorliegende Werk. Der Verfasser wird dabei vorzüglich von dem Grafen Caspar Sternberg unterstützt; und dadurch wird auch die Wohlfeilheit dieses Werkes möglich.

### Syllabus Muscorum

in Italia et in Insulis circumstantibus hucusque cognitorum, auctore J. DE NOTARIS, M. D. Taurini, 1838. 8. 333.

Bekanntlich haben wir aus Italien in der neuern Zeit sehr wenig über die Cryptogama erhalten: um so mehr wird man sich freuen über dieses allem Anscheine nach sehr vollständige, in jeder Hinsicht aber sehr fleißige Werk. Wenigstens hat der Verfasser weder Zeit noch Kosten gespart, um viele Reisen zu machen, hat auch viele Freunde, welche ihm aus allen Gegenden eingeschickt haben. Ebenso ist er im Besitze der meisten bryologischen Werke und trocknen Sammlungen. Bey den Bekannten Gattungen steht kein Character, aber die Gatte und Fundorte nebst einer genaueren Beschreibung, wo es nöthig war. Bey den neuen Gattungen ist der Character sehr lang, eigentlich

eine Beschreibung, was man nicht loben kann. Die Schrift ist aber mit Liebe und Sachkenntniß bearbeitet und wird daher Bestfall finden.

Die Classification steht so:

**Ordo I. Pleurocarpi. 2. Aploperistomi.**

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Diploperistomi. | Polytrichacei.   |
| Hypnacei.          | Trichostomacei.  |
| 2. Aploperistomi.  | Dicranacei.      |
| Pterogoniacei.     | Weissiacei.      |
| Drepanophyllei.    | Ptychomitriacei. |
| 3. Aperiostomi.    | Tetramidacei.    |
|                    | Encalyptacei.    |
|                    | Splachnacei.     |

**Ordo II. Atrocarpi.**

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Diploperistomi. | 3. Aperiostomi. |
| Bryacei.           | Grimmiacei.     |
| Funariacei.        | Funariacei.     |
| Buxbaumiacei.      | Gymnostomacei.  |
| Orthotrichacei.    | Cleidocarpi.    |
| Zygodontoidei.     | 4. Astomi.      |

Neu sind:

- |   |  |
|---|--|
| Hypnum punctulatum, littoreum, demissum.                | insulana, squarrosa, intermedia.       |
| Leskia saviana, tristis.                                | Trichostomum subalpinum, anomodon.     |
| Pterogonium perpusillum.                                | Didymodon aureus.                      |
| Fabronia major.   | Dicranum bonjeanii.                    |
| Hedwigia sciurioides.                                   | Campylopus atrovirens, polytrichoides. |
| Pohlia cirrifera, laetevirens, dimorpha.                | Encalypta orsinii, lacera.             |
| Bryum insulare, boissierii.                             | microstoma.                            |
| Tortula princeps, spathulifolia, crassinervia, bifrons. | Raineria splachnoides.                 |
|   | Phascum heterophyllum.                 |

Der Verfasser beschreibt im Ganzen 408 Gattungen.

**Bryologia europaea**

seu genera muscorum europaeorum monographice illustrata. Auctoribus BRUCH et SCHUMPER. Stuttgartiae apud Schweizerbart. fasc. I—IV. 1837—1838. 4.

Eine fleißige und kenntnißreiche Arbeit mit deutlichen und genauen Abbildungen, die Stöcke in natürlicher Größe, die Blätter und Fruchttheile vergrößert und zerlegt und von den Verfassern selbst gezeichnet. Jede Sippe hat ihre besonders numerierte Tafel, worauf gewöhnlich 3—4 Gattungen abgebildet sind. Das Werk geht rasch vorwärts; denn binnen einem Jahre sind nicht weniger als 41 Tafeln fertig geworden und zwar von

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Archidium 1 tab.  | Orthotrichum 18 tab. |
| Phascum 7 tab.    | Glypomitrium et      |
| Bruchia et        | Coscinodon 1 tab.    |
| Voitia 1 tab.     | Ptychomitrium 1 tab. |
| Buxbaumia 1 tab.  | Zygodon 2 tab.       |
| Diphyscium 1 tab. | Encalypta 8 tab.     |

Der Charakter der Sippen und Gattungen ist lateinisch, wie auch die ausführliche Beschreibung der letztern. Die Aus-

einandersetzung der Sippen dagegen ist in deutscher und französischer Sprache, im Ganzen übereinstimmend, jedoch auch nicht selten abweichend, je nach der Ansicht, wie es scheint, der verschiedenen Herausgeber, da der französische Text wohl von Schimper herrührt. Es fehlt jede Vorrede und Einleitung, worin man Auskunft erhalten könnte. Auch steht bald auf den Tafeln: Auctores delinearunt, bald Auctor delineavit. Es wäre also sehr nöthig zu wissen, welches der eigentliche Auctor von jeder Sippe ist: denn man kann nicht annehmen, daß Beide an einer und derselben Pflanze gezeichnet haben. Auf Stein gestochen scheinen sie zu sein von Sigrist zu München, gedruckt in der Lithographie von Simon zu Straßburg. Man kann mit Allem sehr wohl zufrieden sein.

**Die Natur der lebendigen Pflanze,**

von H. Schultze. I. Berlin, bey Reimer. 1823. 8. 693. 4 Taf. II. Stuttgart, bey Gotta. 1828. 624. 3 Taf.

**Organographie végétale** par A. P. DE CANDOLLE. Paris, chez Deterville. I. II. 1827. 8. 558. 304. 60 pl. Deutsch von Meisner.

Idem, **Physiologie végétale.** 1831. I—III. 8. Deutsch von Röper. I. 1833. II. 1835.

LERBOKI **Botanik** af C. A. AGARH. Malmö. 1829. 8. I. **Organographi.** 416. 4 Taf. Deutsch v. Meyer. 1831. II. **Biologi.** Deutsch v. Creplin. Greifswald, bey Koch. 1832. 479. 1 Tafel.

**Phytotomie** von Meyen. Berlin, bey Haube. 1830. 8. 356. 4 Tafeln.

**Physiologie der Gewächse** von L. Ch. Treviranus. Bonn, bey Marcus. I. 1835. 8. 570. 3 Tafeln. II. 1. 1838. 480.

RASPAIL, **nouveau systeme de physiologie végétale et de botanique.** Paris, 1837. T. I. et II. 599 et 658 t. 60.

DUTROCHET, **Mémoires pour servir à l'histoire anatomique et physiologique de végétaux et des animaux.** Paris, 1837. T. I. et II. 576 et 573. t. 30.

Neues System der **Pflanzenphysiologie** von F. Meyen. Berlin, bey Haube. I. 1837. 8. 440. 6 T. II. 1838. 562. 3 T.

H. LINK, **Elementa philosophiae botanicae.** Berol. ap. Hande. I. II. 1837. 8. 501. 377. 4 t. Deutsch gegenüber: Grundlehren der Kräuterkunde.

Keinen sprechenderen Beweis für die große Regsamkeit in der Anatomie und Physiologie der Pflanzen kann es geben, als die rasche Erscheinung solcher gründlicher und alles umfassender Werke von Männern, welche seit vielen Jahren durch rastlose Beobachtungen, geschickte Zerlegungen, scharfsinnige Versuche und große Übung in der Anwendung des Microscops, sowie durch Lesung, Vergleichung und Beurtheilung aller Entdeckungen sich zu Meistern in der Wissenschaft gebildet haben. Man kann alle diese Werke in Bezug auf ihren Inhalt vortrefflich nennen, die meisten auch in Bezug auf die Anordnung und die Sprache. Man liest sie mit Vergnügen und selbst mit Bewunderung. Die Mühe, welche sich ihre Verfasser gegeben, um alles selbst zu sehen, sowie der Scharfsm, welchen sie angewendet haben, um die Wahrheit zu entdecken, leuchtet aus jeder Zeile hervor. Es ist in der That Unglaubliches geschehen, und man sollte glauben, es wären Beobachtungen genug vorhanden, um endlich

etwas entscheiden zu können, besonders wenn man die tüchtigen Arbeiten der nächsten Vorgänger zu Hülfe nimmt, wie von Rafn 1798, Michel, Moldenhauer, Rudolphi, Sprengel, Kiefer und Andern, welche aufzuzählen gar zu weitläufig wäre. So gründlich aber auch die Anatomie bearbeitet und durch so viele und schöne Abbildungen erweitert ist; so vielseitig und geistreich die Physiologie dargestellt und überlegt ist; so muß man doch leider mit Schrecken gestehen, daß man von der letztern gegenwärtig weniger weiß, als man früher glaubte gewußt zu haben. Nicht weiß man, was die Zellen thun; nicht, wo und wie der Saft aufsteigt; nicht einmal, ob in den Spiralgefäßen Luft oder Saft ist. Man streitet sich, ob in den Zellen aller Pflanzen die Kügelchen umlaufen, ob der Milchsaft in einem eigenen Gefäßsystem sich bewegt oder in zusammenhängenden Lücken stagnirt; von den Absonderungen gar nicht zu reden. Haben die Pflanzengewebe Reizbarkeit und eigene Bewegung, wodurch die Säfte fortgetrieben werden; oder geschieht es durch physische Kräfte, Haarröhrenanziehung, Wärme, Ausdünstung? Das weiß man nicht. Wie und durch welche Theile geschieht die Bewegung mancher Blätter und Staubfäden? Das weiß man nicht. Zersehen die Pflanzen das Wasser, die Kohlensäure, oder ziehen sie fertige Nahrungstheile ein? Das weiß man nicht. Kommt der Sauerstoff, den sie aushauchen, von der Zerlegung der Kohlensäure oder des Wassers her, oder wird er bloß vom Wasser abgetrennt? Das weiß man nicht. Nicht, als wenn man es in diesen Büchern nicht wüßte: im Gegentheil, jedes weiß etwas, aber meist etwas besonderes. Fast jeder Beobachtung, fast jedem Versuch, ja fast jeder microscopischen Erscheinung steht eine andere gegenüber. Aus diesem Wirrwarr scheint nichts anderes hervorgehoben, als daß auf den eingeschlagenen Wegen das Ziel nicht zu erreichen ist; daß der Boden, auf welchem man so eifrig arbeitet, nicht der rechte ist. Ist das Schachbrett falsch eingetheilt, so mag man die Figuren ziehen, wie man will; es wird nie ein Spiel geben, welches zu einem regelmäßigen Ende führt. Man muß es umstoßen und auf einem richtigen Brett aufstellen.

### Flora berolinensis

auctore C. S. Kunth. Berolini apud Duncker. 1839.  
I. 407. II. 439.

Diese Flora ist nach dem natürlichen System geordnet, und auf eine Art bearbeitet, wie man es von einem solchen erprobten Botaniker erwarten kann. Die Charaktere sind zwar etwas lang, aber sie geben ein Bild von dem natürlichen Bau der Pflanzen. Dabey sind die nöthigen Citate, Fundorte, Blüthezeit ufw. Vor jeder Familie steht eine analytische Tabelle der Sippen, wodurch das Auffuchen erleichtert wird. Es sind alle sogenannten Gefäßpflanzen abgehandelt; vielleicht übernimmt ein anderer die Zellenpflanzen. Den Schluß macht ein Register der Sippen. Dieses Werk wird ohne Zweifel dem ihm gebührenden Beyfall der Botaniker erhalten.

### Deconomisch=technische Flora Böhmens

von F. Grafen von Berchold und P. M. Dpiz. Prag, 1839.  
S. II. 1. 299.

Von diesem Werk kann man wirklich sagen, daß die Verfasser des Guten zu viel thun. Nicht bloß die Beschreibungen Sfs 1838. Sest 11.

und die Fundorte, so wie die Abarten und Citate sind mit einer ungemeinen Vollständigkeit gegeben, sondern auch die chemischen und öconomischen Verhältnisse in allen möglichen Beziehungen; die Bestandtheile meist nach verschiedenen Verfassern, der Anbau, das Alter, die Zeit der Einsammlung, Nutzen und Schaden sowohl nach eigenen Erfahrungen als nach den Schriftstellern aller Zeiten. Das Botanische rührt von Dpiz, das Deconomisch=Technische von Berchold her; die Potamogeta sind von Fr. A. Fieber bearbeitet, ganz in derselben Art, wie das andere. Wir wissen wirklich nicht, ob solch eine Ausführlichkeit den Deconomen und Techniken zuträglich ist, löblich aber ist solch ein Fleiß auf jeden Fall und freuen wird es sehr viele Männer vom Fach, daß sie Alles finden können, was sie nur zu wünschen haben.

### De Cedrela febrifuga,

diss. in., auctore E. A. FORSTEN. Lugd. Batav. 1836.  
4. 36. 1 t. in fol.

Dieses ist eine sehr umständliche Monographie dieser wichtigen auf Java wachsenden Heilpflanze und enthält die ausführliche Darstellung der Charaktere der Familie, der Sippe und der Gattung nach den neuesten Begriffen der Botanik. In der zweyten Abtheilung werden die chemischen, pharmaceutischen und medicinischen Verhältnisse dargestellt. Auf der dritten Tafel sind Zweige abgebildet mit den Rippen, den einzelnen Theilen der Blüthe, sowie die Rinde. Diese kleine Schrift macht dem Eiser und den Kenntnissen des Verfassers viel Ehre.

### Die Flora der Schweiz

von Dr. med. J. Hegestschweiler. Zürich, bey Schutthes. 1839.  
S. I. 144.

Es ist nicht nöthig dieses Werk zu empfehlen, da es der Name des Verfassers hinreichend thut. Nicht leicht hat jemand die Schweiz so durchsucht, eine solche vollständige Sammlung zusammengebracht und dieselbe sowohl in der Natur als im Zimmer nach allen Seiten studirt und verglichen wie der Verfasser, der eine lange Reihe von Jahren mit Liebe für die Wissenschaft, sowie für sein Vaterland sich diesem Studium gewidmet hat. Gaudin's Flora enthält 2313 Gattungen, die vorliegende wird gegen 3000 enthalten, obschon der Verf. keinesweges der Speciesmacherey hulldiget.

Das Werk ist nach dem Linneischen System bearbeitet, welches bey Floren offenbar dem natürlichen vorzuziehen ist, da sie keinen andern Zweck haben können, als die Pflanzen schnell kennen zu lernen. Die Anordnung der Pflanzen eines Landes nach dem natürlichen System hat einen andern Zweck und gehört einer andern Form von Wädhern und Erubium an, im Grunde auch andern Menschen, nehmlich solchen, welche sich der Wissenschaft ausschließlich widmen können und dieselbe nicht zu einem practischen Zwecke brauchen.

Das Werk ist deutsch. Es enthält voran Uebersicht der Sippen nebst dem Charakter, der etwas lang ist. Es wäre vielleicht gut, wenn man den Charakter in zwey Theile schiebe

und jeden a linea setzte. Der erste Theil mußte bloß den strengen Unterscheidungscharacter enthalten und kein Wort mehr. Der zweyte würde sodann den natürlichen Character darstellen, worinn jeder Blüthenheil kurz geschildert wäre.

Nach den Sippencharacteren jeder Classe folgen die Gattungen, jedesfalls mehr mit einem natürlichen, als sogenannten systematischen Character. Dabei ist die Höhe angegeben, Standort, der Nutzen, Abweichungen usw. Man findet hier eine Menge besonderer Beobachtungen, welche anderen Botanikern noch nicht aufgefallen sind. Diese Lieferung enthält die 4 ersten Classen in 94 Sippen und 493 Gattungen. Sie enthält auch die gewöhnlichen Cultur- und Gartenpflanzen, was sehr zu loben ist, da sonst der Pflanzenfreund fast kein Mittel hat, die ihm täglich vorkommenden Pflanzen kennen zu lernen: denn Sprengels System kann er doch unmöglich mit sich tragen, auch wenn er es wirklich besitzt.

### Deutschlands Flora

von Jacob Sturm. I. 72—74. III. 17. 1838.

Die Phanerogamen dieser Hefte sind von Professor Koch zu Erlangen bearbeitet, die Pilze von Dr. Roskovicus zu Stettin. Sie enthalten:

I. 72. 1) *Campanula rhomboidalis*, *bononiensis*, *latifolia*, *spicata*.

2) *Epilobium dodonaei*, *fleischeri*, *montanum*, *montanum verticillatum*, *montanum lanceolatum*, *hypericifolium*.

3) *Ononis spinosa*, *antiquorum*, *repens*, *hircina*, *natrix*, *rotundifolia*.

I. 73. 4) *Rumex maritimus*, *palustris*, *steinii*, *conglomeratus*, *sanguineus*, *sanguineus genuinus*, *pulcher*, *divaricatus*, *obtusifolius*, *obtusifolius discolor*, *obtusifolius sylvestris*, *pratensis*, *crispus*, *patientia*, *hydrolapathum*, *maximus*, I. 74. *aquaticus*, *alpinus*, *scutatus hastifolius*, *scutatus hastilis*, *scutatus triangularis*, *arifolius*, *acetosa*, *acetosa fissus* (*R. intermedius*), *acetosella*, *acetosella multifidus* (*R. multifidus*).

5) *Blitum capitatum*, *virgatum*, *bonus Henricus*, *rubrum*, *rubrum varietas acuminata* (*Chenopodium blitoides*), *rubrum varietas foliis paucidentatis* (*Chenopod. botryodes*).

III. 17. 6) *Polyporus serialis*, *rini*, *nigricans*, *fomentarius*, *ribis*, *igniarius*, *makraulos*, *polymorphus*, *murinus*; *aurantiacus*, *bathyporus*, *vulgaris*, *cerasi*, *haematodus*, *micans*, *molluscus*.

### Anatomisch-botanische Abbildungen

zur Erläuterung der Grundbegriffe der Kräuterkunde von H. Fr. Eint. Berlin, bey Haude. Fol. Heft I—III. 1837—1838. Tafel 1—24.

Bisher hatten wir nur in der Anatomie der Thiere Prachwerke oder zahlreiche und genaue Abbildungen in großem Format; die Anatomie der Pflanzen hatte außer Kiefers Preisschrift nichts ähnliches nachzuweisen. Sie mußte sich mit einigen Wespblättern zum Texte begnügen. Der berühmte Veteran in der

Pflanzen-Anatomie hat diesem Mangel abgeholfen und zwar auf eine Art, welche ihm und der Wissenschaft Ehre und ihren Freunden Freude macht. Ein junger Mann, C. H. Schmidt, hat sich bey ihm Jahre lang im Zeichnen microscopischer Pflanzentheile gelibt und es endlich zu einer Genauigkeit gebracht, welche kaum etwas zu wünschen übrig läßt. Er weiß von keiner Theorie und gibt daher die Dinge ganz so, wie er sie sieht. Die Gegenstände sind in der Regel durch ein Microscop von März in München gesehen, bey einer 584 maligen Vergrößerung; manchmal nur durch die Lupe. Die Abbildungen sind alle sehr groß, vollständig ausgeführt, bisweilen illuminirt, wo es nöthig war. Die Gegenstände sind aus den verschiedensten Pflanzen und den verschiedensten Theilen genommen, so daß man dieses Werk als einen vollständigen Coder der Pflanzenanatomie ansehen kann. Der Verfasser begleitet jede Abbildung mit einer Erklärung und gelegentlich mit physiologischen Bemerkungen. Eine Angabe des Inhalts wäre unmöglich, da jede Tafel ungefähr ein Duzend Abbildungen enthält, mithin ihre Zahl schon in mehrere Hundert läuft.

### Transactions of the zoological

society of London II. part. 2. 1838. 4. 87—163. tab. 18—29. (18 Schllg.)

Enthält: VIII. Garner, Anatomie der Schalthiere.

IX. Owen, neue Cephalopoden.

X. Fr. Cuvier, Springmäuse.

XI. Waterhouse, Myrmecobius.

XII. Westwood, heilige Käfer.

E. 87. VIII. R. Garner, über die Anatomie der Schalthiere mit Blattkiemen. Taf. 18—20.

Die Tunicata unterscheiden sich von diesen Schalthieren durch den Mangel der Schalen: indessen habe ich bey einigen brittischen Gattungen kalkige Stücke gefunden, in der Gestalt von zwei kegelförmigen nebartigen Röhren in jeder Oeffnung des Mantels und daraus hervorspringend. Savigny hat es übersehen, Esenhardt aber gefunden. Die Schalthiere mit Blattkiemen unterscheiden sich von den Brachiopoden durch zweifelhafte Mantellappen, welche eine rechte und linke Klappe absondern; durch einen elastischen Knorpel zwischen den Klappen; durch ein einfacheres Muskelsystem zum Oeffnen und Schließen der Schale, durch vier häutige kammförmige Organe um den Mund und durch 4 andere zum Atmen.

Anomia steht zwischen beyden. Die Lage des Thieres in der Schale ist weder wagrecht wie bey den einen, noch senkrecht wie bey den andern, sondern schräg. Durch das getheilte Muskelsystem, eine Spur von Fußscheibe, einen kurzen Darm, im Mantel verzweigte Kiemen und durch die verbundenen Lippen- und Kiemenanhängele stimmt sie mit Orbicula überein; in anderer Hinsicht mit den einmuskeligen Blattkiemen.

Ich halte die verfeinerten Spheruliten für verwandt der Anomia; deshalb wäre die Zerlegung von Thecidea, Crania, Placuna und der verschiedenen Gattungen von Anomia, Terebratula etc. sehr wünschenswerth.



In Lamarck's Monomyarien zeigt sich bey vielen Sippen eine schiefe Gestalt und eine verschiedene Größe der Schalen; wenn sich bey den Dimyarien etwas der Art findet, so kommt es nicht von der verschiedenen Lage der weichen Theile zur Schale her, wie bey den Brachiopoden, sondern von der Natur des Schloßes.

Ich will mich hier nicht auf das Wachsthum der Schale einlassen. In den von einander entfernten Lagen der Schalen mancher Plattkriemer glaube ich aber einige Ähnlichkeit mit den verlängerten zelligen Klappen gewisser verstreimter Sippen und mit den vielfächerigen Schalen wahrzunehmen. Die Gestalt und Größe des Schloßes trägt sehr viel zur Gestalt des vordern Theils der Schale bey, während der hintere von der Gestalt der Aschmörhren abhängt. Die Entfernung der Klappenschnäbel bey manchen Schalen kann nur entstehen durch Zerfressung oder durch Nachgeben des Knorpels, weil die Schnäbel ursprünglich immer durch diesen Knorpel zusammenhängen. Bey Isocardia, wo die Schnäbel weit von einander um die Klappen gewunden sind, kann man bemerken, daß der Knorpel sich hinten vergrößert, während er vorn nachgibt und sich spaltet. Bisweilen gibt der Knorpel an einer Klappe mehr nach als an der andern und dann wird nur der eine Schnäbel länger, wie bey Gryphaea etc. Das Wachsthum einiger Schalen können wir nur begreifen, wenn wir annehmen, daß das Thier dieselben an gewissen Stellen loslassen kann: so können wir die Erweiterung der Kerbe, welche fast ein völliges Loch wieh, an der Unterschale von Anomia nicht erklären, ohne ein solches Vermögen des Thiers, welches von dem beständigen Wasserstrom herkommt, den die flimmernden Wimpern des Thiers hervorbringen.

Die Färbung der Schale, des Fußes, der Röhren usto. kommt von einem abgesonderten Farbestoff, dessen chemische Natur nicht bekannt ist. Es findet sich aber eine ähnliche Absonderung bey allen Schalthieren. Diese Absonderung hat die Eigenschaft, am Lichte viel glänzender zu werden. Um den berühmten Purpur der Alten hervorzuheben, scheint man nur die weichen Theile des Thiers der Purpura dem Einfluß des Lichtes und der Luft aussetzen zu müssen, um die braune Absonderung in eine glänzende Purpurfarbe zu verwandeln. Diese farbende Flüssigkeit wird entweder von den Venen oder von venösen Secretionsorganen abgesondert, wie in der Folge gezeigt werden wird, und nicht von der Leber, wie Blainville sagt.

Die Zeichnungen der Klappen scheinen von der Lage der Mantelvenen herzukommen und ihre Unterbrechung von dem Aufhören der Absonderung in gewissen Perioden.

Die Verschiedenheiten in der Articulation der Klappen im Knorpel, im Band und in den Zähnen können auf folgende Art erklärt werden. Ist der Knorpel äußerlich wie bey Cardium, convex und vorspringend, so kommt seine Zusammenrückung nicht vom Druck der Klappen her wie bey den Gattungen mit innerlichem Knorpel; sondern davon, daß er sich auf sich selbst biegt. Ein Knorpel von dieser Bildung unterscheidet sich von den andern durch kohlensauren Kalk, den er enthält. Die Zähne fehlen oder sind schwach, wenn die Muskeln oder Knorpel stark sind; wenn unregelmäßige Klappenränder das Gleiten bey der Bewegung hindern oder wenn die Schale klein, flach und glatt ist und daher keine Gewalt ausübt; auch wenn Schloß und Knorpel lang sind; obgleich zahlreich im langen Schloße der Arcaeen, wodurch die Schwäche des Knorpels ersetzt wird.

Bei Nucula findet sich ein gefiederter Mantelfortsatz zur Absonderung der zahlreichen Zähne. Bey den Sippen mit langen fleischigen Röhren und klaffenden Schalen liegt der Knorpel innwendig auf einem Vorsprung einer Klappe wie bey Mya; bey diesem Bau schließt sich nicht leicht die Schale ganz und öffnet sich auch nicht weit. Sie kann sich nur dann weit öffnen, wenn die Mantelklappen nur auf eine kurze Strecke verwachsen sind, wie bey dem inneren Knorpel vieler Monomyarien. Ist der Fuß wie bey Arca dick, so liegt in dem graben Schloß und in der Entfernung der Schnäbel die Vorrichtung zur weiten Oeffnung der Klappen durch den Fuß; in manchen Gattungen klaffen selbst die Klappen unten, damit der Fuß heraus kann.

Bei Pholas candidus findet sich ein Knorpel zwischen den zweien kleinen stachelartigen Fortsätzen des Schloßes. Bey anderen Gattungen von Pholas, welche keine Spur davon haben, und bey andern verwandten Sippen, welche einen eigenthümlichen Bau in der Articulation haben, betrachte ich die Bewegung der Klappen nur als eine secundäre Ursache bey der Durchbohrung der Substanzen, worinn man diese Thiere findet.

Muskelsystem. Die Röhre zur Hervorbringung des Byßus (deren Daseyn Blainville läugnet) findet man sehr leicht am Grunde des Fußes (bey Modiola z. B.) mit einem Gang, der sich am Vorn seiner Furche befindet. Sie ist zweyklappig und von dunklem, körnigem Ansehn. Ich betrachte den Fuß von Pecten, Spondylus etc. als ein Organ zum Ergreifen des Futters, welches durch die flimmernden Ströme am Munde gesammelt wird. Bey diesem hat er nur einen einzigen langen und dünnen Muskel. Der Gebrauch des Fußes als Organ der Ortsbewegung ist hinlänglich von den Naturforschern beschrieben. Ich glaube auch, daß ein Nutzen des sogenannten Crayfalfgels darin besteht, daß er dem Fuß Federkraft gibt. Er ragt in den Magen hinein und richtet sich nach unten zu dem Porus, durch welchen Wasser in den Fuß tritt, wie man es bey vielen Gattungen findet. Sein oberes Ende hat einen kleinen membranösen Knorpel mit Namen Corpus tricuspe. Bey Anomia trägt der Griffel ein großes Stück des Mantels; bey anderen Monomyarien fehlt er; die Membran aber ist immer vorhanden. Das Ganze scheint das Analogon zu seyn von der sonderbaren Zunge anderer Schalthiere.

Einige Gattungen haben zweien Mantelsäcke, worinn bisweilen Gas enthalten ist, das wahrscheinlich aus Secretionsorganen kommt. Diese Thiere können sich heben und leicht ihre Lage nach Ebbe und Fluth ändern.

Nervensystem. Bey mehr als 20 Sippen, wo ich es untersucht habe, finde ich eine große Uebereinstimmung. Poli, Cuvier und Blainville haben es ziemlich unrichtig beschrieben; Mangili dagegen bey Anodonta sehr genau.

Ist ein Fuß vorhanden, so finden sich drey Knoten oder so viel Paar von Knoten; fehlt er, nur zwey. Diese Knoten sind auswendig hochgelb, innwendig weiß. Zweyen liegen am Mund, mehr oder weniger weit von einander, aber immer durch einen Nerven über der Speiseröhre verbunden: bisweilen liegen sie gerad am Munde oder davor, bisweilen dahinter. Sie geben ab jederseits Fäden zu dem vordern Muskel, den Fühlern, Rippen und dem vordern Theil des Mantels. Jeder Knoten gibt auch einen Zweig ab zu den hinteren Knoten, welche zwischen den Riemen am hinteren Muskel liegen. Sie sind in einen



vereinigt, wenn die Kiemen selbst in der Mitte verbunden sind, wie bey *Mactra*, *Mya*, *Solen* etc.; liegen aber wdt von einander, wenn die Kiemen getrennt sind; in welchem Falle jedoch sie immer durch einen Quernerven zusammenhängen, wie bey *Modiola*, *Avicula*, *Lithodomus*, *Arca* etc. Die Knoten geben Nerven zu den Kiemen, Röhren, dem hinteren Muskel, Mantel usw. Die vorderen Knoten geben auch zwei Zweige ab, welche in den Fuß dringen und sich in einen doppelten Knoten vereinigen, aus welchem dieses Organ Nerven empfängt. Fehlt der Fuß, so findet sich nur ein einziger verbindender Quersablen. Die hinteren und die Fußknoten stehen außer aller Verbindung mit einander. Dann ist der Mund von einem Ring umgeben, dessen Theil hinter und über den Lippenknoten doppelt ist. Bey *Pecten* zeigt es sich deutlich, daß die Lippenknoten zusammenge-  
 gesetzt sind. Es gibt kein sympathisches Nervensystem, obgleich es Einige behaupten.

**Verdauungssystem.** Poli nimmt an, daß das *Corpus trienspidum* den Einfluß der Galle in den Magen vermittelt, welcher Nahrung die beyträgt, weil ich seine Enden immer in den Gallengängen finde. Der Darm gibt einer Menge Venen ihren Ursprung, welche wahrscheinlich als Milchsaftgefäße wirken. Sein erstes Stück ist drüsig. Manchmal ist er kürzer als das Thier, manchmal 12 mal länger. Gewöhnlich sieht man in ihm eine Leiste, wie man es bey den nackten *Acephala* findet. Diese Leiste wurde übrigens von Poli erschöpft und ich gehe daher zum

**Kreislaufsystem.** Bojanus hat (in der *Iffe*) eine genaue Beschreibung des Kreislaufes bey *Anodonta* gegeben und gezeigt, daß es nicht so einfach ist, wie Cuvier meynet. Aus des Bojanus Arbeit geht hervor, daß die wirklichen Athemorgane zwei dunkle schwammige Körper sind, an der Wurzel der sogenannten Kiemen, und daß sie aus der Verbindung vieler Venen gebildet werden. Meine Untersuchungen führen mich auf andere Schlüsse. Durchsichere Einspritzungen zeigten mir, daß bey der großen Kammuschel (*Scallop*, *Pecten maximus*) das Blut, welches aus dem Leibe zurückkehrt, nicht unmittelbar zu den Kiemen geht; sondern ein großer Theil davon, das aus den Eyerstöcken, der Leber und dem Darn, zuerst theilweise durch die zwei dunklen Venen, secretirenden Organe (Lungen von Bojanus) geht, und ein anderer Theil in einen großen Sinus oder eine venöse Erweiterung auf dem Schließmuskel. Dieser Sinus scheint jederseits die Kiemenarterie zu bilden, und steht übrigens in offener Verbindung mit Zweigen von den Secretionsorganen, welche letztere wieder eine dritte Reihe von Zweigen haben, die in die Kiemenarterie gehen.

Der oben erwähnte Sinus, welcher auch bey den Dimparien vorkommt und unter dem *Pericardium* liegt, empfängt auch bey *Pecten* die Venen aus einem Theil des Mantels; ein anderer schickt sie unmittelbar in die Herzohren. Die Kiemenarterien werden gebildet von dem großen Aste des Sinus, von den Ästen aus den Secretionsorganen und von einigen kleinen aus dem Mantel und aus den Wurzeln der Kiemen. Das Blut aus den Kiemenvenen bringt in die Herzohren, welche Anhängsel über sich haben, die wahrscheinlich das *Liquidum pericardii* absondern. Die Herzohren, welche bey der Auster mit einander verbunden sind, sind es hier durch einen Canal; im Allgemeinen sind sie ganz von einander getrennt. Zwei mondformige Klappen liegen am Eingang eines jeden Ohrs in

die Herzkammer; auch liegen Klappen am Ursprung der Aorten. Bekanntlich durchbohrt gewöhnlich der Mastdarm die Herzkammer, wovon aber die Auster eine Ausnahme macht. Bey *Anomia* liegt die Kammer auf dem Mastdarm. Bey *Arca*, *Lima* und einigen *Pectunculi* finden sich zwei Herzklappen und der Mastdarm geht zwischen beiden durch. In der Theilung der Arterien gibt es nichts Merkwürdiges. Biezeiten, wie bey *Cardium echinatum*, zeigt sich das erste Stück der Aorta sehr weit mit starken Wänden und vielen fleischigen Säulen an der inneren Fläche.

Es tragen mithin nicht alle Venen zur Bildung der Kiemenarterien bey: während etwas Venenblut gradenwegs in die Herzohren kommt, wird ein anderer Theil zuerst in die Absonderungsorgane vertheilt. Auch gibt es einen Behälter oder Sinus, oder eine Reihe von sehr großen Venen, welche einen großen Theil des venösen Blutes empfangen und sich sowohl in die Venen der Kiemen entleeren, als in die der Absonderungsorgane. Das venöse Blut aus dem Leibe geht ebenfalls einigermaßen in die Herzohren. Die Kiemenarterien nehmen wenig Venen auf; das meiste Blut bekommen sie aus dem Sinus. Hierinn zeigt sich eine Aehnlichkeit mit einem Fortader-Kreislauf, obgleich er nicht durch die Leber geht, als in welcher die Galle von den Arterien abgefordert wird.

Blut aus den Herzohren ist fast farblos und scheidet sich bey'm Stehen in einen flüssigen und einen festen Theil, zeigt auch unter dem Microscop ein sonderbares Phänomen, welches Mayer (in Bonn) beobachtet zu haben scheint: nemlich seine Kügelchen, etwa 1000 Zoll dick, erscheinen mit Fortsätzen und zeigen augenscheinlich Bewegung. Die Pulsationen des Herzens sind langsam, 20 bis 30 in der Minute.

**Athemsystem.** Ich halte die Lage und Gestalt der Kiemen und Röhren für sehr wichtig bey der Classification dieser Thiere: so haben bey *Anomia*, *Pecten*, *Arca*; *Modiola*, *Mya*, *Cardium*, *Cyclas*, *Donax* et *Mactra* je einen besondern Bau in den Kiemen, im Mantelsack, in den Klappen, Röhren usw., wodurch besondere Abänderungen im Laufe des oxydirenden Wassers zu den Kiemen bebingt sind. Bey allen genannten Sippen gibt es keine vollständige Trennung des Mantelsacks. Bey *Solen*, *Hiatella*, *Pholas* etc. ist der Bau verschieden: die Kiemen verlängern sich in die untere Röhre, und da sie innwendig nicht vom Grunde des Fußes getrennt sind, auswendig nicht vom Mantel; so muß das durch das untere Loch eingezogene Wasser wieder zu demselben herausgehen oder zu der vorderen Oeffnung. Aber Wasser wird auch durch die obere Röhre eingezogen und bekommt dadurch Zutritt zu den inneren Räumen zwischen den Kiemenblättern (Epergänge, wie Einige meynen); und durch diese obere Röhre werden die Eyer, der Urath und die Absonderungen ausgestoßen\*. Hier sind die Kiemen oft sehr lang und die Röhren sehr muskulös. Biezeiten finden sich kleine Hülfskiemen, wie bey *Psammobia*,

\* Das geschieht auch so bey den *Tunicata*. Das Wasser geht durch ein Loch zum Athemfach und wird durch das andere in die äußeren Maschen der Kiemen gezogen. Das durch jedes Loch eingezogene Wasser muß wieder durch dasselbe hinausgehen. Diejenigen, welche das Gegentheil behaupten, scheinen sich zu irren, wosfern das Wasser nicht durch den Magen und den Darm geht.

Pholas etc. Das äußere Paar zeigt sich vorn verkürzt bey *Mya*, *Venerupis* etc. Bey *Pandora* besteht die einzige Spur von den äußeren Kiemenblättern aus zween sehr schmalen Streifen am Grunde der andern: so ist es auch nach *Blainville* bey dem der *Pandora* verwandten *Osteodesma*. Obgleich das Einziehen des Wassers in den Mantel nicht durch die Thätigkeit der Oeffnungen oder Röhren, oder durch die Erschlaffung der Schließmuskeln und die Oeffnungen der Klappen bewirkt wird, so begleiten doch diese Thätigkeiten das Einstürmen; und obgleich das Wasser gewöhnlich in einem fortlaufenden Strom durch die Thätigkeit der Cilia austritt; so findet doch oft ein plötzliches Ausströmen Statt, begleitet von dem Schließen der Klappen und von der Contraction der Röhren.

**Aussonderungssystem.** Die sehr zahlreichen Mantelvenen scheinen die Klappen abzuondern und enthalten oft viel kohlensauren Kalk, sichtbar durch das Microscop, in der Gestalt von kleinen Spiculae. Bey der Süßwassermuschel wußten oft die Platonisten das Erscheinen einer graulichen Materie zu gewissen Zeiten nicht zu erklären, welche über den ganzen Leib ergossen ist und in alle Gewebe dringt. Die Anhäufung dieser Materie in den Mantelvenen war Veranlassung, dieselben als männliche Organe zu betrachten. Wir wissen, daß die Schale zu gewissen Zeiten sich mehr vergrößert als zu andern, und diese Anhäufung mag als Vorrath vor dem Abfalle hergehen oder sie mag deshalb geschehen, um durch die Excretionsorgane ausgeschieden zu werden, weil diese Anhäufung vorzüglich um die Venen herum stattfindet. Diese graue Materie ist hauptsächlich kohlensaurer Kalk.

Diese Excretionsorgane stoßen auch Schleim aus und Farbstoff sowohl als kohlensauren Kalk, welchen letztern man oft darin finden in der Gestalt von Concretion; auch Harnsäure. Bey *Pecten* führt ein kleines Loch an jeder Seite unmittelbar in dieselben. Die Epergänge treten ebenfalls hinein. Oben führt jeder Excretionsack in eine einzelne quertiegende Höhle unter dem Pericardium. Bey *Unio* etc. führt ein Loch dicht an dem des Epergangs in eine große Höhle des Mantels unter dem Pericardium, in welcher die Excretionsorgane sich öffnen durch ein inneres Loch an jeder Seite. *Wojanus* hat diese innere Oeffnung nicht gekannt, sonst würde er diese Organe nicht für Lungen angesehen haben. Das äußere Loch liegt am vorderen Winkel, den der Fuß mit den Kiemen bildet. Der Epergang ist auch vom Sack getrennt bey *Modiola*, *Mytilus*, *Lithodanus* etc., während bey *Tellina*, *Cardium*, *Maetra*, *Pholas*, *Mya* und den meisten andern die Eper in die Excretionsorgane geleert werden. Im Allgemeinen liegt die Oeffnung der Excretionsorgane näher dem hintern Muskel und der Epergang mehr vorwärts. Die erstere ist oft so klein, daß sie schwer zu finden ist. Bey der Auster scheinen die Gefäße keine Drüsen zu bilden, sondern stoßen von ihren auf dem Mantel verbreiteten Enden die kalte Materie für die Klappen aus, welche bey einem vollkommenen Thier durch ein drüsenartiges Organ abgefordert und durch eine Excretionsöffnung ausgestoßen wird. Bey höheren Schalthieren z. B. so, daß der Farbstoff bey einigen durch die Mantelvenen geleert wird, bey andern gesammelt in einen Drüsenack. Schwammerdam glaubte, die dunkeln Organe der Blattkiemer trügen zur Bildung der Schale bey; ebenso *Poli*, welcher sie *Viscera testacea* nannte. *Blainville* vergleicht sie mit Nieren; und ich denke genug gesagt zu haben, um seine Meynung zu bestätigen. [Zft 1838. Sept 11.

eine in Deutschland schon lang ausgesprochene Ansicht.] Ein ähnliches Verhältniß zeigt sich bey den Kabiäten. Bey den Stelleriden treten die Venen der Eingeweide zusammen und verbinden sich mit einer bräunlichen schwammigen Substanz, welche zwey Organe bildet, die sich wahrscheinlich nach außen öffnen, durch die Rückenleiste oder nahe dabey. Von dieser Leiste geht ab an der Seite der schwammigen Substanz in die kreisförmige Verbindung der wasserführenden Canäle ein walziger kalkiger Theil, welcher gegliedert ist und analog zu seyn scheint dem Stamm des *Pentacrinus*, welcher aber ein innerlicher geworden ist durch die Bildung der Rückendecke. Da die nackten *Acephala* keine Kalktheile haben, so haben sie auch kaum eine Spur von Absonderungsorganen. Bey den Schalenschnecken aber findet sich immer ein Excretionsorgan, wenn eine Schale vorhanden ist. Dieses Organ wird bey ihnen augenscheinlich durch ein Gewebe von Venen gebildet. Bey *Patella* öffnet es sich durch den Epergang und den Mastdarm und liegt über den Eingeweiden. *Blainville* betrachtet es als das Athemorgan bey diesen Thieren. Bey einigen *Animalia patelliformia* finden sich 2 Oeffnungen. Diese Oeffnungen liegen bey *Chiton* zwischen den Kiemenfortsätzen, nicht weit von den Epergängen. Wo sich keine Spur von Schale findet, da gibt es auch keine Absonderungsorgane. Bey den Doriden, welche gewöhnlich Kalkstoff in der Rückendecke haben, da scheint der von *Cuvier* beschriebene und sich neben dem After öffnende Sack eine Spur davon. Bey *Bulla aperta*, welche eine Schale hat, finden sich zwey Drüsen am Munde, obgleich sie *Cuvier* übersehen hat. Es ist unnöthig zu bemerken, daß ein Schleim und Kalk absonderndes Organ sich bey allen spiralen Schalenschnecken findet. Dieser Schleimsack öffnet sich manchmal durch einen Gang neben dem After, wie bey den Pflanzenfressenden; oder mit einem weiten Loch auf dem Rücken der Kiemenhöhle, wie bey den Fleischfressenden; in dem letzten Falle kann wahrscheinlich das Thier Luft damit athmen, wenn es sich außer dem Wasser befindet.

Durch die Schleimsäcke der Cephalopoden, welche sich durch Papillen an jeder Seite des Mastdarms öffnen, laufen die großen Venen, welche aus besondern Anhängseln an ihrer Oberfläche viele schleimig kalte Materie in dieselben absondern. Auch die Gallengänge gehen durch die Höhle und sondern darin ab. Bey diesen Thier scheint das Blut aus den Eingeweiden in die Lebervenen zu kommen, wie *Cuvier* bemerkt; und ich betrachte ihren Kreislauf als ein Mittelbing zwischen demjenigen, in welchem das Blut aus den Erspeßenden, dem Darm uwm. zur Leber geht und zwischen dem, in welchen das Leber-, Darm- und Eperstockblut ganz durch die Aussonderungsorgane läuft. Kein Schalthier scheint absorbierende Gefäße zu haben; daher liegt nothwendig das Skelet auswendig und außerhalb des Kreislaufs.

**Wimpern (Cilia).** Das Glimmern, welches man an der Oberfläche des Darms der Schalthiere bemerkt hat, kommt daher, daß dieser Canal durch die Absonderungsfäße läuft, worin das Wasser gezogen wird durch die Thätigkeit der Wimpern auf ihren Oberflächen. Diese Erscheinung, welche ich am Darne des Chitons bemerkte, veranlaßte mich, die zwey eben beschriebenen Oeffnungen zu finden, durch welche das Wasser eingezogen wird.

Das schöne und wundervolle Phänomen des Glimmerns kleiner Wimpern bey den niederen Thieren haben viele ältere

Naturforscher bemerkt; aber aus Mangel guter Instrumente für einen Kreislauf angesehen. Raspail hat gezeigt, daß viele Infusorien von Müller und Baer nichts anderes sind als stimmernde Theile anderer Thiere. H. me erklärt die Umwälzung des Embryos im Ey der Blattkriemer für die Wirkung eines Vibrio, welcher hineindringt und davon lebt; und die von diesem eingebildeten Thierchen gegebenen Figuren stellen nichts anderes vor, als die Kiemenfortsätze der Anodonten. Die Wassergefäße der Radiaten sind innerndig ganz mit Wimpern bedeckt, und diese sind es, welche den Kreislauf in der Beroë gänzlich hervorbringen. Ich finde sie nicht in den Crustaceen, Cirropoden und Wasserlarven der Insecten. Dr. Sharpey konnte sie in den Tunicaten nicht sehen: das würde er wohl gekonnt haben, wenn er eine stärkere Linse angewendet hätte. Sie bedecken in großer Menge die Maschen der Kiemen, sind aber ungewöhnlich klein in diesen Organen. Auf den Kiemen der Cephalopoden finde ich sie nicht. Vorhanden sind sie im Magen von Asterias et Actinia, und die langen weißen Fäden, welche man bisweilen von der Actinia diantha herunterhängen sieht, sind damit bedeckt.

Das Durchbohren der Felsen, Steine, Hölzer usw. von Blattkriemern kann nicht in jedem Falle durch mechanische Wirkung der Klappen geschehen. Diese Klappen mancher Sippen, wie bey Lithodomus und vielen andern, taugen keineswegs zu einer solchen Wirkung. Auch kann keine vom Thier abgesonderte auflösende Flüssigkeit solche Durchbohrung bewirken: denn welche könnte so vielerley Substanzen auflösen, ohne des Thieres Schale selbst zu beschädigen? Die Erscheinung scheint durch die Wirkung der Stimmerbewegung hervorgebracht zu werden, welche Bewegung beständig Wasserströme gegen die Substanzen treibt, wozu noch der Andrang des Wassers beiträgt, wenn es in den langen Leib des Thieres gezogen wird, manchmal auch vielleicht das Scharen der Klappen. Oft kann die Schale gar nicht wirken, entweder wegen ihrer flachen Gestalt oder weil sie ganz genau in das Loch paßt. Wenn die Patella an einem Felsen sitzt, macht sie oft ein Loch einen Zoll tief, bloß durch die Wirkung ihrer gewimperten Kiemen: die Schale kann das Loch nicht machen, weil sie genau hineinpaßt und eine solche Gestalt hat, daß keine Rotation möglich ist. Hippionyx, eine andere Sobolenschnede, macht Höhlen wie die Patella in andere Schalen, an denen sie hängt. Die Höhlen der Saxicava sind nicht rund: daher glauben Belloc und Desier, sie würden in diesem Falle durch die von dem Thier abgesonderte Phosphorsäure bewirkt, und dabey nehmen sie an, es bewohne keine anderen als Kalkfelsen, welches letztere nach meiner eigenen Beobachtung unrichtig ist. Turton sagt: die Klappen von Tereido stimmen nicht mit dem Sobolus überein; ich aber glaube, daß sie hier als mechanische Werkzeuge thätig sind. Aber Pholas conoides findet sich oft in hartem Holz und doch sehen seine Klappen nicht im Geringsten aus, als wenn sie bohren oder feilen könnten.

Gewisse Anneliden scheinen diese Ausschöpfungskraft zu haben. Die Felsen an unserer Küste werden von einem kleinen Wurm durchbohrt, wahrscheinlich einer Diplotis von Montague. Er ist sehr stark gewimpert: aber sein Maul sieht gar nicht darnach aus, daß es einen Weg in so harte Substanzen zu machen im Stande wäre. Die Ausströmungen an den Schwänzen der Süßwassermuscheln kommen von den Strömungen, welche die Vorticellen und dergl. erregen. Die Schalenblätter an dieser Stelle sind weich und weiter von einander. Die Schalen der

Auster, Kammmuschel, Latraria etc. finden wir durch kleine runde Löcher bis ins Innere durchbohrt. Buckland zeigte, daß dieses von der Wirkung eines Zoophyten herkomme, welchen Grant Cliona coelata nannte. Buckland meynet, die Löcher würden durch kleine Bohrer gemacht, welche die Polypen haben sollen: es gibt aber keine solche und ich glaube, daß es die Wirkung der Wimpern ist.

Fremenville, Nilsson, Deudant, Stark und andere untersuchten, ob Süßwassermuscheln in Salzwasser leben könnten und umgekehrt. Um zu sehen, ob bey den Blattkriemern das Athmen fortege, wenn sie ihren Aufenthalt auf diese Weise ändern, nahm ich ein Stück von den Kiemen einer Mactra und legte es eine Minute lang in Süßwasser. Die Wimpern, vorher in großer Thätigkeit, erstarrten und kamen nicht wieder zu sich im Meerwasser. 5 Gran Kochsalz kamen in eine Unze Süßwasser; darin ein Stück Kiemen und sogleich hörte das Stimmern auf. In einer Auflösung von 10 Gran Kochsalz in einer Unze Wasser gieng es fort; ebenso bey 20 Gran Salz. In einer stärkeren Auflösung hörte es plötzlich auf. Wurde das Kiemenstück nicht lang hineingehalten, so kam das Stimmern wieder in der schwächeren Auflösung. Die Kiemen einer Mactra aber, 15 Minuten in süßem Wasser, erholten sich nicht wieder im Meerwasser. Meerwasser oder nur 2 Gran Salz in einer Unze süßem Wasser, stellten sogleich das Stimmern bey Süßwassermuscheln. Hieraus folgt, daß diese Thiere einen solchen Wechsel nur in sehr geringem Grade ertragen können. Denn sobald die Wimpern stehen bleiben, hört das Athmen auf, so wie die Herbeziehung der nachhaften Theilchen aus dem Wasser. Vielleicht ertragen die Bewohner von Brackwasser am besten solchen Wechsel: was aber Nilsson und Fremenville von den Anodonten und andern sagen, welche sich in Gesellschaft von Tellinen und dergl. finden, so scheint diese Sache sehr strittig: wahrscheinlich gilt dieses nur von Flußmündungen. Die Cardien, Mactren, Amphibesmen usw. in Brackwasser sterben, wenn es gesalzen wird durch Verdunstung oder, wenn es seine Salzigkeit verliert durch Vermischung von süßem Wasser.

Die Mytili, welche man in Süßwasser-Becken findet, sind wahrscheinlich Süßwassergattungen aus fremden Flüssen, an den Schiffen hängend herbegeführt: ihre Reise überleben sie wahrscheinlich deshalb, weil sie ihre Klappen immer und genau verschlossen hielten.

Nachdem ich die schlimmen Folgen des concentrirten Meerwassers auf die Kiemen seiner Muscheln gezeigt habe, so ist es wohl der Mühe werth, zu untersuchen, wie die Verdunstung des Wassers verhindert wird, wenn diese Thiere zur Zeit der Ebbe der austrocknenden Wirkung der Sonne und der Luft ausgesetzt werden. Diejenigen Thiere, welche nackte gewimperte Kiemen haben, können dieselben in Scheiden ziehen, wenn sie, wie viele Doriden, auf nackte Felsen kriechen. Können sie das nicht, wie andere Doriden, Tritonien, Coliden usw., so bedecken sie sich mit feuchtem Tang oder verstecken sich in schattigen Klüften. An heißen Tagen klebt Patella fest an den Felsen, so daß die Feuchtigkeit nicht entweichen kann. Die Actinien halten sich in Dämpfern um die Felsen auf, welche bey der Ebbe nicht trocken werden. Die Actinien, Lobulieren usw. hängen an der trübseligen hinteren Seite der Klappen, oder halten sich an schattigen Plätzen auf. Die Polypen setzen in diesem Wasser oder bewohnen Stellen, wosin die Sonne nicht dringen kann. Diejenigen

Blattkriemer, welche, wie die *Miesmuscheln*, auf nackten Felsen der Sonne und der Luft ausgesetzt sind, haben Klappen, welche ganz genau aneinander schließen und die Verdunstung hindern. Sind die Klappen an einer Stelle offen, so bewohnt das Thier entweder tiefes Wasser, wie manche *Kammmuschel*, oder kann sich in den Schlamm oder Sand graben, wenn er zur Ebbe trocken wird. Auch die *Sohlenmuscheln* verbergen sich vor der Sonne, obgleich ihre Kiemen wenig frey liegen. *Aristoteles* sagt, sie verbergen sich während der Hundstage. Längs der sandigen Buchten sehen wir eine Menge Löcher, führend zu den Kiemen verschiedener Thiere, welche durch Einbohren sich verstecken und ihre Organe gegen Verdunstung schützen, auch Wasser bekommen mit nahrungsreichen Theilchen.

Die Erscheinung der Phosphorescenz scheint fast ganz auf gewimperte Thiere beschränkt zu seyn. Bey einem Wurm, welcher diese Erscheinung sehr schön zeigt und in Menge die herausgezogenen Fischeierne bedeckt, fand ich das Leuchten aufhören, sobald die Wimpern nicht mehr flimmerten; das war am stärksten, wann sie am thätigsten waren; und das Zittern des Lichts schien mit der Unstätigkeit des Flimmerns übereinzustimmen. Es verdient untersucht zu werden, ob diese Erscheinung nicht von der Reibung der Wimpern auf den Wassertheilchen herkommt. *Beccaria*s Versuche scheinen zu beweisen, daß das Licht nicht von chemischer Thätigkeit herührt und daß es sich genau in solchen Umständen zeigt, in welchen die Wimpern fortfahren zu flimmern.

**Reproductionssysteme.** Die Meynung von *Leuwenhoeck*, *Mern*, *Droest* und *Dumas* ufw. über die verschiedenen Geschlechter der Blattkriemer: man hat aber allen Grund zu glauben, daß die Individuen sich nicht nach dem Geschlechte unterscheiden und daß die Eyer aus den Eyerstöcken in einem entwicklungsfähigen Zustand ausgetrieben werden; oder mit andern Worten, daß sie befruchtet werden, bevor sie die Eyerstöcke verlassen, durch Hoden, welche mit diesen Organen verbunden sind. Einige Schriftsteller haben die Aussonderungsorgane mit Unrecht für Hoden genommen. Die Eyerstöcke haben eine sehr verschiedene Lage; bisweilen sind es abgesonderte Theile; bisweilen liegen sie im Fuß; bisweilen sind sie im Mantel verzweigt, wie bey *Modiola*, *Anomia*, *Lithodomus*, *Hiatella* und dergl. Die Eyergänge öffnen sich verschiednen, je nach den Gattungen, wie oben bemerkt, was ohne Zweifel seinen Grund in der verschiedenen Lage der Eyerstöcke hat. Zu unbestimmter Zeit zeigt sich vor der Ausstoßung der Eyer aus den Eyerstöcken eine milchichte, oft rothbraune Flüssigkeit in den letztern, welche ebenfalls durch die Eyerstöcke ausgetrieben wird. Das scheint der männliche Samen zu seyn. Unter einer starken Linse sieht man kleine ovale Körperchen, kaum  $\frac{1}{1000}$  Zoll lang, in der dünneren Flüssigkeit schwimmen, mit einer sehr lebhaften Bewegung. Sie scheinen keine Schwänze zu haben, obgleich kleine *Vibriones* und flimmernde Kiementheilchen oft solch ein Aussehen verursachen. Die Eyer scheinen sich durch die Einwirkung vieler Flüssigkeit zu vergrößern und der Dotter wird davon gefärbt. Die Eyer haben in verschiedenen Sippen eine verschiedene Gestalt: in *Unio* kugelförmig und durchsichtig  $\frac{1}{2}$  Zoll dick mit einer dicken Schale, worinn eine helle Flüssigkeit mit darin schwimmendem Dotter. Im Allgemeinen werden die Eyer aus den Gängen unmittelbar ins Wasser gelassen: bey *Unio* aber und *Anodonta* kommen sie, in Schleim eingehüllt, aus den Ausführungsorganen in die Kiemenfächer (*Horne's* Eyergänge),

wo sie sich weiter entwickeln, indem die Eyerchale zerreißt; das Junge hängt an einem Byssus. Es ist sonderbar, daß man sie nie im innern Kiemenpaare findet, obgleich sie längs dessen Rand zu dem äußern geleitet werden. Im Sommer verlassen die Eyer die Eyergänge und bey'm Herannahen des folgenden Frühlings verlassen die jungen Thierchen die Kiemen. Zu einer gewissen Zeit bemerkt man eine sonderbare Umwälzung des Embryos im Ey, durch die Wirkung der Wimpern, in der Minute 7—8 Mal. Die Jungen können die Klappen öffnen und schließen, ehe sie die Eyerchale verlassen. *Katze* sieht sie als Schmarotzer an, welche er *Glochidium* nennt. *Jacobson* folgt ihm darin und behauptet, sie können nicht die Jungen dieser Muscheln seyn. Ihre Klappen sind dreyeckig mit einem Band an dem kurzen graden Rand; die zwey andern Ränder emhigen in eine Spitze, woran man einen membranösen Fortsatz sieht an jeder Klappe, welche gezähnt ist an ihrer äußern Oberfläche. Zwey spitze Fortsätze stehen auch aus der innern Fläche der Klappen hervor. Der Fuß steht und der Muskel scheint ungetheilt zu seyn, um die Klappen ganz öffnen zu können. Betrachtet man aber einen sehr jungen *Unio*, so findet man, daß die Klappen wirklich durch dreyeckige Nuclei anfangen. Die Membranen mögen die Kiemen seyn, und die andern Fortsätze scheinen die Nuclei der Klappenzähne zu seyn. *Horne* beschreibet die ächten Eyergänge nicht; *Bojanus* nennt die Kiemen Uteri oder Eyerbehälter; *Jörg* nennt die äußern Eyerstöcke und die innern Hoden. *Anodonta anatina* et *cygnea* sind lebendig gebührend, obgleich es *Draparnaud* auf die Angabe von *Poiret* bey der ersten läugnet. Bey den Eycladen finden wir immer 10—20 Jungen in den innern Kiemen: sie sind von verschiedener Größe und werden einzeln ausgetrieben, wenn sie etwa  $\frac{1}{2}$  Zoll groß sind. Die Eyergänge öffnen sich über den innern Kiemen, zu welchen das Wasser nur von hinten kommen kann. Drey oder vier von diesen Jungen strecken in einer membranösen Hülle; die größten aber finden sich abgesondert und an einem Byssus hängend. *Turton* hat im Juny ungefähr 12 vollkommene Jungen in *Kellia rubra* gefunden. Niemals kommen die Eyer aus dem Maul, wie man gemeinet hat; ebenfowenig aus dem ächten After. Bey den lebendig gebührenden gibt es auch keinen Gang, welcher aus den Eyerstöcken zu den Kiemenfächern führe.

**Krankheiten und Schmarotzerthieren.** Bekanntlich verankern wir einer Krankheit dieser Thiere die Perlen. Ihre Bildungart wurde übrigens erschöpft von *Plinius*, *Horne*, *Bojt* und vielen andern.

Daer hat viele Schmarotzerthiere beschrieben, besonders aus Süßwassermuscheln, wo *Aspidogaster conchicola* sehr gemein im Herzbeutel und den Excretionsorganen liegt. *Nummulella* von *Carus* scheint kein Schmarotzer zu seyn, sondern ein aufgerollter Kiemenfortsatz. Ich fand den Fuß einer *Anodonta* ungeheuer strobend von Schmarotzer-Eyern, in deren jedem mehrere junge Difomen waren. Im Fuß einer andern *Anodonta* fand ich einen besondern Schmarotzer. Am reifen Zustande ist der Leib mehr oder weniger walzig, kann sich aber nach Belieben verändern. An einem Ende hat er zwey sehr lange Anhängel, welche an ihrem Ende Dornen tragen und bey einigen an einer Seite auf eine gewisse Strecke ihrer Länge eine Reihe runder Körperchen nur anlebbend. Diese Anhängel lassen sich sehr schnell zusammenziehen und sind dann sehr kurz. Zwischen denselben liegt eine Oeffnung mit einer runden Lippe.

Eine Einschnürung scheidet diesen Theil, woran sie liegen, von dem übrigen Leib (es bildet sich eine Art von Kopf). Am andern Ende des Thiers scheint auch eine Öffnung zu liegen.

Dann folgt eine Classification der Blattkriemer, welche wir schon früher gegeben haben.

Abgebildet sind und anatomiert: *Psammobia florida*; *Nucula nucleus*; *Corbula striata*; *Pandora inaequalis*; *Solen ensis*; *Mactra stultorum*; *Cardium echinatum*, *edule*; *Anodonta anatina*; *Mytilus edulis*; *Pecten opercularis*, *maximus*; *Venerupis pullastra*; Eyer und Junge von *Unio pictorum*, *Cycas*, *Mytilus*, *Pecten*, *Anomia*.

Schmarotzer: *Nummulella*, *Distoma*, *Nereis phosphorescens*, *Diplotis hyalina*.

103. IX. Richard Owen, Beschreibung einiger neuer und seltener Cephalopoden. Taf. 21.

Georg Bennett hat auf seiner Reise nach Australien folgende Thiere auf Tang oder im Schleppnetz gefangen und mitgebracht.

1) *Cranchia scabra*, gefangen am 1. März bey schönem Wetter und Südostwind, 80° F., 12° Südbreite, 10° Westlänge. Er hat es für eine Qualle angesehen; eines war mit dunkelrothen Flecken schön gezeichnet.

2) Vier sehr kleine *Loligo*.

3) Kopf und Eingeweide von einem *Cephalopodum decapodum dibranchiatum* in Port-Jackson.

4) 3 kleine *Octopus*.

5) Eine sehr kleine Schale von *Argonauta hians* mit ihrem Bewohner (*Ocythoe cranchii*) und einem Haufen Eyer.

1) *Cranchia scabra* gehört zu den *Cephalopoda dibranchiata* mit 2 langen Fühlfäden nebst den 8 Armen, und zu der Familie von Decapoden, wo die Schale nur einen hornigen Griffel vorstellt in der Substanz des Mantels mitten auf dem Rücken.

Der Unterschied der *Cranchia* von *Loligo* et *Onychoteuthis* liegt in dem Zusammenhang des Mantels mit den Rückenwänden des Kopfes und der daraus folgenden Unterbrechung seines freyen vordern Randes an dieser Stelle; von *Sepioteuthis*, *Sepiola* et *Rossia* in den Verhältnissen und der Lage der Mantelflossen und im Bau des Trichters, sowie in dessen Verbindungen, nebst einigen anatomischen Dingen. Uebrigens sollten Gattungen, bey welchen die Mantelflossen kurz sind und am Ende stehen und welche auch nur eine Spur von Schale haben, dieselben Mantelverbindungen und Bewaffnung der Saugnäpfe, nicht in Cyprien zerfallen werden bloß wegen der verschiedenen Gestalt der Flossen, besonders wenn kein innerer Unterschied vorhanden ist: denn verglichen wir die Gattungen der *Calmare* mit Hähnen, welche Lichtenstein *Onychoteuthis* genannt hat; so stimmen kaum zwey im Umriss der Flossen überein, und betrachten wir die vielen *Loligo*, so finden wir manche, wie *L. piscatorum*, *duvacei*, *brevipinna* und besonders *brevix*, welche sich der *Cranchia scabra* in den runden Endflossen und ihrer Rückenlage dicht anschließen, so daß man die letztere nicht von *Loligo* trennen könnte, wenn ihr vorderer Mantelrand nicht andere Verbindungen hätte.

Dieses Verhältniß des Mantels wurde übrigens bey der Einteilung der Cranchiengattungen wenig beachtet: so nicht von *Ferussac* bey *Cr. bonelliana* (Ann. de sc. nat. III. p. 339), nicht bey *Cr. cardiptera*, *minima*; nach *Ferussac*s Abbildungen scheint beyden der vordere Mantelrand am Rücken frey zu seyn wie bey *Loligo*.

Obige *Cranchia scabra* ist lang, sammt den Fühlfäden 1 Z. 8 Lin., ohne diese 11 Lin. Längster Arm 3, kürzester 1½, Flossen 2. Breite 3, des Kopfes 3½. Umfang des Leibes 3 Zoll.

Die Eingeweide liegen am vordern Theil des Mantels, nicht am Boden des Sacks wie bey *Loligopsis* und nehmen nur einen kleinen Raum ein; woher der Mantel schlaff und runzelig wie bey keiner andern Gattung, wohl aber wie bey einigen *Pteropoden*.

Die Oberfläche des Mantels ist mit kleinen, runden, dunkelrothen Flecken besetzt, welche in Brantwein schmutzig braun werden. Es liegen auch kleinere auf den Flossen und auswendig an den Armen und Fühlfäden. Mitten auf dem Rücken des Mantels läuft eine dunkelsichtige Linie, weil darselbst die Wand des Mantels sehr dünn ist und einen farblosen Griffel von gallertartiger Consistenz enthält, ziemlich gleich breit, in der Mitte etwas schmaler, an beyden Enden zugespitzt. Länge gleich dem Mantel, Dicke ⅓ Zoll.

Unter dem Microscop sieht man auf dem Mantel unzählige kleine und flache Fortsätze ⅓ — ⅓ Zoll breit und ⅓ lang, endigend in 2 — 3 oder 4 spitzige Fortsätze. Bey andern Cephalopoden zeigt die übrige glatte Haut auch Unebenheiten. Sie ist besetzt mit verzweigten Papillen bey *Sepia palliata*; mit stumpfen Erhöhungen bey *Sepia mamillata*; mit Höckern bey *Sep. tubercul.*, mit zugespitzten Höckern bey *Octopus aculeatus* etc.; diesen Höckern stehen die facheligen Lamellen von *Cr. scabra* am nächsten. Diese Hautfortsätze dienen wahrscheinlich zur Vermehrung des Gefühlsinnes und deuten die Natur der Oberflächen an, mit welchen sie in Berührung kommen.

Die Endflossen sind rundlich, stehen der Rückenfläche näher, sind am Grunde verwachsen, und der verwachsene Theil erstreckt sich eine Linie über das Mantelende hinaus. Sie haben keinen Knorpel, wie bey *Loligo*, sondern sind bloße Hautfalten.

Unter den kegelförmigen Armen ist das erste oder Rückenpaar das kürzeste wie bey den meisten Decapoden; das zweyte und vierte ziemlich gleich und etwas länger; das dritte noch einmal so lang als das erste. Das erste, zweyte und dritte sind am Grunde durch eine Spannhaut verbunden, größer als gewöhnlich bey den Decapoden: sie fehlt bekanntlich den *Loligines*.

Bey *Cranchia bonnell.* erstreckt sich eine ähnliche Spannhaut zwischen den Armen auf 2 Drittel ihrer Länge. Zwischen dem 3ten und 4ten Paar ist bey *Cr. scabra* keine Spannhaut, weil darselbst der dicke Stamm der Fühlfäden liegt. Alle Arme sind durch die äußere häutige Lippe mit einander verbunden, welche 8 spitzige Fortsätze abgibt; diese springen aber nicht frey vor, wie bey den meisten *Loligines*, *Sepioteuthis* et *Sepia*, sondern sind an die innere Fläche des Grundes eines jeden Arms geheftet. Die zwischentliegenden Stücke der Lippe

bilden eine innere und kleinere Spannhaut, wovon die Stücke zwischen dem dritten und vierten Paar Arme am breitesten sind. Da bey den Octopoden die äußere Spannhaut bey dem Mangel der Mantelflossen das einzige Schwimmorgan ist; so muß man annehmen, daß sie bey *Cr. scabra*, wo sie sich findet, einigermaßen die kleinen Endflossen ersetzt, und daß die Ortsbewegung der Cranchien wahrscheinlich rückwärts geht.

Die Saugnäpfe an den Armen sind gefielt und bestehen in einer doppelten abwechselnden Reihe längs den Rändern eines jeden Arms; der Zwischenraum ist hier weiter und man sieht in der Mittellinie des durchsichtigen Arms den Knotennerven sehr schön durch die Linse. Die Füßfäden sind dicker als die anderen und stehen sehr ab gegen die langen und dünnen bey *Loligopsis*. Die Saugnäpfe unregelmäßig an den wenig breiteren Enden zusammengehäuft, sind viel kleiner als die an den Armen, aber auch gefielt; die Ränder dieses breiteren Endstücks der Füßfäden sind gefranzt. Der Nerve in der Mitte dieser Theile ist einfach im Stamm, knotiger aber an dem Ende mit den Näpfen.

Die Kiefer bestehen aus einer dünnen, hornigen Substanz, farblos; braun aber längs dem glatten, schneidenden Rändern und an den spitzigen Enden: sie sind umgeben von einer dicken, gefalteten, inneren Lippe ohne Warzen, und von der oben erwähnten membranösen äußeren Falte. Trichter klein, untergehoben von *Loligo* dadurch, daß er schief abgestutzt ist und seine Rückenwände nach unten geschlagen. Öffnet man die Bauchwände des Mantels, so findet man, daß der Grund des Trichters nicht durch ein fleischiges, bewegliches Muskelend mit der inneren Fläche des Mantels verbunden ist, also wie bey *Loligopsis* nach Ratke. Bey allen andern Decapoden ist der Trichter mit dem Mantel durch zwey Nussgelenke verbunden, wovon die Kugel am Mantel, die Pfanne am Trichter liegt, beyde Gelenkflächen aus Knorpel bestehend und mit einer glatten Synovialhaut bedekt. Hier haben wir aber eine Ausnahme von allen Nussgelenken: denn die Synovialhaut bildet keinen geschlossenen Sack, sondern geht in die Schleimhaut über, welche das Innere des Mantels überzieht. Im Kuttelfisch hat der convexe Knorpel eine ovale Gestalt; bey *Loligo* bildet er eine längliche Leiste; bey *Onychoteuthis* fängt die Gelenkleiste am vorderen Rande des Mantels an und erstreckt sich ein Drittel weit am End hinunter und besteht aus zwey dünnen, fleischigen, knorpeligen Blättern, liegend ziemlich an der Bauchseite des Mantels; auf jeder dieser Leisten spielt eine Furche, auf der entsprechenden Seite des Trichters; bey *Loligopsis* aber hängen die Seiten des Trichters an den entsprechenden knorpeligen Blättern, welche nicht, wie man gemeint hat, anomal und dieser Sippe eigenthümlich sind, sondern sich von den Seitenknorpeln anderer Decapoden nur durch größere Länge und Höckerform unterscheiden. Bey *Cranchia* fehlen diese Knorpel wie bey den Octopoden.

Sie hat zwey Kiemen mit Kiemenkammern ohne fleischige Anhängsel; ferner zwey große untere Speicheldrüsen. Unterscheidet sich mithin hinlänglich von *Loligo*; durch die Anheftung des Trichters an den Mantel und den Mangel der Anhängsel an den Kiemenkammern ist sie *Loligopsis* verwandt, und gleicht ihr auch in den runden und am Ende stehenden Flossen; unterscheidet sich aber davon durch die Anheftung des Mantels an den Kopf, die Anwesenheit der Trichterklappe, die

Stie 1838, Heft 11.

Dicke und Kürze der Füßfäden und durch die Spannhaut zwischen dem ersten, zweyten und dritten Paar Arme.

Die 4 Stücke einer kleinen *Loligo* sind neu, *Loligo laticeps* wegen des breiten Kopfes. Taf. 21. Fig. 6 — 11. Länge  $1\frac{1}{2}$  Zoll sammt den Füßfäden; es gibt indeß auch noch kleinere Octopoden. Bennett hat sie gefangen unter einer Masse *Sargasso* im April unter 29 Nordbreite, 47 Westlänge; schön purpuroth mit dunkelrothen Flecken, welche in Brantwein röthlich braun geworden sind, sehr zahlreich auf Rücken und Kopf, selten auf der Unterseite, fehlend an den Flossen und an der untern Seite des dritten und vierten Fußpaares; dieser dunkle Färbestoff bildet breite, merkwürdige Querstreifen zwischen jedem Paar Näpfe auf der inneren Fläche des ersten, zweyten und dritten Paares.

Die Arme sind verhältnißmäßig länger als sonst bey den Calmaren, der zweyte und dritte fast so lang als der Rumpf. Die Sclerotica ist von einem kleineren Loch durchbohrt, so daß die Linfencapsel unmittelbar vom Wasser bespült wird.

Das Pigment bildet dicke Gläben, ist vorn mit einer undurchsichtigen weißen Substanz überzogen, welche ich für die *Retina* halte, obgleich die vorzügliche Ausbreitung der optischen Fäden hinter dem Pigment liegt.

Der Leib ist etwas walzig und kegelförmig. Der Vorderrand des Mantels ist ganz frey wie bey den andern. Die Muskeln, welche den Mantel mit dem Kopfe verbinden, heften sich hinten an ein Paar Knorpelsiele auf dem Rücken des Halses.

An der inneren Fläche des Mantels liegen auf den Seiten zwey knorpelige Leisten articuliert wie bey anderen *Loliginen* mit Furchen am Boden des Trichters, dessen Oeffnung schief ist aber nicht so sehr wie bey *Cr. scabra*. Die Rücken- oder der *Gladius* ist gut entwickelt. Die Kiemenherzen haben fleischige Anhängsel wie die anderen Calmare und wie alle Dibranchiaten mit einem anarticulierten Trichter usw.

Der kleine *Octopus* wurde auch auf *Sargasso* gefunden im April unter 30 Nordbr., 44 Westlänge, purpuroth. Sonst finden sich die Octopoden nur an den Küsten. Länge sammt den Armen  $1\frac{1}{2}$  Zoll, des Leibes kaum  $\frac{1}{2}$ . Die Augen stehen nicht in einer Grube wie bey dem gemeinen *Octopus*, sondern springen hervor wie bey *Nautilus*, *Argonauta* et *Octopus hyalinus*. Diejenigen allein, welche Zeugen waren von der beharrlichen Thätigkeit, der Kraft und Geschwindigkeit des *Octopus*, wann er mit seinen zerstörenden Practiken unter einem Schwarm von Fischen beschäftigt ist, und welche ihn gesehen haben, wie er den Schnabel tief in das Fleisch seines mit zahlreichen Armen umschlungenen Schlachtopfers vergraben, dennoch augenblicklich seine tausend Saugnäpfe zu gleicher Zeit ablöst, seine Beute fahren läßt und wie ein Pfeil vor dem Netze flieht, das man ihm vorsichtig nähert, kann sich eine richtige Vorstellung von dem scharfen Gesicht und den Kräften machen, womit dieser sonderbare und ungefaltete Cephalopod begabt ist.

Bey vorliegender Gattung ist der Leib bauchig, der Mantel breit mit der Haut des Kopfstücks verwachsen; Leib 4" breit, Kopf mit den Augen einen halben Zoll. Erstes Armpaar auf der Rückenseite am längsten wie gewöhnlich, zweytes



ebenso, drittes nur halb so lang, bey andern Decapoden sonst das längste; viertes zwey Drittel des ersten. Spannhaut nur zwischen den 4 Rückenarmen; soll daher *Octopus semipalmatus* heißen. Die Sclerotica durchbohrt wie gewöhnlich; die Cornea aber, welche bey dem gemeinen *Octopus* den vorderen Theil der Sclerotica bedeckt, fehlt, und die Capitel der Crystalline liegt bloß; wie bey *Nautilus*. Im Trichter weder eine Klappe noch ein Knorpel; so auch bey *Octopus catenulatus*; bey allen Gattungen von *Argonauta* ist die Articulation der Seiten des Trichters ganz vollständig.

Die Kiemenherzen haben keine fleischigen Anhängsel. Bauchfell roth gefleckt, ziemlich so wie bey den Argonauten. Färbung desselben bemerkt man auch bey vielen Fischen und einigen Lurcheu: *Anguis fragilis*, *Ophisaurus ventralis*; *Agama atra* und einigen Lacerten.

Der *Argonauta* wurde gefangen im März 4 $\frac{1}{2}$ ° Südbreite, 17 $\frac{1}{2}$ ° Westlänge. In Meerwasser gesetzt breitete er die Arme aus, schwamm aber nicht und heftete sich nicht an Glas. Am andern Tag war er todt und fiel aus der Schale, in welcher ein Haufen Eyer zurückblieb, wie in der Abbildung in *Lutke's* Reise auf den Congo. In Brantwein schwammen die Eyer heraus wie eine kleine weiße, sehr zierliche Pflanze. Das Thier war röthlich, die Arme weißlich mit röthlichen Flecken; die Saugnapfe weiß. Bennett hält diese Thiere ebenfalls für Schmarotzer.

Die Schale ist *Argonauta hians*, das Thier *Ocythoe cranchii* anders gebaut als das Thier in *Argonauta argo*, und das in *Argon. tuberculatus* und *Argon. rufus*, welchen Capit. Ring im stillen Meer bekommen hat.

Diese 4 Gattungen unterscheiden sich in Schale und Thier, woraus also wohl folgt, daß beyde zusammen gehören. Auch hat Debnig Exemplare von *Ocythoe* in *Argonauta*-Schalen gefunden, wo der Schalenrand noch weich oder häutig und unversehrt gewesen, woraus wohl folgt, daß das Thier zur Schale gehört.

Frau Pomer und Rang haben zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten Stücke aus der Schale mit dem lebendigen Thier gebrochen und bemerkt, daß das Loch durch eine secretierte, jedoch etwas verschiedene Substanz wieder ausgefüllt wurde, ziemlich so wie die Schnecken ihre Schale ergänzen. *Charlesworth* (Mag. of nat. hist. 1837 p. 526) hat bemerkt, daß Brüche am Schalenrand mit dergleichen Substanz wieder ausgefüllt wurden; ob von einer *Ocythoe* oder einem andern Thier, weiß man freylich nicht.

Bei den Einsiedlerkrebsen sieht man oft größere und kleinere in gleich großen Schalen steden; bey den Argonauten aber haben größere Thiere auch größere Schalen und umgekehrt.

So verhielt es sich bey 6 *Arg. rufus* und bey mehreren jungen *Argon. argo*. Man müßte also annehmen, daß die Decapoden in sehr kurzen Zwischenräumen ihre Schalen verließen und die Eigenthümer aus größeren Schalen trieben. Die *Serpule* sondern ebenfalls Kalkschalen ab, an denen sie nicht durch Muskeln hängen und aus denen sie beliebig aus- und einschließen können. Daß der *Nucleus* der Schale bey *Argonauta* größer im Ey sey, wie *Gray* sagte, hat er selbst wieder zu-

rückgenommen (Zool. Proceed. 1834. Mag. of nat. hist. 1837. p. 247).

Die Schale von *A. hians* ist 9 Linien lang, 6 breit; das Thier mit dem längsten Arm (dem zweyten) 1 Zoll 4 Lin., Saß 5 Lin. Trichter ohne Klappe, aber am Grunde mit 2 seitlichen Gelenken an den Mantel gegliedert. Erstes Armpaar 9 Lin. lang mit 36 Saugnapfen und einer Hautausbreitung oder einem Schleyer, am Ende kleiner als bey *Argon. argo* et *tuberculata*. Dieser sogenannte Schleyer kann nicht als Seegel dienen, wie man gemeynet hat. Zweytes Armpaar 10 Lin. lang mit 56 Näpfen; drittes Paar 8 Linien mit 52 Näpfen, 4tes Paar 7 Linien mit 28 Näpfen. Weicht ab wie *Argon. argo* von den nackten Decapoden und nähert sich dem Decapoden im Bau der Kiemenherzen, welche ein fleischiges Anhängsel haben; in den früheren und dickeren Anhängseln der *Vena cava* und in der freyen Lage des Dintensacks in der vorderen Ausbühlung der Leber usw. Das verstückelte Stück eines zehnführigen Cephalopoden von Portjackson gehörte vielleicht zu einem *Loligo*, zu *Sepioteuthis*.

Die weiblichen Organe zeigen bey den Cephalopoden häufiger Abänderungen. Es findet sich immer nur ein Eyerstock, der aber baldweilen, wie bey dem Kuttelfisch, durch eine Scheidewand getrennt ist.

1) Bey *Nautilus* findet sich nur ein Eyerengang, der am Ende durch eine längliche Drüse geht: auch findet sich ein *Glands nidamentalis*, welcher keine Verbindung mit dem Eyerengang hat, sondern an den Wänden der Kiemenkammern hängt, wie bey den Sohlenschnecken und Kammkiemern.

2) Bey *Sepia*, *Sepiola*, *Rossia*, *Sepioteuthis* und einigen *Loligo* findet sich auch ein Eyergang mit einem drüsigen Ende, aber zwei getrennte nidamentale Drüsen, abgefordert vom Mantel und ohne Verbindung mit dem Eyerengang.

3) Bey *Onychoteuthis*, *Loligo sagitt.* und einigen anderen Gattungen finden sich zwey Eyergänge, jeder mit einem drüsigen Organ am Ende; auch zwei getrennte nidamentale Drüsen.

4) Bey den Decapoden und Eledonen sind zwey Eyergänge, wovon jeder in der Mitte von einem drüsigen Organ umgeben ist; es gibt keine abgeforderte nidamentale Drüsen.

5) Bey *Argonauta* gibt es zwey gerollte Eyergänge mit drüsigen Wänden durchaus, aber ohne stellenweise Verdickung; es gibt keine abgeforderte nidamentale Drüsen. Das verstückelte Thier von Portjackson gehört zu Nr. 2.

Der Verfasser beschreibt die Theile umständlicher, als wir hier ausziehen können, critisiert so bald die versuchten Classificationen, hält die Rücksicht auf die Bildung der Haut und der Schale nicht für so wichtig und stellt folgende Classification auf.

Classis: *Cephalopoda*.

Ordo I. *Dibranchiata*.

Trib. 1. *Octopoda*.

Fam. *nuda* — *Eledona*, *Octopus*.

— 2. *Testacea* — *Argonauta*, *Bellephoron* etc.



## Tribus 2. Decapoda.

### Fam. 3. Teuthidæ.

#### a. Lologopsis, Cranchia.

#### b. Sepiola, Rossia, Onychoteuthis, Loligo, Sepioteuthis.

### Fam. 4. Sepiadæ — Sepia.

#### — 5. Belemnitidæ — Belemnites etc.

#### — 6. Spirulidæ — Spirula.

## Ordo II. Tetrabranchiata.

### Fam. 7. Ammonitidæ — Ammonites etc., Baculites etc.

#### — 8. Nautilidæ — Nautilus etc., Orthocera etc.

Gewöhnlich theilt man die Cephalopoden in Octopoda, Decapoda und Polythalamacea.

Abgebildet sind Taf. 21.: *Cranchia scabra*, *Loligo lacticeps*, *Octopus semipalmatus*, *Argonauta hians*. Das verstümmelte Stück von *Sepioteuthis*; Hörorgan von *Sepia officinalis*; weibliche Theile von *Rossia palpebrosa*.

Aber der allgemeine Bau der 2 ersten und besonders das Athem- und Kreislaufsystem ist sich so ähnlich und weicht zugleich von dem bey *Nautilus* so ab, daß die 3 Hauptabtheilungen offenbar nicht gleichen Werth haben: überließ sind Charactere von Bewegungs- und Fangorganen nur tauglich zu Unterabtheilungen. Eine vielsammerige Schale mit einem Siphon hat auch keinen Ordnungswert. Dieser liegt eher in dem Grade der Entwicklung einer vielsammerigen Schale und in ihrer Lage, ob sie nehmlich deckt oder bedeckt wird. Ist sie innerlich wie eine Luftblase, mithin nicht mehr beschützend, so ist ein Dintensack vorhanden als Vertheidigungsmittel; und damit bey einer solchen Schale die Kräfte der Drückbewegung vermehrt werden, finden sich auch entsprechende Abänderungen in den Athem- und Kreislauf-Organen, welche ohne Zweifel Ordnungswert haben.

Da nun der *Nautilus* einen untergeordneten Typus in seinen Athemorganen zeigt und die Mehrzahl von Herzen zur Beschleunigung des vordrängenden Blutes durch die Kiemen, welche die nackten und thätigeren Cephalopoden haben, fehlt, und da diese Verhältnisse Bezug haben auf die Größe und äußere Lage der Schale; so stelle ich zu dem *Nautilus* mit einem Siphon auch die ausgeforschten Sippen *Orthoceras*, *Ammonites* und alle *Siphonifera*, bey welchen die weichen Theile in einer kammerigen Schale liegen und von ihr geschützt werden. Diese nenne ich *Tetrabranchiata*.

Die Cephalopoden mit einer inneren kammerigen Schale, welche sonst auch bey den *Siphonifera* standen, vereinige ich mit den nackten als zweyte Ordnung unter dem Namen *Dibranchiata*, wo nur 2 Kiemen sind, aber außer dem einfachen Systemberg 2 Kiemenherzen und ein Dintensack, wie bey *Spirula*. Da Buctland bey *Belemnites* Spuren vom Dintensack gefunden hat, so darf man schließen, daß er auch zwei Kiemen und 2 Kiemenherzen gehabt habe.

Die *Dibranchiata* kann man in *Decapoda* et *Octopoda* theilen, so daß unter den ersteren nackte und vielsammerige

beyammen stehen: denn eine innere kammerige Schale ist wohl nicht wichtig genug, um daraus eine dritte Junft zu bilden, und der Unterschied zwischen dem hornigen Griffel der *Sepiola* und dem Fischbein der *Sepia* ist wohl eben so groß als der zwischen dem letzteren und dem inneren Kalkapparat von *Belemnites*. Auch zeigt Lamarcs Abbildung von *Spirula* in den Bewegungsorganen so viel Aehnlichkeit mit denen von *Sepia* und *Loligo*, daß man sie unmöglich weit von einander trennen kann.

Die *Spirula* steht offenbar den Vierkiemern am nächsten: an sie schließt sich *Belemnites*, *Actinocamax*, *Pseudobelus* etc. Sie gehen über zu denjenigen Cephalopoden, wo die innere Schale noch kalkig ist, aber kaum Spuren von Kammer zeigt, wie bey den eigentlichen Sepien, deren Gattungen Seitenflossen längs dem ganzen Mantel haben und einen ganzen hornigen Ring am Rande der Nässe, oder nur schwach gezähnet.

Der Character der *Teuthidæ* liegt in dem hornigen Zustand der Schale, welche in ihrem kümmerlichen Zustande nur als eine *Lamina* erscheint. Der Leib ist meist walzig, die Mantelflossen breit, kürzer als der Leib und am Ende. Sie theilen sich nach dem Trichter in zwei Gruppen. In der einen ist der Trichter am Grunde an zwei innere, knorpelige Erhöhungen des Mantels articuliert; so bey *Sepioteuthis*, *Loligo*, *Onychoteuthis*, *Rossia* et *Sepiola*. Der Trichter hat auch eine Klappe. In der andern Gruppe hängt der Trichter mit seinem Grunde am Mantel wie bey *Cranchia* et *Lologopsis*, welche letztere außer dem Mangel der Füßfüden noch überließ Verwandtschaft hat mit den Octopoden durch den Mangel der Trichterklappe. Beyde Sippen zeigen auch den Uebergang durch den Mangel der fleischigen Anhängsel zu den Kiemen. Der Zusammenhang des Mantels mit dem hinteren Theile des Kopfes und das Verfließen der Mantelflossen an ihren hinteren Enden haben nur Sippenwerth: die verschiedene Länge der Arme noch weniger.

Die Octopoden sind characterisirt durch den Mangel der Füßfüden, der Mantelflossen und der Trichterklappe. *Argonauta* ist mit den Decapoden verwandt durch die Anhängsel der Kiemenherzen und das Muskelfleisch des Trichters. Das erste Armpaar oder Rückenpaar hat häutige Ausbreitungen zum Secerniren, Repariren und Halten der Schale.

Die nackten Octopoden haben eine Spannhaut zwischen allen oder einigen Armen; das erste Paar ist länger und in eine Spitze verjüngt. Der Trichter hängt an den Seiten des Mantels; die Kiemenherzen sind ohne fleischige Anhängsel; die Gallengänge ohne Appendices folliculares; die Schale besteht nur in zwei kurzen brüchigen, hornigen oder gallertartigen Griffeln.

S. 131. X. St. Cuvier, über die Gerboises et Gerbilles. Taf. 22—26.

Daß man noch so weit zurück ist in der Classification der Nagthiere liegt darin, daß selbst die bessern Gelehrten noch am künstlichen Systeme hängen. Als ich 1829. mein Werk über die Zähne herausgab, hatte ich nur den *Macaca* aus der Barbaren von der Größe der Ratte, und es blieb daher viel Zweifel übrig, besonders da Pallas von seiner Art des *Alacta-*

er sagte, daß sie einen Zahn mehr habe als die anderen. Ich hatte nicht so viele Gattungen wie Lichtenstein, welcher sie in 3 Abtheilungen bringt. Alle haben nur 3 auftretende Behen.

Seine erste Abtheilung hat keine anderen; seine zweyte hat noch eine kleine auswendig an der Fußwurzel; seine dritte hat auch noch eine innwendig.

Meine Gattung von *Gerboises* aus der Barbarey hat auch 2 Afterzehen, wie der große *Alactaga* von Pallas; auch sind beyde Schädel einander gleich.

Ich kenne keine *Gerboises* mit vier Behen; aber ich habe zweyen Schädel von dreyzehigen, *Dipus hirtipes* und von einer neuen Gattung aus Indien, welche aber beyde verschieden sind vom *Alactaga*, und mithin sippisch getrennt werden müssen. Ich lasse ihnen den Namen *Gerboises* (*Dipus*) und nenne die fünfzehigen *Alactaga*.

Die 3 Hauptzehen der *Alactaga* und die 3 einzigen der *Gerboises* hängen nur an einem Mittelfußknochen; die zwei Afterzehen je an einem besondern. Alle Nagzähne bey *Alactaga* einfach; die oberen bey *Gerboises* gefurcht. Die Backenzähne der ersteren sind zusammengesetzt, der letzteren einfach; oben 4, unten 3; dort aber der erste sehr klein und wahrscheinlich ausfällig im Alter. Die andern in beyden Kiefern mit unregelmäßigen Schmelzfalten, welche sich durch das Abkauen ändern.

Bey *Gerboises* sind überall 3 Backenzähne, die obern mit einer Schmelzfalte innwendig und einer auswendig; die Größe der Zähne nimmt nach hinten ab; unten hat der zweyte Zahn auswendig 2 Falten, der hintere nur eine bloß auswendig [Dieser Zahn ist Tafel 24. Fig. 5. wohl unrichtig abgebildet, weil er aussieht wie zweyen]. Alle haben mehrere Wurzeln. Bey beyden Sippen ist das Unteraugenhöhlenloch sehr groß, bey *Gerboises* aber die Pauke sehr groß, bey *Alactaga* ziemlich klein; auch ist dort die Hirnschale viel größer, sowie der Unterkiefer.

Shaw (voyage I. 321.) spricht von einem kleinen *Jerboa*, oben rothgelb, unten weiß, und gibt seinen Hinterfüßen 4 lange Behen und 2 sehr kurze, den vordern nur drey. Aber alle *Gerboises* haben vorn 5, hinten 3 oder 5 Behen; offenbar ein Druckfehler; wahrscheinlich sollte es heißen: hinten 3 große Behen und 2 kurze. Das ist also ohne Zweifel mein *Alactaga*, den ich *A. arundinis* nenne, weil er sich nach Shaw gern im Schilf aufhält.

Länge 5 Zoll; Schwanz 5 Zoll 3 Linien; Ohren 1 3/4, Fußwurzel von der Ferse an 22 Linien. Rücken schon fahlgrau, Seiten und Schwanz gelblich, der letztere mit einer zweizeiligen schwarzbraunen Quaste, am Ende weiß. Backen, Bauch und Gefäß weiß, große Schnurräste braun, Nagzähne weiß und glatt; Ohren fast nackt.

### Gerbilles (Meriones)

sind klein, mit langen Hinterfüßen, überall 5 Behen. Darin gehört *Mus tamaricinus*, *labradorius*, *canadensis*, *gerbillus* Olivier (voyage III. 157. tab. 23.), *longipes* sive *meridianus*, *pyramidum*, Geoffroy (catalogue Mus. 202).

Man unterschied sie anfangs nur nach dem Aussehen.

Desmarest gab ihnen dann so viel Mittelfußknochen als Behen (N. Dict. hist. nat. 1817.), wodurch sie also von den *Gerboises* getrennt waren, aber nicht von den Mäusen. Er setzte zu seinen *Gerbilles* auch: *Mus tamaricinus* et *Dipus indicus* Harbidge, welcher letzter wirklich Zähne wie *Gerbillus* hat; aber er vermengte *Dipus gerbillus* et *pyramidum* unter dem Namen *G. aegyptius*. *Rafinesques* *G. soricinus*, *leonorinus*, *megalops*, *hudsonius*, *macrourus* et *brachyurus* (*American monthly magazine* 1818. 446) gehören wahrscheinlich nicht dahin. Später kamen hinzu: *Meriones optimus* (Lichtenstein in Meyendorfs Reise 394), *apicalis* et *musculus* (Kühls Beitr. S. 70), *libycus* (Lichtensteins Dubletten S. 6), *gerbillus* (Rüppell und Olivier), *robustus* (Rüppell Taf. 30, 29.), *afer* (*Gray Spicileg. p. 10*), *schlegelii* (*Smuts An. capensis T. 1. u. 2*).

Nach den Zähnen gehört *Gerbillus canadensis* nicht dazu, und ich habe ihn daher abgefondert unter dem Namen *Meriones*.

Es gibt von keinem *Gerbillus* eine gute Abbildung, wenigstens nicht nach dem Leben. Die ältesten sind von *Mus meridianus* et *tamaricinus*, ziemlich gut; die von *Dipus gerbillus* Olivier schlecht, von *D. indicus* besser. Rüppells *Meriones robustus* et *gerbillus*, so wie Smutsens *Meriones schlegelii* sind zwar allen vorzuziehen, aber doch nicht genau. Ich gebe hier eine Abbildung nach mehreren lebendigen von *Gerbillus bartoni*, welche dieser aus Oberägypten gebracht hat.

Man kennt den Schädel von *Gerbillus schlegelii*, *meridianus*, die Zähne von *capensis*, *pyramidum*, *senegalensis* et *indicus*, den Dammcanal von *G. meridianus* et *tamaricinus*. Der Jochbogen ist sehr dünn, die Pauke viel größer als bey den Mäusen. Obere Nagzähne gefurcht, untere glatt; Backenzähne 3, vorjüngens sind nach hinten, haben mehrere Wurzeln; der hintere einfach, der mittlere mit 2 Querhöckern, der vordere mit 3.

Mit Sicherheit gehören hieher nur 6 Gattungen: *G. pyramidum*, *indicus*, *capensis*, *senegalensis*, *afer* et *schlegelii*. Die acht anderen sind zweifelhaft: doch gehört wahrscheinlich *Mus meridianus* hieher, weniger sicher *Mus tamaricinus*; alle haben gefurchte Nagzähne.

Alle, auch die zweifelhaften leben in Asien und Africa. Die americanischen gehören wohl nicht hieher, auch nicht *Meriones musculus*.

Fast alle sind braun oder fahl, und man muß daher auf die Größe und das Verhältniß der Füße Rücksicht nehmen. *Dipus gerbillus* et *pyramidum* sind darnach verschieden; jener nicht größer als eine Maus und gelblich roth, dieser so groß wie ein Lerot (*Myoxos nitela*). Rüppells *Meriones gerbillus* aus Rubien gleicht ganz dem von Senegal; eben so gehören zu dem vom Cap der *Gerb. afer* et *schlegelii*. *Mus meridianus* ist ganz zweifelhaft.

Folgendes sind die 6 älteren Gattungen, und dazu kommen noch 3 neue.

1) *Gerb. aegyptius* Desmarest, *Dipus gerbillus* Olivier, *Meriones quadrinaculatus* Ehrenberg, von der Größe

der Maus, Länge  $3\frac{1}{3}$  Zoll, Schwanz 4 Lin. länger; oben hellfahl, unten weiß; Waden, Füße, ein Flecken über dem Auge und einer an der Seite der Ohren weiß. Schwanzspitze schwärzlich. Langer Schnurbart weiß.

2) *Gerbillus pyramidum* Geoffroy; *Meriones robustus*; Rüppell. Länge 5 Zoll, Schwanz 6 Linien länger; oben braun, unten weiß. Schwanzquaste schwärzlich. Hat vorn auch eine Spur von Daumen, mithin fünf Zehen wie die anderen.

3) *Gerbillus pygargus*, *Meriones gerbillus* Rüppell, gleicht ganz meinem Exemplar vom Senegal und einem anderen aus Oberägypten. Länge 5 Zoll, 5 Linien länger; oben fahl, unten weiß, und ein solcher Flecken über jedem Auge und hinter jedem Ohr. Schwanzquaste braun; Keulen weiß; übrigens dem *Gerbillus aegyptius* sehr ähnlich.

4) *Gerbillus indicus* Hardwicke, braun, nach mehreren Exemplaren zu Paris.

5) *Gerb. afer* Gray, *Meriones schlegelii* Smuts. Davon habe ich die Zähne nach mehreren Exemplaren beschrieben, welche Kalande vom Cap gebracht hat. Länge  $5\frac{1}{2}$  Zoll, Schwanz etwas länger; braun, unten, Stirn und Seiten des Kopfes weiß. Schnurbärte schwarz; Ohren größer als bey anderen.

6) *Gerbillus brevicaudatus* n. Mehrere wurden 1834 durch Berreaux vom Cap gebracht; unterscheiden sich von der vorigen durch geringere Größe und kürzeren Schwanz. Länge  $3\frac{1}{2}$  Zoll, Schwanz  $2\frac{1}{2}$ ; Färbung fahl und grau gemischt; unten weiß, durch ein scharfes fahles Band von der obern Farbe getrennt. Ich habe auch ein Exemplar von der Halbinsel Indiens bekommen, nicht verschieden.

7) *Gerbillus otarius*. Ist die zweite Gattung aus Indien, sehr klein, Schwanz und Ohren kurz. Länge 3 Zoll, Schwanz  $1\frac{1}{2}$ ; Ohren 2 Lin.; oben fahl mit grau, unten, Waden und Füße weiß.

8) *Gerbillus burtoni* neu; kam lebendig durch Burton aus Darfur nach Paris. Länge 4 Zoll, Schwanz 3, Ohr  $\frac{1}{2}$  Vorderarm 8 Lin.; ebensovlang die Fußwurzel. Färbung braun, Schnauze, Seiten des Halses und die Weichen gelblich fahl; unten weiß. Schnurbärte theils weiß, theils schwarz. Ueberall 5 Zehen, die 3 mittleren lang, die 2 äußeren kurz, Vorderbein sehr kurz mit flachen Haaren. Aussehen wie ein Siebenschläfer, mit gedrunenem Leibe, rundem Kopf, großen Augen und Ohren; der Schwanz aber ist nicht mit langen Haaren bedeckt, sieht mehr aus wie ein Rattenschwanz, hat aber keine Schuppen. Seine Bewegungen sind schnell, mehr wie bey einem Siebenschläfer als bey einer Ratte; geht nur auf allen Vieren, was auch Pallas von seinem *Mus meridianus* angibt. Sobald es aber anhält, setzt es sich aufrecht auf seine langen Fußwurzel, ohne jedoch sich auf den Schwanz zu stützen wie die Gerboises, um die Vorderfüße anzuziehen, nimmt auch nicht damit seine Speisen, sondern mit den Zähnen; wahrscheinlich dienen sie ihm zum Graben. Untertags hält es sich verborgen und geht des Nachts der Nahrung nach, welche wie bey dem Siebenschläfer und der Ratte aus Pflanzen und thierischen Substanzen besteht. Mehrere in einem Käfig haben einander den Schwanz abgenagt.

Sie scheinen paarweise zu leben: denn gibt man einem Männchen und Weibchen besonders Baumwollse, so thun sie dieselbe zusammen und machen sich ein gemeinschaftliches Nest. Sperrt man mehrere zusammen, so zanken sie sich unaufhörlich. Sie waren neugierig und furchtsam; sind übrigens wie fast alle Nagthiere sehr dumm.

Nimmt man 14 Gattungen an, so gehören 13 in die heißen Gegenden von Asien und Africa, eine einzige in das nördliche Asien, und diese hat auch allein Wollhaare nebst den Stachelhaaren.

**Verwandtschaften.** Die Fußwurzel hier etwas länger als bey den Mäusen, ihr gewöhnliches Sitzen auf den Hinterbeinen. Das Höhlengraben, ihr nächtliches Leben, die Meinung, daß sie auf den Hinterbeinen giengen, hat viele Naturforscher veranlaßt, die Gerbille zu den Gerboises zu stellen; sie sind aber den Ratten und Siebenschläfern mehr verwandt und auch im Bau ihres Schädels. Die Nasenbeine und Stirnbeine sind sehr lang, bey den Gerboises dagegen sehr kurz und die Unteraugenhöhlen-Löcher ungeheuer groß und rund; bey den Gerbillen schmal und der Unterkiefer breit; bey den Gerboises schmal. So ist es ziemlich bey den Mäusen und Siebenschläfern; auch stimmt der Bau der Füße und der Darmcanal mit den letztern überein; die Augen und alle Theile der Ohren der Gerbille wie bey den Siebenschläfern; sie gehören daher in die Nachbarschaft derselben und der Mäuse, wie es zum Theil schon Georg Cuvier gethan hat.

Abgebildet sind Taf. 22. *Gerb. burtoni*, nat. Gr. III. Taf. 23 Schädel und Darm  
 = 24 = von *Dipus hirtipes*; *Alactaga*.  
 = 25 = *Gerbillus aegyptius*, *pyramidum*, *pygargus*, *indicus*.  
 = 26 = *Gerb. africanus*, *brevicaudatus*, *otarius* und einem unbekannten, wahrscheinlich aus Syrien oder Aegypten, vielleicht einerley mit Ehrenbergs *Mus ruficaudatus* oder *Hypudaecus obesus*.

149. XI. G. Waterhouse, neues Säugethier aus Australien, wahrscheinlich ein Beutelhier. Taf. 27. 28.

Ich habe davon 2 Exemplare: das erste bekam Lieutenant Dale, etwa 90 engl. Meilen südöstlich von der Mündung des Schwannensflusses. Er sah zwey dieser Thiere einige Meilen von einander, zuerst auf dem Boden; als sie aber verfolgt wurden, flohen sie in nahestehende hohle Bäume. Er fieng eines; das andere aber wurde todt gebrannt beym Ausräuchern eines Baums. Die Gegend war voll gefallener Bäume und Ameisenhaufen.

Das zweyte Stück soll aus Diemensland \* kommen, wo man noch andere gesehen hat, grabend an Baumwurzeln nach Insekten. Am liebsten sollen sie sich da aufhalten, wo es viele Port-Jacksonweiden gibt.

Ich nenne die Sippe *Myrmecobius*.

\* Dieser Fundort ist nicht gewiß. Bey dem Balg war noch der von *Perameles lagotis*, von welcher Gattung der Lord Derby ein Exemplar vom Schwannensfuß bekam.

Dentes incisores  $\frac{6}{3}$ , canini  $\frac{1-1}{1-1}$ , pseudomolares  $\frac{3-3}{3-3}$ , molares  $\frac{5-5}{3-5} = 52$

Pedes antici 5-dactyli; digitis tribus intermediis longioribus; postici 4-dactyli; digitis duobus intermediis longioribus; externo brevissimo; ungibus longis, subacutis, subfalcatis; scelides antepedibus longiores. Caput elongatum, rhinario productum. Auriculae mediocres, ad apicem angustiores et subacutae. Cauda mediocris. Digni liberi.

Im Oberkiefer stehen 8 kleine, spitzige und schwach zusammengedrückte Schneidzähne; vom vordern Paar sieht man nur die Spitzen und die 3 folgenden ragen nur wenig über das Zahnfleisch hervor. Die Eckzähne sind zusammengedrückt und spitzig und etwas nach hinten gebogen. Die unächten Backenzähne sind auch zusammengedrückt; Gestalt fast wie ein Dreieck, die Spitze nach hinten gekrümmt. Die zweien ersten jederseits haben vorn und hinten eine schwache Kerbe; beim nächsten sind diese Kerben deutlicher, aber der Mittellappen ist kleiner als bei den vorigen. Der erste Backenzahn ist klein und zusammengedrückt, hat vorn zwei kleine Höcker und hinten ebenfalls; beide deszen Paar Höcker sind durch einen tiefen Einschnitt getrennt, an dessen innerem Rand und im Centro sich ein anderer kleiner Höcker zeigt. Der zweite Backenzahn ist größer; Krone fast halbkreisförmig, bestehend aus mehreren kleinen stumpfen Höckern in 3 Häufen vertheilt, einer vorn, einer hinten und einer innwendig.

Der dritte Zahn ist kürzer und breiter; auf der Krone 3 große stumpfe Höcker im Triangel und eben so gestellt wie die 3 Höckerhaufen des vorigen Backenzahns. Der vierte Zahn gleicht dem vorigen. Der fünfte und letzte ist sehr klein, die Krone dreieckig, besteht aus 3 schwachen stumpfen Höckern, wovon zwei parallel stehen dem Hinterhauptstheil des Schädels.

Im Unterkiefer sind die Schneidzähne ziemlich von derselben Größe und Gestalt, mit Ausnahme des vordern Paares, welches groß und zusammengedrückt; es steht vorwärts und die Spitze ist etwas rückwärts gebogen. Der Eckzahn und die unächten Backenzähne gleichen den obern, jedoch ist der hintere dieser Backenzähne gleich den beiden davorsiehenden. Der erste achte Backenzahn ist klein, zusammengedrückt und das aus dem Zahnfleisch hervorragende Stück besteht aus 3 spitzigen Höckern liegend in einer Linie. Der zweite ist größer und hat 3 ähnliche Höcker; die 3 folgenden verhalten sich eben so, haben aber 4 spitzige Höcker in einer Linie, und auswendig an deren Grunde einige stumpfe Höcker. Der letzte gleicht den vorigen, ist aber kleiner und hat nur 3 spitzige Höcker.

Im Unterkiefer ist der hintere unächte Backenzahn etwas einwärts geneigt; noch mehr aber sind es die achten Backenzähne; es sieht überhaupt aus, als wenn die äußeren Seiten der unteren Zähne opponiert wären den Kronen der oberen; bei genauerer Untersuchung aber finden wir, daß nur die innere Seite eines jeden Zahns gehörig entwickelt ist und die zugespitzten Höcker hat. Die äußere Seite dieser Zähne hat nur die stumpfen Höcker, welche kaum über das Zahnfleisch hervorragen. Diese Gestalt der Zähne kommt offenbar von der Neigung des Unterkieferkandes nach innen.

Wegen der schmalen und verlängerten Gestalt der Schnauze stehen die Schneidzähne zur Seite und von einander abgerückt. Der Raum jederseits zwischen dem letzten Schneidzahn des Oberkiefers und dem Eckzahn ist sehr groß und beim Schluß der Kiefer liegt der untere Eckzahn darin. Die unächten Backenzähne beyder Kiefer sind auch unter einander und vom Eckzahn abgerückt. Eigentlich berühren sich im Oberkiefer nur die zweien unteren Backenzähne, im Unterkiefer die 3 hinteren. Die Backenzähne ragen so wenig vor, daß man kaum die Spitzen sieht, wenn man das Zahnfleisch nicht entfernt: sie sind sehr schwach und der aus dem Zahnfleisch hervortretende Theil besteht nur aus kleinen Höckern.\*

*Mymecobius fasciatus*: colore ochraceofulvo, pilis albis sparsim intermixtis; dorso dimidio posteriore fasciis transversalibus nigris atque albis alternatim ornato; gula, pectore, abdomine artubusque interne subflavescentibus; artubus externe fulvis; tibiis antice albescentibus; cauda fere corporis longitudinem aequante, induta pilis nigris, albis atque fulvis commixtis.

Die bräunliche Farbe des Vorderleibes geht nach hinten allmählich in Schwarz über und ist daseibst mit 9 weißen Querbändern gezieret. Das erste wenig deutliche liegt ziemlich in der Mitte zwischen Kopf und Schwanz und ist auf dem Rücken durch die röthliche Farbe unterbrochen; ebenso das zweite. Beyde Bänder liegen noch in der rothen Färbung. Das dritte und vierte laufen ununterbrochen über den Rücken; die 4 folgenden sind auf dem Rückgrath unterbrochen durch die schwarze Färbung, und diese läuft beyderseits ins Weiße herein wie ein kurzes, spitziges Band. Das neunte ist nicht unterbrochen [es liegt quer übers Kreuz und läuft über den Schenkel herunter bis ans achte Knie].

Der Pelz besteht aus zweierley Haaren: das Unterhaar liegt dünn und ist weißlich grau; das Oberhaar ist ziemlich hart, kurz und an den vordern Leibestheilen angedrückt; an den hintern und untern Leibestheilen lang. Die längeren Haare auf dem Rücken haben meistens eine flache und spitzige Gestalt; die an den vordern Theilen des Rückens sind unten schwarz und oben fuchstroth. Kopfhare sehr kurz und

\* Da ich in dem Exemplar, welches von Diemensland kommen soll, hinten in jedem Kiefer einen Backenzahn mehr fand, als in dem von Lieutenant Dale; so hielt ich es für rathsam, jenes meiner Beschreibung des Gebisses zum Grunde zu legen [Die Beschreibung des Gebisses ist überhaupt nicht mit der gehörigen Klarheit gemacht und in der Zahnformel finden sich offenbar Druckfehler. Statt 3 sollte es offenbar 5 heißen und statt der hinteren 3 sollte es heißen 5, weil sonst die Zahl 32 nicht herauskommt. In der Beschreibung des Gebisses sind im Oberkiefer nur 5 achte Backenzähne, im untern aber 6 angegeben. Damit stimmt auch die Abbildung Taf. 28. Fig. 2—5. überein. Fig. 6 und 7., ohne Zweifel der Unterkiefer des Exemplars vom Schwammlu, hat nur 5 achte Backenzähne, wovon nur die 4 hinteren groß sind und der vordere ziemlich verkümmert, als wäre es ein flaches geliebener Milchzahn; fast eben so kümmerlich sieht der feste oder hinterste Backenzahn aus von dem Exemplar aus Diemensland. Uebrigens magt dieses Gebiß in der großen Zahl der Seitenzähne und ihrer dreylängigen Gestalt an das von *Centetes* et *Chrysocloris*.

bräunlich aus einem Gemisch von Schwarz, Fuchseroth und einigen weißen Haaren. An den Seiten der Schnauze und unter jedem Auge springen einige schwarze Haare vor; das Haar am Schwanz ist lang und ziemlich buschig; die meisten Haare an der Unterseite sind fuchseroth am Grunde und weiß an der Spitze; auf der oberen Seite des Schwanzes sind sie schwarz am Grunde und schwarz an der Spitze.

Am zweiten Exemplar ist die Färbung nicht so glänzend und die Zeichnungen sind weniger deutlich, weichen auch in der Anordnung ab. Die 2 vordersten Bänder sind sehr schwach, gehen aber ununterbrochen über den Rücken. Dahinter ist eine einzelne blasser Linie auf einer Seite des Leibes, welche sich auf den Rückgrath erstreckt und daselbst mit 2 ähnlichen Linien oder Bändern der entgegengesetzten Seite zusammenfließt. Dahinter sind wieder 3 deutliche ununterbrochene Bänder, wovon das letzte 1 halben Zoll vor der Schwanzwurzel liegt. Alle diese Bänder sind rahmfarben. Es ist zu bemerken, daß vor dem vordersten einige schwache Andeutungen von Bändern sind, welche nur aus einigen wenigen weißen Haaren bestehen.

Die hintere Hälfte des Rückens ist bey diesem Thier wie bey dem vorigen schwarz, aber mehr unterbey mit weißen und rötlichen Haaren; der vordere Theil des Rückens mit schwarzen und weißen (oder vielmehr diese Haare sind mit diesen Farben gefleckt); die allgemeine Farbe jedoch ist Fuchseroth. Die Füße sind schmutzig braun; die Kehle und untern Theile schmutzig gelblich weiß, hinten ins Braune.

Länge . . . . .	10 Zoll — —
Schwanz . . . . .	7 — — —
Hinterfuß . . . . .	2 — 2 —
Klaue der Zeigef. . . . .	0 — 2 —
Vorderfuß . . . . .	1 — 4 —
Dhr . . . . .	0 — 9 $\frac{1}{2}$ —
Breite desselben . . . . .	0 — 1 —
Von der Nase bis zum Dhr	1 — 4 —

Das Thier ist am meisten mit Phascogale verwandt, was besonders auch der Schädel beweist.

Zu den Dasyuriden stelle ich *Thylacinus*, *Dasyurus* et *Phascogale*. Nach dieser Reihe gehen die Zähne aus den fleischfressenden in die kerzfressenden über. Obgleich *Myrmecobius* in der Gestalt des Schädels mit *Phascogale* sehr übereinstimmt; so unterscheidet er sich doch durch den Mangel des Hinterbaumens, die Größe der Vorderklauen fast wie bey *Hesperestes* gestaltet und offenbar zum Graben bestimmt. Die Ohren weichen ab, sind schmal und spizig und gleichen denen von *Perameles naevus*; auch sind sie aus- und innwendig behaart.

Das Thier hat auch einige Aehnlichkeit mit den Monotremen, mit *Tupaya*, *Erinaceus* et *Mygale*. Zwar ist *Myrmecobius* im Bau den Monotremen unähnlicher als *Tupaya* den *Mygale*: allein plötzliche Uebergänge finden sich viele bey den Beuteltieren, welche, nicht zu vergeffen, auf einer tiefen Stufe stehen.

Abgebildet sind Taf. 27. das Thier ill.; T. 28. Schädel und Füße.

S. 155. XII. J. W. Westwood, Beschreibung von neuen Arten aus der Gippchaft der heiligen Käfer. Taf. 29.

Diese Käfer haben schon in den frühesten Zeiten die Aufmerksamkeit der Naturfreunde auf sich gezogen, nicht bloß weil sie unter diejenigen Gegenstände gehören: *Qualia demens Aegyptus coluit*, sondern auch wegen ihrer ungewöhnlichen Lebensweise, um derenwillen sie bey den Aegyptiern ein Gegenstand der religiösen Verehrung wurden. In der neuern Zeit war der *Scarabaeus sacer* auch Veranlassung zu der geistreichen Classification in *Mac-Leays* *Horae entomologicae*. Er theilt die Sippe *Scarabaeus* Linn. in zwei parallele Reihen, je von 5 Familien; von den zwei Sippen der eingeschränkten Familie: *Scarabaeidae*, nemlich *Scarabaeus* et *Phanaeus* ist die erste in 5 Typen getheilt, die letzte nur in 4, so daß also eine Lücke blieb, welche nach dem Verfasser einst werde ausgefüllt werden. Von den *Scarabäiden* führt er nicht 5 Sippen, sondern nur die 2 genannten auf, und man findet nur zufällig und zerstreut noch als dazu gehörig erwähnt: *Onitis*, *Onthophagus*, *Copris*, *Canthon* et *Ateuchus*.

Die eingeschränkte Sippe *Scarabaeus* hat als Charaktere: alle Schenkelbeine mit einem einzigen Sporn; Kopf fast dreyeckig oder rhomboidal ohne Hörner; Clypeus strahlig, zweyzählig oder ausgerandet; Thorax elliptisch, gerandet, oft an jeder Seite mit einem Stich, breiter als das Abdomen; vordere Tarsen oft verklümmert usw. Diese Sippe ist in folgende 5 Untersippen oder Typen getheilt.

1) *Heliocantharus*; 2) *Mnematium*; 3) *Pachysoma*; 4) fehlt; 5) *Gymnopleurus*.

Später ist wenig zu dieser Familie gekommen. Kirby brachte hinzu als neuen Typus von *Scarabaeus* einen merkwürdigen Käfer aus Sudau unter dem Namen: *Scar. femoralis*, und sagt: von *Copris* habe ich in meiner Sammlung 10 oder 12 Typen, und *Phanaeus*, *Mac-Leays* fünfter Typus scheint mir in 2 Typen zu zerfallen, wovon der eine enthält *Ph. carnifex*, *vindex*, *igneus* etc., der andere *Ph. splendidus*, *floriger*, *kirbyi* etc. (Einleitung in die Entomologie. Stuttgart bey Cotta. 4. S. 400).

*Ananthesis* et *Deltocilium* sind zwei neue Gruppen, dem *Hyboma* verwandt; *Megathopa* dem *Circellum*; *Scatonomus* dem *Coprobium*; *Drepanocerus* dem *Eurysternus* et *Dendropaemon*; *Enicotarsus* dem *Oniticellus*. Dieses sind die seitdem erfolgten Zusätze.

Es scheint mir, man soll die Familie abtheilen nach dem Bau der 4 Hinterfüße; alle langfüßigen sind Kugelmacher, und hieher gehören sowohl die *Sisyphi* et *Coprobii* als die *Scarabäen*.

Die *Scarabaei* ohne Sporn an den mittlern Füßen sollten abgesondert werden, weil ihnen der Charakter fehlt: allein *Ateuchus adamastor* und die hinten beschriebenen, welche zweien Sporen haben, stimmen übrigens mit *Scarabaeus* in allen Dingen zu genau überein, als daß eine solche Trennung ratsam wäre, und daher wäre es besser, die Charaktere von *Heliocantharus* zu erweitern.

1. *N. G. Scellages*: *Corpus latum, subdepressum. caput subtrigonum, planum, clypeo trilobato, lobo intermedio valde emarginato etc. Antennae 9-articulatae etc. palpi 4-articulati etc. Thorax latior quam longior. Pedes 4 postici elongati; tibiis extus vix spinosis, inter-*

mediis bicalcaratis, posticis 1-calcaratis etc. Abdomen depressum.

*Sceliages jopas*: ater, nitidus, laevis, clypei dentibus duobus intermediis obtusis subelevatis, capite antice punctatissimo, thorace laevissimo, elytris punctis nonnullis minutissimis irregularibus, s. trisque sex longitudinalibus simplicibus, fere oblitteratis; tibiis anticis intus et extus serrulatis, latere externo obtuse quadridentatis; tibiis intermediis extus spinis duobus minutis acutis, posticis tribus. Long. corp. circiter 10 Lin. Hab. in Africa australiori.

Obs. Congenericus videtur *Atenchus adamastor*. Enc. meth. X. p. 351.

2. *Anomiopsis*: pedes elongati, tibiae intermediae curratae, bicalcaratae etc. palpi labiales difformes, articulo secundo maximo etc.

Sectio prima: Clypeus antice cornubus duobus porrectis, depressis etc.

*A. discorides*: ater nitidus punctatissimus; elytris 6-punctato-striatis, capitis thoracisque lateribus, femoribus anticis tarsisque quatuor posticis longe rufo hirtis. Long. corp. 13 lin. Hab. — ?

Sect. II. Clypeus trilobatus etc. caput cornu verticali armatum.

*A. sterquilinus*: ater nitidus punctatissimus convexus, elytris semicircularibus, striis sex simplicibus in singulo, thoracis lateribus tibiisque quatuor posticis serrulatis; capite, thorace tarsisque breviter rufo-hirtis. Long. corp. 10 lin. Hab. — ?

Die beyden vorsehenden Käfer sind in der Gestalt so verschieden, daß man sie weit auseinander stellen müßte; aber genau untersucht, gehören sie doch zusammen, besonders wegen der abweichenden Lippenpalpen. *A. discorides* gleicht in Gestalt den Pachysomen (*Sc. aesculapius* et *hippocrates*); aber *A. sterquilinus* weicht durch den gehörnten Kopf von allen ab; nur bey *Hyboma carinata* ist etwas Ähnliches. Vielleicht kamen beyde Gattungen aus Java.

Abgebildet sind nebst den einzelnen Theilen auf Tafel 29: *Sceliages jopas*, *Anomiopsis discorides*, *sterquilinus*.

Später sah der Verfasser 3 Gattungen fast ganz wie *A. discorides*; sie kamen aus Südamerika von Bahia Blanca und Mendoza, wo sie in der Wüste der Pampa leben; deshalb betrachtet er *A. sterquilinus* als eine eigene Untersippe, *Glyphiderus*, weil der Thorax eine erhabene Scheibe hat mit einem breiten Eindruck und vorn in 2 rundliche Höcker gegliedert ist, und übrigens voll Stiche.

### Insecta lapponica,

descripta a I. W. Zetterstedt. Lips. apud L. Voss. Fasc. IV. 1838. 4. 577 — 768.

Dieses Heft der schon so oft gerühmten Fauna enthält immer noch Muchen von Sippe 40 an *Nephrocerus* bis 120

*Coelopa*, so daß man nicht genug seine Verwunderung über den ungemeinen Fleiß bey'm Sammeln dieser so schwer zu erhaltenden Thierlein ausdrücken kann, noch weniger aber über den ungemeinen Fleiß und die musterhafte Genauigkeit in der Beschreibung derselben. Es kommen begreiflicherweise eine Menge neue Gattungen und selbst Sippen vor, wie *Nephrocerus*, *Coprina*, *Leptopteryx*, *Micra*, *Anthomyza*, *Leptopa*, *Ectinocera*, *Homalocephala*, *Colobaea*.

### Abbildungen

zur Berichtigung und Ergänzung der Schmetterlingskunde, besonders der Microlepidopterologie, herausgegeben von J. G. Fischer, Edlen von Röslerstamm. Leipzig bey Hinrichs 1838. Heft 10. 4. Taf. 46 — 50. III.

Wir freuen uns, fortbauend dieses gründliche und schöne Werk anzeigen zu können. Man erhält hier *Haemylis malvella* in allen Zuständen sehr vergrößert mit den einzelnen Wurzeln und Borsten, nebst der Pflanze und den Samencapseln, worin die Larve lebt, sorgfältig illuminirt; eben so *Haemylis applanella* nebst der Pflanze *Chaerophyllum sylvestre*. Auf den folgenden Tafeln sind bloß die Schmetterlinge von oben und unten abgebildet: *H. onicella*, *impurella*; *Acidalia perochraria*, *ochraria* et *rufaria* mit einander verglichen. Dann folgt eine Nachlese mit allerlei interessanten Beobachtungen über Aufenthalt, Nahrung, Fortpflanzung u. von *Chilo hortuellus*, *conchellus*, *aquilellus*; *Botrys limbalis*; *Geometra vernaria*; *Caradrina trilinea*, mitgetheilt von Heppreich in Weissenfels, A. Schmidt ebenda selbst, K. Heil in Klagenfurt, und Fischer bey Dresden. Wir wünschen dem Verfasser Gesundheit, Muße und Lust zur langen Fortsetzung dieser schönen, critischen und nützlichen Beyträge.

### Recherches

sur les Poissons fossiles par L. Agassiz. Francfort chez Schmerber. 1838. 4. XI. pag. 73 — 140. Feuilleton 107 — 116. 20 Pl.

Dieses schöne und hinlänglich bekannte Werk rückt rasch vorwärts, und beweist das eifrigste Bestreben des Verfassers, die Erwartung des Publicums zu befriedigen und der Wissenschaft, sobald als möglich, nützlich zu seyn.

Dieses Heft enthält die Schilderung der Zähne der Placoiden im Allgemeinen und Besondern, namentlich von *Orodus cinctus*, *ramosus*; *Ctenoptychius apicalis*, *pectinatus*, *denticulatus*.

*Helodus simplex*, *laevissimus*, *subteres*, *gibberulus*, *turgidus*; *Chomatodus cinctus*, *linearis*, *acuminatus*; *Psammodus rugosus*, *porosus*; *Coeliodon contortus*; *Strophodus longidens*, *reticulatus*, *subreticulatus*, *magnus*, *tenuis*, *irregularis*, *radiato-punctatus*, *angustissimus*, *elytra*, *asper*, *punctatus*.

*Ceratodus latissimus*, *curvus*, *kaupii*, *planus*, *parvus*, *emarginalis*, *gibbus*, *daedaleus*, *altus*, *obtusius*, *disauris*, *philippus*, *serratus*, *heteromorphus*; *Ctenodus eristatus*; *Acrodus nobilis*.

Die Tafeln sind in Folio mit brauner Farbe abgedruckt, wodurch die Abbildungen dem Stein so ähnlich als möglich werden. Sie enthalten größtentheils Züge von verschiedenen Sippen; sehr viele von Hagen, alle gezeichnet von Dinkel und von Verschiedenen auf Stein gebracht, gedruckt von Nicolet zu Neuenburg. Sie enthalten sehr viele Abbildungen, um den großen Reichthum, welcher dem Verfasser besonders in England zugekommen ist, noch in den Grenzen der früheren Ankündigung liefern zu können.

Nächstens werden die Süßwasserfische und die Echinodermen von ihm erscheinen.

### A Synopsis

of the Birds of Australia and the adjacent Islands by JOHN GOULD. London, 1837. 4. Part. I—IV. tab. ill.

Dieses ist eigentlich ein Bilderwerk, indem der Text bloß den Charakter lateinisch und englisch nebst den Synonymen enthält. Die Abbildungen scheinen sehr getreu und die ausgemalten sind wirklich sehr schön und sorgfältig, stellen aber nur die Köpfe vor, bisweilen den Fuß. Wir sind zweifelhaft, ob solch ein Werk wirklich den erwarteten Nutzen schafft. Es gibt zwar den Hauptcharakter und ist daher allerdings gut für die Terminologie, aber nicht immer zur sichern Bestimmung der Gattung, und noch viel weniger zum Begriff eines Thiers, worauf es doch jetzt in der Naturgeschichte ankommt. Die Titane der Charaktere macht nur ein Gefumpe im Kopf, aus dem man keinen ächten Ton hört. Dazu sind auch schwarze und wohlfeile Abbildungen gut genug, welche sich überdies bloß auf die Sippen beschränken sollten. Indessen ist dieses Werk genau und schön und es ist daher nichts daran auszusetzen, als daß es für den mechanischen Zweck des bloßen Auffuchens zu theuer ist. Das Heft schwarze Tafeln kostet 15 fl., also etwa 7½ fl. G. M., das illuminierte 1 Pfd. 5 fl. oder 25 fl., also über 12 fl. G. M. Indessen sind die Tafeln zahlreich, nemlich in jedem Heft 18. Wir geben hiervon das Verzeichniß.

#### Heft I. 1837.

*Ocypterus minor* (fuscatus), *superciliosus*, *albo vittatus*, *Turdus sordidus*.  
*Vanga cinerea n.*, *destructor*, *nigrogularis* (*Cracticus varius*).  
*Cracticus hypoleucus n.*, *tibicen* (*Barita*).  
*Coronia fuliginosa n.*, *strepera* (*Coracias*).  
*Calodera maculata n.*, *nuchalis* (*Ptilinorhynchus*).  
*Petroica goodenovii*, *phoenicea n.*, *multicolor* (*Muscicapa*).  
*Malurus lamberti*, *pectoralis n.*, *cyaneus* (*Sylvia*).  
*Struthidea cinerea n.*  
*Amadina castanotis n.*, *ruficauda n.*, *modesta n.*  
*Neomorpha acutirostris n.*, *crassirostris n.*  
*Nestor productus n.* (*Ptyctolophus*), *hypopolius* (*Psittacus nestor*, *meridionalis*).  
*Tropidorrhynchus citreo-gularis n.*, *corniculatus* (*Merops c.* et *Monachus*).

*Anthochaera mellivora* (*Certhia*), *carunculata* (*Merops c.* et *Corvus paradoxus*), *Jewinii* (*phrygia*, *Wattled Bee-eater*).

*Ptilotis* (*Meliphaga*) *penicillata n.*, *leucotis* (*Turdus*), *chrysotis* (*Certhia*).

318 1838, Heft 11.

*Meliphaga austral-asiana* (*Certhia*), *sericea n.*, *novae Hollandiae* (*Certhia*).

*Haematops lunulatus* (*Certhia*, *Meliphaga atricapilla*, *torquata*), *validirostris n.*, *gularis n.*

*Zosterops tenuirostris n.*, *albo-gularis n.*, *dorsalis* (*Sylvia annulosa* ♂).

*Podiceps gularis n.*, *nestor n.*

#### Heft II. 1837.

*Monarcha trivirgata* (*Drymophila*), *carinata* (*Muscipeta*), *inornata* (*Muscipeta*).

*Amadina cincta n.*, *castaneo-thorax n.*, *lathamii* (*Frigilla leucocephala*?).

*Pardalotus punctatus* (*Pipra*), *affinis n.*, *striatus* (*ornatus*, *Pipra*).

*Platycercus* (*Psittacus*), *flaveolus n.*, *flaviventris* (*caledonicus*?, *brownii*), *paliceps n.*, *ignitus*, *eximius*, *icterotis* (*stanleyi*).

*Nanodes* (*Psittacus*) *venustus* (*chrysostomus*), *elegans n.*, *pulchellus*.

*Ptilotis n.* (*Meliphaga*) *chrysops* (*Sylvia*), *auricomis* (*Muscicapa*), *fusca n.* (*melanops*).

*Acanthorhynchus superciliosus n.*, *tenuirostris* (*Certhia*), *dubius n.*

*Coturnix australis*, *pectoralis n.*, *novae Zeelandiae*.

*Hemipodius melanotus n.*, *varius* (*Perdix*), *melanogaster n*

*Aegialitis nigrifrons*, *monachus*, *bicinctus*.

*Himantopus palmatus n.*, *leucocephalus n.*

*Recurvirostra rubricollis*.

*Oxyura* (*Anas*) *australis*.

*Sterna fuliginosa*, *macrotarsa n.*, *poliocerca n.*

#### Heft III. 1838.

*Aquila fucosa*.

*Haliaeetus leucogaster*, *sphenurus n.*, *leucosternus n.*, *canorus* (*calei*).

*Pandion leucocephalus n.*

*Falco frontatus n.*, *melanogenys n.*, *brunnea n.*

*leracidea n.*, *Falco berigora*.

*Astur approximans* (*radiatus*, *fasciatus*), *novae Hollandiae* (*albus*, *raii*).

*Accipiter niger*, *torquatus*.

*Lepidogenys n.*, *subcristatus* (*Falco*, *Lophotes*).

*Milvus affinis n.*, *isurus n.*

*Circus jardinii* (*assimilis*).

*Athene? fortis n.*, *strenua n.*, *maculata*, *boobook*.

*Strix personata*, *castanops n.*, *delicatulus n.*, *cyclops n.*

*Halcyon sanctus*, *collaris*, *cinnamominus*.

*Pachycephala* (*Turdus*) *gutturalis*, *pectoralis* (*Lanius macularius*), *fusca* (*fuliginosa*), *xanthoprocta n.*, *longirostra n.*, *olivacea*.

#### Heft IV. 1838.

*Graucalus pavirostris n.*, *melanotis n.*, *melanops* (*Corvus*), *tenuirostris*, *swainsonii* (*Ceblepyris lineatus*), *mentalis*.

#### Familia Saxicolinae.

*Sericornis n. parvulus*, *frontalis* (*Acanthiza*), *humilis n.*, *citreo-gularis n.*

*Acanthiza pusilla* (*Motacilla*), *nana*, *diemenensis n.*, *lineata*, *reguloides*, *uropygialis n.*, *chrysorrhoea*, *magirostra n.*



### Familia Sylviadae.?

*Psilopus* n. [!], *brevirostris* n., *fuscus* n., *olivaceus* n., *albo-gularis* n.  
*Pardalopus quadragintus* n., *melanocephalus*, *rubricatus* n.  
*Sphenostoma* n. *cristatum*.  
*Ptychotopus galeritus*, *leadbeateri*.  
*Platycercus barnardi*, *tabuensis*, *zonarius* (baueri).  
*Polytelis* (*Palaeornis*) *melanura* (*anthocephalus*), *barra-bandi* (*rosaceus*).  
*Sitella leucocephala* n., *chrysoptera*, *pileata* n. *melanocephala* n.  
*Acanthagenys* n. (*affinis*, *anthochaerae*), *rufogularis* n.  
*Plectorhyncha* n. *lanceolata* n.  
*Entomophila* n. *picta* n.  
*Ptilotis ornatus* n., *flavigula*.  
*Erythrogonys* n. *cinctus* [*Tringa*?].

### Nat u r g e s c h i c h t e

Der Vögel Mecklenburgs von H. D. G. Zander. Wismar, bey Schmidt. 1837. 8. Heft 1. II. 160.

Diese Schrift ist offenbar mit viel Fleiß und Sachkenntniß ausgearbeitet. Der Verfasser hat selbst gesammelt, selbst beobachtet, eigene Charaktere entworfen, ausführliche Beschreibungen gegeben, sowohl für die Gestalt und die Farben als für die einzelnen Theile; auch schildert er die Lebensart meist nach eigenen Erfahrungen. Die Anordnung ist nach Vie's System, welches er in der Isis mitgetheilt hat. Es sind bis jetzt folgende Vögel aufgeführt:

#### Fam. 1. Falkenartige:

- 1) *Haliaetus albicilla*.
- 2) *Aquila fulva*, *naevia*, *pomarina*.
- 3) *Pandion haliaetus*.
- 4) *Circus gallicus* (*brachydactylus*).
- 5) *Buteo lagopus*, *communis*.
- 6) *Pernis apivorus*.
- 7) *Astur palumbarius*.
- 8) *Nisus communis*.
- 9) *Cerchneis tinnuncula*, *rufipes*.
- 10) *Falco aesalon*, *subbuteo*, *peregrinus*.
- 11) *Milvus ruber*, *ater*.
- 12) *Circus rufus*, *cinnereus* (*pygargus*), *cyanus*

#### Fam. 2. Eulenartige (S. 117):

- 1) *Surnia hudsonia* (*nisoria*).
- 2) *Haemeria* n. *nivea*.
- 3) *Athene passerina*.
- 4) *Nyctale tengmalmi*.
- 5) *Scops carniolica*.
- 6) *Bubo maximus*.
- 7) *Syrnium aedum* n., *stridulum*.
- 8) *Otus sylvestris*, *palustris* (*brachyotos*).

Wenn jeder Familie werden vorher die Sippen aufgeführt und kurz beschrieben; bey jeder Gattung ist ein kurzer, wirklich musterhafter Charakter nebst einer kritischen Synonymie, und dann folgt die Beschreibung mit Aushebung der Abarten, wo sie vorkommen.

Uns scheint es, der Verfasser habe des Guten zu viel gethan, indem er die Vögel zu genau beschrieben und ihre Lebensart zu umständlich angegeben, auch zu viel Synonyma angegeben hat. Für die Fauna einer Gegend sollten bloß die neuen Beobachtungen, welche noch nirgends stehen, mitgetheilt, und überhaupt der Vort individuell gehalten werden, wo man z. B. den Vogel, wenn es ein nicht gar zu gemeiner ist, beobachtet, wie er sich vertragen, was er gefressen hat, wie groß er und seine einzelnen Theile usw., wo und wie sein Nest, wie viel Eier darinn gewesen usw. Schilderungen, welche auf die Gattung überhaupt passen, hat man genug, und gerade deshalb muß man ganz individuelle wünschen. Dazu gehört auch bey den Wandervögeln der Zug, bey allen die Menge ihrer Erscheinung, die Zahl der Gesellschaften; ob sie still oder lärmend sind, ob zu allen Zeiten oder nur in gewissen Monaten, zankfüchtig oder friedlich usw. Kurz es muß ein Gemälde seyn, welches an Ort und Stelle aufgenommen worden. Eine allgemeine Schilderung gehört in größere Werke, oder in besondere Beyträge für solche Thiere, deren ganzes Leben und Wesen noch nicht bekannt ist.

Diese Bemerkungen nehmen übrigens dem vorliegenden Werk nichts von seinem Werth, und man muß es mit Dank annehmen, wenn der Verfasser mehr mittheilen will, als nöthig wäre.

### Classification der Batrachier

mit Berücksichtigung der fossilen Thiere dieser Abtheilung von J. J. Schudt. Neuschädel, 1838. 4. 98. 6 L.

Eine solche vollständige und durchaus neue Classification zu entwerfen, wurde dem Verfasser nur durch den Besuch der Leydnischen und Pariser Sammlung möglich. Er hat auch darinn allen Fleiß angewendet, welcher zu einer so umfassenden Arbeit nöthig ist, und es wird ihm gewiß die Anerkennung nicht entgehen.

Voran geht dem Werk eine genaue Beschreibung der Zähne, Zunge, Gehörorgane, Haut, einiges über das geographische Vorkommen und über die fossilen Thiere. Dann folgt die Einteilung mit den Charakteren und endlich die besondere Schilderung der Sippen nebst Angabe der Gattungen und kritischen Bemerkungen.

Diese Classification steht folgendermaßen:

#### I. Batrachia.

Fam. 1. Hylae: Letztes Zehnglied erweitert.

- 2. *Cystignathi*: Kopf mehr verlängert und gewölbt, Zehen spitzig und frey.
- 3. *Ranae*: Schwimnhaut hinten.
- 4. *Ceratophrydes*: Kopf sehr groß und eckig, Augenlid verlängert.
- 5. *Bombinator*: Leib und Füße verkürzt, Kopf runder als bey *Ranae*, Haut meist warzig.
- 6. *Bufones*: Füße länger, Leib sehr warzig, Zunge oval, Kiefer fahlos.
- 7. *Pipae*: Kopf zugespitzt usw.

#### II. Caeciliae.

#### III. Salamandrinae: Geschwät

Fam. 1. *Pleurodeles*.— 2. *Salamandrea*.— 3. *Tritones*.— 4. *Tritonides*: Kopf glatt und dreieckig, Augen sehr klein.IV. *Proteideae*.

Jede Sippe bildet hier eine Sippschaft.

Die Sippen verhalten sich folgendermaßen:

I. *BATRACHIA*.Fam. 1. *Hylae*.

- |   |   |
|---|---|
| 1) <i>Phyllomedusa</i> .                        | 10) <i>Theloderma</i> n.                      |
| 2) <i>Hyalaplesia tinctoria</i> etc.            | 11) <i>Trachycephalus</i> n.                  |
| 3) <i>Cornuhy</i> n.                            | 12) <i>Dendrohyas arborea</i> etc.            |
| 4) <i>Microhyla</i> n. <i>achatina</i> .        | 13) <i>Bürgeria</i> n. <i>Hyla bürgeri</i> .  |
| 5) <i>Sphaenorhynchus</i> n. <i>lac-</i>        | 14) <i>Polypetotes</i> n. <i>H. quadri-</i>   |
| <i>teus</i> .                                   | <i>lineata</i> .                              |
| 6) <i>Symbioas palmatus</i> etc.                | 15) <i>Orchestes</i> n. <i>H. bilineata</i> . |
| ( <i>Auletis</i> , <i>Scinax</i> , <i>Phyl-</i> | 16) <i>Ranoidea</i> n.                        |
| <i>lodytes</i> ).                               | 17) <i>Eucnemis</i> n. <i>H. horstokii</i> .  |
| 7) <i>Calamita cyanea</i> .                     | 18) <i>Boophis</i> n.                         |
| 8) <i>Rhacophorus</i> .                         | 19) <i>Elosia</i> n. <i>H. pygmaea</i> .      |
| 9) <i>Lophopus</i> n. <i>Hyla mar-</i>          | 20) <i>Litoria</i> n.                         |
| <i>morata</i> .                                 | 21) <i>Hylodes</i> ( <i>Enydriobius</i> ).    |
|   | 22) <i>Hylarana erythraea</i> .               |

Fam. 2. *Cystignathi*.

- 1)
- Cystignatus*
- . 2)
- Crinia*
- n. 3)
- Strongylopus*
- n.

Fam. 3. *Ranae*.

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1) <i>Rana esculenta</i> etc.    | 5) <i>Cycloramphus</i> n.                  |
| 2) <i>Discoglossus pictus</i> .  | 6) <i>Palaeobatrachus</i> n. <i>R. di-</i> |
| 3) <i>Pseudis paradoxa</i> .     | <i>luviana</i> ,                           |
| 4) <i>Peltocephalus Bibron</i> . | 7) <i>Leptobranchium</i> n.                |

Fam. 4. *Ceratophrydes*.

- |  |   |
|--|---|
| 1) <i>Ceratophrys</i> .                    | 3) <i>Megalophrys</i> , <i>C. montana</i> . |
| 2) <i>Phrynosceros Bibron</i> , <i>Ra-</i> | 4) <i>Asterophrys</i> n., <i>C. tur-</i>    |
| <i>na megastoma</i> .                      | <i>picola</i> .                             |

Fam. 5. *Bombinatoros*.

- |   |  |
|---|--|
| 1) <i>Telmatobius peruvianus</i> .          | 8) <i>Pleurodema</i> n.                      |
| 2) <i>Pelobates</i> , <i>Bomb. fuscus</i> , | 9) <i>Hyladactyla</i> n., <i>B. ba-</i>      |
| <i>cultripes</i> ,                          | <i>leatus</i> .                              |
| 3) <i>Scaphiopus solitarius</i> .           | 10) <i>Oxyglossus</i> n.                     |
| 4) <i>Pyxicephalus</i> n.                   | 11) <i>Sclerophrys</i> ( <i>Bibron</i> ).    |
| 5) <i>Alytes obstetricans</i> .             | 12) <i>Kalophrynus</i> n.                    |
| 6) <i>Pelophilus</i> n., <i>B. oenin-</i>   | 13) <i>Systema</i> ( <i>Breviceps</i> ).     |
| <i>gensis</i> .                             | 14) <i>Stenocephalus</i> ( <i>Microps</i> ). |
| 7) <i>Bombinator igneus</i> .               |  |

Fam. 6. *Bufo*nes.

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1) <i>Brachycephalus ephip-</i> | 4) <i>Bufo vulgaris</i> .                  |
| <i>pium</i> .                   | 5) <i>Otilophus</i> , <i>R. margariti-</i> |
| 2) <i>Chauvus marmoratus</i> .  | <i>fera</i> .                              |
| 3) <i>Pseudobufo</i> n.         | 6) <i>Palaeophrynos</i> n.                 |

Fam. 7. *Pipae*.

- 1)
- Asterodactylus pipa*
- . 2)
- Dactylethra*
- (
- Xenopus*
- ).

II. *CÆCILIE*.

- 1)
- Caecilia glutinosa*
- . 2)
- Siphonops annulatus*
- .

- 3)
- Epicrion hypocyaneum*
- .

III. *SALAMANDRINÆ*.Fam. 1. *Pleurodeles*.

- 1)
- Pleurodeles waltlii*
- . 2)
- Bradybates*
- n.

Fam. 2. *Salamandrea*.

- |  |   |
|--|---|
| 1) <i>Salamandra maculata</i> .            | 5) <i>Plethodon</i> n., <i>S. glutinosa</i> . |
| 2) <i>Pseudosalamandra</i> n. <i>næ-</i>   | 6) <i>Cylindrosoma</i> n., <i>S. fla-</i>     |
| <i>via</i> .                               | <i>vissima</i> .                              |
| 3) <i>Ambystoma</i> n., <i>S. punc-</i>    | 7) <i>Oedipus</i> n., <i>S. platydac-</i>     |
| <i>tata</i> . [ <i>Ambly</i> ?]            | <i>tyla</i> .                                 |
| 4) <i>Onychodactylus</i> n., <i>S. ja-</i> | 8) <i>Salamandrina perspicil-</i>             |
| <i>ponica</i> .                            | <i>lata</i> .                                 |

Fam. 3. *Tritones*.

- |  |   |
|--|---|
| 1) <i>Geotriton Bonaparte</i> .              | 5) <i>Pseudotriton</i> n., <i>Tr. ruber</i> . |
| 2) <i>Hemidactylum</i> n.                    | 6) <i>Triton cristatus</i> etc.               |
| 3) <i>Cynops</i> n., <i>S. subcristata</i> . | 7) <i>Xiphonura</i> n., <i>S. jeffer-</i>     |
| 4) <i>Hynobius</i> n., <i>S. nebulosa</i> .  | <i>soniana</i> .                              |

Fam. 4. *Tritonides*.

- |  |
|--|
| 1) <i>Megalobatrachus</i> n., <i>Salamandra maxima</i> . |
| 2) <i>Andrias</i> n., <i>Homo diluvii testis</i> .       |
| 3) <i>Menopoma gigantea</i> .                            |

IV. *PROTEIDÆ*.Fam. 1. *Siredon axolotl*.

- |  |
|--|
| — 2. <i>Amphiuma tridactylum</i> .                 |
| — 3. <i>Menobranchius lateralis</i> .              |
| — 4. <i>Hypochthon</i> , <i>Proteus anguinus</i> . |
| — 5. <i>Siren lacertina</i> .                      |

Man wird sich gewiss über die große Zahl der neuen Sippen wundern. Da nicht wenige auf Exemplare gegründet sind, die sich bloß in Sammlungen finden; so läßt sich über ihre Richtigkeit nicht urtheilen: auf jeden Fall beweisen sie aber den großen Fleiß und das Beobachtungstalent, welche der Verfasser bey der Musterung der Sammlungen angewendet hat. Man muß nur bedauern, daß seine frühzeitige Abreise zur Weltumseglung, worauf er sich gegenwärtig befindet, ihm nicht die gehörige Zeit ließ, zur Auswahl der Namen und zur Vergleichung derselben mit schon vorhandenen. Benennungen wie: *Microhyla*, *Bürgeria*, *Ranoidea*, *Hylarana*, *Palaeobatrachus*, *Hyladactyla*, *Pseudobufo*, *Pseudosalamandra*, *Pseudotriton*, *Megalobatrachus* sind nicht zu billigen.

*Orchestes* et *Eucnemis* heißen schon Käfer.

## Revue zoologique

par la société cuvérienne, publiée sous la direction de F. E. GUÉRIN-MÉNEVILLE. Paris, 1838. 8. Nro. 1—8.

Diese Zeitschrift theilt die Verhandlungen der gelehrten Gesellschaften mit, gibt Nachrichten über die Entdeckungen in der Zoologie, Anzeigen von neuen Büchern mit den wesentlichen Auszügen und anderweitige Neuigkeiten. Den meisten Raum nehmen ein die Verhandlungen der Pariser Academie und sojann

die Entomologie. Auch lernt man besonders die neuen Schriften kennen, welche von Wichtigkeit sind, und die sehr spät nach Deutschland kommen. Wegen der gar zahlreichen Gegenstände sind uns jetzt Auszüge aus dieser wichtigen Zeitschrift nicht möglich, und daher glauben wir besser zu thun, wenn wir dieselbe unsern Lesern als unentbehrlich empfehlen, und von Zeit zu Zeit darauf zurückkommen.

## Zeitschrift

für die Entomologie. Herausgegeben von G. Fr. Germar.  
Leipzig, bey Fr. Fleischer. 1. 1839. 8. 196. 2 Taf.

Eine solche Zeitschrift ist allerdings Bedürfnis in Deutschland, wo wir seit fast 20 Jahren keine mehr haben. Die Entomologie hat so viele Pflöge, welche sich ausschließlich damit beschäftigen; ist auch ein so großes Feld, daß man lebenslänglich darin arbeiten kann, ohne zu Ende zu kommen. Man muß sich daher freuen, daß der Herausgeber Muth und Aufopferung hat, sich einem solchen Unternehmen zu unterziehen: denn beyder wird es bedürfen, um einer Zeitschrift Fortdauer zu sichern, welche in Deutschland und selbst in andern Ländern Verläufer hatte, die bald außer Aethem kamen. Bey der gegenwärtigen größeren Achtung aber, worinn die Naturgeschichte steht und bey ihrer größeren Verbreitung in den gebildeten Ständen ist mehr Hoffnung vorhanden als früher, und daher darf man erwarten, daß der Herausgeber wenigstens Freude an seinem Kinde erleben werde. Es tritt auch sehr gesund und kräftig in die Welt, und wenn diese es erkennt und freundlich behandelt, so wird es ihm an Gedeihen nicht fehlen.

Es werden jährlich nur zwey Hefte erscheinen, welche mithin keine große Ausgabe verursachen.

Das vorliegende enthält:

G. 1. Beiträge zu einer Monographie der Schildwanz (Scutellera), vom Herausgeber. Taf. 1. ill.

Voran eine Beschreibung der Organe und sodann eine tabellarische Uebersicht der Sippen, welche wieder ausführlich beschrieben sind und ebenso die Gattungen nebst einem lateinischen Character und den Synonymen. Wir können nur ein Verzeichniß der Sippen mittheilen. Sie heißen:

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Stiretrus 20 species. | 13) Podops 10 species. |
| 2) Discocera 1.          | 14) Deroploa 1.        |
| 3) Chaenocoris 3.        | 15) Psacasta n. 6.     |
| 4) Thyreocoris 31.       | 16) Tetyra 7.          |
| 5) Odontoscelis 15.      | 17) Sphaerocoris 6.    |
| 6) Oxynotus 5.           | 18) Pachycoris 58.     |
| 7) Arctocoris 3.         | 19) Peltophora 1.      |
| 8) Cyptocoris 1.         | 20) Callidea 24.       |
| 9) Graphosoma 10.        | 21) Calliphara n. 17.  |
| 10) Trigonosoma 8.       | 22) Coeloglossa n.     |
| 11) Alphocoris n. 2.     | 23) Scutellera 12.     |
| 12) Phimodera n. 3.      | 24) Augocoris 5.       |

G. 147. Beiträge zu einer Monographie der Mantispä von Erichson. Taf. 2.

Ein sehr vielseitiger Aufsatz über die Ordnungen der Drehepteren und Neuropteren, eine Vergleichung aller ihrer Organe,

besonders der Fresswerkzeuge, der Brustringel und der Flügel, sowie ihrer Verwandlung, wodurch manche Sippen aus einer Ordnung in die andere kommen. Mantispä gehört zu den Neuropteren neben Raphidia. Es werden davon 24 Gattungen charakterisirt und beschrieben. Abgebildet sind *M. decorata* et *notha*, die Fresswerkzeuge von *Mantispä*, *Osmylus*, *Mantis* et *Termes*.

G. 174. Ueber die chemische Construction des Fettkörpers von Döbner in Augsburg.

Besonders wichtig für das Deligwerden der Schmetterlinge; enthält eigenthümliche Versuche.

G. 187. Drey neue Gattungen der Cicadinen.

Ausführlich beschrieben sind nebst ihren Gattungen *Clasoptera* 7 species, *Xerophloea* 1 sp., *Phylloscelis* 2 sp.

Man kann also mit diesem Hefte sehr zufrieden seyn.

## Zur

Anatomie und Physiologie der Riemenwürmer von Dr. K. E. Grube.  
Königsberg, bey Bornträger. 1838. 4. 77. 2 Taf.

Bekanntlich ist für die Anatomie der Meereswürmer im Ganzen noch wenig geschehen, und man hat nur Untersuchungen über einzelne Thiere und zum Theil nur über einzelne Systeme derselben. Mit Dank wird man daher diese Mittheilungen aufnehmen, welche der Verfasser bey den mit Sachkenntnis zerlegten Würmern aus dem Mittelmeer gewonnen hat. Seine Beschreibungen sind offenbar genau, besonders in den Fällen, wo er lebendige Thiere zu untersuchen Gelegenheit hatte. Zuerst von der *Arenicola* die Bewegungs-, Verdauungs-, Kreislaufs-, Athmungs-, Zeugungs-Organe und das Nervensystem; alles mit den Beobachtungen anderer verglichen und beurtheilt: dennoch ist das Gefäß- und Geschlechtersystem noch nicht ganz im Reinen. Nämlich auf ähnliche Art werden *Terebella*, *Sabella*, *Cirratulus*, *Eunice*, *Onuphis*, *Aphrodite*, *Polynoe* dargestellt. Dann folgt eine Vergleichung der anatomischen Systeme dieser Thiere, mit Andeutung zu einer bessern Aufstellung der Familien. *Pleione*, *Lycoris*, *Eunice*, *Onuphis* sollen zusammen die Nereiden bilden; *Sabella* et *Serpula* die Serpuliden; zwischen beyden macht *Cirratulus* den Uebergang. *Arenicola*, *Terebella*, *Amphitrite* sind von den Serpuliden abzufondern; ebenso *Aphrodite* et *Polynoe* von den Nereiden: die ersten führen durch die *Sipunculi* zu den *Holothuriae* abwärts; die letzteren zu den Kesen aufwärts, während die *Sabellen* und *Serpulen* die vermittelnde Stufe zu den Schnecken bilden. Abgebildet sind die anatomischen Theile von *Arenicola*, *Eunice*, *Onuphis*, *Sabella*, *Aphrodite* et *Polynoe*.

Diese Schrift ist ein wichtiger Beitrag zur Kenntniß der genannten Thiere; und wenn auch ihre Anatomie nicht erschöpft ist, was man kaum verlangen kann, so reicht sie doch hin, einen Begriff von den Hauptunterschieden zu geben. Die Abbildungen sind von dem Verfasser selbst entworfen und sehr bestimmt. Diese schöne Arbeit läßt noch Vieles von dem Verfasser erwarten.

## Nalecten

für vergleichende Anatomie. 2. Sammlung. Von Dr. A. Mayer, Prof. Bonn, bey Weber. 1838. 4. 72. 1 Taf.

Das erste Heft dieser reichhaltigen Untersuchungen haben wir schon nach Verdienst angezeigt: das vorliegende ist nicht weniger mannichfaltig und gründlich. Es enthält eine Auswahl von wichtigen Thieren, deren innerer Bau noch wenig bekannt ist, mit einer Genauigkeit in der Zerlegung, wie man sie von diesem geschickten Anatomen erwarten darf. Man findet hier Beiträge zur Anatomie des Straußen, des Randu und des Emeu und zwar zur Osteologie, Myologie und Splanchnologie sehr ausführlich; dergleichen zur Lehre von dem Gehirn, dem Auge, dem Ohr und den Nerven der meisten dieser Thiere.

Dann folgen S. 42 Beiträge zur Anatomie des Dromedars, besonders der Kehlköpfe, des Nervus accessorius, der Magenellen usw.; eines zur Anatomie des Hirs, S. 49; Ausführlicheres zu der von Bradypus (et Myrmecophaga, S. 50), namentlich über das Schultergerüste, die Gefäß=Plerius, die Eingeweide und den Uterus; dergleichen S. 55 von der Phoca vitulina die weiblichen Geschlechtsteile und die Fötushüllen (abgebildet), die Eingeweide, das Herz, mit Bemerkungen von Prof. Weber über Thymus, Herzbeutel, Herz und Venen=Plerius. Endlich S. 67 Beschreibung eines neuen Eingeweidwurms, Rhytis paradoxa, 10' lang, etwas platt gedrückt, ohne Glieder mit einfachem Warzenmund, einem nicht hohlen Darm und einem After; keine sichtbaren Geschlechtsteile. Er ist abgebildet nebst den Eingeweiden; zur Vergleichung Taenia denticulata. Der Wurm schließt sich an die Spulwürmer an, bildet aber, nach dem Verfasser, eine eigene Sippschaft zwischen denselben und den Trematoden.

Aus dieser Inhaltsanzeige wird man die Wichtigkeit dieser Beiträge hinlänglich erkennen und wünschen, daß der Verfasser sie fortsetzen möge.

## MAURITIUS HEROLDII, Prof. Marb.

*Disquisitiones de Animalium vertebriis carentium in ovo formatione. De generatione Insectorum in ovo. Francofurti apud Sauerländer. 1838. Fasc. I. II. 112. 12 Doppeltafeln. ill.*

Endlich wird dieses Werk, woran der Verfasser so viele Jahre mit einem bewundernswürdigen Fleiße und mit eben so viel Geschicklichkeit in microscopischen Beobachtungen gearbeitet hat, glücklicher Weise zu Tage gefördert. Von den ersten Tafeln haben wir schon vor längerer Zeit Nachricht gegeben, um das Werk, so viel an uns liegt, zu befördern. Man darf es wirklich ein ungeheures nennen, wenn man bedenkt, daß der Verfasser nicht bloß die Beobachtungen täglich, fast stündlich viele Jahre lang gemacht und die vergrößerten Gegenstände selbst gezeichnet und gemalt hat. Man braucht sie übrigens nur anzusehen, um diesen Begriff davon zu bekommen. Eine Verurtheilung der Thatfachen ist natürlich nur allmählich möglich denen, welche Miße, Sinn und Gesicht haben dieselben zu wiederholen, wozu also Jahre erforderlich sind. Eine Verurtheilung des Fleißes aber, der Genauigkeit, des Scharfsinns, der Gewandtheit in der Handhabung des Microscops und des Talents im Zeichnen ist nach der bloßen Lesung des Textes und der Beschauung der Tafeln möglich. Der Verfasser hat die kleinsten Eier in ihre Theile zerlegt, die Verwandlungen des

Dotters von Stufe zu Stufe microscopisch beobachtet; ebenso die erste Erscheinung des Embryos und die allmähliche Entwicklung seiner Organe, und jeden Zustand genau beschrieben und abgebildet. Wir können jetzt unmöglich einen Auszug aus diesem reichhaltigen Werke mittheilen, und wollen es auch nicht, weil es billig jeder haben soll, welcher sich um die Physiologie bekümmert; nur bemerken wollen wir, daß der Verfasser gegenwärtig der Uebersetzung ist, daß die sogenannte Keimhaut rund um den ganzen Dotter, wie ein geschlossener Sack, liegt.

Zuerst erzählt er die Handgriffe bey seinem Verfahren; dann bestimmt er den Inhalt der Eier.

Dann folgt die Schilderung des Inhalts der Eier, seine Elementartheile und die ersten Anfänge in den Eyerzügen der Raupen und Puppen auf Tafel 1. und zwar von: Maykäfer, Heuschrecke, Füzlaus, Wanze, Schmeißfliege, Ameise, Semblis, Kothmehlsing.

Auf Taf. 2. der Inhalt des Eies von *Bombyx quercus*. Taf. 3 u. 4. von *Sphinx ocellata*.

Taf. 6. enthält die Veränderungen der Eier des Seidenwurms.

Taf. 7. die Veränderungen desselben unbefruchteten Eies.

Taf. 8. die Veränderungen der Keimhaut von *Sphinx ocellata*.

Taf. 9 u. 10. die Fortbildung derselben zur Rückenplatte usw.

Taf. 12. frisch ausgetrockene Raupen.

Taf. 13 u. 14. Veränderungen im Ey der Schmeißfliege.

Alle diese Theile und Veränderungen sind sehr ausführlich beschrieben, in deutscher und lateinischer Sprache, und durch zahlreiche Figuren illustriert.

Tafel 5 und 11. sind noch nicht geliefert.

Der Preis dieses Werks scheint uns sehr wohlfeil. Es kommt nicht auf 30 fl. rhein. — Wir kommen später ausführlicher darauf.

## Bemerkungen

über das Quadratbein und die Paukenhöhle der Vögel von Dr. Gebor Platner. Dresden, bey G. Fleischer. 1839. 8. 39. 2 Taf.

Diese Abhandlung zeugt von viel Sinn und Geschicklichkeit für die vergleichende Anatomie. Er hat Vögel aus verschiedenen Ordnungen deshalb untersucht, und auch den Schädel eines ganz jungen Huhns, wo die Knochen noch nicht vernachlässigt waren; hat die Theile sehr deutlich abgebildet, Unterschiede im Quadratbeine gefunden, welche selbst die Ordnungen charakterisieren und manchen Zweifel über den Stand eines Vogels, wie der Taube und des Trappen, heben; er hat die meisten Meinungen und Arbeiten über die Bedeutung dieses Beins verglichen und beurtheilt, und ist derjenigen bengetreten, welche es für das abgelöste Gelenkstück des Schläfenbeins ansehen; indessen sind ihm die vielen Aufzählungen hierüber in der Isis, besonders von Bojanus über die Pauke der Vögel, gänzlich entgangen. Dabey kommen noch viele interessante Betrachtungen über die Gehörknöchel und den Verlauf der Chorda tympani bey den Vögeln vor. Uns scheint es, daß die Bedeutung des Quadratbeins nur bey den Fischen zu entdecken ist, versteht sich, mit Vergleichung der bey andern Classen.<sup>6</sup> Dazu wird diese Schrift ein wichtiger und Dank verdienender Beytrag seyn.

## Handbuch

der Geschichte der Medicin. Nach den Quellen bearbeitet von **M. B. Lessing**. Berlin, bey Hirschwald. 1838. 8. I. 567.

Ein wirklich äußerst gründliches Werk mit großem Fleiße und gebiener Sprachkenntniß, aus den Quellen selbst bearbeitet. Sie werden überall zahlreich angeführt, erläutert und beurtheilt. Der Verfasser beginnt mit den ersten Spuren der Medicin und geht im ersten Zeitraum bis auf Hippocrates; im zweyten bis auf Galenus; im dritten bis Paracelsus; im vierten bis auf Harven. Ueberall sind die Männer und Schulen, welche etwas geleistet haben, herausgehoben mit einer Vollständigkeit, in welcher wohl kaum Lücken zu finden sind. Auch die Hülfswissenschaften, besonders die Botanik, Chemie usw. sind reichlich bedacht. Wir zweifeln nicht, daß dieses Werk den Vorfall der Ärzte, Physiologen, Philologen und der Geschichtsfreunde eintränten wird.

## Chemisch-physiologisches System

der **Pharmacodynamik** oder vollständiger Parallelismus des chemischen und dynamischen Characters der anorganischen und organischen Stoffe, von **Dr. W. Graba u.** Kiel, Universitäts-Buchhandlung. 1832. II. 455.

Wie haben in unsern Schriften über die Naturphilosophie den Parallelismus zwischen den Reichen der Natur, besonders zwischen dem Pflanzen- und Thierreich darzustellen gesucht, und den Satz ausgesprochen, daß die auf gleicher Stufe stehenden Mineralien und Pflanzen mit den Thieren als spezifische Mittel für die letztern betrachtet werden müssen. Davon haben wir auch einen Versuch in Schellings und Marcus Zeitschrift mitgetheilt, welcher, obgleich sehr unvollkommen, doch die Idee darstellt, wie die Sache zu behandeln seyn möchte. Der Verfasser sucht nun den Parallelismus im ganzen Arzneyschatz auf und ordnet darnach die Stoffe. In wie weit es ihm gelungen ist, sind wir nicht im Stande zu beurtheilen. Auf jeden Fall ist es auch gut, daß der Versuch gemacht ist und besonders, daß ihn der Verfasser mit so viel Eust, Fleiß und Scharfsinn beginnt.

Wir glauben zwar nicht, daß wir die entsprechenden Pflanzen- und Thierfamilien überall glücklich eingereiht haben; indessen ist es doch sicherlich bey den meisten der Fall, so daß es der Mühe lohnt, nachzusehen, ob sie sich wirklich in Krankheiten der entsprechenden Organe specifisch gegen einander verhalten. Was vom Parallelismus der Pflanzen- und Thierfamilien gilt, das gilt auch von den Stoffen und Organen: denn die Familien sind nur selbstständige Darstellungen der Organe und diese der Stoffe. Der Verfasser arbeitet nun vorzüglich auf diesen Parallelismus los, und er ist es auch gewiß, welcher in der Materia medica seinen Platz hat. Es ist aber ohne Zweifel sehr schwer, vielleicht unmöglich, denselben zu finden, ohne vorher mit dem Parallelismus der Familien im-Reinen zu seyn, weil beyde einander bestärken und der letztere leichter zu finden ist, als der erstere. Indessen muß man von beyden Seiten einander entgegen arbeiten, und am Ende wird man es finden, worinn die Dinge mit einander übereinstimmen.

Der Verfasser behandelt hier nach einer Einleitung die speciellen organischen Stoffe, S. 65, und zwar zuerst die indifferenten, wie Eiweiß, Gallert, Faserstoff, Stärke, Schleim, Zucker, Fette. Sodann die negativen Stoffe, S. 144, wie

Säuren, stickstoffige Körper. Dann positive Stoffe, S. 177, wie Kohlenstoffhaltige, nacratische, bittere, abstringierende; sodann Wasserstoffhaltige, wie Alcohol, Aether, Balsame, empyreumatische. Ein Register erleichtert das Auffuchen.

Auf jeden Fall kommt durch dieses Werk etwas Neues in die Materia medica, und dabey wird immer ein Bedeutendes gewonnen.

## De Perityphlitis,

diss. in. auct. **C. Fr. WILHELM**. Heidelberg, 1837. 8. 45.

Diese Schrift enthält fünf merkwürdige Fälle dieses Hüft-übels mit einer genauen Schilderung der Kennzeichen, der Behandlung und der Anatomie nebst der Literatur, und gibt daher eine gute Uebersicht von den Verhältnissen dieser Krankheit.

## De Machaone et Podalirio,

primis Medicis militaribus. Diss. in. auctore **P. KRAKHOFEN**. Groningæ, 1837. 8. 77.

## De Mutationibus formæ ossium

vi externa productis. Diss. in. auctore **G. HULSHOFF**. Amstelodami apud Müller. 1837. 8. 123. 4 tab. in Folio.

Beydes sind große Abhandlungen, wie sie bey den holländischen Dissertationen vorzukommen pflegen; die erste, philologisch und sehr gelebt, behandelt einen Gegenstand, welcher interessant ist für das Medicinalwesen der Alten; die zweyte behandelt ihren Gegenstand physiologisch, anatomisch, pathologisch und therapeutisch mit viel Gründlichkeit und gibt sehr große Abbildungen von verschobenen Becken, welche besonders für den Orthopäden von Wichtigkeit sind.

## Bewillkommungsgebieth

an die zu Prag im September 1837 versammelten deutschen Naturforscher und Ärzte. Eingefandt von **Dr. Carl Rump** aus Wien in Ungen.\*

**Sunt mihi doctorum communia sacra virorum,**

**Percoluit ausonia quos mea musa lyra.**

**Hinc volo frondentes hederæ decerpere ramos,**

**Quos cupere meritis imposuisse comis.**

**O sinite hanc hederæ vobis adcerpere baccam,**

**Circa laurigerum, tempora vestra, caput!**

**Vos estis saeculi decus indelebile nostri**

**Vos canit aeterna posteritas lyra.**

**Vos spectat centrum radiarum lumine Titan,**

**Deque poli anxius pectora vestra foco.**

**Vos facilis studio pulcher recolatur ut orbis**

**Atque hominum pateat semita facta solo;**

**Eheu! vos scitis mansuras tradere chartas**

**Contigit in mundo quidquid ab axe poli**

**Cur Deus immenso se clausit aëra ponto**

**Soleque submerso sidera lucta micent.**

\* Diese drei Gebiethen gingen zu spät ein.

Quid faciat segetes? Cur quatuor tempora mutans  
 Phoebus in attacto pisce reflectat iter?  
 Quid parit Arceturus, cur non cynosura sub undas  
 Volvitur aequoreas, nec ruat Arctophylax?  
 Cur sæpe adrei luctantur in æquore venti?  
 Cur glacie et sæva grandine terra riget?  
 Unde maris fluxus contingant atque refluxus?  
 Et pluvias madidas cur bibat arcus aquas?  
 Quid moveat stellas, quæ corpora cuncta deorsum  
 Vis agat, alternæ temporis unde vires?  
 Cumque micet Phœbus vultu constanter eodem.  
 Cur Phœbi vario luceat orbe soror?  
 Qualiter aut quanto decurrant sidera lapsu?  
 An ruat e puro stella serena polo?  
 Unde nives, boreæ, tonitru vel fulmina Franklin  
 Quæ docuit magno surripuisse Jovi?  
 Cetera quis referat, vestri monumenta per orbem  
 Ingenii, doctis sat bene nota viris!  
 Vivitis in recti ducentes tramite gentes  
 Ingenio sanos parturiente libros.  
 Immo alios etiam, qui jam videre Corinthum,  
 Ex ipsisque bibunt fontibus Aonidas;  
 Ex his Hungariæ celebres virtute ducentes,  
 Perdoctæ ornatos frontis honore viros,  
 Hic ubi Maruvius vel manant Chryseos undæ,  
 Thyscia, vel rapidus volvitur Ister aquis  
 Ob patriæ curas et mentem diligit omnes  
 Lectosque in socios gratia vestra sovet  
 Longior est series, quam versu dicere possim,  
 Quorum pegaseis ora rigantur aquis;  
 Sunt etenim multi, perdocta volumina quorum  
 Condita Pierii montis in arce jacent.  
 Est his, est animus, qui vos veneretur amatque,  
 Est ratio æternas reddere sueta vices,  
 His ego permotos grati modulaminis ergo  
 Vota mei sensus vestribus ista cano:  
 Vivite! nec subeat vestras oblivio laudes  
 Sed plenas meritis fama sub astra ferat!

### Empfindungen

bei Eröffnung der Vorträge der Naturforscher und Ärzte zu Prag.  
 Eine improvisatorische Dichtung des Hergens von Dr. C. S. Dietrich.

Welch ein freudiges Wort tönte von Mund zu Mund?  
 Tief uns festlich zu Dir, Moldau, zu deinem Strand,  
 Deinen heiligen Ufern,  
 Und zur böhmischen Königsstadt?

Du bist's Mutter Natur! Deiner Erfindung Pracht  
 Zu bewundern, den Geist, der in der Schöpfung lebt,  
 Zu verehren, im Anschau'n  
 Des Erschaffnen den Schöpfer seh'n,

Ist ein heiliger Ruf süßenden Herzen, hebt  
 Ueber's Irdische uns, lehrt in des Anschau's Glück  
 Gott erkennen und lieben,  
 Und beseligt des Menschen Brust!

Wie in innerer Kraft, stets dem Geſetze getreu  
 Die der Schöpfer ihr gab, sich die Natur bewegt,  
 Nimmer ruhend und rastend,  
 Selbst im Tode das Leben zeugt,

Wie in Pflanzen und Stein, und der belebteren  
 Wesen freudigem Seyn, Ursach und Wirkung sich  
 Treu bebingen, und Alles  
 Alles Zeuge der Allmacht ist;

Wie der menschliche Geist, siegend der Schöpfungen  
 Weites irdisches Reich selbst zu beherrschen wagt,  
 Und im stolzen Bewußtsein  
 Elementen Geſetze gibt;

Dies zu lernen und dies treu zu verkünden, sey.  
 Dieser Tage Beruf, festliche Tage sind's —  
 Nacht von Morgen zu Abend,  
 Nacht von Mittag zu Mitternacht!

Al' ihr Forscher! und Du, welcher mit schnellem Kiel  
 Durch die Meere den Weg freudiger Forschung brach,  
 Der die fernsten der Völker  
 Der die schönsten der Reiche sah:

Welch ein schöneres Land, schöner und glücklicher,  
 Von der reichsten Natur Gaben begünstigter,  
 Sahst du, edelster Forscher!  
 Als Böhmiens Königreich?

Mikans Laute, du hast treu uns den Weg gezeigt  
 Seine Schätze zu schau'n: sey uns vergönnt, o Prag!  
 Gib den Stunden der Forschung  
 Ihrer Weihe Verherrlichung.

Ob im Nebengeſiß, ob in der blendenben  
 Stufen Sammlungen, ob unter der thierischen  
 Schöpfung Wundern wir forschen,  
 Ob die Flammen des Chemikers

Prüfend leuchten, ob am lehrenden Krankentbett  
 Wir verweilen, den Kampf innerer Kräfte schau'n,  
 Wo die heilende Kunst sich  
 Mit der himmlischen Liebe eint.

Ueberall, wo wir sind, rufe des Hergens Wort:  
 „Strebt vereint, Al' zum Ziel höheren Wissens, sucht  
 „In den Künsten das Höchste,  
 „In dem Leben Aufriedenheit!“

So vereint soll die Zeit, welche die Königsstadt  
 Uns verherrlicht, die Zeit höheren Forschens und  
 Hygida den Kreisen  
 Aller Mufen verschwifert seyn.

Seht den würdigsten Greis, welchen als Führer wir  
Ireu verehren, ein Stern glänzt von den Bergen Er:  
So einst glänzten die Ahnherren  
Seines Namens im heil'gen Kampf!

Kast vereint uns den Kampf gegen die Tigerinn,  
Die dem Ganzen entstieg, die bald mit raschem Sprung  
Wolkern lachte, bald tüdich  
Um die Horben der Reiche schlich,

Dann beginnen, wenn sie wieder zu nahen wagt,  
Nur im Muth ist der Sieg, nur in der Zuversicht  
Heil und Segen, der Glaube  
Soll der Pharus des Arztes seyn!

Also wandeln belehrt wir von Bohemiens  
Reichen Fluren, der Wunsch töne von Herz zu Herz:  
„Gott erhalte den Kaiser!  
„Herr! Herr! segne sein treues Volk!

### Die Würde der Naturforschung.

Beranlaßt durch die Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte zu Prag 1837.

Ursach' und Wirkung, — des Gewordenen Werden und Daseyn, —  
Massen und Kräfte, — Kleinstes und Größtes, — Fernes und  
Nahes, —  
Denkt und gewahret nach innen und außen der spähenbe Forscher.

Lieben und Hassen magnetischer Pole, — Geben und Nehmen, —  
Feindlich und doch harmonisch zum Ganzen vereinte Extreme, —  
Jedlichen Punkt im unendlichen Raume rastlos beweglich, —  
Leben in jedem Atom und Seele in jeder Monade, —  
Innige Einheit des Lebens vermittelt durch stete Entzweiung,  
Findet und sucht er im innersten Selbst des eignen Bewußtseyns.

Rollender, glühender Sonnen, dunkler, beleuchteter Erden  
Schwimmende Sphären im Raum des unermeßlichen Welt-Alles; —  
Lebender Thiere der Erde, der Pflanzen Blüten-Gewimmel,  
Starren Gesteines Gefüg', die Regel-Gestalt des Eryktales  
Malt microcosmisch sich im Sauber-Ringe des Auges.

Wunderbar bringet ihr Bild vom Auge zum Brennpunct der Seele,  
Innig und dennoch von jedem verschieden erfasst und empfunden.  
Keiner der Wisse erklärt' es; — deutlich begreift es kein Seher.  
Niemand noch fand zu den innersten Thoren des Geistes die Schlüssel.  
Kennst du bestimmt der geist'gen Empfindung inn're Gesetze? —  
Fühlst du beständig die Allmacht des reinen, verständigen Willens? —  
Ununterbrochen des denkenden Geistes reges Bewußtseyn? —

Ueberall spähet der sinnende Forscher der Dinge Gesetze.  
Ihnen gehorchend nur herrscht er; — bringt in die Tiefen der Erde;  
Fliegt von ätherischen Schwingen getragen zur Höhe der Lüfte; —  
Silet, unsichtbar besüßelt, durch Fernen der Meere und Länder;  
Wandelt das Dunkel der Nacht zum künstlich erhellten Tage;  
Horchet dem wechselnden Spiel vernichtend schaffender Kräfte;  
Ahnet unendliches Werden im cycclischen Gesange der Dinge;  
Lauscht im Pulschlag der Zeit dem Hauche des schaffenden Welt-  
geists,  
Rastlos dem Stoffe der Schöpfung vermählend Idee und Gedanken;  
Glaubt an des göttlichen Urgeists allmächtig waltende Weisheit, —  
An des eigenen Selbst's unsterblich veredeltes Daseyn;  
Weiß und erkennt der reineren Wahrheit allmächtige Urkraft,  
Welche hienieden dem Recht der Sitte schon Siege bereitet.

Wahrheit und Recht — im Himmel gezeugt — lebt ewig  
auf Erden;

Herrscht lebendig im cycclischen Laufe und Wechsel der Dinge;  
Lebet den Söhnen der Weihe noch im vermorrensten Schicksal;  
Lebet unsterblich in edlerer Weisen geistlicher Mitte;  
Schirmet des einzelnen Heil und bauet die Wohlfahrt der Staaten.

Dies nur weiß der Natur bescheidener Forscher; glaubt jenes;  
Fühlt die höhere Würde der Einheit des Wissens und Glaubens;  
Rimmer sich ket vermessend den Schleier der Isis zu heben,  
Und des Lebens dunkles Geheimniß erschöpfend zu lösen.

Dresden, am 18. September 1837.

H. W. Kaufher, Dr. phil.

(Wir müssen bemerken, daß dieser Name in dem amtlichen  
Bericht „Prag 1838. 4. S. 91. Nr. 7.“ unrichtig Kaufsch ge-  
schrieben ist. Red.)



1838.

S e f t XII.

**Uebersicht der sämmtlichen Vorträge,**  
welche bey den bereits stattgefundenen 15 Versammlungen der deutschen Naturforscher und Aerzte  
von 1822 bis 1837  
gehalten worden sind, besorgt von Krombholz, Prof. zu Prag.\*

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
<b>Abdominaltyphus</b> , Erörterung des Begriffes des —	Bischof.	Prag.	<b>Acrolein</b> , eine neue, durch trockene Destillation aus Fettarten und Eupion gewonnene Substanz.	Brandes.	Bonn.
<b>Absonderungsorgane</b> , Analogie derselb. mit den Athemorganen.	v. Altenstern.	Jena.	<b>Actinie</b> , Beiträge zur Naturgeschichte derselben.	Simon.	Heidelberg.
<b>Academie der Wissenschaften</b> , über eine zu gründende — in Wien.	Schweigger.	Prag.	<b>Acupunctur</b> , ihre Heilkraft.	Friedreich.	Frankfurt.
<b>Acalephen</b> , deren Eintheilungen in Ctenophorae, Discophorae und Siphonophorae.	Eschscholtz.	Heidelberg.	<b>Aderlaß</b> , Anwendbarkeit derselben in der Cholera.	v. Altenstern.	Wien.
<b>Acariden</b> , Versuch einer systematischen Eintheilung derselben.	v. Heyden.	Frankf. a.M.	<b>Aderlaß</b> , Anzeige derselben im Beginne der Cholera.	Wawruch.	Wien.
<b>Acclimations-Versuche</b> verschiedener Getreidearten.	Lumbe.	Prag.	<b>Adoxa moschatellina</b> .	Hünefeld.	Hamburg.
<b>Acephalie</b> eines Schafes.	Münz.	Prag.	<b>Neoscharfe</b> .	Prudlo.	Breslau.
<b>Achillessehne</b> , ihre Verschneidung beim Klumpfuß.	Kour und Ulrich.	Prag.	<b>Aequatorial</b> , über eine viel leichtere und sichere Gebrauchsweise derselben.	v. Littrow.	Breslau.
<b>Achromatisches Fernrohr</b> , über seine Vorrichtung, um selbes zugleich als ein zusammengesetztes Microscop benutzen zu können.	Weber.	Halle.	<b>Aerolithenbägel</b> im J. 1824 im Gouvernement Drenburg.	Struve.	Jena.
<b>Acipenser-Arten</b> : Untersuchungen über dieselben.	Fisinger.	Breslau.	<b>Aeroscop</b> , über den Gebrauch dieser chemischen Glasröhre.	Jennek.	Dresden.
<b>Aconit</b> , Schärfe der verschiedenen Arten derselben.	Geiger.	Hamburg.	<b>Aerzte</b> , eine Sammlung eigenhümlicher Abhandlungen derselben in Schlesien.	Lichtenstädt.	Berlin.
<b>Aconit</b> mit nicht blauen Blüthen äußert eine giftigere Wirkung als das blau blühende.	Hünefeld.	Breslau.	<b>Aerzte</b> , ihre relative Stellung zum Allgemeinen in biologischer, nosographischer u. therapeutischer Beziehung.	Schmidt.	Stuttgart.
			<b>Aether</b> , Beschreibung eines neuen Apparates zur Bereitung desselben.	Mohr.	Prag.

\* Diese Versammlungen waren: 1822 in Leipzig, 1823 in Halle, 1824 in Würzburg, 1825 in Frankfurt, 1826 in Dresden, 1827 in München, 1828 in Berlin, 1829 in Heidelberg, 1830 in Hamburg, 1832 in Wien, 1833 in Breslau, 1834 in Stuttgart, 1835 in Bonn, 1836 in Jena, 1837 in Prag. Die Verhandlungen stehen in der Isis gewöhnlich ein Jahrgang später.  
Jhs 1838. Heft 12.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
<b>Aetherapparat</b> , Beschreibung eines schon seit längerer Zeit in einer Fabrik in Oestreich angewendeten —.	Ehrmann.	Prag.	<b>Amfeisenarten</b> , die Anwendung der großen — welche man auf die Fruchtstempel zu bringen rathet, weil durch sie die Kornwürmer am schnellsten vertilgt werden.	Volz.	Stuttgart.
<b>Aethiopie</b> , Kopten u. Abyssinier, Wahrnehmungen an denselben.	Rüppel.	Stuttgart.	<b>Amethyst</b> , seine merkw. Structur.	Marg. Meißner.	Jena.
<b>Asterbildungen</b> , Entstehung derselben durch Cleopus lineariae.	Hammer-schmidt.	Wien.	<b>Amphibiorum</b> , de quorundam papillis glandulisq. femoralib.	Stannius.	Stuttgart.
<b>Ahornzuckerfabrication</b> , üb. die —.	Wilbrand.	Stuttgart.	<b>Amphinome rostrata</b> , Anatomie der —.	Heidelberg.	Hamburg.
<b>Alb</b> (schwäbische), Vergleichung derselben mit den äquivalenten Formationen Englands.	Mandelsloh.	Stuttgart.	<b>Amphinome carunculata</b> , über die Structur der Blutgefäße der.	Treviranus.	Heidelberg.
<b>Alge</b> (neu entdeckte), Hydrurus crystallophorus.	Schüler.	München.	<b>Amputiren</b> der Urticularien, über die —.	Treviranus.	Bonn.
<b>Alge</b> , eine von Narbo im adriatischen Meere bey Venedig neu entdeckte — die er gegen scrophulöse Uebel empfiehlt.	Narbo.	Wien.	<b>Amudarja</b> , die Ausmündung dieses Flusses in das caspische Meer.	v. Eichwald.	Jena.
<b>Alge</b> , welche im Aargau in einer Quelle wächst, deren Temperatur + 41° R. ist.	v. Martens.	Stuttgart.	<b>Amylum</b> (oder Stärkmehl), Untersuchungen desselben.	Fritzsche.	Bonn.
<b>Algen</b> , Bemerkungen über mehrere microscopische — in chemischen Solutionen entstehende.	Biafoletto.	Wien.	<b>Analogie</b> , ihre Anwendung in acuten Krankheiten.	Hartmann.	Hamburg.
<b>Algen</b> (farbige), über deren Erhaltung in der Aqua creosotata.	Biafoletto.	Wien.	<b>Analyse</b> , über das Verhältniß der genauern chemischen — zur Medicin.	Pfaff.	Hamburg.
<b>Algen</b> , Bemerk. über mehrere nur in einzelnen Jahren erscheinende.	Martens.	Stuttgart.	<b>Anatomie</b> , pathologische Bruchstücke aus der —.	Otto.	Wien.
<b>Algen</b> , über einige.	Narbo.	Breslau.	<b>Anatomie</b> , über vergleichende —.	Schmidt.	Hamburg.
<b>Algen</b> , ihre Metamorphose.	Biafoletto.	Prag.	<b>Anatomie</b> , Unterschied der descriptiven, geschichtlichen, vergleichenden und philosophischen —.	Carus.	Frankfurt.
<b>Algen</b> , Wichtigkeit der Beobachtung derselben.	Reichenbach.	Prag.	<b>Anatomie</b> , Vortrag über die Lage der Eingeweide, die Lehre vom Kehlkopf und von dem Ursprunge der Ausführungsgänge in den Absonderungsorganen.	Münz.	Dresden.
<b>Algologiae euganae conspect.</b>	Meneghini.	Breslau.	<b>Anemoscop</b> , welches die Veränderungen der Windrichtungen selbst beschreibt.	Trail.	Hamburg.
<b>Allogologie</b> , ihr gegenwärtiger Zustand.	Martens.	Hamburg.	<b>Aneurysme de l'artère poplitée</b> , Observation sur un —.	Ehrmann.	Heidelberg.
<b>Alkohol</b> (absoluter), dessen Gefrierpunct.	Münke.	Heidelberg.	<b>Angina pectoris</b> .	Wendt.	Heidelberg.
<b>Alkohol und Wasser</b> , Meißners Angabe über deren Mischung nach 16 Jahren durch mathematische Ableitung vollkommen bestätigt.	Gesfner.	Wien.	<b>Anodonten</b> , sogenannte Eyer in den Riemen derselben, die für Schmarcottiere erklärt werden.	Jacobson.	Hamburg.
<b>Alluvialthron</b> , einige interessante Vorcommissen in demselben bey Dörsdorf unweit Sangerhausen.	v. Freiesleben.	Dresden.	<b>Antimon</b> , Darstellung eines arsenikfreien aus dem Algarottpulver.	Artus.	Jena.
<b>Alor</b> , die Wirkungsart des wässrigen Extractes derselben als Purgiermittel.	Webekind.	Frankfurt.	<b>Antimonium diaphoreticum ablutum</b> , seine verschiedenen Darstellungsmethoden.	Storch.	Prag.
<b>Alpen</b> , Bemerkungen über die —, insbesondere die der Dauphiné u. über ihr Verhalten gegen das anstossende Gebirgssystem an der Küste der Provence.	v. Buch.	Berlin.	<b>Antimon. diaphoretic. ablutum</b> ist keine Antimonisäure, sondern saures antimonisäures Kali.	Buchner.	Prag.
<b>Alpenstock</b> (Appenzeller).	Walchner.	Bonn.	<b>Antiseruelle Theorie</b> , Einwendung gegen dieselbe.	Meper.	Berlin.
<b>Alpseinen</b> , ihre geogr. Verbreitung.	Fenzl.	Wien.	<b>Anziehung und Abstoßung</b> (magnetische).	Messerschmidt.	Jena.
			<b>Apatis</b> , aus dem Eisenthale am Harze.	Sartorius v. Waltershausen.	Hamburg.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Apotheken, deren Visitation. Apparat, diagnostischer, Skizze zu einem portativen —.	Wackenroder. Vogel.	Jena. Berlin.	Arzneymittellehre, zur kritischen Rüge und Verständigung für dieselbe.	Wischhoff aus Bonn.	Hamburg.
Apparat (neuer) zur Analyse organischer Stoffe und Erklärung der Art seines Gebrauchs.	Brunner.	Wien.	Arzneymittellehre, deren vervollkommnung.	Wedekind.	Heidelberg.
Arbennen. Höhenmessungen in denselben.	Steininger.	Berlin.	Asclepiaden, Vorschub, welchen die Foundation derselben den Insecten verbannt.	Brown.	Breslau.
Arachniden und Scorpioniden, ihr Nervensystem.	Treviranus.	Heidelberg.	Aspergillum vaginiferum Lam.	Rüppell.	Heidelberg.
Argynnis aglaja, Unterschiede einer bey Prag entdeckten Spielart derselben.	Nickel.	Prag.	Asterearum genera et spec.	H. v. Esenbeck.	Wien.
Arm (merkwürdiger), in welchem das Blut unmittelbar aus der Arterie in die Vene übergeht.	Schottin.	Leipzig.	Astereen.	Nardo.	Breslau.
Arum, Darstellung desselben aus den Blüten von Philadelphus coronarius, Reseda odorata und Tilia europ. mittelst Schwefeläther.	Buchner jun.	Jena.	Asthma, eine neue Art desselben. Asthma thymicum.	Kopp.	Heidelberg.
Arsen- und Arsenichsäure in fetten Körpern; Bericht über die in München unternommenen Versuche über die Auflöslichkeit derselben.	Buchner jun.	Prag.	Astronomie, Verhältniß der deutschen zur ausländischen.	Sachs.	Breslau.
Arsenik, sein Einfluß auf Verwesung.	Jäger.	Heidelberg.	Atmungsproceß, die Natur desselben und Bildung der Rhobizon = u. Kohlensäure des Blutes während des Athmens und des Kreislaufs.	Struwe.	Hamburg.
Arsenik, Untersuchung auf —.	Pfaff.	Hamburg.	Atmungsproceß und Kreislauf des Blutes.	Seller.	Prag.
Arsenik, seine Anwendung in manchen Fällen.	Harleß.	Heidelberg.	Atrophie ventriculo.	Wilbrand.	Halle.
Arsenik, dessen Wirkungen und Gefahren.	Wendt.	Heidelberg.	Atrophie, Ansichten und Beobachtungen über eine naturgemäße Behandlung derselben.	Fersch. Herrmann.	Bonn. Wien.
Arsenianickelerz (geschwefeltes), Vergleichung desselben mit den übrigen Nickelerzen.	Weiß.	Stuttgart.	Auerchs.	b. Jacoski.	Hamburg.
Artemisia vulgaris, Wirksamkeit des reindesten Extractes davon.	Kölreuter.	Stuttgart.	Aufeinanderfolge des ersten Auftretens der verschiedenen organischen Gestalten.	Ritgen.	München.
Arteria radialis, Beobachtungen über ihren anomalen Verlauf.	Hyrtl.	Prag.	Auge, Wahrnehmung, daß dasselbe beim Erwachen häufig Höre sehe, die nachher verschwinden.	Schwerd.	Bonn.
Arterien, ihre besondere Färbung bey Injectionen.	Schneider.	Wien.	Auge, das Aufrechterstehen bey umgekehrter Abpiegelung darin.	Bartels.	Breslau.
Arterien, ihre Activität.	Ritgen.	Wien.	Auge, schwebende Flecke in demselben.	Neuber.	Hamburg.
Arterien system der Vögel, Beobachtungen über Erweiterungen im —.	Barlow.	Breslau.	Augenentzündung (contagiöse).	Wirth.	Bonn.
Arum dracunculus, Wärmeentwicklung in seinen Blüten.	Göppert.	Jena.	Augenkrankheit, wobei d. Linse in Folge eines Stosses auf das Auge sich lostrennte, in die vordere Augenkammer trat und über zwey Jahre ihre Durchsichtigkeit behielt.	Cammerer.	Stuttgart.
Athyneven, die gegenwärtige Nomenclatur derselben.	Lichtenstädt.	Berlin.	Augenkrankheiten, mehrere seltene Formen davon.	Sömmerring.	Bonn.
Arzneymittel (einige neue).	Kopp.	Heidelberg.	Augenkrankheiten, Erzählung mehrerer interessanter Fälle davon.	Abels und Jäger.	Stuttgart.
Arzneymittel, Verfälschung derselben, namentlich von Castoreum sibiricum.	Brandes.	Jena.	Augenphantome (bewegliche), ihre Nothwendigkeit zur Uebung in den Augenoperationen, und Bemerkungen über ein solches, unter seiner Leitung vom Prager Techniker Boschel verfertigtes —.	Fischer.	Prag.
Arzneymittel, Nothwendigkeit, die Wirkungsart ders. zu unterf.	Wedekind.	Heidelberg.	Augenübel (neues), vom Vortragenden Ptosis seu strabismus alternans genannt.	Herrmann.	Stuttgart.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Auscultation, die durch Fieber in der Erkenntniß der Herzkrankheiten veranlaßten Irrthümer.	Messerschm.	Jena.	Basaltgang, auf der Grube alte Birke bey Siegen, mit Vortiegung von charakteristischen Stufen und einer geognostischen Karte der Gegend um Siegen.	Schmidt.	Bonn.
Ausführungsgänge, ihr Ursprung aus den Absonderungsdrüsen.	Münz.	Dresden.	Basarde vom Löwenmännchen u. Tigernweibchen, die in der Menagerie des Polito mehrmals vorkamen.	Froriep.	Breslau.
Automatum hydraulicum.	v. Häberl.	Stuttgart.	Basardpflanzen.	Lehmann und Gärtner.	Hamburg.
Azolla microphylla Kaulfuss.	Martius.	Stuttgart.	Basardpfl., Ergebnisse von Versuchen über Erzeugung derselben.	Gärtner.	Heidelberg.
<b>B.</b>			Baumstämme (aufrechtstehende) in Steinkohlenbergwerken Böhmens.	Graf von Sternberg.	Stuttgart.
Baaden, physisch-chemische Untersuchungen der Heilquelle daselbst.	Specz.	Wien.	Becken (weibliche), eine besondere Art fehlerhaft gebildeter —.	Nägele.	Stuttgart.
Bad Scliatzher in Ungarn, seine eigenthümlichen Wirkungen.	Mossnowicz.	Wien.	Becken, das gleichmäßig zu kleine weibliche —.	Nägele.	Heidelberg.
Bäder (weingeistige).	Hempel.	Wien.	Beckenformen, einige sehr seltene rhachitische und malakische —.	Otto.	Prag.
Bäder, sehr einfache und sinnreiche Vorrichtung derselben.	Wirer.	Wien.	Bemerkungen zur Erklärung der Verlängerung des Schenkels in der ersten Zeit des freiwilligen Hinkens.	Weber.	Bonn.
Bänder, ihre Ordnung an den Schalen mehrerer Landschnecken.	v. Martens.	Stuttgart.	Beobachtungen (einige sehr interessante chirurgische).	Seetig.	Breslau.
Bäume (einige zweifelhafte) Herobots in Süd- und Ost-Ausland, und über das Pfeilgift der Coanen im Kaufasus nach Strabo.	Eichwald.	Breslau.	Beobachtungen (mehrere chemische und meteorologische).	Kastner.	Würzburg.
Bäume, ihr Nichtgefrieren im Winter.	Reum.	Stuttgart.	Beobachtungen (barometrische) und Messungen von mehreren vereinten Physikern an vielen Orten von Deutschland zugleich unternommen.	Desfeld.	Berlin.
Balbriansäure und balbriansaure Bittererde.	Kastner.	Stuttgart.	Beobachtungen (meteorolog.).	Neuber.	Hamburg.
Balsaminacearum flores et affinitates.	Röper.	Stuttgart.	ditto ditto.	v. Littrow.	Jena.
Baridius chloris, dessen Naturgeschichte.	Pleninger.	Jena.	Beobachtungsstationen (physikalische) zwischen 38° und 40° NB. über die asiatischen Hochebenen, über die Höhe des caspischen Meeres usw.	v. Humboldt.	Jena.
Barometer, die vorzüglichste Construction derselben, wobei der Vortheil des Ausschleifens anerkannt wird.	Mauch.	Bonn.	Berberin.	Buchner.	Stuttgart.
Barometer, dessen unregelmäßige Schwankungen und Zusammenhang der letztern mit den Schwankungen der Magnetnadel.	Kämz.	Heidelberg.	Berberis aethensis Presl und B. vulgaris, deren Unterschiede.	Mikan.	Wien.
Barometer- und Thermometerbeobachtungen, durch das ganze J. 1827 stündlich angestellt.	Brandes.	Heidelberg.	Berberiswurzel, Verflüchtigungsfähigkeit des Ätherstoffs derselben.	Buchner.	Prag.
Barometerhöhen (mittlere) unter verschiedenen Breitengraden.	Munke.	Jena.	Bergcrystalle (gewundene).	Weiß.	Jena.
Barometerstände, ihre Maxima und Minima.	Felbt.	Breslau.	Bernsteinsäure, Resultate von Untersuchungen derselben, nebst Vortiegung mehrer daraus gewonnener Salze.	Dulk.	Jena.
Baryta muriatica, Anwendung und Wirksamkeit derselben.	Kölreuter.	Stuttgart.	Beugungsphänomene, welche man mit Fernröhren und mit unbewaffnetem Auge durch Gitter von beliebiger Form sieht. Entdeckte Theorie derselben.	Schwerb.	Stuttgart.
Basalt (kugelförmig) und andere Absonderungen in demselben.	v. Klipstein.	Berlin.			
Basalt am Pechsteintopf in Rheinbaiern.	Rapp.	Stuttgart.			
Basalt und Phonolithausbrüche im Högau.	Uthaus.	Stuttgart.			

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Viber (böhmischer) und die Viber-colonien k. Krummiau in Böhmen. Viotomie (anthropologische).	Rahler.	Prag.	Blepharoplastik.	Muser und Gollcher.	Bonn. Wien.
Wittermandelwasser, Versuche über die Zubereitung und Zusammenfetzung desselben.	Butte.	Heidelberg.	Blindheit, ob und wie selbe durch den Genuß von heißem Reiz bedingt werden könne.	Zeune.	
Wlädchen (das Baerische).	Winkler.	Stuttgard.	Bligableiter, Aphorismen zur Theorie und Praxis desselben.	Nürnberger.	Heidelberg.
Wlätter, ihr Abfallen bey Monocotyledonen.	Ezernak.	Wien.	Bligfiguren, Erklärung derselben an dem Leibe eines vom Blitze getroffenen Menschen.	Hohl.	Berlin.
Wlätter (gequirlte), die als Einheit figuriren.	Presl.	Breslau.	Bliskrad, ein Apparat, der sich vorzüglich zu electromagnetischen, so wie auch zu physiologischen Beobachtungen eignet.	Neff.	Bonn.
Wlätter, die Geseze des Standes und derstellungsperiode derselben.	Schimper.	Heidelberg.	Bliskrohren, bey Augustdorf in der Sennhaide gefunden.	Brandes.	Hamburg.
Wlätter schwämme, Verzeichniß und Beschreibung der in den Karpathen vorkommenden —, nebst Bemerkungen über Dentaria glandulosa.	Schimper.	Heidelberg.	Blischlag, wodurch ein eiserner Mörtel in einen Magnet verwandelt wurde.	Baumgartner.	Wien.
Wlaserhalsentzündung (Geschichte einer).	Rump.	Breslau.	Blüthen (fossile), Geschichte ihrer Auffindung.	Göppert.	Fena.
Wlaserstein, ihr Einfluß auf die Urinblase.	Heine.	Bonn.	Blüthen, ihre Architectonik.	Martius.	München.
Wlasersteine und ein Fall, wo die Lithotritie nicht gelang.	Ludwig.	Stuttgard.	Blüthenschwämme, Beschreibung der karpathischen — im Zipser Comitate.	Rumy.	Breslau.
Wlasersteine, ihre Entstehungsweise.	Ehmann.	Stuttgard.	Blüthentheile, deren Stellungenverhältnisse.	Braun.	Heidelberg.
Wlaser- und Nierensteine, Genesis derselben.	Rämpold.	Stuttgard.	Blumen, ihre Architectonik.	Martius.	Berlin.
Wlatta germanica, ein in dessen Leibe vorkommender parasitischer Käfer.	Hennemann.	Stuttgard.	— ihre Farben.	Marquart.	Bonn.
Wlattern (Menschen- u. Schuz-), Resultate von Beobachtungen derselben.	Sundewall.	Hamburg.	— — — (semifosculöse), Entstehen derselben bey den Synantheceren aus den Tubulösen.	Diétrich.	Fena. Wien.
Wlattfland, Geseze desselben und derstellungsperiode der Wlätter.	Ebers.	Breslau.	Blumenfarben, ihre Erhaltung.	Buch.	
Wlattstellung, Möglichkeit eines wissenschaftl. Verständnisses derselben.	Schimper.	Heidelberg.	Blumensöcke, chemisches Verhalten derselben.	Hünefeld.	Bonn. Hamburg.
Wlauseure, Campher und narcotische Gifte, deren Einwirkung auf die Vegetation.	Schimper.	Stuttgard.	Blut, Versuche, die Verschiedenheit desselben bey Thieren mittelst des Geruchsinnes zu erkennen.	Runge.	
Wlei, seine Ausdehnung durch Wärme.	Göppert.	Berlin.	Blut, neueste Versuche in Bezug auf den Kohlenäuregehalt desselb.	Jennek.	Heidelberg.
Wleikruste aus einem englischen Bleischmelzofen, mit eigenthümlicher regenbogenartiger Farbenerscheinung.	W. Wonsdorff.	Prag.	Blut des Menschen und der rothblütigen Thiere.	Wischhoff.	Prag.
Wleiorpb (schwefelsaures).	Seller.		Blutcirculation, naturphilosophische Bedeutung derselben.	Heller.	Prag.
Wleiorpb (bassigsaures) u. Wleiorpbhydrat, deren merkwürdige Reaction auf den Terpentin.	Wittenpi.	Wien.	Blutegel, Augen desselben.	Wittenpi.	Wien.
Wleiorpbhydrat, als Prüfungsmittel auf eine sehr geringe Menge von Kohlenäure.	Siemsen.	Hamburg.	— Feinde derselben.	Weber.	Dresden.
Wleivergiftung (akute u. chronische).	Wackenroder.	Fena.	— deren innere und äußere Unterschiede, besonders der des Saugorgans.	Kohde.	Prag.
	Brandes.	Prag.	Blutegel (die auf die Bewegung sich beziehenden Instincte, in den beyden Hälften eines in seiner Mitte querdurchschnittenen).	Fischer.	Wien.
	v. Wonsdorff.	Prag.	Blutegeltheile, deren Anlage.		
	Sachs.	Fena.	Blutentleerungen (allgemeine), der in unserer Zeit stattfindende	Harles.	Prag. Berlin.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Mißbrauch der antiphlogistischen Methode.			Branntwein, dessen Entfäulung.	Cassebeer.	Frankfurt.
Butterergüsse im Gehirn.	Romberg.	Berlin.	Branntweinbrennerei, neu erfundene Apparat dazu.	Becker.	Frankfurt.
Butterförner, ihre Bedeutung.	Steifensand.	Bonn.	Brod, im Torfmoor Schönonens gefunden, dessen Substanz in der Zeit von 80 Jahren eine vollkommene Veränderung, namentlich in Braunfäule, Harz und etwas Wachs, erlitten hatte.	Hünefeld.	Bonn.
Butter als Mittel zur Polirtur des Stahles.	Engelbrecht.	Dresden.	Brom.	Jos.	Wien.
Blutumlauf in Insectenlarven.	Carus.	Dresden.	Brom, sein Vorkommen und Abstammen.	Hermstadt.	München.
Blutungen (gefährliche) neu Entbundener, zwey bewährte Mittel dabey.	Mappes.	Stuttgart.	Bromgehalt der Greifswalder Saline.	Hünefeld.	Berlin.
Boa anaconda, stattgefundene Ausbrütung von 5 Eiern ders.	v. Froberg.	Stuttgart.	Bromiden.	v. Bunsdorff.	Hamburg.
Bobenfee, Klippen darinn theilweise eingeschlossenen Palubinen.	Rossmäßler.	Prag.	Büche, das Reponiren derselben.	Friz.	Prag.
Böhmern, dessen Darstellung auf den neuen geognostischen Charten.	Zippe.	Breslau.	Buch (eingeklemmter) Naturheilung derselben.	Wolff.	Hamburg.
Böhmern, Erläuterungen und Bemerkungen zu einer geognostischen Charta eines Theils des süblichen und mittleren —.	Mayer.	Prag.	Buchmesser.	Seiler.	Dresden.
Böhmern, dessen Bevölkerungsverhältnisse vor und nach der Einführung der Vaccination.	Stelzig.	Prag.	Bunnen (artefische), neue Methode zur Bohrung derselben.	Hammer-	Zena.
Böhmern, eigene geognost. Charta von —.	Zippe.	Prag.	Bunnen (artefischer) in Breslau, physikalische und geognostische Bemerkungen über ihn.	schmidt.	Stuttgart.
Böhmern, dessen Vegetationsverhältnisse.	Dpis.	Prag.	Bu st (weibliche carcinomatöse) eigenthümliche Entartung derselben.	Böneck.	Hamburg.
Borversuche auf Wasser, Resultate derselben in den verschiedenen Gebirgsformationen Bärtembergs.	Pleninger.	Zena.	Bu st der Fische, ob es eine gibt, und was insbesondere von den sogenannten Zungenbeinknochen der Fische, so wie von ihren Zungenknochen zu halten ist?	Wilbrand.	Prag.
Bos primigenius, Unterschiede dieses Thieres von anderen Gattungen.	Fremery.	Heidelberg.	Bu stwarzen, Mittel gegen das Wundseyn derselben.	Mappes.	Stuttgart.
Botanicus, Nomenclator.	Dpis.	Prag.	Bryopsidum fructificatio.	Meneghini.	Prag.
Botanik, ästhetische Behandlung derselben.	Trattinnik.	Wien.	Buche, deren verschiedener Abtrieb zur Beförderung des Wiederaus- schlages.	Wiedemann.	Zena.
Botanische Gärten im Allgemeinen und deren Verwaltung insbesondere.	Rhauer.	Breslau.	Buchenholztheerparaffin, Bereitung derselben aus andern Substanzen.	Reichenbach a. Bl.	Wien.
Botanische Jahresberichte (die von Reil schmied aus dem Schwedischen überfetzt und mit vielen Zusätzen herausgegebenen).	Reil schmied.	Prag.	Budoblätter.	Regius.	Breslau.
Botrylli, Pyrosomata und einen Theil der Ascid. compos. Savigny.	Xilefus.	Stuttgart.	Buprestis mariana.	Hammer- u. Leonhard.	Heidelberg.
Branntwein, Einfluß desselben auf Gesundheit, Glück und Moralität.	Chaufepié.	Prag.	Burgen (verglaste) in Schottland.		
Branntwein, dessen Anwendung gegen die Drehkrankheit der Schafe.	Reichmann.	Zena.			
Branntwein, dessen Entfäulung durch Rectification über Manganhyperoxyd.	Jos.	Wien.			

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Calamiten.	Germar.	Prag.	Charen, Arbeiten des Referenten, dieselben betreffend.	Braun.	Stuttgart.
Calamoherbe brehmii, als neuer Vogel aus der Familie der Schiffslänger.	Müller.	Wien.	Charten, Versuche über Abhilfe der Fehler bey dem Abdrucke derselben durch Verschiebung des Papiers.	Lohse.	Hamburg.
Cali (chromsaures), Gebrauch derselben.	Jacobson.	Breslau.	Chemie, mehrere Gegenstände aus derselb. in gedrängter Darstellung.	Hünefeld.	Bonn.
Calomel, Methode, denselben auf eine leichte Art zu lävigieren.	Loß.	Prag.	Chermes abietis, Zerstörungen der Nadelholzgattungen dadurch.	Reichenbach a. St.	Jena.
Calomel, Vorzug großer Dosen des — in Gastroenteritis.	Wolff.	Breslau.	Chiloplastik, an der Unterlippe vorgenommen.	Terzer.	München.
Calosoma sycophanta, eine Mißbildung an derselben.	Graf Rüdenburg.	Prag.	Chimborasso, zwey Besteigungen desselben.	v. Humboldt.	Jena.
Canal (ein im Glaskörper aufgefunden), welcher die Arterie und Vene des Glaskörpers zu ihrem Bestimmungsorte geleitet.	Berres.	Prag.	Chinabarz aus der Mutterlauge des Chinin, dessen Brauchbarkeit.	Plagge.	Hamburg.
Cantharidin, neue Methode — zu bereiten.	Nardo.	Wien.	Chinarinde (ächte).	Winkler.	Stuttgart.
Canthariden und ihre Wirkungen auf den lebenden Organismus.	Nardo.	Breslau.	Chinasäure (crystallisierte) und chinasaurer Kalk, dessen Bereitung.	Maier.	Heidelberg.
Carica papaya und Papayaceen.	Reichenbach.	Prag.	Chironia centaurium, neue aus dem frischen Kraute davon erhaltene Substanz.	Buchner.	Bonn.
Carotidenrüse einiger Lurche.	Leuckart.	Heidelberg.	Chlor, Brom und Jod, Verfahren, diese Körper von einander zu trennen.	Osann.	Jena.
Caryophyllin.	Martius.	Stuttgart.	Chlor und Chlorwasser, Reaction, welche selbe ohne Anwendung von Wärme auf Chinin hervorbringen.	Brandes.	Prag.
Cassini'sche Mittagsslinie im Marmorale zu Carlsruhe; dermalige Abweichung der Magnetnadel und Länge des Carlsruher Secundenpendels.	Wucherer.	Heidelberg.	Chlor, Jod, Brom, Säuren und Alkalien, deren Einwirkung auf das Keimen der Samen.	Göppert.	Breslau.
Casuiſtik (medizinische), interessante Erzählungen aus ihrem Gebiete.	Brodowicz.	Wien.	Chloraluminium, Beobachtungen über dasselbe.	v. Bonsdorff.	Wien.
Causticum hahnemanni.	Buchner.	Jena.	Chlorkalk, dessen Eigenschaften und Verhalten des Chlors zu den Hydraten der Metalloxyde.	Dingler.	München.
Cephalhaematom, Heilart derselben.	Schneemann.	Bonn.	Cholera, ihre Wesen, Ursachen u. Therapie.	Brodowicz.	Wien.
Cephalopodon, neues Genus derselb., Belemnosepia genannt.	Buckland.	Bonn.	Cholera, Beyträge zur Erkenntniß derselben.	v. Holzer.	Wien.
Cercopithecus, der dem Dickdarm eines grasfressenden Thieres ähnlich gebaute Magen bey dieser Art von Affen.	Otto.	Stuttgart.	Cholera u. Blatterimpfung.	Renner.	Wien.
Chalcodon.	Fuchs.	Stuttgart.	Cholera, Behandlung derselben durch Brechmittel.	Storz.	Wien.
Chalcodon (geschliffener) von Oberstein mit einem räthselhaften Einschluß.	Nöggerath.	Prag.	Cholera, des Referenten Heilverfahren während derselben im Choleraſpitale zu Wien.	Kaiser.	Wien.
Chalcodone (geschliffene) und Bergcrystalle mit Einschläffen von Denndrüsen und Flechten.	Nees.	Breslau.	Cholera, ihre Definition und Heilmethode.	Grahl.	Wien.
Chamaeleon, die wolkenähnliche Farbenveränderung desselben.	v. Esenbeck.	Stuttgart.	Cholera, Entwicklung der angezeigten Momente des Ueberlaffes bey dieser Krankheit.	Berres.	Wien.
Chamaeleon, die gleichweise vor sich gehende Häutung desselben und die Umstände, die auf die Farbenänderung desselben Einfluß nehmen.	Strauß-Dürkheim.	Stuttgart.	Cholera, vergleichende Darstellung derselben mit der ägyptischen Augenentzündung.	Jäger.	Wien.
Champagnerflaschen, Verbesserung der Stöpsel auf denselben.	v. Frozier.	Stuttgart.			
	Salzer und Kastner.	Stuttgart.			



Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Cholera, gute Wirkung der Pflische in den Epidämien zu Edinburgh in dieser Krankheit.	Schiel.	Breslau.	Circularpolarisation, Versuche derselben durch Druck und Wärme.	Dove.	Jena.
Cholera, Vorschlag den Regierungen, Mittel zu finden, durch welche dem Verbreiten dieser Pest Grenzen gesetzt werden könnten.	Harles.	Hamburg.	Circulation der Säfte, Erklärung derselben bey der Pflanze.	Corba.	Prag.
Cholera, einige Notizen darüber.	Frankl.	Prag.	Conservirung menschlicher und thierischer Körper, Resultate seiner angestellten Versuche darüber nach der von Gannal empfohlenen Methode.	Otto.	Prag.
Cholerae disquisitio medica, cujus mentio in sacris bibliis occurrit.	Wawruch.	Wien.	Contactelectricität, ein Versuch damit.	Schweigger.	Halle.
Cholerae larvatae Monographia pandemiae.	Barbowski.	Breslau.	Contagien, Vergleichung der Fortpflanzungsweise derselben mit jener der Pflanzensamen, nebst einigen für die Heilkunst daraus gezogenen Resultaten.	Hopf.	Heidelberg.
Choleraepidemie, Schilderung der — die am 24. May 1837 in Breslau ausbrach.	Wendt.	Prag.	Contraction des Uterus, während derselben ist keine Pulsation weder an der Nabelschnur, noch an der Radialarterie wahrzunehmen.	b' Dutrepoint.	Würzburg.
Choleraeileichen, sind die an denselben beobachteten, mit einer weißen Flüssigkeit gefüllten bisweilen durchsichtigen Bläschen in der Schleimhaut der Gedärme als krankhafte Veränderungen der Drüsen, oder als ein durch die Krankheit hervorgerufenes Eranthem zu betrachten?	Harles.	Wien.	Cornea, die von Schlemm entdeckten Nerven derselben.	Bochdalek.	Prag.
Cholerahospitaler zu Edinburgh und London; daß die Kranken daselbst einen lebhaften Appetit nach Pflischen gezeigt und nach deren Genuß sich einer gänglichen Genesung erfreut hätten; als Wirkung des Antheils von Salzsäure und Kampher, den die Pflische enthalten.	Schiel.	Breslau.	Cortex adstringens brasilienensis, Analyse desselben.	v. Holger.	Hamburg.
Cholesterin, dessen Gewinnung aus Thierthier, nebst Vorlegung eines neuen, durch Destillation trockener organischer Körper bereiteten Körpers.	Reichenbach a. Bl.	Stuttgard.	Cosmoglobus, Erklärung des geschichtlichen und der Construction seines —.	Garthe.	Bonn.
Choroidea, eine Eigenthümlichkeit ders. im menschl. Fötusauge.	Ammon.	Berlin.	Coralgie.	Wattmann.	Wien.
Choroideaaldrüsen im Auge der Fische; Gestalt, Farbe und Zahl derselben.	Ritterich.	Jena.	Eretinen, Genitalsystem derselben.	Friedrich.	München.
Chromsäure und jene Verbindungen, in denen sie flüchtig erscheint.	Rose.	Wien.	Eretinen oder Eren, deren Vorkommen im Salzburgischen, und über die Bedingungen, unter welchen sie vorkommen.	b' Dutrepoint.	Frankfurt.
Chromsäure, Weinburgs —.	Tos.	Wien.	Eretinismus.	Keyserlingk.	München.
Chrysanthemum indicum, seine Geschichte, Bestimmung u. Pflanze.	Rupprecht.	Breslau.	Erinoideen aus den Uebergangskalk.	Fuchs.	Bonn.
Cimiciden, Eintheilung derselben in Familien nach dem Flügelripenverlauf.	Fieber.	Prag.	Eroup.	Goldfuß.	Stuttgard.
Cinchonin, Erfahrung über die Anwendung desselben.	Müser.	Berlin.	Eroup, merkwürdiger Fall davon.	Hegewisch.	Hamburg.
Cinnamomum malabathrum.	Batka.	Breslau.	Eryptogamische Gewächse Deutschlands.	Geymann.	Heidelberg.
			Eryptalle (rechts und links gewundene), ein Unterscheidungs mittel derselben.	Reichenbach.	Prag.
			Eryptalle, kalkartige, sechsseitige, doppelt zugespitzte, woraus der freidenartige Brey am Säckchen des Labyrinth der Frösche besteht.	Dove.	Jena.
			Eryptalle, regelmässige, Verwachsungen derselben von zwey und drey Mineralspecies.	Carus.	Breslau.
			Eryptalle mit verschiedenen Aeren, Einfluß der Wärme auf deren ungleiche Ausdehnung.	Breithaupt.	Prag.
				Mitscherlich.	Jena.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Crystallformen der Kupferlasur.	Zippe.	Heidelberg.	Climatologische Untersuchungen, deren Wichtigkeit und Vertheilung der Regenmenge in Europa.	Rämig.	Heidelberg.
Crystallisation, Begünstigung derselben von Salzen durch eine elastische Unterlage.	Hünefeld.	Breslau.	Clinik, nothwendiges Bedürfnis derselben für Gehörkrankheiten.	Harleß.	Wien.
Crystallisationen, Methode selbe durch den Electrometer zu erhalten.	Döbereiner.	Jena.	Coccinella septempunctata, Resultate von des Referenten Analyse derselben.	Wiel.	Jena.
Crystallographie nach einer neuen Methode.	Quenstädt.	Prag.	Cocosnuß, Beiträge zur chemischen Kenntniß derselben.	Brandes.	Heidelberg.
Crystallographische specielle Gegenstände.	Weiß.	Stuttgart.	Codrin, Analyse derselben.	Gregory.	Bonn.
Crystallologie, einige Beziehungen derselben zur Chemie.	Frankenheim.	Prag.	Codium-Acten, Characteristika der in der Gegend von Triest vorkommenden —.	Diafoletto.	Breslau.
Crystallsystem (pyramidales), verschiedene hemiedrische Abstufungen derselben.	Zippe.	Wien.	Cohäsion der Körper.	Frankenheim.	Breslau.
Crystallsystem (rhombisches), Darstellung desselben.	Breithaupt.	München.	Coloboma iridis.	Heufelder.	Stuttgart.
Crystallsysteme (neue).	Breithaupt.	Heidelberg.	Coloboma iridis beyder Augen, ein ausgezeichneter Fall davon an einem 7 jährigen Mädchen.	Pieninger.	Stuttgart.
Eucurbitaceen.	Fenzl.	Jena.	Comatula, Mittheilung brieflicher Notizen des Prof. Leuckart.	v. Froiep.	Jena.
Eulturpflanzen, zweckmäßigste Eintheilung derselben und Art, wie die Kartoffeln verbessert werden können.	Reum.	Jena.	Comet (der Hallensche).	Voguslanofsky.	Bonn u. Bresl.
Evanmetalle.	Rammelsberg.	Prag.	Comet vom J. 1770, daß er im J. 1770 vom Jupiter verschlungen wurde.	Gruthuisen.	Donn.
Evanssäure, neue Analyse derselben.	Liebig.	Frankfurt.	Cometen, ihre Lichtstärke und die Wichtigkeit, bey deren Beobachtung die jedesmalige Entfernung von der Sonne und Erde zu berücksichtigen.	Littrow.	Breslau.
Evanose, Erzählung von Fällen derselben, nebst Vorzeigung eines solchen Herzens.	Kußt, Türkheim, Köhler.	Breslau.	Cometenkerne, ihre scheinbare Durchsichtigkeit, welche nicht selten Firsterne verschiedener Größe mit ungeschwächtem Lichte durchschimmern lassen.	Doppler.	Prag.
Cyanosis.	Heufelder.	Stuttgart.	Compensation der Tonhöhe zusammenschwingender Körper.	Weber.	Berlin.
Cyanosis, Eintheilung derselben.	Remer.	Breslau.	Concremente (Steine) deren Erzeugung.	Wendt.	Berlin.
Cyperaceenblüthe.	Kunth.	Jena.	Conserven, Beobachtungen über die leichteste Methode, sie unmittelbar aus den reifen Moossamen darzustellen.	Cassebeer.	Frankfurt.
Cyprinus uranoscopus, neue Art davon.	Agassiz.	Berlin.			
Cysticereus cellulosa im menschlichen Auge.	Sömmering.	Heidelberg.			
* Civilisation, Notizen über die Fortschritte in der — und in der Naturgeschichte des Menschengeschlechtes; über gewisse neue Ansichten in der Classification der Sprachen.	v. Beke.	Stuttgart.			
Classification der indifferenten stickstoffreichen organischen Bestandtheile.	Dulk.	Jena.			
Climatologische Geometrie, Zusammenhang der anthropologischen Biotomie mit dem nach ihr aufzustellenden neuen Systeme derselben.	Butte.	Heidelberg.			

\* Nach Circulation auf S. 880 einzuschalten; ein zu spät entdecktes Versehen im Manuscript.

Jhs 1838. Heft 12.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Dampfkochungsapparat, Erklärung eines —.	Wackenrober.	Jena.	mit Dr. Kaup gemeinschaftlichen Abhandlung über dasselbe.		
Dampfgeschiffe, Ausführung ihrer, (Erfindung von dem Referenten, wobei er Vortheile der Geschwindigkeit und eines willkürlichen vertikalen und horizontalen Fluges, mit jenem der Größe und praktischen Anwendbarkeit der Geschiffe vereinigen zu können hofft.	Wente.	Prag.	Dinothierium giganteum.	Kaup.	Prag.
Dampfmaschine, Demonstration und Vorlegung eines Modells einer in Bewegung gesetzten —, von hohem Drucke mit doppelt durchbohrtem Hahne.	Suckow.	Jena.	Diorit von Wernsdorf in Mähren und das Vorkommen von Pistazit mit Granaten im Glimmerschiefer bey Petersdorf.	Stocker.	Stuttgart.
Dampfmaschinen, Beratungen der Section über —.		Bonn.	Diorit von Rattowitz in Oberschlesien.	Zeuschner.	Prag.
Darmstich bey der Windstik der Pferde.	Hamme.	Prag.	Discozoides, vom Hofe. Weigel übernommene Bearbeitung desselb.	Böttiger.	Dresden.
Darmzotten, Bau derselben u. die darin vorkommenden Gefäße.	Seiler.	Dresden.	Dipteren, Würtembergische — Verzeichniß davon.	v. Roser.	Stuttgart.
Decidua reflexa.	v. Frociop.	Wien.	Dipus, Auszug aus seiner Anatomie dieses Geschlechtes.	Detto.	Dresden.
Deflagrator (neuer), Beschreibung eines solchen oder einfachen galvanischen Elementes.	Spann.	Bonn.	Dolomite, Mittheilung seiner Entscheidung über das Vorkommen desselb. in den Kalkbergen bey Toulon.	Buch.	Frankf. a. M.
Delirium, Unterschiede desselben.	Heinroth.	Jena.	Dolomite aus der Gegend von Gelnhausen.	Keserstein.	Frankfurt.
Delirium tremens, Behandlung durch Digitalis purpurea.	Clef.	Stuttgart.	Dornfortsatz (beweglicher), an der Wirbelsäule mehrerer Säugethiere.	Schulze.	Jena.
Delphine, Bau ihres Magens.	Detto.	Wien.	Dotter sack, dessen Lage in der Nähe des Trichters bey Dmophoteuthis.	Carus.	Jena.
Deplacierungsmethode, deren Vortheile bey Bereitung officineller Extracte.	Brandes.	Jena.	Drogen-Preise, Resultate derselben von 1818 - 1830.	v. Bergen.	Hamburg.
Destillation organischer Körper, Beiträge zur nähern Kenntniß der trocknen —.	Reichenbach.	Breslau.	Drüsen (Peyer'sche), Bildung u. Anordnung derselben in den verschiedenen Altersperioden.	Fohmann.	Heidelberg.
Dentaria glandulosa aus den Karpathen.	Rümpy.	Breslau.	Drüsen, innere Bildung ders. bey den unterschiedenen Thierformen.	Müller.	Berlin.
Deutschland, Betrachtungen über die Bestimmung der Gränzen von Nord- und Süd —.	Julius und Feune.	Breslau.	Drüsen (die Peyer'schen u. Brunner'schen).	Ezerma.	Wien.
Diabetes mellitus.	Wendt.	Heidelberg.	Dünger (animalischer), Verwendungs- und Behandlung desselben.	Simons.	Bonn.
Digitalis, Bemerkung, daß ein Aufguss von selber nach einiger Zeit eine dickliche Beschaffenheit annimmt, wenn derselben eine Auflösung von essigsaurem Kali zugesetzt wird.	Berndt.	Prag.			
Diluvium und Alluvium, Nachweisung des aus theologischen Ansichten in England entsprungenen Mißbrauchs dieser Ausdrücke.	Graf v. Sternberg.	Heidelberg.	<b>C.</b>		
Dinothierium giganteum, Beschreibung desselben.	Kaup.	Berlin.	Ebbe und Fluth.	Wilbrand.	Hamburg.
Dinothierium gigant., nachträgliche Bemerkungen zu seiner	v. Klipfein.	Prag.	Echinodermen, über die innere Organisation derselben.	Leuckart.	Heidelberg.
			Echium, aus d. Umgebung Prag's.	Fieber.	Prag.
			Eelkreis, Einfluß des Mutterstammes auf dasselbe.	Läger.	Prag.
			Eichen, vorzugsweises Einschlagen des Blüthes darein.	Hornemann.	Berlin.
			Eingeweide des Menschen, Regelmäßigkeit der Lage derselben.	Münz.	Dresden.
			Einwurzeln parasitischer Pflanzen auf der Mutterpflanze.	Unger.	Wien.
			Eisenorybul, deren neue Verbindungen desselben mit Wasser.	v. Wonsdorff.	Bonn.
			Eisenorybul (schwefelsaures), Verbindung desselben mit Wasser.	v. Wonsdorff.	Prag.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Electricität, Entwicklung derselben in Menschen.	Rehmann.	Berlin.	Emberiza, Monographie dieses Genus.	v. Nordmann.	Hamburg.
Electricität (galvanische), chemische Wirkung derselben.	Fischer aus Breslau.	Berlin.	Embryo der Mistel.	Treviranus.	Bonn.
Electricität, deren Einfluß auf Bildung der Crystalle.	Groß.	Genä.	Embryonen, Ergebnisse der microscopischen Untersuchungen an denselben.	Arnold.	Stuttgart.
Electricität, durch Wärme in Glas, Thon, Eis usw. hervorgerufen.	Münke.	Hamburg.	Emser-Wasser von Struve künstlich bereitet, dessen Wirksamkeit bey scrophulösen Krankheiten.	Reich.	Halle.
Electricität, welche beim Contacte organischer Körper entwickelt wird.	Kämpf.	Heidelberg.	Entdeckung eines neuen Stoffes bey Zerlegung der Dipsacus fullo-nium.	Runge.	Berlin.
Electricitäten (gleichnamige), Falschheit des von den Physikern aufgestellten Naturgesetzes, daß dieselbe, so wie die gleichnamigen magnetischen Pole, sich vermöge einer, ihnen von Natur eigenen dynamischen Kraft gleichsam feindlich abstoßen sollen.	Messerschmidt.	Prag.	Entdeckungen Rüppells, sein Lebenslauf und seine Reisen im östlichen Africa.	Greifschmar.	Frankfurt.
Electricitäts-erregung durch Berührung, wahrscheinl. Ursache ders. u. der electricischen Spannung.	Doppler.	Prag.	Enthelminthologie (europäische), Beobachtungen aus dem Gebiete derselben.	Hammer-schmidt.	Genä.
Electricischer Funken, Versuche über die Natur derselben.	Spann.	Prag.	Entomologen (europäische), Verzeichniß derselben.	Gistl.	Stuttgart.
Electricischer Körper, Wirkung eines solchen auf einen mit Electrometern versehenen Leiter.	Pfaff.	Hamburg.	Entomologie, Nutzen und Nothwendigkeit eines Journals dafür in Deutschland.	Gernar.	Prag.
Electricischer Strom, der durch ein Paar von Bismuth und Antimon geht, und Kälte oder Wärme erzeugt. Bemerkung über diese Entdeckung Voltiers.	Reeff.	Stuttgart.	Entozoon (ein eigenes), aus dem letzten Darmstücke der Rana temporaria.	Purkinje.	Breslau.
Electromagnetischer Apparat des Referenten.	Ettingshausen.	Prag.	Entzündung.	Ritgen.	Halle.
Electromagnetischer Apparat, Erklärung des vom Referenten construirten.	Hefler.	Prag.	Entzündungen, was von asthenischen, typhösen, venösen und nervösen zu halten sey?	Stiebel.	Frankfurt.
Electromagnetische Drehungen.	Schweigger.	München.	Epidemia, la tellurica dominante, cenni intorno allo stato attuale di essa.	Steer.	Breslau.
Electriche Erscheinungen bey Explosionen einiger Knallfäße.	Schweigger.	München.	Epidemie (eine der Cholera ähnliche) unter dem zahmen Geflügel.	Petenyi.	Wien.
Electromagnetische und magneto-electrische Erscheinungen und Rotation eines Magnetes um seine Ase unter dem Einflusse eines electromagnetischen Stromes.	Schweigger.	Prag.	Epidermis (menschliche), Beobachtungen über die speciellen Schweißcanäle derselben.	Purkinje.	Breslau.
Electromagnetische Untersuchungen.	Gilbert.	Leipzig.	Epispastische Mittel, deren Natur und Wirksamkeit.	Nardo.	Breslau.
Electromagnetische Wirkungen gleichartiger Theile eines Metalles bey ungleichzeitiger Berührung mit einer chemisch einwirkenden Flüssigkeit.	Wohlar.	Heidelberg.	Epithelium bey Thieren.	Wien.	Wien.
Elephanten, fossile.	Fischer.	Hamburg.	Equisetum, dess. Beschränkung.	Lehmann.	Hamburg.
Elephantiasis auf der Haut und dem Auge.	v. Froberg.	Heidelberg.	Erbsen, deren Keimung in ganz verschlossenen Gefäßen, ohne Zutritt der Luft, mit sehr wenig destillirtem Wasser.	Pöniz.	Berlin.
			Erdball und Weltkörper, deren Leben.	Wagner.	Berlin.
			Erdbeben, Geseze bey der Verbreitung der Wirkungen derselben.	Nöggerath.	Berlin.
			Erdbeben, durch welche besonders die Stadt Komorn in Ungarn und deren Umgebungen öfters beunruhigt werden.	Raun.	Halle.
			Erdbeben, Beschreibung des letzten in Basel.	Merian.	Stuttgart.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Erde, Untersuchungen im Innern derselben.	Münchenberger.	Wien.	Extremitäten, deren Verwachsung und Vorzeigung der Zeichnung einer Monstrosität mit freyliegenden Eingeweiden.	Dtto.	Wien.
Erde, Bemerkungen über ihre Abkühlung.	Bischoff.	Prag.	Extremitäten, mangelhafte Bildung derselben.	Beisel.	Stuttgart.
Erdhöhlen und Höhlenverband, die großen Wirkungen der eruptierenden Gase in selben mit Bezug auf die Erdbeben.	v. Stranz.	Prag.	Er, vor der Bebrütung.	Purkinje.	Dresden.
Erdkunde (theoretische), Mittheilungen aus ihrem Gebiete.	Fröbel und Heer.	Stuttgart.	Er, dessen Austritt aus dem Eiersstocke des Hundes.	Werthold.	Heidelberg.
Erdmagnetismus.	Marz.	Stuttgart.	Er (menschliches), Verbindung derselben mit dem Fruchthalter.	Ritgen.	Stuttgart.
Erdrinde, vom Referenten entworfenener idealer Durchschnitt derselben zur Erklärung ihrer geologischen Bildung.	Nöggerath.	Prag.	Eyer, Uebergang derselben aus den Ovarien in die Tuben.	Carus.	Jena.
Erhebungsstrate.	Abich.	Prag.	Eyergang, dessen wesentlicher Bau und Bildung des Eiweißes.	Purkinje.	Dresden.
Erica, Gliederung dieser Gattung.	Tausch.	Prag.	Eyerlegen eines ausgeschnittenen Schildkröteneyerganges.	Ferg.	München.
Erineum und Phyllerium, die vermeintl. Pilze dieser Gattungen.	Fie.	Stuttgart.	Eperfschalenhaut, Bildung und Regeneration derselben.	Werthold.	Heidelberg.
Erscheinung (atmosphärische), im Jahr 1805 beobachtet.	Pohl.	Dresden.	Eygelb, daß das — eine Verbindung von Rhodionensäure mit Eiweiß seyn könnte.	Heller.	Prag.
Erscheinungen (einige neue magnetisch-electrische, physiologisch-therapeutische).	Neef.	Bonn.	<b>F.</b>		
Erscheinungskunde, als eigener Theil der Naturkunde überhaupt und Zusammenhang der Gefühlserscheinungen mit den andern Classen der äußern sinnlichen Erscheinungen insbesondere.	Jennek.	Würzburg.			
Essen, Zeit desselben und Natur der Speisen.	Schulz.	Breslau.	Färbung (merkwürdige), bey der Oxidation des Kaliums und Natriums.	Batka.	Wien.
Essigsäure, deren Bildung aus Platinmohr.	Artus.	Jena.	Fallsucht, ein Fall davon bey einem Pferde durch Belladonna und Stachysel geheilt.	Loke.	Jena.
Essigsäure, Erklärung einer Vorrichtung des Referenten zur Verewandlung des Weingeistes darein.	Döbereiner.	Stuttgart.	Familien (natürliche Pflanzen), Bildung derselben.	Reichenbach.	Prag.
Ethnographie, gewisse neue Ansichten in derselben.	Beise.	Stuttgart.	Farnen.	Rour.	Heidelberg.
Ethnographische Gegenstände, die der Vortragende auf seiner Reise um die Welt gesammelt.	Tilesius.	Prag.	Farben (complementäre), Entstehung derselben. (Mit Bemerkungen von Munk und Experimenten.)	Dann.	Bonn.
Eubometrie, wichtige Entdeckung des Referenten mit Beziehung auf selbe.	Döbereiner.	Halle.	Farbenschema, zur Illuminirung geognostischer Karten von Buch eingesandt.	v. Humboldt.	Breslau.
Erostose, ein beobachteter Fall davon.	Sulzer.	Berlin.	Farbstoff der rothen und gelben Federn und Haare mancher Thiere, gelungene Trennung derselben.	Heller.	Prag.
Experiment (ein galvanisch-chemisches).	Kunge.	Dresden.	Farbenstoff der rothen und gelben Federn und Haare mancher Thiere, gelungene Trennung derselben.	Reichenbach.	Dresden.
Eretrische (narkotische), verschiedene Bereitung derselben und ihre davon abhängende Wirkung.	Brauell.	Jena.	Farbstellung und Reinigung des Vitafals.	a. Wl.	
Extrakte, Abdampfen derselben mittelst durchgeleiteter Luft.	Buchner.	Jena.	Faráo-Inseln, geognost. Verhältnisse derselben.	Forchhammer.	Berlin.
Extractivstoff (kräftender) der Primel.	Hünefeld.	Bonn.	Farrenkräuter, Bedeutung der Organe derselben.	Meyer und Den.	Berlin.
			Farrenkr., deren Fortpflanzungsorgane.	Martius.	Stuttgart.
			Farentr., Bau ders. überhaupt und insbesondere der fossilen.	Kink.	Bonn.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Farrenkräuter (fossile) und fructus in statu fossili	Göppert.	Prag.	Fische des Bodensees.	Nenning.	Stuttgart.
Farrenkräuter (fossile) und deren Früchte.	Göppert.	Stuttgart.	Fische (organische) Erläuterung einer großen Menge Gattungen und Arten solcher, theils durch	Gr. Münster.	Jena.
Faulthier (dreyzelliges), merkwürdige Bildung seiner Eyer.	Carus.	Breslau.	Abbildungen, theils durch natürliche Exemplare.		
Febris intermittens.	Krimers.	Bonn.	Fische (seltene), der Nordsee.	Milsson.	Berlin.
Febris intermittens traumatica.	Jäger.	Bonn.	Fische von Kaschmir.	Bar. Hügel.	Prag.
Febris intermittens traumatica.	Tertor.	Jena.	Fische und Reptilien (Skizzen von verschiedenen in Brasilien gesammelten).	Natterer.	Prag.
Feldspatharten (die verschiedenen) im Granit und deren Unterscheidung.	Hessel.	Heidelberg.	Fischgattung (neue), vom Referenten aufgestellt und Sceloporus benannt.	Narbo.	Wien.
Fernrohre, wichtige Verbesserung derselben durch einen vaterländischen Künstler.	Schickh.	Wien.	Fischotter, Beitrag zur Physiographie derselben.	Diezel.	Frankfurt.
Fett-Arten, Schmelzbarkeit derselben.	Jos.	Wien.	Fischotter (gemeine, lutra vulgaris), die Formveränderung, welche ihr Schädel nach der Geburt erleidet.	Berthold.	Heidelberg.
Fettsäuren (flüchtige), neue Art, dieselben aufzuscheiden.	Jos.	Wien.	Fischippe (neue) aus dem äthiopischen Meere.	Schulze.	Bonn.
Fettsubstanzen, aus dem polnischen Kermes gewonnen.	Jos.	Wien.	Fischverseinerungen, deren Vorkommen bey Mittelwalde und Ruppin.	Schulz.	Berlin.
Fettsubstanzen (drey im Hirschsalz gefundene).	Jos.	Wien.	Flächeninhalts-Berechnungen, Erklärung einer neuen Methode derselben.	Hoffmann.	Stuttgart.
Feuermaal (das sogenannte), nebst Angabe einer neuen Methode, selbes zu heilen.	Pauli.	Stuttgart.	Flachs, wohlfeilere Gewinnung u. Herstellung desselben.	Diebel.	Prag.
Feuersteinbildung in der Gegend von Hamburg.	Müller.	Hamburg.	Fliegen, ein neues System derselben.	Flie.	Stuttgart.
Feuerungsmethode, System derselben, vom Referenten entworfen.	Buch.	Frankfurt.	Fliegenlarven, Abgang einer Menge derselben durch den After.	Messerschm.	Breslau.
Fieber der Levante.	Mäser.	Jena.	Flintglas, Bereitung desselben.	Schönstedt.	Breslau.
Fieber (exanthematische), ob zwey zusammenstreffen können.	Rumpelt.	München.	Flözgebirge, allmähliche Senkungen im Gebiete derselben.	Seune.	Jena.
Fieber (gelbes), dessen Nichtcontagiosität.	Jameson.	Hamburg.	Flora (vorweltliche), Ansichten über dieselbe.	Graf Sternberg.	Hamburg.
Fieberepidemie (eine durch kurzen Verlauf, Schweiß und Frieselschlag merkwürdige).	Schnurrer.	Heidelberg.	Flora der Vorwelt, Bestrebungen der Schiefer selbe zu erläutern.	Göppert.	Stuttgart.
Figuren (elektrische), in der Haut des Menschen, wenn derselbe vom Blitz getroffen worden.	Hohl.	Berlin.	Flora galicica.	Zawabsky.	Prag.
Filarien, deren Vorkommen in der Raupe von Liparis chrysorrhoea.	Pfieninger.	Jena.	Flora germanica exsiccata.	Reichenbach.	Prag.
Filtrirung von Asbestpapier, Gebrauch desselben bey Körpern, die durch Berührung mit dem Papierfiltrum zerstört werden.	Jos.	Wien.	Flora hannoverana. W. Meyer.	Wellwitzsch.	Prag.
Fische (fossile) und deren Eintheilung.	Agassiz.	Breslau.	Flora (cryptogamische) des österreichischen Kaiserstaates, Fortsetzung derselben.		
Fische, Veränderung der Farben, bey jenen, die im süßen Wasser leben.	Johnston.	Hamburg.	Flüsse, ihre progressiven Größenverhältnisse.	Strang.	Bonn.
Fische und Anneliden des Mittelmeeres.	Wagner.	Heidelberg.	Flüsse, ihre Eigenschaften oder Natur.	v. Wiebeking.	Stuttgart.
			Flüssigkeiten, Verfahren bey der Compression derselben.	Dersfeldt.	Berlin.
			Flüssigkeiten (gemischte), Temperatur derselben beim Kochen.	Magnus.	Jena.
			Flußkrebse, Entwicklung desselb.	Rathke.	Berlin.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Fötus, Bildung der Ähne und des Schörganges bey —.	Arnold.	Stuttgart.	Galvanismus, Untersuchungen über ihn.	Pohl.	Berlin.
Fötushüllen.	Oken.	Dresden.	Galvanisch-chemisches Experiment (sonderbares), Erklärung desselb.	Runge.	Dresden.
Fötus in foetu, Geschichte eines solchen an einem 5½ Jahr alten Mädchen.	Lumbe.	Prag.	Galvanische Wirkung bey Unterbindung der Nerven.	v. Humboldt.	Berlin.
Formationen (die tertiären) im Becken von Paris und Entwicklung der Ansicht, daß zwei Formationen von gleichem Character hinsichtlich der Verfeinerungen, die sie führen, dennoch im Alter sehr verschieden seyn können.	E. Perroff.	2 Bonn.	Galvanometer (vergleichendes). Gang (menschlicher), seine Mechanik.	Nervander. Weber.	Bonn. Bonn.
Formationen der Vögel im Vergleich zum Schwarzwalb und andern Gegenden.	b'Halloy.	Stuttgart.	Garten (botanischer) zu St. Peterburg.	Fischer.	Hamburg.
Formveränderung in der Entwicklungsgeschichte des Individuums.	Baer.	Berlin.	Gase, die neuesten Versuche Rubergs in Upsala; über die Ausdehnung derselben durch Wärme.	Poggendorf.	Prag.
Fossil (wachsähnliches), von Dr. Meyer mitgebracht.	Batka.	Breslau.	Gase, Reich derselben.	Jennel. Sars.	Prag. Prag.
Fossil, in den Karpathen der Moldau vorkommend, welches zu Brennmaterial, zu Lampen und Kerzen verwendet wird.	Mayer.	Breslau.	Gasteropoden (nackte), ihre Entwicklung, Aesolidia, Tritonia Ascanii, Doris von der Westküste Norwegens.	Kiebed.	Heidelberg.
Fossile Reptilien und Landsäugethiere in Württemberg.	Jäger.	München.	Gasteropoden, ein vom Referenten entdeckter Canal im Fuße verschiedener davon.	Mikan.	Wien.
Frauen, Schilderung der naturgeschichtlichen Würde derselben.	Schmidt.	Bonn.	Gattung und Geschlecht, deren Mißbrauch für gleiche Begriffe.	Etto.	Wien.
Freiheit und Zurechnungsfähigkeit in physisch gerichtlicher Hinsicht.	Fischer a. Petersburg.	Hamburg.	Gebären (wieberholtes) von häufig ganz gleichen Mißgeburten durch eine und dieselbe Mutter, und über die Erblichkeit dieser Bildungen.	Martin.	Stuttgart.
Fucus buccinalis L. Beschreibung desselben.	Hornemann.	Berlin.	Gebärende, deren sogenannte kriechende Lage bey Wendungen.	Sander.	München.
Füße (künstliche) und ihre besonders wohlfeile Einrichtung.	Dornblüth.	Hamburg.	Gebärmutter, Art, ihre Zurückbewegung zu heilen.	Nagel.	Hamburg.
Fütterungsart (beste) des Viehes, und das sogenannte Abdampfen des Futters.	Schweigger.	Jena.	Gebärm. (schwängere), Schleimhautentzündung derselben.	Behr.	Hamburg.
Fungus cranii, ein vom Referenten operierter Fall desselben.	Harleß.	Stuttgart.	Gebärm. (ungeschwängerte), Ausdehnung derselben.	Petschler.	Prag.
Fungus durae matris, et cranii.	Beck.	Stuttgart.	Gebärmutterblutflüsse.	Walchner.	Heidelberg.
Fungus medullaris et haematodes, Discussionen darüber.	Beck.	Stuttgart.	Gebirge (das Ur- und Uebergangs-) des Schwarzwalbes.	Glocker.	Berlin.
Fuselöl, aus der Hefe des Zeinischen Weines erhalten.	Stiedel.	Jena.	Gebirge (das Groß-Allersdorfer in Mähren und das Vorkommen des Kalais in denselben).	v. Bunsendorff.	Wien.
Fußstapfen von Pferden und einem Menschen, die im Kuiper bey Dentsheim vorkommen.	Plagge.	Bonn.	Gebirgsart (eigene granitische) in Finnland.	Buch.	Bonn.
<b>G.</b>			Gebirgsarten, Wichtigkeit fürs Studium der Grognoie, sich über eine Terminologie derselben zu vereinigen.	Nöggerath.	Bonn.
Galmeiarten, Gemische Zusammenfassung mehrerer —.	Brandes.	Bonn.	Gebirgsbildungen im Siebenbürg, relatives Alter derselben.	Ami Boué.	Wien.
Galvanische Säule Beobachtungen an derselben.	Tokisch.	Breslau.	Gebirgsformationen, Abtheilungen derselben in neptunische und plutonische.	b'Dutrepont.	Würzburg.
			Geburtschilfe, eine vom Vortrag. gemachte Entdeckung in derselben.		



Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Geburtszangen, eine anzubringende Veränderung an der Kopfschirmung derselben.	Martin.	Stuttgart.	Geognostische Charte von Mähren, vorgelegt und erklärt.	Reichenbach a. M.	Wien.
Gedoss (brasilianische), die Faseränderung derselben.	Mikan.	Stuttgart.	Geognostische Charten. Vorlegung und Erklärung mehrerer.	Rosshorn.	Wien.
Gefängnisfrankheiten, Eigenthümlichkeiten derselben.	Otto.	Hamburg.	Geognostische Charte von Würtemberg. Erklärung einer vorgelegten.	Schwarz.	Stuttgart.
Gefäße (ernährende und schweißtreibende), der menschlichen Oberhaut mit Vorlegung und Vertheilung von Präparaten.	Schulze.	Bonn.	Geognostische Verhältnisse der Gegend von Jena.	Wackenroder.	Jena.
Gefrierpunct des absoluten Alkohols.	Münke.	Heidelberg.	Geognostische Verhältnisse der Gegend von Zwickau.	Gutbier.	Jena.
Gegenstände (zoologische), als: Iphition panicea und Clavagella etc.	Audouin.	Bonn.	Geognostische Verhältnisse der Stadt Lüneburg und des Segeberges im Holsteinischen.	Fischer und Forchhammer.	Hamburg.
Gehirn, Hypertrophie desselben.	Münchmeyer.	Prag.	Geographie (vergleichende physische) und ihre Benutzung zur Gründung eines Systems der äußeren Erdgestaltung.	v. Strang.	Stuttgart.
Gehirn (menschliches), Nothwendigkeit fortzusetzender Untersuchungen desselben.	Berres.	Wien.	Geographischer Unterricht, neue Methode desselben.	Zeune.	Stuttgart.
Gehirn, Zustand desselben im angeborenen Idiotismus.	Liedemann.	Stuttgart.	Géologiques positions, en vérification directe de la chronologie de la Bible.	Fairholme.	Stuttgart.
Gehörorgan, Bildung desselben und des äußeren Ohres aus der ersten Kiemenspalte des Fötus.	Arnold.	Stuttgart.	Georginen, verschiedene Formen derselben.	Lumniger.	Prag.
Gelenkbildung (freiwillige) besenophulöser Garies und Andyploje.	Otto.	Wien.	Gerbestoff und Classification der organischen Säuren.	Holzer.	Heidelberg.
Genitalien, bezeichnet durch die Genese der asiatischen Cholera.	Rumpelt.	Bonn.	Gerbestoff, Methode, denselben mittelst Bitrioläther rein darzustellen.	Holzer.	Jena.
Genius morborum epidemicus.	Hofmann.	Breslau.	Germanien, Blicke eines Arztes auf dessen frühere Bewohner.	Schmidt.	Jena.
Geodätische Operationen zur Verbindung der Observatorien zu Göttingen, Seeberg, Mannheim, Speyer und Straßburg.	Eckhardt.	Stuttgart u. Wien.	Geruchsercheinungen, als ein bisher in der Physik wenig beachteter Gegenstand.	Jennef.	Bonn.
Geognosie, Vortrag dazu von Westhoff, mit Relation über Schülers Geologie von Ungarn.	Bernh. Cotta.	Jena.	Geschichte, eine Sammlung davon aus der Gegend von Berlin.	Röben.	Berlin.
Geognosten, Leistungen ders. zur Erforschung der Gebirgsbeschaffenheit der einzelnen Provinzen des österreichischen Kaiserstaates.	Walbauf von Waldenstein.	?	Gesellschaft (geologische) Frankreichs, und Vorlegung der von ihr bisher herausgegebenen Werke.	Erdmann.	Dresden.
Geognostica lethaea.	Bronn.	Stuttgart.	Gestalten (organische), die Aufeinanderfolge des ersten Auftretens derselben.	Ami Boué.	Wien.
Geognostischer Bau des an den thüringer Wald sich anschließenden thüringer Terrains im Gotha'schen.	Hoff.	Jena.	Gesteine, Temperatur derselben in verschiedenen Tiefen der Erde.	Ritgen.	München.
Geognostische Bemerkungen der Umgebungen von Greifswalde.	Hünefelde.	Hamburg.	Gesteinmasse (eine merkwürdige), welche im Hafen von Helsingör vorkommt.	Reich.	Stuttgart.
Geognostische Charten und Ausarbeitungen, Vorlegung und Erklärung mehrerer.	Partsch.	Wien.	Getränke (geistige), die üblen Folgen des übermäßigen Genusses derselben.	Lehmann.	Hamburg.
Geognostische Charte der östlichen Alpen. Vorlegung und Erklärung einer solchen.	Riepl.	Wien.	Getreide, Arten dasselbe aufzubewahren.	Köler.	Stuttgart.
Geognostische Charte von Böhmen. Vorlegung und Erklärung derselben.	Rippe.	Wien.	Getreide, Ursache des Fallens desselben.	Bujanowicz.	Stuttgart.
				Hammer-schmidt.	Stuttgart.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Getreidearten, die Nothwendigkeit einer Vereinigung zu einem einfachen Systeme und einer möglichst kurzen genetischen Benennung der —.	Krause.	Jena.	Gräber (althellenische), Resultate seiner bisherigen Untersuchungen vieler —.	Röser.	Jena.
Getreidearten der Abyssinier.	Fresenius.	Stuttgard.	Gränzmärken, der einzelnen deutschen Volksstämme im südwestlichen Deutschland.	Pfaff.	Stuttgard.
Getreidekörner (Keimung einiger) aus egyptischen Mumiën mit Vorlesung von Exemplaren.	Graf Sternberg.	Stuttgard.	Gräser, die zum Flechten der Strohhitte dienlichen —.	Lichtenstein.	Heidelberg.
Getreidekörner, das Keimen der untheilen —.	Kurr.	Stuttgard.	Gräser, Anstichten über die Bildung der Blüthen derselben.	Kunth.	Berlin.
Gewächse, das Keimen cryptogamischer —.	Wischhoff.	Bonn.	Gräser, Bau der —.	Kunth.	Jena.
Gewächse (cryptogamische), Bau ihrer Sporen, ferner über Michaelis Antheren der Fleischpilze.	Corda.	Breslau.	Graminum genera et species, Relation seiner vieljährigen Arbeiten über —.	Trinius.	Jena.
Gewächse (cryptogam.) Deutschlands, nach ihren natürlichen Standorten geordnet.	Dpiß.	Prag.	Granatoid, ausführliche Beschreibung dieses neuen Minerals.	Beckmann.	Heidelberg.
Gewächssreich, die Principien einer naturgemäßen Anordnung derselben.	Reichenbach.	Dresden.	Granatrinde, Zusammensetzung und wirksame Bestandtheile der —.	v. Holger.	Wien.
Gewebe, Resultate seiner microscopischen Untersuchungen über einfache — und Resultate ähnlicher Untersuchungen, vorzüglich in Embryonen.	Lauth.	Stuttgard.	Granit der niederschleissischen Ebene, über den Basalt bey Striegau, und die Quarzgänge im Granit.	Steinbeck.	Breslau.
Gewitter, deren Vertheilung während dem J. 1833 an der preussischen Küste.	Arnold.	Stuttgard.	Granit, von schmalen Basaltgängen durchsetzt, vom Weitsberge bey Carlsbad.	Graf Sternberg.	Jena.
Gewitterzug, Plan zur Beobachtung desselben und zur Enttwerfung einer Hagelkarte von Deutschland.	Feldt.	Breslau.	Granit, dessen Verwachsung mit dem Plünerkalk in der Gegend von Meissen, Hohenstein usw.	Weiß.	Stuttgard.
Gewöhnung, Gewohnheit, Uebung und Abstumpfung, die Macht der —.	Schweigger.	Halle	Granit und Bohnschiefer, Wechsellagerung derselben in der Gegend von Pilsen.	Weiß.	Stuttgard.
Gicht, über die —.	Ehulke.	Bonn.	Granitmassen, Zerfallen der — in Finnland.	v. Bönshoff.	Bonn.
Giraffe, Anatomie der —.	Sachs, Wendt.	Breslau.	Grasblüthe, die —.	Braun.	Heidelberg.
Glandula pituitaria, eine tuberculöse Entartung, die von der — ausging.	Ezermak.	Heidelberg.	Greifswalder Saline, Bromgehalt der —.	Hünfeld.	Berlin.
Glas, Entdeckung in selbes zu bohren und Schrauben zu schneiden mittelst der Anwendung von Terpentinöl.	Beck.	Stuttgard.	Grönland, dessen große Kälte im 13. Jahrhunderte.	Dersteb.	Jena.
Glasröhren, deren Töne.	Albrecht.	Stuttgard.	Grubenschwamm, ein 85 Fuß unter der Erde in der Gotthelfgrube auf einem Tragwerksteck gefunden.	Wolck.	Breslau.
Glaubersalz, dessen Zerlegung in Mineralquellen, und Auffindung des Selens in dergleichen Gewässern.	Zennek.	Würzburg.	Gründe, zur Aufstellung u. Bildung von Generibus.	Boie.	Hamburg.
Glimmer, künstlicher, durch einen Kupferchemizproceß entstandener.	Frankl aus Marienbad.	Jena.	Grünsäure, die —.	Trommsdorff.	Jena.
Glimmer, Chlorit und Talk.	Mitscherlich.	Jena.	Grünstein, dessen Vorkommen im Ural und seine Wichtigkeit im Bergbau.	Hofe.	Wien.
Goldbergbau, der wieder in Betrieb gesetzt — von Eule.	Kobell.	München.	Grundsätze, die bey der Naturforschung und den Arzneywissenschaften zu befolgenden —.	Eprengel.	Halle.
	Erolz.	Prag.	Gurchofian, dessen Fundort u. Entstehung.	Holger.	Jena.
			Gusseisen und Stahl, Beiträge zur Kenntniß ihrer Eigenschaften.	Ritter von Micis.	Wien.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
<b>S.</b>					
Haarrauch, der —.	Egen.	Berlin.	Heilquellen in den schlesischen und sächsischen Bergen.	Wendt.	Breslau.
Habichtkräuter, Monographie der —.	Frölich.	Stuttgart.	Heilwissenschaft, Verwickelung eines Entwicklungsgesetzes in der Geschichte derselben.	Leupold.	München.
Hackwalbwirthschaft, die — im Den- und Schwarzwalde.	Vogelmann.	Stuttgart.	Helminthen in den Augen der Fische.	v. Nordmann.	Hamburg.
Hämorrhoidalnoten, Structur der —.	v. Froiep.	Breslau.	Helminthenart, Kennzeichen einer neuen —, die im Protostegus, Prototypus gefunden wurde und die er Distoma gigas nennt.	Nardo.	Wien.
Hägel, Bildung und Nutzen derselben im Vogeley.	Berthold.	Berlin.	Hepiolus Hectus, eine dem männlichen Geschlechte des — eigenthümliche Abdominal- = Taschenbildung.	Heyden.	Heidelberg.
Hahn, Beschreibung eines monstrofen vierfüßigen —.	Schneider.	München.	Hermaphroditische Bildung. Hernien, Heilung derselben durch Bruchbalsame.	Mayer.	Bonn.
Harmonica chemica, in Bezug auf Sicherheit und Gleichförmigkeit eines zweckmäßigen Apparates.	Zennek.	Würzburg.	Herz, dessen Schall und Schlag.	Wendt.	Jena.
Harn, diabetischer und gewöhnlicher, die vollkommene Conservation derselben durch eine Spur Ceresot zur chemischen Analyse.	Hünefeld.	Bonn.	Herz, einige angeborene Bildungsfehler desselben.	Burdach.	Wien.
Harn, Erscheinung bey beschränkter Sec- und Excretion desselben.	Fuchs.	Jena.	Herz, ein merkwürdiger Fall von Verschiebung desselben und der übrigen Eingeweide.	Münz.	Jena.
Harnröhre, die von ihm in acht Fällen mit glücklichem Erfolge geübt und erprobte Anwendung metallener Katheter bey Stricturen der —.	Schreiber.	Prag.	Herz, regelwidrige Bildung desselben, sowie der großen Gefäße.	Ritgen.	Halle.
Harnröhrenverengerung, die Entstehung derselben.	Benedict.	Breslau.	Herz der Schlangen, namentlich Coluber natrix.	Römer.	Wien.
Harnruhrucker (crystallisierter), dessen Darstellung.	Raupp.	Heidelberg.	Herzen (vier besondere in gewissen Amphibien, nebst interessanten anatomisch = pathologischen Beobachtungen.	Schulze.	Bonn.
Harnsteine, Entstehungsweise derselben.	Rampold.	Stuttgart.	Herzerweichung, Beobachtungen über dieselbe.	Müller.	Breslau.
Haushund, Ursprung desselben.	Erekschmar.	Dresden.	Herzpolypen.	Fuchs.	Bonn.
Haussmittel, Bemerkung über einige derselben.	Sachse.	Hamburg.	Herzpolypen, zwey beobachtete Fälle von wahren —.	Münz.	Prag.
Hausthiere, Bemerkungen zur Naturgeschichte und Diagnose einiger —.	Erekschmar.	Heidelberg.	Herzstoch, Theorie desselben, und der Herz- und Arterientöne.	v. Türckheim.	Prag.
Haut, Structure derselben, hauptsächlich beim Menschen und beim Wallfisch.	Breschet.	Stuttgart.	Himmelskörper, die letzte Ursache der Bewegung derselben.	Skoda.	Prag.
Hautfunction, Wichtigkeit der Normalität der — in hygienischer und therapeutischer Hinsicht.	Herberger.	Heidelberg.	Höhenmessung (barometrische), eine eigene unmittelbare Sinneswahrnehmung für dieselbe.	Ritgen.	Wien.
Hautfelle, die geeignetste Art der Präparation und Aufstellung derselben zu wissenschaftlichen Forschungen.	Ammerling.	Prag.	Höhenmessung (barometrische), eine eigene unmittelbare Sinneswahrnehmung für dieselbe.	Carus.	Jena.
Heiligensteine (die sogenannten).	v. Stranz.	Breslau.	Höhenmessungen, Bergabstürze, Flugründe, Wasserfälle, Gebirgspässe, Alpen- und Hochseen, Flußbreiten, die Verhältnisse der Landesformationen überhaupt zur Gestalt u. Richtung d. Flüsse.	Fuchs.	Bonn.
Heilkunde, ist die —, ihrer allgemeinen Natur nach, einer wissenschaftlichen Behandlung nach einem Principe fähig? Inwiefern? und welches Princip ist in dieser Beziehung für die gesammte Heilkunde aufzustellen?	Seckendorf.	Heidelberg.	Holothurioiden, Anatomie eines neuen Geschlechtes derselben.	Münz.	Prag.
	Reuß.	Heidelberg.	Holzgeiß, dessen Erzeugung bey jeder gewöhnl. Meilerverkohlung.	Skoda.	Prag.
			Holzgeiß.	Ritgen.	Wien.
				Reichenbach a. Bl.	Breslau.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Holzgeist, Resultate seiner Untersuchungen desselben.	Kane.	Jena.
Holzige Gewächse, Charaktere zur Unterscheidung derselben im blattofen Zustande.	Zuccatini.	Berlin.
Holz-Sammlung (wissenschaftliche); Art, dieselbe anzulegen.	Fischer.	Hamburg.
Homöopathie, Kritik der —.	Harleß.	Bonn.
Hordein, der Gerste und des Buchweizens.	Jennek.	Frankfurt.
Hottentotten, Untersuchungen über die Schürze derselben.	Liedemann.	Stuttgart.
Hühner, Entwicklungsweise des Auges und Ohrs derselben und anderer Thiere der drey höhern Classen.	Huschke.	Hamburg.
Hühnerpox, Abnahme des bebrüteten —.	Ezermak.	Wien.
Hufgelenklähme der Pferde.	Eoge u. Renner.	Jena.
Hundswuth, Mittel wider dieselbe.	Navat.	Bonn.
Hundswuth; Darstellung seiner prophylactischen Methode, nebst Vertheidigung gegen die Angriffe auf selbe.	Kruttge.	Breslau.
Halith (schleifischer).	Gloker.	München.
Hydrogenmaterie, Fortschritte derselben.	August.	Berlin.
Hydrogen, Entzündung desselben beim Zutritt der atmosphär. Luft.	Döbereiner.	Halle.
Hydrora africana und eine neue Art dieser Sippe, Hydrora triiceps genannt.	Meyer.	Breslau.
Hydrometra, ein Fall von —.	Stremmel.	Berlin.
Hydrops ovarii, eine gelungene Heilung desselben.	Holscher.	Hamburg.
Hydrurus crystallophorus, Beobachtungen über —.	Schäbler.	Berlin.
Hygrometer, ein neuer —.	Stieffel.	Heidelberg.
Hygrometrie, Fortschritte derselben während der neuesten Zeit.	August.	Berlin.
Hymenea, Pflanzen der Gattung —.	Hayne.	München.
Hymenopterorum, ichneumonibus affinium monographia, genera europaea et species illustrantes.	K. v. Esenbeck.	Stuttgart.
Hypertrophie der Brüste, eine auf seiner Reise durch Böhmen im Prager Krankenhause beobachtete —.	Dreisfuß.	Stuttgart.
Hyraeis monographia.	Kaulla.	Stuttgart.
Hypospadus, } Beschreibung { eines —.	Seiler.	Dresden.
Hypurit.	Gramm.	München.
Hypurit.	v. Buch.	München.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
<b>I.</b>		
Salappenharz (reines), beste Methode zur Darstellung desselben.	Buchner.	Jena.
Sapanese, Beobachtungen über den Bau derselben.	v. Froiep.	Bonn.
Sealpathologie (vergleichen); ein Versuch, die Krankheiten als Rückfälle der Idee des Lebens auf tiefere normale Lebensstufen darzustellen.	Hoffmann.	Stuttgart.
Serbalin und ein Erdharz.	Schrötter.	Prag.
Servin, eine neue Pflanzenbase.	Rose.	Prag.
Sgelkeimlinge.	Ritgen.	Halle.
Simpfung von Rüben mit Schupodenmaterie.	Leutin.	Jena.
Influenza anni 1833.	Rabius.	Breslau.
Insuforien.	Münke.	Hamburg.
Insuforien, Demonstration seiner neuesten Entdeckung derselben als Feismassen unter dem Microscope.	Ehrenberg.	Jena.
Insuforien (2 neue), im sogenannten blutigen Wasser entdeckte —.	Ehrenberg.	Jena.
Insuforien, über Ehrenberg's Untersuchungen derselben.	Hornschuh.	Hamburg.
Insuforien, deren Wiederbelebungsfähigkeit.	Schulke.	Bonn.
Insuforien, Organisation derselben überhaupt und der Räderthiere insbesondere.	Fizinger.	Wien.
Insuforienwelt, Darstellung der Ehrenberg'schen Untersuchungen über Leben und Organisation derselben.	Chamisso.	Hamburg.
Injectionen, seine Methode — zu machen.	Etrauß.	Stuttgart.
Injectionenmasse, deren Bezeichnung und die Vor- und Nachtheile der verschiedenen Compositionen.	Dürheim.	Wien.
Insect, welches die Feigen in Oberitalien bewohnt.	Froiep, Römer, Beres, Ezermak.	
Insecten, die in Bernstein eingeschlossen.	Fredericus.	Dresden.
Insl., Lebensweise verschiedener —.	Verendt.	Bonn.
Insl., Methode sehr kleine — mittheilen eines in ein Erüchen Holundermark befestigten Silberdrahtes zu conservieren.	Hammerich.	Jena.
Insl., Veränderungen in den Farnverhältnissen der —, nach der Höhe ihres Wohnortes.	v. Heyden.	Stuttgart.
Insl., die die Kirichen angreifen —.	Heer.	Stuttgart.
	Germer.	Jena.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Insekten, Vorkommen derselben in der Gegend von Mailand.	Kunze.	Jena.	Kalait, dessen Vorkommen in Schlesien.	Glocker.	Dresden.
Inf. (versteinerte) des Juraschiefers von Solenhofen.	Germar.	Jena.	Kalium, dessen Reduction.	Josf.	Wien.
Inf., die den Wäldern schädliche.	Rageburg.	Jena.	Kalium, eine neue Methode selbes zu erzeugen.	Plieschel.	Wien.
Inf., Physiognomie derselben, insbesondere der Coleopteren zur künftigen Bestimmung und Prüfung der vorhandenen Sippen nach dem Rippenverlauf der Flügel.	Preyßler.	Prag.	Kalium, bessere Bereitung desselb.	Rukla.	Prag.
Inf., die im Schieferstein vorkommenden, vorweltlichen — namentlich der Libellutinen; und verschiedene Insectenarten in Bernstein.	Germar.	Prag.	Kalium, dessen Einwirkung auf verschiedene organische Stoffe.	König.	Prag.
Insectenlarven, die die Reinclaus verwüsthenden —	Apez.	Jena.	Kalkformation am Centis.	Walchner.	Stuttgart.
Institut, landwirthschaftliches, die Organisation eines solchen durch ganz Deutschland.	Groh.	Jena.	Kalkschlotten, merkwürdiges Vorkommen in selben.	Breithaupt.	Dresden.
Institute, notwendige, hoher Nutzen derselben und notwendiger Verein solcher Anstalten mit Erziehungsanstalten.	Wier.	Wien.	Kalkspath und Arragonitcrystalle, künstliche Bildung derselben durch Fällung kalter und heißer Lösungen von Kalksalzen mittelst kohlsaurer Alkalien.	Rose.	Prag.
Instrumente (chirurgische), über von ihm erfundene —	Seiler.	Dresden.	Kamille, zufällig bemerfter großer Gehalt von Salpeter in derselben.	Josf.	Prag.
Jod, dessen Verhalten gegen Zerpentinel-Dampf.	Winkler.	Heidelberg.	Kammerbühl bey Eger, Resultate der Untersuchungen desselben.	Sternberg.	Bonn.
Jod=Antimon.	Brandes.	Prag.	Kammerbühl bey Eger.	Cotta.	Dresden.
Jod=Crysfalle, aus Jodsäure erzeugt.	Josf.	Wien.	Kamtschatka, naturhistorische Gegenstände desselben.	Rittlich.	Bonn.
Jodwirkung, die — als solche auf Pflanzen.	Reum.	Stuttgart.	Kanonenkugeln, deren Bahn.	Hoffmeister.	Heidelberg.
Iris bohémica et hungarica, Beschreibung von —	Fieber.	Prag.	Karpathen und nordcarpathische Länder, deren geognostische Constitution.	Pusch.	Berlin.
Jfauren.	Siemens.	Hamburg.	Karpfen, Geschmacksorgan ders.	Weber.	Dresden.
Jschel und seine Soolbäder.	Wier.	Wien.	Kase, späte Einführung derselben in England und im nördlichen Europa.	Jäger.	Prag.
Jtop der Bibel.	Landau.	Prag.	Kasen, deren Myologie.	Etrauß.	Stuttgart.
Juragebiet bey Freyburg, Vorlegung einer geognostischen Charte desselben, und Vergleichen der dortigen Gebirgsverhältnisse mit denen anderer Länder.	Thurmam.	Stuttgart.	Kautschuk.	Dürkheim.	Hamburg.
			Kehlkopf.	Münz.	Dresden.
			Keimen von Nymphæa cærulea und Euryale ferax.	Treviranus.	Bonn.
			Keimen cryptogamischer Gewächse.	Bischoff.	Bonn.
			Keimen der in den Gräbern der Inkas gefundenen Maiskörner.	Martens.	Stuttgart.
			Keimen der Samen in verschiedenen Medien von unorganischen Körpern.	Bogel.	Heidelberg.
			Keimfähigkeit unreifer Samen.	Kurt.	Stuttgart.
			Keimung einiger aus ägyptischen Mumien erhalten. Getreidekörner.	Graf.	Stuttgart.
			Regel (vulkanische).	Sternberg.	Bonn.
			Reifen, Kreislauf derselben.	Prevoß.	München.
			Reipersandstein, merkwürdige Absonderungen in der Structur desselben.	Carus.	Prag.
			Riesenfuß, Beiträge zur Anatomie des Krebsartigen —	Jäger.	Prag.
			Riemen der Fische, Structur und Blutumlauf derselben.	Berthold.	Heidelberg.
			Rieselerde u. Eisenoryd v. fosfilen und noch lebenden Infusorien.	Treviranus.	Heidelberg.
				Rose.	Prag.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Kieselguhr, im Franzensbrunner Teichmoor.	Palliarbi.	Jena.	Kopfkreis der Fische.	Hirtl.	Prag.
Kinder, Rahmwerden ders. durch eine Einschnürung der Art. sub- ralis, und über den Einschnitt in die Aponeurose als Heilmittel.	Dotto.	Wien.	Korkstüpfel, deren Verbesserung.	Kesler.	Stuttgart.
Kinderpocken (arabische) bey Vaccinirten.	Marcolini.	Wien.	Rund, rhomboidförmig.	Haibinger.	Prag.
Kindeslagen (regelmäßige).	v. Frociop.	Dresden.	Kornwürmer, Mittel, solche zu vertilgen.	Gock u. Volz.	Stuttgart.
Kissingen, Salzquelle daselbst.	Dann.	Jena.	Kosmographische Instrumente,	Müller.	Wien.
Klumpfüße, deren Heilung.	Stromeyer.	Hamburg.	Krägelmilben, Uebergang derselben von einem Bombat auf Menschen.	Fride.	Heidelberg.
Klumpfüße, Vortheile der Durch- schneidung der Achillessehne bey Behandlung der —	Ulrich.	Bonn.	Krägelmilben, deren Uebergang von Kameelen aus Algier auf ihre Wärter.	Leufart.	Stuttgart.
Klumpfußmaschine vom In- strumentenmacher Kunde in Dres- den, Beschreibung derselben.	Zins.	Prag.	Krankengeschichte einer Trepa- nation, welche 5mal vorgenom- men wurde.	Strauß.	Stuttgart.
Knochen (fossile) bey Köstzig.	Graf		Krankheit, während welcher eine eigenthümliche Masse durch den Stuhl abging.	Dürkheim.	München.
Knochen (fossile), Ablagerung der- selben in der Höhle Goffontaine zwischen Lüttich und Spa.	Stenberg.	München.	Krankheiten, während welcher eine eigenthümliche Masse durch den Stuhl abging.	Koch.	Heidelberg.
Knochen (fossile) aus der Kno- chenhöhle bey Lüttich.	Prevost.	Bonn.	Krankheiten, fieberhafte, welche mit Verschwörung des Darmca- nalis einherzugehen pflegen.	Steinling.	Hamburg.
Knochen (fossile).	Buckland.	Bonn.	Krankheiten, biblische Darstel- lung der diagnostischen Merkmale derselben.	Sachse.	Leipzig.
Knochen (fossile) bey Köstzig.	Maier.	Stuttgart.	Krankheiten, Verbreitung ders.	v. Frociop.	Leipzig.
Knochen, Vernarbung derselben nach der Trepanation.	Schottin.	Berlin.	Krankheiten, Verbreitung ders.	Schnurrer.	München.
Knochen, deren Regeneration nach Substanzverlust durch Resection.	Weißbrod.	München.	Krankheiten (örtliche).	Schmidt.	Stuttgart.
Knochen, deren Spatelform, welche sie bey ihrer Entwicklung durch- laufen.	Heine.	Bonn.	Krankheiten der Mundhöhle, technischer Apparat bey derselben.	Carabelli.	Wien.
Knochenbrüche.	Ritgen.	Breslau.	Krankheiten, Veränderlichkeit im Formwechsel derselben im Laufe der Welt- und Menschengeschichte.	Harlek.	Bonn.
Knochenstiele (athletische).			Krankheiten (chronische), Hin- deutung auf eine naturgemäße Pathologie derselben.	Heidler.	Prag.
Knorrenfische, deren Metamor- phose.	Deckerle.	Stuttgart.	Krankheiten, Nachtheil, welcher aus — aus falscher Scham entsteht.	Sulzer.	Berlin.
Knospen, deren Entwicklung und Structur.	Röser.	Jena.	Krankheiten, Nachtheil der Volksverfälschung der —.	Meyer.	Berlin.
Körper (menschlicher), periphere Gebilde derselben.	Leufart.	Hamburg.	Krankheiten, Character (herr- schender), Einfluß derselben auf die Systeme der Heilkunde.	Kieser.	Würzburg.
Körper (poröse), deren Brechungs- kraft.	Henry.	Bonn.	Krankheitsconstit., welche ha- ben wir wahrscheinlich zu erwarten?	Stiebel.	Heidelberg.
Körper, deren Festigkeit und Flüs- sigkeit bey verschiedenen Tempe- raturen.	Verres.	Stuttgart.	Krankheitsconstitution, allge- meine Ansichten derselben.	Kieser.	Würzburg.
Körper, deren Durchsichtigkeit.	Frankenheim.	Breslau.	Krankheitsfall, Mittheilung des Resultates der Untersuchung eines interessanten — auf der Prager chirurgischen Klinik.	Ritgen.	Prag.
Körper, dessen spezifisches Gewicht.	Gerstner.	Wien.	Krankheitsconstit. (stehende).	Harlek.	München.
Körper, metall., absolut einfache.	Wimmer.	Wien.	Krankheitsformen (örtliche).	Rußt.	Breslau.
Kohlensäure, Reaction derselben auf Kalk.	Kiese.	Bonn.	Krankheitsgenius.	Kieser.	Würzburg.
Kohlenschwefel, liquider.	Böttiger.	Jena.	Krankheitsgeschichte eines Verwundeten, bey welchem nach einer Schlägeren Caries der Ge- sichtsknochen entstand.	Pauli.	Stuttgart.
Kohlenstoff, dessen Abwesenheit im Zellgewebe.	Siegmund.	Stuttgart.			
Kopaibalsam, Verfahren, um die Verfälschung desselben mit Ricinusöl zu entdecken.	Lampadius.	München.			
	Prinz.	Dresden.			
	Rohde.	Prag.			

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Krankenhäuser, Verbindung derselben mit Arbeitsanstalten.	Klose.	Breslau.	Kyano- und Diaphnometer, Gauss'sches, von Sander aus Braunschweig verbessert.	Schweigger.	Halle.
Krankpflege durch barmherzige Schwestern.	Ulrich.	Bonn.			
Krapproth (reines), Darstellung desselben.	Zennek.	München.	<b>I.</b>		
Kreidebildung, Verbreitung derselben.	Beaumont.	Bonn.	Laborator, chemische Zusammensetzung desselben, und die Ursache seines Farbenspiels.	v. Bunsendorff.	Prag.
Kreislauf in den Gangarmen der <i>Plumatella cristata</i> .	Cresschmar.	München.	Labyrinth von Creta.	Prokesch von Ofte.	Wien.
Kreislauf in den mit Blut versehenen Thieren.	Wilbrand.	Frankfurt.	<i>Lacerta vivipara Jacq.</i> , Entdeckung der Eier derselben.	Reichenbach.	Sena.
Kreislauf in der organischen Natur.	Wilbrand.	Wien.	Lähmung der einen untern Extremität bey einem 13 jährigen Mädchen.	Blasius.	Prag.
Kreislauf des Blutes.	Kreisig.	Prag.	Lagerung, gegenseitige sehr gesonderte, und gänzlich von einander abweichende Pflanzenabdrücke des Rothliegenden und der Kohlenformation der Gegend von Zwickau.	v. Gutbier.	Sena.
Kreosot.	Reichenbach.	Breslau.	Land- und Süßwassermolusken (europäische), Monographie und geographische Verbreitung derselben.	Rossmäßer.	Prag.
Kreosotwasser, dessen conservirende Kraft.	Schulze.	Prag.	Landtschildkröte, Dunkans Abbildungen von Fußklappen derselben, im bunten Sandstein Schottlands vorkommend.	Buckland.	Bonn.
Kretinen, deren Genitaliensystem.	Friedrich.	München.	Landwirthschaft, ihre Richtung, um zeitgemäß fortzuschreiten, und dem lange fühlbaren Nothstande derselben abzuhelfen.	Geyer.	Sena.
Kritik (botanische), Gesehe derselben mit besonderer Rücksicht auf Linne.	Richter.	Jena.	Landwirthschaft, Mittel, durch welche zu einem höheren Wohlstande zu gelangen.	Diebel.	Prag.
Kropf, dessen Entstehung in Steyermark und Kärnten.	v. Holzer.	Hamburg.	Landwirthschaftliche Versuche, Wesen derselben.	Schweigger.	Jena.
Kügelchen, deren Entwicklung im Ei, während des Brütens.	Oken.	Heidelberg.	Lariceen, Monographie ihrer Rinden.	Batka.	Prag.
Kuh, Beschreibung einer Mißgeburt von einer —.	v. Lenhossek.	Prag.	Laubmoose, ihr Keimen.	Bischoff a. H.	Heidelberg.
Kuhpocken gift, Versuche, selbes von Kindern auf Thiere zu übertragen.	Lentin.	Jena.	Laubmoose, ihre Entstehung.	Dietrich.	Heidelberg.
Kuhpockenimpfung und Erfolg der Revaccination.	Kolley.	Breslau.	Laurineen (westindische und süd-americanische).	n. v. Gendek.	Wien.
Kuhpockenimpfung, Nothwendigkeit einer gehörig einzurichtenden —.	Sacco.	Wien.	Lava (basaltische) aus der Gegend vom Wolfsberg in Böhmen.	Wiebel.	Stuttgart.
Kuhpockenimpfung, Erfahrungen derselben.	Schmig.	Bonn.	Lebensbewegungen der Cäster.	Schulz.	Breslau.
Kukuluf, Entwicklung des Fettes beim — und das Nervensystem des Igels.	Barkow.	Breslau.	Lebensmagnetismus, Erfahrungen über denselben.	Wendt.	Hamburg.
Kukuluf, Entwicklung des Fettes beim — und das Nervensystem des Igels.	Oken.	Halle.	Lebermoose, 2 neue genera derselben: <i>Brisocarpus</i> und <i>Oxymitra</i> .	Bischoff.	Heidelberg.
Kupferammoniak mit Aepfelsäure gibt einen grünen Niederschlag.	Pfaff.	Hamburg.	Lebermoose, ihre Blüthen, Früchte und morphologische Bedeutung.	Bischoff.	Bonn.
Kupferoxydhydrat als Reagens für Pflanzen Säuren.	Runge.	Heidelberg.	Legirungen, chemische Versuche über die Darstellung mehrerer —.		Jena.
Kupferschiefer, Verrückung derselben durch den Kupfererzgang „Krauping“ bey Cammsdorf.	Tantscher.	Jena.			
Kupfervegetationen, auf nassem Wege erhaltene.	Schweigger.	München.			
Kurzflüchtige, Bemerkung, daß sie sich durch Winkeln gleichsam ein concaves Glas bilden.	Scheibel.	Bonn.			
Kyanöl und Pyrröl.	Runge.	Breslau.			



Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
<b>Leguminosen.</b>	Bentham.	Prag.	<b>Lufttröhre</b> , 2 Fälle von spontaner Auskoffung in dieselbe gebrungener fremder Körper, nach einem mehrjährigen Verweilen in derselben.	Hepfelder.	Stuttgart.
<b>Lemna</b> , Bemerkungen über diese Gattung, besonders in Bezug auf den Bau d. Frucht u. des Samens.	Herfel.	Berlin.	<b>Luftströmungen</b> , Erläuterung der Theorie derselben.	Dove.	Berlin.
<b>Lemna arrhiza</b> , Beschreibung derselben.	Dumortier.	Bonn.	<b>Lumbrici</b> .	Figinger.	Wien.
<b>Lepidosiren paradoxa</b> (Caramourou), deren Beschreibung.	Natterer.	Prag.	<b>Lungenkrankheiten</b> , in anat. pathol. Hinsicht.	Lobstein.	Stuttgart.
<b>Leucochloridum paradoxum</b> . Eingeweidewurm aus den Fühlhörnern von <i>Helix putris</i> .	Carus.	Breslau.	<b>Lutra vulgaris</b> , Metamorphose ihrer Schädelsknochen, und Austritt des Eyes aus dem Eyerstocke der Hunde.	Berthold.	Heidelberg.
<b>Leuchten der Augen</b> bey verschiedenen Thieren.	Hassenstein.	Jena.	<b>Lympe</b> , deren sichtbare Bewegung in den Saugadern des Schwanzes der Froschlurven.	Weber.	Jena.
<b>Levistici radix</b> , ihre Bestandtheile.	Trommsdorff.	Bonn.	<b>Lymphgefäßsystem</b> , dessen Verhalten im Menschen und Verbindung der Saugadern mit den Venen, außer den großen Saugaderstämmen.	Fohmann.	Heidelberg.
<b>Licht</b> , chemische Wirkungen des durch rothe, violette und grüne Glasglocken geleiteten Strahls auf jene Metallorbe, welche durch den Sonnenstrahl eine Veränderung erleiden.	Dulk.	Wien.	<b>Lymphherzen</b> , Beschreibung derselben und einiger Mißbildungen.	Müller.	Breslau.
<b>Lichtererscheinung im Monde</b> , Polarlicht.	Gruithuisen.	Berlin.	<b>M.</b>		
<b>Lichtgestalten im Auge</b> , bey Fixirung desselben auf einen Lichtpunkt.	West.	Wien.	<b>Macrobiotus</b> , Mittheilung, daß man die Entstehung desselben und ähnlicher Thiere in seiner Gewalt habe.	Purkinje.	Prag.
<b>Lichtphänomene an Sonne und Mond</b> .	Meyer.	München.	<b>Macrobiotus hufelandi</b> , und 4 andere Species dieser merkwürdigen Krustenfamilie.	Schulze.	Prag.
<b>Lichtpolarisations-Apparat</b> , Vorgeigung eines geordneten, womit Versuche angestellt wurden.	Dove.	Jena.	<b>Macrobiotus hufelandi</b> , Beschreibung desselben.	Schulze.	Breslau.
<b>Lichtstrahlen</b> , farbige, ihre Einwirkung auf Körper, die gegen das Licht sehr empfindlich sind.	Batka.	Wien.	<b>Macronychus tuberculatus</b> , Abhandlung darüber.	Contarini.	Stuttgart.
<b>Librit vom Kupferberg</b> .	Singer.	Breslau.	<b>Macrosceles bozeti</b> , Abhandlung über selbe.	Duvernoy.	Breslau.
<b>Limnæa auricularia</b> , ihre Fortpflanzung durch 4 Generationen ohne alle Paarung.	Dlen.	Frankfurt.	<b>Mädchen</b> , Nachricht von einem in Holland lebenden, welches seit 6 Jahren keine Nahrung zu sich genommen.	Kottgen.	Bonn.
<b>Linneanus Codex</b> , von Richter herausgegeben, Wichtigkeit desselb.	Reichenbach a. D.	Prag.	<b>Mählen</b> , dessen mineralogische Schätze.	Glocker.	Dresden.
<b>Linneische Litaney</b> nach 24 Classen des Linneischen Pflanzensystems.	Zuccarini.	Prag.	<b>Mäuseart</b> (neue) und innere Organisation verschiedener Helminthen.	Mehlis.	Hamburg.
<b>Literatur</b> (orientalisch-medicin.). Lithion, Art es zu erkennen.	Seligmann.	Stuttgart.	<b>Magenbrüse</b> , ihr Bau, und Natur des Verdauungsprocesses.	Purkinje.	Prag.
<b>Lithium</b> , dessen Ausscheidung aus dem Lepidolith.	Johnston.	Hamburg.	<b>Magnetismus</b> (thierischer).	Reum.	Dresden.
<b>Lithonriptor</b> (civilisier). Lithopodium (b. Heidelbergische).	Tos.	Wien.	<b>Magnet</b> , des elektrischen Stromes.	Derstede.	Berlin.
<b>Lolium temulentum</b> , seine bedingte Schädlichkeit.	Nestler.	Prag.	<b>Magnet</b> (schwächer) in einem Aggregate von Eisen und Stahl.	Baumgärtner.	Breslau.
<b>Luft</b> (atmosphärische), ihre Abkühlung im Allgemeinen, und an dem Wasserdampfe insbesondere.	Wolz.	Heidelberg.			
<b>Luftreinigungsmaschine</b> (neue).	Sabloukoff.	Jena.			

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
<b>Magnetismus</b> (tellurischer) und Einfluß der Bodenvärme des Meeres auf denselben.	Munke.	Jena.
<b>Magnet.</b> , Verfahren, die Intensität dess. an verschiedenen Magneten leicht, schnell und sicher zu bestimmen.	Kastner.	Stuttgart.
<b>Magnetismus</b> (thierischer).	Sachse.	Hamburg.
<b>Magnetismus</b> (thierischer).	Barries.	Hamburg.
<b>Magnetnadeln</b> , Secular = Aenderungen derselben.	Bogulawsky.	Breslau.
<b>Manganorhyde</b> , Scheidung derselben vom Kobaltoryde.	Döbereiner u. Gmelin.	Stuttgart.
<b>Mangan säure</b> , Art sie zu erzeug.	Jos.	Wien.
<b>Mangan säure</b> .	Hänsfeld.	Hamburg.
<b>Mania sine delirio</b> .	Groß.	Hamburg.
<b>Mappæ geognostica</b> .	Bredsdorff.	Berlin.
<b>Marienbads</b> Heilquellen.	Frankl.	Prag.
<b>Marienbads</b> naturhistor. Darstellung.	Heidler.	Prag.
<b>Marienbader</b> Wasser, Bemerkungen darüber.	Krang.	Berlin.
<b>Marfchwamm</b> des Auges.	Rosaf.	Wien.
<b>Maschine</b> , wodurch man im Stande ist, kleine Zeittheile und insbesondere die Zeitekunde in eine beliebige Anzahl kleinerer Theile abgetheilt zu wissen.	Udim.	Wien.
<b>Maschine</b> zum Dfizerkleinern u. einer Dfistörre, Vortheile und Einrichtung derselben.	Härlin.	Stuttgart.
<b>Maschinen</b> , landwirthschaftliche, und besonders der Pflug.	Seidel.	Prag.
<b>Mastodonsaurus salaman-droides</b> .	Jäger.	Prag.
<b>Mafsystem</b> , Versuch eines solchen.	Steinhäuser.	Halle.
<b>Materie</b> und Urstoff.	Jaszenitzky.	Bonn.
<b>Mathematik</b> , neue Entdeckungen in ihrem Gebiete.	Nowak.	Prag.
<b>Maulbeerbaum</b> (vielfältlicher), Beobachtungen an ihm und zwey kultivierte Abarten desselben.	Carus und Schulz.	Breslau.
<b>Maulwurf</b> , dessen Bau und Lebensart.	Weber.	Jena.
<b>Mechanik</b> der menschlichen Geheerzeuge.	Weber.	Bonn.
<b>Mechanik</b> des menschl. Ganges.	Duckland.	Bonn.
<b>Mechanismus</b> , durch welchen das Thier des Nautilus das Auf- u. Absteigen im Wasser bewirkt.		
<b>Meckelia somatomus</b> , Organisation dieses neuen Ringwurms.	Leufart.	Heidelberg.
<b>Medicin</b> , Princip derselben.	Reuß.	Heidelberg.
<b>Medicin</b> , Myifikation in ders.	Bischoff a. B.	Hamburg.
<b>Medicin</b> , Theorie und Praxis in derselben.	Gedel.	Breslau.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
<b>Medicin</b> , ihr gegenwärtiger Standpunkt im Allgemeinen.	Gröfer.	Bonn.
<b>Medicinal = Statistik</b> (allgemeine) Begründung derselben.	v. Froiep.	Breslau.
<b>Medicinalwesen</b> in China.	Haymann.	Bonn.
<b>Medullar = Sarcom</b> des Auges, merkwürdiger Ausgang eines solchen, nebst Andeutungen über die Natur dieser Krankheit.	Chelius.	Heidelberg.
<b>Meduse</b> (neue).	Rathke.	Breslau.
<b>Medusen</b> , Verfahren bey Aufbewahrung derselben.	Schilling.	Berlin.
<b>Meere</b> , Ungleichheit des Niveau zweyer mit einander verbundenen.	Munke.	Jena.
<b>Meerbälle</b> (Pilæ marinae).	Mikan.	Prag.
<b>Meersforche</b> , Kinde derselben, ein kräftiges Abstingens.	Narbo.	Stuttgart.
<b>Meerskrömungen</b> im Allgemeinen, und Strom von kaltem Wasser in der Südsee.	v. Humboldt.	Breslau.
<b>Meeresströmungen</b> .	Sieber.	Prag.
<b>Meerschweinchen</b> , Entdeckung eines aus 2 Stücken bestehenden kleinen Knochens im äußern Ohr desselben.	Leufart.	Stuttgart.
<b>Meerwurm</b> , Beschreibung und Anatomie eines neuen, an Sicilien gefundenen, Notospermus drepanensis.	Leufart.	Heidelberg.
<b>Melischwefel</b> von Delz.		
<b>Melanosen</b> , besond. bey Pferden.	Reichenbach.	Stuttgart.
<b>Membrana capsulo-pupillaris</b> , Anspruchsrecht auf die Priorität der Entdeckung der sogenannten — .	Prinz.	Dresden.
<b>Membrana pupillaris</b> .	Gzermal.	Prag.
<b>Membran</b> (durchsichtige Pseudo-), welche mit dem Pupillarrande verwachsen war.	Römer.	Wien.
<b>Membran</b> (durchsichtige Pseudo-), welche mit dem Pupillarrande verwachsen war.	Fr. Jäger.	Wien.
<b>Monopoma und Monobranchus</b> , Beschreibung und Vorlegung von Exemplaren beyder.	Mayer.	Bonn.
<b>Mentha</b> , verschiedene Gattungen derselben, besonders von Mentha crispa.	Dierbach.	Heidelberg.
<b>Meridianunterschied</b> , Methode, mittelst tragbarer Passage-Instrumente, denselben zwischen zwey Orten zu finden.	Bogulawsky.	Breslau.
<b>Messing</b> (gebogenes) aus Sibirien.		
<b>Metalle</b> , neues Verfahren zur Untersuchung derselben auf nassem Wege.	Manßfeld.	Dresden.
<b>Metalle</b> , Verhalten der atmosphärischen Luft und des Wassers bey dem Oxydieren derselben.	Fischer.	Prag.
<b>Metalle</b> , deren Oxydation.	v. Wonsdorff.	Stuttgart.
	v. Wonsdorff.	Bonn.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Metallblausäuren, ihre Natur und ihre Salze.	Specy.	Wien.	Mineralien, Beschreibung mehrerer, welche in Ungarn vorkommen.	Zipser.	Breslau.
Metaphysik.	Neuber.	Hamburg.	Mineralien, neue Fundörter derselben in Mähren und Schlesien.	Glocker.	Wien.
Metamorphose (chemische) der Bäume und Sträucher.	Rünge.	Hamburg.	Mineralien (schlesische), mehr Analysen davon.	Zellner.	Breslau.
Metamorphose (chem.) mehrerer Pflanzentkörper in stoichiometrischer Beziehung.	Döbereiner.	Würzburg.	Mineralogie und Geognosie, Grundsätze der Classification ders.	Glocker.	Breslau.
Meteor (periodisches), welches vom 13. auf den 14. Novembr, 1836. sichtbar gewesen.	Morstadt.	Prag.	Mineralquellen von Baden.	Edwig.	Prag.
Meteorstein (problematisches) von Magdeburg.	Schreiber.	Wien.	Mineralquellen, ihr Gehalt an Kohlensäure u. Kohlensäurebildung.	Brandes.	Fena.
Meteorsteinsteine von Lenarto und Agram in Ungarn, deren chemische Zusammensetzung.	Holger.	Heidelberg.	Mineralspecies (zwei neue).	Heller.	Prag.
Meteorologische Commission, errichtet von der kön. dänischen Gesellschaft der Wissenschaften, Nachrichten von ihr.	Derstedt.	Hamburg.	Mineralwässer (natürliche), ihre Entstehung.	Struwe.	Stuttgart.
Meteorstein von Stannern, neue Analyse desselben.	Holger.	Wien.	Mineralwässer, eigenthümliche Heilkräfte verschiedener von ihnen.	v. Bering.	Dresden.
Meteorsteine, Analyse einiger solchen.	Holger.	Hamburg.	Mineralwässer bey Niederrhein, Analyse desselben.	Schüller.	Breslau.
Meteorsteine, deren Erzeugung durch Bliz.	Fahrer.	München.	Mineralwasserkarte von Würtemberg sammt Abhandlung.	Siegmart.	Stuttgart.
Meteorsteine und Feuerkugeln, ihre Bildung.	Hopf.	Stuttgart.	Mißbildungen des Gehirns und Kopfes, und Anatomie des genus Pseudopus.	Otto.	Hamburg.
Meteorsteine, die am 25. September 1833. in der Gegend von Biansko in Mähren gefallen.	Reichenbach a. Bl.	Stuttgart.	Mißgeburten (merkwürdige menschliche), nebst Bemerkungen über das sogen. Versehen der Schwangeren u. Aufzählung mehrerer Fälle.	Carus, Meyer und Frobiep.	Bonn.
Meteorsteine und Eisenmassen, das Problematische derselben.	Scherer.	Wien.	Mißgeburten von Hühnern; Ergebnisse seiner Versuche zur künstlichen Erzeugung solcher.	Valentin.	Breslau.
Methylen-Mercapton.	Gregory.	Bonn.	Mittelfleisch, Verhütung des Eintrittes bey der Geburt.	Ritgen.	Stuttgart.
Meteorhagie, interessanter Fall davon.	Kilian.	Bonn.	Moleculen (Brownische).	Schulze.	Hamburg.
Microloa.	Biasoletto.	Prag.	Mollusken.	Grap.	Stuttgart.
Microscop der Fernröhre, warum selbe von der Sonnenhitze nicht angegriffen wurden, wie dieses bey Feuerschwamm u. dgl. der Fall ist, wenn sie von Ungefahr an denselben Ort gebracht werden.	Littrov.	Hamburg.	Mollusken, Art der Einsaugung bey denselben.	Jakobsen.	Hamburg.
Microscop (aplanatisches) von neuer Constitution.	Agassiz.	Heidelberg.	Mollusken, Art der Einsaugung bey denselben.	Schulz.	Breslau.
Milben in frühartigen Hautkrankheiten bey dem Pferd, Schaf, der Gemse und der Rabe.	Hering.	Stuttgart.	Mollusken, Art der Einsaugung bey denselben.	Mädler.	Fena.
Milben in den Tabakmagazinen.	Duvernoy.	Stuttgart.	Mollusken, Art der Einsaugung bey denselben.	Mädler.	Fena.
Milben, in der Rinde wirklich vorgefunden.	Str. Dürkheim und Breichet.	Stuttgart.	Mollusken, Art der Einsaugung bey denselben.	Eisenlohr.	Stuttgart.
Milz, Verichtung und Erstirpation derselben bey Thieren.	Schulz.	Berlin.	Mollusken, Art der Einsaugung bey denselben.	Mädler.	Prag.
Mineralien (schlesische), Untersuchung d. Bestandtheile v. einigen.	Dörsch.	Prag.	Mollusken, Art der Einsaugung bey denselben.	Runowsky.	Berlin.
			Mollusken, Art der Einsaugung bey denselben.	Duvernoy.	Stuttgart.
			Mollusken, Art der Einsaugung bey denselben.	Guelk.	Berlin.
			Mollusken, Art der Einsaugung bey denselben.	Fischer.	Hamburg.
			Mollusken, Art der Einsaugung bey denselben.	Irbski.	Heidelberg.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Mückensehen, in diagnostischer und ätiologischer Beziehung.	Brenner, Mitt. v. Felsach.	Breslau.
Mühlen, Verbesserung derselben in Württemberg.	Pfieninger.	Jena.
Multiplicatoren (electromagnetische), Methode, wie mittelst derselben die Leitungsfähigkeit der Metalle für Electricität durch Zahlen ausgedrückt werden könne.	Schweigger.	Halle.
Multiplicator, Vorlegung und Beschreibung eines verbesserten.	Neeff.	Stuttgart.
Multiplicator, Vorlegung und Erklärung eines vom Referenten geordneten.	a. Straßburg.	Jena.
Muscicapa collaris, Verwechselung ihrer Benennung.	Neeff.	Jena.
Muskeln (kleine), welche an allen Gelenken, besonders häufig und stark am Knie- und Sprunggelenke vorkommen, und für die Spannung der Synovialcapseln bestimmt sind.	Heckel.	Wien.
Muskelbau, Analogien in demselben bey den höheren Thieren und über einen sonderbaren Instinct des männlichen Bulo obstetricans.	Berres.	Prag.
Muskelfaserkraft, ihre Gesetze mit Versuchen an Fröschen.	Agassiz.	Breslau.
Mutter und Frucht, Ergebnisse von Untersuchungen über die Verbindung zwischen beyden.	Schwann.	Jena.
Myriapoden, neue Ordnung derselben.	Weber.	Bonn.
Myuliten, in einigen thierischen vom Grafen Sternberg beobachteten Gebilden, die er in Schlesiens und Böhmens Steinkohle fand.	Brandt.	Jena.
	Detto.	Stuttgart.

## N.

Nabelbeutel, vom Referenten am männlichen Schweine entdeckt.	Hering.	Stuttgart.
Nachgeburt, Einsackung und Einsperung derselben.	Riefe.	Stuttgart.
Nachgrabungen bey Hehenstein in Sachsen, geognostischer Bericht darüber.	Cetta.	Jena.
Nabelfische (männliche), sonderbares Brutorgan unter dem Schwanz derselben.	Regius.	Breslau.
Nägel und Haare, anatomische Notizen über deren Bildung.	Lauth.	Heidelberg.
Nagethierreste, deren Vorkommen in der Höhle von Gallenreuth.	Wagner.	Heidelberg.
Najas, das genus.	Horkel.	Hamburg.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Naphthalin und dessen Vertheilungsart.	Reichenbach a. Bl.	Wien.
Nasenbildung (künstliche), gelungenere Fall einer solchen.	Reiner.	München.
Nasenknorpel (zwey entdeckte).	Hufschke.	Jena.
National-Pharmacopoe: Errichtung einer allgem. deutschen.	Harleß.	Stuttgart.
Natron (kieselsaures), eine neue Verbindung.	Friesche.	Bonn.
Natur (organische), Gemälde derselben.	Wilbrand.	Leipzig.
Natur- und Heilwissenschaft in der Wallachei.	v. Meyer.	Bonn.
Natur = Eintheilungen des Menschenlebens, Ansichten darüber.	Butte.	Heidelberg.
de Naturelle systematique histoire, Fragments anatomico-physiologiques sur le genre Muscaraigne.	Duvernoy.	Stuttgart.
Naturforscherversammlungen, Nutzen derselben.	Gf. Palffy.	Wien.
Naturf., bedrohte Erhaltung derselben.	v. Jacquin.	Wien.
Naturgenuß und wissenschaftliche Entwicklung der Weltgesetze, Verschiedenheit derselben.	v. Humboldt.	Jena.
Naturgeschichte, Werth des künstl. und natürl. Systems derselben.	Berthold.	Frankfurt.
Naturg., Popularisirung derselben mittelst seiner bildlichen Darstellung des Linneischen Systems.	Lummiger.	Prag.
Naturg., Entwicklung und heutiger Standpunkt derselben.	Reichenbach.	Prag.
Naturg., Gebrauch derselben zur Begründung einer wahren medicinischen klinischen Theorie.	Röschlaub.	München.
Naturhistorisch = medicinisches Werk (ein großes), über dessen Bearbeitung.	Formey.	Leipzig.
Naturkenntnisse, Bemerkungen über den Verein zur Verbreitung derselben.	Schweigger.	Frankfurt.
Naturkunde, deren Einfluß auf die Fortschritte der Kunst.	v. Fries.	Bonn.
Naturkunde, deren Einfluß auf die sittliche Verbreitung d. Menschen.	Wilbrand.	Bonn.
Naturphilosophie, Einfluß derselben auf die Naturwissenschaften.	v. Schiel.	Breslau.
Naturstudium, Einfluß, den eine Richtung der modernen Literatur, die Landschaftsmalerei und den Anbau erotischer Genüsse auf die Belebung derselben ausgeübt haben.	v. Humboldt.	Breslau.
Naturwissenschaften, welches sind die Anforderungen an eine künftige Bearbeitung derselben?	Carus.	Leipzig.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Naturwissenschaft und Arzneikunde, ihre Würde.	Simon.	Hamburg.	Nieren, Krankheiten derselben.	Sachs.	Jena.
Naturwissenschaft und Philosophie (empirische), Grenzen derselben.	Hock.	Breslau.	Nierenknäule, ihre Entwicklung und physiologische Bedeutung.	Ezermak.	Prag.
Naturwissenschaftliche Gegenstände, deren Darstellung in künstlerischer Hinsicht.	Carus.	Leipzig.	Mobilische Figuren, denselben ähnliche Erscheinungen.	Kastner.	Stuttgard.
Naturwissenschaftliche Reise in Brasilien, des Joh. Ratterer Ueberblick derselben. Mit Bemerkungen über Nöppigs Reise.	Ratterer.	Wien.	Noma genitalium.	Heine.	Prag.
Naturwissenschaftliche Reise in Südamerica von v. Döbigny, Bericht über dieselbe.	v. Froepie.	Wien.	Nomenclatur, Berichtigung derselben in den botanischen Gärten.	v. Martius.	Stuttgard.
Naturwissenschaft, Vorschlag einer neuen Schriftstellerei in derselben.	Terussac.	Heidelberg.	<b>D.</b>		
Naturwissenschaften, die Beziehungen derselben zu den gesellschaftlichen Verhältnissen.	Stinking.	Hamburg.			
Naturwissenschaften u. Medicin, Ansichten von der Behandlung derselben.	Döbinger.	München.	Distarkten, Würtembergs vorzüglichste.	Mann.	Stuttgard.
Naturwissenschaften, Verhältnis derselben zu der Landwirtschaft, Forstwissenschaft und zum Gartenbau.	Liedemann.	Heidelberg.	Distbäume, Verfahren, wodurch dieselbe bald blühen und Früchte tragen.	Reum.	Jena.
Nelumbium speciosum.	Reum.	Jena.	Distbildung, Beförderung derselben an Aerg- und Pyramidenbäumen, durch mehrjähriges starkes Einschnitten der Zweige.	Reum.	Stuttgard.
Nerve (sympathischer), Kopfschmerz derselben am Menschen.	Bar.v. Hügel.	Prag.	Detäeder, neue lichtvolle Berechnungsweise derselben.	Kau.	Würzburg.
Nerven, Regeneration derselben.	Arnold.	Heidelberg.	Detulare (practisches) des Dr. Kisthiners bey Farnrothen.	Littrow.	Breslau.
Nerven, Einfluß derselben auf die Bewegung des Blutes.	Liedemann.	Hamburg.	Denwald, Uebersicht der Ergebnisse einer geognostischen Erforschung derselben.	Klipstein.	Heidelberg.
Nerven, die Empfindung und Bewegungsleitung in denselben.	Baumgärtner.	Heidelberg.	Delbereitung, Anfrage über die Wichtigkeit derselben aus Desfämerien vermittelst der Anwendung heißer Wasserdämpfe.	Schaaß.	Heidelberg.
Nerv., deren Bildungsverhältnisse.	Roberton.	Bonn.	Dele (fette), ihre Heilkraft bey Hautausschlägen.	v. Seckendorff.	Heidelberg.
Nervencylinder (elementare), scheinbare canaliculöse Beschaffenheit derselben.	Berres.	Prag.	Oestus Equi, Lebensweise und Organisation seiner Larve.	Schrötter.	Heidelberg.
Nervenfaser zu Wechselburg im Jahre 1825.	Purkinje.	Prag.	Dhr, Abhandlung über dasselbe.	Breschet.	Stuttgard.
Nervenhaut im Auge, Entzündung derselben.	Grob.	Dresden.	Denit, ein neues Mineral.	v. Kobell.	Berlin.
Nervensystem, dessen Bestimmung.	Schneider.	München.	Oleum Tiglii Crotonis.	Frost.	Stuttgard.
Nethhaut und das Sommeringsche Loch im Auge.	Hensler.	München.	Dpal, die Gruben derselben bey Egerweniga.	Zeuschner.	Prag.
Nidel (reiner), Versuche über die Darstellung eines solchen.	Berres.	Wien.	Dpalin = Allophan (untheilbarer), Beschreibung dieses neuen Minerals.	Schrötter.	Prag.
Nicotiana rustica, Beobachtung an derselben.	Geitner.	Dresden.	Dptische Gläser (neue) aus der Fabrik des Th. Taguet aus Solothurn, und über die Brauchbarkeit des Crocots zu Objectiven.	Marr.	Stuttgard.
Niere (menschliche), microscopische Bauart derselben.	Jäger.	Prag.	Dptometer, ein neues Instrument, das die Brennweite der für jedes Auge nöthigen Brillen unmittelbar angeben soll.	Stampfer.	Wien.
Nieren, ihre Textur.	Berres.	Prag.	Drangenblüthenwasser, Abhandlung über dasselbe.	Joseph.	Prag.
Nierenknäulen, Resultate seiner Untersuchungen über dieselben.	Huschke.	München.	Drdhiden (österreichische).	Meyerhofer.	Wien.
	Ezermak.	Bonn.	Drgane (menschliche), fremde Erzeugnisse in denselben.	Wolfart.	Berlin.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Organische Gestalten, Aufeinanderfolge des ersten Auftretens derselben.	Ritgen.	München.
Organische Körper, Darstellung der Bestandtheile und der systematischen Einteilung derselben.	Ehrmann.	Prag.
Organismen (thierische), Uebersicht derselben.	v. Meyer.	Heidelberg.
Organismus, Begriff desselben, allgemeinherrschend in den drei Naturreichen.	Limner.	Stuttgart.
Organismus (thierischer), Veränderungen und Prozesse darin.	Heller.	Prag.
Organisationsverhältnisse bei polygastrischen Infusorien und Räderthieren.	Focke.	Bonn.
Ornithologie, die vom Referenten bearbeitete.	Landbuch.	Stuttgart.
Ornitholithen, Spuren derselben, welche neuerdings in America gefunden worden.	v. Frovrip.	Jena.
Orthopädisches Institut zu Gannstadt, Leistung, d. h. Anstalt.	Heine.	Stuttgart.
Oreanamen, deren Entstellung.	Pfaff.	Stuttgart.
Oryctoglossus capensis.	v. Lichtenstein.	Prag.
Oryctographie du gouvernement de Moscou.	Fischer.	Hamburg.
Otiorynchus picipes, der die Weinstockknospen aufsteigende.	Märkel.	Jena.
Ovarien, Krankheiten derselben und ihre Behandlung.	Busch.	Jena.
Ovula, deren Entstellung.	Link.	Berlin.
<b>P.</b>		
Palaeosaurus Sternbergii.	Fibinger.	Prag.
Pallad mit Igebiegenem Gold in der Gegend von Tilgerode.	Weiß.	Jena.
Palladium (gediegenes), welches am Harze gefunden wurde.	Bergelius.	Hamburg.
Paludina vivipara, Mittheilung der Beobachtung über das Drehen des Embryos im Ey derselben.	Carus.	Frankfurt.
Parallelen-Theorie, Beitrag zu derselben.	Doppler.	Prag.
Parasiten, Analyse derselben.	Unger.	Prag.
Parasiten, deren Verbindung mit den von ihnen bewohnten Pflanzen.	Treviranus.	Bonn.
Paris, Keimen derselben.	Rageburg.	Berlin.
Pastatwinde, deren Entstellung.	Dove.	Jena.
Pathologie, gegenwärtiger Stand derselben.	Harleß.	Prag.
Pellian, dessen Zunge und Kinnladensack.	Duvernoy.	Stuttgart.
Pelorien, Beobachtungen über selbe.	Rageburg.	Berlin.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Pendel-Tarirwage, Beschreibung einer solchen.	Lang.	Prag.
Percussionsgewehre, neue Einrichtung derselben.	Bauersachs.	Jena.
Petrefacten (einige der schönsten) des Dresdner Museums.	Reichenbach.	Jena.
Pest.	Grüne.	Prag.
Pest, polizeyliche Maßregeln dabei, und die Pestspitäler in Constantinopel.	Röser.	Bonn.
Pfeffer, roher als schädli. Mittel.	Wendt.	Berlin.
Pferde, Würmer in den Augen derselben.	Guckl.	Hamburg.
Pflanzen, Einwirkung der Blausäure und anderer Substanzen auf dieselben.	Göppert.	München.
Pflanzen, Bestäubung derselben.	Henschel.	Berlin.
Pflanzen, Methode Hünefelds, selbe durch Samen lycopodii zu trocknen.	Göppert.	Wien.
Pflanzen (schwedische), Verzeichniß derselben.	Wahlberg.	Berlin.
Pflanzen, Licht- und Wärmeerscheinung bei denselben.	Treviranus.	Berlin.
Pflanzen, ihre Argenkräfte, verglichen mit ihrer Structur.	Dierbach.	Heidelberg.
Pflanzen, Methode des Referenten, sie einzulegen.	Hoppe.	München.
Pflanzen, deren Spiralgefäße u. Drüsen.	Reum.	Dresden.
Pflanzen, Nothwendigkeit der Beobachtung der geographischen Verbreitung derselben.	Reichenbach.	Prag.
Pflanzen, geographische Verbreitung derselben.	Weltwisch.	Prag.
Pflanzen (fossile), deren Zustand und Verfeinerungen.	Göppert.	Jena.
Pflanzen, Verfruchtung derselben.	Gärtner.	Bonn.
Pflanzen, verschiedene Formen und Entwicklungsstufen der Lebensgefäße derselben.	Schulz.	Dreslau.
Pflanzen, Kreislauf derselben.	Gzermak.	Wien.
Pflanzen, neue Methode sie zu trocknen.	Hünefeld.	Dreslau.
Pflanzen, zweckmäßigste Art sie zu trocknen.	Hoppe.	München.
Pflanzen, deren Samenthiere.	Unger.	Wien.
Pflanzen (parasitische), ihre Wurzeln auf der Mutterpflanze.	Unger.	Wien.
Pflanzen, ihre Temperaturveränderungen.	Schäbler.	Heidelberg.
Pflanzen (schwer zu vermehrende), Methode, sie aus Seglingen zu ziehen.	Dhlenborff.	Hamburg.
Pflanzen (hybride), Resultat von des Referenten Versuchen solche zu erzeugen.	Gärtner.	Stuttgart.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Pflanzen und Thiere, Unterschied zwischen ihnen.	Schulz.	München.	Pflanzenwelt, Zahlenverhältniß, welches in ders. deutlich zu sehen ist.	Wais.	Prag.
Pflanzenabdrücke, Erläuterungen üb. jene der Steinkohlenformat.	Germar.	Berlin.	Pflug (Gangre'scher).	Rieke.	Stuttgart.
Pflanzenabdrücke aus der Gegend von Freiberg.	Cotta.	Jena.	Portader, ihre Verbindung mit der untern Hohlader.	Weber.	Breslau.
Pflanzenaustauschanstalt, Zweck der von Dpiz gegründeten.	Dpiz.	Prag.	Pharmaceutischer Verein, Bericht über die zehnährige Stiftungsfeier desselben.	Brandes.	Hamburg.
Pflanzenauswüchse durch Insecten veranlaßt.	Hammerichm.	Wien.	Pharmacie, drückende Verhältnisse, welche gegenwärtig auf derselben haften.	Vogel.	Bonn.
Pflanzenauswüchse, merkwürdige im Weichselthale.	Estreicher.	Wien.	Pharmacie, deren Zustand im Allgemeinen.	Reichard.	Bonn.
Pflanzenep, Entwicklung der Integumente desselben vor der Befruchtung.	Fritsche.	Bonn.	Pharmacopoe, Ausarbeitung u. Erfordernisse desselben.	Geiger.	Bonn.
Pflanzenfamilien (verwandte), deren Characterisierung durch eigenthümliche Stoffe.	Runge.	Berlin.	Pharmacopoe (eine allgemeine deutsche).	Harleß.	Stuttgart.
Pflanzenfamilien (natürliche) in ihren gegenseitigen Stellungen, Verzweigungen und Gruppierungen zu einem natürl. Pflanzensysteme.	Wilbrand.	Stuttgart.	Pharmacopoe (allgem. deutsche National-), deren Einführung mit Beziehung auf die Stuttgarter Verhandlungen.	Buchner.	Jena.
Pflanzenformen, Einheit ders.	Agardh.	Hamburg.	Pharmacopoe (allgem. deutsche National-), Vorschlag einer Vereinigung zur Herausgabe einer solchen.	Harleß.	Wien.
PflanzenGattung (neue), Beschreibung einer solchen, die der Referent <i>Herbichia</i> nennt.	Jawadsky.	Wien.	Pharmacognostische Erfahrungen über die Verfälschung einiger Rinden.	Batka.	Hamburg.
Pflanzenkrankheiten.	Staudinger.	Hamburg.	Phlegmasia alba dolens, Behandlung desselben.	Wendt.	Jena.
Pflanzenleben, verschiedenartige Einwirkung vieler Substanzen auf dasselbe.	Göppert.	Berlin.	Phosphor, dessen Verbrennen.	Bache.	Hamburg.
Pflanzenreiche, natürliche Verwandtschaften in selben und Entwicklung der Pflanze überhaupt als Basis für die Classification des Gemächereichs.	Reichenbach.	Jena.	Phosphore, neu beobachtete Erscheinungen beim Leuchten derselben mit ihrem eigenen Lichte.	Spann.	Heidelberg.
Pflanzen Säuren, neues Reagens für selbe.	Runge.	Heidelberg.	Physik, mathematische Wahrheit in derselben.	Derstedt.	Hamburg.
Pflanzen Sammlungen.	Bentham.	Prag.	Physik, einige Gegenstände derselben, welche Bezug auf Empfindungen haben.	Rastner.	Würzburg.
Pflanzen system (natürliches u. philosophisches).	Reichenbach.	Dresden.	Physik für Artilleristen, Notizen aus dem Gebiete derselben.	Nau.	Heidelberg.
Pflanzen system (natürliches) des Referenten.	Oken.	Würzburg.	Physik, deren Urgeschichte, mit specieller Beziehung auf den Kreis des <i>Asimanthias</i> .	Schweigger.	Prag.
Pflanzen theile (blättrige) ihre wässerigen und luftigen Auscheidungen.	Treviranus.	Dresden.	Physikalische Entdeckungen (neue), besonders Schallversuche und Echo.	Gilbert.	Leipzig.
Pflanzen = Versteinerungen des Keupers.	Berger.	Stuttgart.	Physiologie, Verhältniß derselben zur gesammten Naturkunde.	Wilbrand.	Halle.
Pflanzenversteinerungen.	Jäger.	München.	Physiologie, was ist sie? und wie ist sie zu behandeln?	Wilbrand.	München.
Pflanzenverf., deren Bildung auf nassem Wege.	Göppert.	Prag.	Physiologie und höhere anatom. Untersuchungen daraus nach den neueren Resultaten auf den Schulbetrieb der medic. Wissenschaften angewandt.	Lenhoffel.	Prag.
Pflanzenverf. des großherzogl. Cabinets in Karlsruhe.	Braun.	Stuttgart.			
Pflanzenwachsthum, dessen Hauptgrundsätze und deren Anwendung auf dem Land- und Gartenbau.	Nowak.	Prag.			



Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Phytochemie, des Referenten neueste Entdeckungen und Untersuchungen in derselben.	Döbereiner.	Würzburg.	Porphyre, eine eigenthümliche Bildung dess. und ein jugendl. Trümmergestein mit Daryschkuren.	Braun.	Heidelberg.
Pigmente, neue Ansichten der Mischungsverhältnisse von denselben organischen Ursprungs und deren Abhängigkeit von Kohlenstoffoxyden.	Neumann.	Prag.	Präparate, welche auf der Gränze organischer und unorganischer Verbindungen stehen.	Mitscherlich.	Jena.
Pikamar, eine neue in den empyreumatischen Flüssigkeiten neu entdeckte Substanz.	Reichenbach a. Bl.	Breslau.	Prag, Erklärung zu des Ref. geognostischer Charte der Umgebungen von —.	Preininger.	Prag.
Pilze (gigiste) und Einwirkung des Bodens, Klimas auf deren Natur.	Ascherson.	Berlin.	Prag und Dresden, Ungewissheit, welche noch in Ansehung der Meereshöhen zwischen beyden Statt findet.	Sommer.	Prag.
Pilze (neue), Gliederung des natürlichen Systems derselben.	Corda.	Prag.	Prager Wässer, chemische Untersuchung derselben.	Pleischl.	Prag.
Pinus maritima, Rinde derselben.	Nardo.	Breslau.	Präparate (chemische), die von Robiquet, Bopearu und Pelletier mitgetheilt worden waren.	v. Bergelius.	Bonn.
Pittakal, Darstellung und Reinigung der vom Ref. neuerlich entdeckten blauen Farben-Substanz.	Reichenbach a. Bl.	Breslau.	Primordial-Nieren, Bemerkungen zu der aufgestellten Theorie derselben.	Jakobson.	Hamburg.
Placenta, Beobachtungen über dieselbe an 3 Affen vom Senegal.	Breschet.	Stuttgart.	Proceß (electro-magnet.), Bemerk. zu der aufgestellten Theorie desselb.	Derstede.	Berlin.
Placenta pravia, was ist vom Lampon bey dess. zu halten?	Wegeler.	Bonn.	Processus ciliaris, eine zwischen denselben und dem Linfencapselrande bestehende Verbindung.	v. Ammon.	Berlin.
Placentatio parietalis.	Reichenbach.	Prag.	Produce (literarische) der deutschen naturforschenden Gesellschaften, Vereinigung derselben zu einem einzigen Werke.	Oken.	Frankfurt.
Plantagineen.	Leydolt.	Prag.	Prolapsus vesicae urinariae, ein merkwürdiger Fall davon.	v. Froberg.	Stuttgart.
Plantagum novarum pugillus secundus.	Lehmann.	Hamburg.	Prophylactische Maßregeln der bayer. Regierung gegen die Cholera und deren glücklicher Erfolg.	Schneider.	Prag.
Platin, dessen Ausbringen in Rußland.	v. Sobolewski.	Stuttgart.	Prosopalgie und günstiger Erfolg der Aкупunctur in derselben.	Sachs.	Wien.
Platinerze im Ural und die darin vorkommenden Metalle.	Bergelius.	Berlin.	Proteus sanguineus, besondere Abweichungen in der Bildung der Kiemen und Augen desselben.	Schreiber.	Wien.
Platinverbindungen (mehrere neue).	Döbereiner.	Jena.	Proteus anguineus, Reproduction der Kiemen und des Schwanzes bey denselben.	Szermak.	Wien.
Pleuronectes, Stellung der Augen bey denselben.	Schleier.	Hamburg.	Psychologie als Naturwissenschaft.	Burdach.	Berlin.
Plexus choroides, körniger Ueberzug, welcher dieselbe an allen Hirnhöhlen beim Menschen und wohl bey allen Classen der Rückgrathsthiere umgibt.	Purkinje.	Prag.	Psychrometer, das vom Referenten erfundene.	August.	Berlin.
Plinius, Herausgabe des mineralischen Theils desselben.	Glocher.	Dresden.	Pterodactylus (fossiler).	Oken.	Hamburg.
Plinius, Anregung zu einer neuen Ausgabe desselben durch Professor Fie in Straßburg.	Jäger.	Stuttgart.	Pterodactylus (neuer).	Goldfuß.	Heidelberg.
Plinius, Vorschlag eine neue Ausgabe desselben zu veranstalten.	Thiersch.	Bonn.	Pterygien, Instrument zur Operation derselben.	Seiler.	Dresden.
Plumatella cristata, Beobachtungen über den Kreislauf in den Fangarnen derselben.	Cresschmar.	München.	Pudicität.	Jörg.	Berlin.
Pneumothorax, ein Fall, wo die Paracentese der Brust mit Erfolg gemacht wurde.	Tertor.	Heidelberg.	Puls, ein Kranker, der 2 Wochen ohne denselben lebte.	Kohen.	Prag.
Pockenepidemie b. Vaccinirten.	Trischler.	München.	Pulsation (nie gehörte doppelte) eines Kindes bey der an Gebärenden vorgenommenen Auscultation.	v'Dontepont.	Würzburg.
Polypodiaceae, die bisher angenommenen genera derselben.	Braun.	Heidelberg.			

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
<b>Punctum caecum</b> im Auge, jetziger Standpunkt der Entscheidung der Frage darüber.	v. Littrow.	Bonn.	Regenmenge in verschiedenen Höhen.	Frankenheim.	Breslau.
<b>Pupille</b> , künstliche Bildung derselben in der Sclerotica.	Wuher.	Bonn.	Reiseverein, naturhistor. Zweck und Leistungen desselben.	Hochstetter.	Stuttgard.
<b>Pustula maligna</b> .	Schwabe.	Jena.	Repetitionskreise, Schwierigkeit u. Unsicherh. ihres Gebrauches.	Littrow.	Breslau.
<b>Pyrops</b> , Vorkommen desselben in Böhmen.	Reuß.	Prag.	Reptilien (fossile) und Säugethiere, Ueberreste derselben, welche in Württemberg gefunden worden.	Jäger.	München.
<b>Q.</b>			Reptilien (fossile) in Württemberg.	Schüler.	Berlin.
<b>Quadrat</b> (kleinste), Betrachtungen über die Methode derselben.	Nürnberg.	Dresden.	Resection der Gelenke im Allgem.	Jäger.	Bonn.
<b>Quallen</b> , deren Aufbewahrung in gleichen Theilen Alkohol u. Wasser.	Hünfeld.	Berlin.	Resina elastica, zur Vereitung eines sehr guten Kittes zur Verklebung anat. und zoolog. Gläser.	Adernmann.	Breslau.
<b>Quecksilber</b> , dessen Bewegung, die durch gewisse Metallberührungen hervorgerufen wird.	Runge.	Hamburg.	Respiration.	Wilbrand.	Dresden.
<b>Quecksilber-Gasometer</b> , Erklärung desselben.	Zennel.	Stuttgard.	Respirationsmuskeln.	Renner.	Jena.
<b>Quecksilberoxyd</b> , dessen Vordringlichkeit als Reagens für mehrere Säuren.	Wackenroder.	Jena.	Rhinoceros unicornis, Ausmessung desselben.	Lumniger.	Prag.
<b>Quecksilberpräparate</b> , Darstellung derselben im Großen.	Popp.	Prag.	Rhizobotrya, Beschreibung dieser neuen Pflanzengattung.	Tauscher.	Prag.
<b>Quecksilbersublimat</b> , Bereitung dess. durch Brunnenwasser.	Winkler.	Heidelberg.	Rhizomorphia subterranea.	N. v. Esenbeck.	Bonn.
<b>R.</b>			Rhobionensäure, vom Ref. entdeckte, als Bestandtheil des Blutes.	Heller.	Prag.
<b>Ragen</b> verschiedenheit des Hineisschens und des gewöhnlichen Schweines.	Renner.	Jena.	Rhobionf., vom Ref. entdeckte, im Allgemeinen, ihre Bildung u. Darstellung, ihre chemische Zusammensetzung, ihre Eigenschaften und Salze.	Heller.	Prag.
<b>Raps</b> , Verfahren beim Verpflanzen desselben mit Bemerkungen über die Knollen an den Wurzeln.	Reum und Crusius.	Jena.	Rhynchoten, einige neue Gattungen derselben.	Fieber.	Prag.
<b>Raubvögel</b> (männl.), Betragen ders. gegen das brütende Weibchen und ihre Jungen.	Brehm.	Jena.	Riesenhant (gezogener), Culturgeschichte desselben auf der Herrschaft Aitolis.	Dschenbauer.	Prag.
<b>Reben</b> , das Propfen derselben.	Härlin, Geol.	Stuttgard.	Rinden, Beschreibung u. Sammlung einiger solcher.	Batka.	Prag.
<b>Rebenforten</b> , richtige Wahl derselben zur Verbesserung der Weinproduction.	Bujanowicz.	Stuttgard.	Rindvieh- und Hausthierragen auf den Privatgütern des Königs v. Württemberg. Beschreibung ders.	Wedderlin.	Stuttgard.
<b>Rebschulen</b> , beschränkter Nutzen derselben und Versuche in der Classification und Benennung der Traubenforten.	Bujanowicz.	Prag.	Ringelnatter, sympath. Nerve derselben.	Schulze.	Hamburg.
<b>Reflex</b> (geistiger), die bey den einzelnen Individuen stattfindende Verschiedenheit desselben bey äußern Eindrücken auf die Organe des Gesichts und Gehörs.	Nicolai.	Heidelberg.	Robben, Bemerkungen über ihr Vorkommen an der pommerschen Küste.	Hornschuh.	Berlin.
<b>Reflexionsgoniometer</b> , Bemerkungen über das vom Mechanikus Bugegeiger in Lubin gen ausgeführte —.	Gmelin.	Heidelberg.	Robben, ihr Vorkommen im Caspischen, Aral-, Baikal- und Baltasch-See. Vorkommen von Delphinen an den überschwemmten Uferwäldungen des Drinoko.	v. Humboldt.	Breslau.
<b>Regenbogenhaut</b> , deren ganztlicher Mangel.	Behr.	Berlin.	Rothen und Hayen, eigentümliche Sinnesorgane derselben.	Treviranus.	Bonn.
			Roth-Ärzneyen, Kenntniß ders.	Embecke.	Hamburg.
			Rotationsapparat, Erklärung der Einwirkung und Wirkung dess.	Ettingshausen.	Prag.
			Rozet's description géologique de la partie meridionale de Vogeses.	Nöggerath.	Stuttgard.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Rückenmark und seine Nerven. Rückenmark, innere Structur und Entstehung desselben.	Bellingieri. Münz.	Stuttgard. Bonn.	Salzcrystalle in nux vomica gefunden.	Lehmann.	Breslau.
Rückgrathsverbiegungen, ein von Ebner in Stuttgard abgeandertes Ausdehnungsbette bey dens.	König.	Stuttgard.	Salze (schwefelsaure), deren Zersetzung durch organische Stoffe.	Vogel.	Berlin.
Rugendas, Erklärung über die Abbildungen derselben, besonders die Physiognomie der Gewächse, der Erdoberfläche und der Gebirgsarten betreffend.	v. Humboldt.	Jena.	Salze, die aus 2 Chloriden oder Bromiden bestehen.	v. Wonsdorff.	Wien.
Runkelrübenzuckerfabrication: Beobachtung derselben; deren möglichst hoher Ertrag; Bemerkungen über dieselbe; Verhältnisse ders. zum Ackerbau.	Ries, Krause. Gf. Colloredo. Kaufmann. Labigés.	Wien. Wien. Bonn. Bonn.	Salzquelle der Saline zu Rissingen.	Osann.	Jena.
<b>E.</b>			Samen, höhere Reinigung derselb. — (unreife), ihr Keimen. — (geschnittene), ihr Keimen. — (verschiedene), Keimen derselben.	v. Grävenitz. Seiffer. Henry. Göppert.	Heidelberg. Bonn. Bonn. Wien.
Saatraupe (Segetum agrotis). Sabellen, deren Athmungsorgane. Sassen, Erläuterungen zu einer Section der geognostischen Charte davon, die Umgebungen von Dresden vorsehend.	Leichmann. Rüppell. Raumann.	Jena. Heidelberg. Prag.	Samenbildung ohne Befruchtung am Winkeltkraut.	Ramisch.	Prag.
Säugthiere (Schlafende), deren Wutumlaut.	Dtto.	Dresden.	Samenhäute, Ansichten über dieselben, den Nabel und die übrigen Theile des Samens.	Schulz.	Berlin.
— deren Verdauungsorgane.	Dtto.	Wien.	Samentkapseln, Beschreibung derselben.	Purkinje.	Wien.
— Geographie derselben.	Thienemann.	Dresden.	Samen thiere der Pflanzen, Beobachtung über dieselben.	Unger.	Prag.
Säugthierblut, tödtliche Folgen der Transfusion desselben in die Venen der Vögel; Bericht: gung, daß dieses nur für die Transfusion des venösen Blutes gültig sey.	Bischoff.	Prag.	Sandelholz und das sogenannte Calliaturholz, Resultate einer neuen Untersuchung darüber.	Batka.	Prag.
Säule (galvanische), ohne Sauerstoff vom Referenten construiert.	Nervander.	Bonn.	Sandstein (vulkanisierter).	Klipsstein.	München.
Säule (thermo-electrische), Vorlegung und Erklärung einer solchen.	Noeff.	Bonn.	Sandstein (Heßberger).	Groß.	Jena.
Saft, Bewegung desselben in vollkommenen Gewächsen.	Hayne.	Heidelberg.	Sarcoma medullaris.	v. Ammon.	Dresden.
Saft abzapfen, Einfluß desselben auf das Leben der Bäume.	Wilbrand.	Bonn.	Sarmente, physiologische Verbindung ders. und der Mutterpflanze.	Jäger.	Stuttgard.
Saftebewegung der Pflanzen.	Meyen.	München.	Sarsaparilla, verschiedene im Handel vorkommende Arten ders.	Batka.	Breslau.
Salamandra atra, Kiemenbildung derselben.	Cyermak.	Wien.	Sarsaparilla.	Batka.	Prag.
Salam. maculosa et atra, merkwürdige Art ihrer Fortpflanzung.	Schreibers.	Wien.	Saturnia spini, Gespinnst derselben zu Kleidungsstücken.	Heeger.	Wien.
Salam. maculosa, Entwicklungs- bergang der Nieren bey ihr.	Cyermak.	Prag.	Sauerstoffgas, Art, aus dem nach des Ref. Methode erhaltenen, mit kohlensäurehaltigem Wasser übergossen und dem Licht ausgesetzten Gewächsen zu entwickeln.	Hünefeld.	Bonn.
Salam. maxima, vom Professor Schlegel aus Leyden eingesandte Abbildung derselben in natürlicher Größe.	v. Lichtenstein.	Prag.	Saugadern, deren Verhalten in verschied. Organen des Menschen.	Fohmann.	Heidelberg.
Salz, das an d. Baadnellsprungsquelle auswittert; Analyse desselb.	Josf.	Wien.	Saugwürmer, Gründe, daß sie eine eigene Classe ausmachen und Angabe der hieher gehörigen Geschlechter.	Leukart.	Heidelberg.
			Saurier, Geselligkeit der geographischen Verbreitung derselben.	Wiegmann.	Berlin.
			Saurier, fossile Reste eines dem Rachenfaurus am nächsten stehenden, im Museum zu Prag.	Fisinger.	Breslau.
			Scammonium, die im Handel vorkommenden Arten desselben.	Marquart.	Bonn.
			Schacht, Herstellung eines solchen z. Erforschung d. Innern der Erde.	Nürnbergger.	Wien.
			Schädel (mench.), abnorme Beschaffenheit einzelner Theile desselb.	Creve.	Bonn.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Schädelknochen, Dens Entdeckung der Bildung derselben.	Kieser.	Jena.	Schwefelquellen bey Baaden, deren Temperatur.	Specy.	Wien.
Schaf (großbeiniges), Cyclopengehör eines solchen.	Czermak.	Wien.	Schwefelies-Bildung durch Seewasser auf Helgoland.	Goldfuß.	Bonn.
Schafraude, Behandlung derselben.	Häring.	Stuttgart.	Schwefelalkohol, dessen Anwendung in der Heilkunde.	Lampadius.	Dresden.
Schafwäsche, Vortheil derselben im warmen Wasser und bessere Verpackungart der Schafwolle für den Handel.	Wartels.	Prag.	Schwefelkohlenstoff, eigenthümliche Bildung desselben.	Kindt.	Jena.
Schall, größere Intensität desselben bey Nacht.	Berthold.	Bonn.	Schwefelverbindung (neue), welche ein Schwefelstickstoff zu seyn scheint.	Gegory.	Bonn.
Schallversuche, welche zu Paris im Großen ausgeführt wurden, u. die neuesten Experimente darüber.	Gilbert.	Leipzig.	Schwefel, seltene Vorkommnisse davon.	v. Humboldt.	Breslau.
Scharlach, Beobachtungen über denselben.	Hinterberger.	Breslau.	Schwingungs-Apparat, Einrichtung u. Gebrauch eines solchen.	Reich.	Prag.
Schatten (gefärbte) Versuch zur Erklärung der Theorie derselben.	v. Münchow.	Berlin.	Schweißfieber-Epidemie.	Stiebel.	Heidelberg.
Schatten (farb.), Erklärung derselben.	Spann.	Bonn.	Secale cornutum, Wirkungen desselben.	Schneemann u. Kilian.	Bonn.
Schilddrüse, deren Bedeutung.	Huske.	Dresden.	Sechs am Pfluge, neue Stellung desselben.	Sabloukoff.	Jena.
Schilderöten, ihr Vorkommen auf dem Jura.	Hugi.	Frankfurt.	Seebad-Anstalt (orthopädische) bey Schwereningen.	Heine.	Bonn.
Schlagaderneke capillar.	Berres.	Breslau.	Seebäsen.	Olfers.	Hamburg
Schlangen, deren Rückenmuskeln.	St. Dürtheim.	Stuttgart.	Seeboden im Allgemeinen, und insbesondere der, welcher Europa umgibt.	Zeune.	Stuttgart
— Häutung und Bildung derselben.	Arnold.	Stuttgart.	Seerosen, Keimen derselben.	Trevicanus.	Bonn.
— Organisation u. Thränenröhren.	Duvernoy.	Prag.	Seesierne, deren Gefäßsystem.	Volkmann.	Jena.
Schleimhaut der weiblichen Geschlechtstheile, Bildungsverhältnisse derselben.	Berres.	Prag.	Seethiere (merkwürdige), Beobachtungen über deren Lebensweise.	Olfers.	Stuttgart
Schmarotzer-Pflanzen (vollkommene), deren Entwickelung aus den Wurzeln anderer Pflanzen.	Meyer.	Berlin.	Seethiere (verschiedene), Cryptostoma, Polypertus, Aroliden, Holothuria, Fische, Placobranchus.	Rüppell.	Stuttgart.
Schmetterlinge, ganze Züge derselben, welche in Mexico und in der Schweiz vorkommen, die in der Gegend selbst nicht einheimisch sind.	Apes.	Jena.	Sehen, physiologische Bemerkungen über dasselbe.	Plagge.	Berlin.
Schnepfenarten, Wichtigkeit der Anzahl der Schwanzfedern bey ihnen, sammt Diagnose einer neuen Art der Gattung Scolopax.	Peterspi.	Wien.	Sehnerven, ursprüngliche Hohlzigkeit desselben.	Seiler.	Dresden.
Schulterblatt, dessen Bedeutung an mit Skelet versehenen Thieren.	Dken.	Frankfurt.	Seidenbau, dessen Einführung in Deutschland.	Liebig.	Prag.
Schultergelenk.	Weber.	Jena.	Seidenbau in Währen.	Diebel.	Prag.
Schwangerschaft, Versehen bey derselben.	Kremer.	Bonn.	Seidenraupe, Fütterung derselben mit Zweigen.	Zinken.	Hamburg.
Schwarzwald, dessen Geognosie.	Walchner.	Heidelberg.	Seidenraupen, welche sich nicht einspinnen und dennoch ihre Metamorphose vollständig durchlaufen.	Meyer.	Bonn.
Schwefel (grünlicher) in Oberschlesien, dessen Entstehung.	Glecker.	Breslau.	Seidenwürmer, Methode sie aufzuziehen.	Stetler.	München.
Schwefel und Selen.	Frankenheim.	Prag.	Seidenzucht, Vortheile derselben für Böhmen.	Rangheri.	Prag.
Schwefeläther (roher), Beobachtung bey Rectification desselben über kohlensaures Kali.	Wohl.	Bonn.	Seife (arabische).	Meyer.	Bonn.
— vortheilhafteste Anwendung desselben bey der Bereitung mehrerer in demselben löslichen Alkalien.	Kukla.	Prag.	Selbstmord und uneheliche Geburten, unselige Zunahme derselben.	v. Schlieben.	Prag.
			Selbstverbrennung d. menschlichen Körpers, Erklärung derselben.	Hünefeld.	Hamburg.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Seiten, Beobachtung, daß es durch Reiben electrisch werde.	Pleischel.	Wien.	Stahlgeläute, Resultate der Untersuchungen des Ref., ob und inwiefern selbst als Gesag für größere Glocken ausführbar und entsprechend sey.	Wiesenfeld.	Prag.
— dessen Verhältnisse zum Lichte.	Marr.	Hamburg.	Stahlsorten (verschied.), Werth derselben zur Benutzung zu Magnetnadeln und hufeisenförmigen Magneten.	Vollmer.	Stuttgart.
— dessen idioelectrische Eigenschaft.	v. Bunsdorff.	Wien.	Stahlwasser (Klausner), Beschreibung desselben.	v. Holzer.	Heidelberg.
Selenographie, Erläuterung derselben.	Nädder.	Prag.	Stammeln.	Bannsmann.	Breslau.
Semperviva der Flora Deutschlands.	Koch.	Jena.	Stannate oder Verbindungen des Zinkoxydes mit mehreren Basen.	v. Bunsdorff.	Prag.
Sepien (verschiedene).	Carus.	Leipzig.	Staphyloma corneae pellucidum, als normales congenitus bey 3 Geschwistern.	v. Armon.	München.
Sepieney, dessen Bedeutung.	v. Froberg.	Wien.	Stearopten aus dem Primel- und Aurikelföl, aus Birkenrinde; und ein künstlicher aus einem Gemenge von Campherspiritus, Salpetersäure und Terpentinol.	Hünefeld.	Bonn.
Silphium von Syene.	Böttger.	Berlin.	Steinbrüche (Sohlenhofer), Beobachtungen derselben.	v. Schlieben.	Berlin.
Simia capucina.	Wilbrand.	Wien.	Steine, Vorrichtung selbe zu schneiden.	v. Albini.	Wien.
Skenopodus, eine neue Fischgattung.	Nardo.	Wien.	Steinkohlen, deren Bildung.	Reichenbach.	Breslau.
Scrophulosis.	Harless.	Wien.	Steinsäule, deren Structur.	Höppert.	Jena.
Somatica de vita.	Pallatides.	Breslau.	Steinsalz von Wieliczka als den tertiären Formationen angehörig.	Graf Sternberg.	Halle.
Soobäder in Kineburg.	Münchmeyer.	Hamburg.	Sterilität, eine wenig bekannte Ursache derselben, Atropie der vaginalen Portion.	b' Dutrepont.	Heidelberg.
Soolen, Prüfung derselben auf die wahren Kochsalzgehalte.	Hünefeld.	Hamburg.	Stereometrie, Bereicherung u. Erweiterung ders., in Folge der crystallographischen Forschungen.	Rau.	Würzburg.
Sorex, Mittheilung über diese Gattung.	Duvernoy.	Stuttgart.	Sternkatalog und neu berechnete Stundentafeln.	Weisse.	Wien.
Spermatozoen der Insecten.	Hammerichm.	Bonn.	Sternschnuppen, Aufforderung zur Beobachtung derselben.	Gilbert.	Leipzig.
Spermatozoen.	Egerma.	Wien.	— Beobachtung derselben.	Scholz.	Breslau.
Sphærococcus conservoides, im Gelf von Venedig sehr häufig wachsend.	Diassetto.	Prag.	— Beobachtung und ein merkwürdiges Gemitter.	Zawadzky.	Prag.
Sphærococcus crispiformis, die als solche in des Ref. Flora der Vorwelt bezeichneten Gebilde.	Graf Sternberg.	Breslau.	— Materie.	Zennek.	Frankfurt.
Sphæroc. acularis, Versuche des Dr. Nardo aus Venedig, aus demselben durch Sieden eine vorzügliche Gallerte als Heilmittel gegen Lungenkrankheiten zu gewinnen.	Martens.	Stuttgart.	Stern-Verzeichniß (großes), vom Ref. verfaßt, das in St. Petersburg auf Kosten der kön. Academie der Wissenschaften gedruckt wird.	Weisse.	Prag.
Spinnengewebsäden, warum sie im Focus der Brennlinen optischer Instrumente nicht verbrennen.	Münke.	Wien.	Stethoscop, Anwendung desselb.	Müller.	Wien.
Spiralen (verschiedene).	Breithaupt.	Dresden.	Stimmrißbänder d. menschlichen Kehlkopfes.	Münz.	Dresden.
Spiralfaserzellen im Haargeflechte der Trichien.	Corda.	Prag.	Stirpes novae et minus cognitae, eine Abtheilung derselben.	Lehmann.	Wien.
Spitzhorn, Zuckergehalt dess.	Wilbrand.	Breslau.	Stoßkraft flüssiger Körper auf Flächen.	Taurinus.	Heidelberg.
Spitzbergen, Bildung dies. Insel.	Kiehlau.	Berlin.			
Spongien und Aferien.	Nardo.	Breslau.			
Spongien, Untersuchungen derselben und ihrer nächst verwandten Thiergattungen.	Nardo.	Wien.			
Staarkleine, welche in Sachsen vorkommen und Palmen zu seyn scheinen.	Graf Sternberg.	Dresden.			
Stabmagnete (große), Mittheilung des Ref. sie darzustellen.	Weber.	Bonn.			
Stahl, Mittel zur Politur desselben aus Blutstein bereitet.	Engelbrecht.	Dresden.			
Stahl, aus Meteorsteinen verfertigt.	v. Holzer.	Heidelberg.			

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Stoßzähne des Dinotherium von Kaup.	Buchland.	Bonn.	Syphilis, Behandlung derselben ohne Quecksilber.	Ritzgen.	Stuttgart.
Strahlen (lange), welche man wahrnimmt, wenn man im Dunkeln bey sehr genäherten Augenspiegeln ein Licht betrachtet.	Schwerd.		Syringa Josikaea (eine neue) in Siebenbürgen gefunden.	v. Jacquin.	Hamburg.
Strahlenrichtung, Verhältniß derselben zur Gesichtsrichtung.	Bartsch.	Breslau.	<b>Z.</b>		
Strepsiptera, Bemerkungen über diese Insectenordnung.	Heyden.	Stuttgart.	Tabak, Anbau desselben, mit Vorlegung von Proben.	Reum und Thielau.	Jena.
Stromme (electrische), am magnetischen Conductor, deren physiologische Wirkungen nach eigenen Versuchen.	Weber.	Jena.	Tagfalter.	Nickerl.	Prag.
Stratiotes aloides, Beobachtungen über die Samen derselben.	Horkel.	Berlin.	Laftatur, Erklärung und Vorzeigung der vom Ref. erfundenen.	Werneburg.	Jena.
Strychninum und Morphin, Beytrag zur chemischen, besonders gerichtlich-chemischen Entdeckung desselben.	Hünefeld.	Hamburg.	Thäler, deren Bildung durch den Lauf der Flüsse und Einwirkung der Gewässer auf die Erdeinde überhaupt.	Fairholme.	Stuttgart.
Stürme, Häufigkeit derselben im chineesischen Meere.	Zeune.	Wien.	Thätigkeit (höhere geistige) bey Menschen; Erörterung der Frage: Sind die Neufferungen derselben bloß Wirkungen seiner vollkommenen Organisation, oder eines mit diesem in Verbindung stehenden unsterblichen geistigen Wesens, auf dem einzig sicherem Wege der Naturforschung beantwortet?	Messerschmidt.	Prag.
Sublimatbäder, Wirkung ders.	Wedekind.	Bonn.	Tænia, observationes clinicæ de —.	Wairuch.	Wien.
Substanz (neue organische), die der Ref. Phloridzin nennt.	Ronink.	Bonn.	Taubstummheit (simulierte).	Pulst.	Breslau.
Substanzen (emphyreumatische), Ergebnisse neuerer Untersuchungen derselben.	Reichenbach.	Breslau.	Tecoma Bignonia radicans.	Waig.	Bonn.
Substanzen, organische Methode selbe unveränderlich zu erhalten.	Hünefeld.	Bonn.	Teichhoraschnacke, deren Cy, drehende Bewegungen bey der Entwicklung desselben, und deren Beziehung auf den Bau des ausgebildeten Thieres.	Carus.	Halle.
Substanzen (einige neue), Darstellung jener, welche Pelletier im Opium gefunden hatte, nämlich: Paramorphin und Pseudomorphin usw.	Bergelius.	Bonn.	Telegraph, electro-magnetischer des Herrn von Schilling.	Münke.	Bonn.
Subuten, deren herauszugebende Beschreibung.	Glocher.	Stuttgart.	Tellur und Silber, deren Gewinnung aus Tellur-Wismuth oder Tetramit.	Whele.	Wien.
Subutenländer, Beyträge zur mineralogischen Kenntniß ders.	Glocher.	München.	Temperatur eines artesischen Brunnens bey Magdeburg.	Magnus.	Jena.
Süßwasseraltge Deutschlands (eine neue).	Schäbler.	München.	Temperatur gemischter Flüssigkeiten bey Kochen.	Magnus.	Jena.
Süßwasserfische (deutsche), Bemerkungen über die Formen, Körperveränderungen und Lebensweise mehrerer derselben.	Agassiz.	Heidelberg.	Temperaturmessungen (mehrzähr. tägliche) des fließenden Wassers, Resultat derselben.	Eschweiler.	München.
Süßwasser-Quellen, deren Temperatur.	Vollmer.	Stuttgart.	Teplich, dessen Umgebungen in mineralogischer Hinsicht.	Germa.	Halle.
Syphilis, frühere Spuren ders.	Beer.	Würzburg.	Teplich, Abhandlung der geognostischen Beschaffenheit seiner Umgegen mit besonderer Rücksicht auf die Verhältnisse der Braunkohlen- und Kreideformation.	Keserstein.	Prag.
— in der Moldau und Wallachen, und Angabe einer eigenen Therapie gegen Harnröhrenverengerungen.	Meyer.	Breslau.	Teplich, dessen geognost. Verhältniß.	Reuß.	Prag.
— Beobachtungen ders., welche beweisen sollten, daß sie sich heut spontan entwickeln könne.	Ebers.	Breslau.	Termitenart (neue), in den Gewächsh. von Schönbrunn gefund.	Kollar.	Wien.
Syphilis und Krätze, deren Behandlung ohne Quecksilber.	Freid.	Heidelberg.			

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
<b>Testacea, Crustacea und Zoophyta</b> beider Sicilien.	v. Schönberg.	Berlin.	<b>Thiere</b> (nordafrikanische).	Greschmar. Hoff.	Dresden. Bonn.
<b>Testudo graeca</b> , Fortpflanzung derselben.	Wilbrand.	Wien.	<b>Thierfährten</b> , die im bunten Sandstein umweil Hildburghausen vorkommen.		
<b>Theater</b> , zweckmäßigster Bau dess.	Albini.	Wien.	<b>Thierfährten</b> , die Referent kürzlich in der Keuperformation bey Stuttgart gefunden.	Vieninger.	Prag.
<b>Theorie des Magnetismus.</b>	Steinhäuser.	Halle.	<b>Thierknochen</b> , Vorkommen derselben in einem Steinkohlenlager von Stepermark.	Anker.	Wien.
<b>Therapeutik</b> (allgem.), Ideen und Aufgabe derselben als wissenschaftliche Disciplin.	Harles.	Heidelberg.	<b>Thonsäulengestein</b> (merkwürdiges) im Basalte des Vogelgebirges.	Klippstein.	Frankfurt.
<b>Thermograph</b> (neuer).	Morstadt.	Prag.	<b>Thranenwerkzeuge</b> , Entwicklung derselben, und Textur der Jakobsonschen Haut.	Huschke.	Jena.
<b>Thermometer</b> , Einrichtung und Gebrauch dess. zur Höhenmessung.	Baumgärtner.	Wien.	<b>Tonleiter</b> (musikalische), beyde Arten derselben.	Wibdt.	Wien.
<b>Thermometer</b> , Ausdehnung des Quecksilbers darin.	Wig.	Bonn.	<b>Tonmesser</b> (physik. und musik.), Erklärung derselben.	Scheibler.	Stuttgart.
<b>Thermometerbeobachtungen</b> und Aufstellung des Thermometers bey denselben.	v. Kiese.	Bonn.	<b>Topas.</b>	Sillem.	Dresden.
<b>Thermomultiplikator nobilis</b> , von Nervander vorgezeigt und mehrere einfache Apparate für Thermolectricität.	Bergelius.	Bonn.	<b>Topascrystallisationen.</b>	Breithaupt.	Dresden.
<b>Thier</b> (neues, zu den Nagern gehöriges).	Gray.	Hamburg.	<b>Torf.</b>	Mühlwenzl. v. Holzer.	Prag. Jena.
<b>Thier</b> (eigenthümliches fossiles), in der Grauwade gefunden und <i>Bos trichopus antiquus</i> genannt.	Goldfuß.	Bonn.	<b>Tormentillwurzel</b> , Analyse derselben.	Schneemann.	Bonn.
<b>Thier</b> (parasitisches), in den Kiemen von <i>Salmo Lavaretus</i> .	Bartels.	Breslau.	<b>Transfusion des Blutes</b> nach großen Muskelblutungen.	Knuur und Meyer.	Stuttgart.
<b>Thier</b> , in der Nähe von Darmstadt gefunden und von Kaup <i>Dinotherium</i> genannt.	Buckland.	Bonn.	<b>Trappgebilde</b> (schwäbische), Alter derselben.	Textor.	Prag.
<b>Thiere und Pflanzen</b> , Unterschied derselben im Geschlechte.	Schulz.	München.	<b>Traumatische Blutungen</b> , Verhalten derselben, besonders der Nachblutungen.		
<b>Thiere</b> , Heilkraft fester Oele bey Hautkrankheiten derselben.	v. Seckendorff.	Heidelberg.	<b>Trepanation der Wirbelsäule.</b>	Holscher.	Bonn.
<b>Thiere</b> (wilde), Erklärung der Frage: warum viele, welche in alter Zeit Westasien sehr zahlreich bewohnten, jetzt aus jenen Gegenden verschwunden, oder doch in weit geringerer Anzahl zu finden seyen.	Hochstetter.	Stuttgart.	<b>Triboliten</b> , an denen Spuren von Füßen beobachtet wurden.	Goldfuß.	Berlin.
<b>Thiere</b> (wirbellose), deren Organe des Kreislaufes.			<b>Triboliten</b> (böhmische).	Graf.	
<b>Thiere</b> , stufenweise Entwicklung ihrer Organe.	Wilbrand.	Wien.	<b>Triphyllin</b> , ein neues in Baiern gefundenes Mineral.	Sternberg.	Heidelberg. Stuttgart.
<b>Thiere</b> (kamelartige), deren Zellen im Magen und physiologische Bedeutung derselben.	Otto.	Breslau.	<b>Tritonia ascanii</b> , Fortpflanzung derselben.	Sars.	Prag.
<b>Thiere</b> (neue seltene), Bemerkungen über selbe.	Leukart.	Frankfurt.	<b>Tuffablagerungen</b> (merkwürdige) in den Appeninen.	Abich.	Prag.
<b>Thiere</b> (vorweltliche), Uebersicht der im aufgeschwemmten Boden Schiefens bisher gefundenen.	Otto.	Breslau.	<b>Typhus</b> , welcher in den Militärsptälern in Galizien im Winter 1832 herrschte.	Mauthner.	Breslau.
<b>Thiere</b> (vorweltliche) der russisch-polnischen Provinzen.	Eichwald.	Breslau.	<b>Typhus abdominalis</b> , Verwandtschaft desselben mit Febris intermitiens.	Türkheim.	Jena.
			<b>Typhus.</b>	Harles.	
			<b>Typus tertianus</b> , bey dem Winterschlaf des <i>Myoxos Glis</i> .	Bischof v. Alstenforn.	Prag.
			<b>Tyrol</b> und die Tyroler.	Czernak.	Wien.
			<b>II.</b>	Schmiedel.	Prag.
			<b>Unterkiefer</b> , Amputation dess.	Ehrmann.	Heidelberg.



Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Unterkiefer, Amputation der rechten Hälfte desselben.	Ulrich.	Heidelberg.	Vegetation der Moldau.	Eysch.	Stuttgart.
Unterschenkel, Operationen, durch welche die Entstellung desselben behoben wurde.	Blasius.	Prag.	Vena mesaraica bey Haysischen.	Duvernoy.	Stuttgart.
Unterisch., Beschreibung einer Operation, wodurch eine außerordentliche Entstellung desselben, bedingt durch schlechte Heilung eines Knochenbruchs, gänzlich behoben wurde.	Korzeniowsky.	Prag.	Venenschwulst, Erläuterung einer aneurismatischen.	v. Froriep.	Leipzig.
Urfelsarten, Bildung derselben.	Esquerradel		Venosität, krankhafte.	Hendler.	Prag.
Urin, Erörterung der Frage: soll man den kritischen Bodensatz in selbem leicht oder schwer nennen?	Bayo.	Breslau.	Venof., deren wahre Bedeutung.	Sachs.	Wien.
Urinwerkzeuge, Krankheiten dess., namentlich der Prostata.	Schimfo.	Prag.	Verbindung zwischen Mutter u. Kind, Widerlegung dies. Theorie.	Gjermak.	Wien.
Uterus (ungeschwängeter), Ausdehnung desselben.	Stark.	Jena.	Verbrennung, Art sich durch Asbestkleider und Drahtgewebe vor solcher zu schützen, nebst Versuchen.	Udini.	Wien.
Uterns (kreisender), welches Verhältniß hat der Grund desselben zum untern Segment.	Behn.	Hamburg.	Verdauung (künstliche), mit Bemerkungen von Volkmann und Schwan.	Valentin.	Jena.
	Rilian.	Bonn.	Verdauung (künstl.), mit Bemerk. von Valentin u. Volkmann.	Schwan.	Jena.
			Verdauung (künstl.), Hauptresultate der vom Referenten hiezu über angestellten Versuche.	Purkinje.	Prag.
			Verhältniß (wechselseitiges) zwischen den Naturwissenschaften einer Seits und der Landwirtschaft, Forstwissenschaft und dem Gartenbau anderer Seits.	Reum.	Jena.
Vaccinatio de ejus necessitate per totum orbem.	Sacco.	Breslau.	Verhältnisse (geognostische) des nordwestlichen Deutschlands.	Hofmann.	Berlin.
Vaccination, warum nach einer normal verlaufenden — nicht Schutz vor der Pocken-Ansteckung durch das ganze Leben eines Menschen zu erwarten sey?	Fischer.	Breslau.	Vernarbung der Knochen nach der Trepanation.	Weißbrod.	München.
Vaccine, Andeutungen über die Natur desselben.	Zeitschler.	Heidelberg.	Verrenkungen (veraltete), Reduction derselben, nebst Angabe gelungener Fälle.	Roberton.	Bonn.
Vanadin, Entdeckung desselben in den Eisenschlacken der Werke von Dreibach in Rärnthen.	Schrötter.	Prag.	Verfeinerung aus dem Tinkalt.	Audouin.	Bonn.
Varicocele, operative Behandlung Besselers.	Beck.	Stuttgart.	Verfeinerungen Württembergs. — des Kalkgebirges bey Greuth in Baiern.	Zieten.	Hamburg.
Variolaria amara, ein einheimisches Erysimittel der China.	Casseberg.	Frankfurt.	— (künstliche), Bedingungen dazu, durch Versuche erläutert.	Reich.	Stuttgart.
Varioloid.	Kleeberg.	Heidelberg.	— aus der Umgegend von Koburg.	Göppert.	Jena.
Vegetabilien, Erzeugnisse seiner neuern Versuche über die Temperaturveränderungen derselben.	Schüler.	Heidelberg.	— in Gieshieben der Mark Brandenburg.	Berger.	Jena.
Vegetation, Einwirkung der Kälte auf dieselbe.	Göppert.	Heidelberg.	— aus dem Quaderandstein der Grafschaft Glatz.	Zeune.	Breslau.
Veget. (zurückgehaltene), merkwürdiges Beispiel davon unter der Erde von mindestens 40 Jahren.	Voigt.	Jena.	Versuche (landwirtschaftl.) Wesen derselben.	Otto.	Prag.
Veget. (alpische), Einfluß der Höhen und Unterlagen auf dieselbe.			Versuche (landwirtschaftl.) Wesen derselben.	Schweigger.	Jena.
Veget., Character dess. auf den Inseln des indischen Archipels.	Zahlbruckner.	Wien.	Vesica urinaria prolapsus (durch den Nabel).	Weise.	Bonn.
Veget., Einfluß des metallischen Quecksilbers auf dieselbe.	Reinhardt.	Berlin.	Vipera Berus.	v. Froriep.	Stuttgart.
	Göppert.	München.	Viverra hermaphrodita Pallas.	Wagner.	Berlin.
			Vögel, Nothwendigkeit einer neuen Classification derselben.	Otto.	Stuttgart.
			Vögel, von Aristoteles benannt und mit Merkmalen bezeichnet.	Crebschmar.	München.
				Gloger.	Berlin.

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
Vögel, mangelhafte Abbildungen und Beschreibungen derselben.	Meyer.	Hamburg.	Weidenarten, Verzeichniß derselben unter und auf den Zipser Karpathen in Ungarn.	Rump.	Prag.
Vögel Europas; vollständige Naturgeschichte derselben mit besonderer Rücksicht auf Deutschland.	Gloger.	Stuttgard.	Weinbau, Alter und Schicksal des böhmischen und sächsischen.	Dittrich.	Prag.
Vögel (seltenere).	Hornschuh.	Hamburg.	Weine, niederheinische rothe, Verbesserung derselben durch eine Mischung der bisher gebauten Elävener mit Ruländer Reben.	Meibtreu.	Bonn.
Vögel, Variation derselben auf Kamtschatka.	Rittlitz.	Bonn.	Weine, deren Classification.	Martius.	Stuttgard.
Vogelspinne, Anatomie derselb.	St.-Dürtheim.	Stuttgard.	Weingeist, dess. gefärbte Flamme.	Vogel.	München.
Voltzia, Vorkommen und Fructificationen derselben im Koburger Keuper.	Berger.	Stuttgard.	Weinrebe, Früchte derselben.	God.	Stuttgard.
Vorkehund, Fähigkeiten dess.	Diezel.	Heidelberg.	Weinreben aus America.	<sup>Gergg</sup> <del>Pautsch</del> <sup>Wienberg.</sup>	Stuttgard.
Vulkan (polychromatischer), Darstellung desselben auf microchemischem Wege.	Döbereiner.	Jena.	Weinstock, herbstl. Schnitt dess.	Wais.	Bonn.
Vulkane (submarine).	Tillius.	Jena.	Weizen, dessen frühes Schneiden in Süd-Europa.	Kerferstein.	Halle.
Vulkanität des Erdkrabanten.	Nöggerath.	Berlin.	Weltbereisung, vom Ref. in den Jahren 1830 — 1836 unternommen, im Abriß.	Kunze.	Stuttgard.
<b>W.</b>			Weltereise, vom Ref. in den Jahren 1830 — 1836 unternommen, im Abriß.	Baron von Hägel.	Prag.
Wärme des Sommers 1834.	Veltram.	Stuttgard.	Wiesen, Siegener, Anlage und Behandlung derselben.	Bönningshausen.	Bonn.
Wärme, Zunahme derselben nach dem Innern der Erde.	Bischoff aus Bonn.	Bonn.	Wind, dessen regelmäßige Veränderungen in Richtung und Intensität.	Dove.	Berlin.
Wärme, stündlicher Gang ders.	Brandes.	Prag.	Winde, Intensität derselben, und falsche Ableitungen der Windrichtungen bey vielen meteorologischen Beobachtungen.	Frankenheim.	Breslau.
Wärme = Erzeugungskraft kaltschlüriger Thiere.	Berthold.	Bonn.	Winkel, Entwicklung einer neuen Methode, dieselben an den Körpern zu berechnen.	Rau.	Würzburg.
Waldbau, dessen Verbindung mit dem Feldbau.	Grümmer.	Stuttgard.	Winkel, dessen Trisection.	Mihalko.	Breslau.
Wall, Entwicklung eines, der aus verschlucktem Gesteine besteht.	Zippe.	Prag.	Wirbel des Menschen, Zahlengesetz in selben.	Oden.	Berlin.
Wallfische.	Brand und Rugeburg.	Berlin.	Wirbelsäule (menschl.), mehrere Varietäten im Bau derselben.	Regius.	Breslau.
Wallfische, deren Blasen.	Rosenfeld.	Hamburg.	Wismuthblende.	Breithaupt.	Dresden.
Wallfischarten, Bildung ders.	Rosenthal.	Berlin.	Witterungsverhältnisse in Würtemberg, Jahresbericht des Jahres 1833 darüber.	Plieninger.	Stuttgard.
Wasser (Emferz), künstlich bereitet, dessen Wirksamkeit bey scrophulösen Krankheiten.	Reich.	Halle.	— — Bericht über diesel. im J. 1837.	Plieninger.	Prag.
Wasser (mineralisches).	Brandes.	Hamburg.	Volksrachen, Entfischung dess.	Weber.	München.
Wasser des Neufiedler-Sees, Zusammenfügung desselben.	Holger.	Wien.	Würmer und Schnecken, Beschreibungen mehrerer neuen genera und species derselben, die Ref. im mittelländischen Meere gefunden.	Leuckart.	Frankfurt.
Wasserdämpfe, Einwirkung derselben auf bittere Mandeln.	Winkler.	Heidelberg.	Würmer, welche im Obste vorkommen.	Gravenhorst.	Breslau.
Wassernuß, deren Keimung.	Braun.	Stuttgard.	Wundfieber (intermittirendes).	Püders.	Hamburg.
Wasserschne.	Wolff.	Dresden.	Wurmart (eine neue), an den Küsten Siziliens gefunden.	Leuckart.	Heidelberg.
Wasserschne, urbanisches Mittel gegen die —.	Sulzer.	Heidelberg.	Würtemberg, Höhenübersicht desselben.	Schüler.	Halle.
Wasservogel (deutscher, bisher nicht gefannter, sehr auffallend gebildeter), der zwischen Mergus und Anas zu stehen scheint.	Timbeck.	Heidelberg.			
Wasserkreuzer, Erklärung desselben in allen seinen Formen für eine entzündliche Krankheit.	Reich.	Frankfurt.			
Weschelwirkung der Naturwissenschaften u. der Landwirtschaft.	Bujanowicz.	Prag.			
Weichselgosp.	Mentzsch.	Breslau.			

Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.	Gegenstand des Vortrages.	Name des Verfassers.	Ort der Versammlung.
<b>X.</b>			<b>Zoologische und anatomische Arbeiten des Vortragenden.</b>	Brandt.	Bonn.
<b>Xenos</b> , eine Art — im Leibe der <b>Vespa vulgaris</b> .	v. Roser.	Stuttgart.	<b>Zoolog. Gegenstände (mehrere).</b>	Audouin.	Bonn.
<b>Xenos</b> -Arten.	v. Heyden.	Stuttgart.	<b>Zoolog. Beobachtungen, welche der Vortragende während der Erdumsiegung mit K. Krusenstern gemacht hat.</b>	Nilcius.	Prag.
<b>Y.</b>			<b>Zootomische Bemerkungen.</b>	Carus.	Jena.
<b>Zähne</b> , deren röhrlige Bildung.	Rehms.	Jena.	<b>Zucker des diabetischen Harns, eine neue Methode, denselben quantitativ zu bestimmen; und das eigentliche Verhalten der Chromsäure zum diabetischen Harn.</b>	Hünfeld.	Bonn.
<b>Zähne</b> , deren ursprüngliche Mißbildung.	Schulze.	Bonn.	<b>Zuckerbedarf von Deutschland, Berechnung, daß derselbe durch eine entsprechende Ausdehnung des Kunkelrübenaues erzielt werden könne.</b>	Ladiges.	Bonn.
<b>Zahnabgüsse</b> , deren Entstehung beim Fötus.	Arnold.	Stuttgart.	<b>Zuckergehalt im Saft des Spitzahorns u. des sogen. Zuckerahorns.</b>	Wilbrand.	Breslau.
<b>Zahlenzeichen der Griechen zur Bezeichnung der Töne ihrer Musik.</b>	Wilde.	Prag.	<b>Zurechnungs-Fähigkeit und Freiheit in physisch-gerichtlicher Hinsicht.</b>	Stierling.	Hamburg.
<b>Zahlenstern in physiologischer und anatomischer Beziehung.</b>	Olen.	Halle.	<b>Zwerchfellbruch (angeborener), Beobachtungen eines solchen und einer Rehdarmeinschiebung.</b>	v. Krombholz.	Prag.
<b>Zellgewebe</b> , dessen Bildung in den vollkommeneren Gewächsen.	Hayne.	München.	<b>Zwischenkiefersknochen des Menschen.</b>	Weber.	München.
<b>Zellgewebsverhärtung</b> (angeborene) der Neugeborenen beim Drillinggeburt.	Horst.	Bonn.	<b>Zwitterbildung (anscheinende).</b>	Heim.	Bonn.
<b>Zink</b> , dessen Fällung aus sauren Auflösungen durch Schwefelwasserstoffgas.	Frank.	Bonn.	<b>Zwitterbildung an einem 32-jährigen Manne, nebst historisch-physiologischen Bemerkungen.</b>	Ditrich.	Breslau.
<b>Zinkoryd</b> (neues), Darstellung desselben aus essigsaurem Zinkoryd.	Gelseler.	Jena.	<b>Zwittermollusken (einheim.).</b>	Carus.	Bonn.
<b>Zinnober</b> , Erklärung der Darstellung eines dem chinesischen vollkommen ähnlichen.	Weyle.	Wien.			
<b>Zoologie</b> , Geschichte derselben.	Thienemann.	Dresden.			
<b>Zoologische Beobachtungen</b> , als Resultat von des Ref. zweyter Reise um die Welt.	Eichscholz.	Heidelberg.			

# Innhalt der Isis, Jahrgang 1838. Heft I—XII.

## Heft I. A. Nach der Reihe.

- 1 Duquoy, Planmäßigkeit im Weltganzen.
- 4 Schwedische Abhandlungen 1835.
- 6 Dahlbom, über die Nette der Traubenentfchen.
- 9 Sundevall, ornithologischen System; Ypsolophus 20.
- 15 Nilsson, Plesiosaurus in Schweden.
- 22 Zoological Transactions II.
- Sykes, über die Nachteln und Hemipoden Indiens.
- 28 Templeton, wirbellose Thiere von Moriz; Actinia, Xenia, Anisomelus, Piratesa.
- 31 Bonnett, Pteropus whitei.
- 33 Th. Bell, Crustaceen von Südamerika.
- 37 Jarrell, über Tenthredo centifolia in Rüben.
- 39 Rüppell, Histiophorus immaculatus.
- 40 The Edinburgh new Philosophical Journal VI.
- Knor, Beschreibung des Morquais.
- Goldstream, Bau und Lebensart von Limnoria terebrans. Taf. I.
- 45 Duetschlet, Gewicht der Menschen.
- Don, Cascariilavinde.
- 46 Traill, Milch der Wale.
- 47 Harlan, versteinerte Knochen in America.
- 48 Agassiz, über die Rache.
- Dalzell, Fortpflanzung schottischer Zoophyten. Taf. I.
- 54 Jardine, Salmoniden in Southerlandshire.
- 61 Thompson, über Leviathan und Behemoth.
- 64 Wilson, Käfer in Southerland.
- T. Davy, Temperatur der Thunfische.
- 65 Patterson, über eine Berce an der Nordküste von Island. T. I.
- 67 Arthur, über die Thranen der Fische und Antilopen.
- 68 Selby, Säugethiere und Vögel in Southerland.
- 73 Thompson, über Pentacrinus et Comatula. Taf. I.
- Bücher: Weber, Cuvier, British Annals of Medicine, Meirner, Trattenbacher, Rösch, Riecke, Mauthner.

## Heft II.

- 81 Auszüge aus dem philosophischen Magazin. V—XI.
- Abbage, Scapistempel bey Pozzuoli.
- 83 Westwood, neue Mucken.
- 87 Brayley, Daumen = Nagel des Drang = Utangs.
- 88 Jones, Rezhaut der Dintenschnecke.
- Buckland und Agassiz, versteinerte Zähne der Chimera.
- 90 Huffer, Kerntewanze.
- Falconer und Gaultley, über Sivatherium. Taf. II. 104.
- 100 Schomburgk, Mucraly = Gift.
- Kernbeißer.
- Guinoa, Cynomorium, Palmenzucker.
- Spinnen, Immen, Robben.
- 102 Baker und Durand, versteinerte Affe. Taf. II.
- Portlock, Anatifa.
- Newport, Wärme der Kerse.
- 103 Dwen, Toxodon platensis.
- 105 Gatz = Berein von 1837; Germar, Versteinerungen.
- Gornung, Hydroporus thermalis.
- Rimrod, Mäuse, Vögel.
- 111 Kesterstein und Tantscher, Schall bey Nacht.
- 113 Seyffer, Keimfähigkeit unreifer Samen.
- 117 Zoological Transactions. II. 1.
- Bennett, Octodon, Ctenomys.
- 120 Edinburgher n. phil. Journal von Jameson 21 — 23.
- Shaw, der Fisch Parr.
- 126 Thompson, Metamorphose der Krebsse.
- 127 Jameson, Thiere der Insel Gerigo.
- 130 Dierbach, Arzneimittel des Alterthums; Cap. I. Nilch.
- Cap. II. Fett, Salz, Markt usw.

## Heft III.

- 161 Freiheit des Menschen.
- 168 Auszüge aus Zool. Proceedings 1836.
- Brut von Crax.
- Phalangista, Antelope montana.
- Gould, neue Vögel 174. 193. 195. 197. 199. 206. 223.
- Hodgson, Schneepfen in Nepal.
- 170 Ahibaut fängt Giraffen.
- 172 Garner, Classification der Muscheln.
- 176 Dwen, Dintenschnecken, Cranchia, Argonauta.
- 179 Dgilby, Daumen der Affen.
- 181 Martin, Sarama, Corythaix.
- Bennett, indische Antilopen.
- 182 Dwen, Drüsenbälge der Antilopen.
- 185 Macropus penicillatus, Chimpanse, Rostellaria.
- Gliedermäuse aus Nepal, Cervus elaphoides.
- Dwen, Berlegung des Wombats.
- 186 Harvey, Tubularia gracilis.
- Martin, Cynictis melanurus.
- 187 Dgilby, Chironectes Yapock.
- 188 Martin, Knochen der Meerotter.
- Gray, Bifanthiere, Fußgassen der Fische.
- 191 Waterhouse, Myrmecobius fasciatus 219.
- 192 Martin, Cerecoleptes.
- 197 Fuller, Bühnenbaskade.
- 198 Gray, Sohlen = und Behtreter.
- 200 Dwen, Schädel des Drang = Utangs.
- 203 Strickland, Vögel bey Smyrna.
- 205 Dgilby, Antelope Koba et Kob.
- Canis himalaicus, Ixalus 213.
- 207 Martin, Felis marmorata, Koala.
- Bennett, Glaucus.
- 214 Gray, Thier von Argonauta.
- 215 Dwen, Eingeweidewurm, Gnathostoma.
- 217 Bennett, Cachelot.
- 218 Reid, Perameles lagotis.
- 219 Dgilby, Characteres der Wiederfäuer.
- 232 Dierbach, Arzneyen der Alten; Cyer.
- Bücher: Berchold, Sturm, Hoppe und Fünnecke, Rüppell, Schönberg, Dahlbom, Zetterstedt, Guerin, Bischoff, Biedemann, Arnold, Thuet, Schmid, Pommer, Philippi, Gaeßler, Montobel, Bischoff, Herschel.

## Heft IV.

- 250 Waltl, Unterdonaukreis: Mineralien, Pflanzen, Käfer.
- 273 Germar, Calamiten. Taf. III.
- 277 U. Speyer, lepidopterologische Beyträge; Fühlhörner.
- 314 Menetries, Thiere vom Caucasus.
- Bücher: Prinz Mar von Wied, Eitenberg, Züricher, Alterthümer, Sprungli, G. Schreiber, Bobrik, Sommer, Eiselein, Hallische Jahrbücher, Leopoldinische Verhandlungen, Zetterstedt, Pommer.

## Heft V.

- 332 Auszüge aus Asiatic Transact. I—II.
- Moerocroft, Purif = Schaf, Caschemir = Biege, Pferd Klang.
- 333 Rödden, Ficus indica.
- Johnston, Handel von Ceylon, Voluta gravis, Perlhäute.
- 334 Low, weiße Elephanten.
- 336 Hardwicke Schaf = Kiefer.
- Sykes, wilder Hund Golsun.
- 337 Burney, japanisierte Waaren.
- 338 Stewart, Perisicherey.
- 342 Sykes, Bombyx paphia.
- 346 Ratterer, Lepidopteren.
- 351 Hammer Schmidt, helminthologische Beyträge. Taf. IV.
- 358 Ersfeld, Spermatozoen. Taf. IV.

- 360 Büttner, zoologische Bemerkungen.  
 375 Philosophical Magazine by Brewster. XII.  
 — Kennedy, Lebensart verschiedener Immen.  
 378 Falconer und Gantley, verfeinerter Kffe.  
 379 Dgilby, Conilurus, Dipus aus Neuholdand.  
 — Keely, Otus brachyotus.  
 380 Philosophical Journal by Jameson. XXIII—XXV.  
 380 Wight, Summigt-Baum.  
 381 Shaw, Kach der Salmen.  
 384 Bask, Entfaltung der Perlen.  
 Bücher: Tarentow, Gros, Asiatic Transact. I-III, Wiener Annalen II. Perty, Glocker, Fromberg, Nürnberger, Schönherr, J. Fischer, Kröper, Bulletin de Moscou, Freyer, Philosph. Magazine, Philosph. Journal, Frey, Pommer.

## Heft VI.

- 403 Auszüge aus Linn. Transact. XVII.  
 404 Jarrell, Cygnus buccinator.  
 — Leuciscus lancastris, ceruleus.  
 405 GUILDING, Naticina et Dentalium.  
 407 Westwood, Diopsis.  
 411 Galiday und Walker, Immen und Mücken.  
 412 Schudbury, Chamaeleo cristatus, Caccia.  
 413 Westwood, Embia.  
 415 Hamilton, Commentar über Hortus malabaricus IV.  
 449 Bask, türkische Käfer.  
 Bücher: Berghaus, Kewald.

## Heft VII u. VIII.

- 473 Versammlung der Naturforscher und Kertze zu Prag 1837.  
 476 Mitglieder.  
 478 G. v. Sternberg, Eröffnungsrede.  
 485 Bischoff, Abkühlung der Erde.  
 494 Göpper, künstliche Pflanzenverfeinerungen.  
 505 Schaufepie, Einfluß des Branntweins.  
 506 Kenhofsek, Preis auf die Wuthkrankheit.  
 508 Zippe, verflackter Wall.  
 513 Reichenbach, Entwicklung der Naturgeschichte.  
 524 Abschiedsreden.  
 528 Ettlinghausen, magneto-electrische Maschine. Taf. V.  
 — Reuß, Geognosie von Toplis.  
 541 Kaup, Plag des Dinotheriums; 595.  
 — Plieninger, verfeinerte Thierfahrten.  
 544 Fleischer, Diorit in Schlesien.  
 548 Abich, Erhebungs-Grater in der Basilicata.  
 552 Strang, Gase in Erdhöhlen.  
 556 Unger, Samenthier der Pflanzen.  
 561 Ramisch, Samenbildung ohne Befruchtung.  
 — Hügel, Nelumbium speciosum.  
 562 Diafoletto, Metamorphose der Algen.  
 564 Gorda, Spiralfaser: Sellen bei Trichien.  
 565 Fenzl, Samenträger der Kürben.  
 568 Melwitsch, Verbreitung der Pflanzen.  
 571 Dix, Vegetation Böhmens.  
 573 Purkinje, Magenbrüsen. Taf. VI.  
 576 Münz, Herzpolypen; kesselförmige Mißgeburten.  
 580 Berres, Schleimbaut.  
 581 Purkinje, Bau der Nerven. Taf. VI.  
 585 Heller, Blut, Dotter, Federn.  
 587 Purkinje und Poppenheim, Verdauung.  
 592 Caré, Fortpflanzung der Tritonia.  
 597 Kreyßig, Blut und Nerven.  
 600 Skoda, Herzstoß.  
 603 Landwirthschaftliches.  
 611 Gedichte.  
 622 Bücher: Röggerath, G. Bonaparte.

## Heft IX u. X.

- 625 Zeller, Bestimmung der Falter in Neamur.  
 729 Register darüber.  
 735 Neue Preisaufgabe auf alle Falter Neamurs.  
 737 Freyer, Bestimmung der Falter in Neamur.  
 753 Bücher: A. Schreiber, (Cornelia, Dampfschiffahrt), Wolfram, Chezy, P. Schreiber, Combe, Röggerath, Lenz, böh-

mishes Museum, Gesellschaften zu Berlin, Zürich, Basel, Mémoires de Pétersbourg 1836, Mémoires présentés 1837.

- 759 Baer, Maltoß.  
 760 Rathke, Fauna der Krim.  
 771 Gebler, Thiere des tatunischen Gebirgs.  
 778 Siebold und Schlegel, Fauna japonica.  
 784 Bronn, Lethaea geognostica.  
 Heft XI u. XII.  
 785 Duquoy, Skizze der Thierwelt.  
 790 Derselbe, Beantwortung über Unfreyheit.  
 792 Bücher: S. Schreiber (Zafchenbuch), Kaup, Perty, Pring, Mar von Wied, Fumrohr, Bulletin de Moscou, Liebig und Voggenberg, Geognostische Karte von Sachsen, Humboldt, Ehrenberg und Rose, Buckland.  
 — Perleb, Endlicher, Kindey u. Bauer, Corda, Notaris, Brug und Schimper.  
 — Schulz, de Sandelle, Agardh, Meyen, Treviranus, Raspaal, Dutrochet, Eisk, Kunth, Berchtold u. Epiz, Forsten, Veget. Schweiler, Sturm, Eisk.  
 847 Zetterstedt, Fischer, Agassiz, Gould, Zander, Eschsch, Guerin, Germar, Grube, Mayer, Herold, Plattner, Bessing, Grabau, Wilhelm, Kerthoven, Eulshoff.  
 798 Schaudoir, Peronia.  
 800 Eichwald, Fauna des caspischen Meers.  
 802 Harpogon, Ahrend, Gebirgschichten am Adenberg.  
 803 Carefen, Blatt- und Holzwespen; Elater heyeri, Fig.  
 820 Zoological Transact. II. 2.  
 — Garner, Anatomie der Muscheln.  
 831 Owen, seltene Dintenschnecken.  
 838 Fr. Cuvier, Springmäuse.  
 842 Waterhouse, Myrmecobius.  
 845 Westwood, heilige Käfer.  
 849 Gould, Vögel aus Australien.  
 852 Eschsch Classification der Batrachier.  
 860 Gedichte auf die Versammlung zu Prag von Rump, Dietrich, Zauscher.  
 865 Register über die Vorträge in allen Versammlungen der Naturforscher und Kertze von 1822—1837.

## Umschlag.

- I. Vögelbälge; Sommeringischer Preis; Waig, Gypsbalge von verfeinerten Pflanzen; Zetterstedt Insecta lapponica.  
 II. Entomologischer Kaufverein; Grepkins Erklärung.  
 III. Vögel Europas; Walz's türkische Käfer.  
 IV. Zehn, Naturalien-Kauf.  
 V. Fortsetzung; Versammlung der Naturforscher zu Freiburg.  
 VI. Walz, Insecten-Kauf.  
 VII u. VIII. Fortsetzung.  
 IX u. X. Schluß.  
 XI u. XII. Supplement zu Schüller's samml. Werke; Agassiz, Histoire naturelle des Poissons; W. Weinhard, Ernst und Raune; Vögelbälge-Kauf von D. W. Rasenhauer.

## Kupfertafeln.

- Taf. I. Linnoria 50; Serularia 53; Hydra 53; Berot 67; Pentacrinus et Comatula 73.  
 — II. Sivatherium 90; verfeinerter Kffe 102.  
 — III. Salamiten 273.  
 — IV. Eingeweidwürmer und Spermatozoen 351.  
 — V. Magneto-electrische Maschine 530.  
 — VI. Fig. 1—8. Magenbrüsen 573; Fig. 9—20. Bau der Nerven 581.

## B. Nach den Wissenschaften.

## 1. Allgemeines.

- Duquoy, Planmäßigkeit im Weltganzen S. 1.  
 2., Freyheit des Menschen 161.  
 Schaufepie, Einfluß des Branntweins 502.  
 Gedichte von Schwoboda, Rifan, Müller, Frank, Ebert 611.  
 Duquoy, Unfreyheit 790.  
 Gedichte von Rump, Dietrich, Zauscher 860.

## 2. Naturkunde.

Referstein, Schall während der Nacht 111.  
 Versammlung der Naturforscher zu Prag 473.  
 G. v. Sternberg, Eröffnungsrede 478.  
 Reuß, Abkühlung der Erde 485.  
 Ettingshausen, Magneto-electrische Maschine 530. *Zaf. V.*  
 Strang, Explosion in der Erde 552.  
 Register über alle Versammlungen der Naturforscher von 1822  
 bis 1837. S. 865.

## 3. Mineralogie.

Babbage, Serapis-Tempel bei Pozzuoli 81.  
 Zinken, Grünstein 108. Mineralien am Harz 108.  
 Walzl, Unterdonaufreis 250.  
 Zippe, verschlackter Wall 508.  
 Reuß, Geognose von Zöplig 539.  
 Höggerath, Verfeinerung in Galcedon 541.  
 Freinitzer, Geognose von Prag 542.  
 Zippe, Geognose von Böhmen 543.  
 Heller, Selen 544.  
 Reuschner, Diorit aus Schlesien 544.  
 Referstein, Geognose von Zöplig 546.  
 Abich, Erhebungsgeräte 548.  
 Frankenheim, Crystallologie 551.  
 Breithaupt, Verwachsung der Crystalle 551.  
 Strang, Gase in Erdböhlen 552.  
 Wondorff, Labradorstein 554.  
 Reuschner, Geognose der Karpathen 554.  
 Zippe, Kupferstein 556.

## 4. Naturgeschichte.

Schwedische Abhandlungen 1835. S. 4.  
 Philosophical Magazine V—XI. S. 81. — Journal 40. 120.  
 Garvein von 1837. S. 105.  
 Walzl, Unterdonaufreis 250.  
 Asiatic Transactions I—III. S. 332.  
 R. Reichenbach, Stand der Naturgeschichte 513.

## 5. Botanik.

Schomburgk, Moorale-Sift 100.  
 Lambert, Quinoa 100.  
 Ward, Cynomorium 100.  
 Colebrook, Palmenzucker 100.  
 Findley, Verwandtschaft von Orobanchen 105.  
 Germar, Verfeinerungen 105.  
 Lampe, Pflanzen vom Harz 107.  
 Geiffert, Keimung unreifer Samen 113.  
 Walzl, Pflanzen vom Unterdonaufreis 255.  
 Germar, Calamiten 273. *Zaf. III.* 547.  
 Höbden, Bannanen-Baum 333.  
 Johnston, Anbau des Reises auf. 333.  
 Wight, Gummitutt-Baum 380.  
 Don, Tropaeolum, Chymocarpus 414.  
 Nees, indische Solaneen 414.  
 Royle, Lycium dioscoridis 415.  
 De Candolle, Myrsinen 415.  
 Hamilton, Commentar über Hortus malabaricus 415.  
 Göppert, künstliche Verfeinerungen 494.  
 Unger, Samenhiere der Pflanzen 556.  
 Bentham, Leguminosen 559.  
 Reichenbach, natürliche Familien 560.  
 Ramisch, Samenbildung ohne Befruchtung 561.  
 Bügel, Nelumbium 561.  
 Bischoletto, Metamorphose der Algen 562.  
 Unger, Rafflesia 564.  
 Corda, Spiralfaser-Zellen in Pilzen 564.  
 Fenzl, Cucurbitaceen 565.  
 Jäger, Nicotiana 566.  
 Corda, System der Pilze 567.  
 Schmittsch, Verbreitung der Pflanzen 568.  
 Reuschner, Draba stellata 569.  
 Rifan, Pilea maritima 569.  
 Jfiss 1838. Heft 12.

## Dizig, Vegetation Böhmens 571.

## Göppert, Pflanzenfeile 572.

## Pflanzennamen.

Algen 562.  
 Bannan-Baum 333.  
 Befruchtung 561.  
 Calamiten 273. 547.  
 Cascarilla 45.  
 Chymocarpus 414.  
 Cucurbitacea 565.  
 Cynomorium 100.  
 Geographie 568. 571.  
 Gummitutt-Baum 380.  
 Hebreandendron 381.  
 Hortus malabaricus IV. 415.  
 Keimen unreifer Samen 113.  
 Landwirthschaft 603.  
 Leguminosa 539.  
 Lycium dioscoridis 415.  
 Myrsinen 415.  
 Nelumbium 561.  
 Nicotiana 566.  
 Orobanchen 105.  
 Palmfaff 100.  
 Pflanzen vom Passau 255.  
 Pilea maritima 569.  
 Pilze 567.  
 Rafflesia 81. 564.  
 Rhizobotrya 569.  
 Runkelzucker 601.  
 Samenhiere 556.  
 Seilete 572.  
 Solaneen, indische 414.  
 Temperatur 125.  
 Tobby 100.  
 Trichia 564.  
 Verfeinerungen 105, künstliche 494.  
 Moorale 100.

## 6. Zoologie.

Bowen, Evadne nordmanni 4.  
 Dahlbom, Tinea padella 5.  
 Sundevall, System der Vögel 9.  
 Nilsson, Plesiosaurus, Ichthyosaurus 15.  
 Dahlbom, Xpsolophus falleniellus 20.  
 Boheman, Pteromalini 21.  
 Zoological Transact. II. 1. S. 22.  
 Sykes, Wachteln und Semipodien 22.  
 Templeton, wirbellose Thiere von Moris 23.  
 Bennett, Pteropus whitei 31.  
 Bell, Grufaken von Südamerika 33.  
 Jarrell, Tenthredo centifolia 37.  
 Rüppell, Histiopterus indicus 39.  
 Philosophical Journal XVI—XX. S. 40.  
 Knox, Norqual 40.  
 Goldfren, Limnoria terebrans (*Zaf. I.*) 40.  
 Quetelet, Gewicht des Menschen 44.  
 Traill, Milch der Wale 46.  
 Harlan, verfeinerte Knochen 47.  
 Traill, Milchdrüsen der Wale 47.  
 Agassiz, Lachse 48.  
 Dalzell, Fortpflanzung der Zoophyten (*Zaf. I.*) 48.  
 Bardin, Salmen 54.  
 Thompson, Tereudo, Limnoria 60.  
 Knox, Balena rostrata 60.  
 Leviathan und Behemoth 61.  
 Wilson, Käfer in Schottland 64.  
 J. Davy, Temperatur der Thunfische 64.  
 Patterson, Bero (*Zaf. I.*) 65.  
 Arthur, Thieren der Erde und Antilopen 67.  
 Selby, Thiere in Schottland 68.  
 Thompson, Pentacrinus europaeus 73.  
 Philosophical Magazine V—XI. S. 81.  
 Westwood, neue Mücken 83.  
 Braxley, Daumenagel des Drang-Utangs 87.  
 Jones, Reihant der Sepia 88.  
 Rudland und Agassiz, verfeinerte Chimera 88.  
 Guffey, Acarus autumnalis 90.  
 Rüppell, Tellinites 90.  
 Falconer und Gaultley, Sivatherium (*Zaf. II.*) 90.  
 Pithecia leucocephala 110.  
 Nicholson, Coccothraustes 100.  
 Blackwall, neue Spinnen 101.  
 Westwood, Immen 101.  
 Wall, Robben an Island 101.  
 Bader, fossiler Affe (*Zaf. II.*) 102.  
 Portlock, Anatife 103.  
 Newport, Temperatur der Kerse 103.  
 Owen, Toxodon 103.

Gautley, Sivatherium 104.  
 Gernat, Versteinungen 105.  
 Gornung, Hydroporus thermalis 107.  
 Rimrod, Thiere von Mansfeld 108.  
 Versteinungen des Harzes 110.  
 Zoological Transactions II. 1. S. 117.  
 Bennett, Octod. cumingii, Ctenomys 117.  
 Philosophical Journal XXI u. XXII. 120.  
 Shaw, Part 120.  
 Ring, Temperatur der Thiere 125.  
 Thompson, Metamorphose d. Krebs 126.  
 Kamen, Thiere von Grigo 127.  
 Dierbach, Arzneythiere 130.  
 Zoological Proceedings 1836, 168.  
 Heron, Britten von Crax rubra 168.  
 Martin, Phalangista vulpina 168.  
 Rüppell, Antelope montana 168.  
 Gould, neue Vögel 174. 193. 195. 197.  
 199. 206. 223.  
 Hodgson, Schnepfen aus Nepal 169.  
 Zibaut, Giraffen 170.  
 Garner, Classification d. Muscheln 172.  
 Owen, Dintenschnecken 176.  
 Dgilby, Daumen der Affen 179.  
 Martin, Dicholophus, Corythaix 181.  
 Bennett, indische Antilopen 181.  
 Owen, Drüsenbälge derselben 182.  
 Bennett, Macropus poncillatus 185.  
 Owen, Simia troglodytes 185.  
 Broderip, neue Echalthiere 185.  
 Harvey, Kestellaria 185.  
 Hodgson, Fiebermäuse aus Nepal; Cervus elaphoides 185.  
 Yarell, britische Fische 185.  
 Owen, Wombat 185.  
 Harvey, Tubularia gracilis 186.  
 Martin, Cynictis melanurus 186.  
 Dgilby, Chironectes yapock 187.  
 Martin, Knochen der Meerotter 189.  
 Burton, Tiliqua fernandi 188.  
 Gray, Bisamthiere 188.  
 Derselbe, Quasten der Fische 190.  
 Waterhouse, Myrmecobius fasciatus 191. 219.  
 Martin, Octodon cumingii 192.  
 Williamson, Vögel in England 191.  
 Harvey, Veicola 191.  
 Vigors, Tinamotis, Psittacus 195.  
 Martin, Cerculeptes 196.  
 Fuller, Sünderbafarde 197.  
 Gray, Eohlen- und Zehrenter 198.  
 Owen, Schädel vom Drang 200.  
 Strickland, Vögel von Smyrna 203.  
 Dgilby, Antelope Koba et Kob 205.

Gray, Betragen des Guckucks 205.  
 Macay, Vultur papa 207.  
 Martin, Felis marmorata; Koala 207.  
 Burton, Pipra von Himalaya 208.  
 Bennett, Glaucus 209.  
 Dgilby, Genssen, Ixalus 213.  
 Gray, Argonauta 214.  
 Owen, Gnathostoma 215.  
 Bennett, Physeter 217.  
 Reid, Perameles lagotis 208.  
 Dgilby, Kennzeichen d. Wiederkäfer 219.  
 Dierbach, Arzneyvögel 232.  
 Gorda, Zerlegung der Hydra 249.  
 Diesing, Axine 249.  
 Walzl, Käfer um Passau 263.  
 Spener, lepidopterologische Beiträge, Fühlhörner 277.  
 Derselbe, Nebenaugen 311.  
 Menetries, Thiere vom Caucasus 314.  
 Asiatic Transactions I—III. 332.  
 Moorecroft, Puril-Schaf 332.  
 Johnston, Voluta gravis 333.  
 Low, weiße Elephanten 334.  
 Hardwicke, Schaffreier 336.  
 Sykes, wilder Hund, Golsun 336.  
 Steuart, Perlfischerei 338.  
 Sykes, Seidenwurm, Bombyx paphia 342.  
 Ratterer, Lepidopteren 346.  
 Hammer Schmidt, helminthologische Beiträge (Zaf. IV.) 351.  
 Büttner, zoologische Bemerkungen 360.  
 Kennedy, Lebensart der Immen 375.  
 Falconer, versteinerte Affe 375.  
 Dgilby, Conilurus et Dipus 379.  
 Realy, Otus brachyotus 379.  
 Shaw, Raig der Salmen 381.  
 Walzl, Entstehung der Perlen 384.  
 Dierbach, Arzneythiere, Lurche 389.  
 Yarell, Cygnus buccinator 404.  
 Derselbe, Leuciscus lancastriensis, caeruleus 404.  
 Buckland, Faultkier 405.  
 Guilding, Natica et Dentalium 405.  
 Westwood, Diopsis 407.  
 Haliday, Immen von Südamerika 411.  
 Walker, Mucken daher 412.  
 Stutchbury, Chamæleo cristatus, Cæcilia squalostoma 412.  
 Westwood, Embia 413.  
 Hope, Dolichoscelis 413.  
 Garner, Nerven der Echalthiere 414.  
 Walzl, türkische Käfer 449.  
 Kaup, Dintotherium 541.

#### Z h i e r n a m e n.

Acarus autumnalis 90.  
 Actinia 28. 48. 50.  
 Actinodura 174.  
 Affendaumen 179.  
 Affen, versteinerte 102. 378.  
 Alactaga 224. 838.  
 Alauda 109.  
 Aleyonum 51.  
 Alpenwolf 775.  
 Amadina 265.  
 Amathia 705.  
 Amphitrite 770.  
 Anguilla 103.  
 Anguilla 358.  
 Anguillina 358.  
 Anisomelus 29.  
 Anomopsis 847.  
 Antelope 67. 213. indica Batrachier 652.  
 montana 168, subgutta-  
 rosa 316.  
 Anthropoides 181.  
 Apocera 86.  
 Apollon 193.  
 Arcticon 593.  
 Ardea 109.  
 Argonauta 176. 205. 214.  
 835.  
 Artemia 767.  
 Arzneythiere 389.  
 Axine 250.  
 Azurine 405.  
 Bären 596.  
 Bafard vom Euhn 197.  
 Balena rostrata 47. 60.  
 Batrachier 652.  
 Belemoth 63.  
 Beroë (Z. I.) 65.  
 Biber 594.  
 Bisamthier 189.  
 Bittacomorpha 84.  
 Blattwespen 803.  
 Blut 585. 597.  
 Bobac 774.  
 Bombyx paphia 344.  
 Bopyrus 766.  
 Bostrychus 362.  
 Brust der Fische 575.  
 Büffel 63.  
 Bullulina 357.  
 Cæcilia squalostoma 412.  
 Calliope 223.  
 Calodera 206.

Pleninger, Thierfährten 541.  
 Otto, Versteinungen 546.  
 Jäger, Mastodonsaurus 547.  
 Unger, Samenhiere der Pflanzen 556.  
 Gernat, Nierentnäuel 573.  
 Berres, Anastomosen der Darmkanäle 573.  
 Purkinje, Magenbrüden (Z. VI.) 573.  
 Ring, Herzpolypen; klopflöse Rißgebürten 576.  
 Berres, Muskeln an den Synovial-Capseln 580.  
 Purkinje, Nerven-Gylinder (Z. VI.) 581.  
 Keller, Blut, Dotter, Fibern 585.  
 Boddaek, Nerven der Hornhaut 587.  
 Purkinje und Poppensheim, Verdauung 587.  
 Schlegel, Salamandra maxima 591.  
 Sars, Fortpflanzung der Tritonia 592.  
 Zilefius, Thiere auf seiner Weltumfer-  
 gelung 592.  
 Schulte, Macrobiotus 593.  
 Rossmäßer, Verbreitung der Land- u.  
 Wasserfische 594.  
 Kaup, Maß des Dintotheriums 594.  
 Vichtenstein, versteinerte Rasthornpan-  
 zer 595.  
 Kreißig, Blut und Nerven 597.  
 Seda, Herzkloß 600.  
 Keller, Bestimmung von Reamurs Fal-  
 tern 625.  
 Preisaufgabe über alle Kerse von Ream-  
 ur 736.  
 Freyer, Bestimmung von Reamurs Fal-  
 tern 737.  
 Barr, Walros 759.  
 Rathé, Fauna der Krin 760.  
 Gebler, Thiere des katurisch. Gebirgs 771.  
 Siebold und Schlegel, japanische  
 Fische 778.  
 Duquoy, Skizze der Thierwelt 785.  
 Gaudin, Feroma 788.  
 Eichwald, Thiere des caspischen Meeres  
 800.  
 Mannerheim, Zahl der Käfer 801.  
 Sarsen, Blatt- und Holzwespen 803.  
 Derselbe, Elater heyeri (Figur) 805.  
 Garner, Anatomie der Echalthiere 820.  
 Owen, neue Dintenschnecken 831.  
 Fr. Guvier, Springmäuse 838.  
 Waterhouse, Myrmecobius 842.  
 Westwood, heilige Käfer 846.  
 Gould, australische Vögel 849.  
 Aschudi, Batrachier 852.

Calyptorhynchus 207.  
 Canis aureus 315. decan-  
 nensis 336, himalaicus  
 205.  
 Capra ibex 772.  
 Cercopithecus 196.  
 Cerigo 127.  
 Cerzodia 84.  
 Cervus aristoteli 384.  
 elaphoides 185.  
 Chamæleo cristatus 412.  
 Chank 333.  
 Char 59.  
 Charaktere 198. 219.  
 Chimæra 88.  
 Chiracanthus 595.  
 Chironectes yapock 187.  
 Chrysomela armoracia 364.  
 Cinnurina 360.  
 Citellus 774.  
 Clausilia 594.  
 Clepsidrina 355.  
 Colson 336.  
 Coccolhrastes 100.  
 Coluber herus 365.  
 Conilurus 379.  
 Corythaix 181.  
 Columen 22.  
 Cracticus 207.  
 Crax 168.  
 Cristatella 49.  
 Crustaceen 764.  
 Ctenomys 117.  
 Cygnus buccinator 404.



- Cynictis melanurus 180.  
Cynogale 198.  
Cursorsius rufus 196.  
Darmfloden 585.  
Deletrix 101.  
Delphinus 46.  
Dendrobis 118.  
Dentalium 406.  
Dhole 336.  
Dichelesthium 768.  
Dicholophus 181.  
Djiran 316.  
Dipilus 361.  
Dinothierium 541. 594.  
Dintenschneden 176. 831.  
Diodontus 376.  
Diopsis 407.  
Diptera 63.  
Dipus 538.  
Dolichoscelis 413.  
Dotter 586.  
Edolus 168.  
Eingeweidwürmer 215. 351.  
595.  
Elater heyeri 805, segentis 361.  
Glenn 367.  
Glephanten, weiße 334.  
Embia 413.  
Epialtus 37.  
Evadne 4.  
Falter 171. Fühlhörner 277.  
— Reaumurs 625. 737.  
Felia marmorata 207.  
Feronia 798.  
Filarina 358.  
Fische 54. 593. 761.  
Flamingo 317.  
Fledermäuse aus Nepal 185.  
Flustra 49.  
Frosch 369.  
Fühlhörner der Falter 277.  
Gallinula ventralis 197.  
Gelenkmuskeln 580.  
Gerbillus 838.  
Gewicht des Menschen 45.  
Giraffen 170.  
Glaucus 209.  
Gnathostoma 216.  
Grayning 404.  
Grey 56.  
Grus 109.  
Guckuck 205.  
Gynoplistia 83.  
Hamatops 326.  
Händschabe 7.  
Hemipodius 22.  
Herling 56.  
Herzpolyp 576.  
Herzstos 600.  
Heteroclitus 24.  
Hiob 61.  
Hirsch 67.  
Hippobosca 361.  
Histophorus 39.  
Hornhaut-Nerven 587.  
Hunderstund 368.  
Hyale 765.  
Hyas 35.  
Hydra 48. 249.  
Hydroporus thermalis 107.  
Ichthyosaurus 19.  
Immen 101. Lebensart 375.  
Isbis 775.  
Ixalus 213. 221.  
Janthina 127.  
Käfer 64. 771, um Passan 263, türksche 449.  
Karpfen 208.  
Kerfe 37. 801, schädliche 369, aus Südamerica 411.  
Kittia cincla 169.  
Kleinfaffen 203.  
Koala 208.  
Kob 205.  
Koba 205.  
Kolisurra 342.  
Korrigum 205.  
Korrigum 205.  
Kalter 171. Fühlhörner 277.  
— Reaumurs 625. 737.  
Krebse 33.  
Lagomys 772.  
Lach der Salmen 381.  
Lepidophora 85.  
Lepidosiren 346.  
Lepus hybridus 205.  
Lepus variabilis 367.  
Lernaeopoda 768.  
Leuciscus coeruleus 405.  
— lancastriensis 401.  
Leviathan 61.  
Limnoria (X. I.) 40. 60.  
Lurche 778, versleinerte 15.  
Lycoris 769.  
Macrobrotus 593.  
Macropus penicillatus 185.  
Macrotis 219.  
Magenbrühen (X. VI.) 573.  
Mastodon saurus 547.  
Medusa minutissima 53.  
Mercurer 188.  
Megalosaurus 61.  
Meisen 267.  
Melipha 225.  
Metamorphose 126.  
Microthynchus 33.  
Midas 84.  
Milch 46.  
Missgeburt 578. 596.  
Moschus 772.  
Mithras 35.  
Muscheln 172.  
Myrmecobius 191. 219. 842.  
Mytilus lithophagus 81.  
Natica 405.  
Nebenans 311.  
Nemestrina 85.  
Neomphala 226.  
Neritina 594.  
Nervenbau (X. VI.) 581.  
Nierenknäuel 573.  
Noctua segetum 361.  
Obelia 2.  
Ocelli 311.  
Octodon 117. 192.  
Ocyrtus 224.  
Ocythoe 213.  
Odynerus 377.  
Ostrera 361.  
Ophiops 137.  
Orang 592, — Nigeli 87, — Schädli 200.  
Ortyx 37.  
Orythia 53.  
Othonia 36.  
Otus brachyotus 379.  
Oxyura 197.  
Oxyuris 352.  
Pagiura 360.  
Palaeon 126.  
Pangonia 87.  
Paradoxornis 174.  
Paradoxurus 198.  
Parametes 218.  
Parr 120. 381.  
Pentactenus europaeus (X. I.) 73.  
Pericaria 36.  
Perlen 333. 338. 384.  
Petroica 206.  
Phalangista vulpina 168.  
Phasianus colchicus 316.  
Philopoda 85.  
Physeta 217.  
Picus 109.  
Pipra squalida 209.  
Piratesa 30.  
Pisa 35.  
Pithecia 100.  
Placodus 107.  
Planula 49.  
Plesiosaurus 17.  
Podiceps 227.  
Poëphagomys 117.  
Polypener 49.  
Pongo 201.  
Prawn 126.  
Preis auf Reaumurs Kerfe 736.  
Prox 221.  
Psittacus augustus, guil-dingii 195.  
Pterocles 24.  
Pteropus whitei 31.  
Ptilogyna 83.  
Pule 387.  
Purci-Schaf 332.  
Pyxinia 357.  
Quasten der Fische 190.  
Raubthiere 198.  
Rhinceros 595.  
Rhizina 356.  
Rhodia 34.  
Rhodizon-Säure 585.  
Robben 101.  
Rorqual 40.  
Rostellaria 185.  
Salamandra maxima 591.  
Salmo 48. 54. 120.  
Säugethiere 68. 108. 772.  
Samenthiere d. Pflanz. 556.  
Scarabaeus 846.  
Scelages 815.  
Schaffreter 336.  
Schaltiere 820.  
Schleimhaut 580.  
Schnecken 594.  
Schneppen 169.  
Schmacker 830.  
Schneckenener 592.  
Schmalblättrig 366.  
Scyphus 762.  
Scytalopus 199.  
Seidenwürmer 342.  
Seidenzucht 608.  
Sennopithecus 102.  
Sepia, Retina 88.  
Sertularia 49.  
Simia troglodytes 165.  
Sivatherium (X. II.) 90. 104.  
Sorex 249.  
Spermatozoa 358.  
Spermophilus musica 315.  
Spinnen 101.  
Spirulura 360.  
Sprat 126.  
Strahlthiere 770.  
Strix castanops 213.  
Struthia 225.  
Südwallis 206.  
Tabanus 364.  
Tamatia bicincta 195.  
Tania 61.  
Tellinites 90.  
Temperatur 125, der Fische 64, der Kerfe 103.  
Tenthredo centifoliae 37.  
Teredo 60.  
Tetracaulodon 47.  
Thiere 127. 771, des caspi-schen Meeres 800, des Caucasus 800, in Euro-land 360, der Krim 760, in Indien 384.  
Thierarzneyen 232.  
Thierfährten 541.  
Thoe 34.  
Thoraxophorus 798.  
Thürangruben 67, der An-tipelen 162.  
Thryothorus 199.  
Ziger 315. 384.  
Tiliqua fernandi 188.  
Tinamotis 195.  
Tinea padella 5.  
Toxodon 113.  
Transfusion 581.  
Triolobites 107.  
Tripoxylon 376.  
Tristoma 248.  
Troglodytes 199.  
Tropidorrhynchus 225.  
Turdus roseus 316.  
Tubularia 49. 186.  
Tyche 36.  
Vanga 224.  
Velella 194.  
Verdauung 587.  
Verfeinerungen 103. 546.  
Vögel 127. 194. 203. 206.  
224. 772. 849. 969.  
Voluta gravis 333.  
Vultur para 207.  
Wachsteln 22, Wachtelfang 127.  
Walfischmilch 46. 47.  
Walroß 759.  
White-Bait 126.  
Wiederkäuer 219.  
Wombat 185.  
Würmer 768.  
Xylosophus 20.  
Kenia 28.  
Baumföng 199.  
Bitterbögen 208.  
Zoe 126.  
Zobel 776.  
Zoophyta 48.  
Zosterops 193.

## 7. Landwirtschaft und Technologie.

- Rekter, Zuckerraffinerie, Filtrier-Apparat 604.  
Seidl, Alter einer Fichte 605.  
Waniet, schädliche Insekten-Larven im Krapp 606.  
Riese, Landwirtschaft 606.  
Rangheri, Seidenzucht 608.  
Wagner, Runkelzucker 608.

## C. Verfasser.

### a) Verfasser der Aufsätze.

- Abich 548.  
Baffa 48. 89.  
Abend 802.  
Ardenhausen 804.  
Arthur 67.  
Baller 102.  
Ball 101.  
Baber 337.  
Baer 759.  
Baker 102.  
Ball 101.  
Batta 554.  
Bell 33.  
Bennett 31. 117. 181. 185.  
209. 217.  
Bentham 559. 566.  
Berres 573. 580. 585.  
Bisioletto 562.  
Bischoff 485. 581. 587.  
Blackwall 90. 101.  
Bochdalek 567.

- Borsdorf 554.  
 Bowler 337.  
 Brandt 249.  
 Brayley 83. 87.  
 Breithaupt 551.  
 Broderip 185.  
 Brown 81.  
 Buckland 88. 405.  
 Bujanowicz 603.  
 Buquoy 785.  
 Burney 337.  
 Burton 205.  
 Büttner 360.  
 Cautley 90. 104.  
 Chaudoir 798.  
 Chaussepix 502.  
 Goldstream 40.  
 Colebrooke 100.  
 Corda 249. 564. 567.  
 Cr. Cuvier 838.  
 Czermak 573.  
 Dahlbom 5.  
 Dalzell 48.  
 Davy 61.  
 De Candolle 415.  
 Dierbach 130. 232. 389.  
 Diefing 248. 249. 595.  
 Dietrich 604. 861.  
 Don 45. 414.  
 Durand 102.  
 Ebert 607.  
 Edlenbach 555.  
 Eichwald 800.  
 Ettingshausen 530.  
 Falconer 90.  
 Fenzl 565.  
 Frankenheim 551.  
 Frantzl 616.  
 Freyer 737.  
 Fuller 172.  
 Garner 192. 272. 414. 820.  
 Geblert 771.  
 Germar 105. 273. 547.  
 Göppert 494. 572.  
 Gould 169. 174. 193. 195.  
 197. 199. 206. 223. 849.  
 Graham 380.  
 Gray 188. 198. 205. 214.  
 Guilding 405.  
 Haliday 411.  
 Hamilton 315.  
 Hammer Schmidt 351.  
 Hampe 107. 802.  
 Hardwidge 336.  
 Harlan 47.  
 Harzverein 802.  
 Harvey 186. 208.  
 Hebel 315.  
 Heller 544. 585.  
 Heron 168.  
 Hodgson 169. 185.  
 Hope 413.  
 Hornung 107.  
 Hügel 561.  
 Hufsey 90.  
 Hyrtl 585.  
 Jäger 544. 566.  
 Jarneson 127.  
 Jardine 54.  
 Jaffe 208.  
 Johnston 333.  
 Jones 88.  
 Kahlert 594.  
 Kaup 594.  
 Keferstein 111. 546.  
 Kennedy 375.  
 King 125.  
 Klippstein 541.  
 Knor 40. 60.  
 Kohen 587.  
 Kreßig 597.  
 Krombholz 865. 768.  
 Kruidich 798.  
 Lambert 100.  
 Lenhoffert 506.  
 Lichtenstein 593.  
 Lindley 105.  
 Low 334.  
 Lunniger 595.  
 Maday 207.  
 Mannenheim 800.  
 Martin 168. 181. 186. 188.  
 192. 196. 207. 208.  
 Menetries 314.  
 Meyer 249. 553.  
 Mitau 569. 612.  
 Mitchell 379.  
 Moorcroft 332.  
 Motschoulsky 798.  
 Müller 615.  
 Münz 576.  
 Ratterer 346.  
 Raumann 543.  
 Reely 379.  
 Rees 411.  
 Reßler 604.  
 Newport 105.  
 Richardson 100.  
 Rileson 15.  
 Röggerath 524. 541.  
 Röbben 333.  
 Rgilby 179. 187. 205. 219.  
 379.  
 Dpiz 567. 571.  
 Duchaßoff 800.  
 Ditto 546.  
 Dwen 103. 176. 182. 185.  
 200. 215. 831.  
 Dornelle 126.  
 Darrot 759.  
 Datterfon 65.  
 Dew 337.  
 Dleninger 541. 609.  
 Doppenheim 587.  
 Dordlock 103.  
 Dreiningen 542.  
 Duffing 573. 581. 587.  
 Luetelet 45.  
 Namisch 561.  
 L. Reichenbach 560. 570.  
 Neuf 539.  
 Noßmähler 556.  
 Noyle 415.  
 Nudberg 537.  
 Nangheri 608.  
 Nathte 760.  
 Neade 102.  
 Reid 218.  
 Reich 537.  
 Rimrod 108. 803.  
 Noßmähler 594.  
 Rummy 560.  
 Rüppell 39. 90. 169.  
 Sars 592.  
 Sarsen 803. 805.  
 Schlegel 591.  
 Schomburgk 100.  
 Schulze 593.  
 Seidl 605.  
 Selby 68.  
 Seiffer 113.  
 Shaw 120. 381.  
 Speyer 277.  
 Sternberg 478. 508. 541.  
 Struatt 338.  
 Strang 552.  
 Strickland 205.  
 Stutchbury 412.  
 Sundevall 9.  
 Swoboda 611.  
 Sydes 22. 336. 342.  
 Tauscher 111.  
 Tausch 569.  
 Tauscher 332. 863.  
 Templeton 28.  
 Thibaut 170.  
 Thompson 60. 61. 73. 126.  
 Tilejus 592.  
 Traill 46. 47.  
 Trubdi 853.  
 Unger 556.  
 Ugors 193.  
 Walfer 412.  
 Wabst 250. 263. 384. 449.  
 Ward 100.  
 Waterhouse 191. 219. 842.  
 Welwitsh 568. 669.  
 Westwood 83. 101. 413. 845.  
 Wight 380.  
 Wilbrand 575.  
 Williamson 194.  
 Wilson 64.  
 Warrall 37. 404.  
 Wamadsky 555.  
 Weller 625.  
 Zellner 556.  
 Zentner 544. 554. 556.  
 Zindken 108.  
 Zippe 508. 543. 556.  
 Zoubhoff 797.

## b) Verfasser der Bücher.

- Ugarth 816.  
 Ugassig 809. 848.  
 Arnold 231.  
 Annalen, Wiener 345.  
 Annales de Medicine 77.  
 Asiatic Transactions 332.  
 Baeler, Gesellschaft 759.  
 Bauer 812.  
 Berchtold 817.  
 Berghaus 401.  
 Berliner Gesellschaft 759.  
 Bischoff 230. 240.  
 Bobrit 216.  
 Bonaparte 622.  
 Bronn 784.  
 Bruch 815.  
 Buckland 809.  
 Chezy 754.  
 Gombé 756.  
 Corda 813.  
 Gotta 808.  
 Cuvier 77.  
 Dahlbom 229.  
 De Candolle 816.  
 Dutrochet 816.  
 Duvernoy 77.  
 Echtermeyer 248.  
 Ehrenberg 808.  
 Eiselein 247.  
 Eitenberg 241.  
 Endlicher 812.  
 Fischer 848.  
 Forsten 818.  
 Frey 388.  
 Freyer 374.  
 Fromberg 349.  
 Fürnrohr 796.  
 Germar 855.  
 Glocker 348.  
 Gould 819.  
 Grabau 859.  
 Groos 327.  
 Grube 856.  
 Guerin 229. 854.  
 Hegetschweiler 818.  
 Häler 239.  
 Herold 857.  
 Herschel 240.  
 Hülshoff 860.  
 Humboldt 808.  
 Journal, philos. 380.  
 Keller 759.  
 Kerthoven 860.  
 Kröyer 372.  
 Kunth 817.  
 Kaurillard 77.  
 Leng 757.  
 Leopoldin. Academie 248.  
 Lessing 859.  
 Ewald 402.  
 Liebig 806.  
 Lindley 812.  
 Link 816.  
 Magazine, philosophical  
 XII. 375.  
 Nauffner 80.  
 Mayer 857.  
 Mémoires de Pétersb. 759.  
 Mémoires présentés 760.  
 Menetries 314.  
 Meisner 78.  
 Meyen 816.  
 Moscou, Bulletin 373. 797.  
 Museum, böhmisches 758.  
 Raumann 807.  
 Röggerath 622. 756.  
 Rotaris 814.  
 Dpiz 817.  
 Perleb 810.  
 Perly 347. 794.  
 Philipp 238.  
 Plattner 858.  
 Poggendorff 806.  
 Pommer 238. 320. 400.  
 Rappail 816.  
 Riecke 79.  
 Rösch 79.  
 Rose 808.  
 Ruge 248.  
 Rüppell 227.  
 Schimper 815.  
 Schlegel 778.  
 Schmid 232.  
 Schönherr 228. 371.  
 A. Schreiber 753. 754.  
 S. Schreiber 246. 755. 792.  
 Schulz 816.  
 Siebold 778.  
 Sommer 217.  
 Sprungli 245.  
 Sturm 819.  
 Thuet 231.  
 Liebmann 230.  
 Transact. linean. 403.  
 Transact. zool. 820.  
 Trattenbacher 79.  
 Trentowit 321.  
 Trevisanus 816.  
 Trubdi 852.  
 Montobeli 239.  
 Weber 75.  
 Wied 794.  
 Wilhelm 860.  
 Wilstram 753.  
 Zander 851.  
 Zetterstedt 229. 320. 847.  
 Züricher Alterthümer 244.  
 Züricher Gesellschaft 759.

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. I.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei G. A. Brochhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

## Ankündigung.

Das seit Anfang dieses Jahres erscheinende

### Leipziger Kreisblatt

wird von 1838 an im Verlage der unterzeichneten Buchhandlung fortgesetzt und wöchentlich dreimal, Montags, Mittwochs und Freitags Abends, ein halber Bogen auf seinem weißen Maschinenpapier ausgegeben.

Das Leipziger Kreisblatt wird seinen zweiten Jahrgang, nach mehrseitigen Wünschen, in wieder erweiterter Ausdehnung beginnen. Wie bisher zerfällt es in zwei Abtheilungen. Die erste Abtheilung bleibt, da die königliche hohe Kreisdirection zu Leipzig und das dasige königliche hohe Appellationsgericht dieses Blatt zur Veröffentlichung der von ihnen zu erlassenden Bekanntmachungen und Anordnungen allgemeiner Inhalts fortwährend zu benutzen gesonnen sind, und zu gleichem Behufe dasselbe auch den königlichen Amtshauptmannschaften des leipziger Kreisdirectionsbezirks, sowie dem königlichen Kreissteuerrathe zu Leipzig dienen wird, für die Bekanntmachungen und Anordnungen dieser Behörden bestimmt.

Dagegen soll von nun an die andere Abtheilung lediglich der Besprechung vaterländischer und des Vaterland berührender Angelegenheiten und Ereignisse in jeglicher Beziehung, theils in ausführlicheren Aufsätzen, theils in kürzern Mittheilungen gewidmet sein. Es soll dieselbe dem gesammten Publicum einen Sprachsaal bieten zum Austausch der Ideen und Erfahrungen, zur Ausgleichung verschiedener Ansichten und zur endlichen Verständigung. Insbesondere sollen hier die Landesverfassung und die Geseze Sachsens erörtert; die Angelegenheiten der Kirche und Schule, insoweit sie vor des größere Publicum gehören, beraten; neue Ideen, Projecte und Erfahrungen in Beziehung auf Landwirthschaft, Industrie und Handel, Gewerbe und Fabrikwesen dargelegt und geprüft; interessante Berichte über den Fortgang und die Ergebnisse gemeinnütziger Unternehmungen abgefaßt; wohlgeordnete Vorschläge zum allgemeinen Besten mitgetheilt und begutachtet; Rügen und Beschwerden mit obler Freimüthigkeit angebracht; Aufklärungen über Justiz und Verwaltung gegeben; polizeiliche und andere Mafregeln genauer betrachtet, und überhaupt soll Alles besprochen werden, was in obiger Beziehung für den sächsischen Staatsbürger nur irgend von Interesse sein kann. Auch werden zweckmäßige Einrichtungen, vortheilhafte Unternehmungen, sowie glückliche und unglückliche Ereignisse im Auslande, vorzüglich in Deutschland, ausführliche oder kurze Erwähnung finden, je nachdem sie Sachen mehr oder weniger berühren. Möglichst vollständig und schnell sollen alle Ereignisse und Vorfälle im Vaterlande berichtet werden, und wo die Gegenwart nicht ausreichenden Stoff gewährt, wird es die Vergangenheit thun. Namentlich soll die Specialgeschichte Sachsens durch interessante Einzelheiten mehr und mehr aufgeheilt, jedoch sollen nicht etwa bloß trockene Notizen beigebracht, sondern es wird ganz besonders auf die Unterhaltung Rücksicht genommen werden.

Wie gethler sollen von Sonn- und Festtagen das Verzeichniß der Prediger in Leipzig gegeben, wöchentlich zweimal der Cours der vorzüglichsten Papiere und Geldsorten an der leipziger Börse, sowie der gangbarsten Actien, und monatlich der Getreidepreis auf den vorzüglichsten Marktplätzen Sachsens mitgetheilt werden; auch wird wöchentlich der in Leipzig Verstorbenen, Vertrauten und Getauften in einer zweckmäßigen Auswahl, sowie von Zeit zu Zeit der vorzüglichsten Verstorbenen im ganzen Lande, so weit es möglich ist, Erwähnung geschehen. Endlich sollen auch in einer besondern Rubrik alle Vergnügungen, welche Leipzig bietet, z. B. Dampfswagenfahrten, Theater, Concerte, Ausstellungen und andere Sehenswürdigkeiten, so zeitig als uns nur immer Kunde davon wird, angezeigt werden, was besonders für die Umgegend Leipzigs sehr willkommen sein dürfte.

Doch nur durch das gemeinschaftliche, ernste und einmüthige Zusammenwirken recht vieler für des Vaterlandes Wohlfahrt lebhaft sich interessirender Männer kann in diesem Blatte etwas wahrhaft Ersprießliches erreicht werden; daher an diese Alle die freundliche

und bringende Bitte, durch baldigste Einfindung von Mittheilungen, seien es ausführlichere Aufsätze, seien es kürzere Nachrichten, das Unternehmen möglichst zu fördern.

Alle Mittheilungen für das Leipziger Kreisblatt, die auf Verlangen honorirt werden, erbitten wir uns durch die Post unter der Adresse: „An die Redaction des Leipziger Kreisblattes in Leipzig.“

Bekanntmachungen aller Art werden sobald als nur immer möglich aufgenommen, und der Raum einer gespaltenen Zeile wird mit sechs Pfennigen berechnet.

Der Preis beträgt jährlich 2 Thlr., halbjährig 1 Thlr., vierteljährig 12 Gr. In Leipzig werden Bestellungen in den Expeditionen: Alter Neumarkt, große Feuerkugel, 1 Treppe und Quergasse Nr. 1249, die von früh 7 bis Abends 7 Uhr geöffnet sind, angenommen, und können die Blätter Abends 7 Uhr abgeholt werden; auch ist die Einrichtung getroffen, sie den in Leipzig wohnenden Abonnenten zuzusenden. Den Debit für auswärts hat die königl. Zeitungs-Expedition in Leipzig übernommen, an die sich die Postämter mit ihren Bestellungen wenden wollen.

Leipzig, im December 1837.

Der Herausgeber:

**Dr. A. A. Espe.**

Der Verleger:

**J. A. Brockhaus.**

### **Sternberg's Palmyra.**

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden:

## **Palmyra**

oder

### **Tagebuch eines Papagais.**

Von

**Freiherrn A. v. Sternberg.**

Belinapapier. In Umschlag broch. Preis 1 Thlr. 20 Gr., oder 3 Fl.

Schon lange hat das Publicum die Eigenthümlichkeit des Schriftstellers, dessen neuestes Werk wir hier anzeigen, erkannt und sich gewonnen. Mit vorzüglichem Glück weiß er das Märchenhafte, das Phantastische als Spiegel der wirklichen Welt zu gebrauchen. So knüpft sich im vorliegenden Roman an die Geschehnisse eines weltweisen Vogels eine Menge der lebendigsten menschlichen Situationen, und aus einem freien Phantasiespiel entwickelt sich das schönste humoristische Bild der socialen und literarischen Verhältnisse der neuesten Zeit.

Stuttgart und Tübingen, im December 1837.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Soeben ist bei Philipp Reclam jun. in Leipzig erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Die

## **Geheimnisse des Spielbergs.**

### **Denkwürdigkeiten**

eines

österreichischen Staatsgefangenen,

sein Proceß

vor der österreichischen Untersuchungscommission gegen geheime Verbindungen zu Mailand, und

seine Schicksale auf dem Spielberge in Gemeinschaft mit dem Grafen Confolonieri.

2 Bände. 2 Thlr.

### **Neues englisches Lesebuch.**

Die Verlagehandlung glaubt einem fühlbaren Mangel abzuhelfen, indem sie der deutschen, die englische Sprache studirenden Jugend ein mit Anmerkungen und einem Wörterbuche ausgestattetes englisches Lesebuch bietet, welches, wie die Ge-

sichte des großen Eroberers von Mexico, Alles in sich vereint, was jugendliche Gemüther ansprechen muß, und zugleich Alles ausschließt, was auf sie nachtheilig einwirken könnte. Es führt den Titel:

## **L I F E**

OF

## **HERNAN CORTES.**

BY

**DON TELESFORO DE TRUEBA  
Y COSIO.**

THE

**ANNOTATIONS, THE DICTIONARY, AND THE  
CORRECTION OF THE PRESS**

BY

**JOHN SPORSCHIL.**

Preis 18 Groschen.

## **Andreas Hofer**

und der

**letzte Kampf der Tiroler  
im Jahre 1809.**

Historisch-romantisches Gemälde

von

**S. C. A. Belani.**

3 Bände. 4 Thlr. 12 Gr.

## **Vertraute Briefe**

über

## **D e s t r e i c h,**

von

einem Diplomaten, der ausruht.

2 Bände. 2 Thlr.

## **Erlebnisse und Abenteuer**

eines Seesoldaten

von der

**kaiserlich französischen Garde  
in Spanien und England.**

2 Bände. 2 Thlr.

# Reise- und Lebensskizzen

nebst  
dramaturgischen Blättern

von  
Friedrich Heinsie.

Erster Theil.

Böhmen.

1 Thlr. 12 Gr.

In unterzeichnetem Verlage sind soeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu erhalten:

## Antike Bildwerke,

zum ersten Male bekannt gemacht

von  
Eduard Gerhard.

Erste Centurie, fünftes Heft, und zweite Centurie, erstes Heft, oder Tafel Nr. 81—120. Grossfolio.

Preis 6 Thlr. 8 Gr., oder 10 fl.

Den Freunden der Kunst und des Alterthums ist das vorliegende Werk, seinen erschienenen Abtheilungen nach, seit längerer Zeit bekannt. Es umfaßt die von dem Herausgeber an verschiedenen Orten Italiens veranstalteten Abbildungen von etwa sechshundert bisher unbekannten antiken Kunstdenkmälern und übertrifft, bei kunstgerechter GröÙe und Ausführung, alle ähnlichen Unternehmungen an Reichthum des Inhalts und Wohlfeilheit des Preises.

In G. C. Kiesling's Verlagsbuchhandlung zu Stuttgart ist soeben erschienen und in allen soliden Buch- und Kunsthandlungen Deutschlands und der angrenzenden Länder zu erhalten:

# Der Hohenstauffen.

Nach der Natur aufgenommen und gemalt

von  
C. Frommel.

In Stahl gestochen

von  
C. Frommel und Henry Winkles.

Mit einem historischen Texte

von  
Wolfgang Menzel.

Grossfolio. Auf feinstes Colombierpapier gedruckt. In Umschlag.

Preis des Ganzen:

1 Thlr., oder 1 fl. 45 Kr. Rhein. Abdrücke auf chines. Papier 1 Thlr. 10 Gr., oder 2 fl. 20 Kr. Rhein.

Der Hohenstauffen, dieses erhabene Denkmal einer großen Vorseit, an welches sich eine Fülle von Erinnerungen knüpft, die Wiege eines deutschen Heldengeschlechts, entbehrt, von Geschichtsschreibern und Dichtern gleich sehr verherrlicht, bisher noch immer einer bildlichen Darstellung, die, in jedem Betracht des Gegenstandes würdig, neben ihrer Schönheit und Vollendung auch in der Form ansprechend und durch einen sehr mäßigen Preis allgemein zugänglich wäre. Der ausgezeichnete Künstler hat die Aufgabe: unbeschadet der localen Treue und einer tiefen Naturwahrheit (bei Stahlstichen so selten) in Charakter und Stimmung auch die dem Bilde inwohnende ernste Idee anzudeuten — auf das glücklichste gelöst. Dem sinnigen Beschauer nach jeder Beziehung Genus und Befriedigung bietend, wird das meisterhafte Blatt durch seine materielle Wirkung, wie durch seinen technischen Gehalt überhaupt, eine der ehrenvollsten Stellen im Gebiete der landschaftlichen Kunst anspornen dürfen und jedem Zimmer eine vertraute Herde werden. Die werthvolle Begleitung, welche dem Blatte durch die in lebendigen und kräftigen Zügen entworfene historische Skizze eines unserer geistreichsten Geschichtschreiber zu Theil geworden, kann dem Unternehmen nur eine weitere Bürgschaft verleihen.

In December 1837.

Nachdem die früher erschienenen vier Hefte dieses Werkes eine mannichfaltige Bilderzau an Götter- und Heroenabstellungen, religiösen Ceremoniell und altclassischem Alltagsleben zusammengestellt hatten, ist die mythologische Reihe in den vorliegenden beiden Heften neu aufgenommen worden. Auf vierzig Tafeln sind über anderthalbhundert antike, bisher unbekannte, größtentheils sehr signenreiche Denkmäler hier abgebildet, deren größere Anzahl den besten Kunstepochen des Alterthums angehört. Die nöthigste erklärende Auskunft ist, nach früher beobachteter Weise, einseitigen auf den Umschlagen gegeben worden.

Stuttgart und Tübingen, im December 1837.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Beim Landes-Industrie-Comptoir zu Weimar ist im November 1837 erschienen:

## Wörterbuch

der

## Naturgeschichte,

dem gegenwärtigen Stande der Botanik, Mineralogie und Zoologie angemessen.

1ten Bandes 1ste Hälfte, Bogen 1—17, und Register Bogen 61—68.

Naats — Oceanides.

Gr. 8. 1 Thlr. 3 Gr., oder 2 fl.

Von der zweiten unveränderten Ausgabe sind bis jetzt 2 Bände, in 4 Lieferungen, versendet worden, und werden wir alle 2 Monate eine Lieferung folgen lassen.

# N IV.

## Neuigkeiten und Fortsetzungen,

versendet von

**F. A. Brockhaus in Leipzig.**

**1837. October, November und December.**

(Nr. 1 dieses Berichts, die Versendungen vom Januar, Februar und März enthaltend, findet sich in Nr. XIII des Literarischen Anzeigers; Nr. II, die Versendungen vom April, Mai und Juni, in Nr. XXVI; Nr. III, die Versendungen vom Juli, August und September, in Nr. XXXI beifolgend.)

68. **Analekten für Frauenkrankheiten, oder Sammlung der vorzüglichsten Abhandlungen, Monographien, Preisschriften, Dissertationen und Notizen des In- und Auslandes über die Krankheiten des Weibes und über die Zustände der Schwangerschaft und des Wochenbettes.** Herausgegeben von einem Vereine praktischer Ärzte. 1sten Bandes 4tes (letztes) Heft. Gr. 8. 16 Gr.

Der erste Band vollständig 2 Thlr. 16 Gr.

69. **Augustum.** Dresdens antike Denkmäler enthaltend. Herausgegeben von Wilhelm Gottlieb Becker. Zweite Auflage. Besorgt und durch Nachträge vermehrt von Wilhelm Adolf Becker. 13tes Heft. Grossfolio. Taf. CXLIII — CLIV und Text Bogen 23 und 24 (in gr. 8.). In Umschlag. Subscriptionspreis 1 Thlr. 21 Gr. 70. —, 14tes (letztes) Heft. Taf. CLV — CLXII und Text Bogen 25 — 29. In Umschlag. Subscriptionspreis 2 Thlr. 12 Gr.

14tes bis 12tes Heft, 1832 — 34, kosten im Subscriptionspreise jebed 1 Thlr. 21 Gr.

71. **Bilder: Conversations-Lexikon für das deutsche Volk.** Ein Handbuch zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse und zur Unterhaltung. Vollständig in vier Bänden. Mit Abbildungen und Landkarten. Zweiter Band: F. — L. 6te und 7te Lieferung. — Dritter Band: M — R. 1fte und 2te Lieferung. Gr. 4. Geh. Jede Lieferung 6 Gr.

72. **Encyclopädie der gesamten medicinischen und chirurgischen Praxis, mit Einschluss der Geburtshülfe und der Augenheilkunde.** Im Verein mit mehreren praktischen Ärzten und Wundärzten Deutschlands bearbeitet und herausgegeben von Georg Friedrich Meiss. Supplementband zur ersten Auflage, enthaltend die Verbesserungen und Zusätze der zweiten, namentlich durch die Operativchirurgie stark vermehrten Auflage. Stes (letztes) Heft. (Lipoma testiculi — Zymosis.) Gr. 8. Jedes Heft im Subscriptionspreis 20 Gr.

73. **Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste, in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet, und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber.** Erste Section, A — G, herausgegeben von J. G. Gruber. 29ter Theil. Nachträge: Dacia — Deliria — Wistritz und E — Eber-gassing.

Zweite Section, H — N, herausgegeben von A. G. Hoffmann. 14ter Theil. Jacobia — Iba.

Dritte Section, O — Z, herausgegeben von M. F. E. Meier und L. F. Rams. 1ter Theil. Pacholenus — Palermo-Seide. Jeder Theil im Pränumerationspreise auf gutem Druckpapier 3 Thlr. 20 Gr., auf feinem Weinpapier 5 Thlr., auf extrafeinem Zeinpapier im größten Quartformat mit breitem Ciegen (Prachtemplate) 15 Thlr.

Den frühern Subscribenten, welchen eine Reihe von Theilen fehlt, und Denjenigen, die als Abonnenten auf das ganze Werk neu eintreten wollen, werden die billigen Bedingungen gestellt.

74. **Bresch (Johann Samuel), Handbuch der deutschen Literatur seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit.** Systematisch bearbeitet und mit den nöthigen Registern versehen. Neue, von verschie-

denen Mitarbeitern besorgte Ausgabe. **Vierter Band, 2te Abtheilung.** Literatur der vermischten Schriften. Neue fortgesetzte Ausgabe von Chr. Anton Geissler. Gr. 8. (Als Rest.)

4 Bände, 1822 — 37, 12 Thlr. Schreibpapier 16 Thlr. Schreib-papier in 3. 24 Thlr. — Die noch fehlende 2te Abtheilung des 2ten Bandes, die Literatur der schönen Künste enthaltend, erscheint im nächsten Jahr.

75. **Der Erzbischof von Köln Clemens August von Droste zu Vischering, seine Prinzipien und Exposition.** Nach und mit authentischen Urkunden und unchriftlichen Belegen dargestellt. 8. Geh. 8 Gr.

76. **Reinhold (Wilhelm), Allgemeines Bücher-Lexikon.** 14ter Band. Herausgegeben von Otto August Schulz. 11te Lieferung. Enthaltend: zweite Abtheilung, Bogen 36 — 45. (Sonntag — Vellejus.) Gr. 4. 20 Gr. Schreib-papier 1 Thlr.

77. **Repertorium der gesamten deutschen Literatur für das Jahr 1837.** Herausgegeben im Verein mit mehreren Gelehrten von E. G. Gersdorff. 14ter Band. (Beilagen werden: Allgemeine Bibliographie für Deutschland.) Gr. 8. Jeder Band von etwa 50 Bogen in 14tägigen Heften 5 Thlr.

78. **Leipziger Allgemeine Zeitung.** 1837. October bis December. 92 Nummern (1 — 2 Bogen). Hochquart. 2 Thlr. 12 Gr.

## Ungemein wohlfeiles Wörterbuch der deutschen Sprache, 3 Thlr., oder 4 Fl.

48 Kr., für 80 — 90 Bogen in Lexikonformat.)

Prof. Hertel's

## Grammatisches Wörterbuch

der

## deutschen Sprache,

wobei zugleich Abstammung, Laut- und Simmverwandtschaft, Sprachreinigung und Wortenernung beachtet wird; in zwei Bänden, jeder zu zwei Abtheilungen. Dritte vermehrte Auflage. Gr. 8. München bei Fleischmann. Subscriptionspreis für jede Abtheilung 18 Gr., oder 1 Fl. 12 Kr.

Dieses ungemein reichhaltige Wörterbuch, dessen 2te Abtheilung schon versandt worden, ist jedem Geschäftsmann und Jedem, der nur einigermaßen auf Bildung Anspruch machen will, durchaus unentbehrlich. Wir laden um so mehr zu schneller Bestellung auf dasselbe ein, da der wohlfeile Preis mit dem Erscheinen der 4ten und letzten Abtheilung aufhört.

In allen soliden Buchhandlungen wird Subscription angenommen auf

## Immanuel Kant's Werke,

vollständige, sorgfältig revidirte Gesamtausgabe in 10 Bänden,

nebst dem in Stahl gestochenen Portrait und dem Facsimile Kants.

## Preis für den Bogen nur 1 gGroschen.

Um dem Publicum die Anschaffung zu erleichtern, erscheint alle 4 Wochen eine Lieferung von 12 Bogen à 12 Groschen (= 15 Sgr. = 45 Kr. Conv. = 54 Kr. Rhein.). Die erste Lieferung ist bereits versandt und in allen Buchhandlungen einzusehen, woselbst auch ausführliche Prospekte gratis ausgegeben werden.

Leipzig, den 15. December 1837.

Wobes und Baumann.

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. II.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

## Vericht über die im Laufe des Jahres 1837 bei F. A. Brockhaus in Leipzig erschienenen neuen Werke und Fortsetzungen.

1. Analecten für Frauenkrankheiten, oder Sammlung der vorzüglichsten Abhandlungen, Monographien, Preisschriften, Dissertationen und Notizen des In- und Auslandes über die Krankheiten des Weibes und über die Zustände der Schwangerschaft und des Wochenbettes. Herausgegeben von einem Vereine praktischer Ärzte. Erster Band. (In 4 Heften.) Gr. 8. Jedes Heft 16 Gr.

2. Anleitung zum Selbststudium der Mineralogie. Nach dem Book of science von Karl Hartmann. Mit 45 Abbildungen. 16. Geh. 18 Gr.

3. Anleitung zum Selbststudium der Krytallographie. Nach dem Book of science von Karl Hartmann. Mit 45 Abbildungen. 16. Geh. 6 Gr.

Diese beiden Werken bilden die erste und zweite Abtheilung des zweiten Bandes vom „Führer in das Reich der Wissenschaften und Künste“. Der erste Band, enthaltend: Anleitung zum Selbststudium der Mechanik (9 Gr.) — Hydrostatik und Hydraulik (6 Gr.) — Pneumatik (6 Gr.) — Akustik (6 Gr.) — Pyrometrik (6 Gr.) — Optik (9 Gr.) — Electricität, Galvanismus und Magnetismus (6 Gr.), mit 221 Abbildungen (1836), kostet 2 Thlr.

4. Augusteum. Dresdens antike Denkmäler enthaltend. Herausgegeben von Wilhelm Gottlieb Becker. Zweite Auflage. Besorgt und durch Nachträge vermehrt von Wilhelm Adolf Becker. Vierzehn Hefte. Grossfolio. 1832 — 37.

Dreizehntes Heft. Tafel CXLIII — CLIV und Text Bogen 23 und 24 (in gr. 8.). In Umschlag. Subscriptionspreis 1 Thlr. 21 Gr.

Vierzehntes (letztes) Heft. Tafel CLV — CLXII und Text Bogen 25 — 29. In Umschlag. Subscriptionspreis 2 Thlr. 12 Gr.

Das erste bis zwölfte Heft, 1832 — 37, sollen jedes im Subscriptionspreise 1 Thlr. 21 Gr. Das vierzehnte Heft wird auch als Supplement zur ersten Auflage zu 2 Thlr. 12 Gr. einzeln gegeben.

5. Beer's (Michael) Briefwechsel. Herausgegeben von Eduard von Schenk. Gr. 8. Geh. 1 Thlr. 8 Gr.

Michael Beer's sämtliche Werke in Einem Bande erschienen 1835 und kosten 4 Thlr.

6. Bericht vom Jahre 1837 an die Mitglieder der Deutschen Gesellschaft zur Erforschung vaterländischer Sprache und Alterthümer in Leipzig. Herausgegeben von Amilius Ludwig Richter und Karl August Epe. Gr. 8. Geh. 10 Gr.

Die Berichte für 1835 und 1836 haben gleichen Preis.

7. Allgemeine Bibliographie für Deutschland. Eine Übersicht der Literatur Deutschlands, sowie der bedeutendsten Schriften des Auslandes, nebst Angabe künftiger erschei-

nender Werke und andern auf den literarischen Verkehr bezüglichen Mittheilungen und Notizen. Mit alphabetischen und systematischen Registern. Zweiter Jahrgang. 1837. 52 Nummern (von 1—2 Bogen). Gr. 8. 3 Thlr.

Der erste Jahrgang, 53 Nummern mit alphabetischen und synematischen Registern, kostet 2 Thlr. 16 Gr.

8. Bibliothek deutscher Dichter des 17. Jahrhunderts. Begonnen von Wilhelm Müller. Fortgesetzt von Karl Förster. Dreizehntes Bändchen. David Schirmer, Zacharias Lundt, Philipp Jesen. 8. Geh. 1 Thlr. 20 Gr.

Erstes bis zwölftes Bändchen, 1822 — 31, kosten 16 Thlr. 8 Gr.

9. Bibliothek classischer Romane und Novellen des Auslandes. Erster bis vierter Band. Der finnreiche Junker Don Quixote von la Mancha von Miguel de Cervantes Saavedra. Aus dem Spanischen überfetzt durch Dietrich Wilhelm Soltan. Zweite Auflage. Mit einer Einleitung. Vier Theile. Gr. 12. Geh. 2 Thlr. 12 Gr.

10. —, 2fter, 24ster Band. Die Leiden des Persiles und der Sigismunda von Miguel de Cervantes Saavedra. Aus dem Spanischen überfetzt. Mit einer Einleitung von Ludwig Tieck. Zwei Theile. Gr. 12. Geh. 1 Thlr. 8 Gr.

11. —, 2fter, 26ster Band. Die Verlobten. Eine mairländer Geschichte aus dem 17. Jahrhundert. Aufgefunden und erneut von Alessandro Manzoni. Aus dem Italienischen überfetzt von Eduard von Bülow. Zweite, völlig umgearbeitete Auflage. Zwei Theile. Gr. 12. Geh. 2 Thlr.

Die ersten 2 Bände enthalten Goldsmith's Landprediger von Wakefield, Le Sage's Gil Blas, Dumas's Erzählung, Fielding's Tom Jones, Holberg's Rime's Wallfahrt in die Unterwelt, Foscolo's Briefe des Jacopo Ortis, Doccaccio's Decameron, Bruu von Staël's Delphine, und kosten statt 13 Thlr. 8 Gr.

**zusammengenommen jetzt nur acht Thaler.**

Jeder Roman ist im Ladenpreise auch einzeln zu haben.

12. Bidder (F. H.), Neurologische Beobachtungen. Mit zwei lithographirten Tafeln. 4. Dorpat. 1836. Geh. 20 Gr.

13. Bilder: Conversations-Lexikon für das deutsche Volk. Ein Handbuch zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse und zur Unterhaltung. Vollständig in vier Bänden. Erster Band: A — E. Mit 320 Abbildungen und 17 Landkarten. Gr. 4. 1834 — 37. Cart. 5 Thlr. 8 Gr.

Zweiter Band: F — L. Erste bis siebente Lieferung.

Dritter Band: M — R. Erste und zweite Lieferung.

Jede Lieferung kostet im Subscriptionspreise 6 Gr.

Die Vollenbung des Bilder-Conversations-Lexikons schreitet jetzt rasch vor, indem der zweite und dritte Band gleichzeitig gedruckt werden.



14. **Altdeutsche Blätter** von Moritz Haupt und Heinrich Hoffmann. Zweiten Bandes erstes Heft. Gr. 8. Geh. 16 Gr.
- Der erste Band in 4 Hefen (1835 — 36) kostet 2 Thlr. 4 Gr.
15. **Blätter für literarische Unterhaltung.** Jahrgang 1837. Außer den Beilagen täglich eine Nummer. Gr. 4. 12 Thlr.
16. **Conversations-Lexikon, oder Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände.** Zwölf Bände. Achte Originalausgabe. Gr. 8. 1833 — 37. Subscriptionspreis auf Druckpapier 16 Thlr., Schreibpapier 24 Thlr., Velinpapier 36 Thlr.
- Das Conversations-Lexikon ist nach längerer Zeit einmal wieder vollständig und noch im Subscriptionspreise zu haben. Auch ist es durch jede Buchhandlung in einem neuen Abonnement, in das zu jeder Zeit eingetreten werden kann, in einzelnen Bänden zu den Preisen von 1 Thlr. 8 Gr. auf Druckpapier, 2 Thlr. auf Schreibpapier und 3 Thlr. auf Velinpapier zu beziehen.
17. **Schermann (Johann Peter), Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens.** 1823 — 32. Zwei Theile. Zweite, mit einem Register versehene Ausgabe. 8. Geh. 4 Thlr.
18. —, Dasselbe. Erste Ausgabe. Namen- und Sachregister. 8. Geh. 4 Gr.
19. **Ehrenbaum (J.), Der Psycholog. Ein Lebensereignis.** 8. Geh. 1 Thlr. 8 Gr.
20. **Eichthal (Gustave d'), Les deux mondes. Servant d'introduction à l'ouvrage de M. Ughart: La Turquie et ses ressources. Publié avec l'autorisation de l'auteur. (Mit einer Karte.)** Gr. 8. Geh. 1 Thlr. 16 Gr.
21. **Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste, in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet, und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber.** Mit Kupfern und Karten. 1813 — 37. Gr. 4. Cart. Erste Section, A—G, herausgegeben von J. G. Gruber. Erster bis neunundzwanzigster Theil.
- Zweite Section, H—N, herausgegeben von A. G. Hoffmann. Erster bis vierzehnter Theil.
- Dritte Section, O—Z, herausgegeben von M. G. E. Meier und E. F. Kämpe. Erster bis neunter Theil.
- Jeder Theil im Pränumerationspreise auf gutem Druckpapier 3 Thlr. 20 Gr., auf feinem Velinpapier 5 Thlr., auf extrafeinem Velinpapier im größten Quartformat mit breiten Stegen (Pracht-exemplare) 15 Thlr.
- Den früheren Subscribenten, welchen eine Reihe von Theilen fehlt, und Denjenigen, die als Abonnenten auf das ganze Werk neu eintreten wollen, werden die billigsten Bedingungen gestellt.
22. **Encyclopädie der gesamten medicinischen und chirurgischen Praxis, mit Einschluss der Geburtshülfe, der Augenheilkunde und der Operativchirurgie.** Im Verein mit mehreren praktischen Ärzten und Wundärzten herausgegeben von Georg Friedrich Most. Zweite stark verbesserte und vermehrte Auflage. Zwei Bände. Gr. 8. 1836 — 37. Subscriptionspreis 10 Thlr.
23. —, Dasselbe. Supplementband zur ersten Auflage, enthaltend die Verbesserungen und Zusätze der zweiten, namentlich durch die Operativchirurgie stark vermehrte Auflage. Gr. 8. Subscriptionspreis 2 Thlr. 12 Gr.
24. **Ergänzungen des Allgemeinen Landrechts für die preussischen Staaten, enthaltend eine vollständige Zusammenstellung aller noch geltenden, das Allgemeine Landrecht abändernden, ergänzenden und erläuternden Gesetze, Verordnungen und Ministerialverfügungen, nebst einem chronologischen Verzeichnisse derselben und Register, herausgegeben von F. H. v. Strombeck. Vierter Band. Enthaltend die Nachträge zur dritten Ausgabe derselben, bearbeitet und bis auf die neueste Zeit fortgeführt von Ferdinand Leopold Emden.** Gr. 8. Druckpapier 1 Thlr. 4 Gr., Schreibpapier 1 Thlr. 12 Gr.
- Der erste bis dritte Band, die Auflage, 1829, kosteten 6 Thlr., auf Schreibpapier 8 Thlr.; alle 4 Bände zusammen jetzt nur 5 Thlr., auf Schreibpapier 6 Thlr. 16 Gr.
25. **Ersch (Johann Samuel), Handbuch der deutschen Literatur seit der Mitte des 18. Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit. Systematisch bearbeitet, und mit den nöthigen Registern versehen. Neue, von verschiedenen Mitarbeitern besorgte Ausgabe. Vierter Band, Zweite Abtheilung. Literatur der vernichteten Schriften. Neue fortgesetzte Ausgabe von Chr. Anton Geissler.** Gr. 8. (Als Rest.)
- Vier Bände, 1822 — 37, 12 Thlr., Schreibpapier 16 Thlr., Schreibpapier in 4. 24 Thlr. — Die noch fehlende zweite Abtheilung des zweiten Bandes, die Literatur der schönen Künste enthaltend, erscheint im Jahre 1838.
26. **Der Erbfiskus von Rön Clemens August von Droste zu Vischering, seine Principien und Disposition. Nach und mit authentischen Actenstücken und schriftlichen Belegen dargestellt.** 8. Geh. 8 Gr.
27. **Feinjus (Wilhelm), Allgemeines Bücher-Lexikon. Achter Band, welcher die von 1833 bis Ende 1834 erschienenen Bücher und die Berichtigungen früherer Erscheinungen enthält. Herausgegeben von Otto August Schulz. Erste bis elfte Lieferung. Abalard—Vellejus. Gr. 4. 1836 — 37. Geh. Jede Lieferung auf Druckpapier 20 Gr., auf Schreibpapier 1 Thlr.**
- Die ersten sieben Bände dieses Werkes, 1812 — 29, sind noch für den ermäßigten Preis von 20 Thlr., sowie auch einzelne Bände billig zu erhalten.
28. **Hille (Karl Christian), Die Heilquellen Deutschlands und der Schweiz. Ein Taschenbuch für Brunnen- und Baderesende. Zwei Theile. Mit Karten und Plänen. Erstes Heft: Brunnen- und Baderdiätetik für Gurgäste. 12 Gr. — Zweites Heft: Die Bäder und Heilquellen des Königreichs Böhmen und der Markgrafschaft Mähren. Mit zwei Karten und einem Plan. 8. Geh. 20 Gr.**
- Das Ganze wird in 8 — 10 Hefen erscheinen.
29. **Hübner (Johann), Zwei Mal zweisundfünfzig ausserlesene biblische Historien aus dem Alten und Neuen Testament, zum Besten der Jugend abgefaßt. Auf's Neue durchgesehen und für unsere Zeit angemessen verbessert von David Jonathan Lindner. Die 103te der alten, oder die vierte der neuen vermehrten und ganz umgearbeiteten und verbesserten Auflage. 8. 8 Gr.**
30. **Jös. Encyclopädische Zeitschrift, vorzüglich für Naturgeschichte, vergleichende Anatomie und Physiologie, von Den. Jahrgang 1837. Zwölf Hefte. Mit Steinplatten.** Gr. 4. 8 Thlr.
31. Ist die Klage über zunehmende Verarmung und Nahrungslosigkeit in Deutschland gegründet, welche Ursachen hat das Uebel, und welche Mittel zur Abhülfe bieten sich dar? Beantwortet von Siegfried Justus L., König von Israel und Hohepriester von Jerusalem. Gr. 8. Geh. 12 Gr.
32. **Kannegiesser (Karl Ludwig), Abriss der Geschichte der Philologie.** Gr. 8. 18 Gr.
33. **Körte (Wilhelm), Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Deutschen. Nebst den Redensarten der Deutschen Jeschröder und Aller Praktik Großmutter, d. i. der Sprichwörter ewigem Wetter-Kalender. Gesammelt und mit vielen schönen Versen, Sprüchen und Historien in ein Buch verfaßt. (In vier Lieferungen.) Gr. 8. Geh. 2 Thlr. 16 Gr.**
34. **Kritiken des Werks von Friedrich von Raumer: England im Jahre 1835 aus der Morning Chronicle, den Times, dem Dublin Review, Foreign Quarterly Review und Edinburgh Review.** Gr. 8. Geh. 8 Gr.
- Friedrich von Raumer's „England im Jahre 1835“, zwei Theile, 1836, kostet 5 Thlr.
35. **Leoparbi (Graf Giacomo), Gefänge, nach der in Florenz 1831 erschienenen Ausgabe übersetzt von Karl Ludwig Kannegiesser.** Gr. 12. Geh. 16 Gr.
36. **Löffler (Franz Adam), Über die Gesetzgebung der Presse. Ein Versuch zur Lösung ihrer Aufgabe auf wissenschaftlichem Wege. Erster Theil.** Gr. 8. 8 Thlr.

37. Most (Georg Friedrich), Über Liebe und Ehe in sittlicher, naturgeschichtlicher und biatisch-medizinischer Hinsicht; nebst einer Anleitung zur richtigen physischen und moralischen Erziehung der Kinder. Dritte, völlig umgearbeitete, stark vermehrte und verbesserte Auflage. 8. Geh. 1 Thlr. 8 Gr.

Das Werk ist in dieser dritten Auflage in meinen Verlag übergegangen.

38. Müller (Wilhelm), Geschichte. Herausgegeben und mit einer Biographie Müller's begleitet von Gustav Schwab. Zwei Bändchen. 16. Geh. 2 Thlr. 16 Gr.

39. Das Pennig-Magazin für Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse. Fünfter Jahrgang 1837. 52 Nummern. (Nr. 197—248.) Mit vielen Abbildungen. Schmal gr. 4. 2 Thlr.

- Erster Jahrgang, 52 Nummern, 2 Thlr. Zweiter Jahrgang, 39 Nummern, 1 Thlr. 12 Gr. Dritter Jahrgang, 52 Nummern, 2 Thlr. Vierter Jahrgang, 53 Nummern, 2 Thlr.

40. — für Kinder. Vierter Jahrgang. 1837. 52 Nummern. Mit vielen Abbildungen. Kl. 4. 1 Thlr.

Der erste bis dritte Jahrgang haben gleichen Preis.

41. Raumer (Karl von), Der Zug der Israeliten aus Aegypten nach Kanaan. Beilage zu des Verfassers „Palästina“. Mit einer Karte. Gr. 8. Geh. 12 Gr.

Die sauber gestochene Karte kostet einzeln 6 Gr. Die zweite sehr vermehrte Auflage von Raumer's Palästina ist bald im Druck beendigt.

42. — (Rudolf von), Die Aspiration und die Lautverschiebung. Eine sprachgeschichtliche Untersuchung. Gr. 8. Geh. 12 Gr.

43. Repertorium der gesammten deutschen Literatur für das Jahr 1837. Herausgegeben im Verein mit mehreren Gelehrten von E. G. Gersdorf. (Beigegeben wird: Allgemeine Bibliographie für Deutschland.) Elfter bis vierzehnter Band. Gr. 8. Jeder Band 3 Thlr.

44. Die Resultate der Wassercur zu Grafenberg. (Ex apibus mel & cera.) Mit einer Abbildung. 8. Geh. 1 Thlr.

45. Hobespierre. Mit Beziehung auf die neueste Zeit dargestellt von einem Wahrheitsfreunde. Gr. 8. Geh. 1 Thlr.

46. Schopenhauer (Johanna), Richard Wood. Ein Roman. Zwei Theile. 8. 4 Thlr.

47. —, Die Lante. Ein Roman. Neue Ausgabe. Zwei Bändchen. 16. Cart. 1 Thlr. 16 Gr.

48. Taschenbuch dramatischer Originalen. Herausgegeben von Dr. Frand. Zweiter Jahrgang. Mit fünf Kupfern und einem Facsimile. 8. Elegant gebunden mit Goldschnitt. 3 Thlr.

Der erste Jahrgang kostet 2 Thlr. 8 Gr.

49. Olfertisches Taschenbuch. Mit Beiträgen von Barthold, Jacob, Schubert, Voigt, herausgegeben von Friedrich von Raumer. Neunter Jahrgang. Gr. 12. Cart. 2 Thlr.

Der erste bis fünfte Jahrgang, 1830—34, sind zusammen von 9 Thlr. 16 Gr.

auf 5 Thlr. im Preise ermäßigt.

einzelne kostet jeder 1 Thlr. 8 Gr.; der sechste, siebente und achte Jahrgang aber jeder 2 Thlr.

50. Urania. Taschenbuch auf das Jahr 1838. Mit K. v. von Sehlitz's Bildniß und sechs Stahlstichen. 16. Mit Goldschnitt geb. 2 Thlr.

o. Sehlitz's Bildniß, in schönen Abdrücken in gr. 4., kostet einzeln 6 Gr.

Im Preise herabgesetzt

sind die Jahrgänge der Urania für 1830 — 34 und kosten statt 10 Thlr. 6 Gr. nur fünf Thaler. Einzelne sind so weit der Vorrath reicht, zu 1 Thlr. 8 Gr., die Jahrgänge 1835, 1836 und 1837 jedoch nur zu 2 Thlr. jeder zu haben.

51. Wenke (Karl Wilhelm), Die Natur, der Mensch und sein Wissen. In die Naturforscher und Denker des 19. Jahrhunderts. Die Vorrede seiner Schriften. Gr. 8. Geh. 8 Gr.

52. Wurm (G. F.), Das königl. hanoversche Patent, die deutschen Stände und der Bundestag. Publicistische Skizze. 8. Geh. 8 Gr.

53. Zeitgenossen. Ein biographisches Magazin für die Geschichte unserer Zeit. Dritte Reihe. Sechsten Bandes drittes bis sechstes Heft. Gr. 8. Geh. 2 Thlr.

54. Allgemeine medicinische Zeitung. Herausgegeben von Dr. Karl Pabst. Jahrgang 1837. Wöchentlich zwei Nummern von einem Bogen. Gr. 4. 6 Thlr. 16 Gr.

55. Leipziger Allgemeine Zeitung. (Täglich mit Einschluß der Sonn- und Festtage eine Nummer von einem Bogen nebst Beilagen von einem halben bis einem Bogen.) 4. Vierteljährige Pränumeration 2 Thlr. 12 Gr.

Aus dem Verlage der Hofbuchhandlung in Rudolstadt habe ich den Vorrath des folgenden Werkes an mich gekauft:

Robat (Christian), Vollständiges Handbuch der Münz-, Bank- und Wechselverhältnisse aller Länder und Handelsplätze der Erde. Mit getreuen Abbildungen der vornehmsten Gold-, Platina- und Silbermünzen aller Länder, in 380 Münzbildern auf 119 Tafeln. Drei Abtheilungen. Gr. 8. Rudolstadt. 1833. Geh. 6 Thlr. 18 Gr.

Im Verlage von A. Campe in Hamburg ist erschienen und sowie auch der ältere Verlag dieser Handlung durch mich zu beziehen:

Lloyd (H. C.), Theoretisch-praktische Sprachlehre für Deutschland. Mit fasslichen Übungen nach den Regeln der Sprache versehen. Fünfte verbesserte Auflage. 8. 22 Gr.

Le Portfolio, ou Collection de documents politiques relatifs à l'histoire contemporaine. Traduit de l'anglais. Tome I — V. (Nos. 1 — 41.) Hamburg, Campe. 1835—37. Geh. 10 Thlr. 12 Gr.

Schließlich erlaube ich mir Freunde gediegener, unterhaltender Lecture, Lesegesellschaften und Leihbibliotheken auf eine

Sammlung von Romanen, Erzählungen, Schauspielen, Gedichten, Briefen, Biographien, Denkwürdigkeiten, Reisen, historischen und andern werthvollen Schriften aus meinem Verlage

aufmerksam zu machen und zur Benutzung der äusserst vortheilhaften Bedingungen, worüber das Verzeichniß, welches durch alle Buchhandlungen gratis zu beziehen ist, nähere Auskunft gibt, aufzufordern.

Oestreichische militairische Zeitschrift. 1837.

Erstes Heft.

Dieses Heft ist schon erschienen und an alle Buchhandlungen versendet worden:

Inhalt: I. Die Operationen der verbündeten Heere gegen Paris im März 1814. (Fortsetzung.) — 26. Das Gefecht bei Rogent. — 27. Das Gefecht bei Echelle. — 28. Gefichte bei Echelle, Gormeron und Lunan. II. Festzug in Nepal und Sikkim, in den Jahren 1794 und 1795. (Schluß des ersten Abschnittes.) III. Uebersicht der ägyptischen Streitkräfte. IV. Literatur. V. Neueste Militairveränderungen. VI. Miscellen und Notizen.

Der Preis des Jahrgangs 1837 von 12 Heften ist wie der aller frühern Jahrgänge von 1818—36 jeder 8 Thlr. Sächsl.

Die Jahrgänge 1811—13 sind in einer neuen Auflage in vier Bänden vereinigt erschienen und kosten zusammen ebenfals 8 Thlr. Sächsl. Wer die ganze Sammlung von 1811—37 auf einmal abnimmt, erhält dieselbe um  $\frac{1}{4}$  wohlfeiler.

Nach im Jahre 1838 wird diese nicht nur für Militaires, sondern auch für Freunde der Geschichte höchst interessante Zeitschrift ununterbrochen fortgesetzt und bei dem Reichthume an wichtigen Materialien, sowie dem Bestreben der Redaction, nur Siegeswerke zu geben, wird auch dieser künftige Jahrgang den anerkannten Werth dieser Zeitschrift nur vermehren.

Von dem Unterzeichneten ist diese Zeitschrift durch alle Buchhandlungen um die genannten Preise zu beziehen.

Wien, den 23ten December 1837.

J. G. Heubner, Buchhändler.

**Lewald's**  
**Theater-Revue für 1838.**

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden:

**Allgemeine**  
**Theater-Revue.**

Herausgegeben

von  
**August Lewald.**

Dritter Jahrgang für 1838.

Mit dem Portrait der Demeiselle Stubenrauch.

Gr. 8. Cartonirt. Preis 2 Thlr., oder 3 Fl. 30 Kr.

Die ehrende Anerkennung, welche sich dieses junge Institut bereits im ganzen Publicum erworben, sowie die besondere Theilnahme der Kunstwelt, die sich ihm zugewendet hat, überheben uns hier, den Zweck desselben nochmals darzulegen und sein abermaliges Erscheinen mit lobenden und anpreisenden Worten zu begleiten. Es ist als ein gewichtiger Beitrag zu einer Kunstgeschichte des modernen Theaters zu betrachten und wird in seiner Gesamtheit als ein umfassendes dramaturgisches Werk von mehr als vorübergehender Dauer sein. Wie sehr der Herausgeber es versteht, die mannichfachen Interessen in seinem Bereiche anzuregen und das ihm zugewiesene Feld nach allen Richtungen hin auszubenten, wird die Mittheilung des Inhalts dieses Werkes am besten dartun.

1 8 3 8.

- 1) Aus den Tagebüchern Costenoble's, des im vergangenen Sommer verstorbenen Regisseurs des k. k. Hofburgtheaters in Wien.
- 2) Vertraute Briefe, geschrieben aus einem Dorfe bei Paris von H. Heine an den Herausgeber.
- 3) „In die Scene sehen“. Von August Lewald.
- 4) Andreas Gryphius. Von W. Ponck.
- 5) Curiositäten.

1 8 3 7.

- 1) Die hamburger Oper von 1678 — 1728. Von Dr. A. Peucer.
- 2) Nabel's Theaterurtheile. Mitgetheilt von K. A. Barnhagen von Ense.
- 3) Theaterwesen in England. (Zweite Abtheilung.) Von Dr. W. Seyffarth.
- 4) Das Theater in Frankreich in den letzten sechs Monaten des Theaterjahres. Ein Sendschreiben an den Herausgeber von Jules Janin.
- 5) Künstlerportraits. Skizzen von August Lewald.
- 6) Die Vormundschaft. Lustspiel von W. A. Götz und Uffo Horn.
- 7) Vergleichende Uebersichten. Von August Lewald.
- 8) Theatercuriositäten.

Mit dem Bildnisse der k. k. österreichischen Hofschauspielerin Julie Rettich.

1 8 3 6.

- 1) Ludwig Tieck und das deutsche Theater. Von Dr. G. Schlessier.
- 2) Theaterwesen in England. (Erste Abtheilung.) Von Dr. W. Seyffarth.
- 3) Hamlet in Wittenberg. Umriss von K. Sukkow.
- 4) Seydelmann und die Theaterrecensenten. Von August Lewald.
- 5) San Carlino, das komische Volkstheater in Neapel. Von W. Menzel.
- 6) Altdeutsche Nationalbühne, nach der Gottschel'schen Sammlung in Weimar. Von Dr. A. Peucer.
- 7) Vergleichende Uebersichten. Von August Lewald.

- 8) Das böhmische Schauspiel zu Prag.
- 9) Ein Halbjahr der pariser Theater.
- 10) Theatercuriositäten.

Mit Seydelmann's Bildniß.

Stuttgart und Tübingen, im December 1837.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

**Interessante Neuigkeit.**

Soeben ist in der Joh. Palm'schen Verlagsbuchhandlung zu Landshut erschienen und in allen guten Buchhandlungen zu haben:

**Franz Paula von Gruithuisen's**

(Professor zu München u.)

**Kritik der neuesten Theorien der Erde, und Sieg der Natur über dieselben.**

Für Geologen, und überhaupt für Naturhistoriker, Physiker und Astronomen.

Gr. 8. Brosch. Preis 8 Gr., oder 30 Kr. Rhein.

Für dieses geistvolle Schriftchen etwas Empfehlendes zu sagen, hält die Verlagsbuchhandlung nicht für nöthig. Was es enthält, bezeugt der Titel ganz genau, und daß der Inhalt ausgezeichnet sei, dafür bürgt der Name des berühmten Herrn Verfassers, den alle Gelehrten nur mit hoher Achtung nennen. Nur die Bemerkung wollen wir uns noch erlauben, daß dieses Schriftchen gleich interessant und wichtig für Geologen, Naturhistoriker, Physiker und Astronomen wie für gebildete Laien ist.

Im Verlage von **Vietro Del Vecchio** in Leipzig ist soeben erschienen und durch jede solide Kunst- oder Buchhandlung zu beziehen:

Das sprechend ähnliche **Portrait** des jetzt in Leipzig anwesenden

**Vofraths Dr. Dahlmann**

(mit Facsimile)

nach dem **Leben** auf Stein gezeichnet von F. A. Vecht, einem der geschicktesten Mitarbeiter des bekannten Dresdener Galerieswerkes, gedruckt von Fr. Hanfstängl aus München.

Der Verleger hat nichts versäumt, um den Verehrern Dahlmann's ein hinsichtlich Ähnlichkeit, Druck und Papier gleich ausgezeichnetes Portrait, an dem es bisher gemangelt hat, zu liefern.

Preis 18 Gr. auf weißem, und 1 Thlr. auf chinesischem Papier.

Bei Meißner in Stuttgart erschien soeben:

**Männer'schule**

von Balthasar Gracian. Aus dem Spanischen übersezt von Fr. Kölle. 12. Geh. Preis 20 Gr., oder 1 Fl. 24 Kr.

Ein 1658 zu Saragoga geforbener Jesuit gibt hier Regeln des Verkehrs mit Männern, welche nicht bloß zu flüchtigen Genüssen, vielmehr zu wiederholtem Nutzen und Durchdenken dienen mögen. Gereifen Männern wird diese geistvolle Schrift ein werth bleibendes Geschenk sein. Vorräthig in jeder Buchhandlung Deutschlands, der Schweiz und der österreichischen Monarchie.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

Allgemeine medicinische Zeitung. Herausgegeben von Dr. Karl Pabst. Jahrgang 1837. Monat September, oder Nr. 70—78. Gr. 4. Preis des Jahrgangs 6 Thlr. 16 Gr. Leipzig, im Januar 1838. F. A. Brockhaus.

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. III.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brochhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Zeile 2 Gr.

## Ankündigung.

Der zweite Jahrgang des

## Leipziger Kreisblattes

erscheint im Verlage der unterzeichneten Buchhandlung, und es wird dasselbe wöchentlich dreimal, Montags, Mittwochs und Freitags Abends, in einem halben Bogen auf seinem weißen Maschinenpapier ausgegeben.

Während die erste Abtheilung des Blattes, wie bisher, für die Bekanntmachungen und Anordnungen der königlichen hohen Behörden bestimmt bleibt, soll die andere Abtheilung lediglich der Besprechung vaterländischer und des Vaterland berührender Angelegenheiten und Ereignisse gewidmet sein und dem gesammten Publicum einen Sprachsaal bieten zum Austausch der Ideen und Erfahrungen, zur Ausgleichung verschiedener Ansichten und zur endlichen Verständigung.

Alle **Mittheilungen** für das Leipziger Kreisblatt, seien es ausführliche Aufsätze, seien es kürzere Nachrichten, sind höchst willkommen und werden auf Verlangen honorirt.

**Bekanntmachungen** aller Art finden möglichst baldige Aufnahme und es wird der Raum einer gespaltenen Zeile mit sechs Pfennigen berechnet.

Der **Preis** beträgt jährlich 2 Thlr., halbjährig 1 Thlr., vierteljährig 12 Gr. In **Leipzig** werden Bestellungen in den Expeditionen: Alter Neumarkt, große Feuerzettel, 1 Treppe, und Quergasse Nr. 1249 angenommen und können die Blätter Abends 7 Uhr abgeholt werden; auch ist die Einrichtung getroffen, sie den in Leipzig wohnenden Abonnenten zuzuführen. Den **Debit** für **außwärts** hat die königl. **Zeitungsexpeditio** zu **Leipzig** übernommen, an die sich die Postämter mit ihren Bestellungen wenden wollen.

Leipzig, im Januar 1838.

Der Herausgeber:

**Dr. A. A. Espe.**

Der Verleger:

**F. A. Brochhaus.**

### v. Hailbronner's Reise-Albums.

In der Unterzeichneten sind sieben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden:

## Albums

aus der

### Reisemappe eines deutschen Touristen.

Gesammelt und herausgegeben

von

Karl v. Hailbronner.

Zweiter und dritter Band.

Gr. 8. In Umschlag broschirt. Preis 2 Thlr. 16 Gr., oder 4 Fl. 12 Kr.

Auf wenigen Blättern findet sich hier Vieles zusammengebrängt, was man in voluminösen Reisebeschreibungen vergeblich suchen würde.

Der **zweite Band** enthält: Kopenhagen. — Schweden. — Der Eriksfärdt- und Göthafärdt. — Stockholm. — Dalekarlien. — Die schwedische Armee. — Reise von Stockholm

nach Berlin. — Berlin. — Dresden. — Prag. — München. — Nippoldsau. — Nürnberg. — Wien. — Die östreichische Armee.

Der **dritte Band**: Die Bora. — Venedig. — Mailand. — Florenz. — Genua. — Turin und die Seen. — Rom. — Der Carneval in Rom. — Die römische Charwoche. — Die Römerin. — Neapel. — Sicilien. — Der Vesuv.

Allerdings Vielen durch persönlichen Besuch und noch Mehren aus einer Menge von Büchern bekannte Gegenden. Allein hier verbreitet eine geistreiche Subjectivität über die aus der Ferne wunderbar vor die Einbildungskraft des Lesers gezauberte Außenwelt eine eigenthümliche Färbung. Der gewandte Reisende erscheint stets und überall als feingebildeter, unterhaltender und geistreicher Gesellschafter, während er, beinahe sich selbst unbewußt, zugleich gründlich erfahrener, belehrender Führer ist. Was er mit schneller und scharfer Beobachtungsgabe unbefangenen aufgefaßt hat, findet der Leser in ebenso klarer als conciser Darstellung unumwunden wiedergegeben. Zwar sind die Schilderungen schon nach dem Titel des Buches Fragmente, allein der Herausgeber hat sie in so zweckmäßige Ordnung gebracht, daß der Leser mit einiger Phantasie die Übergänge ohne Mühe sich selbst bilden kann. Und wir wissen nicht, ob nicht gerade Albums für den Kenner ein ganz be-

sonderes Interesse haben, das ein vollständig componirtes und im Einzelnen ausgeführtes Tableau niemals gewährt. Überall sind die charakteristischen Merkmale von Land und Volk, von Natur und Menschenschöpfung in kräftigen Zügen und bestimmtem Umrissen ausgehoben, und bei jedem Bilde steht die Stagesage in ansprechender Harmonie mit dem Hauptwerke. Der einfache, edle, in ungelünstelter Eleganz und angeborener Kraft dahinfließende Styl des Verfassers ist der höhern Lesewelt aus interessantem Beiträgen für die Allgemeine Zeitung schon länger bekannt.

Dies Alles, verbunden mit dem Reize der Neuheit und Liberalität, indem der Verfasser die skizzirten Reisen erst seit Kurzem vollendet und in seiner Darstellung nur das bis jetzt Unbekannte aufgenommen hat, macht das Werk, welches sich dem ersten Anblick durch eine seinem gebiegenen Inhalte entsprechende Ausstattung empfiehlt, nicht nur zu einem nützlichen Wegweiser für den Reisefreudigen, sondern auch in ausgedehntem Maße zu einem höchst unterhaltenden Lesebuche für jeden Gebildeten.

Stuttgart und Tübingen, im November 1837.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Schriftsteller und Buchhändler, Componisten und Musikverleger, Künstler und Besizer von Kunsthandlungen, welche sich über ihre Berechtigung unterrichten wollen, endlich alle zichterliche Beamte, welche über literarische oder artistische Verhältnisse zu entscheiden haben, mache ich aufmerksam auf folgende eben bei mir erschienene Schrift:

### Das königl. preussische Gesetz vom 1ten Juni 1837 zum Schutze des Eigenthums an Werken der Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck und Nachbildung.

Dargestellt in seinem Entstehen und erläutert in seinen einzelnen Bestimmungen aus den amtlichen Quellen

durch **Dr. Julius Eduard Hübner**.

viii und 122 Seiten. 8. Sauer brosch. 12 Gr.

Dem Herrn Verfasser sind, wie aus dem Titel und der Vorrede hervorgeht, die amtlichen Quellen zur Committirung des für Wissenschaft und Kunst so wichtigen Gesetzes vom 1ten Juni eröffnet worden, es wird also keiner weiteren Empfehlung seiner Schrift bedürfen.

Ferdinand Dümmler in Berlin.

In der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart ist erschienen:

## Das Ausland.

Ein Tagblatt

für Kunde des geistigen und sittlichen Lebens der Völker.

Monat November 1837.

Größere Auflage.

Reisestücken aus Frankreich. 1) Reise von Paris nach Bordeaux. 2) Aufenthalt in Bordeaux. Das Kloster auf dem Berge Sinai. Die Rhodocoe-Compagnie. Ansichten von Pesth. 1) Das Äußere der Stadt. 2) Öffentliches Leben und Treiben. 3) Gasthöfe und Kaffeehäuser. 4) Der Donaustrand. 5) Waarenlager und Ausstellungen. 6) Häusliches Leben. 7) Gewerbetätigkeit. 8) Das Stadtwäldchen. 9) Die Brücke. Aphorismen aus dem Völkerverleben: Die Grazie im Sudan. Einfluß des Klimas. Über den Einfluß der europäischen Civilisation auf Asten. Historische Erzählungen der Radchuten. 2) Geschichte Bertap Sing's und Harnak's. Die Ruinen von Selinunt. Die Stadt Buffalo. Die Gouverneure von Neuwales. Geschichtliche Gesellschaften in Aegypten. Die Priesterherrschaft in Nordamerika. Erster Artikel. Südamerikas Schätze. Französische

Gerichtsverhandlungen: Der Mörder Roussel. Über die Alterthümer in Bannian. Sitten und Gebräuche in Northumberland. Die Russen im Kaukasus. (Mit einer Karte der kaukasischen Provinzen.) Die Chinesische Tatarei und Khoten. Der Ackerbau in Indien. 1) Lage des Ackerbauers. 2) Kulturpflanzen. Erinnerungsbilder aus Südamerika. I. II. Ein Besuch in den Katafomben von Paris. Über den alten Handel zwischen Indien und Arabien. Etwas über die Venetianer. Schweden. (Aus der Reisekarte eines deutschen Touristen.) Wissenschaftliche Ergebnisse der Reise der Bonite. Der ugrische Volksstamm. Das Lektarien. (Aus der Reisekarte eines deutschen Touristen.)

### Chronik der Reisen.

Schreiben des Dr. Wit aus Gortum. Aus den Reisebeschreibungen eines Nordamerikaners im steinigten Arabien. Wanderungen in Serbien. Reise durch die Moldau und Wallachien im Sommer 1837. Schreiben des Professors Sjögren aus Lissib.

### Kleinere Mittheilungen.

Geologische Notizen: Eine neue Sauriergattung; über die Identität des neuen rothen und des bunten Sandsteins. Desbeben im Departement Salvados. Sinken der westlichen Küste von Grönland. Erdtemperatur in Sibirien. Verbreitung der Gerste im Norden. Nachgrabungen bei Poitiers. Die österreichische Marine. Sidergesellschaften. Der Ergobytensasse. Über die Vorkasität der Pest. Die Höhlenstädte in der Krain und im Kaukasus. Nachlaß eines Großfürsten. Schulen im Seindepartement. Literarische Notizen: Mignet beabsichtigt ein Werk über die Reformation; über betruerische und umbrische Münzen; Werk über die Kathedrale in Lund; Ustrialow's Geschichte von Russland; Werk über die spanische America; ein Manuscript über die geistige Unruhe unter Karl V.; Auffindung von Manuscripten über die erste Theilung Polens. Der Natur über Guineawurm. Die kleine Post in London. Stand der Eisenbahnen in England. Zustand der Typographie in Schweden. Indianische Galanterie. Einfluß des Mondes auf das Holz. Mosaikarbeit in Russland. Theel. Gefährdung vieler Schiffe durch die Bewohner der Südpoleiseln. Unterrichtsanstalten in Algier. Hien zur Feigung der Wagen. Ein Frankenharem in Konstantinopel.

### Inhalt des Literaturblattes.

Die deutsche Romantik und der englische Geschmack. Jacques, von George Sand. Missionshymne, aus dem Englischen der amerikanischen Dichterin Miss Sigourney. Walter Scott über Lord Byron. Schiller's Don Carlos ins Englische übersetzt. Ältere und neuere englische Poesie. Scherzhafte Sonette von Galt. Dogmatische Controversen in England. Neugriechisches: Lied von Christophulos. Die Memoiren des Teufels. Carrel's Schriftstellerische Eigenthümlichkeit. Die Prinzessin, von Lady Morgan. Reise ins Schlaraffenland, von Beranger. Eine Capricie, von Alfred de Musset. Alessandro Manzoni. Zweiter Artikel.

In allen Buchhandlungen Deutschlands ist zu haben:

## Thespiis.

Originalspiele für die deutsche Bühne

von

**Friedr. Clemens Serke.**

Erster Band.

8. Altona, Hammerich. Geh. 1 Thlr. 8 Gr.

Inhalt: Die Auswanderer am Ohio, Lustspiel in fünf Aufzügen.

Das Pöpschen, Lustspiel in zwei Aufzügen.

Das Automat, dramatische Skizze.

Dieser erste Band, dem nächsten ein zweiter folgen wird, enthält das Lustspiel: Die Auswanderer, welches bereits auf dem Stadttheater zu Hamburg gegeben und von mehreren der angesehensten Bühnen zur Aufführung angenommen worden ist.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

# Das Pfennig-Magazin

für Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse.

1837. December. Nr. 244 — 248.

**Nr. 244.** Die deutschen Zollvereine. (Fortsetzung.) Der Kampf mit dem Alligator. Neue Holzverkohlungsmethode. \* Abang. Das Kreisrad. Zur Statistik des Handelsverkehrs in Nishnei-Nowgorod. Das Land Iskarob. \* Bilder aus Rom. IV. — **Nr. 245.** \* Galerie der deutschen Bundesfürsten. XXXII. Leopold, Fürst zur Lippe. Die deutschen Zollvereine. (Bechluss.) — \* Bilder aus Rom. V. Reisebenteuer in Canabada. Der Salzberg in Cardona in Spanien. \* Fischerei in Nordamerika. — **Nr. 246.** \* Galerie der deutschen Bundesfürsten. XXXIII. Georg Wilhelm, Fürst zu Schaumburg-Lippe. Die Rrim. Töpferwaaren in England. \* Belem. Lebensversicherungen. Einer der merkwürdigsten Redner unsers Jahrhunderts. \* Bilder aus Rom. VI. — **Nr. 247.** \* Galerie der deutschen Bundesfürsten. XXXIV. Georg Heinrich Friedrich, Fürst von Waldeck und Pyrmont. XXXV. Ludwig Wilhelm Friedrich, Landgraf zu Hessen-Homburg. Der Schmied zu Grotta-Green. Ragusa. \* Das Kloster zu St. Vincent di Fora in Lissabon. Eisbereitung in Bengalen. Die Rathedrale zu Lund. Bilder aus Rom. VII. — **Nr. 248.** \* Luebe an Eorengflusse. Bilder aus Rom. VIII. Charakter und Sitten der Chinesen. Griechenlands Klima. \* Peter Vischer. Über die Abschaffung des Sklavenhandels. \* Römische Aphenkrüge. Militairische Organisation der Hunde in Afrika. Der Dom von Köln.

Die mit \* bezeichneten Aufsätze enthalten eine oder mehrere Abbildungen.

Preis dieses Jahrgangs von 52 Nummern 2 Thlr. — Der erste Jahrgang von 52 Nrn. kostet 2 Thlr., der zweite von 39 Nrn. 1 Thlr. 12 Gr., der dritte von 52 Nrn. 2 Thlr., der vierte von 53 Nrn. 2 Thlr.

Leipzig, im Januar 1838.

J. A. Brochhaus.

In der Unterzeichneten ist erschienen und an alle Buchhandlungen verlanft worden:

## Polytechnisches Journal,

herausgegeben

von den

**DD. Dingler und Schultes.**

Erstes Novemberheft.

Inhalt: Perkins, über die Anwendung der pneumatischen Maschinen an Bergwerken und zu andern Zwecken. Darc. Beschreibung einer neuen Luftpumpe, welche entweder als solche, oder als Verdichter, oder auch als beides zugleich dienen kann, und mit deren Hüffe man einen Raum auspumpen, oder seinen Inhalt verdichten, oder ein Gas aus einem Raume in den andern schaffen oder auch durch eine Flüssigkeit treiben kann. Mit Abbild. Castels's Versuche über den Ausfluss des Wassers durch überfälle. Beschreibung einer in Niederfallbach bei Koburg aufgestellten, nach der Idee von Leovier durch den herzoglich Koburgischen Rammerrath Ludolf ausgeführten Wasserhebmachine. Mit Abbild. Sharpe's Verbesserungen an den Vorrichtungen zum Sägen von Holz und andern Dingen. Mit Abbild. Beschreibung einer Schraubenklappe zum Schneiden vollkommen flacher Gewinde. Mit Abbild. Englische tragbare Bohrmaschine für Mechaniker, beschrieben von Prof. Schneider. Mit Abbild. Schrapnell's Verbesserungen an den Lichtpuken. Mit Abbild. Beschreibung eines Weiffstift- und Federhalters von der Erfindung des Hrn. Bownd. Mit Abbild. Parlour's Verbesserungen an den Apparaten zum Skizziren und Zeichnen. Mit Abbild. Über Zeichnisse zum Zeichnen auf Glas von der Erfindung des Hrn. S. B. Snowlett, Hauptzeichner bei der Artillerie.

Brand's Verbesserungen im Abdampfen und Abkühlen von Flüssigkeiten. Mit Abbild. Berry's verbesserter Apparat zum Darren, Baden und Kösten vegetabilischer Stoffe, besonders des Stärkmehls zur Fabrikation von Gummi für Kauttabuckereien, welcher auch zum Abdampfen von Gruppen anwendbar ist. Mit Abbild. Beschreibung des von den Herren Tometel und Lemare erfundenen Badofens. Mit Abbild. Montecat, Beschreibung der in Glastuben gebräuchlichen Ralkfisen. Mit Abbild. Cooper's verbesserte Methode, verschiedene Verzierungen, Dessins und Farben auf Glas auszuführen. Samlins Verbesserungen in der Eisen- und Stahlfabrikation. Bouchardat, über die Produkte, welche man bei der Destillation des Kautschuks erhält. (Doppelte Kohlenwasserstoff, Kautschuk, Seiden.) Miscellen. Preise, welche die Société industrielle in Nüßthausen in ihren Generalversammlungen vom 11ten Mai 1838, 1839 und 1840 zuertheilen wird. Über die große Verbindungsseisenbahn zwischen Birmingham, Manchester und Liverpool. Bauanschläge der London-Birmingham-Eisenbahn. Einnahmen an der großen Verbindungsseisenbahn zwischen Birmingham und Manchester. Prof. Nollet's verbesserte Dampfmaschine. Lorf zur Beheizung von Dampfbooten verwendet. Vistrucchi's Erfindung in der Metallurkunde. Pelitier's neuer Dynamometer. Einfluss des Kupfers auf die Dehnbarkeit des Stahls. Über den Schwefelstoffsstoff. Künstliche Bereitung des Oxidations, welcher das Bouquet der Weine bildet. Über die Zusammensetzung einiger englischen und bairischen Biere. Reinigung der Malzbottiche in den Brauereien durch Kalk. Ausbringung von Fleden aus Kupferstichen und Büchern. Über das in China gebräuchliche Theeöl. Zur Handelsstatistik von Belgien.

Zweites Novemberheft.

Über die Bennett'sche Dampfmaschine. Mit Abbild. Hachworth's Verbesserungen an den Dampfmaschinen. Mit Abbild. Johnson, über einen von Hrn. S. Raub erfundenen Sicherheitsapparat für Dampfessel. Mit Abbild. Winn's Verbesserungen an den Eisenbahnen und an den auf ihnen laufenden Wagen. Mit Abbild. Armstrong's Verbesserungen an der hydraulischen Presse, wodurch dieselbe allgemeiner zum Heben von Wasser und andern Substanzen, sowie auch als Triebkraft anwendbar wird. Mit Abbild. Regit's Verbesserungen an den Ankern und an den zum Aufhängen derselben dienenden Apparaten, welche Verbesserungen auch auf die gewöhnlichen Anker anwendbar sind. Mit Abbild. v. Bobe's Verbesserungen an den Ankern und an den Spillen. Mit Abbild. Dobb's Verbesserungen an den Schießgewehren, welche zum Theil auch auf gewöhnliche und andere Kanonen anwendbar sind. Mit Abbild. Sodner's Verbesserungen in der Fabrikation von Nieten, Schraubenbolzen und andern dertel Gegenständen. Mit Abbild. Harding's Verbesserungen an den Febers, Weiffstift- und Kreidelhaltern. Mit Abbild. Young's Verbesserungen an den Biechmaschinen und Rollen für Fenster, Schiebefenster und andere Zwecke. Mit Abbild. Corbett's Verbesserungen an den Fasern. Mit Abbild. Bericht des Hrn. Amédée Durand über die von Hrn. Palliste in Paris erfundenen Gefäße mit ununterbrochenem Winde. Mit Abbild. Greig's verbesserte Methode mittels eines Cylinders oder einer Walze auf Baumwolle, Seiden-, Flachs-, Hanf- oder Wollelenfabrikate oder auch auf Papier zu drucken und zugleich verlebene Dessins heraufzubringen. Mit Abbild. Buchanan's verbesserter Apparat zum Färben und zu andern ähnlichen Operationen. Mit Abbild. Brigley's verbessertes Zeugnis für Papiermacher. Mit Abbild. Berry's Verbesserungen an den Gasmessern. Mit Abbild. Spillsbury's Verbesserungen in der Fabrikation von kohlenfaurem Patron. Mit Abbild. Über den Einfluss heißer und kalter Gekühlung auf die Eigenschaften des Hohlensens. 1) Über die Stärke des kalt geblassenen Eisens in Vergleich mit dem heiß geblassenen. 2) Über die Zusammensetzung des kalt geblassenen Eisens in Vergleich mit dem heiß geblassenen. 3) Theorie der Wirkung der heißen Gekühlung in den Hohlens. Über die Methoden, wodurch das Ausbleichen der Schrift von gebrauchtem Stempelpapier und die Verschärfung von öffentlichen und Privatakten verbütet werden kann. Aus einem Bericht an die pariser Akademie. Über das Bleichen des alten Stempels.



papiers. Über die Verhinderung der Schriftverfälschungen. Bereitung der zerstörbaren und unzerstörbaren Tinte. Über das Mozard'sche Sicherheitspapier. Miscellen. Englische Patente. Brunton's Verbesserungen an den Apparaten zum Erhitzen von Flüssigkeiten und zum Erzeugen von Dampf. Cochran's Locomotive. Frn. Gabarru's bewegliche Bahn. Über die Paris-St.-Germain-Eisenbahn. Über die Anwendung von Dampf bei Hohenprocessen. Über den Hohenprocess mit Anthracit. Unzerstörbar gemachter Zink. Anthon's Bereitungsart eines reinen Nictoxydes. Über ein neues blassiges Nictalz, welches sich in den Blei- und Zinkfabriken hieselbst bildet. Mischungen zu gefährtem Feuer. Über die Benützung von Steinöl zur Gasbeleuchtung. Vorschrift zur Bereitung einer Tinte ohne freie Säure. Zerfließende Einwirkung des Kupfers auf die Tinte. Weitere Notizen über Saufray's Düngebereitung.

Von diesem sehr gemeinnützigen und wohlfeilsten Journal erscheinen wie bisher monatlich zwei Hefte mit Kupfern. Der Jahrgang, aus 24 Heften mit 24—36 Kupferplatten bestehend und welcher mit einem vollständigen Sachregister versehen wird, macht für sich ein Ganzes aus und kostet durch die Postämter und Buchhandlungen nur 9 Thlr. 8 Gr., oder 16 Fl. In das Abonnement kann nur für den ganzen Jahrgang eingetret werden.

Ein dieses Journal begleitender Anzeiger nimmt einschlägige Dienstgesuche, Waaren- und Maschinen-Anbietungen, Bücheranzeigen u. s. w. gegen sehr billige Insertionsgebühren auf, und die Verlags-Expedition besorgt die einschlägige Correspondenz. Stuttgart und Augsburg, im December 1837.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

In der Wagner'schen Buchhandlung in Dresden ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Wiederholte Prüfung der Eckernförder Elementarschuleinrichtung, mit Rücksicht auf Dr. Diesterweg's Urtheil hierüber — über die Anwendung derselben bei dem Unterrichte in dem Gesange, der Gymnastik und Industrie — Grundzüge zu einer Veauffichtigung- und Beschäftigungsanstalt für die Jugend in größeren Städten. Mit 16 nähern Nachweisungen zur Beschreibung der Freischule zu St.-Marien in Flensburg, einer Tafel mit Figuren zur Gymnastik und 10 Tabellen zum Gesangsunterricht. Von **C. Fr. G. Baumfelder**, Oberlehrer in Dresden. Gr. 8. In Umschlag. Preis 16 Gr.

## Th. Mundt's Weltfahrten.

Eben ist bei mir erschienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands, Oesterreichs, der Schweiz und Dänemarks zu haben:

**Spaziergänge und Weltfahrten.**

Von  
**Theodor Mundt.**

Erster Band.

1. Briefe aus London. 2. Tagebuch aus Paris.

3. Elegant gebunden. 2 Thlr.

Diese lebendigen Skizzen, die unter einem begünstigten Aufenthalte des Verfassers in London und Paris entstanden, dürften als Uebersetzungen zur Zeit- und Tagesgeschichte ein dauerndes Interesse ansprechen, da sie wahre Culturbilder der Gegenwart sind und in einer klaren und pikanten Anschauung ein lebensgetreues Tableau der großen Welthauptstädte liefern. Es wird diese Bilder Niemand aus der Hand

legen, ohne sich über die wichtigsten Angelegenheiten des Tages und die berühmtesten Persönlichkeiten der Zeitwelt darin auf eine neue Weise orientirt zu haben, weshalb wir dies an Anregung und Unterhaltung so reiche Werk gebildeten Lesern aller Stände dringend empfehlen. Der zweite Band, der eine Reihe humoristischer Briefe unter dem Titel: „Deutschland in Frankreich, Briefe an einen deutschen Kleinbäcker“, enthält, befindet sich unter der Presse und wird mit nächstem erscheinen.

Altona, im Januar 1838.

J. F. Hammerich.

## BUREAU DE TRADUCTION.

(Paris, rue St.-Jacques No. 189.)

Der Zweck dieser Anstalt ist, die deutsche Literatur in Frankreich ihrem Inhalte nach bekannt zu machen. Das Bureau arbeitet für nachstehende Blätter: *Minerve du Nord* (sein eigenes Blatt), *Mémorial encyclopédique*, *Echo du monde savant*, *Revue française et étrangère*, *Revue britannique*, *Revue française*, *Magasin de zoologie*, *Annales des sciences naturelles*, *Journal des connaissances usuelles*, *Magasin universel*, *Magasin pittoresque*, *Paris advertiser*, *le Temps*, *l'Echo de France*. Jedes deutsche Werk, welches ihm zugesandt wird, das 8 Fl. Ladenpreis nicht überschreitet, wird in vier dieser Blätter, je nach dem Inhalte angezeigt und kurz analysirt. überschreitet das Werk diesen Preis, so werden ausführlichere Analysen davon gemacht und wenigstens in acht bis zehn Nummern dieser Blätter davon gesprochen. Den Prachtwerten wird noch eine größere Publicität gegeben. Sie werden der Reihe nach den fünf hiesigen Akademien und den funfzehn bis zwanzig wichtigsten gelehrten Gesellschaften je nach dem Inhalte vorgelegt und die Analyse in die Bulletins eingebracht. Die angezeigten Werke werden auch zum Verkauf in Commission genommen. Die Vortheile dieser Anstalt sind leicht einzusehen, sowie die große Publicität, welche jedem Werke nach seinem Inhalte und seiner Wichtigkeit gegeben werden kann.

**Jacquemin,**

Directeur du bureau, professeur d'histoire naturelle etc.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

## Das Pfennig-Magazin für Kinder.

1837. December. Nr. 48—52.

Nr. 48. \*Der Fortgang der Reformation. \*Der Willens-kaiman. Franz und der Gärtner. Der Monat December. \*Die Speisezeit. Auflösung der Räthsel im vorigen Monat. Räthsel. — Nr. 49. \*Der Vogel Greif. Der tapfere Elefant. \*Die Schüttelbahn. Der Geiz. \*Das Raufschul. Nr. 50. \*Die Gagele. Ein Geschächten von einer treuen Kage. \*Der Frankenkönig Elodwig. Der Zauberer aus dem Heusch-her. Die gefessenen Spinnen. \*Die Blindmaus oder der Elepaz. Räthsel. — Nr. 51. \*Der gesegnete Fischzug des Petrus. Das Glück und Misgeschick. \*Die Hahnenkämpfe. Der vergnügte Abend und die Reisenden. \*Die Berg- oder Ringamsel. — Nr. 52. \*Der Beseigte. Der hochfahrende Spanier und Heinz von Ramstein. Eine Liebe ist der andern werth. \*Die Schlitzschuhfollarten. Der Fischer und sein Sohn. (Hierzu das Titelbild.) \*Der Kabeisau. Auflösung der Räthsel in diesem Monat.

Die mit \* bezeichneten Aufsätze enthalten eine oder mehre Abbildungen.

Preis dieses Jahrgangs von 52 Nummern 1 Thlr. — Der erste bis dritte Jahrgang kosten ebenfalls jeder 1 Thlr.

Leipzig, im Januar 1838.

**F. A. Brockhaus.**

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. IV.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

## N<sup>o</sup> III.

### Commissionsartikel

von

**Brockhaus & Avenarius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur  
in **Leipzig** und **Paris.**

1837. October bis December.

(Nr. I dieses Berichts, die Artikel vom Januar bis Juni enthaltend, befindet sich in Nr. 33 des Bibliographischen Anzeigers von 1837; Nr. II, die Artikel vom Juli bis September, in Nr. 44 desselben.)

51. **Biedermann (F. B. François)**, Don Quichotte, et la tâche de ses traducteurs: Eclaircissements nouveaux sur le style et l'esprit de l'original, et sur l'interprétation de son texte; développés dans une analyse du début de son nouveau traducteur français, M. Viardot. Gr. in-8. Paris. 16 Gr.

52. **Czaykowski (Michal)**, Wernyhora wieszcz Ukraiński powieść historyczna z roku 1768. (Wernyhora, die ukrainische Wahrsagerin, historische Erzählung aus dem Jahre 1768.) 2 Tom. Gr. 8. Paryż. 4 Thlr. 12 Gr.

53. **Denkschriften**, Neue, der Allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften. — Nouveaux mémoires de la société helvétique des sciences naturelles. Band 1. Mit 10 Tafeln. Gr. 4. Neuchâtel. 3 Thlr.

54. **Humbert (Joh.)**, Arabica chrestomathia faciliior, quam, partim ex profanis libris, partim ex sacro codice collegit, in ordinem digessit ac notis et glossario locupletavit. Vol. 1, arabicum textum complectens. 8maj. Parisiis, 1834. 4 Thlr.

55. **Schinz (Professor H. R.)**, Verzeichniß der in der Schweiz vorkommenden Wirbelthiere, als Erster Theil der auf Veranstaltung der Allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften entworfenen Fauna Helvetica. (Aus dem ersten Bande der „Neuen Denkschriften“ der Allgemeinen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften besonders abgedruckt.) Gr. 4. Neuchâtel. 2 Thlr.

56. **Wrotnowski (Felix)**, Powstanie na Wotyniu, Podolu i Ukrainie w roku 1831. Podług podań dowódczón i wspomóczeńników tegoż powstania. (Die Aufstände in Wolhynien etc. im Jahre 1831 etc.) Tom. II. 8. Paryż. 2 Thlr. 6 Gr.

Tom. I, II. 4 Thlr. 12 Gr.

Für Freunde der ausländischen Literatur  
erscheint bei uns ununterbrochen und wird monatlich zweimal gratis  
ausgegeben.

### Bulletin bibliographique

de la littérature étrangère publié par **Brockhaus & Avenarius** à Leipzig. (à Paris: même maison,  
Rue Richelieu No. 60.)

Auch ist von uns gratis zu beziehen:

Verzeichniß der vorzüglichsten für 1838 in Frankreich erscheinenden Journale, welche durch **Brockhaus & Avenarius**, Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur in Leipzig und Paris zu beziehen sind.

Im Verlage des Literatur-Comptoirs in Stuttgart erschien und ist durch alle Buchhandlungen auf feste Bestellung zu haben:

### Portrait des Dr. D. F. Strauß,

Versaffer des „Leben Jesu“,

nach dem Leben gezeichnet von **Schmidt**, in Stahl  
gestochen von **Karl Mayer.**

Auf feinstem franz. Kupferdruckstein, in Großquart, Chines. Papier, 22 Gr., oder 1 Fl. 30 Kr.

Auf feinstem franz. Kupferdruckstein, in Großquart, weiß Papier, 18 Gr., oder 1 Fl. 12 Kr.

Auf feinem franz. Kupferdruckstein, in Großoctav, 12 Gr., oder 48 Kr.

Bei Bestellungen bitten wir durch Beifügung des Preises genau die gewünschte Ausgabe zu bezeichnen.

Vor Kurzem erschienen in Ernst Klein's literarischem Comptoir in Leipzig:

### Der Talmudist

in der eleganten Welt. Scenen und Skizzen aus der Gegenwart vom Verfasser des „Jüdischen Gil-Blas“.

13<sup>3/4</sup> Bogen. 8. Brosch. 1 Thlr.

Des Verfassers treffende Art, die Eigenschaften und Sonderbarkeiten der Kinder Israels darzustellen und ihr Thun zu enthüllen, ist zu bekannt, als daß diese neue Schilderung größter Empfehlung bedürfte.

### Nießwurziprisen

für Juden und Christen. 2tes Heftchen. 40 S.

Gr. 16. Brosch. 5 Gr.

Der Beifall, welchen das 1ste Heftchen (32 S., 4 Kr.) sich erwarb, wird gewiß auch diesem zu Theil werden. In Wiß und Satire ist der tiefste Ernst verthüllt.

Bei Chr. Garthe in Marburg ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

**Scheffer, Dr. W.**, Über Predigervereine und eine Reform des Conventwesens, in besonderer Beziehung auf Kurhessen. Nebst einem Nachtrage über theologische Literatur als Wegweiser für Predigerbibliotheken. Gr. 8. Brosch. 1 Thlr., oder 1 Fl. 48 Kr.



In meinem Verlage ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu erhalten:

## Deutsches Declamatorium.

Von

Karl Ludwig Kannegiesser.

In drei Theilen.

8. Geh. 2 Thlr.

Erster Theil. Für das erste Jugendalter, insbesondere für die untern Classen der Bürgerschulen und Gymnasien. Geh. 8 Gr.

Zweiter Theil. Für das mittlere Jugendalter, insbesondere für die höhern Classen der Bürgerschulen und die mittlern Classen der Gymnasien. Geh. 12 Gr.

Dritter Theil. Für das reifere Jugendalter, insbesondere für die obern Classen der Gymnasien. Geh. 1 Thlr. 4 Gr.

Der Verfasser, Director des königlichen Friedrichsgymnasiums zu Breslau, ward zur Bearbeitung eines für die verschiedenen Classen der Schulen zweckmäßig geordneten Declamatoriums aufgefordert. Sein darauf gemachter Entwurf fand den Beifall der geachteten Lehrer und Schuldirectoren, und das Buch ist schon bei seinem Erscheinen in preussischen Schulen eingeführt.

Das Declamatorium enthält von ältern Stücken nur sowohl klassische als unentbehrliche, dagegen aber eine reiche Auswahl aus den neuern deutschen Dichtern, aus Chamisso, Immermann, Platen, Stagemann, Senau, Wilhelm Müller, Rückert, Freiligrath u. A. Zweckmäßige Register erleichtern den Gebrauch, und der wohlfeile Preis der einzelnen Theile macht das Buch zur Einführung in Schulen noch besonders geeignet. Leipzig, im Februar 1838.

F. A. Brockhaus.

## Vollständigste und wohlfeilste französische Sprachlehre.

Vollständiger Auszug  
der französischen

# Sprachlehre

vom

ABBÉ MOZIN,

oder:

neue und leichtere Art, Französisch zu lernen, durch Darstellung der wesentlichen Regeln in beiden Sprachen, nebst vielen französischen und deutschen Übungen über dieselben.

Vierte, umgearbeitete und vermehrte Ausgabe, welcher eine 12 Bogen starke Auswahl französischer und deutscher Gespräche, nebst einer Sammlung der unentbehrlichsten Wörter und sprichwörtlicher Redensarten, als Anhang beigegeben ist.

37 Bogen. Gr. 8. Preis 16 Gr., oder 1 fl.

Dieses Werk ist insbesondere für die deutsche Jugend und für die Schulen bestimmt. Da alle Noththeile in beiden Sprachen abgehandelt sind, so haben die Schulen den Vortheil, daß sie sich mit den beiderseitigen Kunstausdrücken der Sprachlehre bekannt machen können. Die Gespräche umfassen die mannich-

faltigsten Gegenstände, welche sich auf das gemeine Leben beziehen, und dürften daher am besten geeignet sein, mit den in beiden Sprachen gebräuchlichen Redensarten vertraut zu machen. Stuttgart und Tübingen, im December 1837.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

## ANZEIGE

für

Ärzte, Wundärzte und Stadirende.

Bei C. Scheld & Comp. in Leipzig und Baltimore ist nachstehendes empfehlenswerthe Werk erschienen und kann durch alle Buchhandlungen Deutschlands und der Schweiz bezogen werden:

## Handbuch der

## medizinischen Chemie

nach den neuesten und besten Quellen, mit Berücksichtigung ihrer technischen Anwendung bearbeitet für Ärzte, Wundärzte und Studirende, sowie zum Selbststudium und zur Vorbereitung zum Examen

von

Karl Gottlieb Wilhelm Reichel.

Bevorwortet von

Dr. Heinrich Ficinus,

Prof. der Physik und Chemie an der chirurg.-medicin. Akademie zu Dresden etc.

2 Abtheilungen in 8.

Preis 1 Thlr. 18 Gr.

In Sachs' Almanach f. 1838 wird dies Werkchen lobend erwähnt und unter Andern gesagt: „Das Buch bietet, wie, wol nur kleinen Umfanges, einen dem jetzigen Stande der Wissenschaft sehr angemessenen Überblick des „Wichtigsten aus der auf Medicin und Chirurgie angewandten Chemie.“

Bei Chr. Garthe in Marburg ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu haben:

Vier Abbildungen  
des Schädels der Simia Satyrus  
von verschiedenem Alter,  
zur Aufklärung der Fabel vom Orañ utañ,  
herausgegeben

von

Dr. C. F. Heusinger.

Preis 1 Thlr. 16 Gr.

Bei Joh. Fr. Hartknoch in Leipzig erschien soeben und wurde an alle Buchhandlungen des In- und Auslandes versandt:

über  
die neuesten Darstellungen und Beurtheilungen  
der

## Serbart'schen Philosophie

von

G. Hartenstein,

ordentl. Professor der Philosophie an der Universität zu Leipzig.  
Gr. 8. In Umschlag geheftet. Preis 18 Gr.

**In dem Verlage  
von F. A. Brockhaus in Leipzig  
erscheinen für 1838 folgende Zeitschriften:**

**Leipziger Allgemeine Zeitung.** Hoch 4. Auf seinem Druck-Wellpapier. Pränumerationspreis vierteljährlich 2 Thlr. 12 Gr. Täglich mit Einschluß der Sonn- und Festtage erscheint eine Nummer von einem Bogen nebst Beilage von einem oder einem halben Bogen. Die Insertionsgebühr für den Raum einer gespaltenen Seite beträgt 1½ Gr. und Anzeigen aller Art genießen einer großen Verbreitung durch diese Zeitung.

**Blätter für literarische Unterhaltung.** Täglich außer den Beilagen eine Nummer. Gr. 4. Auf seinem Druck-Wellpapier. Preis des Jahrgangs 12 Thlr.

**Flis.** Encyclopädische Zeitschrift, vorzüglich für Naturgeschichte, vergleichende Anatomie und Physiologie. Herausgegeben von H. N. 12 Hefte. Mit Kupfern. (Zürich.) Gr. 4. Preis des Jahrgangs 8 Thlr.

**Allgemeine medicinische Zeitung.** Herausgegeben von Dr. C. Pabst. Wöchentlich zwei Nummern von einem Bogen. Gr. 4. Preis des Jahrgangs auf seinem Druck-Wellpapier 6 Thlr. 16 Gr.

Für diese drei Zeitschriften erscheint gemeinschaftlich ein **literarischer Anzeiger.** der zu literarischen Insertionen aller Art benutzt wird. Die gesaltene Seite oder deren Raum wird mit 2 Groschen berechnet.

Gegen Vergütung von 3 Thlr. werden Anzeigen u. s. w. den Blättern für literarische Unterhaltung und für 1 Thlr. 12 Gr. der Allgemeinen medicinischen Zeitung und der Flis beigelegt oder beigeheftet.

**Allgemeine Bibliographie für Deutschland.**

Eine Übersicht der Literatur Deutschlands, wie der bedeutendsten Schriften des Auslandes, nebst Angabe künftig erscheinender Werke und andern auf den literarischen Verkehr bezüglichen Mittheilungen und Notizen. Mit alphabetischen und systematischen Registern. Dritter Jahrgang. In wöchentlichen Nummern von 1—2 Bogen. Gr. 8. Auf gutem Druckpapier. Preis des Jahrgangs 3 Thlr.

**Repertorium der gesammten deutschen Literatur.** Herausgegeben im Verein mit mehreren Gelehrten von Ernst Gotthelf Gersdorf. 15ter Band und folgende. (Beigegeben wird: Allgemeine Bibliographie für Deutschland.) Gr. 8. Preis eines Bandes von 50 Bogen auf gutem Druckpapier 3 Thlr.

Dem Repertorium erscheint regelmäßig am 15. und 30. jeden Monats ein Heft, dessen Umfang sich nach dem vorhandenen

Material richtet. Es enthält eine kritische Würdigung aller neuen Erscheinungen der deutschen Literatur und bietet im Verein mit der Bibliographie die vollständige Übersicht der gesammten neuen literarischen Erzeugnisse.

Dem Repertorium und der Allgemeinen Bibliographie wird ein

**Bibliographischer Anzeiger** beigegeben, welcher literarischen Anzeigen und Nachrichten aller Art offen steht. Die Insertionsgebühren betragen für den Raum einer Seite 1½ Gr. Besondere Beilagen, Prospekte, Subscriptionsanzeigen u. werden für jede dieser Zeitschriften gegen die Gebühr von 1 Thlr. 12 Gr. angenommen.

**Das Pfennig-Magazin für Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse.** Sechster Jahrgang. Wöchentlich eine Nummer. Mit vielen hundert Abbildungen. Schmal gr. 4. Auf seinem Wellpapier. Preis eines Jahrgangs 2 Thlr.

Die früheren Jahrgänge des Pfennig-Magazins sind noch in elegantem Umschlag geheselt zu den äußerst billigen Preisen zu erhalten: I., Nr. 1—52, 2 Thlr.; II., Nr. 53—91, 1 Thlr. 12 Gr.; III., Nr. 92—143, 2 Thlr.; IV., Nr. 144—196, 2 Thlr.; V., Nr. 197—248, 2 Thlr.

Das Intelligenzblatt zum Pfennig-Magazin eignet sich zu Anzeigen aller Art, welche für ein großes Publicum bestimmt sind. Die Insertionsgebühren werden bei einer Auflage von gegen 30,000 Exemplare nur mit 5 Gr. für die gesaltene Seite oder deren Raum, besondere Beilagen aber mit 18 Gr. für das Tausend berechnet.

**Das Pfennig-Magazin für Kinder.** Fünfter Jahrgang. 52 Nummern. Klein 4. Auf seinem Wellpapier. Mit 200 Abbildungen. Preis des Jahrgangs 1 Thlr.

Der erste bis vierte Jahrgang haben gleiche Preise.

**Zeitgenossen.** Ein biographisches Magazin für die Geschichte unserer Zeit. Dritte Reihe. Sechsten Bandes siebentes und achttes Heft. Gr. 8. Geh. Preis des Heftes von 6—7 Bogen auf gutem Druckpapier 12 Gr.

**Leipziger Kreisblatt.** Zweiter Jahrgang. Gr. 4. Pränumerationspreis vierteljährlich 12 Gr.

Wöchentlich erscheinen drei Nummern. Für Bekanntmachungen jeder Art wird der Raum einer gespaltenen Seite mit sechs Pfennigen berechnet.

Wir machen alle Geschichtsfreunde darauf aufmerksam, daß der herabgesetzte Preis von 5 Thlr. 12 Gr., oder 9 fl. Rhein., für

# Ernst Münch's allgemeine Geschichte

## der neuesten Zeit, von dem Ende des großen Kampfes der europäischen Mächte wider Napoleon Bonaparte bis auf unsere Tage. Sieben Bände.

mit Ende Februars d. J. ertischt und sodann die frühern Preise wieder eintreten. Durch einen von Dr. Franz Kottencamp bearbeiteten Supplementband (à 1 Thlr. 6 Gr., oder 2 fl. Rhein.) ist dieses Werk bis auf die neueste Zeit fortgeführt und namentlich den Besitzern der Geschichtswerke von Hottet, Vois, Becker u. s. w. als ein wichtiges Ergänzungswerk zu empfehlen. Wer von dem äußerst wohlfeilen Preise noch Gebrauch machen will, beliebe seine Bestellung baldigst an die nächste Buchhandlung gelangen zu lassen.

Stuttgart, im Januar 1838.

**Literatur-Comptoir.**

# Lenau's Gedichte.

Dritte Auflage.

Mit dem Bild des Verfassers.

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Gedichte

von

Nikolaus Lenau.

Dritte, mit dem in Stahl gestochenen Bildniß des Verfassers geschmückte Auflage.

Velinpapier. Brosch. Preis 1 Thlr. 20 Gr., oder 3 Fl.

Vor fünf Jahren erschienen zum ersten Mal die Gedichte des unter dem Namen Nikolaus Lenau ungewöhnlich schnell bekannt gewordenen Dichters. Sie fanden unbedingte allgemeine Anerkennung, und Jeder begrüßte den Dichter als einen unsern größten Dichtergeister Ebenbürtigen. Hier haben wir nun bereits die Freude, von diesen Gedichten voll echter Romantik, Innigkeit, Barthheit, Tiefe, Glut und Glanz der Phantasie eine dritte mit dem Bildniß des Verfassers geschmückte Auflage anzubieten. Jeder Freund des Schönen wird der Reichthum und das reine Streben des edlen Geistes überausen, welcher — fern von jeder Nachahmung — in eigener echter Urkräftigkeit seine Schöpfungen vollendet.

Stuttgart und Tübingen, im December 1837.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Bei **C. Scheld & Comp.** in Leipzig und Baltimore ist nachstehendes empfehlenswerthe botanische Werkchen erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Schlüssel zur Botanik

nach

**Linné's System**

in Classen und Ordnungen.

Für

Gymnasien und zum Selbstunterricht

entworfen von

**M. B. TERMO.**

Nebst einer bildlichen Uebersicht aller Classen und Ordnungen auf einem Tableau.

Carton. schwarz 16 Gr., illumin. 1 Thlr.

Durch die Joh. Christoph Hermann'sche Buchhandlung in Frankfurt a. M. ist zu beziehen:

## Erwägungen

eines rheinischen Juristen

über die

## Gesetzlichkeit

der

## Verhaftung und Wegführung

des

Erzbischofs von Köln.

Mit Berücksichtigung der geschichtlich-kirchenrechtlichen Abhandlung des P. Göpler.

8. Geh. Preis 2 Gr., oder 9 Kr.

## Botanik,

für Freunde und Kenner derselben!!

Vollständig in drei Bänden, als **classisch** von allen Botanikern anerkannt, sowohl für den Botaniker von Fach, als auch für den Freund der Botanik unentbehrlich, kann die **dritte Auflage** von

**J. C. Moessler's**

## Handbuch der Gewächskunde.

Dritte Auflage,

herausgegeben, vermehrt und verbessert

von

**Dr. J. C. L. Reichenbach.**

Gr. 8. Drei Bände. Altona, Hammerich. 6 Thlr. 18 Gr. nicht dringend genug empfohlen werden.

Dieses sichere, zuverlässige Handbuch hat bereits beim Studium der Gewächskunde sich als **höchst praktisch** bewährt, was wol nichts besser beweist, als die allgemeine Verbreitung desselben, wodurch es auch möglich wird, einen so billigen Preis zu stellen.

Sammtliche solche Buchhandlungen Deutschlands, Oesterreichs, der Schweiz etc. haben dieses gediegene Werk stets vorräthig.

Bei E. F. Steinacker in Leipzig ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden:

## Summarium

des Neuesten und Wissenswürdigsten aus der

## gesamten Medicin

zum Gebrauche praktischer Ärzte und Wundärzte.

Jahrgang 1838. 1stes Heft.

Preis für 24 Hefte 6 Thlr. 16 Gr.

Soeben erschien in meinem Verlage folgende interessante Schrift, die in allen Buchhandlungen zu finden ist:

## Die römisch-hierarchische

## Propaganda,

ihre

Partei, Umtriebe und Fortschritte

in

Deutschland.

Mit Rückblicken auf die Opposition des Erzbischofs von Köln nach unumstößlichen Thatsachen geschildert

vom Verfasser der Schrift:

„Der Erzbischof von Köln, seine Principien und Opposition.“

Rom wollte immer herrschen; und als seine Legionen fielen, sandte es Dogmen in die Provinzen.

8. Geh. 8 Gr.

Die frühere Schrift des Verfassers kostet ebenfalls 8 Gr. Leipzig, im Februar 1838.

**F. A. Brockhaus.**

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. V.

Dieser literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Zeile 2 Gr.

In einigen Tagen erscheint in meinem Verlage eine Schrift unter dem Titel:

## Die Römische Curie im Kampf um ihren Einfluß in Deutschland,

veranlaßt

durch die Opposition des Erzbischofs von Köln gegen  
Preußen unter Mitwissenschaft Roms und das Ver-  
dammungsbreue des Hermes'schen Lehrsystems.

Vom Verfasser der Schrift:

„Der Erzbischof von Köln, seine Principien und  
Opposition.“

Motto: Die Tage der Geistesknechtschaft sind  
vorüber. Altersschwach zwischen den zerbrochenen  
Säulen ihres Colosseums sitzt die alte Kreuzspinne  
und spinnt noch immer das alte Gewebe. Aber es  
ist matt und morsch; es verfangen sich darin nur  
Schmetterlinge und Fledermäuse und nicht mehr die  
Steinadler des Nordens.

8. Circa 4 Bogen.

Leipzig, den 15ten Februar 1838.

F. A. Brockhaus.

## Ankündigung

von

## Soldaten- Kriegs- und Lager-Leben.

### Blüten der Erinnerung

aus

## dem Befreiungskriege

gesammelt

von

J. C. KRETZSCHMER.

Fünfundzwanzig Jahre sind verschwunden, seit  
jener Riesenkampf für die Freiheit und Selbständigkeit  
Deutschlands begann, und je weiter jene Zeit zurücktritt  
in die Nebel der Vergangenheit, je mehr gewinnt sie an  
Interesse für die Zeitgenossen. Als wir Jünglinge waren,  
und Männer von den Kämpfen am Rhein gegen die Franken,  
Greise vom alten Fritz und dem siebenjährigen Kriege  
erzählten, da klopfte uns das Herz höher in der Brust.  
So geht es auch jetzt unserer Jugend, bei welcher der  
Drang nach Thaten, ohngeachtet der langen Ruhe, noch  
nicht erstorben ist, wenn Augenzeugen von den Jahren  
1813, 1814 und 1815 sprechen.

Wohlan, Ihr Jünglinge, nehmt das Geschwätz des al-  
ten Kriegers von jener Blüthenzeit des preussischen Ruhmes  
freundlich auf, es ermunthige Euch zum gleichen Handeln,  
wenn König und Vaterland es heischen.

Ihr alten Waffengenossen, begleitet mich noch einmal  
auf dem Wege der Gefahr und des Sieges, der Noth und  
der Freude, und laßt Euch mit mir an den Träumen, die  
die Erinnerung Euch darbieten wird. Ich liefere Euch aber  
keine strategische Schilderungen der Operationen, sondern  
nur bunte Bilder aus jener Zeit. Gemälde des Soldatenle-  
bens auf dem Schlachtfelde, im Bivouac und in den Quar-  
tieren, Anekdoten und Charakterzüge, vermischt mit Gedich-  
ten und Novellen, Alles im heitern Gewande, denn wir  
wollen uns jener Zeit ja freuen, indem wir sie nochmals  
durchleben, jedoch nicht ohne belehrende Winke für den  
jungen Krieger über sein Benehmen im Felde.

Kr.

Die unterzeichnete L. G. Homann'sche Buchhandlung  
hat die Schrift in Commission genommen, sie erscheint,  
elegant ausgestattet, zur Ostermesse in zwei Bändchen, zu  
einem Subscriptionspreis von 1 Thlr. 5 Sgr. für jedes, und  
der Ladenpreis wird 1 Thlr. 15 Sgr. sein.

Der Ertrag ist für Invaliden aus dem Be-  
freiungskriege bestimmt.

In allen guten Buchhandlungen sind Subscriptionslisten  
ausgelegt, um deren Unterzeichnung im Namen der Invali-  
den ergebenst gebeten wird.

Danzig, im December 1837.

L. G. Homann'sche  
Buch- und Kunsthandlung.

## Lloyd's Werke zur Erlernung der eng- lischen Sprache.

Lloyd, H. C., Theoretisch-praktische englische Sprachlehre für  
Deutsche. Mit fäsißten Übungen versehen. Fünfte Auf-  
lage. 8. 1837. 22 Gr.

—, Englisch-deutsche Gespräche; ein Erlernungsmittel für  
Anfänger. Nach J. Perrin bearbeitet. Nebst einer Sam-  
mlung besonderer Redensarten. Achte Auflage. 8. 1838.  
16 Gr.

— und G. H. Nöbden, Neues englisch-deutsches und  
deutsch-englisches Handwörterbuch. Zweite Auflage. 2 Theile.  
Gr. 8. 1836. Cart. 2 Thlr. 16 Gr.

Auch unter dem Titel:

A new Dictionary of the English and German languages.  
In two parts. By H. E. Lloyd and G. H. Nöbden.

—, Übersetzungsbuch aus dem Deutschen ins Englische. 8.  
1832. 12 Gr.

—, Englisches Lesebuch. Eine Auswahl aus den besten  
neuern englischen Schriftstellern.

Auch unter dem Titel:

Gems of the english literature. 8. 1832. 20 Gr.

Hamburg, Verlag von A. Campe.

Zu beziehen durch

F. A. Brockhaus in Leipzig.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:  
**Das Pfennig-Magazin**  
**für Kinder.**

1838. Januar. Nr. 1—4.

Nr. 1. \*Die Kinder und der heilige Mann im Walde, eine Legende. \*Von den Wölfen. Ein Hahn hilft einen Dieb entdecken. \*Das Wasserbuhn. Räthsel. — Nr. 2. \*Die Verkürzung Jesu auf dem Berge Zabor. — Der Weinstock. Die wüste Insel. \*Der Huch oder Huch. — Nr. 3. \*Minerva. Der barmherzige Samariter. \*Der Winter im hohen Norden. Die neugierige Laura. \*Die Wohnungen der Strohwürmer. — Nr. 4. \*Der Hund der Estimos. Emma und die Arbeit. \*Die lange Brücke in Berlin. \*Von den Wirkungen der Schwere. Vor dem Schlafengehen. \*Der Adler einer römischen Legion. Die mit \* bezeichneten Aufsätze enthalten eine oder mehrere Abbildungen.  
Preis dieses Jahrgangs von 52 Nummern 1 Thlr. — Der erste bis vierte Jahrgang kosten ebenfalls jeder 1 Thlr.  
Leipzig, im Februar 1838.

**W. A. Brochhaus.**

Soeben ist erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden:

**Central-Bibliothek**  
der  
*Literatur, Statistik und Geschichte*  
der  
**Pädagogik und des Schul-Unterrichts**  
im  
*In- und Auslande.*

Herausgegeben

von  
**Dr. H. G. Brzoska,**  
Professor in Jena.

**1838.**

Januar-Heft.

**Inhalt.**

**Prospect.**

**A. Literatur.**

1. Dr. Fr. H. Chr. Schwarz in seinem Leben und Wirken als Pädagog dargestellt von Prof. Dr. Reuter. (Die Fortsetzung im nächsten Heft.)
2. Knor: Liberale Erziehung, oder: praktische Abhandlung über die Methode der Erwerbung nützlicher und feiner Gelehrsamkeit. (Die Fortsetzung im nächsten Heft.)
3. Literarische Anzeigen. Die Pädagogik des Hauses u. s. w. Von Theodor Heinsius.
4. Über die hohe Bedeutung, welche die neuerlich in der Methode der Psychologie eingetretene Reform für die Pädagogik hat. Von Dr. F. E. Beneke.

**B. Statistik.**

1. St.-Galler katholisches Schulwesen.
2. Alexander von Krusenstern: Abriss des Systems, der Fortschritte und des Zustandes des öffentlichen Unterrichts in Russland. (Die Fortsetzung im nächsten Heft.)

3. Über die neuesten mit dem Schul- und Studienwesen in Bayern vorgenommenen Veränderungen.

4. Correspondenznachrichten.

1. Zur Statistik der Realschulen in der preussischen Rheinprovinz.
2. Canton Zürich.

**C. Geschichte.**

Die Gegenwart in ihren pädagogischen Bestrebungen und Forderungen. Mit besonderer Rücksicht auf Deutschland. Ein pädagogisch-historischer Versuch von Dr. Fr. Cramer.

(Die Fortsetzung im nächsten Heft.)

**D. Miscellaneen.**

1. Pädagogisches Forum.
  2. Pädagogische Paränesen.
- Intelligenzblatt Nr. 1—5.**

Der Preis des Jahrgangs von 12 Heften ist 8 Thaler.  
Halle, im Januar 1838.

**C. A. Schwetschke und Sohn.**

In meinem Verlage ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu erhalten:

Das  
**Preussische Intestat-Erbrecht,**  
aus dem  
gemeinen deutschen Rechte  
entwickelt  
von  
**Karl Witte,**  
Professor in Halle.  
Gr. 8. 1 Thlr. 12 Gr.  
Leipzig, im Februar 1838.  
**F. A. Brochhaus.**

In unterzeichneter Verlagsbuchhandlung ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versendet:

Des Ersten Theiles zweite Abtheilung

von  
**Encyclopädisches Handbuch**  
des  
**Maschinen- und Fabrikwesens**  
für

Kameralisten, Architekten, Künstler, Fabrikanten und Gewerbetreibende jeder Art;

nach den  
besten deutschen, englischen und französischen Hilfsmitteln  
bearbeitet von

**Karl Hartmann,**  
der Philosophie Doctor, herzogl. braunschweig. Bergcommissar, mehrerer Gelehrten- und Gewerbevereine Mitgliede u.  
Enthaltend die Beschreibung von Winden, Kränen, Hammern, Pumpen, Feuerspreien, Pressen, Buchdrucker-, Kupfer- und Steindruckpressen, Schneide- oder Sägemäshen, Taback-, Holz-, Garbe- und Garbeholzmäshen u. s. w.

Gr. 4. 9 Bogen Text. Mit 19 schön lithographirten Tafeln. Subscriptionspreis 1 Thlr. 12 Gr., oder 2 fl. 42 Kr.

Die günstige Aufnahme, welche der ersten Abtheilung gleich nach Erscheinen zu Theil wurde, hat bereits über den Werth dieses Werkes entschieden, den es sich durch die folgenden Abtheilungen zu verschaffen wird.

lungen noch mehr sichern wird. Zunächst erscheint und wird bis Oftern in den Händen der Subscribenten sein die 1ste Abtheilung des 2ten Bandes, „Gewinnung und Verarbeitung der Metalle“ enthaltend, der alsdann möglichst rasch des 1ten Bandes 2te Abtheilung über Eisenbahnen folgen soll, deren späteres Erscheinen das Hinzufügen der neuesten interessanten Erfahrungen über diesen Gegenstand rechtfertigen soll.

Darmstadt, im December 1857.

C. W. Leske.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

## Das Pfennig-Magazin

für Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse.

1838. Januar. Nr. 249 — 252.

Nr. 249. \*Die Museen. Gistwarren in Wiana. Bettler in den Vereinigten Staaten. \*Columbo. Das Gebirge Sinai. Stahlfedern rein und feucht zu erhalten. \*Der Louvre. — Nr. 250. \*Der amerikanische Dampftragen. Wirkungen des Patchy. \*Don Juan d'Austria. Zur Statistik der Nahrung. \*Beauvais. — Nr. 251. \*Der Bell-Rock-Leuchthurm. Die Gemenjagd. \*Die Kleejenfälle. Der Selbstmord als Gaunerkunstgriff. \*Gerippe eines Thiers der Vorwelt. Über den Mais. — Nr. 252. \*Tours. Die Schaters zu Neulibanon in Nordamerika. Die Insel Delos oder Ipera. \*Die Koralleninseln. Über den Mais. (Fortsetzung.) \*Die Ureinwohner in Neuuland.

Die mit \* bezeichneten Aufsätze enthalten eine oder mehrere Abbildungen.

Preis dieses Jahrgangs von 52 Nummern 2 Thlr. — Der erste Jahrgang von 52 Nrn. kostet 2 Thlr., der zweite von 52 Nrn. 1 Thlr. 12 Gr., der dritte von 52 Nrn. 2 Thlr., der vierte von 52 Nrn. 2 Thlr., der fünfte von 52 Nrn. 2 Thlr. Leipzig, im Februar 1838.

F. A. Brockhaus.

Sieben ist erschienen:

## Gedichte

von

Anastasius Grün.

Zweite Auflage.

Preis 2 Thlr.

Die erste Auflage, welche Ende des vorigen Jahres erschien, war in wenigen Wochen vergriffen. Die zweite Auflage, welche jener so schnell folgt, ist daher nicht vermehrt, aber doch von dem Dichter durchgesehen.

Leipzig, im Februar 1838.

Weidmann'sche Buchhandlung.

Bei Karl Heymann in Berlin, Poststraße Nr. 26, sowie in allen Buchhandlungen Deutschlands ist für Einen Thaler zu haben:

## Enthüllung des räthselhaften Wesens der Unterleibskrankheit,

nebst einer neuen und naturgemäßen Heilmethode der Hämmorrhoiden, Hypochondrie, Hysterie und Gicht. Für gebildete Nichtärzte von Dr. Moritz Strahl, praktischem Arzt und Accoucheur in Berlin.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

In dieser zweiten Auflage seiner bereits durch ganz Deutschland verbreiteten Schrift hat der Herr Verfasser die glücklichen Resultate seiner neuen Behandlungsweise der Unterleibskrank-

heiten auf das entschiedenste nachgewiesen. Er thut, wie aus der Vorrede der zweiten Auflage zu entnehmen ist, auf eine durchaus unzweifelhafte Weise dar, daß er im Laufe des letzten Jahres so glücklich gewesen ist, 120 auswärtige, oft sehr entfernt wohnende Kranke im Wege der schriftlichen Behandlung vollständig herzustellen; und da somit die factische Beweisführung für die Wahrheit der in der Schrift enthaltenen, klar und anziehend dargestellten Grundzüge geliefert ist, so wird das oben angezeigte Buch gewiß nach weit ausgebreiteten Kreisen hin auch ferner segensreich und wohlthätig wirken. Dem Buche ist ein Schema von Fragen beigegeben, deren Beantwortung hinreicht die Behandlung einzuleiten.

In Unterzeichnetem haben schon die Presse verlassen und können durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

## Beiträge

zu der

## landständischen Berathung

des

## Entwurfs eines Strafgesetzbuchs

für das

## Königreich Württemberg.

Gr. 8. In Umschlag brosch. Preis 12 Gr., oder 45 Kr.

Diese Beiträge sind als eine Fortsetzung und Ergänzung der mit Beifall aufgenommenen

## Bemerkungen über den Entwurf u. s. w.

anzusehen, sodaß beide Schriften vereint ein Ganzes bilden, welches sich über die wichtigsten Materien des Entwurfs verbreitet.

Wir glauben diese Schriften, welche als ein nicht unbedeutender Beitrag zur Strafgesetzgebung überhaupt betrachtet werden können, Jedem, der an der Ausbildung derselben Antheil nimmt, mit Überzeugung empfehlen zu dürfen.

Stuttgart und Tübingen, im Januar 1838.

J. G. Cotta'scher Verlag.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

Zf's. Encyclopädische Zeitschrift, vorzüglich für Naturgeschichte, Anatomie und Physiologie. Von Den. Jahrgang 1837. Aches und neuntes Heft. Mit vier Kupfern. 1838. Erstes Heft. Mit einem Kupfer. Gr. 4. Preis des Jahrgangs von 12 Heften mit Kupfern 8 Thlr.

Blätter für literarische Unterhaltung. (Verantwortlicher Herausgeber: Heinrich Brockhaus.) Jahrgang 1838. Monat Februar, oder Nr. 32 — 59, und 2 literarische Anzeiger: Nr. IV und V. Gr. 4. Preis des Jahrgangs von 365 Nummern (außer den Beilagen) auf feinem Druck-Wellpapier 12 Thlr.

Repertorium der gesammten deutschen Literatur. Herausgegeben von E. G. Gersdorf. 1837. Vierzehnten Bandes fünftes Heft. (Nr. XXIV.) 1838. Funfzehnten Bandes erstes und zweites Heft. (Nr. I, II.) Gr. 8. Preis eines Bandes 3 Thlr.

Allgemeine Bibliographie für Deutschland, Jahrgang 1838. Monat Januar, oder Nr. 1 — 4, und Bibliographischer Anzeiger: Nr. 1 — 4. Gr. 8. Preis des Jahrgangs 3 Thlr.

Leipzig, im Februar 1838.

F. A. Brockhaus.

In meinem Verlage ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen vorrätig:

## Ausführliche Encyclopädie der gesamten Staatsarzneikunde.

Im Vereine mit mehreren Doctoren der Rechtsgelahrtheit, der Philosophie, der Arzneiwissenschaft und Wundarzneikunst, praktischen Ärzten, Physikern und Chemikern bearbeitet und herausgegeben

VON  
**Georg Friedrich Meiss.**

*Für Gesetzgeber, Rechtsgelehrte, Polizeibeamte, gerichtliche Aerzte, Wundärzte, Apotheker und Veterinärärzte.*

Zwei Bände in Heften zu 12 Bogen.

Erstes Heft.  
**Art - Arzt.**  
Gr. 8. Subscriptionspreis 20 Gr.

Der Beifall, welcher die „Encyclopädie der gesamten medicinischen und chirurgischen Praxis“ allgemein als ein Werk von grosser praktischer Brauchbarkeit bezeichnete, veranlasste den Herausgeber, in Verbindung mit den geeignetsten Männern in ähnlicher Weise ein Handbuch der Staatsarzneikunde zu bearbeiten, welches dem gerichtlichen Arzte und dem Juristen von gleichem Nutzen sein sollte.

Die Encyclopädie der gesamten Staatsarzneikunde, deren erstes Heft nun der Theilnahme des betreffenden Publicums empfohlen wird, umfasst als integrierende Theile:

- 1) Die gerichtliche Arzneiwissenschaft,
- 2) Die medicinische Polizei,
- 3) Die Medicinalordnung, das Medicinalwesen und die Medicinalverfassung, nach ihrem ganzen Umfange und ihren einzelnen Theilen.

Das Ganze wird aus zwei starken Bänden bestehen und in Heften von 12 Bogen erscheinen, deren regelmässige Ausgabe die Verlagshandlung verbürgen kann, da der grösste Theil des Manuscriptes fertig vorliegt. Der Druck und die ganze äussere Einrichtung ist ebenso wie bei

*Meiss's* Encyclopädie der gesamten medicinischen und chirurgischen Praxis. Zweite, stark vermehrte und verbesserte Auflage. 1837. 10 Thlr.

welche, sowie ein Supplement zur ersten Auflage (2 Thlr. 12 Gr.), durch alle Buchhandlungen zu erhalten ist. Leipzig, im Februar 1838.

**F. A. Brockhaus.**

Bei Chr. E. Kollmann in Leipzig erschien soeben:

## **Maiknospen**

VON  
**Konstantin Tischendorf.**

Proschirt (in Golddruck-Umschlag) 1 Thlr.

Die elegante Ausstattung dieser Dichtungen ist Beweis für die Erwartungen, mit denen der Verleger den jungen Dichter ins Publicum einführt. Das Ganze ist in sechs Strauflagen getheilt und füllt nahe an 200 Seiten.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben ist erschienen:

## **Immanuel Kant's sämmtliche Werke.**

Herausgegeben

VON

**Karl Rosenkranz und Friedr. Wilh. Schubert.**  
**Erster Theil.** (Kleine logisch-metaphysische Schriften.)  
Subscriptionspreis 2 Thlr. 18 Gr.

Dieser einzigen rechtmässigen Gesamtausgabe der Kant'schen Werke, deren äussere sorgfältige und würdige Ausstattung allgemeine Anerkennung finden wird, stehen zwei Männer vor, die recht eigentlich den Beruf dazu haben, den grossen Philosophen auf das correcteste dem Publicum zu überliefern und zu erklären. Der erste Band bringt Kant's kleine logisch-metaphysische Schriften; sie reichen vom Jahre 1755, wo er seine Doctordissertation schrieb, bis ins Jahr 1796, wo die „Verkündigung des nahen Abschlusses eines Tractats zum ewigen Frieden in der Philosophie“ erschien. Wir finden hier Kant's erste grosse Versuche, die Welt der Verwirrung, die er in der Philosophie vorfand, zu organisiren, seine berliner Preisschriften, seine Programme zur Einrichtung seiner Vorlesungen in Königsberg, seine grosse Abhandlung zum Beweis eines Daseins Gottes, seinen Aufsatz „über Philosophie überhaupt“, seine polemischen Debatten gegen Zeitgenossen u. a. Herr Prof. Rosenkranz spricht sich geistvoll über die Bedeutsamkeit dieser kleinen Schriften Kant's in der Vorrede aus.

Der folgende Band (Rechtslehre, Tugendlehre und Pädagogik, herausgegeben von Herrn Prof. Schubert) erscheint nächsten. Die Gesamtausgabe wird vor Ablauf zweier Jahre vollständig in den Händen der bereits zahlreichen Subscribenten sein.

Leipzig, den Sisten Januar 1838.

**Leopold Voss.**

In der Schulze'schen Buchhandlung in Döbenburg ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## **Der Döbenburgische Volksbote.**

Ein gemeinnütziger Volkskalender für den  
Bürger und Landmann  
auf das Jahr 1838.  
1ster Jahrgang.

Geheftet. 152 Seiten. 8. Preis 6 Gr.

Seit Anfang dieses Jahres erscheint:

## **Bulletin des concours.**

Recueil des questions proposées pour sujets de prix par les divers corps savants de la France et de l'Etranger.

Publié par

**EUGENE CASSIN.**

Paris, 1838. Jährlich 4 Thlr.

Von dieser Zeitschrift wird alle zwei Monate ein Heft von mindestens zwei Bogen ausgegeben, und der Jahrgang mit den nöthigen Registern ausgestattet.

Durch alle Buchhandlungen kann dieselbe von uns bezogen werden, und erbieten wir uns auch, dem Zwecke dieser Zeitschrift entsprechende Mittheilungen von Seiten der literarischen Institute Deutschlands an den Herausgeber nach Paris zu befördern.

Leipzig, im Februar 1838.

**Brockhaus & Avenarius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. VI.

Dieser literarische Anzeiger wird den bei J. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

In meinem Verlage erschien soeben:

## Fortuna.

Ein Feenmärchen

von

A. von Sternberg.

Zwei Theile.

8. Gr. 3 Thlr. 18 Gr.

Leipzig, im Februar 1838.

J. A. Brockhaus.

Bei DüMont-Schauberg in Köln ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## MAGENDIE,

## Vorlesungen

über die physikalischen

## Erscheinungen des Lebens.

Mit Magendie's Hinzuziehung und Unterstützung aus dem Französischen überfetzt von Dr. Haswiz.

Zweiter Band. Gr. 8. Brosch. 20 Gr., oder 1½ fl. Rhein.

Indem wir dem medicinischen Publicum die Uebersetzung des zweiten Bandes von „Magendie's Vorlesungen“ übergeben, hegen wir die feste Ueberzeugung, daß er dieselbe beifällige Aufnahme finden werde, welche dem ersten Bande in so hohem Grade zu Theil wurde. Es ist wahr, auch in diesem Bande kommt Manches vor, was nicht bloß von Magendie, sondern noch vielen andern Physiologen schon anderswo gesagt ist; allein das Verdienst dieser Vorlesungen liegt auch weit weniger in neuen Ergebnissen und großen Entdeckungen, als vielmehr in einer strengen Sichtung der physikalischen Erscheinungen des Lebens von den rein vitalen Vorgängen desselben, in der steten Anwendung physiologischer Thatsachen auf praktische Medicin, und endlich in jener so höchst aufmunternden, allein reellen Fortschritte für die Medicin versprechenden Richtung, welche das Ganze überall durchdringt und gewiß keinen sachkundigen Leser unberührt lassen wird.

In J. C. Krieger's Verlagsbuchhandlung in Kassel ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu haben:

**Büdinger, Dr. M.,** Moreh Lathora, oder: Leitfaden bei dem Unterrichte in der israelitischen Religion für Knaben und Mädchen, in Schulen und beim Privatunterrichte. 3te verbesserte und vermehrte Auflage. 1837. 8. (11 Bogen.) 8 Gr.

**Gironcourt, A. von,** Repertorium der Militairjournalistik des 19ten Jahrhunderts bis zum Jahre 1837. 2te Auflage. 1838. Gr. 8. Brosch. (11½ Bogen.) 1 Thlr.

**Lobe, Dr. G. M.,** Wanderungen durch Kassel und die Umgegend. Eine Skizze für Einheimische und Fremde. Mit 5 Ansichten in Stahlstich und einer Situationskarte über die Umgegend der Stadt. 12. 1837. Cart. (10½ Bogen.) n. 1 Thlr. 8 Gr.

**Rehm, Dr. Fr.,** Handbuch der Geschichte des Mittelalters. 4ten Bandes 2te Abtheilung. Geschichte des Mittelalters seit den Kreuzzügen. 2ter Theil, 2te Abtheilung. Mit 10 Stammtafeln. Gr. 8. 1838. (45 Bogen.) 3 Thlr. 18 Gr.

**Schmittbener, Dr. Fr.,** Deutsche Sprachlehre für Schulen. 4te verm. Auflage. Gr. 8. 1837. (20 Bogen.) n. 16 Gr.

**Wenderoth, Dr. G. W. F.,** Das Akonit und die Akonitarzneien. 12. 1837. Brosch. (1 Bogen.) 4 Gr.

Zeitschrift für Recht und Gesetzgebung in Kurhessen, herausgegeben unter der Aufsicht des Justizministeriums. 2tes Heft. Gr. 8. 1837. Brosch. (18 Bogen.) n. 1 Thlr. 8 Gr.

Bei J. M. Gebhardt in Grimma erschienen und sind durch alle Buchhandlungen zu haben:

Aphorismen zur Apologie des Dr. Strauß und seines Werkes. Gr. 8. Brosch. 12 Gr.

Catalogus librorum manuscriptorum qui in bibliotheca Senatoria civitatis Lipsiensis asservantur edit a Dr. Naumann, de Bose, Dr. Delitzsch et Prof. Dr. Fleischer. Gr. 4. Cum tabb. lithogr.

Fasc. I et II. Druckvelin 5 Thlr. 8 Gr.

Schweizer Kupferdruck 9 Thlr. 8 Gr.

(Das ganze Werk wird bis Johannis dieses Jahres fertig und aus 5 Hefen, jedes zu 12 Bogen Text mit 4—5 lithographirten Blättern, bestehen. Die 1ste Lieferung wird zur Ansicht gegeben.)

**Deligisch, Franz,** Wissenschaft, Kunst, Judenthum. Schilderungen und Kritiken. Brosch. 1 Thlr. 12 Gr.

**Hammer (Pastor),** Aphorismen über das Wesen und die Mittel zur Fortbildung des evangelisch-christlichen Geistes. Gr. 8. Brosch. 10 Gr.

**Kugen (Prof.),** Perikles als Staatsmann während der gefährvollsten Zeit seines Wirkens. Gr. 8. 18 Gr.

—, **De Atheniensium imperio Cimonis atque Veridis tempore constituto.** Cum tab. geographica. Commentatio. 8. 4 Gr.

**Weichert, M. Aug.,** De L. Varii et Cassii Parmensis vita et carminibus. Gr. 8. Brosch. 3 Thlr.



In meinem Verlage ist erschienen:

## Meine Reise nach **Portugal**

im Frühjahr 1836.

Von  
**Gustav von Seeringen.**

Zwei Theile.

8. Geh. 3 Thlr. 12 Gr.

Der Verfasser, schon anderweit der deutschen Lesewelt vortheilhaft bekannt, hatte als Begleiter des Don Fernando, jetzigen Königs von Portugal, zu interessanten Beobachtungen Gelegenheit, deren gelungene Schilderung eine unterhaltende Lecture gewähren wird.

Leipzig, im Februar 1838.

**F. A. Brockhaus.**

Bei H. E. Brönnner in Frankfurt a. M. ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## Beiträge zur Physik und Chemie. Eine Sammlung eigner Erfahrungen, Versuche und Beobachtungen,

von

**Dr. R. Böttger.**

Nebst 1 Steindrucktafel. 8½ Bogen. 8. Geh. Preis 13 Gr., oder 1 Fl. 21 Kr.

In dieser Schrift übergibt der Herr Verfasser dem naturwissenschaftlichen Publicum eine große Anzahl eigner, origineller Versuche und Beobachtungen in dem Gebiete der Physik und Chemie, unterstützt durch Mittheilung potestischer Rathschläge und überraschender, oft höchst anziehender Experimente. Besonders machen wir aufmerksam auf einige von dem Herrn Verfasser bereits bei einer Versammlung der Naturforscher in Jena zur Sprache gebrachten, hier aber ausführlicher behandelten Darstellungen von der verschiedenen Art der Almagame, die Anfertigung der Seifenblasen ähnlichen Harzblasen, Selbstzündern, Schwammzucker, geistigem Kopalstein, auf die Construction eines Aetheräure-Apparats u. s. w., und wünschen nur, daß die Schrift zur Förderung der Wissenschaft in recht vieler Hände gelangen möge.

In der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart ist erschienen:

## Das Ausland.

Ein Tagblatt

für Kunde des geistigen und sittlichen Lebens der Völker.

Monat December 1837.

**Größere Aufsätze.**

Skizzen aus Südamerika. 1) Valparaiso, Haupthofenstadt der Republik Chile. 2) Reise von Arica durch die Wüsten nach Taena. 3) Hafen- und Handelsstadt Guayaquil. 4) Die Cordilleras oder das Andengebirge. Apuriscimen aus der Länder- und Völkerkunde: Der Südpazifiksee in Südamerika, über einige Franken im Orient. Vernichtung der nordamerikanischen Indianer durch den Pesthandel. Frankreichs Stellung im Mittelmeer. Grenada. (Nach Rossieu St.-Hilaire.) 1) Alhambra; die Stadt und ihre Umgebungen. Kopenhagen. (Aus der Reisekarte eines deutschen Touristen.) Die Kafferkriege. Portsmouth. (Aus der Reisekarte eines deutschen Touristen.) Der Muski in Kairo im Jahre 1837. Der Prie-

ster Johannes. Die Bevölkerung von Ceylon. Zustand von Mesur. Sicilien. (Aus der Reisekarte eines deutschen Touristen.) Die Euphraterpedition. Die Hochseen auf dem Tatra der Karpaten. Skizzen aus Escherkessen: 1) Ankunft in Escherkessen; 2) häusliches Leben. Die Jahrbücher von Irland. Skizzen aus Algiers Umgebung. 5) Der Pylos oder die Banlieue von Algier; der Sahel; die Lager Mahelma und Quera. Die Malerkunst bei den Türken. Streit über die Aukerfische-rei zwischen England und Frankreich. Buchhandel in Kairo. Orientalische Literatur. (Schreiben aus Paris.) Capitain Savignia's Untersuchung der großen Pyramide. Cordoba. (Nach Rossieu St.-Hilaire.) Verwendung des Kautschuk. Preise der Esentien in Indien. Die Sage vom heiligen Mönche in Hrisco. Das Gebiet der Narenta. Die Courrieren in der Türkei. Rückblicke.

### Chronik der Reisen.

Bruchstücke aus der Reise von G. Dubucq von der mericanischen Küste durch Louisiana, Arkansas, Mississippi und Ohio nach Pensylvanien. Reise der Bonite um die Welt. Forschungen in Französisch-Guiana. Von einem französischen Marine-offizier. Reise von Adra bis an die Grenze von Assam.

### Kleinere Mittheilungen.

Inskription auf der Glocke des Klosters Eschmabzin. Alterthümer auf Corsica. Nachrichten von Capitain Alexander. Die Musik der Hindus. Geologische Notizen: Erdbeben in Murcia; Lagerung fossiler Knochen auf der Insel Perim; Entdeckung großer fossiler Knochen im Staate Ohio. Verwendung von Ziren zu Ackerbauarbeiten. Seidenmurmeler aus Cochinchina. Nachrichten von dem Reisen des Schomburg. Die Kleidung der Sträflinge in Neuhivwales. Literarische Notizen: Nachricht von lesgischen Büchern; merkwürdiges Manuscript; altes Turnierbuch von Flandern; letzte Sitzung der Gesellschaft für orientalische Übersetzungen. Pariser Stabatgaben. Die Todesbeurtheilung des Königs in Versailles. Der Ahornzucker in Canada. Ein heisser Wind auf dem Meere. Beachtliche Reise nach Persien. Preisaufgabe über den Opiumhandel. Indische Miscellen: Zahlreiche Brände in Kalkutta; Aukerfischer Geist der Moslems; Furcht vor Unruhen in Meur. Höhe der Nordlichter. Eine merkwürdige Wasserhebe. In der Seine aufgefundenen Seanker. Große Zahl betrügerischer Bettler in London. Nachrichten vom Cap. Der tönende Berg. Einführung der durbamer Kindheirats in Frankreich. Abtöbung der Gräber der savyonischen Herzoge in Bourg. Zahl der an Fremde ertheilten Pässe in Frankreich. Chronveränderung in Adra. Maria dello Scarpello. Die Insel Sumbawa. Verkauf der Kirchen- und Klosterhäuser in Spanien. Wissenschaftliche Senzungen Cusébe de Calles' nach Agypten, Arabien und Indien.

### Inhalt des Literaturblattes.

Alessandro Manzoni. Die Prinzessin, von Lady Morgan. Lieber von Thomas Moore. Irdischer, von Béranger. Funzig Jahre, von Demselben. Das Blutbad von Kringellen, aus dem Vorwiegend. Bulwer's neueste Werke. Poniatowski, von Béranger. Frau von Krüden. Der alte Bettler, von Béranger. Aus Byron's Don Juan: Die Überführung des Heimkehrenden. Der Selbstmord; Das Feuer des Gefangenen; Der Kolibri, von Béranger.

Bei A. Förstner in Berlin ist soeben erschienen:

## Hegel's Lehre vom Staat und seine Philosophie der Geschichte in ihren Hauptresultaten. Broschirt. Preis 12 Gr.

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:

**F ü n f B ü c h e r**  
deutscher

## Lieder und Gedichte.

Von A. von Haller's bis auf die neueste Zeit.

Eine Musterammlung  
mit Rücksicht auf den Gebrauch in Schulen.

Herausgegeben

von

**G u s t a v S c h w a b .**

Geb. Preis 1 Thlr. 12 Gr.

Das Publicum erhält hier auf 733 eng gedruckten Seiten über fünfhundert Gedichte von etwa hundertfünfzig neuern deutschen Dichtern, ausgewählt von einem Dichter.

Dieses Buch, von so reichem Inhalt und doch im bequemen Format, hat bereits so großen Beifall gefunden, daß wir uns jeder Empfehlung enthalten können, und nur sein Erscheinen in Erinnerung zu bringen brauchen.

Leipzig.

**Weidmann'sche Buchhandlung.**

Die Fortsetzung

des

## Wochenblattes

für

Land- und Hauswirthschaft, Gewerbe und Handel  
betreffend.

Das Wochenblatt erscheint auch in diesem Jahre wie bisher und obgleich die Zahl der besondern Beilagen und Zeichnungen noch vermehrt werden soll, bleibt doch der niedrige Preis von 22 Gr., oder 1 fl. 30 Kr., für den Jahrgang, wofür es durch alle Buchhandlungen und in ganz Württemberg postportofrei zu haben ist, unverändert. Wir bitten nun unsere geehrten Abnehmer und Alle, die im laufenden Jahre noch neu eintreten wollen, ihre Bestellungen bei den betreffenden Buchhandlungen oder Postämtern bald zu machen, um dadurch jede sonst mögliche Störung bei den Versendungen zu vermeiden.

Stuttgart und Tübingen, im Januar 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**

Bei Eduard Anton in Halle ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

**Leo, Dr. Feinr.,** Leitfaden für den Unterricht in der Universalgeschichte. Erster Theil. Gr. 8. 14 $\frac{1}{2}$  Bogen. 12 Gr.

**Leo, Dr. Feinr.,** Altsächsishe und angelsächsische Sprachproben, mit einem erklärenden Verzeichniß der angelsächsischen Wörter. Gr. 8. 18 Bogen. 1 Thlr. 12 Gr.

## Chronik von Berlin,

von Entstehung der Stadt an bis heute.

Bearbeitet von Dr. C. E. Cypert.

Mit vielen Abbildungen.

1stes bis 4tes Heft. à 4 Gr.

Berlin, bei Ferdinand Rubach.

In unserm und dem Verlag der Herren Firmin Didot Frères in Paris erschien soeben:

## Histoire de France

depuis

le 18 Brumaire (Novembre 1799),  
jusqu'à la paix de Tilsitt (Juillet  
1807).

**Par M. Bignon.**

Tome VII. In-8. 2 Thlr. 12 Gr.

Mit diesem siebenten Bande beginnt die zweite Serie dieses Werkes, welche dasselbe bis zum Jahre 1812 fortführt und von der noch drei Bände erscheinen werden. Eine dritte Serie ist vom Verfasser später zu liefern versprochen.

Tome I - VI dieses Werkes, welche im Jahre 1830 erschienen, sind ebenfalls von uns zu beziehen.  
Leipzig, im Februar 1838.

**Brockhaus & Wenariius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

## Neue Vierteljahrschrift.

### Vereinigungspunkt

der ausgezeichnetsten Schriftsteller Deutschlands.

Soeben, Februar 1838, hat die Presse verlassen und ist in allen Buchhandlungen Deutschlands, Oesterreichs, der Schweiz, zu haben:

## Der Freihafen.

Galerie von Unterhaltungsbildern aus den  
Kreisen der Literatur, Gesellschaft und  
Wissenschaft.

**Erstes Heft.**

8. Altona, Hammerich. 1838. Geh. 1 Thlr. 12 Gr.

Diese neue Vierteljahrschrift bildet einen Vereinigungspunkt der ausgezeichnetsten Schriftsteller Deutschlands, und indem sie schon durch den ansehnlichen Kreis der gewonnenen Mitarbeiter recht eigentlich aus der lebendigen Mitte der Gegenwart hervorgeht, wird sie durch die Darstellungen, die sie liefert, dazu beitragen, dem Publicum in jeder Art und Form eine zeitgemäße Unterhaltung und eine Lecture zu bieten, die zur Orientirung in den wichtigsten Erscheinungen des modernen Lebens dienen soll.

Wir erlauben uns allen Leserkreisen dies neue Journal zur Beachtung zu empfehlen. Der Inhalt des erschienenen ersten Heftes ist folgender:

1) Scheidewege, von K. A. Varnhagen von Ense. 2) Excommunication. Blicke aus dem Leben in die Zeit, von H. Roenig. 3) Geistliche Antiphonien, von Karl Rosenkranz. 4) Fragmente zur Geschichte des Erlebens, von G. G. Carus. 5) Gedichte aus den Bergen, von Dr. Mißes. 6) Literaturblätter. (Von Dr. Mißes und Karl Rosenkranz.) 7) Correspondenzblätter. (Eine Reihe von Berichten aus Paris, Berlin, Hamburg, Leipzig, Göttingen u. a. m.) Das zweite Heft des Freihafens erscheint im Monat März.

# August Graf von Platen's gesammelte Werke.

Prachtausgabe in Einem Band in zwei Lieferungen.

Mit des Verfassers Bildniss in Stahl gestochen und einem Facsimile seiner Handschrift.

In der Unterzeichneten wird demnächst die erste Lieferung einer

## Prachtausgabe von Platen's gesammelten Werken

erscheinen, welche in Format, Schrift und Papier der Ausgabe von Goethe's Werken in Zwei Bänden sich anreihen und mit gleicher Sorgfalt behandelt werden wird.

Der bis Ostern d. J. offen bleibende Subscriptionspreis für das ganze Werk ist 3 Thlr. 16 Gr., oder 6 Fl., und ist derselbe je bei Empfang jeder Lieferung mit 1 Thlr. 20 Gr., oder 3 Fl., zu entrichten. Später tritt ein erhöhter Ladenpreis ein.

Wir hoffen dem Wunsche vieler Freunde und Verehrer Platen's durch eine würdige Ausgabe seiner Werke entgegen zu kommen und diese vorläufige Ankündigung daher mit allgemeinem Beifall aufgenommen zu sehen. Die erste Lieferung, zumeist das Poetische enthaltend, wird auch die noch nie gedruckten poetischen Arbeiten des Verfassers bringen, deren Veröffentlichung man seit dem Tode des Dichters sehnlich entgegenfiehet.

Stuttgart und Tübingen, im Januar 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**

Neue Romane in Ernst Klein's literarischem Comptoir in Leipzig:

### Georg Schobri,

der Räuberhauptmann in Ungarn.

Ein Charaktergemälde der neuesten Zeit. Nach dem Ungarischen des Ladislav Hóties Székelybő bearbeitet und herausgegeben von \* \* \* \*. 2 Bände.

1 Thlr. 16 Gr.

In romantischem Gewande ist hier sein bewegtes Leben im Zusammenhang gegeben und der Leserwelt ein Bild Ungarns, eines Landes, das so segnet und so besonders gestaltet und von den verschiedensten Nationen bevölkert ist.

Der gute Absatz dieses Werkes machte schon die zweite Auflage in Taschenformat nöthig, welche 1 Thlr. 12 Gr. kostet.

### Romische Scenen

aus dem Leben eines Nonvivants. Aus dem Französischen des Paul von Kock. 2 Bände. 520 S. 12. Broch.

1 Thlr. 3 Gr.

Wer liest nicht gern etwas Erheiterndes, zumal von einem so sehr beliebten Schriftsteller, der mit der nur dem Franzosen eigenthümlichen Leichtigkeit über Situationen wegzuschlüpfen weiß, über die auch der größte Misanthrop lachen muß.

### Die Nonvivants.

Charakterbilder nach dem Leben von Dr. H. G. Rumsen. 2 Bände. 510 S. 12. Broch. 1 Thlr.

Aus dem Leben gegriffen sind diese Charakterbilder; im Gewande des Humors stellen sie uns die verschiedenen Stände, ihre Schwächen und Lächerlichkeiten dar.

Bei der günstigen Aufnahme, welche die Werschowitz gefunden haben, knüpfte der Verfasser daran eine Darstellung aus dem romantischen Mittelalter unter den Titeln:

### Die hochherzigen Räuber der Pöscopole;

Ritter- und Räubergeschichte aus dem Ende des 13ten Jahrhunderts. 20 Gr.

### Der Einsiedler des Lochotins,

oder Pilsens Bürgertreue und Tapferkeit. Historisch-romantisches Gemälde aus dem 14ten Jahrhundert. Von Dr. Ew. Dietrich. 22 Gr.

Sie schildert zugleich die pittoresken Gegenden des böhmischen Mittelgebirges an der Elbe und der böhmisch-bairischen Grenze, während der erste Theil (Der Schwur der Rache, 1 Thlr.) die romantische Gegend der böhmisch-meißner Grenze, des Bades Tepliz und dessen Entfaltung schildert. Das Ganze verwebt die Sagen der Vorzeit Böhmens mit der Geschichte des Mittelalters.

Geeben ist erschienen und in allen Buchhandlungen vorrätzig:

Literarische

### Zustände und Zeitgenossen.

In Schilderungen

aus

Karl Aug. Böttiger's

handschriftlichem Nachlasse.

Herausgegeben von

N. W. Böttiger.

Erstes Bändchen.

Gr. 8. Geh. 1 Thlr. 12 Gr.

Es sind namentlich Beiträge zu den Memoiren der „Weimarschen Genieperiode“, welche, aus dem reichen handschriftlichen Nachlasse K. A. Böttiger's gesammelt, hier dargeboten werden und in leicht entworfenen Darstellungen des Neuen und Anziehenden über die Heroen jener Zeit Vieles enthalten. Zugleich mögen sie als Ergänzung der biographischen Skizze K. A. Böttiger's (1837, 16 Gr.), welche, ebenfalls von dem Sohne desselben bearbeitet, in meinem Verlage erschien, betrachtet werden.

Leipzig, im Februar 1838.

**F. A. Brockhaus.**

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. VII.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei G. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Zeile 2 Gr.

## Verzeichniss

der

auf der königl. vereinten Friedrichs-Universität  
**Halle - Wittenberg** im Sommer-  
Halbjahre vom 7ten Mai bis 22sten September  
1838 zu haltenden Vorlesungen und der öffent-  
lichen akademischen Anstalten.

### A. Vorlesungen.

#### a) Wissenschaften überhaupt.

Über akademisches Studium liest Hr. Prof. Erdmann.

#### b) Besondere Wissenschaften.

##### I. Theologie.

*Encyklopädie und Methodologie des theologischen Studiums* trägt Hr. Prof. Franke vor. — *Die Literaturgeschichte der Kirchenschriftsteller* lehrt Hr. Cons.-Rath Thilo. — *Hermeneutik* lehrt Hr. Prof. Dähne. — *Biblische Archäologie* trägt Hr. Cons.-Rath Gesenius vor. — Von Büchern des A. T. werden erklärt: die *Genesis*, vom Hrn. Cons.-Rath Gesenius; das *Buch Hiob* vom Hrn. Prof. Röddiger; die *Psalmen*, der *Prediger* und das *Hohe Lied Salomons* vom Hrn. Dr. Tuch. — Die *Messianischen Weissagungen des A. T.* erläutert Hr. Prof. Fritzsche (in lateinischer Sprache). — *Eine historisch-kritische Einleitung in die kanonischen und apokryphischen Bücher des N. T. sowie in die Schriften der apostolischen Väter* trägt Hr. Prof. Niemeyer vor. — Von den Büchern des N. T. werden erklärt: die *Evangelien des Matthäus, Marcus und Lucas* von den Herren Prof. Wegscheider und Dähne; die *Apostelgeschichte* vom Hrn. Prof. Niemeyer; die *Briefe an die Römer und Galater* von Ebendenselben; die *Briefe an die Korinther* sowie die *katholischen Briefe* vom Hrn. Cons.-Rath Tholuck. — Über die *Leidens- und Auferstehungsgeschichte* liest Hr. Prof. Wegscheider. — *Exegetisch-homiletisch-praktische und apologetische Vorträge über die Parabeln Christi* hält Hr. Prof. Marks. — *Christliche Dogmengeschichte* trägt Hr. Prof. Dähne vor. — *Dogmatik* lehren Hr. Cons.-Rath Tholuck und Hr. Prof. Fritzsche. — *Der christlichen Religions- und Kirchengeschichte ersten Theil* lehrt Hr. Cons.-Rath Thilo. — *Christliche Moral* trägt Hr. Prof. Wegscheider vor. — *Pastoraltheologie* trägt Hr. Cons.-Rath Wagnitz vor, auch liest Derselbe über *homiletische und catechetische Gegenstände*. — *Homiletik und Geschichte derselben* trägt Hr. Prof. Marks vor, auch liest Derselbe *theoretisch-praktische homiletische Übungen*. — *Catechetik und Geschichte derselben* lehrt Hr. Prof. Franke. — *Pastoralmedicin* trägt Hr. Dr. Rosenbaum vor.

Im königl. theologischen Seminarium leitet Hr. Cons.-Rath Gesenius die *Übungen in der Exegese des A. T.* und Hr. Prof. Wegscheider in der des N. T.; Hr. Cons.-

Rath Tholuck die *Übungen der dogmatischen*, Hr. Cons.-Rath Thilo die der *historischen Abtheilung*; Hr. Prof. Marks die *homiletischen und liturgischen*, und Hr. Prof. Fritzsche die *katechetischen Übungen der Seminaristen*. *Übungen im Interpretiren des N. T.* leitet Hr. Prof. Fritzsche. *Examinatorien und Repetitorien über Dogmatik* hält Ebenderselbe; über *Kirchengeschichte* Hr. Prof. Dähne.

##### II. Jurisprudenz.

*Encyklopädie und Methodologie der Rechtswissenschaft* trägt Hr. Prof. Wilda vor. — *Philosophie des Rechts* lehrt Hr. Hofrath Henke. — *Institutionen und Geschichte des römischen Rechts* trägt Hr. Prof. Witte, *erstere* auch Hr. Dr. Pfotenhauer vor. — *Die Pandekten* trägt Hr. Hofgerichtsrath Pfotenhauer vor; das *Erbrecht* Hr. Dr. Pfotenhauer. — *Deutsches Privatrecht* lehren die Herren Prof. Dieck und Wilda; das *Recht des Adel- und Bauernstandes* trägt Hr. Prof. Dieck, das *Handelsrecht* Hr. Prof. Wilda vor. — *Das Lehnrecht* lehrt Hr. Prof. Pernice. — *Das öffentliche Recht des deutschen Bundes und der Bundesstaaten* trägt Ebenderselbe vor. — *Preussisches Civilrecht* lehren Hr. Hofgerichtsrath Pfotenhauer und Hr. Prof. Witte; auch liest Letzterer über das *preussische Sachenrecht*. — *Kirchenrecht* trägt Hr. Prof. Laspeyres vor; auch setzt Derselbe die *geschichtliche Einleitung in die preussische Kirchenverfassung* fort. — *Gemeines und preussisches Criminalrecht* lehrt Hr. Hofrath Henke. — *Gemeines und preussisches Civilprocess* trägt Hr. Prof. Laspeyres vor, *Criminalprocess* Hr. Hofrath Henke. — *Merkwürdige Rechtsfälle* erläutert Hr. Prof. Pernice.

*Übungen in der juristischen Praxis* leitet Hr. Hofgerichtsrath Pfotenhauer; ein *Examinatorium über Criminalrecht* hält Hr. Hofrath Henke.

Hr. Geh. Justizrath Schmelzer ist, seiner Gesundheit wegen, auch für dieses Halbjahr von Haltung der Vorlesungen entbunden.

##### III. Medicin.

*Encyklopädie und Methodologie des medicinischen Studiums* trägt Hr. Prof. Friedländer nach seinem Lehrbuche vor. — *Der Zootomie ersten Theil* oder *vergleichende Osteologie und Myologie*, sowie *Osteologie und Syndesmologie* trägt Hr. Prof. d'Alton vor. — *Pathologische Anatomie* lehrt Ebenderselbe; auch trägt Derselbe *Physiologie* verbunden mit *Experimenten und Demonstrationen* vor. — *Allgemeine Physiologie, Pathologie und Therapie* trägt Hr. Dr. Rosenbaum vor; auch liest Derselbe über *epidemische Krankheiten*. — *Den ersten Theil der speciellen Pathologie und Therapie* trägt Hr. Geh. Medicinalrath Krukenberg vor; auch lehrt Derselbe *Pathologie und Therapie der Lungen, des Herzens und der Haut*. — *Pastoralmedicin* lehrt Hr. Dr. Rosenbaum. — *Akiurgie*, verbunden mit einem *Cursus chirurgischer Operationen* trägt Hr. Prof. Blasius vor. — Über *ausgewählte Capitel der Ophthalmologie* liest Hr. Prof. Blasius; auch hält Derselbe *theoretisch-praktische Vorträge über Augenoperationen*. — *Theorie und Praxis der Geburtshilfe* lehren die Herren Prof. Niemeyer und

Hohl; auch trägt Letzterer die *Geschichte der Geburtshülfe* vor. — Über die *Krankheiten der Weiber und Kinder* liest Hr. Prof. Hohl. — *Pharmakologie* tragen die Herren Prof. Friedländer und Schweigger-Seidel, Letzterer mit besonderer Berücksichtigung der *preussischen Pharmakopöe* vor. — *Die Rezeptirkunst* lehrt Hr. Prof. Schweigger-Seidel. — *Die officinellen Pflanzen der preussischen Pharmakopöe* erläutert Hr. Dr. Sprengel.

*Die medicinisch-klinischen Übungen* leitet Hr. Geh. Medicinalrath Krukenberg. — *Chirurgisch-klinische und ophthalmiatische Übungen* leitet Hr. Prof. Blasius. — *Praktische Übungen in der Geburtshülfe* leitet Hr. Prof. Niemeyer in der akademischen Entbindungsanstalt und Hr. Prof. Hohl. — *Die Übungen der Mitglieder des pharmaceutischen Instituts* leitet Hr. Prof. Schweigger-Seidel. — *Examinatorien und Repetitorien* halten der Hr. Geh. Medicinalrath Krukenberg und die Herren Prof. Niemeyer und Hohl, auch Hr. Dr. Rosenbaum.

#### IV. Philosophie und Pädagogik.

*Encyclopädie und Methodologie des philosophischen Studiums* trägt Hr. Prof. Hinrichs vor. — *Allgemeine Geschichte der Philosophie* lehrt Ebenderselbe und Hr. Dr. Schaller. — *Anthropologie* trägt Hr. Geh. Hofrath Gruber vor. — *Empirische Psychologie* lehrt Hr. Prof. Gerlach. — *Fundamentalphilosophie* trägt Hr. Dr. Schaller vor. — *Logik* lehren die Herren Prof. Gerlach und Erdmann. — *Metaphysik* tragen die Herren Prof. Hinrichs und Erdmann vor. — *Ästhetik oder Philosophie der Geschichte der Kunst* trägt Hr. Prof. Ulrici vor; auch liest Derselbe über *Shakspeare's Dramen und sein Verhältniss zu Calderon und Goethe*, als Einleitung zur *Geschichte der neuern Poesie*. — *Religionsphilosophie* lehrt Hr. Dr. Schaller. — Über den Begriff, die Gründe und die verschiedene Gestaltung des *Panthismus* liest Hr. Prof. Gerlach. — *Ethik und Politik* trägt Hr. Dr. Ruge vor; auch liest Derselbe über *Phänomenologie der heutigen Philosophie*. — *Die Begriffe von Recht und Unrecht* entwickelt Hr. Prof. Eiselen.

*Pädagogik und Didaktik* trägt Hr. Prof. Fritzsche vor.

Die Übungen der Mitglieder im königl. pädagogischen Seminarium leitet Hr. Prof. Niemeyer.

#### V. Mathematik.

Den *arithmetischen Theil der Elementarmathematik* trägt Hr. Prof. Sohncke vor. — *Die Differentialrechnung* lehrt Ebenderselbe. — *Algebra* trägt Hr. Prof. Rosenberger vor. — *Die Geometrie nach Euklid* lehrt Hr. Prof. Gartz; auch liest Derselbe über die *analytische Geometrie der alten und neuen Mathematiker*. — *Combinatorische Analysis* trägt Hr. Prof. Sohncke vor. — *Ebene und sphärische Trigonometrie* lehrt Hr. Prof. Gartz. — *Analytische Mechanik* trägt Hr. Prof. Rosenberger vor; auch liest Derselbe über *geographische Längen- und Breitenbestimmung*.

*Examinatorien über einzelne mathematische Disciplinen* hält Hr. Prof. Gartz.

#### VI. Naturwissenschaften.

*Die Elemente der Chemie* verbunden mit *Experimentirungen* trägt Hr. Prof. Schweigger-Seidel vor. — *Experimentalphysik* nach Baumgärtner's Lehrbuch, sowie *Elektrochemie* trägt Hr. Prof. Schweigger vor. — *Physische Geographie* lehrt Hr. Prof. Kämtz; auch liest Derselbe über *Meteorologie*. — *Geognosie* trägt Hr. Prof. Gernar vor. — *Mineralogie* lehrt Ebenderselbe nach seinem Handbuche; auch liest Derselbe über einzelne Gegenstände aus dem Gebiete der gesamten Mineralogie, verbunden mit *Demonstrationen und Aufgaben zu besondern Untersuchungen*. — *Den ersten Theil der Gewäcshunde,*

*umfassend die Gestaltung, Anatomie und Physiologie der Pflanzen, verbunden mit Demonstrationen und Excursionen*, trägt Hr. Prof. von Schlechtendal vor. — Über die *Gräser und Halbgräser* liest Ebenderselbe. — *Zoologie* trägt Hr. Prof. Burmeister nach seinem Handbuche der *Naturgeschichte* (Berlin 1837) vor. — *Die allgemeine Naturgeschichte der Thiere* lehrt Hr. Dr. Buhle nach seinem Handbuche.

*Physikalische und chemische Experimentirungen* im akad. Laboratorium leitet Hr. Prof. Schweigger mit besonderer Rücksicht auf die Mitglieder eines für die gesamten Naturwissenschaften zu begründenden Seminars, welche Derselbe auch zu praktischen Übungen in physikalischen Vorträgen veranlassen wird. — *Botanische Excursionen* veranstaltet Hr. Dr. Sprengel; auch hält Derselbe *Examinatorien und Repetitorien über das Gesamtgebiet der Philologie*. — *Zoologische Zusammenkünfte zur Übung im Selbstuntersuchen* veranstaltet Hr. Prof. Burmeister.

#### VII. Staats- und Kameralwissenschaften.

*Encyclopädie der Kameralwissenschaften* trägt Hr. Prof. Eiselen vor. — *Finanzwissenschaft* lehrt Ebenderselbe. — *Forsttechnologie* lehrt Hr. Dr. Buhle; auch liest Derselbe über den ökonomischen Nutzen der *Hausthiere*.

#### VIII. Historische Wissenschaften.

*Archäologie der orientalischen Völker* trägt Hr. Cons.-Rath Gesenius vor. — *Mythologie und Religionsgeschichte der alten Völker* lehrt Hr. Prof. Ulrici. — *Griechische Staatsalterthümer* trägt Hr. Prof. Meier vor. — Über das *Kriegswesen der Alten* liest Hr. Generalmajor Dr. von Hoyer. — *Die Geschichte der Päpste von Gregor VII. bis auf die neuesten Zeiten* trägt Hr. Geh. Hofrath Voigtel vor. — *Neuere Geschichte seit dem westfälischen Frieden* lehrt Hr. Dr. Röpell. — *Neuere preussische Geschichte seit dem Tode des grossen Kurfürsten* trägt Ebenderselbe vor. — *Die Geschichte der französischen Revolution bis zum Jahre 1804* lehrt Hr. Prof. Leo. — *Die Übungen der historischen Gesellschaft* leitet Hr. Geh. Hofrath Voigtel.

#### IX. Philologie und neuere Sprachkunde.

##### 1) Classische Philologie: griechische und römische Literatur.

*Die Geschichte der griechischen und römischen Beredsamkeit* trägt Hr. Prof. Raabe vor. — *Vergleichende Grammatik der griechischen und lateinischen Sprache* lehrt Hr. Prof. Pott. — *Grammatik der griechischen Sprache* lehrt Hr. Prof. Bernhardt. — Von Werken *griechischer Schriftsteller* werden erklärt: *Platon's Bücher über die Republik* vom Hrn. Prof. Bernhardt; *auserlesene Iägypten Theokrit's* vom Hrn. Prof. Pott; *der Oäpud des Sophokles* vom Hrn. Dr. Staeger. — Von Werken *lateinischer Schriftsteller* werden erklärt: *Horazens Ars poetica*, sowie dessen *Carmen seculare* vom Hrn. Prof. Raabe; *die Germania des Tacitus* vom Hrn. Prof. Wilda.

Im königl. philologischen Seminarium werden die Mitglieder im *Interpretiren, Disputiren und Lateinschreiben* von den Herren Prof. Meier und Bernhardt unterrichtet und geübt; und zwar hat Ersterer den *Miles gloriosus des Platon*, Letzterer das *erste Buch des Thyestes* zur Erklärung bestimmt.

##### 2) Morgenländische Sprachen.

*Vergleichende Grammatik der semitischen Sprachen* trägt Hr. Dr. Tuch vor; auch setzt Derselbe die *Übungen seiner hebräischen Gesellschaft* fort. — *Hebräische Grammatik* lehrt Hr. Prof. Rödiger; auch liest Derselbe über die *chaldäische Sprache und den rabbinischen*

**Dialekt.** — *Ausgewählte Stellen des Koran, der Hamusa und des Hariri* erläutert Ebenderselbe. — *Die Sündflut* nebst andern Episoden aus dem Mahabharata erklärt nach Bopp's Ausgabe Hr. Prof. Pott.

### 3) Neue abendländische Sprachen.

*Die Regeln der angelsächsischen Grammatik* trägt Hr. Prof. Leo vor. — *Die engländische Sprache* lehrt Hr. Hofrath Hollmann; auch erläutert Derselbe den *Sturm von Shakespeare*. — *Italienische Grammatik* trägt Hr. Prof. Blanc vor; die *italienische und spanische Sprache* lehrt Hr. Hofrath Hollmann; auch setzt Derselbe seine *Sprachübungen im Italienischen und Spanischen* fort. — *Die Geschichte der dramatischen Literatur der Franzosen* trägt Hr. Prof. Blanc vor; die *französische Sprache* lehrt Hr. Hofrath Hollmann; auch erbetet sich Derselbe zum Privatunterricht im *Griechischen, Lateinischen und Hebräischen*.

### X. Schöne und gymnastische Künste.

*Geschichte, Theorie und Technik der Malerei* lehrt Hr. Prof. Weise; auch leitet Derselbe *Übungen im Zeichnen*. — *Theoretischen und praktischen Unterricht im Zeichnen und Malen* ertheilen die akad. Zeichenlehrer Hr. Schumann und Hr. Herschel.

*Den Generalbass* lehrt Hr. Musikdirector Dr. Naue; auch unterrichtet Derselbe im *Kirchengesange*. — *Theoretisch-praktischen Unterricht in der Musik* ertheilt der akad. Musiklehrer Hr. Helmholtz.

*Die Reitkunst* lehren die Herren Stallmeister André sen. und André jun. — *Unterricht in der Fechtkunst* ertheilt Hr. Fechtmeister Urban. — *Die Tanzkunst* lehrt Hr. Tanzmeister Wehrhahn.

## Deutsche Viertel-Jahresschrift.

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden:

## Deutsche Viertel - Jahresschrift.

Januar — März 1838.

Gr. 8. In Umschlag. Brochirt. Preis 1 Thlr. 20 Gr., oder 3 fl.

**Inhalt:** Was wir bezwecken. — über alte und neue Handelswege nach der Westküste Amerikas, von G. Wöpptg. — Die Steinföhlengedäbe, in naturgeschichtlicher und technischer Beziehung, von K. E. v. Leonhard. — Der Pauperismus, von Prof. Vilau zu Leipzig. — Die neue Gestaltung der deutschen Urtumssozialwissenschaften, von G. Leo. — Die literarischen Zustände Belgiens, von Dr. L. A. Wagnkönig. — Heine's Schriften und Leben, von G. P. — Beiträge zur Lösung der jüdischen Frage, von M. — Auf welchem Standpunkt steht die vaterländische Geschichtsforschung, von W. M. — über den Sonnambulismus, von Prof. Fischer zu Basel. — Aphorismen über Kriegskunst, von Ritter Profesch von Ofen. — über Diplomatie, von F. R.

Stuttgart und Tübingen, im Januar 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

## B. Öffentliche akademische Anstalten.

**I. Seminarien:** 1) *theologisches*, unter Oberaufsicht der theologischen Facultät; 2) *pädagogisches*, unter Direction des Hrn. Prof. Niemeyer; 3) *philologisches*, unter Direction der Herren Prof. Meier und Bernhardt. — 4) *Historische Gesellschaft*, unter Direction des Hrn. Geh. Hofraths Voigtel. — 5) *Pharmaceutisches Institut*, unter Direction des Hrn. Prof. Schweigger-Seidel. — **II. Klinische Anstalten:** 1) *medizinische Klinik*, unter Direction des Hrn. Geh. Medicinalraths Krukenberg; 2) *chirurgisch-ophthalmiatrie Klinik*, unter Direction des Hrn. Prof. Blasius; 3) *Entbindungsanstalt*, unter Direction des Hrn. Prof. Niemeyer. — **III. Die Universitätsbibliothek** wird, unter Aufsicht des Hrn. Oberbibliothekars Geh. Hofr. Voigtel und des Hrn. Bibliothekars Prof. Pernice, Mittwochs und Sonnabends von 1—3 Uhr, an den übrigen Wochentagen von 10—12 Uhr geöffnet. — **IV. Die akad. Kupferstichsammlung**, unter Aufsicht des Hrn. Prof. Weise, ist Dienstags und Sonnabends von 1—2 Uhr geöffnet. — **V. Die archäologische Sammlung** des thüringisch-sächsischen Vereins zeigt Hr. Bibliotheksecretaire Dr. Förstermann auf Verlangen. — **VI. Anatomisches Theater und anatomisch-zootomisches Museum**, sowie die *Meckelschen Sammlungen*, unter Direction des Hrn. Prof. d'Alton. — **VII. Physikalisches Museum und chemisches Laboratorium**, unter Direction des Hrn. Prof. Schweigger. — **VIII. Sternwarte**, unter Aufsicht des Hrn. Prof. Rosenberger. — **IX. Das mineralogische Museum** ist, unter Aufsicht des Hrn. Prof. Germar, Donnerstags und Freitags von 2—4 Uhr geöffnet. — **X. Botanischer Garten und Herbarium**, unter Direction des Hrn. Prof. von Schlechtendal. — **XI. Das zoologische Museum** ist, unter Aufsicht des Hrn. Prof. Burmeister und Hrn. Inspector Dr. Buhle, Mittwochs von 1—3 Uhr geöffnet.

In meinem Verlage ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu erhalten:

## Analekten

für

## Frauenkrankheiten,

oder

Sammlung der vorzüglichsten Abhandlungen, Monographien, Preisschriften, Dissertationen und Notizen des In- und Auslandes über die Krankheiten des Weibes und über die Zustände der Schwangerschaft und des Wochenbettes.

Herausgegeben

von einem **Vereine praktischer Ärzte.**

Erster Band. In vier Heften.

Gr. 8. 2 Thlr. 16 Gr.

Aus der von Jahr zu Jahr immer stärker anschwellenden Flut medicinischer Schriften eine schätzbare Sammlung alles Gediengenen, Brauchbaren und Guten, was das Gebiet der Frauenkrankheiten betrifft, zu ziehen, ist der Zweck der Herausgeber. Sie wollen den praktischen Ärzte, welcher nicht viel auf seine Bibliothek verwenden kann oder will, für einen geringen Preis viele Werke ersetzen, aus denen er das hier Gesammelte selbst schöpfen müsste.

Leipzig, im Februar 1838.

**F. A. Brockhaus.**

## Thiersch gelehrte Schulen.

In der Unterzeichneten ist erschienen:

### Ueber gelehrte Schulen, mit besonderer Rücksicht auf Baiern

von  
Friedrich Thiersch.  
Drei Theile. Gr. 8.

Da die vier ersten Hefte dieses Werkes seit einiger Zeit fehlten, während von denen des zweiten und dritten Bandes Exemplare noch vorhanden, so war es nöthig, von dem ersten Theile die jenem Vorrath entsprechende Anzahl Exemplare neu zu drucken, um das Werk, so weit es erschienen, zu ergänzen. Beim Wiederdruck wurden, da es sich nur davon handelte, die erste Ausgabe zu ergänzen, nur Druckfehler und einzelne Ungenauigkeiten des Ausdrucks verbessert, jedoch in Bezug auf den Inhalt die Exemplare des Werkes, welche durch den Wiederdruck des ersten ergänzt werden, von den früheren in keinem Punkte verschieden sind.

Vollständige Exemplare des ersten bis dritten Bandes können für den Preis von 8 Thlr. 8 Gr., oder 13 Fl. 30 Kr., jezt wieder durch alle Sortimentshandlungen bezogen werden.

Stuttgart und Tübingen, im Januar 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Bei DüMont-Schauberg in Köln ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

**TOXIKOLOGISCHE TABELLEN,**  
oder tabellarische Uebersicht der Gifte, der Symptome, die sie hervorbringen u. s. w. Nach den neuesten Entdeckungen und Berichtigungen entworfen von Dr. STUCKE. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Broschirt. 14 Gr., oder 1 Fl.

Daß ein solches Werk in so kurzer Zeit eine neue Auflage erlebt, spricht schon von selbst für die Brauchbarkeit und Vorzüge desselben. Diese neue Auflage unterscheidet sich wesentlich von der ersten; der Herr Verfasser hat sie mit großer Vorliebe für seinen Gegenstand durchaus überarbeitet und keine Mühe gescheut, um ihr die möglichste Vollständigkeit und Genauigkeit zu geben. Nicht nur sind die neuen Beobachtungen und Erfahrungen zur Berichtigung des Aufgestellten benutzt, sondern auch bei mehreren Rubriken viele Zusätze eingeschaltet worden.

In der Unterzeichneten ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## F a u s t.

Eine Tragödie  
von  
Goethe.

Beide Theile in Einem Band.

Mit Goethe's Bildniß in Stahl.

Diese neue Ausgabe von Goethe's Meisterwerk übertrifft die bisher erschienenen Ausgaben; bemerkgewürdig haben wir uns entschlossen, einen äußerst niedrigen Subscriptionspreis davon bei 12 Stkern 1838 gelten zu lassen und zwar 2 Thlr., oder 3 Fl. 12 Kr. Nach 12 Stkern 1838 wird ein erhöhter Ladenpreis eintreten.

Wird sind überzeugt, daß unser Bestreben, den Ankauf dieses Werkes, welches in den früheren Ausgaben 2 Thlr. 16 Gr., oder 4 Fl. 48 Kr., kostete, möglichst zu erleichtern, allgemeine Anerkennung finden werde.

Bei dieser Gelegenheit machen wir auch auf die vom Prof. Moriz Reith gezeichneten und gestochenen Umrisse zu Goethe's Faust aufmerksam; diese Umrisse sind allbekannt und unterlassen wir daher alle Anrühmung. Der Preis für beide Theile — 40 Blatt in Quersolio cartonnet — ist 3 Thlr. 12 Gr., oder 5 Fl. 24 Kr.

Stuttgart und Tübingen, im Januar 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

## S c h r i f t e n

in Angelegenheiten des Erzbischofs von Köln.

Soeben erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

### Die Römische Curie im Kampf um ihren Einfluß in Deutschland,

veranlaßt

durch die Opposition des Erzbischofs von Köln gegen Preußen unter Mitwissenschaft Roms und das Verdammungsbreve des Hermes'schen Reichstheismus.

Vom Verfasser der Schrift:

„Der Erzbischof von Köln, seine Principien und Opposition.“

Motto: Die Tage der Geistesknechtschaft sind vorüber. Altersschwach zwischen den zerbrochenen Säulen ihres Colosseums sitzt die alte Kreuzspinne und spinnt noch immer das alte Gewebe. Aber es ist matt und morisch; es versangen sich darin nur Schmetterlinge und Fiebermader und nicht mehr die Steinabder des Nordens.

8. Geh. 8 Gr.

Früher erschienen von demselben Verfasser und sind in allen Buchhandlungen zu finden:

**Der Erzbischof von Köln, Freiherr Clemens August von Droste zu Wischering, seine Principien und Opposition. Nach und mit authentischen Actenstücken und schriftlichen Belegen dargestellt.**

Motto: In meinen Staaten kann Jeder ungehört nach seiner Façon selig werden.

Friedrich der Große.

8. Geh. 8 Gr.

**Die römisch-hierarchische Propaganda, ihre Partei, Umtriebe und Fortschritte in Deutschland. Mit Rückblicken auf die Opposition des Erzbischofs von Köln nach unumstößlichen Thatfachen geschildert.**

Motto: Rom wollte immer herrschen; und als seine Legionen fielen, sandte es Dogmen in die Provinzen.

8. Geh. 8 Gr.

Leipzig, im Februar 1838.

F. W. Brockhaus.



# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. VIII.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Zeile 2 Gr.

Durch alle Buchhandlungen Deutschlands sind zu haben:

## Novellen von Posgaru.

**Zweite verbesserte Auflage.**

3 Bändchen.

Mit zierlichen Titelbignetten in Stahlstich.

8. Breslau bei **Josef May und Comp.** Sauber geheftet 2 Thlr. 18 Gr.

Die Berliner Evangelische Kirchenzeitung, 1837, Nr. 93, empfiehlt obiges Werk, wovon das 1ste und 2te Bändchen: Die Liebesgeschichten, das 3te Bändchen: Germanos enthält, ihren Lesern mit folgenden Worten:

„Posgaru liefert Werke von einer strengen und scharfen Bildung. In den Liebesgeschichten ist das ungöttliche Wesen, der modernen schöngeistigen Bildung scharf gezeichnet, und in seiner Lügenhaftigkeit, Angst und Heillosigkeit streng gerichtet. Höchst beachtenswerthe Excurse über die Goethe'sche und Tieck'sche Poesie treten uns hier entgegen. Schade ist es, daß der schöngeistigen Finsterniß kein überwiegendes Gegenüber christlicher Klarheit und Kraft in diesem Werke gegeben ist, obwohl sie in sich selber zerfällt und zu Grunde geht, und das Gegenstück einer höhern Denkart in allgemeinerer Gestalt nicht fehlt. In diesem Werke tritt die scharfe Charakterzeichnung in ausgezeichnetem Maße hervor, selbst in geringeren Personen, besonders aber in einer eminenten weiblichen Figur. — Der Germanos ist ein gehaltreiches Werk, lebensfrisch, trotz dem, daß seine Personen einem Hegelianischen Recensenten nur als Personifikationen der herrschenden geistigen Richtungen im Reformationszeitalter erscheinen sind. Wenn Ref. nicht irrt, so enthält dieses Werk einen herrlichen Traum, eine poetische Darstellung der verschiedenen Zeiträume der Weltgeschichte im Lichte der christlichen Wahrheit, die für sich allein dem Germanos einen bleibenden Werth gibt. überall aber gibt sich in diesen Schriften der christliche Glaube kund, getragen von einem sehr schönen Talent, im Bunde mit einer bedeutenden Bildung.“

In meinem Verlage ist erschienen:

**Ersch (Joh. Sam.),**

**Literatur der vermischten Schriften**  
seit der Mitte des 18. Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit; systematisch bearbeitet und mit den nöthigen Registern versehen. Neue fortgesetzte Ausgabe von **Chr. Ant. Geissler.**

(Aus der neuen Ausgabe des Handbuchs der deutschen Literatur besonders abgedruckt.)

Gr. 8. 1837. 20 Gr.

Die Beendigung der neuen Ausgabe von Ersch's Handbuch der deutschen Literatur ward durch den Tod des Gründers und durch mancherlei spätere Widerwärtigkeiten seit dem Jahre 1822 bis jetzt verzögert. Nun aber habe ich gegründete Hoffnung, auch die letzte noch fehlende Abtheilung, die Literatur der schönen Künste enthaltend, in diesem Jahre ausgeben zu können.

Die frühern Abtheilungen, jede von einem in seinem Fache ausgezeichneten Manne bis auf die Zeit des Erscheinens fortgesetzt, enthalten:

- I. 1. Literatur der Philologie, Philosophie und Pädagogik. Bearbeitet von **E. G. A. Böckel.** 1822. 1 Thlr. 6 Gr.
- I. 2. Literatur der Theologie. Bearbeitet von **E. G. A. Böckel.** 1822. 1 Thlr. 16 Gr.
- II. 1. Literatur der Jurisprudenz und Politik. Bearbeitet von **J. Ch. Koppe.** 1823. 1 Thlr. 18 Gr.
- III. 1. Literatur der Medicin. Bearbeitet von **F. A. B. Puchell.** 1822. 1 Thlr. 20 Gr.

III. 2. Literatur der Mathematik, Natur- und Gewerbskunde etc. Bearbeitet von **Fr. W. Schweigger-Seidel.** 1828. 4 Thlr.

IV. 1. Literatur der Geschichte und deren Hilfswissenschaften. 1827. 3 Thlr. 8 Gr.

Das ganze Werk in vier Bänden kostet auf Druckpapier 12 Thlr., auf Schreibpapier 16 Thlr., auf Schreibpapier in 4. 24 Thlr.

Leipzig, im März 1838.

**F. A. Brockhaus.**

Bei A. Förstner in Berlin ist soeben erschienen:

**Jahresberichte**  
über die Fortschritte der Forstwissenschaft und forstlichen Naturkunde im Jahre 1836—37

nebst  
**Original-Abhandlungen**  
aus dem Gebiete dieser Wissenschaften.

**Eine Zeitschrift**

für Forstleute, Waldbesitzer und Kameralisten.

Herausgegeben von

**Dr. Theodor Hartig,**

Prof. an der Universität zu Berlin, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften etc.

1ster Jahrgang. 1stes Heft.

Mit 1 Kupfertafel. Gr. 8. Broch. 1 Thlr. 4 Gr.



In meinem Verlage ist erschienen und in allen Buchhandlungen vorrätig:

## F. G. Wetzel's gesammelte Gedichte

und

N a c h l a s s.

Herausgegeben von

B. Funck.

8. Geh. 2 Thlr. 8 Gr.

Wetzel ist ein echter deutscher Dichter und sein Name konnte von der Masse der Erzeugnisse des Tages wol verdrängt, nicht aber vergessen werden. Seine Lebens- und Liebeslieder, seine zahlreichen Legenden, Sagen und Romane dürfen neben Uhland's und Rückert's Gedichten genannt werden. Seine Krieger-, Sieges- und Feuerlieder sind wie die Körner's und Max von Schenkendorff's unvergessliche Worte aus einer großen Zeit. Seine vermischten Gedichte, sein „Prolog zum großen Wagen“ tragen den Stempel seiner tiefen Einsinnung. Der Herausgeber hofft daher mit Recht durch eine Auswahl von Wetzel's Gedichten, welche in Taschenbüchern und Zeitschriften bisher zerstreut waren, den Dank der Besten zu verdienen und dem Dichter ein Denkmal zu errichten.

Leipzig, im März 1838.

F. A. Brockhaus.

In der Unterzeichneten ist erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden:

## Polytechnisches Journal,

herausgegeben

von den

DD. Dingler und Schultes.

Erstes Jahrbuch.

Inhalt: Perkins' Verbesserungen an den Dampfmaschinen, ihren Hfen und Rfeln. Mit Abbildungen. Beschreibung einer durch Dampf betriebenen Maschine, die man in Louisiana zum Einschlagen und Abtragen der Pfähle, welche den Eisenbahnen als Grundlage zu dienen haben, benutzte. Mit Abbild. Harrison's Verbesserungen an den Locomotivmaschinen. Mit Abbild. Sullivan's Verbesserungen an den zum Pressen von Flüssigkeiten dienenden Apparaten. Mit Abbild. Bericht des Amadee Durand über den sogenannten französischen Schraubenschlüssel des Hrn. Leroy-Eriveau. Mit Abbild. Young's Verbesserungen in der Fabrication metallener Angeln für Thiere und zu andern Zwecken. Mit Abbild. über die Zinnoberabwägungen des Hrn. Biette und des Hrn. Seyffert in Paris. Mit Abbild. Bailey's Verbesserungen an dem Strumpfwirkerstuhl. Mit Abbild. Ritchie's Verbesserungen im Zureichten und Appretiren von wollenen und andern Geweben. Mit Abbild. Smith's Verbesserungen an den Apparaten, womit Baumwoll-, Seiden- und Wollen- und andere Zeuge nach ihrer Breite ausgespannt erhalten werden können. Mit Abbild. Beschreibung einer verbesserten Maschine zum Zerpresse, von Lord Wiltoughby & Co. Mit Abbild. Beschreibung einer seit einigen Jahren am Reinhardtswalde eingeführten neuen Holzverzögerungsmethode, von G. Pfort. Heuser, Sprengmethode mit Sandbombe. Woolley's verbesserte Behandlungsweise verschiedener Stoffe, welche anfangs des Bienenwachses und zu andern Zwecken dienen können. Goodlet's verbessertes Verfahren, Maschin- und andere geistige Flüssigkeiten zu destilliren, welches aber auch auf das Rectificiren, Kochen und Abdampfen im Allgemeinen anwendbar ist. Key über die Fabrication des Allicoms (gedröhten Kartoffelstärke). Über eine von Hrn. Ad. Theodor Bertier vorgeschlagene Methode, die Bildung von Schaum nach dem Verfahren der Runkelrübenbrunne zu verhindern

und die Formen voll zu erhalten. Zink's verbesserte Methode, aus den Ananasblättern einen zum Fabrikgebrauch geeigneten Faserstoff zu gewinnen. Bericht des Hrn. Labarraque über die geistlichen Lapetenpapiere des Hrn. Benoit in Paris. Auszug aus einer Abhandlung über die Fabrication vergoldeter und gepresster Papiere zum Tapetiren und zu Papparbeiten, von Hrn. Delpont in Paris. Auszug aus einem Berichte des Hrn. Dolant-Denos über die löthungsfähigen Hüte des Hrn. Gibus und über dessen Gattengewebe. Über eine neue, von Hrn. Barbeau d. Jüng. erfundene Methode, den Bau in den Hühnergruben zu führen. Über eine von Hrn. Winter erfundene tragbare Drehschneidmaschine. Miscellen. Englische Patente. Lemoine's Verbesserung an den Dampfesseln. Vassor's Mittel gegen die Explosionen der Dampfesseln. Vorschlag zur Verhütung des Zusammenstoßens von Dampfbooten. Das Dampfboot Gorgon. Neue Ruberräder für Dampfboote. Beslay's Maschine zum Poliren von Obelisken u. dgl. Bingham's und Dupé's Verbesserungen an den Schiffsgewehren. Jacottin's Verbesserungen an den feinen Wangen. Lang's Verbesserungen an den Maschinen zum Vorspinnen und Spinnen von Glas, Hanf und andern Faserstoffen. Jolivet's Vorschlag der Spitzen der Schnürriemen. Schandeler's Knöpfe. Dronjari's sogenannte Philippine zu Hüten, Tapeten &c. Verwendung der Kinder in den englischen und französischen Fabriken. Grundy's Wellenmaarenfabrik. Über eine neue goldartige und anstatt der Verzinnung anwendbare Legirung. Über den Diamant und dessen Anwendung zu optischen Zwecken. Frankreichs Handel im Jahr 1836. Zur Statistik Frankreichs. Frankreichs Steinkohlenstatistik. Über die Dachbedeckung mit Zink. Die größte Tischplatte aus Acajouholz. Literatur.

Zweites Jahrbuch.

Nach, über die Ursachen der Explosionen der Dampfesseln. Hawkin's Verbesserungen in der Anwendung der Producte der Verbrennung zur Erzeugung und Unterhaltung des zum Betriebe der Dampfmaschine dienenden Dampfes. Mit Abbild. Woodhouse, Beschreibung einer neuen rotirenden Dampfmaschine. Mit Abbild. Pague's verbesserte Anwendung einer bekannten Kraft zum Heben von Wasser aus Bergwerken, Schiffsräumen &c. und auch zum Betriebe gewisser Maschinen. Mit Abbild. Bethell's Verbesserungen an den Apparaten zum Tauchen und zur Völlbringung verschiedener Arbeiten unter Wasser. Mit Abbild. über die Lampen mit Regulator des Hrn. Rouen. Walker's Verbesserter, an Kerzenleuchtern anwendbarer Lichtauslöcher. Mit Abbild. Berry's Verbesserter Apparat, um die auf Pianofortes oder Orgeln angespielten Tasten niederzuziehen. Mit Abbild. Giller's Verbesserungen an den Gabelrosten. Mit Abbild. Die Verstärkung der Klopfsenken, vom Gabelrostenfabrikanten Crause jun. Bericht, welchen die Herren Schumacher und Scheurer der Societä Industrielle in Nürnberg über verschiedene Einrichtungen und Apparate in den englischen Bleichereien und Rattundrudereien erstatteten. Mit Abbild. Walzenbrudmaschine. Stiel zum gleichzeitigen Aufdrucken mehrerer Farben. Mechanischer Streicher für den Handdruck. Glanzpapier für die Drucker. Weichen. Waschräder. Auspressmaschinen. Färbekufen. Trockenkufen. Trockenkufen für grundirte Zeuge. Feuerstoffe. Mechanische Feizer. Dampfessel. Apparate zum Filtern des Wassers. Wiedergewinnung des Indigos aus dem Saft der Blaufrühen. Benetzung des Holzes. Bericht des Herrn Schwarz über Clerc's metallene Druckformen, welche gegossen und mit benedigen Gegenständen versehen sind. Dingler's nachträgliche Bemerkungen über Zwabbe's Tricometer. Über die Heizung der Wohnungen mit Gas. Miscellen. Fourneyron's Vorschlag zu einem Kanal von Basel nach Straßburg. über die auf Holz ausgelegenen Messingfabrikate des Hrn. Lacarrière. Ausführlischer über Derr's Pastey's Versuche über die Stärke gemauerter Balken. Engelmann's Sicherheitspapier. über die Dauerhaftigkeit verschiedener Holzsorten. Neue Verarbeitungsart des Rals. Bicarons. über die Ursache, wozu ein weißbrot gebracktes Wellentücher beim Dämpfen oft Flecken bekommen. Bereitung einer gleichartigen Lackfarbe. (Summielastium-) Auflösung und Anwendung derselben

zum Wasserbichtmachen von Wollentüchern u. Reisenehl als Futter für die Seidenraupen. Fütterung der Seidenraupen mit Kartoffelsäcke. Fortschritte der Kunstkrübengucker-Fabrikation in Ungarn.

Von diesem sehr gemeinnützigen und wohlfeilsten Journal erscheinen aus bisher monatlich zwei Hefte mit Kupfern. Der Jahrgang, aus 24 Heften mit 24-36 Kupferplatten bestehend und welcher mit einem vollständigen Sachregister versehen wird, macht für sich ein Ganzes aus und kostet durch die Postämter und Buchhandlungen nur 9 Thlr. 8 Gr., oder 16 Fl. In das Abonnement kann nur für den ganzen Jahrgang eingetretten werden.

### Die Verlagshandlung kam vom Polytechnischen Journal

noch einige ganz vollständige Exemplare, welche sie auf gekauft hat und zwar 1ster bis 18ter Jahrgang zu 168 Thln., oder 288 Fl., anbieten. Die Jahrgänge 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1826 bis 1837 sind fortwährend einzeln zum Preise von 9 Thlr. 8 Gr., oder 16 Fl., zu haben.

Stuttgart und Augsburg, im Januar 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Für Freunde geistreicher Unterhaltung ist jetzt vollständig erschienen:

### Dezobry,

Rom im Jahrhunderte des Augustus, oder Reise eines Galliers nach Rom u. Nach dem Franzöf. von **Jh. Sell.** Nebst Schilderung des röm. Münzwesens von **H. Hase.** 4 Theile mit 1 Plan. Geh. 1837 und 1838. 3 Thlr. 12 Gr.

In 104 Briefen ist hier ein Gemälde von röm. Leben, Sitten, Gebräuchen, Einrichtungen u. gegeben, das jeden, nicht eigentlichen Alterthumsforscher und selbst die erwachsene Jugend aufs anziehendste beiziehend wird.

### G. D. Marxbach,

### über moderne Literatur.

In Briefen an eine Dame. Dritte Sendung: Guckow. Wienburg. Laube. Kühne. Penau. Die schwäbische Schule. Bettina. Rahel u. 8. 1838. Geh. 16 Gr.

Die ersten 2 Hefte erregten viel Aufsehen bei ihrem Erscheinen und dürfte die Nachricht von der Vollendung dieser Besprechungen nicht unerwünscht sein.

Alle 5 Sendungen in einem Bande unter dem Titel:

### Der Zeitgeist und die moderne Literatur.

Geh. 1 Thlr. 16 Gr.

Leipzig, im Januar 1838.

J. E. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Im Verlage der **Gedr. Bornträger** in Königsberg sind seit Jahresfrist folgende Werke erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Andrat, G., Die Krankheiten des Gehirns. Aus dem Französischen überf. und mit Bemerkungen v. B. A. Köhler. 2 Thle. Gr. 8. 1837. 3 Thlr.

v. Baer, R. G., Entwickelungsgeschichte der Thiere. 2ter Theil. Mit 4 Kupfern. Gr. 4. 1837. 4 Thlr.

Burbach, G., Beitrag zur mikroskopischen Anatomie der Nerven. Mit 2 Kupferst. Gr. 4. 1837. 1 Thlr.

Drumann, W., Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikanischen zur monarchischen Verfassung. Nach Ge-

schlechtern und mit genealogischen Tabellen. 2ter Band. Gr. 8. 1837. 3 Thlr. 18 Gr.

Jacobson, L., Zur Lehre von den Eingeweidebrüchen. Zwei gekrönte Preischriften. Mit 2 Kupferst. Gr. 8. 1837. 2 Thlr.

Köster, F., Die Psalmen nach ihrer strophischen Anordnung, überf. mit Einleitung und Anmerkungen. Gr. 8. 1837. 2 Thlr. 12 Gr.

Lehrs, K., Quaestiones epicae. 8maj. 1837. 1 Thlr. 16 Gr.

Lehde, C., Dyrerkränze. Ein Andachtsbuch für die Jugend. Gr. 12. 1837. Geh. 12 Gr.

Mongovius, Chr. C., Deutsch-polnische Wörterbuch. 4te und letzte Lieferung. Gr. 4. 1837. 1 Thlr. 9 Gr.

Der deutsch-polnische Theil vollständig 4 Thlr. 9 Gr.

Der polnisch-deutsche Theil vollständig 4 Thlr. 12 Gr.

Nhert, G. D. E., Leisfaden für den ersten Unterricht in der Naturgeschichte. 8. 1837. 6 Gr.

Rosenkranz, R., Psychologie oder die Wissenschaft vom subjectiven Geist. Gr. 8. 1837. 2 Thlr.

Rupp, J., Übersicht der allgemeinen Geschichte. Für die obere Classe der Gymnasien, mit genealogischen Tabellen und einem Atlas von 17 historischen Karten. Gr. 8. 1837. 2 Thlr. 12 Gr.

Dasselbe ohne Atlas 1 Thlr. 8 Gr.

Der historische Atlas apart in Großfolio 1 Thlr. 4 Gr.

Sachs, L. W., und Dulk, F. Ph., Handwörterbuch der praktischen Arzneimittellehre zum Gebrauch für angehende Ärzte und Physici. 3ter Theil. 1ste bis 6te Lieferung. Gr. 8. 5 Thlr.

Ulrici, Ergänzungen zu den Verordnungen über den Mandats-, summarischen und Bagatelproceß, der Rechtsmittel der Revision, über die Execution in Civilsachen und über den Subhastations- und Kaufgelder-Liquidationsproceß. 2 Theile. Gr. 8. 1836 und 1837. 2 Thlr. 12 Gr.

Der Katalog über die naturhistorische Bibliothek des Rechnungsraths Meydeck in Manheim, bestehend zum Theil in den seltensten und kostbarsten Pracht- und Kupferwerken, die hier dem Liebhaber billig angeboten werden, ist in allen soliden Buchhandlungen zu finden. Bestellungen sind bei der unterzeichneten Buchhandlung, die mit dem Verkauf der Bibliothek beauftragt ist, zu machen.

Manheim.

Schwan und Göß'sche Hofbuchhandlung.

Durch alle Buchhandlungen ist von uns zu beziehen:

### REVUE

### Française et Etrangère,

ou Nouvelle Revue encyclopédique.

Deuxième année. 12 livraisons mensuelles. Gr. in-8.

Paris, 1838. 15 Thlr. 12 Gr.

In dieser kritischen Zeitschrift werden nicht nur Beurtheilungen französischer literarischer Erscheinungen, sondern auch deutscher, englischer, italienischer u. s. w. Werke geliefert; von den Mitarbeitern sind vorzugsweise folgende zu nennen: die Herren Baron Vardoux de Penhoen, Baron d'Estheim, Baron Taylor, Bibliophile Jacob, Marquis de Lagrange, Graf de Circourt, Graf de Salau, Roussinet, Verour de Vinc, Tissot, R. Fournier, Ch. Farcy, B. Lafaye, C. Barton, Parquis, Ed. Carrière, A. de Géfena. Auch liefert dieses Journal Originalaufsätze über Gegenstände aus allen Fächern der Künste und Wissenschaften.

Leipzig, im März 1838.

### Brockhaus & Wernarius,

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.

(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

# Bericht

über die  
**Verlagsunternehmungen für 1838**  
von  
**F. A. Brockhaus in Leipzig.**

Die mit \* bezeichneten Artikel werden bestimmt im Laufe des Jahres fertig; von den übrigen ist die Erscheinung ungewisser.

## I. An Zeitschriften erscheint für 1838:

\*1. **Leipziger Allgemeine Zeitung.** Jahrgang 1838. Täglich mit Einschluß der Sonn- und Festtage eine Nummer (1 Bogen) nebst Beilage ( $\frac{1}{2}$ —1 Bogen). Hoch-4. Auf feinem Maschinen-Wellpapier. Pränumerationspreis vierteljährig 2 Thlr. 12 Gr. Wird wöchentlich für den folgenden Tag ausgegeben. Anzeigen aller Art finden in der Leipziger Allgemeinen Zeitung eine weitestverbreitete. Die Insertionsgebühren betragen für den Raum einer gespaltenen Zeile  $\frac{1}{2}$  1/2 Gr.

\*2. **Allgemeine Bibliographie für Deutschland.** Eine Übersicht der Literatur Deutschlands, wie der bedeutendern Schriften des Auslandes, nebst Angabe künftig erscheinender Werke und andern auf den literarischen Verkehr bezüglichen Mittheilungen und Notizen. Mit vollständigen Registern. Jahrgang 1838. 52 Nummern (von 1—2 Bogen). Gr. 8. Auf gutem Druckpapier. Preis des Jahrgangs 3 Thlr.

Wird wöchentlich ausgegeben.  
Der Jahrgang 1836 der Allgemeinen Bibliographie kostet 2 Thlr. 16 Gr., der Jahrgang 1837 3 Thlr. Beide Jahrgänge sind mit ausführlichen alphabetischen und systematischen Registern versehen.

\*3. **Repertorium der gesamten deutschen Literatur für das Jahr 1838.** Herausgegeben im Verein mit mehreren Gelehrten von *Ernst Gotthilf Gersdorf*. Funfzehnter Band und folgende. (Beigegeben wird: Allgemeine Bibliographie für Deutschland.) Gr. 8. Preis eines Bandes von etwa 50 Bogen auf gutem Druckpapier 3 Thlr. Das Repertorium erscheint regelmäßig am 15. und 30. jedes Monats in Heften, deren Umfang sich nach den vorhandenen Materialien richtet.

Der Allgemeinen Bibliographie für Deutschland und dem Repertorium der deutschen Literatur wird ein beider Zeitschriften gemeinschaftlicher

### Bibliographischer Anzeiger

beigegeben, der für literarische Anzeigen aller Art bestimmt ist. Die Insertionsgebühren betragen  $\frac{1}{2}$  1/2 Gr. für die Petitzeile oder deren Raum. Besondere Beilagen, als Prospekte, Anzeigen u. dgl., werden mit der Bibliographie wie mit dem Repertorium ausgegeben und dafür die Gebühren mit 1 Thlr. 12 Gr. bei jeder dieser Zeitschriften berechnet.

\*4. **Blätter für literarische Unterhaltung.** (Herausgeber: Heinrich Brockhaus.) Jahrgang 1838. Außer den Beilagen täglich eine Nummer. Gr. 4. Auf feinem Druckpapier. 12 Thlr. Wird wöchentlich und Feiertags ausgegeben, kann aber auch in Monatsheften bezogen werden.

\*5. **Fis.** Encyclopädische Zeitschrift, vorzüglich für Naturgeschichte, vergleichende Anatomie und Physiologie. Herausge-

geben von *F. A. Brockhaus*. Jahrgang 1838. 12 Hefte. Mit Kupfern. (Zürich.) Gr. 4. 8 Thlr.

\*6. **Allgemeine medicinische Zeitung.** Herausgegeben von *Karl Padst*. Jahrgang 1838. Wöchentlich 2 Nummern von 1 Bogen. Gr. 4. Auf feinem Druckpapier. 6 Thlr. 16 Gr.

Zu den unter Nr. 4, 5 und 6 genannten Zeitschriften erscheint ein **Literarischer Anzeiger**, für literarische Ankündigungen aller Art bestimmt. Für die gespaltenen Petitzeile oder deren Raum werden zwei Groschen berechnet.

Gegen Vergütung von 3 Thln. werden Anzeigen und dergl. den Blättern für literarische Unterhaltung, und gegen Vergütung von 1 Thlr. 12 Gr. der *Fis* oder der Allgemeinen medicinischen Zeitung beigelegt oder beigeheftet.

\*7. **Das Pfenning-Magazin für Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse.** (Herausgeber: Friedrich Brockhaus.) Jahrgang 1838. 52 Nummern. (Nr. 249—300.) Mit vielen Abbildungen. Klein Folio. Auf Wellpapier. 2 Thlr. Wird wöchentlich und monatlich ausgegeben.

Der erste Jahrgang des Pfenning-Magazins in 52 Nummern (Nr. 1—52) kostet außer Gehört 2 Thlr., der zweite Jahrgang in 39 Nummern (Nr. 53—91) 1 Thlr. 12 Gr., der dritte Jahrgang in 52 Nummern (Nr. 92—143) 2 Thlr., der vierte Jahrgang in 53 Nummern (Nr. 144—196) 2 Thlr., der fünfte Jahrgang (Nr. 197—248) 2 Thlr., und es sind fortwährend Exemplare davon in guten Abdrücken zu erhalten.

Das dem Pfenning-Magazin beigelegte

### Intelligenzblatt

eignet sich vorzüglich für alle das gesammte deutsche Publicum betreffende Angelegenheiten. Für die gespaltenen Petitzeile oder deren Raum werden nur 5 Gr. berechnet. Anzeigen und dergl. gegen Vergütung von 18 Gr. für das Tausend beigelegt.

\*8. **Das Pfenning-Magazin für Kinder.** (Herausgeber: A. Kaiser.) Jahrgang 1838. 52 Nummern. Mit vielen Abbildungen. Gr. 4. Auf Wellpapier. 1 Thlr.

Wird monatlich ausgegeben.

Der erste bis vierte Jahrgang kosten cartennirt jeder 1 Thlr.  
\*9. **Zeitschriften.** Ein biographisches Magazin für die Geschichte unserer Zeit. (Herausgegeben unter Verantwortlichkeit der Verlagsbuchhandlung.) Sechsten Bandes siebentes und achtstes Heft. (Nr. XLVII—XLVIII.) Gr. 8. Geh. Preis des Heftes von 6—7 Bogen auf gutem Druckpapier 12 Gr.

\*10. **Leipziger Kreisblatt.** (Herausgeber: K. A. C. Sp.) Jahrgang 1838. Wöchentlich drei Nummern ( $\frac{1}{2}$  Bogen). Gr. 4. Auf feinem Druckpapier. Pränumerationspreis vierteljährig 12 Gr. Für Bekanntmachungen aller Art wird die gespaltenen Zeile mit sechs Pfennigen berechnet.

(Die Fortsetzung folgt.)

## Oestreichische militairische Zeitschrift. 1838.

### Erstes Heft.

Dieses Heft ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versendet worden:

Inhalt: I. Aumalacarequis. Eine biographisch-militairische Skizze. II. Betrachtungen über das Leistungsbemögen der Truppen auf Märchen. III. Die russischen Militaircolonnen in den Gouvernements Cherson und Charkow. IV. Die Eroberung von Bremen durch die Allirten im October 1813. V. Neueste Militairveränderungen.

Der Preis des Jahrgangs 1838 von 12 Heften ist wie der aller frühern Jahrgänge von 1818—37 jeder 8 Thlr. Sächsl. Die Jahrgänge 1811—13 sind in einer neuen Auflage

in vier Bänden vereinigt erschienen und kosten zusammen ebenfalls 8 Thlr. Sächsl. Wer die ganze Sammlung von 1811—37 auf einmal abnimmt, erhält dieselbe um  $\frac{1}{4}$  wohlfeiler.

Auch im Jahre 1838 wird diese nicht nur für Militairs, sondern auch für Freunde der Geschichte höchst interessante Zeitschrift ununterbrochen fortgesetzt und bei dem Reichthum an wichtigen Materialien, sowie dem Bestreben der Redaction, nur Gutes zu geben, wird auch dieser Jahrgang den anerkannten Werth dieser Zeitschrift nur vermehren.

Von dem Unterzeichneten ist diese Zeitschrift durch alle Buchhandlungen um die genannten Preise zu beziehen.

Wien, den 12ten Februar 1838.

J. G. Heubner,  
Buchhändler.

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. IX.

Dieser literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Zeile 2 Gr.

## Leipziger Allgemeine Zeitung.

Motto: Wahrheit und Recht, Freiheit und Geseh!

Wenn diese Zeitung gleich nach ihrem ersten Erscheinen sich der größten Theilnahme erfreute, so hat sich diese seit dem Anfang dieses Jahres noch bedeutend vermehrt und der Absatz seitdem fast verdoppelt. Es wird allgemein anerkannt, daß die **Leipziger Allgemeine Zeitung** in freisinniger und unparteiischer Würdigung der Zeitereignisse und vollständiger Mittheilung der parlamentarischen und ständischen Verhandlungen von keinem andern deutschen Blatte übertroffen wird. Die Zahl der Correspondenten und Mitarbeiter in allen Theilen Europas und Deutschlands insbesondere vermehrt sich täglich und die Verlagsabhandlung findet sich durch die Unterstützung, die man ihrem schwierigen Unternehmen von allen Seiten schenkt, nur um so mehr aufgebodert und ermuntert, nichts zu versäumen, um den Erwartungen des Publicums zu entsprechen und dem Blatt immer erhöhten Werth zu geben.

**Mit dem 1ten April beginnt das neue vierteljährliche Abonnement, auf das durch alle resp. Postämter und Zeitungsexpeditoren Bestellung gemacht werden kann.** Der Preis beträgt in Sachsen vierteljährlich 2 Thlr. 12 Gr. und wird im Auslande nach Billigkeit etwas erhöht.

**Inserate** aller Art, für deren schnelle und allgemeine Verbreitung Leipzigs Lage besondere Vortheile darbieten möchte, werden in die Zeitung selbst aufgenommen und der Raum einer Zeile wird mit 1 1/2 Gr. berechnet.

**Die im Jahre 1838 neu hinzugetretenen Abonnenten können das erste Vierteljahr vom Oct. bis Dec. 1837, nebst vollständigem Sachregister und Titel, zu dem Preise von 2 Thlr. 12 Gr. beziehen.**  
Leipzig, im März 1838.

F. A. Brockhaus.

An alle Lehranstalten, Ärzte, Apotheker, Kameralisten und Landbesitzer.

Von  
**S. S. Berzelius, Lehrbuch der Chemie u.**

erscheint soeben der 8te Band der 3ten sehr verbesserten Auflage in 5 Heften zu 2 Thlr. 12 Gr. im Pränumerationspreise bis Ostermesse d. J. Der nachherige Ladenpreis ist 3 Thlr. 12 Gr.

Wer es verabsäumt, die Vorauszahlung von 2 Thlr. 12 Gr. bis Ende April d. J. zu leisten, hat es sich selbst zugesprochen, wenn ihm der Ladenpreis von 3 Thlr. 12 Gr. abgefordert wird; indem wir nach dieser Zeit kein einziges Exemplar mehr im Pränumerationspreise liefern können.  
Dresden und Leipzig, den 1ten Februar 1838.

Arnold'sche Buchhandlung.

Von:

**Pölig Weltgeschichte für gebildete Leser und Studierende.**

Neue Ausgabe der 6ten Auflage, fortgeführt bis zum Jahre 1838, in 15 Lieferungen à circa 12 Bogen. Geh. à 1/2 Thlr.  
haben wir heute die achte Lieferung an die Besteller versandt. Das Ganze wird im Juli vollkommen sein und dann die

neueste, übersichtlichste und wohlfeilste Universalgeschichte in diesem Umfange bilden, deren Anschaffung durch die monatliche Lieferung sehr erleichtert wird.

Leipzig, den 22ten Januar 1838.

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Soeben ist bei uns erschienen und an alle Buchhandlungen versandt:

**Kranse, Dr. C. F. T. (Medicinalrath und Professor der Anatomie), Handbuch der menschlichen Anatomie.** Durchaus nach eigenen Untersuchungen und mit besonderer Rücksicht auf das Bedürfnis der Studierenden, der praktischen Ärzte und Wundärzte und der Gerichtsärzte. Ersten Bandes dritte Abtheilung mit Tabellen und vollständigem Register. Gr. 8. 1838. 2 Thlr. 8 Gr.

Mit dieser Abtheilung ist der erste Band in 3 Abtheilungen, welche zusammen 4 Thlr. 16 Gr. kosten, ganz vollständig und in demselben die gesammte allgemeine und specielle Anatomie des Erwachsenen enthalten.

Der zweite und letzte, schwächere Band, welcher die Anatomie der Entwicklungsperioden, insbesondere die des Foetus und eine detaillirte topographische Übersicht, als Leitfaden und Hülfsmittel bei Zergliederungen und Operationen enthalten soll, wird in Jahresfrist nachfolgen.

Hahn'sche Hofbuchhandlung in Hanover.

# Herder's Cid.

In der Unterzeichneten ist jetzt wieder erschienen und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

## Der Cid.

Nach spanischen Romanzen.

Von

J. G. von Herder.

Neue Auflage.

Velinpapier. Preis 1 Thlr. 6 Gr., oder 2 Fl. 15 Kr.

Stuttgart und Tübingen, im Januar 1833.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

## Das Pfennig-Magazin

für Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse.

1838. Februar. Nr. 253 — 256.

Nr. 253. \*Victoria, Königin von Großbritannien und Irland. über den Mais. (Fortsetzung.) Wilde in Frankreich. Die älteste Kirche der Christenheit. \*Ruinen von Rochester. Die Feuersbrünste in Konstantinopel. über den Kautschuk. \*Hindu-Pilger. — Nr. 254. \*Die Kirchenversammlung von Orient. über den Mais. (Beschluß.) \*Die großblumige Sippflanze. Das Knochenmehl. \*über Höröhren und Hörmaschinen. — Nr. 255. \*Das Prägen der Münzen. Regerepublik in Guiana. \*Die Wasserleitung bei Larragona. über Eisenbahnen. \*Die Kathedrale von Durham. — Nr. 256. \*Der Brand der Börse in London. über Eisenbahnen. (Beschluß.) Merkwürdiger Mord. Das Neueste der Natur- und Gewerbswissenschaft.

Die mit \* bezeichneten Aufsätze enthalten eine oder mehrere Abbildungen.

Preis dieses Jahrgangs von 52 Nummern 2 Thlr. — Der erste Jahrgang von 52 Nrn. kostet 2 Thlr., der zweite von 52 Nrn. 1 Thlr. 12 Gr., der dritte von 52 Nrn. 2 Thlr., der vierte von 52 Nrn. 2 Thlr., der fünfte von 52 Nrn. 2 Thlr. Leipzig, im März 1838.

J. A. Brockhaus.

In der Chr. Fr. Müller'schen Hofbuchhandlung in Karlsruhe ist soeben erschienen und in allen soliden Buchhandlungen zu haben:

## Trauerspiele

von

J. Frhrn. von Auffenberg.

Enthaltend: 1) Das Nordlicht von Kasan; 2) Der Schwur des Kriegers; 3) Der Prophet von Florenz.

Gr. 8. Geh. Preis 1 Thlr. 15 Gr.

Moralische

## Erzählungen

für

die weibliche Jugend.

Von

A. von Clermont.

Gr. 8. Geh. 15 Gr.

Soeben ist erschienen:

## Immanuel Kant's sämtliche Werke.

Herausgegeben

von

Karl Rosenkranz und Friedr. Wilhelm Schubert.  
Neunter Theil. (Metaphysik der Sitten und Pädagogik.)

Subscriptionspreis 1 Thlr. 18 Gr.

Wir überliefern hiermit dem Publicum in schneller Folge auf den ersten, den neunten Theil von Kant's sämtlichen Werken, den Herr Prof. Schubert editirt hat. Er enthält die Metaphysik der Sitten in den zwei Abtheilungen der Rechtslehre und der Tugendlehre, und die Pädagogik. Der Metaphysik der Sitten schickte Kant eine „Grundlegung“ voraus, welche im Jahr 1785 zuerst erschien und bereits 1797 ihre vierte Auflage erlebte, als die Rechtslehre und die Tugendlehre bekannt gemacht wurden. Diese Grundlegung zur Metaphysik der Sitten wird der achte Theil unserer Ausgabe bringen. In Bezug auf Kant's Pädagogik, die dem neunten Theile angehängt ist, wird Herr Prof. Schubert in seiner Biographie des grossen Philosophen seine Erläuterungen bringen.

Zunächst werden die anthropologisch-praktischen Schriften, herausgegeben von Herrn Prof. Schubert und die Kritik der reinen Vernunft, herausgegeben von Herrn Prof. Rosenkranz, erscheinen.

Leipzig, den 14ten Februar 1838.

Leopold Voss.

## Anzeige für Leihbibliotheken und Lesevereine.

Als eine interessante Lecture ist der eben erschienene historische Roman:

## Jakob von Molay der letzte Templer.

Historischer Roman

von F. Th. Wangerheim.

3 Bände. 8. Altona, Hammerich. 1838.

Geh. 3 Thlr.

zu empfehlen.

Wangerheim's Romane werden überall gern gelesen und dürfen in einer gut versehenen Leihbibliothek nicht fehlen.

Ist in sämtlichen Buchhandlungen Deutschlands zu haben.

In der Unterzeichneten ist erschienen:

# Goethe's poetische und prosaische Werke

in  
**Zwei Bänden.**

Unter den schützenden Privilegien sämmtlicher Staaten des deutschen Bundes.

Mit acht Stahlstichen  
und einem Facsimile der Handschrift Goethe's.

**Zweiten Bandes zweite und letzte Lieferung.**

Mit einer **Rappe**, die noch restirenden sieben Stahlstiche enthaltend.

Subscriptionspreis für beide Bände 14 Thlr., oder 24 Fl.

Um diesen niedrigen Preis, welcher nur noch kurze Zeit bestehen wird, können jetzt vollständige Exemplare durch alle Sortimentsbuchhandlungen bezogen werden.

Stuttgart und Tübingen, im Januar 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**

## Zeitschriften für das Jahr 1838.

### Bibliothèque universelle de Genève.

Nouvelle série. 3me année. 1838.

12 cahiers. In-8. Genève. 17 Thlr.

Von dieser gehaltreichen Zeitschrift, deren Hauptbebit wir für Deutschland und den Norden übernahmen, erhalten wir die Hefte monatlich und liefern dieselben regelmäßig nach Erscheinen.

### Revue critique

des

livres nouveaux publiés pendant l'année 1838,

rédigée par

*Jos. Cherbuliez.*

Sixième année du Bulletin littéraire et scientifique.

12 cahiers. In-8. Paris. 2 Thlr. 12 Gr.

Wie bedeutend auch bereits der Beifall war, den dieses kritische Journal selbst in Deutschland fand, wo wir dessen Hauptbebit besorgen, so erlauben wir uns doch nochmals, die Freunde der französischen Literatur besonders darauf aufmerksam zu machen, da ihnen dadurch für einen äußerst billigen Preis ein Mittel dargeboten wird, sich stets Kenntniss der neuesten Erscheinungen der französischen Presse zu verschaffen.

Leipzig, im März 1838.

### Brochhaus & Wenarius,

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.

(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

Um vielseitigem Verlangen zu genügen, ist

**Der Beweis,**

**dass Dr. M. Luther nie existirt hat,**

vom Prof. v. d. Hagen in der Deutschen Gesellschaft vorgetragen, aus den.

**Berliner Conversationsblatt für 1838**

besonders abgedruckt worden. Preis 4 Gr.

Schlesinger'sche Buch- u. Musikalienhandlung  
in Berlin.

In unserm Verlage ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

### Die Erkenntniss und Heilung der Ohrenkrankheiten.

Von

**Dr. Wilhelm Kramer.**

Zweite, sehr verbesserte und vermehrte Auflage seiner „langwierigen Schwerhörigkeit“. Mit Abbildungen in Kupferstich. Preis 2 Thlr.

Der Herr Verfasser hat in diesem Werke (welches bereits von Dr. J. R. Bennett in London ins Englische übersetzt worden ist, während Dr. Wharton Jones in London eine zweite Übersetzung drucken zu lassen beabsichtigt und in Brüssel eine französische Übertragung bereits unternommen worden ist) die praktischen Resultate seiner vieljährigen und ausgebreiteten Praxis mit grosser Klarheit und Bestimmtheit niedergelegt, alles Hypothetische aus der Erkenntniss und Behandlung der Ohrenkrankheiten verbannt und durch die glückliche Heilung sehr vieler Fälle von Taubheit die Zuverlässigkeit seiner Heilmethoden bewährt, welche deshalb den Herren Ärzten nicht dringend genug zur sorgfältigsten Beachtung empfohlen werden können.

Nicolai'sche Buchhandlung in Berlin.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

Allgemeine medicinische Zeitung. Herausgegeben von Dr. Karl Pabst. Jahrgang 1837. Monat October, oder Nr. 79—86. Gr. 4. Preis des Jahrgangs 6 Thlr. 16 Gr.

Repertorium der gesammten deutschen Literatur. Herausgegeben von E. G. Geradendorf. 1838. Funfzehnten Bandes drittes und viertes Heft. (Nr. III, IV.) Gr. 8. Preis eines Bandes 3 Thlr.

Allgemeine Bibliographie für Deutschland. Jahrgang 1838. Monat Februar, oder Nr. 5—8, und Bibliographischer Anzeiger. Nr. 5—8. Gr. 8. Preis des Jahrgangs 3 Thlr.

Leipzig, im März 1838.

**J. A. Brochhaus.**

# Bericht

über die  
Verlagsunternehmungen für 1838  
von  
F. A. Brockhaus in Leipzig.

Die mit \* bezeichneten Artikel werden bestimmt im Laufe des Jahres fertig; von den übrigen ist die Erscheinung ungewisser.

(Der Anfang dieses Berichtes befindet sich in Nr. VIII.)

## II. An Fortsetzungen und Resten erscheint:

- \*11. **Altdeutsche Blätter** von **Moritz Haupt und Heinrich Hoffmann**. Zweiten Bandes zweites Heft und folgende. Gr. 8. Auf gutem Druckpapier.

Der erste Band in 4 Heften (1835 — 36) kostet 2 Thlr. 4 Gr., das erste Heft des zweiten Bandes 16 Gr.

- \*12. **Analekten für Frauenkrankheiten**, oder Sammlung der vorzüglichsten Abhandlungen, Monographien, Preisschriften, Dissertationen und Notizen des In- und Auslandes über die Krankheiten des Weibes und über die Zustände der Schwangerschaft und des Wochenbettes. Herausgegeben von einem Vereine praktischer Ärzte. Zweiten Bandes erstes Heft und folgende. Gr. 8. Jedes Heft 16 Gr. Der erste Band in 4 Heften (1837) kostet 2 Thlr. 16 Gr.

- \*13. **Bibliothek classischer Romane und Novellen des Auslan des**. Mit biographisch-literarischen Einleitungen. Siebenundzwanzigster Band und folgende. Gr. 12. Auf gutem Druckpapier. Geh.

Dieser Fortsetzung wird zunächst Casotte's „Der vertriebene Aukel und Der Vord aus dem Gezeirer“ und Cervantes' Novellen enthalten. Bisher erschienen:

- 1—IV. Von Quixote von Cervantes, übersetzt von Goltz. Dritte Auflage. 2 Thlr. 12 Gr. — V. Kempterich von Ratsch von Goltz. Fünftes, übersetzt von Goltz. Dritte Auflage. 15 Gr. — VI—IX. Von Blas von Goltz. 2 Thlr. — X. Leben des Gesandten von Ducado, übersetzt von Keil. 12 Gr. — XI—XIV. Tom Jones von Fielding, übersetzt von Klemm. 2 Thlr. 12 Gr. — XV. Die Römische Geschichte, übersetzt von Goltz. 15 Gr. — XVI. Sappho Dicht von Rossetti, übersetzt von Klemm. 15 Gr. — XVII—XIX. Delphine von Stael, übersetzt von Goltz. 1 Thlr. 20 Gr. — XX—XXII. Desarmen von Boissac. 2 Thlr. — XXIII—XXIV. Die Leben des Pericles und der Gesandten von Cervantes, mit einer Einleitung von G. Fied. 1 Thlr. 8 Gr. — XXV—XXVI. Die Verlobten, von Manzoni, übersetzt von Dülom. Zweite, umgearbeitete Auflage. 2 Thlr. Die ersten 22 Bände dieser Sammlung sind im Preise herabgesetzt und kosten anstatt 13 Thlr. 5 Gr. nur 8 Thlr.

- \*14. **Bibliothek deutscher Dichter des siebzehnten Jahrhunderts**. Begonnen von Wilhelm Müller. Fortgesetzt von Karl Förster. Vierzigstes Bändchen. 8. Auf seinem Schreibpapier. Geh.

Das vierzehnte Bändchen wird Hoffmannswaldau, Lohenstein, Merckel, Genig, Weiss, Feller, Mühlert, Kautzsch, Wolfersdorf, Weider enthalten und die Sammlung beschließen. — Bgl. Nr. 40.

Erstes bis dreizehntes Bändchen (1822—37) kosten 18 Thlr. 4 Gr.

- \*15. **Bilder-Conversations-Lexikon für das deutsche Volk**. Ein Handbuch zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse und zur Unterhaltung. Vollständig in vier Bänden. Mit bildlichen Darstellungen und Landkarten. Zweiten Bandes achte Lieferung und folgende. Dritten Bandes dritte Lieferung und folgende. Gr. 4. Auf gutem Druckpapier. Geh. Preis jeder Lieferung 6 Gr.

Durch die Veranlassung, daß der zweite Band, die Artikel von F—L, und der dritte Band, die Artikel von M—R enthaltend, jetzt gleichzeitig gedruckt werden, steht die Vollendung des Werks nun bald zu erwarten, ohne daß die rasche Förderung der Lieferungen eine Verminderung der Sorgfalt der Redaction in Hinsicht auf die Anzahl und Bearbeitung der einzelnen Artikel zu Folge haben soll.

Der erste Band, A—B (92 Bogen mit 320 Abbildungen und 17 Landkarten), kostet in elegantem Carton gebunden 3 Thlr. 8 Gr. und wird

Allen empfohlen, denen die Anschaffung des Werks in einzelnen Lieferungen ungenügend sein sollte.

Auf dem Umfange des Bilder-Conversations-Lexikons werden Zugaben zu, gegen Berechnung von 4 Gr. Insertionsgebühren für die gesparte Seite, oder deren Raum abgedruckt, sowie gegen eine Vergütung von 1 Thlr. für das Ausfüllen desselben beigegeben.

16. **Cuvier (Baron von), Das Thierreich**, geordnet nach seiner Organisation. Als Grundlage der Naturgeschichte der Thiere, und Einleitung in die vergleichende Anatomie. Nach der zweiten, vermehrten Ausgabe überseht und durch Zusätze erweitert von F. S. Voigt. In sechs Bänden. Fünfter Band. Gr. 8. Auf gutem Druckpapier.

Der erste Band (Säugethiere und Vögel, 1831) kostet 4 Thlr., der zweite Band (Reptilien und Fische, 1832) 2 Thlr. 8 Gr., der dritte Band (Mollusken, 1834) 2 Thlr. 16 Gr., der vierte Band (Amphibien, Crustaceen, Arachniden und ungeschlechtliche Insekten, 1835) 2 Thlr. 8 Gr. Der fünfte Band wird mit der großen Klasse der Insekten: Coleopteren begeben und noch einige der folgenden thierischen Klassen enthalten.

- \*17. **Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste**, in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet, und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber. Mit Kupfern und Karten. Gr. 4. Cart.

Der erste Teil im Pränumerationspreise auf gutem Druckpapier 3 Thlr. 20 Gr., auf feinem Velinpapier 5 Thlr., auf extrafeinem Velinpapier im größten Format mit breitem Stegen (Prachteremblem) 15 Thlr.

Erste Section, A—G, herausgegeben von J. G. Gruber. Dreißigster Teil und folgende.

Zweite Section, H—N, herausgegeben von A. G. Hoffmann. Fünftester Teil und folgende.

Dritte Section, O—Z, herausgegeben von M. F. C. Meier und F. A. Mager. Sechster Teil und folgende.

Den früheren Abonnenten, denen eine Reihe von Theilen fehlte, und Denjenigen, die als Abonnenten auf das ganze Werk neu eintreten wollen, werden die billigsten Bedingungen gestellt.

- \*18. **Ergänzungen der Allgemeinen Gerichtsordnung und der allgemeinen Gebührenarten für die Gerichte, Justizcommissionen und Notarien in den preussischen Staaten, des Stempelgesetzes, Salariatenreglements, sammt der Instruction für die Überrechnungskammer, wie auch die Verordnungen der General-Commissionen, enthaltend eine vollständige Zusammenstellung aller noch geltenden, die Allgemeine Gerichtsordnung, die Allgemeinen Gebührenarten, das Stempelgesetz, das Salariatenreglement und die Instruction für die Überrechnungskammer abändernden, ergänzenden und erläuternden Gesetze, Verordnungen und Ministerialverfügungen, nebst einem chronologischen Verzeichnisse derselben und Register, herausgegeben von F. v. Strombeck. Vierten Band. Enthaltend die Nachträge zur dritten Ausgabe derselben, bearbeitet und bis auf die neueste Zeit fortgesetzt von Ferdinand Leopold Lindau. Gr. 8. 34 Bogen. Auf Druckpapier 1 Thlr. 4 Gr., auf Schreibpapier 1 Thlr. 12 Gr. Der erste bis dritte Band kosten in der dritten Auflage (1829—30) auf Druckpapier 5 Thlr. 16 Gr., auf Schreibpapier 7 Thlr. 12 Gr.; alle 4 Bände jetzt nur 4 Thlr. 16 Gr. auf Druckpapier, 7 Thlr. 12 Gr. auf Schreibpapier. Ergänzungen des Allgemeinen Landrechts der preussischen Staaten, herausgegeben von F. v. Strombeck, und fortgesetzt von F. A. Lindau (4 Bände, 1829—37), kosten zusammengekommen nur 5 Thlr. auf Druckpapier, 8 Thlr. auf Schreibpapier.**

(Die Fortsetzung folgt.)

**In Nr. 68 der „Leipziger Allgemeinen Zeitung“ findet sich eine Erklärung des Herrn Dr. Mager in Genf gegen Herrn Dr. Willing in Berlin.**



# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. X.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brochhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

## Preisaufgaben der F. Jablonowski'schen Gesellschaft

für die Jahre 1837 — 1840.

(Aus der Leipziger Zeitung, 1838, Nr. 63.)

Leipzig, im März. Die F. Jablonowski'sche Gesellschaft der Wissenschaften hat auf die von ihr für das J. 1837 aufgegebenen drei Preisfragen vier Abhandlungen erhalten: drei betrafen die mathematische, eine die ökonomische Aufgabe. Die historische hatte keinen Bearbeiter gefunden. Unter den mathematischen Abhandlungen schien ihr keine des Preises würdig zu sein; eine jedoch, mit dem Motto: Auf dem Gebiete der Mathematik u. s. w., zeichnete sich so aus, daß die Gesellschaft dem Herrn Verf. die Hälfte des festgesetzten Preises zuerkannte, wofern er es nicht vorzieht, seine Abhandlung, mit Berücksichtigung der im Programme der Gesellschaft ange deuteten Lücken und Mängel, überarbeitet und vermehrt der Gesellschaft vor dem Ende des Monats November 1838 zur Beurtheilung wieder vorzulegen. Sie ersucht ihn deshalb, ihr seinen Entschluß schriftlich anzuzeigen. — Die ökonomische Abhandlung über die Frage:

**„Welche Einwirkung auf den Flor des sächsischen Gewerbfleißes und Handels hat der Anschluß des Königreichs Sachsen an den preussisch-deutschen Zollverein gehabt?“**

wurde, obgleich sie, was der Hr. Verf. selbst bemerkt hat, noch einiger statistischen Belege entbehrt, in staatsökonomischer Hinsicht so vorzüglich gefunden, daß die Gesellschaft ihr den Preis einstimmig zuerkannte. Nach Eröffnung des verseitigen Zettels fand sich der Name des Verfassers: Herr Jakob Heinrich Thieriot, k. sächs. Kammerath in Dresden. — In dem bei dieser Gelegenheit ausgegebenen lateinischen und deutschen Programm legt die Gesellschaft für die Jahre 1838, 1839 u. 1840 folgende theils wiederholte, theils neue Preisfragen vor:

**I. Ex historia.** In annum 1838. „Examinetur et describatur politicus urbium in Polonia status, qualis exeunte seculo XV fuerit; doceatur imprimis, an et quatenus urbes nonnullae in parem iuris publici libertatisque conditionem seu usui, seu privilegiis ab ordinibus regni receptae, et publici consilii in comitis participes factae fuerint. — Quaestio extraordinaria denuo proposita atque anno 1838 assignata et duplo praemio oranda haec est: Vicissitudines comitiorum in Polonia sub regibus stirpis Jagellonicae habitum explicantur et sic quidem, ut civilium institutorum et legum ratio habeatur.“

„Es soll untersucht und beschrieben werden, welches der politische Zustand der Städte in Polen zu Ende des funfzehnten Jahrhunderts gewesen sei, wobei insbesondere die Beantwortung der Frage gewünscht wird, ob und wie weit einige Städte, es sei nun durch das Herkommen, oder durch Privilegien, von

den Reichskständen in den Genuß gleicher staatsrechtlicher Freiheit mit aufgenommen worden sind, und an den Beratungen auf den Reichstagen Theil genommen haben.“

Außerordentliche, mit doppeltem Preise zu belohnende Aufgabe für das Jahr 1838: „Es ist darzuthun, was für Veränderungen der polnischen Reichsversammlungen unter den Königen aus Jagellonischem Stamme stattgefunden haben, und zwar so, daß auf die Einrichtungen und Gesetze des Staates Rücksicht genommen werde.“

In annum 1839. Quanam instituta Germanica in ea Pomeraniae parte, que ordinis Teutonici a. 1310 subiecta est ditioni, per annos centum et quinquaginta proxime sequentes exstiterint, et quanam eorum vicissitudines inde a tempore, quo regio ista Poloniae accessit (a. 1466) usque ad a. 1773 insecutae sint, exponatur.“

„Es werde auseinandergesetzt, welche deutsche Einrichtungen in demjenigen Theile Pommerns, der im Jahre 1310 der Herrschaft des deutschen Ordens unterworfen ward, während der nächstfolgenden 150 Jahre bestanden und welche Veränderungen sie bis zum Jahre 1773 erlitten haben, nachdem jene Gesend (im J. 1466) an Polen gekommen war.“

In annum 1840. Exponatur, cuiusmodi Iesuitarum in regno Poloniae inde a regno Henrici Valesii (Adegaensis) usque ad annum MDCCLXIV fuerit ratio et quonam modo dissidium, qui vocantur, status civilis auctoribus istis sit pessumdatus.“

„Es ist darzuthun, von welcher Art das Benehmen und Treiben der Jesuiten in Polen von der Regierung Heinrichs von Valois (Anjou) bis zum Jahre 1764 gewesen, und wie Stand und Recht der sogenannten Dissidenten auf ihren Betrieb zu Grunde gerichtet worden ist.“

## II. E disciplinae physici et mathematicis.

In annum 1838. „A Cl. Dove nuper tentatum est, leges ventorum extra zonam tropicam observatorum ad eadem fundamenta reducere, quibus olim Cel. HALLEY theoriam ventorum inter tropicos anniversariorum superstruxit. Scilicet auctore Dovo in zonis borealibus, temperata et frigida, ventus, si ad conditionem mediam respexeris, secundum ordinem plagiarum S. W. N. O. S. directionem mutare solet; in zonis vero australibus ordinem inversum S. O. N. W. S. sequitur. Quam legem si cum distributione media pressus aëris et temperaturae in plagas horizontis coniunxeris, regulae variationum barometri et thermometri a directione venti penduntum inde deducuntur, quas auctor theoriae in Cl. POGGENDORFF Annal., T. XXXVI, p. 321 sqq. communicavit. Que regulae quum in boreali quidem hemisphaera, observationibus Parisiensibus, Londinensibus et Gedanensibus ad calculum reductis iam confirmatae sint, in australi vero hemisphaera (nec minus in boreali, si locos maiori longitudinis geographicae intervallo distinctos comparaveris) eadem experientiae auctoritate adhuc careant, viros doctos Societas invitat, ut has regulas denuo velint examinare ita ut variationes mediae barometri vel thermometri more legitimo ad

calculus revocatur, et quidem primum dato loco quodam zonae temperatae australis, deinde dato loco boreali in America septentrionali vel in Russia sito. Quod si in hemisphaera australi annales meteorologici desiderantur, diarium nautarum cautus conceditur usus."

Neuerbings hat Dove die Windeverhältnisse der nicht tropischen Zonen auf dieselben physikalischen Grundbestimmungen zurückzuführen gesucht, auf welche Halley die nach ihm benannte Theorie der Passate gründete. Nach ihm soll sich in der nördlichen gemäßigten und kalten Zone der Wind im Mittel im Sinne S. W. N. D. S. durch die Windeise drehen, in der südlichen im entgegengesetzten Sinne S. D. N. W. S. Als Folge dieses Drehungsgesetzes in Verbindung mit der mittleren Verteilung des Druckes der Luft und der Temperatur in der Windrose ergeben sich für die Veränderungen des Barometers und Thermometers bestimmte Regeln, welche der genannte Physiker in Poggendorff's Annalen, Bd. XXXVI, S. 321 fg., mitgeteilt hat. Da nun diese Regeln zwar für die nördliche Halbkugel durch Berechnung der Beobachtungen von Paris, London und Danzig bestätigt sind, für die südliche Halbkugel aber noch der Bestätigung durch Rechnung ermangeln, auch in der nördlichen Halbkugel eine Vergleichung von Orten von größerem Längenzunterschied wünschenswert erscheint, so labet die Gesellschaft zur Prüfung dieser Regeln ein, und zwar 1) durch Berechnung der mittleren Barometer- und Thermometerveränderungen eines Orts der nördlichen Halbkugel, wo möglich in Nordamerika oder in Rußland; 2) durch Berechnungen der mittleren Barometer- und Thermometerveränderungen eines Orts der gemäßigten Zone der südlichen Halbkugel. — In Ermangelung eines Beobachtungsjournals aus der südlichen Halbkugel wünscht die Gesellschaft eine möglichst vollständige Benützung der Schiffsjournale."

In annum 1839. „Primus detexit Ill. BASSER, (vid. Königsberger Beobachtungen, Abth. VIII, p. 1), a binis astronomicis, earundem stellarum ad flum tribut meridionalis appulsus simul observantibus, transitus momenta diversum paulo in modum notari, eamque diversitatem aliam, minorem nempe, esse in observandis repentinis phaenomenis, praeterea mutari etiam, mutatis tunc personis tunc temporibus. Iam quaeritur, an huius variationis regula quaedam erui possit, in primis an pendeat quodammodo a conditionibus physiologicis, v. c. pulsus arteriarum celeritate. Cum hac quaestione coniungi, si non debet, poterit tamen disquisitio de quantitate erroris, qui in observando per auditum ictu penduli committi solet, quae notanda binorum pendulorum datae celeritatis concussus ab aere percipiendi frequentia investigari posse videtur. Denique si ad haec accederet disquisitio de observatorum differentis, ex usu horologiorum tertias minutae partes indicantium conspicuis, pergratum esset."

„Bestel hat zuerst gefunden (Königsberger Beobachtungen, Abth. VIII, S. 1), daß zwei Beobachter den Antritt eines und desselben Sterns an den Hahen des Mittagserfrohrs nicht genau zu derselben Zeit notiren, daß diese Verschiedenheit bei plötzlich eintretenden Erscheinungen geringer ist, und daß sie sich nicht nur mit den Personen, sondern auch mit der Zeit ändert. Welcher Regel ist diese Änderung unterworfen? Hängt sie vielleicht mit physiologischen Eigenschaften der Beobachter, z. B. der Schnelligkeit des Pulses, zusammen? Nahe verwandt mit dieser Frage ist die nach der Größe des Fehlers, dem man bei Beobachtung des Uhrpendelschlages durch das Gehör ausgesetzt ist, eine Frage, die durch Abzählung der Gehörscoincidenzen zweier Pendel von bekanntem Gange beantwortet werden zu können scheint. Endlich wäre es sehr wünschenswert, wenn hieran eine Untersuchung über die Persönalitäten, die mit dem Gebrauche der Zeituhr verbunden sind, geknüpft würde."

In annum 1840. „Geometria nostris temporibus, praeclearissimis Germaniae inprimis et Francogalliae geometrarum inventis mirum in modum aucta, quaeritur, quanam ex his in elementorum compagem recipi vel possint vel debeant, eaque an, salva systematis norma, liceat reliquis immutatis

tamquam nova incrementa adici, an novarum methodorum ratione habita, totum geometriae Euclidea corpus funditus reformari oporteat et instaurari; quod, quomodo fieri debeat, doceatur."

„Die großen Bereicherungen, die in unserer Zeit die Geometrie vorzüglich durch die Bemühungen deutscher und französischer Mathematiker erhalten hat, veranlassen zu der Frage, wieviel hiervon in die Elemente aufgenommen werden kann oder muß, und ob dieses sich ohne Verletzung der systematischen Form der bisherigen Elementarlehren als bloßer Zuwachs beifügen läßt, oder ob die Berücksichtigung der neuen Methoden eine gänzliche Umgestaltung des Gebäudes der Euklidischen Geometrie notwendig macht, und worin dann diese Umgestaltung bestehen soll?"

III. *Ex oeconomica disciplina ad Saxoniam referendis.* In annum 1838. „Quum nostris temporibus pretium stanni et plumbi haud sine magno rei metallica patriae impedimento ac detrimento retro abierit, Societati hanc quaestionem proponere visum est: Deceatur, quibus novis satisque probatis stanno et plumbo utendi modis consumitio istorum metallorum ita sit augenda, ut ex ratione usus frequentioris utrumque eo pretio vendi possit, quo fodinarum et officinarum opus fructuosius reddatur."

„Da in neuerer Zeit die Preise des Zinnes und des Bleies so gedrückt sind, daß dadurch dem vaterländischen Bergbau und Hüttenwesen erheblicher Nachtheil und Hinderung erwachsen ist, so stellt die Gesellschaft folgende Frage auf: Durch welche neue und hinlänglich erwiesene Arten der Anwendung des Zinnes und des Bleies läßt sich der Verbrauch dieser Metalle so steigern, daß dadurch eine erhöhte Nachfrage darnach erfolgen und deshalb der Preis derselben soviel höher sein müsse, als nöthig ist, um Gruben- und Hüttenbetrieb lohnender als seither zu machen?"

In annum 1839. „Considerantibus, quam prosperè nullis in terris et antiquitus et nostris temporibus successerit aquis arte recte ducendis solum irrigandi modus, apparuit nobis, artificiosam istam solum irrigandi rationem in tractu Saxoniae montano superiore et in Variscia nostra segnius adhiberi, quam locorum opportunitates eiusmodi conatus invare et pratorum, relique pabularis et pecuariae commoda id poscere videantur, quapropter Societas haud a re alienum putat examinari, quam vim ad rem rusticam in tractu Saxoniae montano superiore et in Variscia feliciter augendam habiturus sit modus irrigandi solum et recte constitutus et prudenter dispositus; itaque doceatur, quibusnam institutis atque adiumentis tam publicis quam privatis, res ista utilissima facillime et expeditissime promoveri queat."

„In Erwägung, welche glückliche Erfolge in verschiedenen Ländern ehemals das Landesbewässerungssystem gehabt hat und jetzt noch hat, bot sich unserer Gesellschaft die Bemerkung dar, daß jene künstliche Bewässerungsart in dem sächsischen Obererzgebirge und in dem sächsischen Voigtlande nicht so eifrig angewendet werde, als die günstige Abtheilung des Landes solche Unternehmungen zu erleichtern, und die Viehwirtschaft zum Vortheile des Futterbaues und der Viehwirtschaft es zu erfordern scheinen. Die Gesellschaft hält es daher nicht für unangemessen, eine Untersuchung der Frage zu veranlassen: welchen Einfluß eine planmäßig angelegte und zweckmäßig eingerichtete Bewässerungsanstalt auf die Landwirthschaft im sächsischen Obererzgebirge und Voigtlande haben würde; — verbunden mit der Angabe der erforderlichen Einrichtungen, gesellschaftlichen Bestimmungen und Beförderungsmittel, durch welche jener wichtige Zweck am leichtesten erreicht werden kann."

In annum 1840. „Quum Saxoniae accessio ad Societatem portorii Borussiae Germanicae secundum art. XLI pacti Berolinensis de d. XXX. m. Martii MDCCCXXXIII, in praesentia usque ad d. I. m. Januarii MDCCCXLIII vim habitura, biennio ante hunc diem renuocanda sin secus, per duodecim annos subsequentes continuanda sit, visum est Societati nostrae, quaestionem a. MDCCCXXXIV proposi-

tam, annoque MDCCCXXXVII solum, perspectis iis quae usque atque experientia posteriore triennio edocuerint, rei peritis iudicio proponere enucleandam: Doceatur igitur, quam vim Saxoniae nostrae ad Societatem portorii Borussiae - Germanicam accessio, usu iam per sexennium et quod excurrit, experta, ad industriae et mercaturae patriae opes alendas augendasque habuerit?"

„Da die Dauer des preussisch-deutschen Zollvereinigungsvertrages mit dem Königreiche Sachsen, durch Art. 41 des berliner Vertrages vom 30. März 1833, vorläufig bis zum 1. Jan. 1842 festgesetzt worden ist, und derselbe, wenn er während dieser Zeit und spätestens zwei Jahre vor Ablauf der Frist nicht gekündigt wird, auf zwölf Jahre als verlängert angesehen werden soll, so fand sich die Gesellschaft bewogen, die von ihr bereits im Jahre 1834 aufgestellte und im Jahre 1837 beantwortete Preisfrage, mit Bezugnahme auf die Erfahrungen, welche die Fortdauer des Zollvereinvertrages in den letzten drei Jahren darbieten wird, sachkundigen Männern noch einmal zur Beantwortung vorzulegen. Sie stellt daher die Frage auf: Welche Einwirkung auf den Flor des sächsischen Gewerbfleisses und Handels hat der Anschluß des Königreichs Sachsen an den preussisch-deutschen Zollverein, nach einer mehr als sechsjährigen Erfahrung gehabt?"

Die Preisschriften der ersten beiden Classen sind ohne Ausnahme in lateinischer Sprache zu verfassen, zu denen der dritten Classe kann auch die französische oder deutsche Sprache gebraucht werden. Insgesamt muß die einzusendenden Abhandlungen deutlich geschrieben und paginirt, ferner mit einem Motto und einem versiegelten Zettel versehen sein, der auswendig dasselbe Motto, inwendig den Namen und Wohnort des Verfassers angibt. Die Zeit der Einsendung endet für das Jahr der Preisfrage mit dem Monat November; die Adresse ist an den jedesmaligen Secrétaire der Gesellschaft, für das Jahr 1838 an den ordentl. Professor der historischen Hülfswissenschaften an der Universität zu Leipzig, Friedrich Christian August Sasse, zu richten. Der bestimmte Preis ist eine Goldmünze, 24 Dukaten an Werth.

## Schwab's Gedichte in neuer Ausgabe.

In der Unterzeichneten sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Gedichte

von  
**Gustav Schwab.**  
Neue Ausgabe.

Mit des Verfassers Bild in Stahl.

8. Velinpapier. Preis 2 Thlr. 12 Gr., oder 3 Fl. 36 Kr.

Der Verfasser bietet hier seine Gedichte, nach dem Rathe der öffentlichen Kritik und bewährter Freunde gesichtet, aber zugleich um Vieles vermehrt, in einer neuen Auswahl dem Publicum dar. Die Romanzen aus dem Tugendleben Herzogs Christoph sind, als noch selbständig, im Buchhandel zu erhalten und einige Nachbildungen, als dem Dichter minder eigen thümlich ansehlich, weggelassen worden, um die Ausgabe in einen einzigen Band zusammenzubringen zu können.

Stuttgart und Tübingen, im Februar 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Sieben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes von uns zu beziehen:

## Histoire de la peinture sur verre d'après ses documens en France, par le comte Ferdinand de Lasteyrie. In-folio. Paris.

Die ganz neuen Originalzeichnungen, mit denen dieses bedeutende Werk ausgestattet ist, sind mit aller der Pracht ausgeführt, welche ein Unternehmen dieser Art erlaubt, und nichts ist veräußert, um durch eine die größte Treue bezeugende Genauigkeit, wie durch Reichthum der Farbengebung sie ihrem Zwecke entsprechend zu machen. Das Werk des Herrn Grafen von Lasteyrie genährt eine interessante, gedrungene Übersicht aller Denkmäler dieser einst so blühenden Kunst, welche sich bis jetzt erhalten haben, und der Verfasser hat keine Mühe gescheut, um seinem Werke die genügendste Vollständigkeit zu verleihen.

Das Ganze wird 25—30 Lieferungen, jede von 2 Bögen Text in Folio und 4 colorirte Kupfer, umfassen.

Die erste ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu erhalten, die zweite wird binnen einigen Wochen ausgegeben. Preis jeder Lieferung 36 Francs.

Leipzig, im März 1838.

## Brochhaus & Wernarius,

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

Bei dem

## Bevorstehenden Unterrichtswesfel Zehrbuch der Erdbeschreibung in natürlicher Verbindung mit

Weltgeschichte, Naturgeschichte und Technologie

von

## N. Zacharia.

Gr. 8. Altona, Hammerich. 18 Gr.

aufmerksam zu machen. In den Schulen, wo es eingeführt ist, hat es bereits die glänzendsten Resultate geliefert und alle Lehrer, welche dies gediegene Werk kennen, stimmen darin überein, daß es für Bürger- und Volksschulen, wo die auf dem Titel angegebenen Wissenschaften nicht einzeln gelehrt werden, unentbehrlich sei und die allgemeinste Verbreitung verdiene.

Sämmtliche Buchhandlungen Deutschlands, Oesterreichs, der Schweiz etc. haben Exemplare vorräthig.

Bei E. G. Pender in Köslin ist sieben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## Russen und Mongolen.

Von

## Wilhelm Müller.

Erster Band. 12. Geh. 1 Thlr. 15 Sgr.

Die Redaction des Journals „Est und West“ sagt in Nr. 8 vom 27. Jan. d. J. bei Gelegenheit eines Auszugs aus diesem Werke: „Aus einem größern Werke des wahrhaft genialen Verfassers, den ich zu den ausgezeichnetsten Erzählern unserer Zeit rechne.“

Sieben ist im Verlage der Unterzeichneten erschienen:

über Hermes, Hermesianer, Hermesianismus vom Pastor L. Klöveborn. Gr. 8. Geh. 6 Gr.

Über die durch subjective Zustände der Sinne begründeten Täuschungen des Bewußtseins von Dr. Al. Bötter. Aus dem Französ. übersetzt und mit einem Vorberichte versehen von Dr. A. Droffe. Gr. 8. Geh. 12 Gr.

Donabrück, im Februar 1838.

Nachorff'sche Buchhandlung.



# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XI.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

## Vericht über die Verlagsunternehmungen für 1838 von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Die mit \* bezeichneten Artikel werden bestimmt im Laufe des Jahres fertig; von den übrigen ist die Erscheinung ungewisser.

(Der Anfang und die Fortsetzungen dieses Verichts befinden sich in Nr. VIII, IX und X.)

### III. An neuen Auflagen und Neuigkeiten erscheint:

\*34. Adolphe, Ideal und Wirklichkeit. 8. Auf seinem Druckpapier.

Von der Verfasserin erschien bereits in meinem Verlage: „Reiseblätter. Drei Novellen.“ (1835, 1 Zehr.)

\*35. Anleitung zum Selbststudium der Geologie. Nach dem Book of science von R. Hartmann. Mit 16 Abbildungen. 16. Geh. 21 Gr.

\*36. — zum Selbststudium der Versteinerungsfunde. Nach dem Book of science von R. Hartmann. Mit Abbildungen. 16. Geh.

\*37. — zum Selbststudium der Chemie. Nach dem Book of science von R. Hartmann. Mit Abbildungen. 16. Geh.

\*38. — zum Selbststudium der Berg- und Hüttenkunde. Nach dem Book of science von R. Hartmann. Mit Abbildungen. 16. Geh.

\*39. — zum Selbststudium der Meteorologie. Nach dem Book of science von R. Hartmann. Mit Abbildungen. 16. Geh. Nr. 35—39 bilden einzelne Abtheilungen des unter Nr. 20 angegebenen Werks.

\*40. Auserlesene Gedichte von Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau, Daniel Casper von Lohenstein, Christian Bernike, Friedrich Rudolf Ludwig Freiherr von Canig, Christian Weise, Johann von Besser, Heinrich Mühlensporth, Benjamin Neutrich, Johann Michael Moscherosch, Nicolaus Peucker. Herausgegeben von Karl Förster. 8. Auf seinem Schreibpapier. Geh.

Wird das vierzehnte und letzte Bändchen der unter Nr. 19 erwähnten Sammlung.

\*41. Barthels (Friedrich), Anleitung zur Behandlung und Vererbung der Merkmalspollen. Nach eigenen praktischen Erfahrungen und Versuchen bearbeitet. In zwei Theilen. Theil I: Behandlung der Schafrasse durch schneeweisse Abäder vor der Schur. Mit Abbildungen. Gr. 8. Auf seinem Druckpapier. Geh.

Die Zusammenkunft des Monarchen Publikums ist schon auf die vortheilhafte Methode des Verfassers gerichtet und es wird die Nachricht nur erwünscht sein, daß der erste Theil im Druck bereits vollendet ist und demnach ausgeben werden soll. Der zweite Theil wird eine „untrügliche Anleitung zur Vererbung der Schafrassen“ enthalten und ebenfalls mit erläuternden Abbildungen und Tabellen begleitet sein.

\*42. Bericht vom Jahre 1838 an die Mitglieder der Deutschen Gesellschaft zu Erforschung vaterländischer Sprache und Alterthümer in Leipzig. Herausgegeben von Amilius Ludwig Richter und Karl August Espr. Gr. 8. Auf gutem Druckpapier. Geh.

Die Berichte vom Jahre 1835, 36 u. 37 kosten jeder 10 Gr.

\*43. (Böttiger.) Literarische Zustände und Zeitgenossen. In Schilderungen aus Karl Aug. Böttiger's handschriftlichem Nachlasse herausgegeben von R. W. Böttiger. Erstes und zweites Bändchen. Gr. 8. Auf seinem Druckpapier. Geh.

Das erste Bändchen ist bereits erschienen und kostet 1 Zehr. 12 Gr.

Eine biographische Skizze K. A. Böttiger's, ebenfalls von seinem Gelehrten, erschien im vorigen Jahre in meinem Verlage und kostet 16 Gr.

\*44. Busch (D. W. H.), Handbuch über die Krankheiten des Weibes. Vier Bände. Gr. 8. Auf seinem Druckpapier.

Der berühmte Verfasser bezieht das Werk als ein Ergebniss seiner dreißigjährigen praktischen Erfahrungen und wissenschaftlichen Studien. Der erste Band, welcher die allgemeinen symptomatischen, pathologischen, diätetischen, medicinischen und therapeutischen Lehren enthält, wird bald erscheinen.

\*45. Cazotte (Jacques), Der verliebte Teufel und Der Förd aus dem Steigriß. Zwei Novellen. Uebersetzt von Ch. von Bülow. Mit einer Einleitung. Gr. 12. Auf gutem Druckpapier. Geh. 16 Gr.

Wird der siebenundzwanzigste Band der unter Nr. 13 angeführten Sammlung.

46. Cervantes Saavedra (Miguel de), Novellen. Mit einer Einleitung. Gr. 12. Auf gutem Druckpapier. Geh.

\*47. Cobbett's (William) englische Sprachlehre. Zweite Auflage, mit steter Hinweisung auf die deutsche Sprache, und mit Erläuterung der Vorbegriffe aus der allgemeinen Sprachlehre für Deutsche bearbeitet, für Schulen, sowie auch zum Privat- und Selbstunterricht eingerichtet, mit mancherlei Übungsaufgaben und einem besondern Anhange für Kaufleute begleitet von Jakob Heinrich Raltschmidt. Gr. 12. Auf gutem Druckpapier.

Diese Sammlung im Auslande längst als vorzüglich praktisch anerkannte Grammatik wird in der neuen Bearbeitung, die durch seine Sprachwerke bekannten Verfasser ihre Brauchbarkeit in Deutschland immer mehr bewähren.

\*48. Conversations-Lexikon, oder Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände. Achte Originalausgabe. Zwölf Bände. Gr. 8.

Jeder Band in einem neuen Abonnement, das zu jeder Zeit bezogen werden kann, auf Druckpapier 1 Zehr. 8 Gr., auf Schreibpapier 2 Zehr., auf Feinschreibpapier 3 Zehr.

\*49. Conversations-Lexikon, oder Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände. Achte Originalausgabe. Achte Ausgabe. Gr. 8. Auf Druck-, Schreib- und Feinschreibpapier.

Dieser Registerband soll ein wahrer Index zu dem vierbändigen Werke werden und den Lesern das Auffinden aller der verschiedenartigen Mittheilungen derselben erleichtern, dadurch also noch wesentlich dessen Brauchbarkeit erhöhen.

\*50. Conversations-Lexikon der Gegenwart. In Heften. Gr. 8. Auf Druck- und Feinschreibpapier.

Seit der Wiedergabe der achten Auflage des Conversations-Lexikons war ich mit der Bearbeitung dieses Werks beschäftigt, welches sich die Aufgabe

gesteht hat, nach Art des Conversations-Lexikons der neuesten Zeit und Literatur (4 Bände, 1832—34, Druckpapier 8 Zhlr., Schreibpapier 10 Zhlr. 12 Gr., Bindung 20 Zhlr.), das Hauptwerk mit der sehr vortheilhaften Zeit im Einklang zu erhalten, indem es ein lebendiges Bild alles dessen geben wird, was sich in den letzten Jahren irgend Bemerkenswerthes in der Politik, im Leben, in Literatur und Kunst ereignet oder die Aufmerksamkeit jedes Gebildeten im höhern Grade in Anspruch genommen hat. Es wird ferner für die Besitzer irgend einer Zulage des Conversations-Lexikons, sowie der zahlreichen Nachbildungen und Auszüge desselben als unentbehrliches Supplement und für das Conversations-Lexikon der neuesten Zeit und Literatur als neue Folge zu betrachten sein, als auch für sich ein abgeschlossenes Werk bilden.

Das Conversations-Lexikon der Gegenwart wird in Heften von 10 Bogen, denen jedes in Wien März 1838, ausgehen werden. Der Preis für jedes Heft ist auf Druckpapier 5 Gr., auf Schreibpapier 12 Gr., auf Bindung 18 Gr.

- \*51. Der Cavalier auf Reisen. Vom Verfasser der „Ansichten aus der Cavalierperspective im Jahre 1835“. Gr. 12. Auf seinem Bindungspapier. Geh. 1 Zhlr. 20 Gr.
- \*52. Das erwähnte Werk erschien 1836 bei Frobergner in Leipzig und kostet 2 Zhlr.
- \*53. Duller (Eduard), Kaiser und Papst. Roman. Vier Theile. 8. Auf seinem Druckpapier. Geh.
- \*54. Die Römische Curie im Kampf um ihren Einfluss in Deutschland, veranlaßt durch die Opposition des Erzbischofs von Köln gegen Preußen unter Mitwirkung von Röm und das Verdammungsbeurtheil des Römischen Erzbischofs. Vom Verfasser der Schrift: „Der Erzbischof von Köln, seine Principien und Opposition.“ 8. Auf gutem Druckpapier. Geh. 8 Gr.

Die hier verkürzten erschienenen Schriften des Verfassers sind unter Nr. 60 und 63 angeführt.

(Die Fortsetzung folgt.)

Durch alle gute Buchhandlungen ist zu erhalten:

## Deutschlands Flora

mit  
höchst naturgetreuen, charakteristischen Abbildungen aller ihrer Pflanzenarten in natürlicher Größe und mit Analysen auf Kupfertafeln,  
als Beleg

für die  
**FLORA GERMANICA EXCURSORIA**

und  
zur Aufnahme und Verbreitung  
der  
**neuesten Entdeckungen**  
innerhalb

Deutschlands und der angrenzenden Länder: Belgien und Holland, Holstein und Schleswig, Ostpreußen, Galizien, Siebenbürgen, Ungarn, Dalmatien, Istrien, Oberitalien, der Schweiz und Piemont.

Herausgegeben

von  
**Dr. G. G. Ludwig Reichenbach,**  
Königl. Kgl. Hofrath, Professor an der chirurgisch-medicinischen Akademie und Director des botanischen Gartens in Dreßden etc.

Das jetzt so vielfach durch Schriften angeregte, allgemeine Interesse und verbreitete Studium der Flora Deutschlands bedarf zu seiner Förderung nichts mehr, als einer systematischen Kupfersammlung, welche alle Gattungen und Arten treu abbildet vor Augen legt. Die höchste Compendiosität dieses Werkes, dessen erste Lieferung schon 70 Arten enthält, macht es möglich, dasselbe mit seinem deutschen Texte wohlfeiler zu liefern, als irgend ein dem Inhalte nach vergleichbares jemals existirt hat. Bei der großen Anzahl der schon vorliegenden Kupferplatten und bei der unausgesetzten Thätigkeit des Herrn Verfassers sind wir im Stande, um das Werk bald vollenden zu können, die Lieferungen aller 14 Tage folgen zu lassen. Jede enthält 10 volle Kupfertafeln mit dazu gehöriger deutscher Beschreibung, Culturangaben, arzneilichem

Gebrauch u. s. w. und wir machen zur leichtern Anschaffung jetzt, bei dem Beginnen des Werkes, auf dessen Erscheinung aufmerksam. Der Name des Verfassers und die eigne Ansicht der Kenner übersteigt uns aller Empfehlung dieses größten Hülfsmittels zum Selbststudium der vaterländischen Botanik.

Subscriptionspreis à Lieferung: } fein colorirt 1 Zhlr. 12 Gr.  
} schwarz — 20 Gr.  
Leipzig, den 1sten Januar 1838.

**Friedrich Hofmeister.**

In der **Festschen Verlagsbuchhandlung** in **Leipzig** ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu haben:

## Die Kinderkrankheiten

nach den  
neuesten Ansichten und Erfahrungen  
zum

**Unterricht für praktische Aerzte**

bearbeitet von  
**Friedrich Ludwig Meissner,**

Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe, akademischem Privatdocenten, der medicinischen, der naturforschenden Gesellschaft und der ökonomischen Societät zu Leipzig ordentlichem, der kaiserl. russ. Akademie zu Moskau, sowie der Academie royale zu Paris correspondirendem und des Apothekervereins im nördlichen Deutschland Ehrenmitglied.

Zweite ganz umgearbeitete und sehr vermehrte Auflage.  
2 Theile. Gr. 8. Preis 5 Thlr.

Dieses nach dem neuesten Standpunkte der Wissenschaft ganz umgearbeitete und im Vergleich zu der ersten Auflage **fast um das Doppelte vergrößerte** Werk enthält ausser den reichen Erfahrungen des Herrn Verfassers, eines anerkannten und viel beschäftigten Kinderarztes, noch die Angabe des Verfahrens aller grossen Kinderärzte und deren Erfahrungen, sodass jeder Arzt darin Alles mit grösster Sorgsamkeit zusammengestellt findet, was für diesen Zweig der Heilkunde auf der ganzen civilisirten Welt geschehen ist. Es zeichnet sich daher dieses Handbuch durch seine Vollständigkeit vor allen andern vortheilhaft aus, indem es dem Arzte, den das eingeschlagene Heilverfahren in irgend einem Falle im Stiche lässt, immer neue geprüfte Heilmethoden an die Hand gibt, mit denen nur derjenige vertraut sein kann, der, wie der geschätzte Herr Verfasser, eine lange Reihe von Jahren sich vorzugsweise dem Studium dieses Zweiges der Heilkunde gewidmet hat.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:  
Blätter für literarische Unterhaltung. (Verantwortlicher Herausgeber: Heinrich Brockhaus.) Jahrgang 1838. Monat März, oder Nr. 60—90, 1 Beilage: Nr. 2, und 4 literarische Anzeiger: Nr. VI—IX. Gr. 4. Preis des Jahrgangs von 365 Nummern (außer den Beilagen) auf seinem Druck-Bindungs-papier 12 Thlr.

Repertorium der gesammten deutschen Literatur, Herausgegeben von E. G. Geradorf. 1838. Funfzehnten Bandes fünftes Heft. (Nr. V.) Gr. 8. Preis eines Bandes 3 Thlr.

Leipzig, im März 1838.

**H. A. Brockhaus.**

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden:

Über

# Gleichgewicht und Bewegung gespannter elastischer fester Körper. Mit einem Anhang

über die

Berechnung des Widerstandes und die vortheilhafteste Gestalt der Eisenbahnschienen.

Von

**J. P. G. von HEIM.**

königlich württembergischem Artilleriehauptmann.

MIT DREI STEINTAFELN.

Gr. 8. Preis 3 Thlr. 8 Gr., oder 5 Fl. 24 Kr.

Diese Abhandlung verdankt ihr Entstehen den Aufträgen einzelner, den Widerstand der festen Körper betreffender Aufgaben, welche der Verfasser zu unternehmen Veranlassung fand und welche erst, als sie einen grösseren Umfang erreichten, in ein zusammenhängendes Ganzes geordnet wurden.

Ohne sich mit speculativen Untersuchungen über die Ableitung der Gesetze der Spannkraft von allgemeinen Naturkräften zu beschäftigen, hat der Verfasser bei seiner Arbeit, nebst den Anwendungen der Lehre von dem Gleichgewichte und der Bewegung elastischer fester Körper auf die wichtigsten Theile der Maschinenkunde, vorzugsweise die wissenschaftliche Entwicklung dieser Lehre im Auge gehabt und er glaubt nicht, dass eine solche Richtung des Unternehmens diesem zum Vorwurfe gereichen werde, da eben die für die Sicherheit der Anwendungen unerlässliche wissenschaftliche Begründung der genannten Lehre bis jetzt noch so Manches zu wünschen übrig lässt und durch die mit jedem Tage mehr hervortretende praktische Bedeutsamkeit derselben um so höheres Interesse gewinnt.

Stuttgart und Tübingen, im März 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**

## Transport! — Eisenbahnen!

Bei dem allgemeinen Interesse, welches die Frage über Eisenbahnen in der ganzen Welt, namentlich aber jetzt in Deutschland gefunden hat, ist es gewiss von der grössten Wichtigkeit, dass ein Mann, dem die vielfachen Erfahrungen und die gründlichsten Kenntnisse über diesen Gegenstand nicht abgesprochen werden können, seine Resultate mittheilt. Dies ist in der eben bei Hammerich in Altona erschienenen Schrift des Herrn **F. Riß** (nordamerikanischen Consul zu Leipzig) geschehen, welche

Das

## Deutsche National-Transport-System in volks- und staatswirtschaftlicher Beziehung

von

**F. Riß,**

Consul der Vereinigten Staaten von Nordamerika zu Leipzig.

Gr. 8. Altona, Hammerich, Geh.

bestellt und in sämtlichen Buchhandlungen Deutschlands, Ostreichs, der Schweiz u. für 1 Thlr. zu haben ist.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

# Das Pfennig-Magazin für Kinder.

1838. Februar. Nr. 5—8.

Nr. 5. \* Jesu feierlicher Einzug zu Jerusalem. Brüderliche Großmuth. \* Der Springhase. Die eigensinnige Kleine. Das Schneeglöckchen, von G. Schauerlein. \* Der bunte Kal oder die Meerfische. Auflösung des Räthfels im vorigen Monat. — Nr. 6. \* Die Auerente. David und die Esen, ein irisches Märchen. \* Das Reisen in den Corbilleren in Südamerika. Das Fest der Wasserweisse zu Petersburg. \* Die Tazegierbiene. Räthfel. — Nr. 7. \* Janus. Ein Pferd holt Beistand für seinen verunglückten Reiter. Der Reichstag zu Augsburg im Jahre 1530. \* Die griechische Schildkröte. Beschidenheit ist eine große Zierde. \* Der Hans. — Nr. 8. \* Der Hirtenhund. Ein Eichhörnchen als Rüstkocher. \* Die Neger. Die Gespensier. \* Der Ziegenbock und der Gastein. Räthfel.

Die mit \* bezeichneten Aufsätze enthalten eine oder mehrere Abbildungen.

Preis dieses Jahrgangs von 52 Nummern 1 Thlr. — Der erste bis vierte Jahrgang kosten ebenfalls jeder 1 Thlr.

Leipzig, im März 1838.

**F. A. Brockhaus.**

## Ein nothwendiges Handbuch für alle Stände, für beide Geschlechter und jedes Alter.

Der Herr Kirchenrath Petri hat durch sein „Gedrängtes Handbuch der Fremdwörter in deutscher Schrift- und Umgangssprache“ einem allgemein gefühlten Bedürfnisse so abgeholfen, dass binnen 25 Jahren sieben Auflagen davon erscheinen konnten. Dieses Werk ist nun von dem Verfasser selbst und in Verbindung mit andern anerkannten Sprachforschern: Endau, Müller, Fromm u. c. immerwährend so ergänzt und verbessert worden, dass es, trotz aller Nachtragungen und Pfländerungen, nach dem Urtheil aller Sachkundigen, durchaus den ersten Platz in den vorgedachten Grenzen einnimmt und aus obigen Gründen auch ferner einnehmen wird.

Jetzt sind nun von der achten, rechtmässigen, vielfältig, besonders auch für Ärzte und Arzneiberichter bereicherten und sorgsam verbesserten Auflage, unter dem Titel:

## Gedrängtes Handbuch der Fremdwörter

in  
deutscher Schrift- und Umgangssprache,  
zum  
Verstehen und Vermeiden jener, mehr oder weniger,  
entbehrlichen Einmischungen;  
herausgegeben

von

**Dr. Friedrich Erdmann Petri,**

bereits 4 Hefte, jedes zu 8 Gr., erschienen.

Die Durchsicht dieser in allen Buchhandlungen vorliegenden Hefte wird Jedem zu der Uebersetzung führen, dass er bei dem gewöhnlichen Gebrauch der Fremdwörter in Gesellschaften, bei juristischen und medicinischen Ausdrücken und Redarten, in der Musik, in den bildenden Künsten, in kaufmännischen und gewerblichen Geschäften, sowie bei dem Zeitunglesen die beste Auskunft darin findet. Auch in Ansehung der richtigen Aussprache und Silbenbetonung der Fremdwörter, besonders englischen, italienischen und spanischen Ursprungs, wird es ihm



volle Genüge leisten, da bei dieser neuen Auflage darauf noch ganz besondere Rücksicht genommen worden ist.

Das ganze Werk besteht aus 8 Theilen, welche zusammen nicht mehr als 2 Thlr. 16 Gr. bis zur Dienermesse 1833, wo das letzte Heft ausgegeben wird, kosten.

Alle namhafte Buchhandlungen nehmen Unterzeichnung darauf an und können bei 20 Exemplaren 3 Exemplare frei geben. Der künftige Ladenpreis wird nicht weniger als 4 Thlr. betragen.

Dresden und Leipzig.

Arnold'sche Buchhandlung.

## Neuestes Handbuch der Botanik.

Bei **K. F. Köhler** in Leipzig ist soeben erschienen:

Anleitung zum Studium der

## Botanik

oder

Grundriss dieser Wissenschaft,

enthaltend: die Organographie, Physiologie, Methodologie, die Pflanzengeographie, eine Übersicht der fossilen Gewächse, der pharmaceutischen Botanik und der Geschichte der Botanik.

Von

**ALPH. DE CANTOUE,**

Professor an der Akademie zu Genf.

Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von

**Dr. Alodr. von Bunge.**

2 Theile. Mit 8 Tafeln Abbildungen. 3 Thlr. 18 Gr.

Dieses Werk empfiehlt sich durch Vollständigkeit und Kürze, sowie durch Benutzung der neuesten Arbeiten in allen Theilen der Wissenschaft, es bildet im Wesentlichen einen durch die neuesten Entdeckungen bereicherten Auszug aus den umfassenden allgemein als trefflich anerkannten Werken des berühmten Vaters des Verfassers, unter dessen Leitung das Werk abgefasst wurde. Der Verfasser hielt es für zweckmässig, das Werk in fünf Abschnitte oder Bücher einzutheilen.

Das erste Buch bildet die Organographie als Grundlage der Wissenschaft, das zweite Buch handelt von der Physiologie oder dem Studium des Pflanzenlebens etc., das dritte, die Methodologie, umfasst die Prüfung der auf das Pflanzenstudium bezüglichen Methoden, insbesondere Beschreibung, Nomenclatur und Classification der Pflanzen. Die Pflanzengeographie bildet das vierte Buch, dem im fünften eine kurze Übersicht der fossilen Gewächse folgt. Beigefügt ist ein Abriss der Geschichte der Botanik, sowie mehreres der pharmaceutischen Botanik Angehörige.

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden:

**Die Maße und Gewichte**  
der deutschen Zollvereins-Staaten  
und vieler anderer Länder und Handelsplätze in  
ihren gegenseitigen Verhältnissen.

Nach den neuesten amtlichen und andern zuverlässigen  
Angaben berechnet

von  
**C. L. W. Ulfesfeld,**

königl. preussischem Regierungs-Secretair.

8. In Umschlag broschirt. Preis 1 Thlr. 16 Gr.,  
oder 2 Fl. 42 Kr.

Inhalt: Anhalt-Köthen und Anhalt-Desau, Baden,  
Bairen, Belgien, Birkensfeld, Böhmen, Braunschweig, Bres-

men, Croatien, Dänemark, Dalmatien, England, Frankfurt a. M., Frankreich, Galizien und Eodomitrien, Hamburg, Hannover, Kurfürstenthum Hessen, Hessen-Darmstadt, Hessen-Homburg, Holland, Holstein, Illyrien, Kirchenstaat, Krakau, Lippe-Deimold und Lippe-Schaumburg, Lombardisch-Venetianisches Königreich, Lucca, Laked, Luxemburg, Medlenburg-Schwerin, Medlenburg-Strelitz, Modena, Nassau, Ostreich, Oldenburg, Parma mit Placenza und Gnaftalla, Polen, Portugal, Preussen, Fürstenthümer Reuss, Russland, Königreich Sachsen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Roburg-Gotha, Sachsen-Meiningen-Hildburghausen, Sachsen-Weimar-Eisenach, Serbinien, Schweden, Schweiz, Sicilien, Siebenbürgen, Slavonien, Toscana, Ungarn, Waldeck, Walachei, Württemberg. Anhang: Übersicht der Münz-, Gold- und Silbergewichte.

Das vorliegende Werk soll ein Handbuch für Geschäftsmänner, keine Quellschrift sein, welches für jeden Platz die daselbst am häufigsten vorkommenden Vergleichen, nach dem neuesten und besten Bestimmungen berechnet, liefert. Um den argen Verwirrungen in den Gewichtangaben des Kalkenbrecher'schen Taschenbuchs entgegenzuarbeiten, hielt der Verfasser eine sorgfältig bearbeitete tabellarische Zusammenstellung der Gewichtangaben in beiden Grammenarten für nöthig. Die Wahl der verglichenen Maße und Gewichte ist weber, wie bei Jädel, allgemein gleichartig, noch ist sie dem Zufall überlassen worden; der Verfasser verdankt sie der Mittheilung erfahrener Kaufleute. Die Anordnung und Reihenfolge der Artikel anlangend, hat der Verfasser, abweichend von ähnlichen Schriften, vorgezogen, die Staaten unter sich alphabetisch zu ordnen; diese bilden demnach Hauptabtheilungen, welche zuerst die geselligen oder allgemein üblichen, und demnächst die Local- und ältern Maße und Gewichte enthalten. In dem Anhang sind Bekuhs besserer Übersicht des Unterschiedes die verschiedenen, unter dem Namen der königlichen Mark bestehenden Gewichte, verglichen mit französischen genauen Grammen, holländischen Troy-Aß und der preussigen Mark, zusammenge stellt.

Strutigart und Tübingen, im Februar 1833.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

## Zeitschrift für 1838.

**LA FRANCE INDUSTRIELLE,**  
manufacturière, agricole et commerciale.

Archives universelles  
de l'industrie, de l'agriculture, du commerce, des  
finances, des travaux publics, des beaux-arts,  
des manufactures, des progrès, perfectionne-  
ments, inventions et découvertes dans les sciences,  
procédés industriels, tant en France qu'en

payes étrangers;  
publiée par une société d'ingénieurs, de  
manufacturiers, d'agriculteurs, de savans  
et d'industriels,  
sous la direction

**DE M. CHARLES-MALO,**  
son fondateur.

Quatrième année. 52 numéros. Gr. in-4. Paris, 1838.  
5 Thlr. 8 Gr.

Probehefte und Prospekte für den Jahrgang 1838 von dies-  
ser schon seit vier Jahren erscheinenden und mit vielem Beifall  
aufgenommenen gewerblichen Zeitschrift sind von uns oder nah-  
gelegene Buchhandlungen zu beziehen.

Leipzig, im März 1838.

**Brockhaus & Wennerius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XII.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

## Vericht über die Verlagsunternehmungen für 1838 von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Die mit \* bezeichneten Artikel werden bestimmt im Laufe des Jahres fertig; von den übrigen ist die Erscheinung ungewisser.

(Der Anfang und die Fortsetzungen dieses Verichts befinden sich in Nr. VIII, IX, X und XI.)

### III. An neuen Auflagen und Neuigkeiten erscheint ferner:

54. Dante Alighieri's lyrische Gedichte. Italienisch und deutsch herausgegeben von Karl Ludwig Kannegiesser. Zweite, verbesserte Auflage. Gr. 8. Auf seinem Druckpapier. Früher erschien in meinem Verlage: Die göttliche Komödie des Dante. Uebersetzt und erklärt von A. E. Kannegiesser. Dritte, sehr verbesserte Auflage. Drei Theile. Mit einem Zehntheiler (Dante's Bildnis) und geometrischen Plänen der Hölle, des Purgatoriums und des Paradieses. Gr. 8. 1832. 3 Thlr.

\*55. Eckermann (Johann Peter), Gedichte. 8. Auf Velinpapier. Geh. 1 Thlr. 12 Gr.

Der Verfasser ist durch die Herausgabe seiner „Gespräche mit Goethe“ (2 Theile, 2te Auflage, 1837, 4 Thlr.) dem Publicum so nahe gereten, daß man mit Interesse seine eignen poetischen Productionen entgegennehmen wird.

\*56. Eitner (Karl), Der moderne Lazarus. Eine Novelle. 8. Auf seinem Druckpapier.

\*57. Ikonographische Encyclopädie, oder bildliche Darstellung aller Gegenstände der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. Unter Mitwirkung der Herren DD. v. Ammon, Dieffenbach, Grossheim, Jüngken, Kluge, Trüstedt herausgegeben von Friedrich J. Behrend. In vier Abtheilungen: I. Medicinische Klinik. II. Chirurgische Klinik. III. Geburtshülfsliche Klinik. IV. Hülfswissenschaften. Das Ganze etwa 150 Tafeln in Folio mit ausführlichem Text.

Das Unternehmen ist soweit vorbereitet, daß die erste Abtheilung der medicinischen Klinik oder die Darstellung der Hautkrankheiten in diesem Jahre erscheinen kann. Es enthält mit vor, den Plan des ganzen wichtigen Werks gleichzeitig mitzutheilen.

\*58. Ersch (Johann Samuel), Literatur der vermischten Schriften seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit; systematisch bearbeitet und mit den nöthigen Registern versehen. Neue fortgesetzte Ausgabe von Chr. A. Geissler. Gr. 8. Auf gutem Druckpapier. 20 Gr.

\*59. — — —, Literatur der schönen Künste u. s. w. Neue fortgesetzte Ausgabe vom Prediger C. A. Rese in Halberstadt. Gr. 8. Auf gutem Druckpapier. 1837. Nr. 19.

\*60. Der Erzbischof von Köln Clemens August Freiherr von Droste zu Vischering, seine Principien und Opposition. Nach und mit authentischen Actenstücken und schriftlichen Belegen dargestellt. 8. Auf seinem Druckpapier. Geh. 8 Gr. Die spätern Schriften des Verfassers über diesen Gegenstand sind unter Nr. 53 und 63 angeführt.

\*61. Fund (J.). Aus dem Leben zweier Schauspieler: August Wilhelm Sfland's und Ludwig Dörrent's. 8. Auf seinem Druckpapier. Geh. 1 Thlr. 12 Gr. Willt den zweiten Band des unter Nr. 21 angeführten Werks.

\*62. Gans (Eduard), Vorträge über die Geschichte der letzten fünfzig Jahre. Erster Band und folgende. Gr. 8. Auf seinem Druckpapier.

Der erste Band dieser in den Jahren 1828—33 an der Berliner Universität vor zahlreichen Zuhörern gehaltenen, für den Druck aber sehr umgearbeiteten Vorträge wird noch im Laufe dieses Jahres erscheinen.

\*63. Perringen (Gustav von), Meine Reise nach Portugal im Frühjahr 1836. Zwei Theile. 8. Auf seinem Druckpapier. Geh. 3 Thlr. 12 Gr.

Der Verfasser hatte als Begleiter des Don Fernando, letzten Königs von Portugal, sechs zu höchst interessanten Bemerkungen Gelegenheit.

\*64. Herder (S. A. W. v.), Ueber den Meissner Erbstollen. Mit Kupfern und Karten. Roy.-4. Auf Velinpapier. Das Werk war noch vor dem Tode des verehrten Verfassers vollendet und wird in Kürze erscheinen.

\*65. Hille (Karl Christian), Die Bäder und Heilquellen Schlesiens und der Grafschaft Glatz. Für Brunnen- und Badereisende. Mit zwei Kärtchen. 8. Auf seinem Druckpapier. Geh. 18 Gr.

\*66. Hille (Karl Christian), Beschreibung der Ost- und Nordseebäder. Mit drei Kärtchen. 8. Auf seinem Druckpapier. Geh.

\*67. — — —, Die Bäder am Rieber- und Oberstein und die Launusbäder. Mit Kärtchen. 8. Auf seinem Druckpapier. Geh.

\*68. Julius (S. R.), Nordamerica's sittliche Zustände. Versuch einer Darstellung derselben nach eignen Anschauungen während der Jahre 1834, 1835 und 1836. Zwei Bände. Mit einer Karte und vielen Abbildungen und Tabellen. Gr. 8. Auf seinem Druckpapier. Geh.

Die Vorläufer zu diesem wichtigen Werke erschien eine kleine Skizze des Verfassers: „Die amerikanischen Erziehungs-Systeme“ (1837, 8 Gr.).

\*69. Kannegiesser (Karl Ludwig), Deutsches Declamatorium. In drei Theilen. 8. Auf seinem Druckpapier. Geh. 2 Thlr. Die einzelnen Theile unter den folgenden Titeln:

\*70. — — —, Deutsches Declamatorium für das erste Jugendalter, insbesondere für Elementarschulen und die unteren Classen der Bürgerschulen und Gymnasien. 8. Geh. 8 Gr.

\*71. — — —, Deutsches Declamatorium für das mittlere Jugendalter, insbesondere für die höheren Classen der Bürgerschulen und die mittleren Classen der Gymnasien. 8. Geh. 12 Gr.

\*72. — — —, Deutsches Declamatorium für das reifere Jugendalter, insbesondere für die oberen Classen der Gymnasien. 8. Geh. 1 Thlr. 4 Gr.

73. Katha sarit sagara. Die Märchengsammlung des Soma Deva. Sanskrit und deutsch herausgegeben von Hermann Brockhaus. Gr. 8. Auf seinem Velinpapier. Geh. Ein Fragment hiervon: „Erzählung der Stadt Vallapura und Geschichte der Upalaja“, erschien 1836 und kostete 6 Gr. Ein früherer Zeit von „Prabodha Chandrodaya Krishna Misri Comedien“, von demselben Herausgeber taucht 1 Thlr.

\*74. **Krug (Wilhelm Traugott)**, Allgemeines Handwörterbuch der philosophischen Wissenschaften, nebst ihrer Literatur und Geschichte. Nach dem heutigen Standpunkte der Wissenschaften bearbeitet und herausgegeben. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Fünfter oder Supplementband. In zwei Abtheilungen. Gr. 8. Auf gutem Druckpapier. Auch unter dem Titel: Encyclopädisches Lexikon in Bezug auf die neueste Literatur und Geschichte der Philosophie.

Die ersten vier Bände (1832—34) folgten 11 Bde.  
\*75. **Pang (J. G.)**, Neue praktische französische Grammatik. Gr. 12. Auf gutem Druckpapier.

Competente Richter haben diese Grammatik für seine unmittelbare Vermeidung der Literatur, sondern für äußerst praktisch erachtet.

\*76. **Reben und Briefwechsel George Washington's**. Nach dem Englischen des Jared Sparks im Auszuge bearbeitet. Herausgegeben von Friedrich von Raumer. Erster Band und folgende. Gr. 8. Auf gutem Druckpapier.

Nachdem das Original jetzt vorliegt, kann sich das Erscheinen des ersten Bandes dieser in Uebereinstimmung des Verfassers von Herrn von Raumer besorgten Bearbeitung als bald ersehend verheissen.

\*77. **Koebeil (Johann Wilhelm)**, Gregor von Tours und seine Zeit in seinem Geschickte. Gr. 8. Auf gutem Druckpapier.

\*78. **Martens (Charles de)**, Nouvelles causes célèbres du droit des gens. Deux volumes. Gr. 8. Auf feinem Druckpapier. Geh.

Eine Fortsetzung der im J. 1827 von Herrn Baron von Martens herausgehaltene Sammlung der „Causés célèbres du droit des gens“ (2 Bände, 4 Bde. 12 Gr.), welche sich aber allein auf Rechtsfälle der neueren Zeit bezieht.

(Der Beschluß folgt.)

Ankündigung und Einladung zur Subscription.

**Grace Kennedy's**  
sämmliche  
**Christliche Erzählungen,**  
in Verbindung mit Anderen  
aus dem Englischen herausgegeben  
von  
**Dr. Gustav Plieninger.**

Zwölf monatliche Lieferungen à 7 Gr., oder 27 Kr. —  
5 Bde. 12 Gr., oder 5 Fl. 24 Kr.

Die drei ersten Lieferungen sind bereits erschienen und in allen Buchhandlungen nebst ausführlichen Anzeigen über das Ganze zu haben.

Reutlingen, im März 1838.

Lithographische Anstalt und Verlagsbuchhandlung  
von

**Johann Konrad Wacken jun.**

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden:

**Esprit de la conversation française**  
ou recueil

de plus de deux mille gallicismes à l'usage des étrangers qui veulent se perfectionner dans l'étude du français,

avec la traduction anglaise et allemande en regard

par

**A. F. B. SCHUBERT,**  
Professeur de littérature française et anglaise à l'université de Tübingen, membre de l'institut historique de France etc.

Première livraison.

8. Preis 9 Gr., oder 36 Kr.

Unter so vielen Schriften, welche dazu bestimmt sind, die Kenntniß der französischen Sprache zu erleichtern und mit deren feinen Wendungen bekannt zu machen, gibt es

sehr wenige, die ihren Titel rechtfertigen und die Erwartung des Publicums befriedigen. Die meisten werden von Fremden herausgegeben, welche sich, nach einem kurzen Aufenthalt in Frankreich, einbilden, sie seien mit der französischen Sprache vollkommen vertraut worden, aber die entweder ihre Eigenthümlichkeiten oder ihre Feinheiten nicht einmal vermuthen. Diese wichtige Arbeit hat Hr. Prof. Peschier übernommen, welcher schon durch seine **Histoire de la littérature allemande** als Sprachforscher und Schriftsteller allgemeine Anerkennung nicht nur in Frankreich, sondern auch in England und unter uns fand, und welcher folglich die Gallicismen am besten für sich zu gebrauchen und mitzutheilen versteht. Indem er die steifen und grammatischen Phrasen sowohl als die trivialen Ausdrücke sehr sorgfältig vermeidet, bietet er uns zugleich eine Menge von feinen, eleganten und witzigen Redensarten, welche die französische Sprache zur allgemeinen Conversationssprache erhoben hat. Die deutsche und englische Übersetzung, wodurch er die französischen Idiotismen ebenso treu als geistreich wiedergegeben, machen diese neue Sammlung zu einer der interessantesten für Franzosen, Engländer und Deutsche. Das Vorwort, worin der Verfasser sich als eleganter Schriftsteller gezeigt hat, empfehlen wir Jedem, welcher die französische Sprache gründlich studiren will.

Stuttgart und Tübingen, im März 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**

## Neuer Nekrolog

der  
**Deutschen.**

Dierzehnter Jahrgang.

**Enthaltend die Lebensbeschreibungen und Notizen von 1488 im Jahre 1836 verstorbenen denkwürdigern Deutschen.**  
**2 Theile, mit 2 Portraits.**

67 Bogen stark.

**S. Weimar, Voigt. Geheftet. 4 Thlr., oder 7 Fl. 12 Kr.**

Dieses echt vaterländische Unternehmen, das von allen gewiß das größte Recht auf den Namen eines deutschen Nationalwerks hat, weil es ein Buch des Andenkens, ein Stammbuch, eine Gedenktafel für Tausende ist, wird bekanntlich nicht des Gewinns wegen, sondern allein aus Patriotismus mit großen Opfern an Zeit und Geld fortgesetzt. Die würdigsten Männer der Nation haben längst erklärt und gewünscht, daß Deutschland dessen große Wichtigkeit noch nicht nach Verdienst beachtet und gewürdigt habe und daß ihm zu seiner eignen Ehre eine allgemeinere Verbreitung und Unterstützung zu Theil werden möge. — Um kurz und schlagend darzutun, was der Nekrolog seit 14 Jahren geleistet hat, so bedarf es nur der Thatfache, daß, obschon er sich nur auf die Töbten von 1823—36 beschränkt, er in dieser Periode die Geschichte und das Andenken von mehr als 16,000 berühmten oder doch erwähnenswerthen Deutschen in 810's unergängliche Tafeln eingezeichnet hat, von denen schon jetzt, ohne ihn, großentheils in keinem bestehenden Werke auch nur eine Spur zu finden wäre. Möge man endlich anfangen einzusehen, welch ein großes Verdienst und welch ein Gewinn diese ist und daß sich die Nation selbst nicht ehet, wenn sie ein Werk untergehen läßt, wie sich dessen keine andere in der Welt rühmen kann und welches z. B. Franzosen und Engländer auf ihrem Boden

zu schätzen wissen würden. Es wird Zeit, ja es wird sogar eine Ehrensache, das Deutschland ihnen nicht länger nachsehen und Empfindlichkeit für seinen Nationalruhm, Deutschland, welches alljährlich einen Stoff an ausgezeichneten Menschen für diese Chronik liefert, wie es schwerlich ein anderes Land könnte. — Davon zeugt auch dieser 14te Jahrgang, der 321 ausführliche Biographien und 1467 kürzere Notizen liefert, von welchen ersten wir des beschränkten Raumes wegen hier nur nennen wollen: unter den künftlichen Personen **König Anton** von Sachsen, **Herzogin Wilh. Luise** von Hessen, **Fürst Heinrich XIX.** von Ruß-Örreiz; als Sterne erster Größe den österreichischen Blücher — den großen und heldenmüthigen **Fürst Johann von Liechtenstein** und den menschenfreundlichen **Ärzt Juseland**, ferner die **Minister Graf v. Bremer** und **Rehberg** in Hannover, **Müller, Kottitz** und **Jänfendorf** in Dresden, **Freiherr v. Gemmningen** in Heidelberg, **v. Weinrich** in München, **v. Brandeure** in Schwelm, **v. Otto** in Stuttgart, den originellen **Graf v. Mellin** in Straßburg und den Ober-Ceremonienmeister **v. Buch** in Berlin, — die Generale und Kriegshelden **Albrecht Graf v. Götlan**, die preussischen **v. Dobschütz**, **v. Brante**, **v. Völshöfel**, die bairischen **v. Nachlovich**, **v. Tauch**, **v. Villemont**, die sächsischen **v. Wolan**, **v. Ziegler** und **Klipphausen**, den hessischen General **v. Falck**, den dänischen Generalleutnant, Landgraf **Karl von Hessen**, den württemb. General **Fürst v. Hohenlohe-Kirchb.** und den tapfern Hessen **Lehrn v. Münchhausen**, — die Staatsmänner **And. Fürst v. Kinsky**, den Landammann **Müller v. Friedberg**, **Ritter v. Drech** in München, **Präf. v. Delrich** in Marienwerder, **Geh. Justizrath Wachsmuth** in Naumburg, **Präf. Etzling** und **Staatsrath Kaufe** in Weimar, — die Prälaten **Graf Cypact**, **Fürst-Erzbischof v. Olmütz**, **Prinz v. Hohenpollern-Hech**, **Fürst-Erzbischof v. Ermeland**, den **Erzbischof Boll v. Freiburg**, den **Bischof v. Hommer** in Trier, **v. Schuberth** in Breslau, den **Gen.-Bicar Dugmus** in Würzburg, den **evangel. Bischof Müller** in Rastau, — die berühmten Theologen **Muperti** in Göttingen, **Goldhorn** in Leipzig, **Seltenreich** in Dresden, **Engel** in Plauen, **Weerth** in Detmold, **Schulze** in Zürich, **Schmid** und **Daub** in Heidelberg, — die Professoren **Clodius** in Leipzig, **Sickler** in Hildburghausen, **Grotefend** in Göttingen, **Keserstein** in Thorn, **Landvoigt** in Merseburg, **Eisenfchmid** in Schweinfurt, **Lehne** in Mainz und den großen **Erzieher Hundelcker**, — die Medici **Friedrich** in Würzburg, **Volke** in Berlin, die **Leibarzte Gebr. Stiff** in Wien, **Meyer** in Offenbach, **Hieronymi** in Neustrelitz, **Hedenus** in Dresden, — die ausgezeichneten Geschäfts-, Kauf- und Fabrikanten **Nathan Rothschild**, **v. Hering** in Brunn, **Galberla** in Dresden, **Ganzwald** in Luedlinburg, **Leisch** in Nürnberg, **Lutteroth** in Mühlhausen, **Taunich** in Leipzig, — die Schriftsteller und Dichter **Haimund**, **Grabbe**, **Dr. Fr. Cramer**, **v. Kurländer**, **Weißer**, — die Tonkünstler **Reicha**, **Nägeli**, **Benda**, **Ebers**, — die Frauen: **Wilme Anna v. Hoyer**, **Freiin v. Spec-Sternburg**, **Frau v. Gersdorf**, **Clara Frieschmann**, ferner den berühmten Geographen **Stieler** in Gotha, den großen Fortmann **Hartig** den Mathematiker **Bieth**, den Kupferstecher **Bolt**, den verdienten Schulgen **Kästner** in Giesresleben u. f. w.

**Ausführliche Berichte** über das ganze Rekrologswerk können durch alle Buchhandlungen unentgeltlich bezogen werden.

Um die Anschaffung des Ganzen zu erleichtern, sollen die ersten 10 Jahrgänge (20 Bände), deren Preis eigentlich 40 Thlr. ist, für 10 Thlr. preuß. Cour. (17 fl. 30 Kr.), wenn man sie complet nimmt, abgegeben werden und sind dafür durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

An alle Buchhandlungen und Subscribenten ist verhandt:  
**Allgemeine Encyclopädie**  
 der Wissenschaften und Künste,  
 in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern  
 bearbeitet, und herausgegeben von  
**J. S. Ersch** und **J. G. Gruber.**

Mit Kupfern und Karten.

Erste Section (A—G). Herausgegeben von **J. G. Gruber**. 25ter Theil.  
 Zweite Section (H—N). Herausgegeben von **A. G. Hoffmann**. 14ter Theil.  
 Dritte Section (O—Z). Herausgegeben von **M. G. E. Meier** und **V. G. Rams**. 1ter Theil.

Von den reichhaltigen Artikeln dieser neuen Bände nenne ich nur in der ersten Section: *Rechtträge*, *Dacia* von *Recher*; *Dacier* von *Jacob*; *Dänische Literatur* und *Sprache* von *Rudelbach*; *Dann* von *v. Stramberg*; *Declamation* von *Flemming*; *Differenz*, *Differentialrechnung* u. s. w. von *Gartz*; *Diplomatische Chronologie*, *Formelkunde* u. s. w. von *Erhard*; *Distoma* von *Crepin*; ferner: *Ebbe* und *Flut* von *Küntz*; *Ebbekestorp* von *Wachter*; *Ebel* von *Escher*; *Eber* von *Wachter*.

Aus der zweiten Section: *Jacobiner* von *Röse*; *Jacob* von *Flügel*; *Jagd* von *Pfeil* und *Emminghaus*; *Jagellonen* von *v. Stramberg*; *Jahja* von *Schmidt*; *Jahr* von *Stern*; *Jamaica* von *Klaehn*; *Janitscharen* von *Flügel*; *Jansenismus* von *Lange*; *Jaroslav* von *Wachter*; *Jazyger* von *Gamauf*.  
 Aus der dritten Section: *Pacht* von *v. Madai* und *Fischer*; *Padua* von *Schreiner*; *Pädagogik* von *Niemeyer*; *Päderastie* von *Meier*; *Päonien* von *Droysen*; *Päpus* von *Hanse*; *Paläographie* von *Gesenius*; *Palästina* von *Rödiger*; *Palästrik* von *Hanse* u. f. w.

Der Pränumerationspreis ist für jeden Theil in der Ausgabe auf Druckpapier 3 Thlr. 20 Gr., auf Velinpapier 5 Thlr. Für den Ankauf des ganzen Werkes, sowie auch einer Anzahl einzelner Theile zur Ergänzung unvollständiger Exemplare, gewähre ich die billigsten Bedingungen und bemerke noch, daß alle Anstalten so getroffen sind, daß die Fortsetzung regelmäßig erscheinen kann.

Leipzig, im März 1838.

**f. N. Brockhaus.**

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen verhandt worden:

**Betrachtungen**  
**über Diplomatie**

von

**Friedrich Kösle.**

8. In Umschlag geheftet. Preis 1 Thlr. 16 Gr., oder 2 fl. 42 Kr.

Die Verlagsbandlung nimmt sich die Freiheit auf dieses Buch nicht nur die Männer vom Fach, sondern das gebildete Publicum überhaupt aufmerksam zu machen. Es enthält das Ergebniß vieljähriger Übung und Beobachtung, und behandelt eine so sehr verkannte Disciplin unparteiisch, vollständiger und mit mehr Rücksicht auf die Richtung der Geister als irgend eine Schrift älterer und neuerer Zeit deutscher oder ausländischer Literatur.

Stuttgart und Tübingen, im Februar 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**

Sieben ist erschienen und auf Bestellung durch alle Buchhandlungen zu erhalten:

**V o t u m**  
eines  
norddeutschen Publicisten

zu  
**H. T. Klüber's**  
nachgelassener Schrift:  
**Die eheliche Abstammung**

des  
fürstlichen Hauses  
**Löwenstein - Wertheim,**  
und  
dessen Nachfolgerrecht

in den Stammländern des Hauses  
**Wittelsbach.**

Halle, bei **C. T. Schwetschke und Sohn.** 1838.  
Gr. 8. Geh. Velinpapier.  
Preis 1 Thlr.

Ein  
sehr wichtiges Werk für Juristen  
ist soeben erschienen. Es ist dies  
**Die Wissenschaft**  
**der römischen Rechtsgeschichte**

von  
**Dr. J. Christiansen.**  
1fter Band. Gr. 8. Altona, Hammerich. 1838.  
Geb. 3 Thlr.

Originalität und tiefes Wissen im Geleite der pikanten Polemik und einer Kritik von gleicher Kühnheit, Sicherheit und Leichtigkeit im tiefsten Allgemeinen, wie im äußersten Einzelnen, sichern diesem Werke eine allgemeine Beachtung, das schon hier und dort außergewöhnliche Sensation erregt.

Das Buch ist gebunden in allen Buchhandlungen Deutschlands, Österreichs, der Schweiz u. vorräthig.

**Mäkerath's Gedichte.**

In der Unterzeichneten sind soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

**Gedichte**

von  
**Chr. J. Mäkerath.**

8. In Umschlag broschirt. Preis 1 Thlr. 8 Gr., oder  
2 Fl. 12 Kr.

Wir übergeben hier dem Publicum eine neue Gedichtsammlung, welche durch ihren eignen innern Werth sich gewiss Beifall und Freunde gewinnen wird. Fülle der Ideen und Schönheit der Form, jugendliches Feuer und gereiftes Maß sind in diesen Dichtungen verbunden, die in reicher Mannichfaltigkeit die verschiedensten Töne anschlagen und weichen allen das gemeinsame ist, daß sie das Gemüth des Lesers in eine wahrhaft poetische Atmosphäre versetzen und es über die prosaische Wirklichkeit kräftig emporheben. Der Inhalt zerfällt in Balladen und Romane. Vermischte Gedichte. Dithyramben. Elegien, Idyllen, dramatische Scenen.

Die Erscheinung dieser Gedichte ist besonders für die Rheinlande um so mehr von Interesse, je länger diese schöne Grenz-

proving des Gesamtstaates durch ihre frühere Geschichte von der allgemein deutschen Literatur ausgeschlossen worden und je dringender es daher gilt, in dem schönen Fortschritt dieser Literatur auch sie würdig zu repräsentiren.

Stuttgart und Tübingen, im März 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**

Bei Karl Aue in Altona ist erschienen:

**3ur Fundamentalphysik,**  
oder Andeutungen eines einzig möglichen physikalischen Systems. Gr. 8. (26½ Bogen.)  
Geheftet. Preis 2 Thlr.

Eine Schrift, welche für die Physik von Wichtigkeit werden dürfte, und auf welche Freunde und Kenner der Physik daher hierdurch angelegentlich aufmerksam gemacht werden.

**Zeitschrift für 1838.**

**LA FRANCE LITTÉRAIRE.**  
**Revue universelle**  
des lettres, des sciences et des arts.

*Fondateur et rédacteur en chef,*

**M. Charles-Malo.**

**CADRE DU JOURNAL:**

Philosophie, Sciences, Littérature, Archéologie, Beaux-Arts, Statistique, Législation, Finances, Économie politique, Histoire naturelle, Instruction publique, Philologie, Institutions sociales, Linguistique, Histoire, Cours publics, Voyages, Origines, Biographie, Moyen Age, Variétés, Impressions et Souvenirs, Chroniques et Légendes, Miscellanees. Poésie, Académies, Revue littéraire, Ephémérides scientifiques, littéraires, artistiques, etc.

**COLLABORATEURS PRINCIPAUX:**

MM. Allet, Ballanche, l'Abbé Batain, Berville, Beugnot, Bignan, Blanqui, Casimir Bonjour, Bouilly, Creuzé de Lesser, Alex. De Laborde, Benjamin Delessert, Dumont-Durville, Ferdinand Denis, Emil Deschamps, Alex. Dumas, Ch. Dupin, Ph. Dupin, d'Epagny, Esquiros, Falconnet, Théodore Fix, Fortia d'Urban, Garcin de Tassy, Guérard, Guiraud, Guizot, Halevy, De Hammer, Hugo, Jomard, Kératry, La-cretelle, Lamartine, De Lamennais, Le Clerc, Legouvé, Népom. Lemerrier, Onés. Leroy, Lesson, Charles-Malo, della Rovère, X. Marmier, Matter, Michaud, Munk, Charles Nodier, De Pastoret, Paulin - Paris, Peignot, De Pongerville, Raoul-Rochette, Reiffenberg, Reinaud, De Rességuier, Rochette, Romieu, Sainte-Beuve, Saintine, Saint-Marc Girardin, Salvandy, Scribe, Eugène Sue, Sylvestre de Sacy, Taylor, Villemain, Villenave, Wigmore, etc., etc., etc.

12 livraisons mensuelles. Gr. in-8.  
Paris, 1838. 8 Thlr.

**Probehefte und Prospekte sind von uns, sowie durch alle Buchhandlungen zu beziehen.**

Leipzig, im März 1838.

**Brockhaus & Wernarins,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XIII.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Zeile 2 Gr.

## B e r i c h t

über die

## Verlagsunternehmungen für 1838

von

F. A. Brockhaus in Leipzig.

Die mit \* bezeichneten Artikel werden bestimmt im Laufe des Jahres fertig; von den übrigen ist die Erscheinung ungewisser.

(Der Anfang und die Fortsetzungen dieses Berichts befinden sich in Nr. VIII, IX, X, XI und XII.)

### III. An neuen Auflagen und Neuigkeiten erscheint ferner:

\*79. *Most (Georg Friedrich)*, Ausführliche Encyclopädie der gesammten Staatsarzneikunde. Im Vereine mit mehreren Doctoren der Rechtsgelahrtheit, der Philosophie, der Arzneiwissenschaft und Wundtarzneikunst, praktischen Aerzten, Physikern und Chemikern bearbeitet und herausgegeben. Für Gesetzgeber, Rechtsgelehrte, Polizeibeamte, gerichtliche Aerzte, Wundärzte, Apotheker und Veterinärärzte. Ersten Bandes erstes Heft und folgende Gr. 8. Auf gutem Druckpapier.

Die günstige Aufnahme, welche der „Encyclopädie der gesammten medicinischen und chirurgischen Praxis“ — wovon eine zweite, verbesserte und namentlich durch die Erweiterung der Zahl vermehrte Auflage (2 Bände, 1837, 10 Thle.) und ein Supplement zur ersten Auflage (2 Thle., 16 Gr.) erschienen — zu Theil ward, veranlaßte den Herausgeber derselben in Verbindung mit den gesonnenen Männern ein gleich praktisches Handbuch der Staatsarzneikunde zu bearbeiten. Das Werk erscheint ebenfalls in zwei Bänden, welche in Heften von 12 Bogen ausgegeben werden. Der Subscriptionspreis ist für jedes Heft 20 Gr.

\*80. *Passavant (J. D.)*, Rafael von Urbino und sein Vater Giovanni Santi. Zwei Bände. Mit einem Atlas. Gr. 8. Auf feinem Druckpapier. Cart.

Der erste Band dieses für die Kunstgeschichte genöthig höchst bedeutenden Werkes ist unter der Presse und wird das Leben der beiden Künstler enthalten, während der zweite Band, der gleichzeitig erscheint, ein Verzeichniß der Werke des großen Meisters nebst Beschreibungen und historischen Nachrichten über dieselben geben wird. Der Atlas enthält mehr Portraits Rafael's und verschiedener dessen Helden seines Lebens, Rafael's Haus, Rafael's Gemälde und verschiedene seiner Meisterwerke in schönen Kupferstichen. Auf die Ausstattung des Ganzen in topographischer und artistischer Hinsicht wird die größte Sorgfalt verwendet.

\*81. *Pedöcz (Michael)*, Ansicht der Welt. Versuch die höchste Aufgabe der Philosophie zu lösen. Gr. 8. Auf feinem Druckpapier.

82. *Pösgarn, Vater und Sohn*. Eine Novelle. Zwei Theile. 8. Auf feinem Helmpapier. Geh.

\*83. Die römisch-hierarchische Propaganda, ihre Partei, Umtriebe und Fortschritte in Deutschland. Mit Küchliken auf die Opposition des Erzbischofs von Köln nach unumstößlichen Thatfachen geschildert von dem Verfasser der Schrift: „Der Erzbischof von Köln, seine Principien und Opposition.“ 8. Auf feinem Druckpapier. Geh. 8 Gr.

Die übrigen Schriften des Verfassers über diese Angelegenheit sind unter Nr. 53 und 60 angekündigt.

\*84. *Duand (J. G. v.)*, Kleines A-B-C-Buch für Anfänger im Lesen und Schreiben. — Auch u. d. T.: Synonymen und Homonymen. Gr. 12. Auf feinem Druckpapier. Geh.

\*85. *Raumer (Friedrich von)*, Europa vom Ende des siebenjährigen bis zum Ende des amerikanischen Krieges (1763 — 83). Nach den Quellen im britischen und französisc-

hen Reichsarchiv. Drei Theile. Gr. 12. Auf feinem Druckpapier. Geh.

Dies interessante Ergebnis der Reisen des Verfassers bildet die Fortsetzung der „Beiträge zur neuen Geschichte“. — Vgl. Nr. 27.

\*86. *Raumer (Karl von)*, Beschreibung der Erdoberfläche. Eine Vorlesung der Erdkunde. Dritte verbesserte Auflage. Gr. 8. Auf gutem Druckpapier. Geh. 4 Gr.

Dessen „Lehrbuch der allgemeinen Geographie“, 2te Auflage. Mit 6 Kupferstichen. 1833. 1 Thlr. 12 Gr.

\*87. — *Valisina*. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit Plänen von Jerusalem, dem Sichern und dem Jakobbrunnen und dem Grundriß des heiligen Grabes. Gr. 8. Auf gutem Druckpapier. 1 Thlr. 16 Gr.

Die zweite Auflage erschien: „Der Zug der Scythen nach Kanaan“, 1837, und kostet 12 Gr.; die dritte heraus s. 6 Gr.

88. *Schmid (Karl Ernst)*, Lehrbuch des gemeinen deutschen Staatsrechts. Zweite, umgearbeitete und vervollständigte Ausgabe. Gr. 8. Auf gutem Druckpapier.

\*89. *Schulze (Ernst)*, Die bezagerte Rose. Romantisches Gedicht in drei Gesängen. 8. Beste Auflage.

Ausgabe in 8. ohne Kupfer. Auf feinem Druckpapier. Geh. 1 Thlr. Ausgabe in 8. mit 7 Stahlstichen. Auf feinem Druckpapier. Cart. 2 Thlr. Ausgabe in 8. mit 7 Stahlstichen. Auf feinem Helmpapier. Cart. mit Goldschnitt. 2 Thlr. 12 Gr.

\*90. *Stizzen* aus dem Alltagsleben. Aus dem Schwedischen. Erstes Bändchen. — Auch u. d. T.: Die Töchter des Präbidenten. Erzählung einer Gouvernante. Aus dem Schwedischen. 8. Auf feinem Druckpapier. Geh. 1 Thlr. 16 Gr.

Mit diesem Bändchen beginnt eine Uebersetzung der „Schwinger utur Schwabegelsamer“, unter welchem Titel die schwedische Verfasserin eine Reihe von Erzählungen herausgegeben hat, welche den größten Beifall fanden.

\*91. *Sternberg (A. von)*, Fortunat. Ein Feenmärchen. Zwei Theile. 8. Auf feinem Druckpapier. Geh. 3 Thlr. 18 Gr.

\*92. *Stieg (K. v.)*, Bunte Stizzen aus Ost und Süd. Entworfen und gesammelt in Preußen, Rußland, der Türkei, Griechenland, auf den ionischen Inseln und in Italien. Zwei Theile. Mit einer Musikbeilage. 8. Auf feinem Druckpapier. Geh. 3 Thlr.

\*93. *Wegeler's (F. G.)* gesammelte Gedichte und Nachlaß. Herausgegeben von F. Funk. 8. Auf feinem Druckpapier. Geh. 2 Thlr. 8 Gr.

Eine Sammlung der zerstreuten Gedichte dieses sehr deutschen Sängers, dessen interessante Lebensbeschreibung im ersten Theile von Funk's Erinnerungen (vgl. Nr. 21) enthalten ist.

94. *Winkler (Eduard)*, Vollständiges Real-Lexikon der medicinisch-pharmaceutischen Naturgeschichte und Rohwarenkunde. Enthaltend Erläuterungen und Nachweisungen über alle Gegensände der Naturreiche, welche bis auf die neuesten Zeiten in medicinisch-pharmaceuti-

scher und toxiologischer Hinsicht bemerkenswerth geworden sind. Naturgeschichtlicher und pharmakognostischer Commentar jeder Pharmakopoe für Aerzte, Studierende, Apotheker und Drogisten. Zwei Bände. Gr. 8. Auf gutem Druckpapier.

Dieses Werk wird im Zeichnen ganz mit Moß's Encyclopädie (Nr. 79) übereinstimmen und wie diese in 12 Bogen erscheinen.

\*95. Witte (Karl), Das preussische Intestats-Erbrecht, aus dem gemeinen deutschen Rechte entwickelt. Gr. 8. Auf gutem Druckpapier. 1 Thlr. 12 Gr.

96. Zintfeisen (Joh. Wilh.), Leben des Generals Marquis de Lafayette. Zwei Theile. Gr. 8. Auf gutem Druckpapier. Geh.

Freunde gebiegener und unterhaltender Lecture erlaube ich mir aufmerksam zu machen auf eine

## S a m l u n g

von

Romanen, Erzählungen, Schauspielen, Gedichten, Briefen, Biographien, Denkwürdigkeiten, Reisen, historischen und andern vortheilhaften Schriften,

welche sich zur Errichtung und Ergänzung von Privat- und Leihbibliotheken eignen und zu äußerst vorteilhaften Bedingungen erlassen werden.

Das Verzeichniß darüber ist in allen Buchhandlungen, welche bis Ende September d. J. zur Gewährung der außerordentlichen Vortheile in Stand gesetzt sind, gratis zu erhalten.

Schließlich empfehle ich meinen sorgfältig gearbeiteten und mit einem Autorenregister versehenen

## Verlagskatalog,

welcher soeben durch einen zweiten Nachtrag bis Ende 1837 vervollständigt ist und von jeder Buchhandlung auf Verlangen geliefert wird, einer gefälligen Beachtung.

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden:

## Vorhalle zur Griechischen Geschichte und Mythologie,

von

Johann Aschold,

Professor am königl. bairischen Gymnasium zu Straubing.

### Erster Theil.

Preis 2 Thlr. 12 Gr., oder 4 Fl.

Inhalt: Einleitung. über den Werth der griechischen Sagen Geschichte. Inhalt der griechischen Sagen Geschichte. über die ältesten Quellen der griechischen Sagen Geschichte. über die Folgen der menschlichen Darstellung der griechischen Götter. über das Verhältnis der verschiedenen Quellen der griechischen Sagen Geschichte zueinander. über die Grundsätze und Anhaltspunkte bei der Mythenerklärung. — I. Ueber die mythische Bedeutung der griechischen Sagen Geschichte. über die göttliche Natur und göttliche Verehrung der Heroen. über die körperliche Unsterblichkeit der Heroen und ihren Aufenthalt in dem Olympos und Elysion. über die göttliche Abkunft der Heroen. über die Erzähler und den Aufenthalt der Heroen in Grotten und auf Bergen. über die Beschäftigung und Kunstfertigkeiten der Heroen. über die geistigen Vorzüge der Heroen und Heroinnen. über die Vermählung der Heroen mit Göttinnen und ihre Verbindung mit vielen Frauen. über die Kinder der Heroen und die Anzahl derselben. über den Inhalt der genealogischen Verzeichnisse. über das Auftreten der Heroen zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten. über die Wanderungen und Irrfahrten der Heroen. über die Paläste und Schatzhäuser der Heroen. über den Aufenthalt der Heroen in Tempeln. über die Kleidung und den Schmuck einiger He-

roen und Heroinnen. über die Speere und Bogen einiger Heroen. über die Schilde des Achilleus, Herakles und Agamemnon. über die Argo und einige ähnliche Fahrzeuge. über den Kasten des Sisyphos und die einiger anderer Heroen. über das Hinabsteigen des Odysseus in den Hades. über die Beschäftigung der Heroen in dem Hades. über die Dienstbarkeit des Herakles und anderer Heroen. über die große Herrschaft des Minos, Agamemnon und Diomedes. über den großen Reichtum einiger Heroen. über den Reichtum der Heroen an Herden. über die Kügelcoffe des Achilleus und anderer Heroen. über die symbolische Bedeutung des Raubes und der Entführung. Von der symbolischen Bedeutung der Erlegung schädlicher Thiere.

Der Verfasser dieser Schrift hat durch seine Geschichte des trojanischen Krieges bereits bewiesen, wie sehr er mit dem griechischen Alterthum vertraut ist. Während er sich aber in jener Schrift auf den geehrten Krieg und die zunächst mit demselben in Verbindung stehenden Stoffe beschränkte, verbreitete er sich in dieser Vorhalle über alle jene dunkeln Sagen, welche bisher wenig beachtet wurden, mit einer solchen Gründlichkeit, daß dieselben dadurch nicht bloß ihre volle Bedeutung bekommen, sondern überhaupt die ganze Uebersicht und Mythologie der Griechen neues Licht und eine sichere Grundlage gewinnt. Daher zweifeln wir nicht, daß dieses Werk zur Lösung vieler bisher streitigen Punkte wesentlich beitragen und bei der einfachen Darstellung des Verfassers und dem hohen Interesse des Gegenstandes allen Freunden der Literatur, besonders jener des classischen Alterthums, ebenso viel Vergnügen gewähren dürfte, als den Gelehrten vom Fache.

Stuttgart und Tübingen, im März 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Seben ist bei J. H. C. Schreiner in Düsseldorf erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## Die Hermannsschlacht.

Drama

von Grabbe.

Nebst Grabbe's Leben von G. Dülfer.

8. 15 Bogen. Velinpapier. Geh. In elegantem Umschlag.

Preis 1 Thlr. 7½ Sgr., oder 2 Fl.

## M e d i c i n.

## ARCHIVES GÉNÉRALES de médecine.

Journal complémentaire des sciences médicales; publié

par une société de médecins, composée de professeurs de la faculté, de membres de l'académie de médecine, de médecins et chirurgiens des hôpitaux.

*Troisième et nouvelle série.*

Année 1838. Trois volumes en douze livraisons mensuelles. In-8. Paris. 8 Thlr. 12 Gr.

Von dieser Zeitschrift, welche bereits seit dem Jahre 1823 ununterbrochen erscheint, beginnt mit diesem Jahre eine neue Reihe, bei der jedoch die innere Einrichtung unverändert bleibt.

Von dem Jahrsheft 1838 stehen Exemplare als Probe zu Diensten.

Leipzig, im April 1838.

## Brochhaus & Wernarius,

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.

(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)



In unterzeichneter Buchhandlung erschien soeben:

# Aesthetik der TONKUNST

von  
**Dr. Ferdinand Hand,**  
Professor und Geh. Hofrath.  
Erster Theil.

26 Bogen. Gr. 8. Gebfiet. Preis 2 Thlr.

Eine Aesthetik der Tonkunst wurde seit langer Zeit gewünscht und von vielen Seiten angeregt; denn unsere Wissenschaft besaß noch keine vollständige und wissenschaftlich durchgeführte Untersuchung. Was wir hier darbieten, soll darauf hinwirken, daß in die ästhetischen Grundansichten von der Musik Einheit und Klarheit komme, wie es überhaupt bestimmt ist, den Freunden der Tonkunst das Urtheil über musikalische Werke und Meister zu befähigen und das Schwanken in den Grundbegriffen zu mindern. Fern von aller Polemik will das Buch als ein Product der reinsten Liebe für die Sache der Kunst aufgenommen sein, und eine lebendigere Begeisterung für das Schöne vermitteln.

Der zweite (letzte) Theil zu Ostern!

Leipzig.

C. Hochhausen und Fournes.

## Empfehlenswerthe Jugendschriften.

**Petite  
Bibliothèque française**  
à l'usage des instituts des deux sexes  
ou  
**lectures choisies,**  
tirées des auteurs des deux nations qui se sont  
occupés de la jeunesse, pour servir de suite  
aux ouvrages

de  
**l'Abbé Mozin.**  
**12 Bände.**

Preis 2 Thlr. 8 Gr., oder 4 Fl.

Inhalt:

I. Les bons enfans par Glatz. — Petites histoire à la portée des enfans. — II. Histoires instructives et morales par Aegidius. Extrait de la petite bibliothèque des enfans par Campé. La petite curieuse, tiré d'un ouvrage français. — III. Belles histoires de M. Stille. Les voyages et aventures de maître Hauser. Fables de Lafontaine. — IV. Suite des belles histoires de Stille par Glatz. Contes moraux à la portée des enfans. Petites histoires pour former l'esprit et le cœur de la jeunesse par Meynier. — V. Les oeufs de Paques. Le jeune Henri d'Eichenfels. Le fermier Martin et sa famille. — VI. Iduna, lecture morale et amusante par Glatz. Le monde des enfans par Glatz. — VII. Minona par Glatz. Théoné par le même. — VIII. Théoné suite. Collection amusante et instructive par Pöhlmann, Alvin et Théodore par Fr. Jacob. — IX. Bibliothèque de contes par Grimm: 1) Le jardin merveilleux; 2) Histoire d'Hassan Alhabal; 3) Histoire d'Ali Baba et des 40 voleurs; 4) Histoire du jeune roi Zein Alasman et du roi des Génies; 5) Histoire de l'oiseau parlant; 6) Les sept voyages du marin Sinbad. —

IX. Beaux traits d'humanité, de justice, d'amour filiale etc. Contes de fées. — X. Contes à ma fille par M. Bouilly. Nouvelles nouvelles par M. Delafaye. Correspondance de Julie avec son frère Hyacinthe. — XI. Suite de lettres de Julie. Correspondance de jeunes émigrés. Correspondance de Mylady Chesterfield et de ses enfans. Conte à l'usage de la jeunesse par Mad. Guizot. Simons de Nantua ou le marchand forain. Les veillées au village. — XII. Les journées au village. Contes moraux nouveaux et anciens. Le polonais également brave et généreux.

Es bestehen diese für die stufenweise Übung in der französischen Sprache ausserwählten Bestände theils aus Übersetzungen, theils aus Nachbildungen unserer besten Schriftsteller für die Jugend, theils auch aus den französischen Schriftstellern, die in diesem Fache als classisch zu betrachten sind. Wer sich je mit dem Unterricht der Jugend in der französischen Sprache beschäftigt hat, kennt aus Erfahrung die Verlegenheit, worin sich nur zu oft der Lehrer in Ansehung des Stoffes zur Leistung und Übersetzungsbildung befindet, zumal wenn es ihm am Herzen liegt, den nächsten Zweck, den des Sprachlehrens, mit dem höhern pädagogischen zu verbinden: nämlich mittels dieses Stoffes zugleich auf Geist und Gemüth der Jünger zu wirken. Diese Sammlung wird in der hier angebotenen doppelten Beziehung wenig zu wünschen übrig lassen.

Wie alle Schriften des nach Gemeinnützigkeit strebenden und besonders auch die Kinder unermittelten Alters berücksichtigenden Abbé Mozin, zeichnet sich auch dieses Werk durch Wohlfeilheit des Preises aus, wodurch die Verlagehandlung sein edles Streben zu befördern sucht.

Stuttgart und Tübingen, im März 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

## Oestreichische militairische Zeitschrift. 1838. Zweites Heft.

Dieses Heft ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versendet worden:

Inhalt: I. Die Vertheidigung des nördlichen Böhmens im August 1813. II. Der Erbfolgekrieg in Spanien 1701—13. 4. Der Feldzug 1705 in Portugal und Spanien. III. Kriegsgesenen aus der Geschichte des k. k. vierten Dragonerregiments Großherzog von Toscana. — Angriff des Wachmeister's Baracken auf die französischen am linken Donauufer aufgestellten Vortruppen. IV. Über Kriegsrafeten als Ersatz für die ehemaligen Bataillionskanonen. V. Neueste Militairveränderungen. VI. Miscellen und Notizen.

Der Preis des Jahrgangs 1838 von 12 Heften ist wie bei allen früheren Jahrgängen von 1818—37 jeder 8 Thlr. Sächf.

Die Jahrgänge 1811—13 sind in einer neuen Auflage in vier Bänden vereinigt erschienen und kosten zusammen ebenfalls 8 Thlr. Sächf. Wer die ganze Sammlung von 1811—37 auf einmal abnimmt, erhält dieselbe um  $\frac{1}{4}$  wohlfeiler.

Von dem Unterzeichneten ist diese Zeitschrift durch alle Buchhandlungen um die genannten Preise zu beziehen.

Wien, den 15ten März 1838.

J. G. Heubner,  
Buchhändler.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:  
Repertorium der gesammten deutschen Literatur, Herausgegeben von E. G. Gersdorf. 1838. Fünfzehnten Bandes sechstes Heft. (Nr. VI.) Gr. 8. Preis eines Bandes 3 Thlr.

Allgemeine Bibliographie für Deutschland. Jahrgang 1838. Monat März, oder Nr. 9—13, und Bibliographischer Anzeiger: Nr. 9—13. Gr. 8. Preis des Jahrgangs 3 Thlr.

Leipzig, im April 1838.

F. A. Brockhaus.

Alterthumswissenschaften.

## RECHERCHES

sur

le culte, les symboles, les attributs et les  
monumens figurés

de Vénus,

en Orient et en Occident; par

FELIX LAJARD,

avec un tableau lithographié et XXX planches  
in-folio, gravées sur cuivre au trait.

Paris, 1838.

Dieses Werk wird aus einem Band Text in Quart und  
einem Atlas in Folio bestehen, welche in sechs Lieferungen  
ausgegeben werden sollen; zwei davon sind bereits erschienen  
und ist der Preis einer jeden derselben 5 Thlr. 20 Gr.

Prospecte und Probestieferungen sind von uns durch alle  
Buchhandlungen zu beziehen.

Leipzig, im April 1838.

**Brockhaus & Weynand,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

## Allgemeine Geschichte

der

**Katholischen Kirche**

von

dem Concilium von Trident  
bis auf unsere Tage;

mit besonderer Rücksicht auf die Geschichte der Nuntia-  
turen, der Nationalkirchen, der Concordate und die ge-  
genwärtig obschwebenden Fragen der Zeit.

Von

**Dr. Ernst Münch.**

Erste Lieferung.

## Fra Paolo Sarpi

und sein Kampf mit der römischen Curie und  
dem Jesuitismus.

Auch unter dem besondern Titel:

**Fra Paolo Sarpi**

und sein Kampf für geläuterten Katholicismus, für die  
Rechte des Staates circa sacra und den kirchenverfas-  
sungsmässigen Episcopat.

Von

**Dr. Ernst Münch.**

Winnen Kurzem wird die erste Lieferung dieses vor eini-  
ger Zeit schon angekündigten, aber durch mancherlei Hindernisse  
bis jetzt verzögerten, aus Quellen bearbeiteten Werkes erschei-  
nen, welches der neueste Kampf mit den Ansprüchen der römi-  
schen Curie um so zweckmässiger und bedeutsamer gemacht.

Der Verfasser hat als Biograph, Historiker und Publicist  
seinen Beruf dazu hinreichend dargehan, und ist schon seit

achtzehn Jahren als einer der tüchtigsten Vorkämpfer für Licht  
und Aufklärung und zeitgemäße Reform der katholischen Kirche  
bekannt, sodas die Verlagsabhandlung sich jeder fernern Anpreis-  
ung enthalten zu dürfen glaubt.

Als Resultat längerer und gründlicher Studien über die  
wichtigsten Angelegenheiten und Interessen, welche gegenwärtig  
die Geisteswelt bewegen, werden die Denkmüdigkeiten der be-  
rühmtesten Vorfescher des aufgeklärten Katholicismus voran-  
gehen, sodann die verschiedenen auf dem Haupttitel angege-  
benen Rubriken im Zusammenhange geschildert folgen.

Jede Lieferung soll ein abgeschlossenes Ganzes bilden, und  
kann auch einzeln abgegeben werden.

Den Preis wird die Verlagsabhandlung, je nach dem Um-  
fang der einzelnen Lieferungen, aufs billigste berechnen.

Karlruhe, im März 1838.

**Chr. Fr. Müller'sche Hofbuchhandlung.**

In der unterzeichneten ist soeben erschienen und an alle  
Buchhandlungen versandt worden:

## Geschichte der Amazonen

von

**Dr. Friedrich Nagel.**

Mit einer Abbildung und Karte eines der Amazonenlandes.

Preis 1 Thlr., oder 1 Fl. 30 Kr.

Dieses Werkchen umfasst auf wenigen Bogen Alles, was  
uns die klassischen Schriftsteller des Alterthums über diese höchst  
interessanten Frauen aufbewahrt haben. Unsere reiche archäo-  
logische und historische Literatur besitz kein Werk, das die Ge-  
schichte der Amazonen vollständig behandelt; hier wird der Ge-  
lehrte wie der Ungerlehrte, der Künstler wie der Kunstfreund  
gleiche Befriedigung finden. Was wir bisher mit Mühe aus  
den umfassenden archäologischen, mythologischen und artistischen  
Werken von Böttiger, Creuzer, Tischbein, Bindelmann u. A.  
zusammenlesen mußten, ist hier in freundliches Gewand geklei-  
det, zu einem Ganzen vereint, das gewis der Wißbegierde des  
gelehrten Forschers und des neugierigen Lesers nur willkommen  
sein wird.

Stuttgart und Tübingen, im März 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**

Soeben ist erschienen und versandt:

Der

## Cavalier auf Reisen.

Vom Verfasser

der

„Ansichten aus der Cavalierperspective im Jahre  
1835.“

Gr. 12. Geh. 1 Thlr. 20 Gr.

Inhalt:

Der Geburtstag. — Warnungssimile. — Politisches Glaubensbekennt-  
niß des Verfassers. — Der neue Mirabeau. — Die Volkrepräsentanten.  
— Die Hoffnung aus Oden. — Kaiser Siebenschnepper I. — Die Gordonaris.  
— Die Freimaurer. — Die Strapaziermenschen. — Die schönen Polinnen. —  
Das Haus Romanow. — Tout parait beau de loin. — Die Straßenscene. — Auf-  
lauf und Tumult. — Die Miserebraten. — Die Bauerncommissionen. — Das  
Handbuch für Hof und Staat. — Die mächtige Ritterchaft. — Archiwinkel.  
— Dobberan. — Die Legitimitätsfrage. — Der Cenfor. — Die Patrimonial-  
gerichte. — Die Frommen im Lande. — Der Keck. — Der Lügenholl. —  
Der Hensemann und seine Zehnleute. — Das rheinische Aeltestatut.

Die Übersicht des Inhalts und eine Erwähnung der von  
demselben Verfasser herausgegebenen „Ansichten aus der  
Cavalierperspective“ (Leipzig, Proberger, 1836, 2 Thlr.)  
werden hinreichen, auf diese interessante Erscheinung aufmerksam  
zu machen.

Leipzig, im April 1838.

**F. A. Brockhaus.**

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XIV.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

## Verzeichniss der Vorlesungen,

welche

an der königlich bairischen Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen  
im Sommer-Semester 1838 gehalten werden sollen.

Der gefegliche Rufung derselben ist der 23te April.

### Theologische Facultät.

Dr. Kaiser: Übungen des exegetischen Seminars der alt- und neutestamentlichen Abtheilung, Erklärung der Salomonischen Sprüche, Hermeneutik des Alten Testaments, christliche Apologetik, über die Strauß'schen Ansichten von der evangelischen Geschichte. — Dr. Engelhardt: Übungen des kirchenhistorischen Seminars, Dogmengeschichte und die Geschichte der neuen Dogmatik. — Dr. Nishausen: Dogmatik, zweiter Theil, die kleinen Briefe des Apostels Paulus. — Dr. Höfling: Übungen des homiletischen und catechetischen Seminars, Katechetik, Theorie der Seelsorge. — Dr. Harless: evangelische Synopsis, erster Theil, christliche Ethik. — Dr. Kraft: den letzten Theil der Dogmatik, neuere Missionsgeschichte. — Dr. von Ammon: Pastoralinstitut, Symbolik und Polemik.

Die vier angestellten Repetenten werden unter Aufsicht und Leitung des königl. Ephorus wissenschaftliche Conversatorien in lateinischer Sprache und Repetitorien für die Theologie Studirenden in vier Jahrescursen halten.

### Juristische Facultät.

Dr. Bucher: Pandekten, Conversatorium über die wichtigsten Lehren des bürgerlichen Rechts und Processus. — Dr. Schmidlein: Theorie des Criminalprocessus mit steter Rücksicht auf das bairische Recht, Encyclopädie und Methodologie der Rechtswissenschaft, ausgewählte Lehren aus dem Criminalrechte und Processus. — Dr. Feuerbach: gemeines und bairisches Lehnrecht, Staats- und Rechtsgeschichte, Handels- und Wechselrecht. — Dr. Stacht: Civilprocess. — Dr. von Einck: deutsches Bundes-Staatsrecht in Verbindung mit einer Übersicht der normalen deutschen Reichsverfassung und der Geschichte ihrer Auflösung, gemeines deutsches und bairisches Territorial-Staatsrecht. — Dr. von Schertel: Institutionen des römischen Rechts mit kurzer Darstellung der äußeren und inneren Geschichte desselben, das römische Erbrecht, ausgewählte Pandektenstellen.

### Medicinische Facultät.

Dr. Henke: ein Examinatorium in lateinischer Sprache über specielle Pathologie und Therapie, gerichtliche Medicin, die praktischen Übungen in der medicinischen Klinik des Krankenhauses und Poliklinik, specielle Pathologie und Therapie der Weiber- und Kinderkrankheiten. — Dr. Fleischmann sen.: Examinatorium über anatomische und physiologische Gegenstände, allgemeine menschliche Anatomie, allgemeine und besondere Physiologie. — Dr. Koch: Botanik und zwar Anatomie und Physiologie der Gewächse und beschreibende Botanik, letztere vorzugsweise in Hinsicht auf alle medicinischen Gewächse der Umgegend und des botanischen Gartens, botanische Excursionen, die Cultur der Obstbäume, hauptsächlich zum Unterrichte der Theologie Studirenden. — Dr. Leupoldt: allgemeine Patho-

logie und Therapie, Psychiatrie, den jatrophischen Verein. — Dr. Kosschitz: geburtschüssliche Klinik in Verbindung mit den Touchirübungen und den Manual- und Instrumentaloperationen am Fantom, Geburtskunde, Krankheiten der Wöchnerinnen und neugeborenen Kinder. — Dr. Wagner: über Zeugung und Entwicklung der organischen Körper, vergleichende Anatomie, allgemeine und medicinische Zoologie in Verbindung mit Zoonomie, Veterinärmedicin mit besonderer Rücksicht auf die Seuchen der Hausthiere. — Dr. Trött: Arzneimittellehre in Verbindung mit der pharmaceutischen Varenkunde, Gisthehre, Receptirkunst. — Dr. Fleischmann jun.: Angiologie und Neurologie, chirurgische Anatomie, Homöopathie, Repetitorien über Anatomie und Physiologie.

Die Vorlesungen über Chirurgie werden später besonders angekündigt werden. Die chirurgisch-äugenärztliche Klinik nimmt ihren ungestörten Fortgang.

### Philosophische Facultät.

Dr. Mehmert: Psychologie und Ästhetik. — Dr. Carl: Landwirthschafts- und Forstwissenschaft, Staatswirthschaft oder Nationalökonomie, die Polizeiwissenschaft in Verbindung mit dem Polizeirecht, Conversatorium über Polizei, Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. — Dr. Köppen: Examinatorium, praktische Philosophie, nämlich Naturrecht und Ethik, Geschichte der Philosophie. — Dr. Kaffner: encyclopädische Übersicht der gesammten Naturwissenschaft, Meteorologie, Experimentalphysik, Theorie der Chemie, analytische Chemie. — Dr. Böttiger: Geschichte der neuesten Zeit von 1789 an, Geschichte und Statistik von Baiern, Geschichte des römischen Volkes und Reichs. — Dr. Rücker: Hypopadesa, Arabisch oder Persisch, oder auch Armenisch. — Dr. Oberlein: Übungen des philologischen Seminars, den Thucydides, der philologischen Encyclopädie praktischen Theil mit Einschluß der Gymnasialpädagogik. — Dr. von Raumer: Geognosie, Mineralogie, Pädagogik mit besonderer Beziehung auf die Geschichte derselben. — Dr. Kopp: Geschichte der griechischen Philosophie, Seneca's Quaestiones naturales, Aristoteles Topica. — Dr. von Staudt: Clementarmathematik, algebraische Analysis. — Dr. Fabri: Technologie, Civilbaukunst, politische Rechnungskunst. — Dr. Drechsler: Genesie, als zweiten Cours des Arabismus einige poetische Stücke. — Dr. Winterling: deutsche Literatur, Interpretationsmethode und ihre verschiedene Anwendung auf alte und neue Schriftsteller. — Dr. Martinus: Experimentalpharmacie, Aräometrie. — Dr. Fritsch: Völkergeschichte. — Dr. Leutschner: über den Geh der Medicinen, Claudio und andere dramatische Dichtungen Goethe's, Andeutungen zur philosophischen Würdigung jener literarischen Werke, welche den merkwürdigen Einfluß auf die Entwicklung des Wissens und Lebens der europäischen Menschheit gehabt haben. — Dr. Hofmann: alttestamentliche Geschichte, wissenschaftliche Übersicht der allgemeinen Geschichte. — Eector Dr. Doignon: Les caractères de la Bruyère, französische Privatunterricht, französische Übungen und Conversatorien. — Eector Dr. Otto: Spanisch und Portugiesisch, Englisch oder Italienisch, Ungarisch.

Die Zeichenkunst lehrt Küster; die Tanzkunst Hübsch; die Reckunst Klingner; der Unterricht in der Fechtkunst wird seiner Zeit besonders bekannt gemacht werden.

Die Universitätsbibliothek ist jeden Tag (mit Ausnahme des Sonnabends) von 1—2, das Lesezimmer in denselben Stun-

den und Montage, Mittwochs von 1—3, das Naturalien- und Kunstkabinet Mittwochs und Sonnabends von 1—2 Uhr geöffnet.

# **N<sup>o</sup> I.** **Neuigkeiten und Fortsetzungen,** versendet von **F. A. Brockhaus in Leipzig.** **1838. Januar, Februar und März.**

1. Allgemeine Bibliographie für Deutschland. Eine Übersicht der Literatur Deutschlands, wie der bedeutendsten Schriften des Auslandes, nebst Angabe künftig erscheinender Werke und andern auf den literarischen Verkehr bezüglichen Mittheilungen und Notizen. Mit vollständigem Register. Ster Jahrgang. 1838. 52 Nummern. Gr. 8. 3 Thlr. Jahrgang 1836. 2 Thlr. 16 Gr.; Jahrgang 1837. 3 Thlr.
2. Bibliothek classischer Romane und Novellen des Auslandes. 27ter Band. — Auch u. d. Z.: Der verliebte Kaufel und Der Lord aus dem Steigrife. Zwei Novellen von Jacques Cazotte. Aus dem Französischen überf. von Eduard von Bülow. Mit einer Einleitung. Gr. 12. Geh. 16 Gr. Im vorigen Jahre erschienen von dieser Sammlung:  
**XXIII. XXIV.** Die Leiden des Persides und der Sigismunda von Gerantes, mit einer Einleitung von L. Tieck. 1 Thlr. 8 Gr. —  
**XXV. XXVI.** Die Verlobten von Manzoni, überf. von Bülow. Zweite, umgearbeitete Auflage. 2 Thlr.  
Die ersten 22 Bände kosten anstatt 13 Thlr. 5 Gr. zusammen nur **8 Thlr.**
3. Bilder-Conversations-Lexikon für das deutsche Volk. Ein Handbuch zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse und zur Unterhaltung. In vier Bänden. Mit bildlichen Darstellungen und Landkarten. Zweiter Band: F—L. 8te Lieferung. — Dritter Band: M—R. 3te Lieferung. Gr. 4. Geh. Jede Lieferung 6 Gr.
4. Blätter für literarische Unterhaltung. Jahrgang 1838. 365 Nummern. Nebst Beilagen. Gr. 4. 12 Thlr.
5. (Böttiger.) Literarische Zustände und Zeitgenossen. In Schilderungen aus Karl Aug. Böttiger's handschriftlichem Nachlasse. Herausgegeben von R. Böttiger. Erstes Bändchen. Gr. 8. Geh. 1 Thlr. 12 Gr.  
R. A. Böttiger's biographische Skizze (1837) 16 Gr.
6. Der Cavalier auf Reisen. Vom Verfasser der „Ansichten aus der Cavalierperspective im Jahre 1835“. Gr. 12. Geh. 1 Thlr. 20 Gr.  
Ansichten aus der Cavalierperspective, 2 Theile (Leipzig, Froberg, 1836), 2 Thlr.
7. Conversations-Lexikon der Gegenwart. 1tes Heft. Aa1—Underfen. Gr. 8. Preis eines Heftes von 10 Bogen auf Druck. 8 Gr., auf Schreibp. 12 Gr., auf Velinp. 18 Gr.  
Ein für sich bestehendes, in sich abgeschlossenes Werk, zugleich ein Supplement zur achten Auflage des Conversations-Lexikons sowie jeder früheren Auflage, aller Nachdrucke und Nachbildungen. Der Umfang ist nicht genau zu bestimmen, doch dürfte das Ganze 20—21 Bände nicht übersteigen.
8. **Neuigkeiten und Fortsetzungen** in allen Buchhandlungen zu erhalten.
9. Die Römische Curie im Kampf um ihren Einfluß in Deutschland, veranlaßt durch die Opposition des Erzbischofs von Köln gegen Preußen unter Mitwirkung des Roms und das Verdammungsurtheil des Hermes'schen Lehrsystems. Vom Verfasser der Schrift: „Der Erzbischof von Köln, seine Principien und Opposition.“ 8. Geh. 8 Gr.
10. Germann (Johann Peter), Geschichte. 8. Geh. 1 Thlr. 12 Gr.  
Germann's Gespräche mit Goethe, 2te Auflage (1837), 4 Thlr.
11. Ausführliche Encyclopädie der gesammten Staatsarzneikunde. Im Vereine mit mehreren Doctoren der Rechts-

gelahrtheit, der Philosophie, der Arzneiwissenschaft und Wundarzneikunst, praktischen Ärzten, Physikern und Chemikern bearbeitet und herausgegeben von **Georg Friedrich Most**. Für Gesetzgeber, Rechtsgelehrte, Polizeibeamte, gerichtliche Ärzte, Wundärzte, Apotheker und Veterinärärzte. Ersten Bandes erstes und zweites Heft. (Aa1—Entbindungsanstalt.) Gr. 8. Subscriptionspreis eines Heftes von 12 Bogen 20 Gr.

11. Ergänzungen der Allgemeinen Gerichtsordnung und der allgemeinen Gebührenarten für die Gerichte, Justizcommissarien und Notarien in den preussischen Staaten, des Stempelgesetzes, Salarienverordnungen, sammt der Instruction für die Verrechnungskammer, wie auch die Verordnungen der General-Commissionen u. s. w. Herausgegeben von F. v. v. Strombeck. Viertes Band. Enthaltend die Nachträge zur dritten Ausgabe derselben, bearbeitet und bis auf die neueste Zeit fortgeführt von Ferdinand Leopold Emden. Gr. 8. Druck. 1 Thlr. 4 Gr. Schreibp. 1 Thlr. 12 Gr. Erster bis dritter Band folgten allein auf Druck. 5 Thlr. 16 Gr., auf Schreibp. 7 Thlr. 12 Gr.; alle vier Bände zusammen jetzt auf Druck. nur **4 Thlr. 16 Gr.**, auf Schreibp. **7 Thlr. 12 Gr.**
12. **Ersch (Johann Samuel)**, Literatur der vermischten Schriften seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit; systematisch bearbeitet und mit den nöthigen Registern versehen. Neue fortgesetzte Ausgabe von **Chr. A. Geissler**. (Aus der neuen Ausgabe des Handbuchs der deutschen Literatur besonders abgedruckt.) Gr. 8. 20 Gr.  
Ersch, Handbuch der deutschen Literatur. 4 Bände. Neue von verschiedenen Mitarbeitern besorgte Auflage. 1822—38. 12 Thlr.
13. **Rund (3.)**, Erinnerungen aus meinem Leben in biographischen Denkwürdigkeiten und andern Mittheilungen. Zweiter Band. — Auch u. d. Z.: Aus dem Leben zweier Schauspieler: August Wilhelm Jffland's und Ludwig Derivatis. 8. Geh. 1 Thlr. 12 Gr.  
Erster Band: C. A. W. Hoffmann und F. S. Weßel (1836), 1 Thlr. 16 Gr.
14. **Heering (Gustav von)**, Meine Reise nach Portugal im Frühjahr 1836. Zwei Theile. 8. Geh. 3 Thlr. 12 Gr.
15. **Hille (Carl Christian)**, Die Bäder und Heilquellen Deutschlands und der Schweiz. Drittes Heft. — Auch u. d. Z.: Die Bäder und Heilquellen Schlesiens und der Grafschaft Glatz. Für Brunnens- und Badereisende. Mit zwei Karten. 8. Geh. 16 Gr.  
1tes Heft: Brunnens- und Baderstatistik, 12 Gr.; 2tes Heft: Bäder und Heilquellen in Böhmen und Mähren, 20 Gr.
16. **Jfis**, Encyclopädische Zeitschrift, vorzüglich für Naturgeschichte, vergleichende Anatomie und Physiologie von Den. Jahrgang 1838. 12 Hefte. Mit Kupfern. Gr. 4. 8 Thlr.
17. **Kannegieser (Carl Ludwig)**, Deutsches Declamatorium. In drei Theilen. 8. Geh. 2 Thlr.  
Die einzelnen Theile unter den besondern Titeln:  
18. —, Deutsches Declamatorium für das erste Jugendalter, insbesondere für Elementarschulen und die unteren Classen der Bürgerschulen und Gymnasien. 8. Geh. 8 Gr.  
19. —, Deutsches Declamatorium für das mittlere Jugendalter, insbesondere für die höhern Classen der Bürgerschulen und die mittleren Classen der Gymnasien. 8. Geh. 12 Gr.  
20. —, Deutsches Declamatorium für das reifere Jugendalter, insbesondere für die oberen Classen der Gymnasien. 8. Geh. 1 Thlr. 4 Gr.
21. Leipziger Kreisblatt. Zweiter Jahrgang. 1838. 156 Nummern. Gr. 4. 2 Thlr.
22. Das Pfenning-Magazin für Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse. Sechstes Jahrgang. 1838. 52 Nummern. (Nr. 249—300.) Mit vielen Abbildungen. Schmal gr. 4. 2 Thlr.
23. Das Pfenning-Magazin für Kinder. Fünftes Jahrgang. 1838. 52 Nummern. Mit vielen Abbildungen. Kl. 4. 1 Thlr.
24. Die römisch-hierarchische Propaganda, ihre Partei, Umtriebe und Fortschritt in Deutschland. Mit Rückblicken auf die Opposition des Erzbischofs von Köln nach unumstößlichen

Handfachen geschildert vom Verfasser der Schrift: „Der Erzbischof von Köln, seine Principien und Opposition.“ 8. Geh. 8 Gr.

25. Kauer (Karl von), Beschreibung der Erdoberfläche. Eine Vorschule der Erdkunde. Dritte verbesserte Auflage. Gr. 8. 4 Gr.

Des Verfassers „Lehrbuch der allgemeinen Geographie“, 2te Auflage, 1830, kostet 1 Thlr. 12 Gr.

26. Repertorium der gesammten deutschen Literatur. (5ter Jahrgang, für das Jahr 1833.) Herausgegeben im Verein mit mehreren Gelehrten von Ernst Gotthelf Gersdorf. (Beigegeben wird: Allgemeine Bibliographie für Deutschland.) 15ter Band in 6 Heften. Gr. 8. Jeder Band etwa 50 Bogen in 14tägigen Heften. 3 Thlr.

27. Schütze (Ernst), Die bezauberte Rose. Romantisches Gedicht in drei Gesängen. Sechste Auflage. 8. Geh. 1 Thlr. Ausgabe mit 7 Stahlstichen. Cart. 2 Thlr. Ausgabe in gr. 8. mit 7 Stahlstichen. Velinp. Cart. mit Goldschnitt. 2 Thlr. 12 Gr.

28. Skizzen aus dem Alltagsleben. Aus dem Schwedischen. Erstes Bändchen. — Auch u. d. T.: Die Töchter des Präbenten. Erzählung einer Gouvernante. Aus dem Schwedischen. 8. Geh. 1 Thlr. 16 Gr.

29. Sternberg (A. von), Fortunat. Ein Feenmärchen. Zwei Theile. 8. Geh. 3 Thlr. 18 Gr.

30. Tieck (F.), Bunte Skizzen aus Ost und Süd. Entworfen und gesammelt in Preußen, Rußland, der Türkei, Griechenland, auf den ionischen Inseln und in Italien. Zwei Theile. Mit einer Musikbeilage. 8. Geh. 5 Thlr.

31. Wegel's (F. G.) gesammelte Gedichte und Nachlaß. Herausgegeben von J. Gund. 8. Geh. 2 Thlr. 8 Gr.

32. Allgemeine medicinische Zeitung. (Herausgeber: Dr. Karl Pabst.) Jahrgang 1833. 104 Nummern. Gr. 4. 6 Thlr. 16 Gr.

33. Leipziger Allgemeine Zeitung. Jahrgang 1833. 365 Nummern nebst täglichen Beilagen. Hoch 4. Pränumerationspreis vierteljährlich 2 Thlr. 12 Gr.

In der Unterzeichneten ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Unleitung zum praktischen Ackerbau

von  
Joh. Nep. von Schwerz.

Drei Bände.

Mit 15 lithographirten Tafeln.

Zweite vermehrte, mit dem Bildniß des Verfassers geschmückte Auflage.

Preis 6 Thlr. 16 Gr., oder 10 Fl. 48 Kr.

Der dritte Band führt den besondern Titel:

## Unterriht für Anfänger in der Landwirthschaft über

Natur, Wahl und Werth aller bekannten Feldsysteme oder Fruchtfolgen.

Es ist gewiß überflüssig, bei der zweiten Auflage dieser Schrift sich über ihren Inhalt und ihren Werth zu verbreiten, da diese jedem gebildeten Landwirth Deutschlands bereits bekannt sind. Auch außerhalb der Grenzen unsers Vaterlandes findet sie immer mehr Anerkennung. Besonders hat der dritte Band, welcher die Feldsysteme oder Fruchtfolgen umfaßt, diese wichtige Materie auf eine bis jetzt unübertroffene Weise erschöpft und sich daher des allgemeinsten Beifalls zu erfreuen; im Jahr 1831 erschien zu Metz eine von E. und F. Willeroy unternommene Uebersetzung desselben ins Französische und im Jahr 1834 veranstaltete die petersburger Landwirthschaftsgesellschaft eine Uebersetzung in die russische Sprache.

Vermehrt ist diese zweite Auflage durch das Bildniß, ein Facsimile der Handschrift, ein Vorwort und eine kurze Biographie des berühmten Verfassers; dessenungeachtet wurde der Preis des Werks von 14 Fl., was die erste Auflage gekostet, auf 10 Fl. 48 Kr. ermäßigt.

In dem Vorworte verabschiedet sich der ehrwürdige 77jährige Veteran von dem landwirthschaftlichen Publicum und entzieht ihm dadurch die Hoffnung, die Lehre vom Anbau der Gewerbspflanzen von seiner Hand unmittelbar zu erhalten; dagegen gibt er die Versicherung, daß Herr Oekonomierath Pabst in Darmstadt, welchem er seine sämtlichen Notizen und Erfahrungen sowohl über jene als über verschiedne andere landwirthschaftliche Gegenstände eingehängt habe, dieselben ordnen und in einem vierten Band des vorliegenden Werks herausgeben werde.

Stuttgart und Tübingen, im März 1833.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

## Das Pfennig-Magazin

für Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse.

1838. März. Nr. 257 — 261.

Nr. 257. \*Das Rathaus in Neuport. Das Neueste aus der Natur- und Gewerbswissenschaft. (Fortsetzung.) Der Handel zwischen Indien und Arabien. \*Die Rose von Jericho. Chinesisches Porzellan. Anekdote. Die Borax-Lagunen in Toscana. Wahrheitsliebe der Engländer. \*Christus als Lehrer. — Nr. 258. \*Innsbruck. Das Neueste aus der Natur- und Gewerbswissenschaft. (Fortsetzung.) Gelehrtheit des Stiers. Ein Abenteuer unter den Indianern von Guiana. — Nr. 259. \*Maribit. Die Thugs oder die Mordgesellschaft in Indien. Wohlthätige Anstalten in Konstantinopel. \*Militairische Orden in Frankreich. Das Neueste aus der Natur- und Gewerbswissenschaft. (Fortsetzung.) \*Die Uhr im Straßburger Münster. — Nr. 260. \*Die unterirdischen Gewölbe von Elora. Das Neueste aus der Natur- und Gewerbswissenschaft. (Schluß.) Gefängnisse in Konstantinopel. Die Bugis in Celebes. \*Kupferminen in Cornwall. — Nr. 261. \*Die Elancos in Südamerika. Canada. \*Darstellungen aus dem Leben der alten Römer. Schwammfischerei. Bettelrei in Irland. Der große Atlas, eine Fabel.

Die mit \* bezeichneten Aufsätze enthalten eine oder mehrere Abbildungen.

Preis dieses Jahrgangs von 52 Nummern 2 Thlr. — Der erste Jahrgang von 52 Nrn. kostet 2 Thlr., der zweite von 52 Nrn. 1 Thlr. 12 Gr., der dritte von 52 Nrn. 2 Thlr., der vierte von 52 Nrn. 2 Thlr., der fünfte von 52 Nrn. 2 Thlr.

Leipzig, im April 1838.

J. A. Brockhaus.

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden:

### Neden und Vorträge

über

Gegenstände aus dem Gebiete

der

## Naturforschung

von

Karl Fr. Ph. v. Martins.

8. Preis 1 Thlr. 12 Gr., oder 2 Fl. 24 Kr.

Inhalt: Neden zu Linne's Gedächtniß. — Über den philosophischen Gehalten in Linne's Werken. — Aus Linne's Rede vor dem Könige von Schweden. — Die Stufenalter des Menschenthums. — Vom möglichen Einflusse der Natur auf den Menschen. — Die Leiden und Freuden des Naturforschers. — Linne'sche Lieder und Vitanel. — Vier Vorträge über die Metamorphose der Pflanzen. — Die Seele der Pflanzen. — Die Unsterblichkeit der Pflanze. — Die Anforderung der Zeit an den Naturforscher.

Der Herr Verfasser behandelt hier mehr Gegenstände von hohem allgemeinem Interesse. Seiner Darstellung liegt überall eine begeisterte Ansicht von der Natur zum Grunde, und er sucht die Beziehungen zwischen der physischen und moralischen Welt hervorzuheben.

Der Erlös des Werthens ist für die Unterstützung von Waisen an der Cholera Verstorbenen bestimmt.

Stuttgart und Tübingen, im März 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden:

## Lehrbuch

der

## speciellen Technologie,

vornämlich zum Gebrauch

auf Universitäten und in andern Lehranstalten.

Nach dem jetzigen Zustande  
der Naturwissenschaften und den neuesten  
Erfindungen und Entdeckungen

bearbeitet von

Joh. Heinr. Moritz von Poppe,

Doctor der Philosophie und Staatswissenschaft, Prof. der Technologie  
auf der Universität Tübingen, Ritter u. c.

Zweite sehr vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit 6 Steinbrustafeln.

Gr. 8. Preis 3 Thlr. 8 Gr., oder 5 Fl. 24 Kr.

Die erste Auflage dieses Lehrbuchs der speciellen Technologie hatte bald nach ihrem Erscheinen das Glück, nicht bloß auf vielen Universitäten (in einer italienischen Übersetzung auch in Padua), sondern auch in andern Lehranstalten als Compendium mit Nutzen gebraucht zu werden. Seit dem Erscheinen der ersten Auflage sind aber fast alle technischen Gewerbe mit gar vielen wichtigen neuen Erfindungen und Entdeckungen bereichert, und überhaupt sind sie sehr vervollkommen worden. Dieses Neue und Bessere findet man nun in der zweiten Auflage, welche zugleich mit ganz neuen Abschnitten und zu genauerer Erläuterung der abgehandelten Gegenstände, mit vielen Abbildungen auf 6 Steinbrustafeln versehen ist. Die Unterzeichnete darf wohl hoffen, daß aus diesen Gründen, sowie wegen des immer mehr wachsenden Interesses, das die Welt heutiges Tages an der Technologie nimmt, und wegen der vielen neu errichteten Gewerkschulen und anderer technologischer Lehranstalten, die zweite Auflage eine noch weitere Ausbreitung finden werde, als die erste.

Stuttgart und Tübingen, im März 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Fortsetzung zu Bignon's Geschichte  
von Frankreich.

## HISTOIRE DE FRANCE,

depuis

le 18 Brumaire (Novembre 1799),  
jusqu'à la paix de Tilsitt (Juillet  
1807).

Par M. BIGNON.

Édition originale. Paris et Leipzig.

Tome septième. In-8. 2 Thlr.

Mit Band 7 beginnt die zweite Serie dieses Werkes, dessen erste sechs Bände bereits im Jahre 1830 erschienen, und werden demselben noch drei folgen, welche die Geschichte Frankreichs bis zum Jahre 1812 fortführen.

Eine dritte Serie, die neueste Zeit umfassend, ist vom Verfasser später zu liefern versprochen.

Leipzig, im April 1838.

Brockhaus & Wennerius,

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XV.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Zeile 2 Gr.

## Conversations - Lexikon der Gegenwart.

Ein

für sich bestehendes und in sich abgeschlossenes Werk,  
zugleich ein Supplement  
zur achten Auflage des Conversations-Lexikons,  
sowie zu jeder frühern,  
und zu allen Nachdrucken und Nachbildungen desselben.

Gr. 8. In Heften von zehn Bogen.

Preis eines Heftes:

Auf weißem Druckpapier	8 Groschen.
Auf gutem Schreibpapier	12 Groschen.
Auf extrafeinem Belinpapier	18 Groschen.

Leipzig, bei F. A. Brockhaus.

Die allgemeine Theilnahme, welche das **Conversations-Lexikon der neuesten Zeit und Literatur** von 1832 gefunden, gab der Verlagshandlung Veranlassung, schon im Nachwort am Schlusse dieses Werkes zu bemerken, daß der hier abgerissene Faden künftig wieder aufgenommen, und in einer dazu geeigneten Form ein neuer Spiegel der Zeit aufgestellt werden solle.

Jahre sind seitdem verflossen; eine neue Auflage (die **achte**) des **Conversations-Lexikons**, das trotz aller Concurrenz in immer weitem Kreise Verbreitung gefunden hat, ist beendet worden und in diese das **Conversations-Lexikon der neuesten Zeit und Literatur** seinem wesentlichen Inhalte nach übergegangen. Es hat demnach dieses Werk aufgehört, ein nothwendiges Supplement des **Conversations-Lexikons** zu sein, obgleich es als ein treues Abbild jener aufgeregten Zeit von 1830 nicht bloß in Hinsicht der geschilderten Begebenheiten, Zustände und Personen, sondern auch durch die Art und Weise der Darstellung selbst, in welcher sich nicht minder deutlich die Zeit seines Erscheinens ausprägt, einen bleibenden Werth behalten wird.

Dringend stellt sich bei den immer raschen Fortschritten in der Entwicklung des gesellschaftlichen Zustandes und bei der immer lebendigeren Theilnahme, welche die Zeitgenossen dieser Entwicklung widmen, das Bedürfnis wieder heraus,



die Masse der Begebenheiten, die die jüngste Vergangenheit bewegt, und die Resultate, welche während dieser Zeit in Wissenschaft, Kunst und praktischem Leben erstrebt wurden, in einem lebendigen Bilde vorgeführt zu sehen. Diesem Bedürfnisse soll das

## Conversations-Lexikon der Gegenwart

dienen, das in Anlage und Form mit der achten Auflage des Conversations-Lexikons übereinstimmend,

### ein für sich bestehendes Ganzes

bildet, insofern alle darin enthaltenen Artikel in sich abgeschlossene Darstellungen sind, das aber zugleich die achte Auflage des **Conversations-Lexikons** namentlich was die **neueste Zeit** betrifft, ergänzt und somit den Besitzern dieser, sowie aller früheren Auflagen, aller Nachdrucke und Nachbildungen desselben, als ein

### unentbehrliches Supplement

sich darbietet.

In dem **Conversations-Lexikon** kann die Geschichte, selbst der neuesten Zeit, nur in allgemeinen Umrissen gezeichnet, die staatswissenschaftlichen Entwicklungen und andere Erörterungen interessanter Fragen können nur in ihren Resultaten gegeben, eine Menge Gegenstände nur im Allgemeinen berührt und nur die ausgezeichnetsten Persönlichkeiten biographisch geschildert und charakterisirt werden. Das neue Werk wird als Supplement in allen den berührten und vielen andern Beziehungen das Hauptwerk ergänzen und bis zur **Gegenwart** fortführen; es wird aber als ein selbstständiges Werk nicht immer da beginnen, wo das Hauptwerk aufhört; es wird die historischen Darstellungen nicht grade von dem Punkte aus fortsetzen, der ihnen in dem Hauptwerke als Grenze gesetzt ist; es wird im Gegentheile immer bis zu dem Punkte zurückgehen, ohne dessen Berührung die Gegenwart nicht vollkommen verstanden werden kann.

Das **Conversations-Lexikon der Gegenwart** wird Alles umfassen, was in der neuesten Zeit in irgend einer Richtung bedeutend hervorgetreten ist. Es wird in Beziehung auf das **Conversations-Lexikon der neuesten Zeit und Literatur** von 1832 gleichsam ein zweites Zeitbild sein; wie jenes die Zeit von 1829 an schilderte, so ist dieses bestimmt, die Gegenwart zu schildern, und ein frisches aus dem Leben gegriffenes Bild derselben zu geben. Es wird mit einem Worte Alles enthalten, was dem Gebildeten zum Verständniß der **Gegenwart** dient, und auf diese Weise als einen treuen und besonnenen Führer und Berather im Gedränge der Ereignisse sich zu bewähren suchen. Der Standpunkt aber, von welchem dasselbe ausgeht, kann kein anderer sein, als der **liberale** — im edlen Sinne des Wortes —, denn anständige **Freimüthigkeit** ist die allgemeine Forderung und das Lösungswort der Gegenwart.

Der Verlagsbandlung ist es gelungen, in den meisten europäischen Staaten für die betreffenden geschichtlichen Artikel Männer zu gewinnen, die die Verhältnisse genau kennen und mit unbefangenen Auge beurtheilen. Ebenso hat sie hinsichtlich der Artikel aus dem Gebiete der Wissenschaft, der Kunst und des praktischen Lebens sowie der Biographien der thätigsten Mitwirkung der namhaftesten und hinsichtlich der Darstellungsweise gewandtesten Fachgelehrten, Kunstkenner und Techniker sich versichert. Was endlich die zur Bearbeitung der Biographien nöthigen Materialien betrifft, so haben sich fast durchgehend mit großer, dankbar zu erkennender Bereitwilligkeit die zuverlässigsten Quellen eröffnet. Die Verlagsbandlung darf demnach hoffen, ihren Plan auf das befriedigendste ausführen und nicht nur ein nütziges und tüchtiges **Werk zum Nachschlagen**, sondern auch zugleich ein namentlich durch gewandte Darstellung anziehendes **Lesebuch** liefern zu können.

Die Reichhaltigkeit des neuen Werks einigermaßen zu bezeichnen, lassen wir das Verzeichniß einiger der **bedeutendsten und interessantesten Artikel aus dem Buchstaben A** folgen:

**Abarca** (Bischof von Leon, Minister des Don Carlos) — **Abbas Mirza** (der früh verstorbene Thronfolger in Persien) — **Abd-el-Kader** (das Haupt der Beduinenstämme in Alger) — **Abel** (bairischer Staatsrath) — **Abolition** (rechtl. Entwicklung und die Bestimmungen darüber in den neuern Constitutionen) — **Abtrante** (die fruchtbarste Schriftstellerin der Gegenwart) — **Abstraktionismus** (zur Beurtheilung der verschiedenen Ansichten) — **Acerverwendung** (historische Darlegung; Untersuchung derselben) — **Actienwesen** (allseitige Betrachtung der Vortheile und Nachtheile) — **Adel und Bürger** (Gestaltung der Verhältnisse in neuer Zeit) — **Afrika** (ein Zeitbild des Landes und seiner Bewohner) — **Aguado** (der pariser Bankier) — **Ägypten** (Gestaltung des Landes unter Mohammed Ali und Ausfahrten) — **Almadada** (Mitglied des Regentenschaats in Spanien) — **Alava** (spanischer General) — **Albrecht** (einer der sieben göttlicher Professoren) — **Algier** (Verhältnisse, neueste Geschichte, Ausichten) — **Allard** (Feldher der Rundschüt Eingh) — **Almodovar** (spanischer Staatsmann) — **Altan** (banoverscher Kreisminister, ehemaliger Chef der deutschen Legion) — **Alterthumsvereine** — **Alvensleben** (preussischer Finanzminister) — **Amerika** (topographisches Bild des gegenwärtigen Zustandes) — **Amberg** (Finanzdirector in Braunschweig) — **Andersen** (der dänische Dichter) — **Andorra** (Verhältnisse dieser alten Republik in den Pyrenäen) — **Anhalt** (Geschichte der drei originalen dänische Reiches) — **Appropriationsclausel** (Bedeutung, Geschichte) — **Apriunenden und Aprilproceß** — **Archäologie** (gegenwärtiger Stand der Wissenschaft) — **Archivwesen** (geschichtlich und anregend) — **Argelander** (Astronom) — **Argentanfabrikate** (im Allgemeinen, Schädlichkeit derselben) — **Aristokratie und Liberalismus** (im Lichte der Gegenwart aufgeführt) — **Armandsberg** (Mitglied der Regentenschaft in Griechenland) — **Arnoldi** (Begründer der Lebensversicherungsanstalt für Deutschland) — **Arriaga** (spanischer Dichter) — **Aschbach** (Geschichtsforscher) — **Asiatische Gesellschaft** — **Asien** (gegenwärtiger Zustand) — **Assicurazioni** (See und Charakter in neuer Zeit) — **Associationen** (die Arbeiter und Handwerkervereine in England, Frankreich und in der Schweiz) — **Asperitz** (Fortbildung derselben in neuer Zeit) — **Äthen** (Bild der Residenz)

Das **Conversations-Lexikon der Gegenwart** wird, um die Artikel, da sie sich auf die Gegenwart beziehen, bald nach ihrer Abfassung in das Publicum zu bringen und die Anschaffung zu erleichtern, in **Heften von 10 Bogen**

zu dem Preise:

auf weißem Druckpapier 8 Gr.,  
auf gutem Schreibpapier 12 Gr.,  
auf extrafeinem Velinpapier 18 Gr.,

ausgegeben werden. Der Umfang läßt sich, da die Zeit stets Neues bringt, nicht genau bestimmen, indes werden wol 20 — 24 Hefte zu einer genügenden Ausführung des Plans hinreichen. Die Hefte sollen sich so rasch folgen, als die auf die Bearbeitung und Redaction zu wendende Sorgfalt es irgend gestattet.

**Das erste Heft ist bereits erschienen und in allen Buchhandlungen zur Ansicht zu erhalten.**

Leipzig, im April 1838.

**J. A. Brockhaus.**

In der Unterzeichneten ist erschienen und an alle Buchhandlungen verandt worden:

## **Polytechnisches Journal,**

herausgegeben  
von den

**DD. Dingler und Schultes.**

Erstes Februarheft.

**Inhalt.** Zur Geschichte der Journen von'schen Kreiselräder. **Rathen,** über Averb's rotirende Dampfmaschine. **Babbety,** über metallene Benille für Feuerpfeilen. **Mit Abbild.** Beschreibung eines neuen Bahnes von der Erfindung des Hrn. Haller in Paris. **Mit Abbild.** Derselbe, über einen Universal-Centrirungen. **Mit Abbild.** Derselbe über eine Modification der sogenannten Rosenmachine für Dreher. **Mit Abbild.** Beschreibung der neuen mechanischen Lampe des Hrn. Leroy in Paris. **Mit Abbild.** Voole's Verbesserungen an den Geschützen und Feuergewehren. **Mit Abbild.** Chamber und Hall's Verbesserungen an den Pumpen. **Mit Abbild.** Springalls Verbesserungen an den Hufeisen für Pferde und andere Thiere. **Mit Abbild.** über die zum Spannen der Wandraute und Verbunden dienende Vorrichtung der Herren Brüder Drouault, und über deren Kettenraute. **Mit Abbild.** über Hrn. Gagal's Verbesserungen an den Verbesserungen der Regenschirme. **Mit Abbild.** Bericht des Hrn. Amédée Durand über eine von Hrn. Guillin erfundene Maschine zum Seidenhospeln, Compteur à régulateur transposable genannt. **Mit Abbild.** Scantgatt's Beschreibung eines mit Steinkohlen zu heizenden Hypocausts. **Mit Abbild.** Wde's Beschreibung eines Anemometers zum Messen der Unterschiede in der Windgeschwindigkeit. **Mit Abbild.** Karmarsch, über das Schwinden der Metalle beim Gießen. Neumann's Verbesserungen in der Fabrication von eisenlaurem Kali und Natron. **Mit Abbild.** Spence's Verfahren zur Bereitung von Berlinerblau und eisenlaurem Kali aus dem Kaltwasser der Steinkohlengasfabriken. Richardson's Untersuchungen über die Zusammenfügung der Steinkohlen. Bericht des Hrn. Gustav Schwarz über das Baratsgrün oder den olivengrün gefärbten Indigo aus Kalkutta. über eine von Charles Brompton Goathupe erfundene Verbesserung in der Glasfabrication. Bericht über Bonville's Apparat zum Wiltren des Wassers, von Hrn. Krato. Le Contours neuer Pfalz zum Ausgeben der Kartoffeln. Miscellen. Englische Patente. John Reynolds über Eisenbahnen. Erster vollendeter Thymse-Tunnel. Einrichtmaschine für Kupferstiche und Steindrucker. Kaffeeapparate des Hrn. Ritter Delacour. Maschine zum Aufheben von Kleibern. Sicherheitsmaße für Gießer. über einige mit Brenngläser angefeuchtete Brände. Selbstentzündung des eingetrockneten Reindols. über

die nachtheilige Anwendung von Arsenik bei den Kerzen. über die Anwendung von Wismuthoxyd bei Kerzen. über künstliche Kälterzeugung. Dr. Glanny's Telegraph. Die elektrische Telegraphie schon vor 50 Jahren bekannt. über die Behauptung, daß Eisen durch Zinn gegen Oxydation im Salzwasser geschützt werde. Crane's Hohefenbetrieb mit Anthracit. über die Pottfongfabrik des Hrn. Pichinay. Nachtheilige Wirkung des Braunkohlensaures. Bereitung des salpetersauren Barvts nach Duflos. Simonin's Methode zur Bereingung des Kochsalzes. Simonin's Apparat zur Bereitung gasförmiger Wasser. Gogens Methode vegetabilische Die zu reinigen. Jungem Franzos brandtwein die Eigenschaften von altem zu geben. Micou's wasserfestes geschmeidiges Leder. Vorschrift zur Übertragung eines Kupferstiches auf Holz. Kupferstiche, Lithographien u. zu illuminiren und ihnen den Glanz von Gemälden zu geben. Neue Methode metallene Druckformen u. zu verfertigen. Zur Kenntniß der Krappsorten und Beiträge zur Krappfärberei. Wie man Milchpfund und Käse in den Ställen Bewegung verschaffen kann. Die Schweinemästungsanstalt in Boston.

**Zweites Februarheft.**

Potters neue Schießpulvermaschine. **Mit Abbild.** Beschreibung eines von Hrn. W. Hamphorn erfundenen Eisenbahnreigners. **Mit Abbild.** über Hobelmaschinen und Drehbänke, von Edward Sang. Bondest verbesserte Methode Räderfahrwerke fortzuschaffen. **Mit Abbild.** Aufstins verbesserte Methode versunkene Schiffe und andere Gegenstände emporzuschaffen. **Mit Abbild.** Baddelen, über einen Fehel zur Verbindung von Feuer- und Sturmleitern. **Mit Abbild.** über den verbesserten Federhalter des Hrn. Kiddle. **Mit Abbild.** Bootcoats verbesserte Methode verschiedene Waaren zu weben, und Verbesserungen an den hierzu dienenden Maschinen. **Mit Abbild.** Rapier's Verbesserungen im Letterndruck. **Mit Abbild.** Eine Goldlegierungswage, erfunden von Ferd. Dohsche. **Mit Abbild.** Deatin, über einen verbesserten Hohefen. **Mit Abbild.** über die Anwendung kalter Luft, um gleichem Eisen seine Hitze zu erhalten. Lutyng's Verbesserungen an den Apparaten zur Zersetzung des Kochsalzes und in der Art und Weise sich ihrer zu bedienen. **Mit Abbild.** Elkington's neue Versahrungsarten zum Vergolden des Kupfers, Messings und anderer Legirungen. **Mit Abbild.** (Verfahren, um die Metalle mit Platin zu überziehen. Verfahren das mit Platin überzogene Kupfer, Messing u. zu vergolden. Verfahren gewisse Metalle mit einer Gold- und einer Quecksilberauflösung zu vergolden. Apparat zum Abdampfen des goldhaltigen Aufschwaffers.) Braronat, über die Aufbewahrung frischer Gemüse. Neumann, über die bei der Zuckerrabrication aus einheimischen Gewächsen hinsichtlich der Erzeugungskosten zu berücksichtigenden Umstände. A. Zuckerrabrication aus Runkelrüben. 1) Beschaffenheit und Bestandtheile

der Runkelrüben. 2) Wie viel und in welcher Beschaffenheit der Zucker aus den Runkelrüben erhalten wird. 3) Ertrag des Bodens aus Runkelrüben. 4) Wie viel Brennmaterial zur Darstellung des Zuckers aus Runkelrüben erforderlich ist. 5) Allgemeine Erfordernisse und Erzeugungskosten bei der Fabrication des Zuckers aus Runkelrüben. B. Zuckersfabrication aus Kürbis. 1) Beschaffenheit, Verarbeitung und Ertrag des Bodens. 2) Erforderliches Brennmaterial. 3) Erzeugungskosten des Kürbiszuckers. C. über die Gewinnung von Rohzucker aus dem Safte der Akerarten. 1. über die Gewinnung von Rohzucker aus dem Safte des Mais. E. über Zuckerverbereitung aus dem Traubensaft. über eine ökonomische Bereitungsart des Kreofofs und seine technische Anwendung, von Andreas Czgi. über die Bereitung des Kalks aus, von T. G. Gentile. über zwei besondere Seifenarten, von Hrn. Girardin. über einen sehr leicht und schnell darzustellenden geistigen Copalfirmig, von R. Böttger. über den Großstein Apparat zum Erhitzen der Luft beim Schmieden. Mit Abbild. Miscellen. Englische Patente. Guy's Methode vollkommen sphärische Kugeln aus Metallglas u. zu verfertigen. über Hrn. Claghet's Verbesserungen an den Lampen. Houzeau-Muiron's wasserdichte und gedruckte Leuchte. Vorschlag zu einem Aufstrich für Canoes, Segeltuch u. dgl., um es wasserdicht und dauerhafter zu machen. über den Einfluss der Elektricität auf Brauprocess. über die besonders für Zuckerraffinerien zu empfehlende Luftaufsaugungsmaschine des Hrn. Anton Schmid in Wien. Verbrauch von Zucker in Europa im Jahre 1836. über die Anwendung des Sechsmalzuckers zur Verbesserung des Weines. über das Pflastern mit Erdbarz. über die beweglichen Reifen des Hrn. Plaiere Gasnob.

Von diesem sehr gemeinnütigen und wohlfeilsten Journal erscheinen vier bisher monatlich zwei Hefte mit Kupfern. Der Jahrgang, aus 24 Heften mit 24—36 Kupferplatten bestehend und welcher mit einem vollständigen Sachregister versehen wird, macht für sich ein Ganzes aus und kostet durch die Postämter und Buchhandlungen nur 9 Thlr. 8 Gr., oder 16 fl. In das Abonnement kann nur für den ganzen Jahrgang eingetret werden.

### Die Verlagshandlung kann vom Polytechnischen Journal

noch einige ganz vollständige Exemplare, welche sie aufgekauft hat, und zwar 1ster bis 18ter Jahrgang zu 168 Thln., oder 288 fl. anbieten. Die Jahrgänge 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1826 bis 1837 sind fortwährend einzeln zum Preise von 9 Thlr. 8 Gr., oder 16 fl., zu haben.

Stuttgart und Tübingen, im März 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Seben ist bei uns erschienen und in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes vorräthig der erste Band der neuen Ausgabe von

## Gotthold Ephraim Lessing's sämmlichen Schriften,

herausgegeben von Karl Achmann.

Zwölf Bände in Großoctav auf Velinpapier mit Lessing's Portrait in Stahlstich. Subscriptionspreis 12 Thlr.

Wir übergeben hiermit dem deutschen Publicum diese neue, sehr verbesserte, correcte Ausgabe der Lessing'schen Schriften, als erste dieses großen Mannes würdige; für die äußere Ausstattung haben wir alle Sorgfalt verwendet und wird dieselbe gewiß allen Anforderungen entsprechen. Die folgenden Bände sind unter der Presse und werden möglichst schnell erscheinen. Prospecte sind in allen Buchhandlungen zu haben.

Berlin, im März 1838.

Wag'sche Buchhandlung.

In der Unterzeichneten ist seoben erschienen und an alle Buchhandlungen verandt worden:

## Guter Rath

beim

## An- und Verkauf von Land- gütern

von J. G. Elsner.

8. In Umschlag broschirt. Preis 1 Thlr. 4 Gr., oder 2 fl. Mißgriffe bei Kauf und Verkauf von Gütern haben nur allzu oft schon großes Unheil gestiftet und den Grund zum Untergange ganzer Familien gelegt. Wie man solchen am sichersten entgehe, dazu gibt das hier angezeigte Werkchen Anleitung. Nützlich aus dem Leben entlehnt und klar und erschöpfend ist der Gegenstand gegeben. Sonach kann es wol mit vollem Recht eine werthvolle und dankenswerthe Gabe des verdienten Verfassers genannt werden.

Stuttgart und Tübingen, im März 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

An alle Buchhandlungen wurde seoben verandt:

J. F. Grulich, über die **Ironien in den Reden Jesu**; noch ein Beitrag zu seiner Charakteristik. Gr. 8. Leipzig, bei A. Wien's brad. Geh. Preis 18 Gr.

Der allen Theologen gewiß höchst interessante Gegenstand selbst, sowie die klare und umsichtige Darstellung und die von tiefer Religiosität durchdrungene Sprache des bekannten und geachteten Verfassers lassen sich erwarten, daß diese Schrift recht viele Leser finden werde.

## Erdbeschreibung.

## Abrégé de Géographie

physique, historique, politique ancienne et moderne, contenant un extrait méthodique du précis de la géographie universelle, divisé en deux parties, celle des principes et celle des

descriptions, par

**MALTE-BRUN,**

précédé de l'histoire de la géographie et des découvertes des principaux voyageurs jusqu'en 1837, et suivi d'un aperçu de la géographie

ancienne, par

**Larenaudière;**

les principes généraux de géographie astronomique, physique et politique, par

**Adrien Balbi.**

**Deuxième édition,**

entièrement revue, corrigée et augmentée de toutes les découvertes les plus récentes et de tous les renseignements statistiques utiles, par J. J. N. Huot; accompagnée de plus de cinquante cartes, vignettes, vues, et de nombreux tableaux historiques, statistiques etc.

Un gros volume. Grand in-8. Paris, 1838. 9 Thlr. Leipzig, im April 1838.

**Brochhaus & Wenarius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XVI.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

## Conversations-Lexikon der Gegenwart.

In allen Buchhandlungen des In- und Auslandes ist zu erhalten:

## Conversations-Lexikon der Gegenwart.

Erstes Heft.

Dies Werk ist ein für sich bestehendes und in sich abgeschlossenes Ganzes, bildet aber zugleich einen Supplementband zur achten Auflage des Conversations-Lexikons, sowie zu jeder frühern Auflage, zu allen Nachdrucken und Nachbildungen desselben. Um die Anschaffung zu erleichtern, erscheint das Werk in Hefen von 10 Bogen, deren jedes

auf weißem Druckpapier 8 Gr.,  
auf gutem Schreibpapier 12 Gr.,  
auf extrafeinem Velinpapier 18 Gr.

kostet. Das Ganze wird aus 20 — 24 Hefen bestehen, die sich rasch folgen werden.

**Ausführliche Ankündigungen sind in allen Buchhandlungen zu erhalten, wo auch das erste Heft eingesehen werden kann.**

Leipzig, im April 1838.

F. A. Brockhaus.

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen verandt worden:

ü b e r

den gegenwärtigen Zustand

des

## öffentlichen Unterrichts

in den westlichen Staaten von Deutschland, in  
Holland, Frankreich und Belgien.

von

Friedrich Thiersch.

Drei Theile.

Gr. 8. Preis 6 Thlr. 12 Gr., oder 10 Fl. 48 Kr.

In diesem Werke hat der Verfasser das Gegenstück zu seinem frühern, mit allgemeinem Beifall aufgenommenen Werke:

**Über die gelehrten Schulen,**

geliefert, das vor Kurzem ebenfalls mit dem dritten Bande geschlossen worden ist. Wie dieses letztere sich vorzüglich mit

der Theorie des öffentlichen Unterrichts und der Einrichtung und Führung seiner Anstalten beschäftigt, so zeigt das gegenwärtige Werk, was auf dem großen Gebiete des öffentlichen Unterrichts und der Erziehung in den auf dem Titel genannten Ländern geleistet, für dieselben in neuen und ältern Plänen und Lehrordnungen vorgekehrt, verfehlt oder gewonnen wird. Es enthält also die praktische Seite zu jener Theorie, oder, wie sich die Einkleitung ausdrückt, es zeigt in treuer Schilderung „die Zeit am Werke“, die Gegenwart mit Bildung der Zukunft beschäftigt, und die Hoffnungen oder Besorgnisse, welche daran sich knüpfen; doch genügt dem Verfasser nicht, zu berichten, was er auf jenem Gebiete an Anstalten, Vorkehrungen und Kräften vorfindet, sondern dieses gibt ihm zugleich den Stoff, in das Innere und den Geist der Sachen einzudringen, um das in ihnen Schädliche oder Förderliche oft mit Entschiedenheit und Nachdruck darzulegen und die einzelnen Erscheinungen auf dem Gebiete des Unterrichts und der Erziehung auf den großen Gegensatz der traditionell-idealen und industriell-materiellen Systeme der Bildung, wie er in unserm Zeitalter hervorgetreten ist, zu beziehen, nicht um den Kampf zwischen ihnen zu nähren, sondern durch Darlegung der Natur derselben und ihrer wahren Bedürfnisse zu schlichten.

Was der Verfasser selbst bei wiederholter Inspection der Schu-

len des bairischen Rheinkreises beobachtet und eingeleitet oder vorgekehrt hat, um ihnen durch die königl. Staatsregierung, in deren Namen er verfuhr, jenes höhere Geseßten zu sichern, in welchem sie jetzt begriffen sind, eröffnet den ersten Theil. Hierauf folgen die Beschränkungen der verschiedensten Art von Würtemberg mit seinen vortheilhaften lateinischen Schulen, sowie die Darlegung des Widerstreites, der sich dort entsponnen und in einzelnen Anstalten geltend gemacht hat, z. B. in der von Setten, die ausführlich geschildert wird; dann Baden, dessen neue Schulordnung einer durchgreifenden Kritik unterliegt, nicht ohne Anerkennung, was namentlich die polytechnische Schule zu Karlsruhe bei viclem der Änderung Bedürftigen Gutes enthält; dann die an bedenklichen Mängeln, besonders des Organismus und der oberen Pflege leidenden Anstalten von Hesse: Darmstadt, Frankfurt und Cassel. Vorzüglich das Unterrichtssystem dieses letzten Landes wird in Bezug auf seine höchstbeschränkte Natur und ihre Folgen in das Eingelne dargelegt. Den Schluß des ersten Theils bilden die preussischen Schulen in den Rheinprovinzen und in Westfalen, wo der Verfasser die Schilderung des gegenwärtigen Bestandes durch eine umfassende Darstellung der geschichtlichen Entwicklung des preussischen Unterrichtssystems einleitet, um auf diesem Wege die Einsicht in die Vorzüge, sowie die verschlechten und mancherhaften Seiten desselben desto sicherer zu bestimmen und dadurch den Bedarf der gegen diese Schulordnung in neuerer Zeit erhobenen Anklagen deutlich zu machen oder zu beschränken.

Der zweite Theil enthält in drei umfassenden Gemäßen den öffentlichen Unterricht in Holland, Frankreich und Belgien. Die Vortrefflichkeit der holländischen Clementarziehung, die Mängel des mittlern Unterrichts und das beschränkte Geseßten des höhern werden durch Darlegung und Beurtheilung der Lehrordnungen und einzelnen Anstalten entwickelt, ebenso der in vieler Hinsicht höchst bedenkliche Zustand des öffentlichen Unterrichts in Frankreich. Der Verfasser hat außer den Geseßen über die einzelnen Gattungen der Lehranstalten und der Einrichtung der Normalschule auch die Organisation der großen Lehrcorporation oder der Universität ausführlich dargestellt, und das Geseßliche, ja Verberbliche und für Gegenwart und Zukunft von Frankreich höchst Gefährliche ihres, den edlern Geist tödenden Mechanismus und ihres durch den äußersten Zwang erzielten unformen Ganges auf das eindringlichste geschildert und auch hier eine Darstellung des Widerstreites der pädagogischen Systeme geliefert, der die Debatten der Kammer über den Gegenstand während der zwei letzten Jahre zum Grunde liegen. Das System des öffentlichen Unterrichts in Belgien, welcher auf den verschiedenen Gebieten der untern, mittlern und höhern Schulen unter dem Geseße der unbedingten Freiheit schon jetzt dem Klerus verfallen ist und ihm mehr und mehr gehören wird, bildet den Schluß des zweiten Theils, der bei der Aufmerksamkeit, welche jetzt grade auf jene Gegenstände und diesen Gegenstand gerichtet wird, auch unabhängig von seiner pädagogischen Wichtigkeit das Interesse der Gegenwart um so mehr in Anspruch nehmen wird, da der Verfasser den Gang und die Entwicklung jener Bewegungen des öffentlichen Unterrichts in Belgien mit den ihnen entsprechenden Bewegungen auf dem Gebiete des öffentlichen Lebens, von welchem sie nur ein Theil sind, in Verbindung gebracht hat.

Der dritte Theil ist ein codex diplomaticus von Geseßen, Planen, Instructionen und Verfügungen über den öffentlichen Unterricht vorzüglich in den drei zuletzt genannten Ländern, so geordnet, daß in ihnen die Systeme des Unterrichts sich in ihren Hauptbestimmungen vollständig darstellen.

In Folge der langen Erfahrung, welche dem Verf. über die Gegenstände, die er behandelt, zur Seite steht, hat er nicht unterlassen, bei jedem Lande nach Darstellung und Beurtheilung seiner Beschränkungen die Wege ihrer Hebung und Verbesserung überall zu zeigen und das ihnen Förderliche vorzuschlagen. Seinen Lehren und Warnungen ist um so mehr Beherzigung zu wünschen, da auch nach Dem, was er beobachtet und gezeigt hat, wie im Fall auf dem Gebiete des Unterrichts und der Er-

ziehung nicht ein mit wahrer Einsicht verbundenes reges Eingreifen der Erfahrungen verbunden wird, einer endlosen Verwirrung der Bestrebungen und Ideen, dem Verfall der höhern Bildung und dem Umsturze der Hauptstütze der socialen Ordnung mehr und mehr entgegengehen. Das Werk wünscht darum, wie der Verfasser am Schluß der Einleitung sagt, „nicht nur von Schulmännern, sondern von Allen beachtet und erwogen zu werden, welchen mit dem Wohle ihrer Angehörigen das Wohl des Ganzen, das in der Zukunft ruht, am Herzen liegt“. — „Denn zu keiner Zeit ist es durch beachtlichere und mannichfachere Zeichen für Eingelne wie für die Staaten, für Bürger wie für Fürsten klarer geworden, daß wir am Scheidewege der Bildung und der Barbarei, der wahren Freiheit unter der höhern Einsicht oder der Knechtschaft unter der Unwissenschaft stehen, und daß die Wahl, die Thätigkeit für alles Große der Ueberlieferung und alle Hoffnung der Zukunft, die jezo noch möglich ist, bald nicht mehr möglich sein wird, wenn die überflutende Macht der neuen Ideen, Bestrebungen und Leidenschaften den traditionellen Besiß aus der Vergangenheit bebeden und Religion und Bildung wie die sociale Ordnung der Staaten in ihrem Schooße begraben wird.“

Stuttgart und Tübingen, im März 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

## Das Pfennig-Magazin für Kinder.

1838. März. Nr. 9 — 13.

Nr. 9. \*Jesus segt das heilige Abendmahl ein. \*Die Banile. Die kleine Mäusgünste. \*Der Flegelknäpper mit schwarzem Rücken. Auflösung der Räthsel im vorigen Monat. — Nr. 10. \*Die Armenier. Der Palmfel. \*Der Markthiedel Vagabond. \*Donoghue, eine irische Sage. Ein Lieb im März. \*Der Thunfisch. — Nr. 11. \*Die Furiere. Laura. \*Der Kalong oder fliegende Hund. Das Fernrohr. \*Die Bluteigel. Räthsel. — Nr. 12. \*Der Spürhund. Die geflügelten Todengräber. \*Kön. Der Gispalast in Petersburg. \*Noch eine Tapetziene. Räthsel. — Nr. 13. \*Der kleine Savoyarde. Die Himmelschale. ein Märlein. \*Die Lauben. Fernando de Magellan und die erste Reise um die Erde. \*Der Sonneneiger oder die Compasmmuschel. Räthsel.

Die mit \* bezeichneten Aufsätze enthalten eine oder mehre Abbildungen.

Preis dieses Jahrgangs von 52 Nummern 1 Thlr. — Der erste bis vierte Jahrgang kosten ebenfalls jeder 1 Thlr.

Leipzig, im April 1838.

F. A. Brockhaus.

Bei J. M. Gebhardt in Grimma erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## National-Versammlung der deutschen Lyriker

des 18ten und 19ten Jahrhunderts von Ferdinand Stolle.

Dieses Werk, welches in circa 10 Lieferungen von je 6 Wochen à 9 Bogen in Octav auf feinstem Velinapapier erscheint, wird aus 3 Bänden bestehen, von welchen jeder eine Periode der deutschen Lyrik enthält. Der erste Band geht von Haller bis Goethe, der zweite von Goethe bis Heine

und der dritte Band umfaßt die neuere Dichterschule, welche mit **Heine** ihren Anfang nimmt. Jeder in der Entwicklungsgeschichte der deutschen Lyrik berühmt gewordene Dichter wird durch ein und zwar durch das beste Gebicht aus den verschiedenen Gattungen der Lyrik, in welchen er sich ausgezeichnete, repräsentirt, und somit wird dieses Werk eine Literaturgeschichte der deutschen Lyrik in Beispielen sein.

Noch ist zu bemerken, daß sämtliche lebende deutsche Dichter, bis auf sehr wenige, deren Theilnahme noch zu erwarten steht, diesem nationalen Unternehmen dadurch fördernd zur Seite getreten sind, daß sie durch eigene Wahl ihrer schönsten poetischen Leistungen in ihr dichterisches Portrait in dieses National-Album der deutschen Lyrik eingetragen haben.

Die erste Lieferung liegt in jeder Buchhandlung zur Ansicht bereit, und wird für **12 Gr.**, oder **54 Kr. Rhein.**, verkauft.

Ferner:

## Märchen

der

# Tausend und Einen Nacht

für

die Jugend bearbeitet

von

**Albert Ludw. Grimm.**

Diese dem Publicum schon längst als ausgezeichnet bekannte Jugendschrift erscheint in **10 Halbbänden** in Zwischenräumen von je vier Wochen auf **feinstem Velinpapier** à 6 Gr., oder 27 Kr. Rhein., so daß das ganze Werk, welches früher 7 Thlr. 12 Gr. kostete, nicht mehr als 2 Thlr. 12 Gr. kosten wird. Später tritt der Ladenpreis von 5 Thlr. ein. — Der erste halbe Band ist in jeder Buchhandlung einzusehen.

Auf 12 Exemplare wird von jeder Buchhandlung ein **Freiexemplar** gegeben.

## Neue philologische und Schulschriften

im Verlage von

**Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.**

Ciceronis M. T. de officiis libri tres. Cum selectis Jo. Mich. et Jac. Frid. Heusingerorum suisque notis scholarum in usum edidit Carol. Timoth. Zumptius. 8. Geh. Preis 20 Gr.

Neben dieser Schulausgabe erscheint bis zur Ostermesse d. J. auch eine neue Auflage der größten Heusinger'schen Ausgabe, vom Herrn Professor Zumpt in Berlin besorgt.

Cicero von Redner in 3 Büchern. Zum Gebrauche auf Schulen herausgegeben von J. C. F. Wetzel. 8. Zweite Auflage, besorgt von Dr. F. G. Schneidewin, Prof. in Göttingen. Preis 12 Gr.

Cicero's auserlesene Reden. Zum Gebrauche auf Schulen herausgegeben von F. W. Döring. 8. Zweite Auflage, besorgt von Dr. F. G. Schneidewin, Prof. in Göttingen. Preis 6 Gr.

Horaz, A. Flaccus, Oden. In den Vermaßen der Urschrift deutsch mit beigefügtem lateinischen Text von A. F. von der Deden. 2 Bände. Geh. Gr. 8. 3 Thlr. 12 Gr.

Krüger, G. F. A., De formulae ἀλλ' ἢ et assinium particular. post negationes vel negativas sententias usurpationum natura et usu commentatio. 4. Geh. Preis 14 Gr.

Ovid's Metamorphosen im Auszuge. Zum Gebrauche auf Schulen bearbeitet von C. A. Meinecke. 8. Dritte Auflage, besorgt von Dr. F. G. Schneidewin, Prof. in Göttingen. Preis 12 Gr.

Ovid's fünf Bücher der Trauer, übersezt von F. K. von Strombeck. Gr. 8. Preis 1 Thlr.

Simonidis Cei Carminum reliquiae. Edidit Dr. F. G. Schneidewin. 8maj. Geh. Fein Velin-Druckpapier. Preis 1 Thlr. 20 Gr. Fein geleimt Velinpapier. Preis 2 Thlr. 8 Gr.

Suetonius, des C. Tranquillus, Werke, übersezt von F. K. von Strombeck. I, enthält das Leben des Julius Caesar. Gr. 8. Preis 12 Gr.

Wagner, Prof. Dr. K. F. C., Neue vollständige und auf die möglichste Erleichterung des Unterrichts abgewandte englische Sprachlehre für die Deutschen. Erster Band. Gr. 8. Vierte Ausgabe. Preis 1 Thlr. Zweiter Band. Gr. 8. Preis 16 Gr.

Welford, H. M., Englisches Lesebuch, enthaltend eine zweckmäßige, zur Beförderung der Fortschritte in dieser Sprache besonders dienliche Sammlung von Lese- und Uebersetzungsstücken, aus den besten neuern englischen Prosaisisten und Dichtern gezogen. Mit einem Vorworte von K. F. C. Wagner. Zweite vermehrte Ausgabe. Gr. 8. Preis 18 Gr.

In meinem Verlage ist erschienen und in allen Buch- und Kunsthandlungen zu haben:

## Augusteum,

## Dresdens antike Denkmäler enthaltend.

Herausgegeben von

**Wilhelm Gottlieb Becker.**

Zweite Auflage.

Besorgt und durch Nachträge vermehrt von

**Wilhelm Adolf Becker.**

14 Hefte. CLXII Kupfertafeln in Folio, nebst 26 Bogen Text in gr. 8. In Umschlag. 1832 — 37.

Subscriptionspreis 27 Thlr. 21 Gr.

Endlich bin ich in Stand gesetzt, das dreizehnte und vierzehnte Heft, womit dieses Prachtwerk geschlossen ist, ausgeben zu können. Jedes Heft kostet im Subscriptionspreise 1 Thlr. 21 Gr., mit Ausnahme des letzten, welches acht ganz neue Tafeln enthält und auch für die Besitzer der ersten Auflage als Supplement zu 2 Thlr. 12 Gr. besonders abgegeben wird.

Leipzig, im April 1838.

**F. A. Brockhaus.**

Bei M. Wienbrack in Leipzig ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt:

**Die Amtsentsetzung des Erzbischofs von Köln, Droste von Wischering**, durch die königl. preuß. Regierung nach dem Grundsatze einer echt christlichen Politik gewürdigt von W. Schröter. Gr. 8. Geh. 8 Gr.

Parteilos und unbefangenen sind in dieser kleinen Schrift die Angelegenheiten in Köln untersucht und dargestellt, daß man hoffen darf, sie werde alle Verständigen und Guten unter Protestanten und Katholiken sich befreundeten.

**B a u k u n s t.**

**Essai historique  
sur le Pont de Rialto,**

par  
**Antoine Rondelet,**  
Architecte.

In-folio. Paris, 1837. 5 Thlr. 20 Gr.

In diesem mit zwölf sehr schön gestochenen, theilweise illuminirten Kupfertafeln gezierten Werke ist nicht nur die Rialtobrücke auf das genaueste durch Grund- und Aufrisse in architektonischer und künstlerischer Hinsicht beschrieben, sondern es werden darin auch über ihre Erbauung gründliche historische Nachweisungen gegeben.

Leipzig, im April 1838.

**Brockhaus & Venenarius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

Sieben erschien:

**Cooper, C. F., Wanderungen in Italien.**  
2 Bände. Nach dem Englischen von Dr. F. Steger.  
Geh. 3 Thlr.

Den Freunden von Cooper's geistvollen Schilderungen wird dieses Werk, das keinem seiner früheren an Vortreflichkeit und reichem Interesse nachsteht, eine willkommene Erscheinung und eine wünschenswerthe Vermehrung ihrer Sammlungen sein. Für Gellanz der äußern Ausstattung ist das Beste gethan.

Braunschweig, den 11ten April 1838.

Friedr. Vieweg & Sohn.

**ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΤΟΥ ΟΛΟΡΟΥ  
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ  
ΒΙΒΛΙΑ ΟΚΤΩ.**

**Thucydides, Olori Fil  
de Bello Peloponnesiaco**

libri VIII.

Ad editionem

**Car. Andr. Duckeri,**  
cum omnibus auctariis recurs.

Accesserunt variae lectiones duorum codicum  
animadversiones

**Joannis Christophori Gottleberi A. M.,**  
Rectoris quondam Scholae provinc. Misenicae.

Coeptum opus perfecit

suas notas adiecit  
indicem Duckeri et Glossarium Gottleberi  
auxit

**Carolus Ludovicus Hanerus A. M.**

Scholae ad Hirschbergam Rector,  
et

**Christ. Dan. Beckius,**  
Prof. Lips.

II Vol. 4maj.

Früherer Ladenpreis 10 Thlr. 12 Gr.

Herabgesetzter Preis 5 Thlr., oder 8 Fl. 30 Kr.

Wir empfehlen dem philologischen Publicum diese Ausgabe, von der wir eine nicht unterdrückliche Anzahl Exemplare übernommen haben, mit um so größerer Zuversicht, da sie neben allen Leistungen der neuesten Zeit immer einen ganz eigenthümlichen Werth dadurch hat, daß sie die einzig vollendete Ausgabe

ist, die den gelehrten Apparat von G. Stephanus, Hudson, Waser, Duder u. A. vollständig mit allen Nachträgen und den trefflichen Zugaben von Gottleber, Wauer und G. D. Beck enthält, und mit sehr brauchbaren Indices Rorum et Verborum versehen ist.

Stuttgart und Tübingen, im März 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

**Der Philanthrop**

oder

**Blätter zur Beförderung  
der Menschenkunde, der Naturwissenschaften**

und

der häuslichen Erziehung,

redigirt von einem Vereine von Gelehrten.

Mit vielen Abbildungen.

Diese neu begründete Zeitschrift hat sich zur Aufgabe gestellt, ein höher gebildetes Publicum mit den ernstern Wissenschaften, welche eine innige Beziehung zum täglichen Leben haben, als Anthropologie, Physik, Chemie und Astronomie, auf eine angenehme Weise bekannt zu machen. Der Vortrag ist durchaus populär, für jeden Gebildeten verständlich, und weder zu streng wissenschaftlich noch zu trivial. Viele Abbildungen werden den anziehenden Inhalt erläutern und Aufträge über häusliche Erziehung diese wichtige Angelegenheit von den verschiedensten Standpunkten beleuchten. Hoffentlich wird das Publicum diese nur für erste Zwecke bestimmte Zeitschrift mit anerkennender Theilnahme empfangen. Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes, sowie die respectiven Postbehörden, nehmen Bestellungen an. Der sehr billige Preis des ganzen Jahrgangs ist incl. der Kupferbeilagen auf 1 Thlr. 8 Gr. festgesetzt. Ausführl. Prospekte sind auf allen Postämtern und Buchhandlungen und in der unterzeichneten Verlagsbuchhandlung gratis zu haben.

Karl Heymann  
in Berlin.

Sieben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu erhalten:

**Die bezauhbarte Rose.**

Romantisches Gedicht

in drei Gesängen.

Von

**Ernst Schulze.**

Sechste Auflage.

Ausgabe ohne Kupfer. 8. Geh. 1 Thlr.

Ausgabe mit 7 Kupfern. 8. Geh. 2 Thlr.

Prachtausgabe auf Velinpapier mit 7 Kupfern.  
Gr. 8. Elegant geb. 2 Thlr. 12 Gr.

In meinem Verlage erschien ferner von Ernst Schulze:

**Sämmtliche poetische Werke.** Vier Bände.

Neue Auflage. 8. 6 Thlr. Mit 16 Kupfern.

8 Thlr. Prachtausgabe 18 Thlr.

**Cäcilie.** Ein romantisches Gedicht in 20 Gesän-

gen. Zwei Bände. Neue Auflage. 8. 3 Thlr.

Mit 8 Kupfern 4 Thlr. Prachtausgabe 9 Thlr.

**Wynke.** Ein griechisches Märchen. 8. 1 Thlr.

**Vermischte Gedichte.** 8. 1 Thlr. 12 Gr.

Leipzig, im April 1838.

J. A. Brockhaus.

Druck und Verlag von J. A. Brockhaus in Leipzig.



# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XVII.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brochhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Zeile 2 Gr.

## N a c h r i c h t

über die im Verlage von F. A. Brochhaus in Leipzig erscheinenden Blätter, durch welche literarische Anzeigen und Bekanntmachungen anderer Art zur Kenntniß des Publicums gelangen.

## Bibliographischer Anzeiger.

Derselbe wird mit der Allgemeinen Bibliographie für Deutschland und dem Repertorium der gesammten deutschen Literatur ausgegeben.

Für die Petitzeile in gr. 8. oder deren Raum betragen die Insertionsgebühren  $1\frac{1}{2}$  Gr. Die Beilegegebühren für besondere Anzeigen u. dgl. berechne ich bei jeder dieser Zeitschriften mit 1 Thlr. 12 Gr.

## Literarischer Anzeiger.

Derselbe wird mit den Blättern für literarische Unterhaltung, der Isis von Dfen und der Allgemeinen medicinischen Zeitung ausgegeben.

Die Insertionsgebühren betragen für die gespaltene Zeile mit Petitschrift oder deren Raum 2 Gr. Besondere Beilagen, Anzeigen u. dgl. werden gegen eine Vergütung von 3 Thln. den Blättern für literarische Unterhaltung, der Isis und der Allgemeinen medicinischen Zeitung aber gegen eine Gebühr von 1 Thlr. 12 Gr. bei jeder dieser Zeitschriften beigelegt oder beigeheftet.

## Intelligenz-Blatt

zum Pfennig-Magazin.

Dasselbe eignet sich vorzüglich zu Anzeigen von Schriften für das gesammte deutsche Publicum.

Für die Zeile oder deren Raum betragen die Insertionsgebühren 5 Gr. Besondere Anzeigen u. dgl. werden dem Pfennig-Magazin gegen Berechnung von 18 Gr. für das Tausend beigelegt.

## Intelligenz-Blatt

zum Bilder-Conversations-Lexikon für das Deutsche Volk.

Dasselbe wird den einzelnen Hefen dieses Werkes beigegeben, oder werden die Anzeigen auf den Umschlägen der Hefte abgedruckt.

Die Insertionsgebühren betragen für die gespaltene Zeile oder deren Raum 4 Gr. Besondere Anzeigen werden für eine Gebühr von 1 Thlr. für das Tausend beigeheftet.

## Leipziger Allgemeine Zeitung.

Von derselben erscheint täglich mit Einschluß der Sonn- und Festtage ein Bogen nebst Beilage.

Die Insertionsgebühren betragen für die gespaltene Zeile oder deren Raum  $1\frac{1}{2}$  Gr. Durch die Lage Leipzigs begünstigt, gewährt diese Zeitung Anzeigen aller Art, namentlich unter dem gebildeten und Bücher kaufenden Publicum, eine schnelle und große Verbreitung.

# Leipziger Kreisblatt.

Dasselbe erscheint dreimal wöchentlich und eignet sich zu Anzeigen aller Art, namentlich solcher für das große Publicum.

Der Raum einer gespaltenen Zeile wird mit sechs Pfennigen berechnet.

F. A. Brockhaus.

Im Verlage der Unterzeichneten ist erschienen und vor-  
rätig in allen guten Buchhandlungen:

**Historisch-kritische Darstellung**  
der Pockeneuchen, des gesammten  
Impf- und Revaccinationswesens im Königreiche  
Württemberg, innerhalb der 5 Jahre Juli 1831 bis  
Juni 1836. Nach den bei dem k. Medicinalcolle-  
gium vorliegenden Physikatsberichten bearbeitet von  
Professor Dr. **Franz Heim**, k. würt. Regi-  
mentsarzte, der ärztlichen Vereine in Baiern und  
Württemberg, des Vereines grossherzogl. badischer  
Medicinalbeamter zur Beförderung der Staatsarznei-  
kunde und der medicinischen Gesellschaften in Di-  
jon, Leipzig, Lyon und Zürich Mitglieder.

Ebenso wie der Herr Verfasser, nach dem von dem  
königl. würtemb. Medicinalcollegium erlassenen Rescript an  
denselben, welches dem Buche vorgedruckt ist, sein Werk,  
als ein durch eigne vielfache Erfahrung und vollkommene  
Kenntniß der betreffenden Literatur *wahrhaft dazu be-  
rufener Mann*, ausgeführt hat, ist dasselbe besonders  
dadurch für jeden, auch den ausländischen Arzt, von höch-  
stem Interesse, dass es, hervorgegangen aus einer grossen  
Anzahl sich gegenseitig ergänzender Jahres-Impf- und Pocken-  
epidemie-Berichte, einen in sich geschlossenen Schauplatz  
umfasst, der einerseits gross genug ist, um Resultate in  
grössern Maasstabe zu gewähren, andererseits keinen zu  
ausgedehnten Umfang hat, um die Übersicht des Ganzen  
zu erschweren. Im Übrigen machen wir auf das bereits  
erwähnte, sehr ehrenvolle Rescript des würtemb. Me-  
dicinalcollegiums aufmerksam. Der Preis für 43 Bogen  
grösstes Octav, sehr schön ausgestattet, ist 3 Thlr. 9 Gr. Pr.  
Courant, oder 5 Fl. 24 Kr. Rhein.

Verlagshandlung von **Imle & Liesching**  
in Stuttgart.

## Geographie des Herodot

vorzugsweise aus dem Schriftsteller selbst  
dargestellt von

**Hermann Bobrik.**

Nebst einem Atlasse von 10 Karten. Gr. 8. (Preis 3 Thlr.)

Königsberg 1838, bei Aug. Wilh. Unzer.

Je lebhaftere Theilnahme das Studium der alten Geogra-  
phie von Tage zu Tage findet, um so willkommener muß eine  
Arbeit, wie die gegenwärtige, sein, welche nicht blos, gleich den  
vorangegangenen von Redow, Niebuhr, Dönniges und  
Andern, sich mit allgemeinen Gebirgs- und Flüssen, sondern, ins  
Einzelne eingehend, bei jedem Lande dasjenige Bild, welches  
Herodot vorgeschwebt haben mag, zu entwickeln bemüht ist.  
Indem solchergehalt das gegenwärtige Werk, dessen Verfasser  
der gelehrten Welt bereits durch seine in der Verghauschen  
Annalen mitgetheilte Karte von Eils vortreflichst bekannt  
geworden ist, einerseits den Freunden der Geographie einen  
wichtigen Beitrag zur Geschichte derselben liefert, dürfte dasselbe  
andererseits auch für Philologen und Historiker überhaupt von  
Bedeutung sein, da es ihnen durch Veranschaulichung des Schau-  
platzes der Begebenheiten das tiefere Eindringen in einen so

viel gelesenen Schriftsteller, wie Herodot, wesentlich erleich-  
tert. — Für ein gefälliges Auzere ist von dem Verleger nach  
Kräften gesorgt worden, und derselbe darf insbesondere hoffen,  
daß der aus einer der ersten lithographischen Anstalten Deutsch-  
lands hervorgegangene Atlas sich des Beifalls der Kenner zu  
erfreuen haben werde.

Soeben ist bei Wilh. Engelmann in Leipzig er-  
schienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

**G. G. Servinus** (Prof.),

**G e s c h i c h t e**

der

**poetischen National-Literatur**

der Deutschen

vom Ende der Reformation bis zu Gottsched's Zeiten.

Gr. 8. 1838. 2 Thlr. 18 Gr.

Unter diesem Titel ist soeben der dritte Band der Ge-  
schichte der deutschen Dichtung des berühmten Verfassers erschie-  
nen. Der vierte und letzte Band dieses so allgemein aner-  
kannten Werkes wird bestimmt noch im Laufe dieses Jahres  
im Druck vollendet werden.

1ster und 2ter Bd., 1835 — 36, Preis 5 Thlr.

In alle Buchhandlungen wurde soeben versandt:

## Gedanken und Urtheile Clemens XIV.

über die wichtigsten Gegenstände des Lebens.  
Ein Weihgeschenk zum Geburtstage dieses und  
jedes neuen Papstes von **W. Schröter.**

Wohlfleile Ausgabe. 8. Leipzig, Wienbrad. Geh.  
Preis 16 Gr.

## Zur Geschichte der Jesuiten.

## LES AMOURS

du révérend

**Père Jacques Marel, de la Compagnie de  
Jésus;**

**EXTRAITS**

des documents trouvés dans les archives de la  
sussdite compagnie à Munich, par  
**Charles Henri de Lang.**

Traduit du latin.

In-12. Paris, 1837. 12 Gr.

Dieser Übersetzung ist das lateinische Original, welches im  
Jahre 1815 erschien, gegenüberschickend beigegeben.  
Leipzig, im Mai 1838.

**Brockhaus & Wennerius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

In der Unterzeichneten ist erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden:

## Polytechnisches Journal,

herausgegeben  
von den

**DD. Dingler und Schultes.**

Erstes Märzheft.

Inhalt: über den Dampfseil des Hrn. Schöot, aus dem Berichte des Hrn. Maleprie des Ältern. Geod's Verbesserungen an den Dampfmaschinen. Mit Abbild. über die Zerstümer und Trugschlüsse der Erfinder der sogenannten rostenden Dampfmaschinen, vorgetragen von Hrn. John Scott Russell Esq. Mit Abbild. Weston's Verbesserungen an Räderfabriken. Mit Abbild. Booth's Verbesserungen an den Fien der Locomotiven, welche auch auf andere Fien anwendbar sind. Mit Abbild. Cistern's Verbesserungen an den Lampen und besonders an den zum Emporziehen des Hies dienenden Vorrichtungen, welche auch zum Heben von Wasser und andern Flüssigkeiten anwendbar sind. Mit Abbild. Watt's verbesserte Maschine zur Fabrication metallener Angewinde. Mit Abbild. Harvey's Verbesserungen in der Fabrication metallener Röhren und im Schneiden oder Auswalzen der Metalle zu verschiedenen andern Zwecken. Mit Abbild. Macnamara's Verbesserung im Pfastern von Stadt-, Land- und andern Straßen. Mit Abbild. Mielser's und Dixon's Spindelbank, méchoir (Dochtmachine) genannt. Mit Abbild. Hennin's Mühle zum Auswalzen von gold- und silberhaltigen Lichen. Mit Abbild. Priebeau's Holzrohr. Mit Abbild. über die von Hrn. Sorel erfundenen galvanischen Verfahrungsarten, um das Schmiedelein, den Stahl und das Gusseisen gegen die zerstörende Einwirkung des Rostes zu schützen. über die von Wallace angegebene Methode, Feuer mit Dampf zu löschen, und über dessen Rauchprotector. über den von Hrn. de Valery erfundenen Apparat zum Aufbewahren von Getreide. — Miscellen. Über Steinheil's elektromagnetischen Telegraphen mit betreffenden historischen Notizen. über den Einfluss der Geschwindigkeit des Kolbens in dem Dampfmaschinen. über die Anwendung des Galvanismus als Arbeitskraft. über Hrn. Lentin Durand's Hausmaschinen. Paulin's Apparat in lebensgefähiger Kellertluft angewendet. über die Verwendung des Gasöls zum Aufkochen von Kautschuk. Kautschukbäder für Heuschlober und dergl. Metallene Pfandons für Zimmer. Durios' unverbrennliche Seuche. über Unterscheidung wollener Gewebe von baumwollenen und leinenen, und Bestimmung der Quantität der einzelnen Stoffe in gemischten Geweben. Kattagen, Kissen u. dergl. aus Korkpulver. über die mechanische Flachspinnerei in England. über Papierverfälschung mit Gyps und Sand. Milchsäure, die Säure des Sauerkrauts. Betailier's Methode, vegetabilische Substanzen zu conserviren. über den Verbrauch an Weizenwurzel zu Fontanellen. Ausdehnung der porösen Cloaken und Zertotfalls. Verfahren, das Hatz in große, hohle Kugeln auszublasen. — Literatur.

zweites Märzheft:

Nicholson's Verbesserungen an den Spinnmaschinen. Mit Abbild. Gaultley's Verbesserungen an den Maschinen zur Bobbinet- oder Spigenfabrication. Mit Abbild. Barker's Verbesserungen an den Sonnen- und Regenfirmen. Mit Abbild. Ler's gewundener Holzbohrer. Mit Abbild. Karmarsch, über einen Holzbohrer zum Gebrauch auf der Drehsbank. Mit Abbild. Freeman's Verbesserungen an den Walzen zum Auswalzen von Eisen und andern Metallen zu verschiednen geformten Stäben und Schienen für Eisenbahnen. Mit Abbild. Wilschield's verbesserter Mechanismus zur Erzeugung der Parallelbewegung der Kolbenstangen an den Lampen, welcher auch auf andere Parallelbewegungen anwendbar ist. Mit Abbild. Rowland's Verbesserungen an den Certanten, Quabranten und Kreisen zur Vornahme von Beobachtungen und Messungen. Mit Abbild. Ball's Verbesserungen in der Salzfabrication. Mit Abbild. Bell's Verbesserungen in der Fabrication von schwefelsaurem Natron oder Glaubersalz, welche zum Theil auch zu andern

Zwecken tauglich sind. Mit Abbild. Poole's Verbesserungen in der Zubereitung gegebener Flüssigkeiten. Mit Abbild. Seeren, über den sogenannten englischen Mastic-Cement. über die Fabrication der Salz- oder Stearinsäure in England. Hempel's verbesserte Methode, vegetabilische und animalische Fette zu behandeln, um Kerzen daraus zu fabriciren. über eine neue Abseige in Stahl, von T. Eisner. über die Bereitung des Vitrum antimoni in Großen, von A. Werner. über die Goldschcheidung mit Schwefelsäure in Petersburg, von Sobolewsky. über die Bereitung des reinen Gerbstoffes, von Hrn. Veconnet. über eine harte durchsichtige Substanz, worauf man schreiben und zeichnen kann, nouveau papier diaphane et perpétuel genannt, von Hrn. Laborde. Boone's neue Methode, sich zum Behufe des Abdruckes auf verschiedene Substanzen Platten mit erhabenen Dessins zu verschaffen. Götchen's Verbesserungen in der Reinigung des Glases und Hafes zum Spinnen. — Miscellen. Englische Patente. Elektrische Strömung in Eisenbahnen. Dupargé's Methode, Holz- und Steinkohlen zu zubereiten. Th. Knor's Regenschirm. über farbige Flammen. Sonton's Seife. Licht für Leuchtglöden. Raspaill's Ansichten über den innern Bau der Runkelrübe. über eine Verfalligung des Karmine, welche auch für die Malerei beachtungswürdig ist. Agierische Bomben. Säure des Sauerkrauts. über die Anwendung des Glaubersalzes statt Weinstein beim Färben der Wolle. Vorschriften zur Bereitung künstlicher Seife.

Von diesem sehr gemeinnützigen und wohlfeilsten Journal erscheinen wie bisher monatlich zwei Hefte mit Kupfern. Der Jahrgang, aus 24 Heften mit 24—35 Kupferplatten bestehend und welcher mit einem vollständigen Sachregister versehen wird, macht für sich ein Ganzes aus, und kostet durch die Postämter und Buchhandlungen nur 9 Thlr 8 Gr., oder 16 Fl. In das Abonnement kann nur für den ganzen Jahrgang eingetreten werden.

### Die Verlagsbuchhandlung kann vom Polytechnischen Journal

nach einige ganz vollständige Exemplare, welche sie angekauft hat, und zwar **liter bis 18ter Jahrgang zu 168 Thlern., oder 288 Fl.,** anbieten. Die Jahrgänge **1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1826 bis 1837** sind fortwährend einzeln zum Preise von **9 Thlr. 8 Gr., oder 16 Fl.,** zu haben.

Stuttgart und Tübingen, im April 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

Allgemeine medicinische Zeitung. Herausgegeben von Dr. Karl Pabst. Jahrgang 1838. Monat Januar, oder Nr. 1—9. Gr. 4. Preis des Jahrgangs 6 Thlr. 16 Gr.

Blätter für literarische Unterhaltung. (Verantwortlicher Herausgeber: Heinrich Brockhaus.) Jahrgang 1838. Monat April, oder Nr. 91—120, und 6 literarische Anzeiger: Nr. X—XV. Gr. 4. Preis des Jahrgangs von 365 Nummern (außer den Beilagen) auf seinem Druck-Wellpapier 12 Thlr.

Repertorium der gesammten deutschen Literatur. Herausgegeben von E. G. Gersdorf. 1838. Sechszehnten Bandes erstes Heft. (Nr. VII.) Gr. 8. Preis eines Bandes 3 Thlr.

Allgemeine Bibliographie für Deutschland. Jahrgang 1838. Monat April, oder Nr. 14—17, und Bibliographischer Anzeiger: Nr. 14—17. Gr. 8. Preis des Jahrgangs 3 Thlr.

Leipzig, im Mai 1838.

F. A. Brockhaus.

**Henrich Steffens Novellen,**  
**in einer neuen Gesamt-Ausgabe.**  
13tes bis 16tes Bändchen.

Im Verlage der unterzeichneten Buchhandlung ist soeben erschienen:

**Malkolm.**  
**Eine norwegische Novelle**  
von

**Henrich Steffens.**

**Zweite verbesserte Auflage.**

4 Bändchen. 8. 1838. 64 $\frac{1}{4}$  Bogen. Geh. 2 Thlr. 20 Gr.

Bei so vielen anerkennenden Beurtheilungen, welche die kritischen Zeitschriften über obiges Werk gebracht haben, theilen wir einige Stellen aus einer in der Evangelischen Kirchen-Zeitung erschienenen Recension hier mit, in welcher die Bedeutsamkeit und Vortrefflichkeit dieser tiefen und großartigen Dichtung besonders scharf herausgehoben worden ist.

„Innig und gewaltig bewegt hat uns Malkolm, diese mächtige, schöne Dichtung. Seine beiden Grundideen sind „die Grundsätze des Christenthums: Fluch und Veröhnung. — Die Schilderungen gehören zu dem Erhabenen „und Ergreifendsten, was man im Gebiete der Novellenichtung finden kann, und bezeugen einen großen Dichter. — „Die Darstellung der Umkehr eines Verlorenen, seine Erschütterung, seine Buße, seine himmlische Klarheit in seiner „Umggebung an die Gnade Gottes und in das Gericht der Menschen, seines feierlichen Sterbens, ist die Blüte einer „priesterlich und dichterisch hoch erhobenen Stimmung, und tief aus dem Geist und Wesen des Evangeliums ist der „höchst ergreifende Schluß der Dichtung geschöpft. — Sowie diese Dichtung den Ref. innigst bewegt, und ihn selige „Einblicke bereitet hat in das tiefe, herrliche Geheimniß der Veröhnung, so wird sie ohne Zweifel vielen Seelen einen „Segen gebracht haben und noch vielen andern ihn bringen — Genuß und Gewinn für die Ewigkeit, der zu Liebe, „Dank und Gerechtigkeit für den christlichen Dichter verpflichtet.“

Die frühern Bändchen dieser eleganten und wohlfeilen Gesamt-Ausgabe der Steffens'schen Novellen enthalten:

Das 1te Bändchen: **Gebirgsfagen.** Als Anhang: **Die Trauung, eine Sage des Nordens.**  
8. 1837. 19 Bogen. 1 Thlr.

Das 2te bis 6te Bändchen: **Die Familien Walfeth und Leith.** Ein Cyltus von Novellen.  
3te verb. Aufl. 5 Bändchen. 8. 1837. 71 $\frac{1}{2}$  Bogen. 3 Thlr.

Das 7te bis 12te Bändchen: **Die vier Norweger.** Ein Cyltus von Novellen. 2te verb. Aufl.  
6 Bändchen. 8. 1837. 87 $\frac{3}{4}$  Bogen. 3 Thlr. 25 Sgr.

Und nun:

Das 13te bis 16te Bändchen: **Malkolm.** Eine norwegische Novelle. 2te verb. Aufl. 4 Bändchen.  
8. 1838. 64 $\frac{1}{4}$  Bogen. 2 Thlr. 25 Sgr.

Wir hoffen mit Zuversicht, daß diesem Unternehmen die lebhafteste Theilnahme des Publicums entgegenkommen wird, zumal, da einzelne unter diesen Werken schon lange im Buchhandel gar nicht mehr zu haben waren, und auch Neues, bisher Ungedrucktes, hinzugegeben wird.

Buchhandlung **Josef Nag und Comp.** in **Breslau.**

Bei dem Unterzeichneten ist erschienen und sofort an alle Buchhandlungen versandt worden:

Die  
**Medicinal-Verfassung**  
**Preussens,**

wie sie war und wie sie ist.

Actenmäßig dargestellt und kritisch beleuchtet von

**Dr. Joh. Nep. Rust,**

wirklichem Geh. Ober-Med.-Rathe und Präsidenten.

Gr. 8. Sauber broschirt. Preis 1 Thlr. 10 Sgr.

Berlin, den 18ten April 1838.

Th. Chr. Fr. Enslin.

Im Verlage des Unterzeichneten wird nächstens erscheinen:

**Haase, C. H.** (Dr. und Appellationsrath),  
**Alphabetische Zusammenstellung der in**  
**dem Criminalgesetzbuche für das König-**  
**reich Sachsen und in den dazu erlassenen**  
**Verordnungen enthaltenen Bestimmungen.**  
(12—16 Bogen.)

Leipzig, im Mai 1838.

**F. A. Brockhaus.**

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XVIII.

Dieser literarische Anzeiger wird den bei **J. A. Brochhaus** in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Zeile 2 Gr.

## Bibliothek classischer Romane und Novellen des Auslandes.

Hiervon erschien schon der 27te Band:

### Der verliebte Teufel

und

### Der Lord aus dem Stegreife.

Zwei Novellen von

**Jacques Cazotte.**

Aus dem Französischen übersezt von  
**Eduard von Bülow.**

Mit einer Einleitung.

Gr. 12. Geh. 16 Gr.

Die frühern Bände dieser Sammlung enthalten:

1-IV. Don Quixote von **Cervantes**, übersezt von **Voltan**. Zweite Auflage. 2 Thlr. 12 Gr. — V. Landprediger von **Walters** von **Goldsmith**, übersezt von **Dolzig**. Zweite Auflage. 15 Gr. — VI-IX. Gil Blas von **Le Sage**. 2 Thlr. — X. Leben des Grafen von **Lucanor**, übersezt von **Reil**. 12 Gr. — XI-XIV. Tom Jones von **Helding**, übersezt von **Ludemann**. 2 Thlr. 12 Gr. — XV. Reis im von **Holberg**, übersezt von **Wolf**. 15 Gr. — XVI. Saccaro Reis von **Roscolo**, übersezt von **Kaufmann**. 15 Gr. — XVII-XIX. Despatch von **Stael**, übersezt von **Reich**. 1 Thlr. 20 Gr. — XX-XII. Artamon von **Rosacetti**. 2 Thlr. — XXIII. XIV. Die Reiben des Perthes und der Sigismunda von **Cervantes**, mit einer Einleitung von **E. Reich**. 1 Thlr. 8 Gr. — XXV. XVI. Die Verlorenen von **Manzoni**, übersezt von **Bülow**. Zweite, umgearbeitete Auflage. 2 Thlr.

Jeder Roman, mit einer literarisch-historischen Einleitung, ist für den beigelegten Preis einzeln zu erhalten, die ersten 22 Bände aber kosten zusammen anfangs 13 Thlr. 5 Gr. nur **acht Thaler**.

Leipzig, im Mai 1838.

**J. A. Brochhaus.**

In der Unterzeichneten ist schon erschienen und an alle Buchhandlungen verandt worden:

## Die Masse und Gewichte

der Deutschen Zollvereins - Staaten  
und vieler anderer Länder und Handelsplätze  
in ihren gegenseitigen Verhältnissen.

Nach den neuesten amtlichen und andern zuverlässigen  
Angaben berechnet

von  
**C. A. M. Abelsfeld,**

königl. preuss. Regierungssecretair.

8. In Umschlag broschirt. Preis 1 Thlr. 16 Gr., oder  
2 fl. 42 Kr.

Inhalt: Anhalt-Röthen und Anhalt-Desau, Baden, Baiern, Belgien, Birtensfeld, Böhmen, Braunschwigen, Bremen, Croatien, Dänemark, Dalmatien, England, Frankfurt a. M., Frankreich, Genöien und Eodoniien, Danaburg, Ganoer, Kurfürstenthum Hessen, Hessen-Darmstadt, Hessen-Pomburg, Holland,

Holstein, Illyrien, Kirchenstaat, Krakau, Lippe-Deimold und Lippe-Schaumburg, Lombardisch-Venetianisches Königreich, Lucca, Lubec, Luxemburg, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Modena, Nassau, Osterreich, Oldenburg, Parma mit Piacenza und Guastalla, Polen, Portugal, Preußen, Fürstenthümer Neuf, Ausland, Königreich Sachsen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Roburg-Gotha, Sachsen-Meinungen-Hildburghausen, Sachsen-Weimar-Eisenach, Carbinien, Schweden, Schweiz, Sicilien, Siebenbürgen, Slononien, Toscana, Ungarn, Waldeck, Walachei, Württemberg. Anhang: Übersicht der Münz-, Gold- und Silbergewichte.

Das vorliegende Werk ist ein Handbuch für Kaufleute, Beamte und Geschäftsmänner jeder Art; es wird auch als Quellenschrift nicht unbeachtet bleiben, indem es nach den neuesten Bestimmungen bearbeitet und für jeden Platz die hiesigst am häufigsten vorkommenden Vergleichen liefert. Die Wahl der verglichenen Maße und Gewichte ist weber, wie bei Tadel, allgemein gleichartig, noch ist sie dem Zufall überlassen worden; der Verfasser verdankt sie der Mittheilung erfahrener Kaufleute. Die Anordnung und Reihenfolge der Artikel anlangend, hat der Verfasser, abweichend von ähnlichen Schriften, vorgezogen, die Staaten unter sich alphabetisch zu ordnen; diese bilden demnach Hauptabtheilungen, welche zuerst die gesellschaf oder allgemein üblichen, und demnachst die Local- und ältern Maße und Gewichte enthalten. In dem Anhang sind behufs besserer Übersicht des Unterchiedes die verglichenen unter dem Namen der königlichen Mark bestehenden Gewichte, verglichen mit französischen genauen Grammen, holländischen Troy-As und der preussischen Mark, zusammengefaßt. In der Vorrede sind die argen Verhältnisse in andern Werken, namentlich hinsichtlich der Gewichtsangaben im Reichenbrecher'schen Taschenbuche, nachgewiesen.

Stuttgart und Tübingen, im April 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

## Wissenschaftskunde.

### DE L'UNITÉ,

ou

### aperçus philosophiques

sur l'identité des principes de la science mathématique, de la grammaire générale et de la religion chrétienne; par un ancien élève de l'école polytechnique.

Deux volumes. In-8. Paris, 1836. 4 Thlr. 12 Gr.

Der Verfasser dieses Werks sucht eine Einheit der Wissenschaften durch eine allgemeine Sprache zu begründen, wobei besonders seine tiefen philosophischen Forschungen der Beachtung des gelehrten Publicums sehr zu empfehlen sind.

Leipzig, im Mai 1838.

**Brochhaus & Wennerius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

# Deutsche Viertel-Jahrsschrift.

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden:

## Deutsche Viertel-Jahrsschrift.

2tes Heft: April — Juni 1838.

Gr. 8. In Umschlag broschirt. Preis 1 Thlr. 20 Gr., oder 3 Fl.

Inhalt: Rückblick auf praktische Seiten des antiken Münzwesens, von **Crenzer**. Wohnlichkeit und Lebensgenuss in Deutschland, von **A. M.** Die Cholera, von **H.** Die Romane, von **W. M.** Blicke auf die neuesten Bearbeitungen der französischen Staats- und Rechtsgeschichte, von **L. F. Warnkönig**. Die Menschenrassen, von **H. H.** Die Gesangbuchsreform, von **G.** Über die Entstehung und Erweiterung des großen deutschen Zollvereins, von **H. Nebenius**. Übersicht der Leistungen der konstantinopolitanischen Presse in den letzten sieben Jahren, von **Hammer-Purgstall**.

Die Zahl der gebildeten Männer aus allen Classen, welche den Beruf und das Bedürfnis fühlen, sich über Alles, was die geistige Welt im Großen anregt, auf dem Laufenden zu erhalten und die Stellung genau zu erkennen, welche das Wissen gegen das Leben nimmt, wächst immer mehr und mehr an. Je mehr sie in ihren besondern Fächern vorzuschreiten streben, desto notwendiger fühlen sie das Bedürfnis einer fortwährenden Zuthat allgemeiner Bildung, welche sie über dem Täglichen erhalten soll. Für sie, die an Allem Theil nehmen möchten, was die Zeit bewegt, aber nicht Muße genug haben, was für sie wichtig ist in den gelehrten Zeitschriften zusammenzusuchen, oder nicht die Mittel, sich alles hierher Gehörige anzuschaffen, für sie zunächst soll durch die Viertel-Jahrsschrift gesorgt werden. Sie soll die Ergebnisse eifriger Forschung und gründlichen Denkens, auch für Denjenigen, den das praktische Leben ganz in Anspruch nimmt, verständlich und nuzenbringend, die wohlverwogenen, leidenschaftlichen Urtheile eines geläuterten Geschmacks für einen weitem Kreis denkender, strebender und lernbegieriger Geister zugänglich machen; kurz, eine Verbindung zwischen dem einsamen Arbeitszimmer und den verschiedenartigen Lebenskreisen der nicht gelehrten Welt herstellen durch das Zusammenwirken einer größeren Anzahl wohlmeinender, über die zu verfolgenden Zwecke einverständener Männer. Strebend nach Ernst und Gründlichkeit, wird diese Zeitschrift — als Organ der Überzeugung und Wahrheit — hauptsächlich und durchweg es als ersten Zweck verfolgen, überflüssig dem praktischen Leben näher zu bringen, was das Reich der Geister bewegt.

Mit wenig Worten:

zwischen dem praktischen Leben und der in der Literatur für dasselbe liegenden Ausbeute will die Viertel-Jahrsschrift vermitteln.

Was sie zu erreichen wünscht, wäre also für den jeweiligen Standpunkt der verschiedenen geistigen Richtungen, eine Reihe von leading articles, nicht im Geiste eines Tagblatts, sondern in dem einer Viertel-Jahrsschrift überflüssig aufgeführt, und zwar mit sorgfältiger Beachtung des Nothwendigen und Praktischen, mit reiflicher Erwägung dessen, was gerade an der Zeit ist, mit gänzlicher Entfernung der Leidenschaften des Tages, mit deutscher Unparteilichkeit und deutschem guten Glauben, und mit dem ruhigen würdigen Tone, welcher der Wissenschaft ziemt, und welcher allein einer guten Sache frommen kann.

In diesem Sinne beizutragen zu der Viertel-Jahrsschrift, laden wir ebenso angelegentlich als ehrerbietig alle Diejenigen ein, welchen das Bedürfnis, besonnen vorzuschreiten und die Nothwendigkeit vorschwebt, daß die Berufsgelehrten sich auch in Deutschland der praktischen Richtung und Bildung in dem Maße nähern müssen, in welchem diese sich zum Wissen steigert.

Entsprechende Beiträge werden anständigst honorirt werden, und im Wege des Buchhandels, aus Norddeutschland über Leipzig

durch Herrn **L. H. Bösenberg** daselbst,

aus Süddeutschland aber

durch Beisatz unserer Literarisch-artistischen Anstalt zu München,

unserer Verlags-Expedition zu Augsburg,

des Herrn **Aug. Neumann** zu Nürnberg,

der **Andreas'schen** Buchhandlung zu Frankfurt,

oder direct durch den Postwagen, uns am besten zukommen.

Stuttgart und Tübingen, im April 1838.

**J. G. Cotta'sche** Buchhandlung.

**Brockhaus & Avenarius** in Paris und Leipzig haben den Debit des nachstehenden höchst interessanten Werks übernommen:

## Panorama de l'Allemagne,

par une Société d'hommes de lettres  
français et allemands sous la direction

de  
**Mr. Savoye.**

Vorläufig erscheint alle 14 Tage ein Heft von einem Bogen Text und zwei artistischen Beilagen.

Abonnement für 12 Hefte 2 Thlr. 16 Gr.

Das erste Heft wird Ende April ausgegeben. Prospective stehen auf Verlangen zu Diensten.

Eine deutsche Ausgabe mit den Kupfern des Originals wird vorbereitet, und das Nähere darüber noch bekannt gemacht werden.

Wenngleich die Hauptaufgabe des **Panorama de l'Allemagne** ist, eine richtigere Kenntniss Deutschlands in Frankreich zu verbreiten, so wird dasselbe doch auch in Deutschland durch die Art und Weise der Behandlung des Stoffes mannichfaches Interesse erregen, und Vieles den Reiz gänzlicher Neuheit haben.

Ausgezeichnete Literaten beider Völker sind für das Unternehmen gewonnen; wir nennen z. B. **Impère, Barchou de Penhven, Whil. Châles, Cousin, Dahlmann, Depping, Diez, Fauriel, Fichte, Gaud, Servinus, Girardin, Jacob und Wilhelm Grimm, Guizot, Heine, Kugler, Lachmann u. s. w.** Somit lassen sich gründliche Arbeiten in geschmackvoller Form erwarten.

Paris und Leipzig, den 15ten April 1838.

### Schul-Ausgabe von Campe's Robinson.

Vielfach ist von Schulmännern der Verlagehandlung der Wunsch ausgesprochen, die Einführung des

### Campe'schen Robinson

als Lesebuch auf Schulen durch eine recht wohlfeile Ausgabe zu erleichtern. Diesem Wunsche genügen wir, indem wir die Erscheinung einer überaus billigen und hübschen Schulausgabe dieses klassischen unübertroffenen Kinderbuches zum Preise von 12 Gr. ankündigen. Doch wird das Buch zu diesem Preise nur bei Partien von 25 Exemplaren abgegeben; es ist aber jede Buchhandlung, bei der die Bestellung einer solchen Anzahl von Exemplaren gemacht wird, in den Stand gesetzt, einzelne Exemplare für den Preis von 12 Gr. zu liefern.

Braunschweig, März 1838.

Schulbuchhandlung. — Friedr. Vieweg & Sohn.

### Oestreichische militairische Zeitschrift. 1838.

Drittes Heft.

Dieses Heft ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versendet worden:

Inhalt: I. Die Einrichtung leichter Truppen. II. Die Besetzung von Bergen-op-zoom in der Nacht vom 8ten bis 9ten März 1814. III. Der Feldzug 1705 in Portugal und Spanien. — Zweiter Abschnitt. IV. Kriegsgesenen aus der Geschichte des k. k. 4ten Dragonerregiments Großherzogs von Toscana. Schluss. — Vertreibung und Rettung des Colonnenmagazins zu Gottschee, im August 1813. — Auszeichnung des Rittmeisters Alt im Gefechte bei Altenburg am 28sten September 1813. — Gefecht am 10ten October 1813 bei Pressitz. — Streifzug des Oberstleutnants Renniger in Südrussland, im Februar 1814. — Gefechte vom 20sten Februar bis nach der Einnahme von Lyon am 21sten März 1814. — Ereignisse des Feldzuges 1815 gegen Murat, an welchem das Dragonerregiment Theil nahm. — Geschichte des Regiments vom Jahre

1817—37. V. Berichtigung zur Geschichte der Eroberung von Konstantine 1837. VI. Neuere Militairveränderungen.

Der Preis des Jahrgangs 1838 von 12 Heften ist wie der aller frühern Jahrgänge von 1818—37 jeher 8 Thlr. Sächsl.

Die Jahrgänge 1811—13 sind in einer neuen Auflage in vier Bänden vereinigt erschienen und kosten zusammen ebenfalls 8 Thlr. Sächsl. Wer die ganze Sammlung von 1811—37 auf einmal abnimmt, erhält dieselbe um  $\frac{1}{4}$  wohlfeiler.

Von dem Unterzeichneten ist diese Zeitschrift durch alle Buchhandlungen um die genannten Preise zu beziehen.

Wien, den 20ten April 1838.

J. G. Heubner,  
Buchhändler.

Bei Witz. Engelmann in Leipzig ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## Goethe als Dramatiker.

Von

**Dr. H. Dünger.**

Gr. 12. 1 Thlr. 12 Gr.

Inhalt: I. Wesen des Dramas. Goethe's betreffende Äußerungen. — II. Goethe und Schiller als Dramatiker. — III. Goethe's dramatische Laufbahn. — IV. Goethe und die Griechen. — V. Goethe's Iphigenie, verglichen mit der Euripideischen und Gluckischen. — Nachträge.

Bei E. Anton in Halle ist soeben erschienen:

Sendeschreiben an J. Görres von Heinrich  
Leo. Gr. 8. 9 $\frac{1}{2}$  Bogen. Geh. Preis  
16 Gr.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

## Das Pfennig-Magazin

für Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse.

1838. April. Nr. 262—265.

Nr. 262. \*Albrecht Dürer. Canada (Beschluss). \*Das Einfangen wilder Gelfanten in Geylon. Die Rußeländer. Die Leiden des Jahres 1837. Kieselsteine aus Schalen von Infusorienthieren. Wie weit kann die Runkelrübenzuckerfabrikation getrieben werden? — Nr. 263. \*Marie Christine, Königin-Regentin von Spanien. Stützen aus dem Leben der Cäsaren. \*Das Eismeer auf dem Montblanc. Der Plattensee in Ungarn. Verbindung zwischen dem atlantischen und stillen Meere. \*Der Raiman. — Nr. 264. \*Praça do Comercio in Lissabon. Glasmalerei. Fontanelle und sein Spargel. Die Abessinier. \*Rembrandt. Verwundung des Dorfs in Brenntzohle und Düngefeld. Die Stadt Buffalo in Nordamerika. Handel mit Menschenhaaren in Frankreich. — Nr. 265. \*Die Pilger in der Wüste. Die Sklaverei auf der Insel Cuba. \*Gloas. Chemische Versuche mit verschiedenen Zuckersorten. Höhen bewohnter Orte über dem Meere und Höhen einiger Gebäude. XI aus Schildkröteneiern. Golbsand am Ural.

Die mit \* bezeichneten Aufsätze enthalten eine oder mehrere Abbildungen.

Preis dieses Jahrgangs von 52 Nummern 2 Thlr. — Der erste Jahrgang von 52 Nrn. kostet 2 Thlr., der zweite von 59 Nrn. 1 Thlr. 12 Gr., der dritte von 52 Nrn. 2 Thlr., der vierte von 53 Nrn. 2 Thlr., der fünfte von 52 Nrn. 2 Thlr. Leipzig, im Mai 1838.

F. A. Brockhaus.



# Für Bibliophilen, Lesecirkel und Museen.

In meinem Verlage erscheint und nehmen alle Buchhandlungen Bestellungen an:

Leipziger Allgemeine

## Zeitung für Buchhandel

und  
Bücherkunde.

### Inhaltsverzeichnis Nr. 1—4.

**Correspondenznachrichten:** aus London, Kassel, Paris, Berlin, Stuttgart, Amsterdam und St.-Petersburg.

**Abhandlungen:** Anmerkungen über den Einfluss des deutschen Buchhandels auf die deutsche Literatur. — Französische Geseßgebung über literarisches Eigenthum. — Bücher und Literaten in London. — Zur Geschichte der Kunsttypographie und Kunsttypographie. — Talpou's Copyrightbill. — Königl. württembergischer Geseßentwurf über das schriftstellerische und künstlerische Eigenthum und über den Schutz gegen Nachdruck und Nachbildung. — Der gegenwärtige Zustand des Musikalienhandels in Deutschland.

**Buchhandel und Bücherkunde.** Das Wichtigste der Buch-

druckerkunst. (Kritik.) — Handbuch der Buchführerangelegenheiten. (Kritik.) — Bibliographie paléographique-diplomatique-bibliologique générale. (Kritik.)

**Allgem. Movitänzettel.** Verzeichniß demnächst erscheinender Bücher, Landkarten und Kunstfachen.

**Miscellen.** Literarischer Verein in Wien u. s. w. — Metamorphose deutscher Schriftsteller. — Tractatlein. — Neue Art Abonnenten zu gewinnen. — Hülfverein für Buchhändler in London. — Murphy, der Wetterprophet. — Mittel gegen Nachdruck. — Zeitschrift für Wahrheit. — Der Bibliophilen-Verein in London.

**Bekanntmachungen.** Literarische und vermischte Anzeigen.

Die Zeitung für Buchhandel und Bücherkunde erscheint vom 1. Mai ab jeden Sonnabend (1 Bogen gr. hoch 4.); das damit verbundene Recensionenverzeichnis (sämmlicher seit 1sten Januar d. J. in deutschen und ausländischen Zeitschriften recensirten, in Deutschland erschienenen Bücher) am 1sten eines jeden Monats. Der Preis für den Jahrgang 1838 (3 Quartale oder 39 Nrn.) ist 3 Thlr., des Recensionenverzeichnisses (12 Nrn.) 1 Thlr. 8 Gr. — Inserate werden gegen Vergütung von 1 Gr. für die Zeile aufgenommen. — Beilagen pro 500 mit 1 Thlr. berechnet. — Passende Beiträge (Correspondenzen oder Abhandlungen) werden dankbar angenommen und angemessen honorirt.

Leipzig, im Mai 1838.

J. F. Weber.

Soben erschien bei R. F. Köhler in Leipzig und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

### Görres

und

### Athanasius.

Gr. 8. Brosch. 65 S. 8 Gr.

Das Publicum findet in dieser (von einem geachteten Autor verfaßten) Schrift eine Beleuchtung des Treibens der Partei, als deren Ghorführer Görres aufgetreten ist, die der in Deutschland bestehenden Cultur, Wissenschaft und Bildung, sowie dem geläuterten religiösen Leben die dumpfe Mystik und papistische Druck des Mittelalters entgegensetzt.

Für jeden Gebildeten, der einen Überblick über das Wollen und Wirken dieser jetzt kräftig wiederaufstehenden Partei — sowie über ihr Verhältnis zu dem jetzigen geistigen und sittlichen Zustande Deutschlands erlangen will, wird dies Schriftchen eine interessante, willkommene Lecture sein.

Bei F. L. Schmidten in Moskau ist Soben erschienen:  
Zur Beurtheilung der sieben göttlicher Professoren und ihrer Sache. In Briefen von **Dr. Georg Beseler**, ord. Professor des deutschen Rechts an der Universität zu Moskau.  
8. Geh. 12 Gr.

Soben ist erschienen und in allen Buchhandlungen vorrätzig:

### Die Bäder und Heilquellen Schlesiens und der Grafschaft Glatz.

Für Brunnen- und Badereisende

bearbeitet von

Dr. Karl Christian Hille.

Mit zwei Kärtchen.

8. Geh. 16 Gr.

Diese Monographie teilt sich an die im vorigen Jahre erschienenen Schriften des Verfassers an:

Die Heilquellen in allgemein wissenschaftlicher Beziehung und deren zweckmäßige Benützung. 8. Geh. 12 Gr.  
Die Heilquellen des Königreichs Böhmen und der Markgrafschaft Mähren. Mit zwei Kärtchen und dem Plane von Ratlesbad. 8. Geh. 20 Gr.

Demnächst werden die Beschreibungen der Ost- und Westseebäder, der Bäder am Nieber- und Oberhein und der Lauenburgbäder folgen, und sich daran die Bearbeitungen der übrigen Bäder und Heilquellen Deutschlands und der Schweiz reihen, in der Weise, daß das Ganze ein seinen Gegenstand in topographischer und diätetischer Hinsicht erschöpfendes Werk bilden wird.

Leipzig, im Mai 1838.

J. A. Brockhaus.

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XIX.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Zeile 2 Gr.

## Ueber den Stand und Fortgang des Werkes:

Das

## malerische und romantische Deutschland. Bericht an das geehrte Publicum.

Wir stehen mit Ueberlieferung des zehnten Heftes des „Harz“ am Schlusse der vierten Section unsers Werkes. Möge uns vergönnt sein, hier einige Worte über Das, was wir gewollt, was wir bisher gewirkt und was ferner zu bieten uns am Herzen liegt, auszusprechen.

Die Idee, ein Werk zu liefern, welches alle Schönheiten der Natur in den Gauen unsers Vaterlandes umfasst in Schilderung und künstlerischer Darstellung, war in ihrer Ausführung mit unsäglichem Mühn verbunden. Es galt da, die besten deutschen Kräfte für Text, Zeichnung und Stich zu gewinnen; Dichter und Maler mussten die Gegenden durchwandern, um ein lebendiges Bild abzulauschen, ja wir mussten die Hülfe englischer StICKKünstler in Anspruch nehmen, da wir in der Heimat der Männer nicht genug fanden, um das Ganze in ununterbrochener Reihe fortzuführen. Dass bei all diesen Schwierigkeiten einige Mängel sich zeigen mussten, wie Verzögerung in Ablieferung, oder ein nicht vollkommen gelungener Stich, ist wol verzeihlich und wird auch mit Nachsicht beurtheilt worden sein.

Wir sind aber jetzt auf einer Station angekommen, von der wir dem Ziele, das wir uns gestellt, frohen Muthes entgegensehen können. Die Theilnahme, deren wir bei solch einem Unternehmen bedurften, ist uns von den Gebildeten Deutschlands in vollem Masse geworden; wir sprechen dafür unsern Dank aus und leben der Ueberzeugung, dass wir uns des uns bisher geschenkten Wohlwollens auch für die Fortsetzung unsers Bilderwerkes erfreuen dürfen, da wir rüstig und rührig fortwirken werden, stets bemüht, immer Vorzüglicheres zu leisten. Dies Bestreben möge die eben beendigte Harz-Section bezeugen, die in ihren mit lieblichen Gruppen belebten Bildern eine Anschauung des pittoresken Landstriches und seiner Bewohner gibt, wie sie noch in keinem bisher erschienenen Stahlstichwerke erreicht wurde.

Vollendet sind nun und, jede Section einzeln, zu haben:

**Die sächsische Schweiz** von A. von Tromlitz, mit 30 Stahlstichen. Preis 3 Thlr. 8 Gr.

**Schwaben** von Gustav Schwab, mit 30 Stahlstichen. Preis 3 Thlr. 8 Gr.

**Thüringen** von Ludwig Sechstein, mit 30 Stahlstichen. Preis 3 Thlr. 8 Gr.

**Der Harz** von W. Blumenhagen, mit 30 Stahlstichen. Preis 3 Thlr. 8 Gr.

Begonnen ist:

**Die malerischen und romantischen Donauländer** von Eduard Duller, mit 60 Stahlstichen. (Zeichnungen von Prof. Alt in Wien. Das erste Heft davon ist erschienen.)

Vorbereitet ist und beginnt in Kurzem:

**Das malerische und romantische Rheintal** von Karl Simrock, mit 60 Stahlstichen. (Zeichnungen von Galeriedirector Frommel in Karlsruhe.)

Im Laufe des Sommers wird begonnen:

**Das Frankenland** von G. von Heringen, mit 30 Stahlstichen. (Zeichnungen von Prof. L. Richter in Dresden.)

Leipzig, am 1sten Juni 1838.

Georg Wigand.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:  
**Das Pfennig-Magazin**  
für Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse.  
1838. Mai. Nr. 266 — 269.

Nr. 266. \*Maria da Gloria. Das Nordcap. Die relative Höhe des schwarzen und eisigen Meeres. \*Der Gang nach dem Eisenhammer. Die elektrischen Fische. Der neuseeländische Haub oder die Pflanzenseide. \*Etoas (Beschluß). — Nr. 267. \*Händel und sein Denkmal in der Westminsterabtei. Die Insel Ascension. \*Eine chinesische Heirath. Chronik der Eisenbahnen in den Jahren 1835, 1836 und 1837. \*Schedrick's Strafe des Diebstahls. \*Das Kloster von Troja bei Moskau. — Nr. 268. \*Der Korknab bei Moira in Portugal. \*Der Zar Swan. Benutzung des Bluts als Düngemittel. Tunnels auf Eisenbahnen. Ursache der Müdigkeit auf hohen Bergen. Fütterung der Seidenraupen mit Reisemehl und Kartoffelsäcke. \*Der kaiserliche Palast in Delhi. — Nr. 269. \*Die Schnitter in den pontinischen Sümpfen. Verhütung des Auswachsens der Kartoffeln durch Einweichen in Ammoniakwasser. Wann wurde die Buchdruckerkunst erfunden? \*Der Kanzler Bacon. \*Die schwarzen und rothen Ameisen in Australien. \*Die Stadt Bezgiers in Frankreich und die Verfolgung der Albigenser.

Die mit \* bezeichneten Aufsätze enthalten eine oder mehrere Abbildungen.

Preis dieses Jahrgangs von 52 Nummern 2 Thlr. — Der erste Jahrgang von 52 Nrn. kostet 2 Thlr., der zweite von 39 Nrn. 1 Thlr. 12 Gr., der dritte von 52 Nrn. 2 Thlr., der vierte von 53 Nrn. 2 Thlr., der fünfte von 52 Nrn. 2 Thlr. Leipzig, im Juni 1838.

J. A. Brockhaus.

In Karl Gerold's Buchhandlung in Wien ist soeben erschienen und daselbst, sowie in allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

**Jahrbücher der Literatur. Einundachtzigster Band.**  
1838. Januar. Februar. März.

**I n h a l t.**

- Art. I. Übersicht von zwanzig Reisen in die Türkei. (Schluß.)
- II. Deutsche Sprache und Literatur. Von M. W. Götzinger. Erster Band. Stuttgart 1837. (Schluß.)
- III. Die Schweiz. Ein Handbuch für Reisende. Von E. von Bollmann. Stuttgart und Zürich 1837.
- IV. Geschichte der Philosophie. Von Dr. F. Ritter. Dritter und vierter Theil. Hamburg 1834.
- V. Neuere Geschichte der Deutschen von der Reformation bis zur Bundesacte, von Karl Adolph Mengel. 7 Bände. Breslau 1826—37.
- VI. Gemäldeaal der Lebensbeschreibungen großer moslimischer Herrscher der ersten sieben Jahrhunderte der Hidjret, von Hammer-Purgstall. Erster, zweiter und dritter Band. Leipzig und Darmstadt 1837.
- VII. Neue Beiträge zur Physiologie des Gesichtsinnes. Von Dr. A. M. Wolfmann. Leipzig 1836.
- VIII. Beiträge zur Philosophie des Rechts. Heidelberg 1836.
- IX. Recueil des Actes de l'Académie imp. de St.-Petersbourg. Petersburg 1837.

**Inhalt des Anzeiger-Blattes Nr. LXXXI.**

- 1) Dello amore ai Veneziani di Tiziano Vecellio, delle sue case in Cadore e in Venezia, e delle vite de' suoi figli, notizie dell' Ab. Giuseppe Cadorin, corredate da documenti inediti. Venezia 1833.

- 2) Sulla Capellina degli Scrovegni nell' arena di Padova e sui freschi di Giotto in essa dipinti, osservazioni di Pietro Estense Selvatico. Padova 1836.
- 3) Del Palazzo Ducale in Venezia, lettera discorsiva. Venezia 1837.
- 4) Le premier siècle de la Calographie, ou catalogue raisonné des estampes du cabinet de feu M. le comte Leo. Cicognara, avec une appendice sur les Nielles du même cabinet. — Ecole d'Italie par Alexandre Zanetti. Venise 1837.

Hammer-Purgstall's morgenländische Handschriften. (Fortf.)

Bei Wiltb. Engelmann in Leipzig ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

**Historisches Lesebuch**

enthaltend

**Erzählungen und Schilderungen**

aus den Quellschriftstellern entlehnt

und

für die Jugend bearbeitet

von

**Dr. A. F. W. Ranx,**

Lehrer am Gymnasium zu Gießen.

I.

Erzählungen aus der alten Geschichte.

Gr. 8. 1838. Brosch. 1 Thlr. 6 Gr.

**Oestreichische militairische Zeitschrift. 1838.**

Viertes Heft.

Dieses Heft ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versendet worden:

Inhalt: I. Die Operationen der verbündeten Heere gegen Paris im März 1814. (Fortsetzung.) — 32. Der 20ste März. Schlacht von Arcis. Erster Tag. Mit einer Karte zur Übersicht der Operationen bei Arcis, Fere Champeoise und Saint-Dizier, und dem Plane des Schlachtfeldes bei Arcis am 20ten und 21sten März 1814. — II. Die Waffenübungen bei Wofnesenst 1837. — III. Literatur. — IV. Neueste Militairveränderungen. — V. Miscellen und Notizen.

Der Preis des Jahrgangs 1838 von 12 Heften ist wie der aller früheren Jahrgänge von 1818—37 jeder 8 Thlr. Sächf. Die Jahrgänge 1811—13 sind in einer neuen Auflage in vier Bänden vereinigt erschienen und kosten zusammen ebenfalls 8 Thlr. Sächf. Wer die ganze Sammlung von 1811—37 auf einmal abnimmt, erhält dieselbe um  $\frac{1}{4}$  wohlfeiler.

Von dem Unterzeichneten ist diese Zeitschrift durch alle Buchhandlungen um die genannten Preise zu beziehen.

Wien, den 10ten Mai 1838.

J. G. Heubner,  
Buchhändler.

In gegenwärtiger Zeit wird es nicht unangemessen erscheinen, auf das bekannte Werk von

**Lamennais**  
**Affaires de Rome**

aufmerksam zu machen. Preis der pariser Ausgabe in gr. 8. 2 Thlr. 16 Gr., der brüsseler Ausgabe in 12. 1 Thlr. 6 Gr. Leipzig, im Juni 1838.

**Brockhaus & Wennerius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und an diejenigen Buchhandlungen, welche darauf subscribirt, versandt worden:

# August Graf von Platen's gesammelte Werke.

Prachtausgabe in Einem Band in zwei Lieferungen.

Mit des Verfassers Bildniß in Stahl gestochen und einem Facsimile seiner Handschrift.

**Erste Lieferung,**

**oder Bogen 1—20, mit Platen's Portrait.**

Subscriptionspreis 1 Thlr. 20 Gr., oder 3 Fl.

Wir hoffen dem Wunsche vieler Freunde und Verehrer Platen's durch diese würdige Ausgabe seiner Werke, welche in Format, Schrift und Papier der Ausgabe von **Goethe's Werken in Zwei Bänden** sich anreihet und mit gleicher Sorgfalt behandelt wird, entgegenzukommen. Diese erste Lieferung, zumeist das Poetische enthaltend, bringt auch die noch nie gedruckten letzten Poesien des Verfassers, deren Veröffentlichung man seit dem Tode des Dichters sehnlich entgegengehehen.

Der nur noch kurze Zeit offen bleibende Subscriptionspreis für das ganze Werk ist 3 Thlr. 16 Gr., oder 6 Fl., und ist derselbe bei Empfang jeder Lieferung mit 1 Thlr. 20 Gr., oder 3 Fl., zu entrichten. Später tritt ein erhöhter Ladenpreis ein.

Stuttgart und Tübingen, im April 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**

Im Verlage von Julius Klinkhardt in Leipzig ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## Prof. Dr. Friedr. Francke, Das selbständige und reine Leben des Gefühls,

als des Geistes ursprünglichen Urtheils  
im Gegenfaze und Kampfe mit den Träumen vom  
Absoluten bei den Scholastikern und Neuplatonikern  
unserer Tage.

**A. u. d. T.: Zur Theorie und Kritik der  
Urtheilskraft.**

Gr. 8. Velinpapier. Brosch. 1 Thlr. 16 Gr.

Die Principien und Ideen des Wahren, Guten und Schönen, welche wir nach der Organisation unseres Geistes in unserm rein-vernünftigen Leben in uns tragen, den Anlässen nach, werden hiernach nicht nur bloß durch die logisch vermittelnde Reflexion des wissenschaftlichen Verstandes in uns zum deutlichen Bewußtsein entwickelt, sondern dem voraus kommen sie uns schon immer in der Anwesenheit des wirklichen Lebens durch dieselbe Kraft, durch die Denkraft oder Urtheilskraft, d. i. in der Thätigkeit des **Gefühls**, unmittelbar zum klaren Bewußtsein. Wollen wir die Muttergestalten und Normen des geistigen Lebens in Kirche und Staat, in Schule und Leben, im wirklichen Leben zur schönen Erscheinung bringen, so müssen wir auch zugleich und vorher auf die reine Naturstimme des Gefühls hören.

Bei Th. Chr. Fr. Enslin in Berlin ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Wiesbaden nebst seinen Heilquellen und Umgebungen, von

**Dr. Gustav Heinrich Richter,**  
prakt. Ärzte und Wundärzte in Wiesbaden, Mitglieder mehrerer gelehrten Gesellschaften.

Mit einer Ansicht von Wiesbaden und einer Titelvignette.

Sauber broschirt 1 Thlr. 12 Gr.

Es stellt diese Schrift, deren Verfasser dem ärztlichen Publicum als ein gebildeter und erfahrener Arzt schon rühmlichst bekannt ist, einen sehr schätzbaren Beitrag zur ge-

hörigen Würdigung der grossen Wirksamkeit der Heilquellen zu Wiesbaden dar, welche, ohne den Wechsel der Mode unterworfen zu sein, jetzt noch fortwährend Tausenden die Hülfe leisten, welche vergebens auf andern Wegen gesucht wurde. Die Summe der Erfahrungen, welche sich jährlich an dieser Quelle machen lässt, ist gross, und der Inhalt dieser zeitgemässen Schrift daher in pathologischer und therapeutischer Hinsicht für Ärzte ebenso lehrreich, als durch eine Reihe anderer Mittheilungen für Laien, welche diese Quellen benutzen wollen, unentbehrlich. Das Äussere derselben darf gleichfalls als geschmackvoll und ansprechend bezeichnet werden.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

**Jsis.** Encyclopädische Zeitschrift, vorzüglich für Naturgeschichte, Anatomie und Physiologie. Von Dken. Jahrgang 1837. Zwölftes Heft. Gr. 4. Preis des Jahrgangs von 12 Heften mit Kupfern 8 Thlr.

**Allgemeine medicinische Zeitung.** Herausgegeben von Dr. Karl Pabst. Jahrgang 1837. Monat November, oder Nr. 87—95. Gr. 4. Preis des Jahrgangs 6 Thlr. 16 Gr.

**Blätter für literarische Unterhaltung.** (Verantwortlicher Herausgeber: Heinrich Brockhaus.) Jahrgang 1838. Monat Mai, oder Nr. 121—151, 1 Beilage, Nr. 3, und 3 literarische Anzeiger: Nr. XVI—XVIII. Gr. 4. Preis des Jahrgangs von 365 Nummern (außer den Beilagen) auf seinem Druck-Velinpapier 12 Thlr.

**Repertorium der gesammten deutschen Literatur.** Herausgegeben von E. G. Gersdorf. 1838. Sechszehnten Bandes zweites und drittes Heft. (Nr. VIII, IX.) Gr. 8. Preis eines Bandes 3 Thlr.

**Allgemeine Bibliographie für Deutschland.** Jahrgang 1838. Monat Mai, oder Nr. 18—21, und Bibliographischer Anzeiger: Nr. 18—21. Gr. 8. Preis des Jahrgangs 3 Thlr.

Leipzig, im Juni 1838.

**J. A. Brockhaus.**

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

## Das Pfennig-Magazin für Kinder.

1838. April. Nr. 14 — 17.

**Nr. 14.** \* Die Gefangennehmung und Verurtheilung Jesu. Des Krotus Trost im Winter. \* Der Güzgenich in Köln. Wer nicht hört, muß fühlen. \* Der Heronsbrunnen und Heronsball. Auflösung der Räthsel im vorigen Monat. Räthsel. — **Nr. 15.** \* Neptun. Der winzige Schuh, ein irisches Märchen. \* Der kleine Schiffshalter oder Hemmschiff. Von dem Weiskande, welchen zuweilen Thiere einander leisten. Von der Nützbarkeit der Pflanzen. \* Die Heerschnecke. Räthsel. — **Nr. 16.** \* Die Muskatennüsse. Die schlaun Ameisen. Die Oshen der Hottentotten. \* Das brandenburger Thor zu Berlin. Der heldenmüthige Buffard. \* Die Urde Noah's. Räthsel. — **Nr. 17.** \* Die Blinden. Zwei merkwürdige Dinge. \* Die virginische Beutelratte oder das nordamerikanische Drossum. Die Vertheilung der Pflanzen als Nahrungsmittel der Thiere. Eine Wolfsskalle. \* Die Blattläuse.

Die mit \* bezeichneten Aufzäge enthalten eine oder mehrere Abbildungen.

Preis dieses Jahrgangs von 52 Nummern 1 Thlr. — Der erste bis vierte Jahrgang kosten ebenfalls je 1 Thlr.

Leipzig, im Juni 1838.

J. A. Brochhaus.

Bei Aug. Wilh. Unger in Königsberg ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

**Geographie des Herodot.** vorzugsweise aus dem Schriftsteller selbst dargestellt von Hermann Bobrik. Gr. 8. Mit einem Atlasse von 10 Karten. 3 Thlr.

**Dischhausen, Herm.,** Commentar über das Neue Testament. 1ster Band, enthaltend die drei ersten Evangelien bis zur Leidengeschichte. 3te Auflage. Gr. 8. Subscriptionspreis 3 Thlr.

**Saalschütz, Dr. Jos. Levin,** Forschungen im Gebiete der hebräisch-ägyptischen Archäologie. I. Zur Geschichte der Buchstabenschrift. Mit 1 lithographirten Tafel. Gr. 8. 12 Gr. (15 Sgr.)

**Rosenkranz, Karl,** Der Zweikampf auf unsern Universitäten. Gr. 8. 4 Gr. (5 Sgr.)

**Gebser, Dr. Aug. Rud.,** Die frommen Regungen unserer Tage. Gr. 8. In Commission. 4 Gr. (5 Sgr.)

Soeben gaben wir aus und ist von uns zu beziehen:

## La chute d'un ange. Episode

par  
**Alphonse de Lamartine.**

2 vols. Ausgabe in gr. 8. 5 Thlr. 18 Gr. Kleine

Ausgabe in 18. 1 Thlr. 18 Gr.

Leipzig, im Juni 1838.

**Brochhaus & Wenariuss,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.

(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

Soeben ist erschienen und an alle Buchhandlungen versandt:

## Grundzüge zur Lehre von der Krankheit und Seilung,

von  
**Dr. A. F. H. Marx.**

Preis 4 Fl. 30 Kr.

## Herophilus.

Ein Beitrag

## Geschichte der Medicin

von  
**Dr. A. F. H. Marx.**

Preis 1 Fl. 12 Kr.

Karlsruhe und Baden, im April 1838.

D. R. Marx'sche Buch- und Kunsthandlung.

Soeben ist erschienen:

Statistische Übersicht der **Eisenbahnen, Kanäle und Dampfschiffahrten** Europas und Amerikas, nach allen einzelnen Staaten zusammengestellt und verglichen von **Moris Kränzl**, Prof. der Statistik. **Mit einer, die Eisenbahnen und Kanäle veranschaulichenden Karte.** Gr. 8. Preis 18 Gr. Bestellung darauf nimmt jede Buchhandlung an. Friedrich Volke's Buchhandlung in Wien.

Bei Eduard Anton in Halle ist soeben erschienen: **Eisenhart, Dr. Hugo, Sanct Georg.** Ein Versuch zur Begründung des Neuhegelianismus, mitgetheilt auf Veranlassung des Richard-Rothe'schen Ausfalls gegen die Kirche. Gr. 8. 2 1/2 Bogen. Geh. Preis 6 Gr.

**Leo, Dr. H.,** Leitfaden für den Unterricht in der Universalgeschichte. 2ter Theil. Gr. 8. 15 Bogen. Preis 12 Gr.

## Die Resultate der Wassercur zu Gräfenberg.

Mit einer Abbildung.

8. Geh. 1 Thlr.

In Briefen, welche theils an Laien und theils an einen Arzt gerichtet sind, gibt der Verfasser dieser neuerlich erschienenen und in allen Buchhandlungen vorrätigen Schrift Mittheilungen über die von ihm selbst bestandene eigenthümliche Curmethode Priesnitz's, welche durch eine geistreiche Aufassungsweise an und für sich eine interessante Lecture, Demjenigen aber, der sich der Wassercur unterwirft, einen sichern Rathgeber und selbst für Ärzte manches Beachtenswerthe bieten. Leipzig, im Juni 1838.

**J. A. Brochhaus.**

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XX.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Zeile 2 Gr.

## Erklärung.

Ich habe die Darstellung der Herbart'schen Philosophie, welche Hr. Prof. Michelet zu Berlin in seiner „Geschichte der letzten Systeme der Philosophie in Deutschland“ (Berlin 1837, Bd. 1) versucht hat, in meiner Schrift: „über die neuesten Darstellungen und Beurtheilungen der Herbart'schen Philosophie“ (Leipzig 1838), einer Kritik unterworfen. Hr. Prof. Michelet hat sich dagegen an zwei Orten (berliner „Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik“, Mai 1838, Nr. 87—89, und in der Vorrede zum 2ten Band seiner „Geschichte der Philosophie“) vernehmen lassen. Er mag sich einbilden, dadurch nicht nur sich selbst glänzend gerechtfertigt, sondern auch die Herbart'sche Philosophie vernichtet zu haben. Die Harmlosigkeit dieser Einbildung wird ihn für den Unwillen entschädigen, welchen ihm mein angeblich persönlicher Angriff auf ihn erregt hat. In Wahrheit aber ist mir die Person des Hrn. Prof. Michelet vollkommen gleichgültig; nur konnte ich von einer Darstellung der Herbart'schen Philosophie, die ihn zum Verfasser hat, nicht sprechen, ohne ihn persönlich zu berühren. Seine Erwiderungen auf meinen Tadel können mich, was meine Person anlangt, weiter nicht beunruhigen. Ebenso scheint, was die Sache anlangt, Hr. Prof. Michelet entschlossen, der Nachweisung der größten und handgreiflichsten Fehler, die ihm nicht als Kritiker, sondern als Historiker, d. h. zunächst als dem Referenten einer fremden Gedankenreihe zur Last fallen, um jeden Preis das unabhängigste Siegesgeheiß entgegenzusetzen; er besitzt und übt den Muth und die Kunst, die eigentliche Begründung des

Tadels bei Seite zu schieben und, was er anführt, nach Bedürfnis zu verdrehen und zu entstellen, in einem Grade, der auf die Ehre eines weitem Verkehrs mit ihm Verzicht zu leisten gebietet; er vermag sich das Majestätsverbrechen einer Dypposition gegen das Hegel'sche System nur aus der retrograden Bornirtheit angeblich sehr weniger, vernünftenswerther Individuen zu erklären; er sieht auf den Ernst einer Unterfuchung, die in den Meinungen des Zeitalters für wissenschaftliche Fragen keinen Schiedsrichter in letzter Instanz anerkennt, mit dem Hohnlächeln herab, mit welchem ein Kleiberkünstler einen Rod betrachtet, dessen Schnitt nicht an demier godt de la capitale ist; er hat endlich durch die Petulanz, mit welcher er nicht nur auf Herbart's Lehre, sondern auf Herbart's Person und äußere Stellung losgeschlagen hat, seinem Charakter ein Denkmal gesetzt, welches durchaus unangetastet stehen bleiben muß. — Aus allen diesen Gründen werde ich den, der äußern Form nach allerdings von mir, der Sache nach durch seine überaus schlechte Darstellung von Hrn. Prof. Michelet hervorgerufenen Streit nicht weiter fortsetzen und begnüge mich, auf meine oben genannte Schrift zu verweisen, weil ich erwarten darf, daß man sie liest, ehe man sein Urtheil fesselt. Hr. Prof. Michelet kann also die in diesem Kampfe erungenen Vorblätter ruhig dem Kränze einschieben, der, um ein unschuldiges, von ihm mit wohlfeilem Witz weidlich abgekehrtes Wort zu gebrauchen, noch von einer andern Gelegenheit her seinem Haupte „auflieft“!

Leipzig, im Juni 1838.

G. Hartenstein.

Soeben ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu erhalten:

## Goethe

von

J. P. Eckermann.

8. Geh. 1 Thlr. 12 Gr.

Der Verfasser hat durch die Herausgabe seiner Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. (1823—32.) Zwei Theile. Zweite, mit einem Register versehene Ausgabe. 8. 1837. Geh. 4 Thlr. der Lesewelt eine so interessante Gabe geboten, daß man begierig sein wird, ihn auch in seinen eignen poetischen Productionen kennen zu lernen.

Leipzig, im Juni 1838.

F. A. Brockhaus.

Bei F. Rubach in Berlin ist soeben erschienen:  
Monographie der Krankheiten der Leber nebst anatomischen und physiologischen Bemerkungen über dieses Organ von Olivier, Adelon, Ferrus und Bérard. Nach der 2ten französischen Auflage überfetzt von Dr. W. Bernbard. Preis 16 Gr.

## Anzeige für Ärzte und Chirurgen.

Bedeutend ermässiger Preis

von

Dr. Joh. Nep. Rust's

theoretisch-praktischem

## Handbuch der Chirurgie

in alphabetischer Ordnung, 17 Bände und ein Registerband, zusammen 832 Bogen.

Ladenpreis 69 Thlr., jetzt für 25 Thlr.

Die Herabsetzung des Preises der wiener Ausgabe veranlaßt mich, dies Werk gleichfalls für eben denselben oben angegebenen Preis, jedoch nur auf so lange, bis die wiener Ausgabe vergriffen sein wird, abzulassen; ich behalte mir also den Widerruf vor, und bitte um baldige Bestellungen. Da der praktische und wissenschaftliche Werth desselben anerkannt ist, so brauche ich zur Empfehlung nichts beizufügen. Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen an.

Berlin, im Juni 1838.

Th. Chr. Fr. Enslin.

## Chateaubriand's neuestes Werk.

Neu ist erschienen und an alle Buchhandlungen von uns  
verfandt:

### Congrès de Vérone.

Guerre d'Espagne. Négociations: Colonies  
espagnoles;

par

### M. de Chateaubriand.

Edition originale.

2 vols. Gr. 12. 1 Thlr. 12 Gr.

Diese namentlich zum Debit in Deutschland bestimmte Ausgabe ward in Leipzig an demselben Tage ausgegeben, an welchem das Werk in Paris erschien; sie ist in Paris mit aller Correctheit und Sauberkeit gedruckt und verdient, abgesehen von dem äußerst niedrigen Preise, somit unbedingten Vorzug vor einem etwa von Brüssel ausgehenden Nachdrucke.

Der Preis der Großoctavausgabe in 2 Bänden ist 4 Thlr. 16 Gr. über die hohe Bedeutung dieses Werks für die Zeitgeschichte ist nur eine Stimme.

Leipzig, im Juni 1838.

**Brockhaus & Wennerius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen und in allen  
Buchhandlungen zu haben:

**Dr. C. G. Carus.**

System

der

## Physiologie

für

Naturforscher und Ärzte.

1ster Theil,

das Allgemeine der Physiologie, die physiologische Geschichte der Menschheit und die physiologische Geschichte des Menschen enthaltend. Gr. 8. 2 Thlr.

**Ahasver.**

Episches Gedicht

von

**Julius Rosen.**

Gr. 8. Broschirt. 1 Thlr. 12 Gr.

**C. G. Wilke.**

Der

## Urevangelist,

oder das Verwandtschaftsverhältniß der drei ersten Evangelien. Gr. 8. 4 Thlr.

**E. Kopp.**

Beitrag zur Darstellung eines reinen einfachen Baustyls.

Mit Kupfern. Folio.

1stes Heft: Entwürfe zu 13 Kirchen im Epigonenstyl.  
6 Thlr. 2tes Heft: zu 4 Synagogen. 2 Thlr. 3tes Heft:  
zu einem Museum und einer Gemäldegalerie. 2 Thlr. 4tes Heft:  
Kritik über das Berliner Museum. 1 Thlr.

Dresden und Leipzig, im Mai 1838.

Gerhard Fleischer.

In Karl Gerold's Buchhandlung in Wien  
ist soeben erschienen, und daselbst sowie in allen Buchhandlungen  
der österreichischen Monarchie zu haben:

## Dramatische Beiträge.

Von

**Joseph Wertheimer.**

Wien 1838.

12. In Umschlag broschirt. Preis: 1 Fl. 15 Kr. C. & M.

Wir freuen uns, in diesem Bande die gelungene Bearbeitung des „Buceligen“ von Sheridan-Knowles, welche auf der k. k. Hofbühne mit entschiedenem Beifalle aufgenommen und oft wiederholt wurde, dem Publicum übergeben zu können, indem dieses Schauspiel neben dem glücklichen dramatischen Erfolge dem Herrn Herausgeber auch den Dank erwirbt, einen bedeutenden, der deutschen Welt kaum bekannten Dichter würdig vorgeführt zu haben. Ein Lustspiel in vier Acten: „Eheliches Leben“, nach dem Englischen des Buckstone, und ein Lustspiel in einem Act: „Der Mantelsack“, ebenfalls nach dem Englischen des Gilbert, füllen den Band, der mit einem Originaldrama in einem Acte und in Versen: „Der Hirtensohn“, schließt. Wenn schon dem Publicum eine geistreiche Lecture mit diesem Buche geboten ist, so ist den Theaterdirectoren, bei dem verwaisten Markte dramatischer Producte, durch vorliegende bühnengerechte Spiele ein wesentlicher Dienst geleistet.

Bei Wih. Engelmann in Leipzig ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## Klosternovellen

von

**Dr. F. Gustav Kühne.**

1ster u. 2ter Band. Raoul.

Gr. 12. Broschirt. 2 Thlr. 12 Gr.

Dieser Roman hat den großen Kampf zwischen Staat und Kirche zum Inhalt. Sein Schauplatz ist in den Klöstern von Südranreich und in der Schweiz (Theil 1), und in Paris (Theil 2) zur Zeit der Verschönerung des Jesuitismus gegen Heinrich IV. und Sulz.

## Adelig und Bürgerlich.

Novelle

von **Julius Hammer.**

Gr. 12. Broschirt. 1 Thlr. 6 Gr.

Der Titel dieser Novelle bestimmt den Standpunkt genau, in welchen socialen Verhältnissen diese sich bewegt; der Leser wird mehr als eine gewöhnliche Lecture in dem Buche finden.

In meinem Verlage ist neu erschienen:

**Bunte Skizzen**

aus

## Ost und Süd.

Entworfen und gesammelt in Preußen, Rußland, der Türkei, Griechenland, auf den ionischen Inseln und in Italien, von

**F. Tietz.**

Zwei Theile.

8. Geh. 3 Thlr.

Leipzig, im Juni 1838.

**F. A. Brockhaus.**



In der Unterzeichneten sind soeben erschienen und an diejenigen Handlungen, welche darauf subscribirt haben, versandt worden:

# Goethe's Gedichte

in zwei Theilen

mit dem Bildniß des Verfassers,

in demselben Format, auf dem nämlichen Papier und mit denselben Lettern gedruckt, wie die mit so allgemeinem Beifall aufgenommene Octavausgabe von Schiller's Werken.

**Subscriptionspreis 2 Thlr. 8 Gr., oder 4 Fl.**

Durch Veranstaltung dieser neuen Ausgabe glauben wir dem vielfach geäußerten Wunsch, die Gedichte eines Schiller und Goethe in ganz gleichmäßig schöner Ausstattung besitzen zu können, entsprochen zu haben und auf vielseitig günstige Aufnahme rechnen zu dürfen.

Stuttgart und Tübingen, im April 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**

In meinem Verlage ist erschienen:

Ergänzungen der

## Allgemeinen Gerichtsordnung

und der Allgemeinen Gebührentaxen für die Gerichte, Justiz-commissarien und Notarien in den Preussischen Staaten, des Stempelgesetzes, Salarien-Kassen-Reglements, sammt der Instruction für die Ober-Rechnungs-Kammer, wie auch die Verordnungen der General-Commissionen u. s. w.

Herausgegeben von

**Friedrich Heinrich von Strombeck.**

Vierter Band. Enthaltend die Nachträge zur dritten Ausgabe derselben, bearbeitet und bis auf die neueste Zeit fortgeführt von

**Ferdinand Leopold Lindau.**

Gr. 8. Auf Druckpapier 1 Thlr. 4 Gr. Auf Schreibpapier 1 Thlr. 12 Gr.

Um den Ankauf dieses durch die Nachträge wieder höchst brauchbar gewordenen Werkes zu erleichtern, gebe ich alle 4 Bände zusammengekommen auf Druckp. jezt für 4 Thlr. 16 Gr., auf Schreibp. für 7 Thlr. 12 Gr. — Strombeck's Ergänzungen des Allgemeinen Landrechts für die preussischen Staaten, fortgesetzt von F. L. Lindau, 4 Bände, kosten nur 5 Thlr. auf Druckp. und 8 Thlr. auf Schreibp. Leipzig, im Juni 1838.

**F. A. Brockhaus.**

Bei Drell Köppli und Comp. in Zürich ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

**Annotationes anatomicae**

de

**velamentis cerebri**

et

**medullae spinalis.**

Auctore **Dr. Fr. Arnold.** Prof. Turic.

Cum I tab. lith. 4maj. Brotschirt.

Preis 1 Fl. 30 Kr.

Soeben erschien:

**Leben und Abenteuer**

des

**Nikolaus Nickleby.**

Nach dem Englischen des Hoz,

des Verfassers der Pickwicker,

bearbeitet von Dr. Hermes.

Mit Federzeichnungen nach Phiz.

Erstes Heft. Mit zwei Zeichnungen. 12. 8 Gr.

In England wurden von dem 1sten Hefte des vorliegenden Werkes 50,000 Exemplare gedruckt, und binnen wenigen Stunden 17,000 Exemplare verkauft. — Die Fortsetzung erscheint gleichmäßig mit dem englischen Originale.

Braunschweig, den 1sten Juni 1838.

**George Westermann.**

**Beachtenswerthe Anzeige für Prediger, Schullehrer und Bibelfreunde.**

An alle Buchhandlungen ist soeben versandt:

**Utter, F. A. P.** (Superint. und Consistorialr. in Dhrdruff), **Summarien**, oder kurzer Inhalt, Erklärungen und erbauliche Betrachtungen der heil. Schrift des Neuen Testaments, zum Gebrauch bei kirchlichen Vorträgen, zur Vorbereitung für Prediger auf freie, erklärende und erbauliche Vorträge über ihre Vorträge, auch für Schullehrer zur Erklärung für die Schulkinder und zur häuslichen Erbauung für jeden fleißigen Bibelleser. 4ter Band in 2 Abtheilungen. Vom Briefe Paulus an die Galater bis zum Briefe Judä. Gr. 8. Leipzig, bei A. Wienbrack. 1 Thlr. 8 Gr. (Alle 4 Bände zusammen 5 Thlr. 16 Gr.)

Mit diesem 4ten Bande ist nun ein Werk geschlossen, für dessen Zweckmäßigkeit und Brauchbarkeit die günstige Aufnahme spricht, welche die früher erschienenen Theile bereits gefunden haben. Möge das Buch in recht vieler Hände kommen, um durch Erleichterung des Verständnisses der heiligen Schrift den Nutzen zu stiften, welchen der ehrwürdige und freisinnige Verfasser beabachtete.

Die Unterzeichneten erlauben sich, auf folgendes in Paris demnächst erscheinende Werk vorläufig aufmerksam zu machen:

## Histoire de l'empereur Napoléon

illustrée par

**Horace Vernet,**

mit 500 dem Texte eingedruckten Holzschnitten.

Das Ganze wird, ausgestattet wie die illustrierten Prachtausgaben des Molière, Gibbas von Lesage u., einen starken Band bilden und in Lieferungen ausgegeben werden.

**Ausführliche Prospekte** bitten wir durch alle Buchhandlungen von uns zu verlangen und vorläufige Bestellungen an diese zu richten.

Leipzig, im Juni 1838.

**Brockhaus & Avenarius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

Im Verlage der Nicolai'schen Buchhandlung in Berlin ist soeben erschienen:

## Die Lehre vom Gelde

als

Anleitung zu gründlichen Urtheilen  
über das Geldwesen

mit besonderer Beziehung auf den  
preussischen Staat

vorgetragen von

**J. G. Hoffmann,**

Director des statistischen Bureau's zu Berlin.

Velinpapier. Sauber geheftet. 1 Thlr. 5 Sgr.

Diese Schrift, welche ein hochgeachteter Staatsmann hiermit der Öffentlichkeit übergibt, wird allen Denen, welche sich mit Staatswirthschaft im weitesten Sinne beschäftigen, um so willkommener sein, als dieser Gegenstand eben jetzt durch die Veränderung des Münzfußes im Königreich Hannover und Herzogthum Braunschweig einerseits und durch den Abbruch des süddeutschen Münzvereins andererseits eine besondere Bedeutung für das gesammte deutsche Vaterland gewonnen hat. Es enthält dieselbe ganz neue, bisher von Niemand nachgewiesene Aufschlüsse über das wahre Wesen des Geldes, seine unvermeidliche allmähliche Entwerthung und die Nothwendigkeit eines festen Münzfußes. Ebenso wichtig sind die darin zum ersten Male gegebenen zuverlässigen Angaben über die in Preußen geprägte Geldmenge, sowie über die Mittel, welche einer Regierung zu Gebote stehen, um den gesetzlichen Münzfuß mit dem wirklichen Metallwerthe des umlaufenden allgemeinen Zahlungsmittels fortwährend im Gleichgewicht zu halten.

Von der sehr interessanten Schrift:

## Religionsbeschwerden

der Protestanten in Ungarn, wie sie auf dem letzten Reichstage abgehandelt worden.

Brosch. Preis 1 Thlr.

ist soeben die 2te unveränderte Auflage erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Leipzig, den 10ten Juni 1838.

C. Scheld & Comp.

Im dem Verlage des Unterzeichneten ist soeben erschienen:

## HANDBUCH ZUR BÜCHERKUNDE

für

**Lehre und Studium**

der

beiden alten classischen und deutschen Sprache.

Von

**Dr. S. F. W. Hoffmann.**

Gr. 8. 30 Bogen. Preis 1 Thlr. 21 Gr.

Der durch seine Schriften bekannte Verfasser dieses Werkes gibt darin eine sorgsame Übersicht der bedeutendsten und brauchbaren Werke für Unterricht und Wissenschaft, mit Winken über Zweck und Wahl derselben, wie die heutige Zeit es fodert, aber noch kein Werk, es bietet. Die unterzeichnete Verlags-handlung hofft daher, es wird Lehrern, Studierenden, Schülern der höhern Gymnasialclassen, sowie Allen, in deren Interesse die Kenntniss der Literatur für das Studium und den Unterricht des classischen Alterthums, der deutschen Sprache und auch des gelehrten Unterrichtswesens liegt, eine willkommene und befriedigende Erscheinung sein, und die allgemeinste Theilnahme finden.

Leipzig, im April 1838.

**Karl Cnobloch.**

Bei

**C. Schünemann in Bremen**

ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

**Meier, Geburtshülflche Beobachtungen und Ergebnisse, gesammelt in der obstetricischen Klinik zu Halle, nebst Beschreibung der Niemeyer'schen Kopfzange und eines Kephalo-lykometer. Mit 2 Steintafeln. Geh. 1 Thlr.**

In meinem Verlage ist neu erschienen:

**Aus dem Leben**

zweier Schauspieler:

**August Wilhelm Iffland's**

und

**Ludwig Devrient's.**

Von

**3. Funck.**

Auch unter dem Titel:

**Erinnerungen aus meinem Leben in biographischen Denkskizzen und andern Mittheilungen. Zweiter Band: A. W. Iffland und L. Devrient. 8. Geh. 1 Thlr. 12 Gr.**

Die günstige Aufnahme, welche den Erinnerungen aus dem Leben C. A. W. Hoffmann's und G. G. Wegeler's (1836, 1 Thlr. 12 Gr.) zu Theil wurde, glaubte der Verfasser als eine Aufforderung ansehen zu dürfen, in seinen Mittheilungen über interessante Persönlichkeiten, zu denen er in nähern Verhältnissen stand, fortzufahren und bietet in diesem Bande eine nicht minder interessante Gabe.

Leipzig, im Juni 1838.

**F. A. Brockhaus.**

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXI.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

## Conversations-Lexikon der Gegenwart.

Ein  
für sich bestehendes und in sich abgeschlossenes Werk,  
zugleich ein Supplement  
zur achten Auflage des Conversations-Lexikons,  
sowie zu jeder frühern,  
zu allen Nachdrucken und Nachbildungen desselben.

Gr. 8. In Heften von zehn Bogen.

Preis eines Heftes:

Auf feinem Druckpapier	8 Groschen.
Auf gutem Schreibpapier	12 Groschen.
Auf extrafeinem Velinpapier	18 Groschen.

Leipzig, bei F. A. Brockhaus.

Die allgemeine Theilnahme, welche das **Conversations-Lexikon der neuesten Zeit und Literatur** von 1832 gefunden, gab der Verlags-handlung Veranlassung, schon im Nachwort am Schlusse dieses Werkes zu bemerken, daß der hier abgerissene Faden künftig wieder aufgenommen, und in einer dazu geeigneten Form ein neuer Spiegel der Zeit aufgestellt werden solle.

Jahre sind seitdem verfloßen; eine neue Auflage (die **achte**) des **Conversations-Lexikons**, das trotz aller Concurrenz in immer weitem Kreise Verbreitung gefunden hat, ist beendet worden und in diese das **Conversations-Lexikon der neuesten Zeit und Literatur** seinem wesentlichen Inhalte nach übergegangen. Es hat demnach dieses Werk aufgehört, ein notwendiges Supplement des **Conversations-Lexikons** zu sein, obschon es als ein treues Abbild jener aufgeregten Zeit von 1830 nicht bloß in Hinsicht der geschilderten Begebenheiten, Zustände und Personen, sondern auch durch die Art und Weise der Darstellung selbst, in welcher sich nicht minder deutlich die Zeit seines Erscheinens ausdrückt, einen bleibenden Werth behalten wird.

Dringend stellt sich bei den immer raschern Fortschritten in der Entwicklung des gesellschaftlichen Zustandes und bei der immer lebendigeren Theilnahme, welche die Zeitgenossen dieser Entwicklung widmen, das Bedürfnis wieder heraus, die Masse der Begebenheiten, die die jüngste Vergangenheit bewegt, und die Resultate, welche während dieser Zeit in

Wissenschaft, Kunst und praktisch im Leben erstrebt wurden, in einem lebendigen Bilde vorgeführt zu sehen. Diesem Bedürfnisse soll das

## Conversations-Lexikon der Gegenwart

dienen, das in Anlage und Form mit der achten Auflage des Conversations-Lexikons übereinstimmend,

### ein für sich bestehendes Ganzes

bildet, insofern alle darin enthaltenen Artikel in sich abgeschlossene Darstellungen sind, das aber zugleich die achte Auflage des **Conversations-Lexikons**, namentlich was die **neueste Zeit** betrifft, ergänzt und somit den Besitzern dieser, sowie aller früheren Auflagen, aller Nachdrucke und Nachbildungen desselben, als ein

### unentbehrliches Supplement

sich darbietet.

In dem **Conversations-Lexikon** kann die Geschichte, selbst der neuesten Zeit, nur in allgemeinen Umrissen gezeichnet, die staatswissenschaftlichen Entwicklungen und andere Erörterungen interessanter Fragen können nur in ihren Resultaten gegeben, eine Menge Gegenstände nur im Allgemeinen berührt und nur die ausgezeichnetesten Persönlichkeiten biographisch geschildert und charakterisirt werden. Das neue Werk wird als Supplement in allen den berührten und vielen andern Beziehungen das Hauptwerk ergänzen und bis zur Gegenwart fortführen; es wird aber als ein selbstständiges Werk nicht immer da beginnen, wo das Hauptwerk aufhört; es wird die historischen Darstellungen nicht grade von dem Punkte aus fortsetzen, der ihnen in dem Hauptwerke als Grenze gesetzt ist; es wird im Gegentheil immer bis zu dem Punkte zurückgehen, ohne dessen Berührung die Gegenwart nicht vollkommen verstanden werden kann.

Das **Conversations-Lexikon der Gegenwart** wird Alles umfassen, was in der neuesten Zeit in irgend einer Richtung bedeutend hervorgetreten ist. Es wird in Beziehung auf das **Conversations-Lexikon der neuesten Zeit und Literatur** von 1832 gleichsam ein zweites Zeitbild sein; wie jenes die Zeit von 1829 an schilderte, so ist dieses bestimmt, die Gegenwart zu schildern, und ein solches aus dem Leben gegriffenes Bild derselben zu geben. Es wird mit einem Worte Alles enthalten, was dem Gebildeten zum Verständnis der Gegenwart dient, und auf diese Weise als einen treuen und besonnenen Führer und Berater im Gedränge der Ereignisse sich zu bewähren suchen. Der Standpunkt aber, von welchem dasselbe ausgeht, kann kein anderer sein, als der **liberale** — im edlen Sinne des Wortes —, denn **anständige Freimüthigkeit** ist die allgemeine Forderung und das Lösungswort der Gegenwart.

Der Verlagshandlung ist es gelungen, in den meisten europäischen Staaten für die betreffenden geschichtlichen Artikel Männer zu gewinnen, die die Verhältnisse genau kennen und mit unbefangenen Auge beurtheilen. Ebenso hat sie hinsichtlich der Artikel aus dem Gebiete der Wissenschaft, der Kunst und des praktischen Lebens sowie der Biographien der thätigsten Mitwirkung der namhaftesten und hinsichtlich der Darstellungsgebe gewandtesten Fachgelehrten, Kunstkenner und Techniker sich versichert. Was endlich die zur Verarbeitung der Biographien nöthigen Materialien betrifft, so haben sich fast durchgehend mit großer, dankbar zu erkennender Bereitwilligkeit die zuverlässigsten Quellen eröffnet. Die Verlagshandlung darf demnach hoffen, ihren Plan auf das befriedigendste ausführen und nicht nur ein nützlich und tüchtiges Werk zum Nachschlagen, sondern auch zugleich ein namentlich durch gewandte Darstellung anziehendes Lesebuch liefern zu können.

Die Reichhaltigkeit des neuen Werks einigermaßen zu bezeichnen, lassen wir eine Uebersicht der im ersten und zweiten Heft behandelten Artikel folgen:

Aal (Jakob) — Abaca (Don Joaquin) — Abbas Mirza — Abd-el-Kader — Abegg (Johann Friedrich) — Abegg (Julius Friedrich Heinrich) — Abeken (Bernhard Rudolf) — Abel (Karl von) — Abercromby (James) — Ablösung — Abolition — Abrantes (Herzogin von) — Absolutismus — Actenverfälschung — Actienwesen — Adam (Charles Adolphe) — Adel und Bürgerstand in der neuesten Zeit — Advocatenvereine — Afrika — Afzelius (Familie) — Agardh (Karl Adolf) — Agassiz (Louis) — Agnew (Sir Andrew) — Aguado (Alexandre Marie) — Agypten — Alquist (Abraham) — Ahumada (Marquis de las Amarillas, Herzog von) — Alquist — Alaya (Don Miguel Ricardo de) — Albrecht (Wilhelm Eduard) — Alexander Karl (Herzog von Anhalt-Bernburg) — Alger — Allard — Almodovar (Don Josefjo Diaz de Alivera, Graf von) — Alons Maria Joseph Johann Joachim Franz (Fürst von Liechtenstein) — Alten (Karl August, Graf) — Alterthumsvereine — Alvensleben (Albrecht, Graf von) — Amann (Heinrich) — Amerika — Amici (Giovanni Battista) — Ammon (Friedrich August von) — Ammon (Friedrich Wilhelm Philipp von) — Ampère (André Marie) — Ampère (Jean Jacques) — Amberg (August Philipp Christian Theodor von) — Ameler (Samuel) — Ankarjörärd (Karl Pentik, Freiherr) — Anderlont (Pietro) — Anderen (H. G.) — Andorre — Andraea e Silva (Joseph Bonifaz — Anton Karl — Martin Franz d') — Anhalt — Anton (Clemens Theodor), König von Sachsen — Appropriationsclausel — Aprilproceß in Frankreich — Aprilunruhen in Frankreich — Arcana — Archäologie — Archivwesen — Arenberg (August Maria Raimund, Fürst von — Ernst, Freiherr von) — Arens (Franz Joseph, Freiherr von) — Argelander (Friedrich Wilhelm August) — Argentanfabrikate — Argout (Xpollinaire, Graf v') — Aristokratismus und seine Gegensätze — Arincourt (Victor, Vicomte d') — Armanberg (Joseph Ludwig, Graf von) — Arnoldi (Ernst Wilhelm) — Ariaza y Superviela (Don Juan Baptista de) — Arwidsson (Adolf Thore) — Aschbach (Joseph) — Asiatische Gesellschaften — Askefeld (Johann Christoph) — Asfercuranz — Associationen — Ast (Georg Anton Friedrich) — Aster (Ernst Ludwig — Karl Heinrich) — Asthetik —

**Athen** — **Attentate** — **Audry de Vuyraveau** (Pierre François) — **Außenberg** (Joseph, Freiherr von) — **August** (Paul Friedrich), Großherzog zu Oldenburg — **Augusti** (Johann Christian Wilhelm) — **Auslieferung** — **Auswanderungen** — **Bader** (Franz von) — **Babbage** (Charles) — **Bach** (Wilhelm) — **Bachmann** (Gottlob Ludwig Ernst) — **Bachmann** (Karl Friedrich) — **Bach** (George) — **Baden** — **Bähr** (Johann Christian Felix) — **Bayern**.

Das **Conversations-Lexikon der Gegenwart** wird, um die Artikel, da sie sich auf die Gegenwart beziehen, bald nach ihrer Abfassung in das Publicum zu bringen und die Anschaffung zu erleichtern, in

## Hefen von 10 Bogen

zu dem Preise:

auf weißem Druckpapier 8 Gr.,  
auf gutem Schreibpapier 12 Gr.,  
auf extrafeinem Velinpapier 18 Gr.,

ausgegeben werden. Der Umfang läßt sich, da die Zeit stets Neues bringt, nicht genau bestimmen, indeß werden wol 20—24 Hefte zu einer genügenden Ausführung des Plans hinreichen. Die Hefte sollen sich so rasch folgen, als die auf die Bearbeitung und Redaction zu verwendende Sorgfalt es irgend gestattet.

Das erste und zweite Heft sind bereits erschienen und in allen Buchhandlungen zur Ansicht zu erhalten.

Leipzig, im Juli 1838.

**J. A. Brockhaus.**

## Literarische Anzeige.

Von der

**CENTRAL-BIBLIOTHEK**  
der *Literatur, Statistik und Geschichte*  
der *Pädagogik und des Schul-Unterrichts*  
im In- und Auslande, herausgegeben von

Dr. **H. G. Brzoska**, Prof. in Jena,  
sind bis jetzt 4 Hefte erschienen und an die Abonnenten versandt.

Die Reichhaltigkeit derselben ist am besten aus nachstehendem Inhaltsverzeichnisse zu ersehen:

- A. LITERATUR:** 1) Dr. **F. H. Ch. Schwarz** in seinem Leben und Wirken als Pädagog dargestellt. 2) **Knoz**: Liberale Erziehung; oder: praktische Abhandlung über die Methode der Erwerbung nützlicher und feiner Gelehrsamkeit. 3) Über die hohe Bedeutung, welche die neuerlich in der Methode der Psychologie eingetretene Reform für die Pädagogik hat. Von Dr. **F. E. Beneke**. 4) **Dahlmann**: Die Volksbildung. 5) **Jost**: Über Unterricht in den alten Sprachen, namentlich für Nichtstudierende, im Vergleich mit dem Unterrichte in der hebräischen Sprache bei den Juden. 6) **Fleck**: Ursprüngliche Einheit der Pädagogik und der Heilkunst. 7) Mad. **Necker de Saussure**: Die Erziehung des Menschen auf seinen verschiedenen Altersstufen. Relation von Dr. **Mönnich**. 8) Dr. **Nik. Bach**: Über die Grenzen der Gymnasialbildung. 9) **Literarische Anzeigen**: a) Die Pädagogik des Hauses von **Heinsius**. b) Lehrbuch der Katechetik von **Müller**. c) Licht und Finsterniß von **Axt**. d) Über den Zustand der heutigen Gymnasien von **Axt**. e) Deutsches Declamatorium von **Kannegiesser**. f) Leitfaden bei dem Unterricht in der israelitischen Religion von **Rüdinger**. g) Lehrbuch der israelitischen Religion. h) Elementarbuch von **Presburger**. **B. STATISTIK:** 1) St.-Galler katholisches Schulwesen. 2) **Alexander von Krusenstern**: Abriss des Systems der Fortschritte und des Zustandes des öffentlichen Unterrichts in Russland. 3) Über die neuesten mit dem Schul- und Studienwesen in Baiern vorgenommenen Veränderungen. 4) Verordnung über die gelehrten Schulen im Großherzogthum Baden nebst dem Lehrplane für dieselben. 5) Erlass des königl. Ministeriums des Unterrichts in Betreff der durch die Schrift des Med.-Raths Dr. **Lorinser**: „Zum Schutz der Gesundheit in den

„Schulen“ veranlasseten Untersuchungen des Gymnasialzustandes. 6) **Fr. Ellendt**: Über die Verordnung des königl. preuss. Ministeriums vom 24sten Oct. 1837 nebst Nachwort von **Brzoska**. 7) **Nik. Bach**: Bemerkungen über den Erlass des königl. preuss. Ministeriums u. s. w. 8) **Brzoska**: Über die in Schwarzburg-Sondershausen unterm 10ten Febr. 1838 erlassene Verfügung, die Bestrafung der Schulkinder betreffend. 9) Das Schulwesen des Großherzogthums Hessen, dargestellt von **Schaumann**. 10) Basellandschaft. 11) **Brzoska**: Über die Verordnung des weimarschen Oberconsistoriums vom 13. Febr. 1833 in Betreff der pädagogischen Studien auf der Universität zu Jena. 12) *Correspondenznachrichten*: a) Zur Statistik der Realschulen in der preussischen Rheinprovinz. b) Canton Zürich. c) Aus der Schweiz. d) Aus Kurhessen. e) Aus Bern. f) Aus dem Großherzogthum Hessen. g) Aus Canton Solothurn. 13) *Programme*: a) Frankfurt a. M.: Israelitische Realschule. b) Berlin: Universität.

**C. GESCHICHTE:** Die Gegenwart in ihren pädagogischen Bestrebungen und Forderungen. Mit besonderer Rücksicht auf Deutschland. Ein pädagogisch-historischer Versuch von Dr. **Fr. Cramer**.

**D. MISCELLANEEN:** 1) Pädagogisches Forum. 2) Pädagogische Paränesen. 3) Preisfrage, das Gewerbewesen betreffend, nebst Nachschrift.

**E. JOURNALISTIK:** I. Deutsche Journale. II. Ausländische Journale. A. Pädagogisch-Wissenschaftliches. B. Statistisches. C. Historisches. D. Vermischtes.

**F. INTELLIGENZBLATT:** Nr. 1—10.

Der Preis für den Jahrgang von 12 Monatsheften ist 8 Thlr.; wofür jede Buchhandlung und jedes Postamt liefern kann.

Das 5te Heft erscheint in einigen Tagen.

Halle, den 1sten Juni 1838.

**C. A. Schwetschke und Sohn.**

Soeben erschien:

**Marat,**

historischer Roman von **H. Schöppe**, geb. Weise.

2 Bände. 12. Geh. Preis 2 Thlr. 12 Gr.

Braunschweig, Juni 1838.

**G. Westermann.**

# Medicin.

## DICTIONNAIRE

### des études médicales pratiques.

Quitt volumes,

gr. in-8. de 40 feuilles, publiés en 32 livraisons.  
Paris, 1838.

Die fünf ersten Lieferungen dieses medicinischen Wörterbuchs, das sich weniger durch den Reichthum seiner Artikel, als durch die Gediegenheit derselben auszeichnet, da es nur eine Auswahl größerer, ganze Doctrinen der Wissenschaft behandelnde Aufsätze enthalten soll, sind bereits erschienen. Von den darin enthaltenen Aufsätzen dürften folgende namhaft zu machen sein: Abcès, par Denonvilliers; Abdomen, par Rigaud; Absorption, par Martins; Accouchement, par Guillemot; Acetates, par Lesueur; Adhérence, par Andral; Aiguilles, par Lenoir; Amaigrissement, par Sanson; Amaurose, par Caffé etc.

Das Werk soll in 32 Lieferungen, deren jede 20 Gr. kostet, vollständig erscheinen; alle diese Zahl überschreitenden Lieferungen werden gratis gegeben.

Leipzig, im Juli 1838.

**Brockhaus & Weyenarius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

Sorben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu haben:

### Über die Idee der Universität und ihre Stellung zur Staatsgewalt. Nebst einer einleitenden Abhandlung über die Bedeutung der kölner und göttinger Amtsentsetzung für die Staatsfragen der Gegenwart.

von

**Dr. Karl Hermann Scheidler.**

28 Bogen. 8. Broschirt. Ladenpreis 1 Thlr. 12 Gr.  
Leipzig, im Juni 1838.

**C. G. Hachhausen & Fournes.**

### Anzeiger für Philologen und jeden Gebildeten.

Bedeutend ermäßigter Preis  
von 6½ Thlr. auf 1½ Thlr.

### Caj. Cornel. Tacitus sämmliche Werke,

übersetzt

von Dr. und Professor **Wilhelm Böttcher.**  
Vier Bände, 1831 — 34.

Diese Uebersetzung des Tacitus, von der einer unserer berühmtesten Philologen sagt, daß, wenn derselbe überhaupt ins Deutsche übersetzt werden solle, es nur in der von Herrn Böttcher befolgten Weise geschehen könne, und dessen Arbeit alle seine Vorgänger bei weitem übertriffe, hat wol bis jetzt

nur des bedeutenden, wenngleich dem Umfange des Werkes nicht unangemessenen Preises wegen die wohlverdiente allgemeine Verbreitung noch nicht gefunden.

Der unterzeichnete Verleger findet sich deshalb veranlaßt, es so billig anzubieten, daß die Anschaffung Lehrern und Schülern sowie jedem Gebildeten leicht wird.

Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen an.

Berlin, im Juni 1838.

**Th. Chr. Fr. Enslin.**

### Für Lesecirkel und Leihbibliotheken.

Sorben ist bei A. Wiedenrad in Leipzig erschienen und durch jede Buchhandlung zu bekommen:

**Niesenburg und Rosenberg.** Ein Roman aus dem 14ten Jahrhundert von **Wilhelmine Lorenz.** 2 Theile. 8. Preis 2 Thlr. 12 Gr.

**Die Brüder Törnebladh.** Novelle von **Penseroso.** 3 Theile. 8. Preis 3 Thlr. 18 Gr.

Verfasser und Verfasserin dieser beiden Romane gewannen bereits durch ihre früheren Leistungen die besondere Gunst der gebildeten Lesewelt und dürften die vorstehenden einer beifälligen Aufnahme nicht minder gewürdigt sein. Während die Verfasserin der „Niesenburg u.“ mit glücklichem Talente die Vorzüge zu schildern versteht und durch eine die Aufmerksamkeit fesselnde, oft angenehm überraschende Entwicklung der Erzählung die Theilnahme des Lesers nie erlaffen läßt, zeichnet uns Penseroso die gesellschaftlichen Zustände der Gegenwart so treffend als anziehend und verleiht durch die einfache Anmuth der Details, die sanfte Wärme in den Verhältnissen beider Geschlechter zu einander, welche an die Zeit der Goethe'schen Jugend erinnert, seinen Darstellungen eine eigenthümliche Frische.

In Karl Gerold's Buchhandlung in Wien ist soeben erschienen und daselbst sowie in allen Buchhandlungen der österreichischen Monarchie zu haben:

### Hermes und Sophrosyne.

Von

**M. C n f.**

Aut imperat, aut servit — pecunia.

Hor.

12. Wien 1838. In Umschlag broschirt. Preis 1 fl. C.-M.

Dieses Werk des bereits durch mehrere Schriften rühmlichst bekannten Verfassers verdient um so mehr die Aufmerksamkeit des Publicums, als es die industriell-commercielle Richtung der Zeit aus dem Standpunkte sittlicher Lebensanschauung betrachtet.

Sorben ist erschienen und in allen Buchhandlungen vorräthig:

### Wanderbuch.

Ein Gedicht in Scenen und Liedern

von

**Hermann Schulz.**

8. Geh. 18 Gr.

Leipzig, im Juli 1838.

**f. A. Brockhaus.**

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXII.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigelegt, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

In meinem Verlage erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Bibliothek deutscher Dichter des 17ten Jahrhunderts.

Begonnen von  
**Wilhelm Müller.**

Fortgesetzt von  
**Karl Förster.**

Vierzehn Bändchen.

8. Bch. 1822—38. 20 Bch. 16 Gr.

Inhalt:

I. Martin Opitz v. Boberfeld (1 Bch. 12 Gr.); II. Andreas Gryphius (1 Bch. 12 Gr.); III. Paul Fleming (1 Bch. 12 Gr.); IV. Rudolf Weichertlin (1 Bch. 12 Gr.); V. Simon Dach, Robert Robertin und Heinrich Albert (1 Bch. 12 Gr.); VI. Friedrich v. Logau und Hans Wilmann v. Wilsch (1 Bch. 4 Gr.); VII. Julius Wilhelm Zindgraf, Andreas Zichering, Ernst Christoph Homburg und Paul Gerhard (1 Bch. 8 Gr.); VIII. Johann Rist und Daniel Georg Morhof (1 Bch. 4 Gr.); IX. Georg Philipp Harsdörffer, Johann Klaj, Sigmund v. Birken, Andreas Scultetus, Justus Georg Schottel, Adam Nierarius und Johann Schiffer (1 Bch. 4 Gr.); X. Johann Christian Günther (1 Bch. 4 Gr.); XI. Jakob Schieweger, Georg Neumark und Joachim Ranber (1 Bch. 12 Gr.); XII. Friedrich Spee (1 Bch. 8 Gr.); XIII. David Schirmer, Zacharias Lundt, Philipp Jesen (1 Bch. 20 Gr.); XIV. Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau, Daniel Casper von Lohenstein, Christian Bernike, Friedrich Rudolf Ludwig Freyherr von Caniz, Christian Weise, Johann von Besser, Heinrich Mühlensforth, Benjamin Reuticke, Johann Michael Moscherosch und Nicolaus Puckert (2 Bch. 12 Gr.).

Diese Sammlung, welche das Beachtenswerthe aus einem interessanten Zeitraum unserer Literatur in sich vereinigt, ist mit dem besten erschienenen vierzehnten Bändchen beendet.

Jedes Bändchen enthält die Charakteristik und Lebensbeschreibung der einzelnen Dichter und ist unter besonderm Titel für den bemerkten Preis zu erhalten.

Leipzig, im Juli 1838.

**F. A. Brockhaus.**

In unserm Verlage ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu haben:

## Auswahl französisch-deutscher Gespräche.

Nebst

den für die Conversation erforderlichen

**Vocabeln.**

8 Bogen. Gr. 8. Brochirt. 12 Gr.

Dieses Werk zeichnet sich dadurch vor andern dieser Art aus, daß in demselben alle fehlerhaften und ungebrauchlichen Redensarten gänzlich vermieden und die neuesten Zeitinteressen, wie Dampfboote, Eisenbahnen zc., berücksichtigt sind. Besonders

spricht es für den Werth desselben, daß es sogleich nach Erscheinen in der hiesigen Handelschule, sowie in mehren Privatinkulten, eingeführt wurde.

Früher erschienen in unserm Verlage noch folgende, die Erleichterung des Sprachstudiums bezweckende Schriften:

**Familiar letters** on various subjects, for the use of young persons of both sexes, by **J. H. Hedley.** 12. Broch. 1836. 14 Bogen. 12 Gr.

**Cent lettres familières** sur differens sujets. A l'usage de la jeunesse. Par **L. de Magy.** 12. Broch. 1836. 12 Bogen. 12 Gr.

**Nouvelle Grammaire française;** par **Noël et Chapsal.** 26e édition. 12. 1835. 10 Bogen. 9 Gr.

**Exercices français** sur l'orthographe, la syntaxe et la ponctuation; par **Noël et Chapsal.** 24e édition. 12. 1-34. 8 Bogen. 9 Gr.

**Corrigé des Exercices français** sur l'orthographe, la syntaxe et la ponctuation; par **Noël et Chapsal.** 20e édition. 12. 1834. 8 Bogen. 9 Gr.

**Abregé de la Grammaire française** ou extrait de la nouvelle grammaire, par **Noël et Chapsal.** 12e édition. 12. 1834. 3 Bogen. 5 Gr.

Bei Abnahme in Partien sind wir im Stande, noch bedeutend billigere Preise zu stellen.

Leipzig, im Juni 1838.

**C. Hochhausen & Fournes.**

In der Unterzeichneten sind soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden:

## Blüten aus Jakob Böhme's Mystik.

Von

**Dr. Wilh. Ludw. Wallen.**

Velinpapier. In Umschlag brochirt. Preis 16 Gr., oder 1 Fl.

Der Herausgeber, bekannt durch seine frühere Schrift über Böhme, welche, wie Gustav Schwab in den Heidelberger Jahrbüchern urtheilt, die strengwissenschaftliche Seite dieses tiefen, gewaltigen Geistes meisterhaft darstellt, gibt in dieser Sammlung Bilder aus der religiösen und dichterischen Weltanschauung des Weisen von Görlitz. Sie hat den Vorzug, daß sie ihren Inhalt nicht zufällig aneinandereiht, sondern ihn kunstreich gliedert und zu einem schönen Ganzen abrundet, das von den tiefsten Blicken in die Geheimnisse des Gemüthes durchleuchtet wird. Man darf deshalb wol sagen, daß mit ihr der Herausgeber seinen Zweck, dem lange verkannten, weil nicht genug bekannten, großen Genius ein Denkmal zu setzen, gründlicher erreichen wird, als der Brite, welcher ihm gegenwärtig auf seinem Grabe in Görlitz einen Marmorstein errichten läßt.

Stuttgart und Tübingen, im Juni 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**



## Chinesische Literatur.

# Le Ta Hio, Ou la grande étude, le premier des quatre livres de philosophie morale et politique de la Chine; Ouvrage de Khong - fou-tseu (Confucius) et de son disciple Tchéou-tseu;

traduit en français avec une version latine et le texte chinois en regard; accompagné du commentaire complet de Tchéou-hi, et de notes tirées de divers autres commentateurs chinois; par G. Pauthier. In-8. Paris. 5 Thlr. 20 Gr.

Von diesem Werk empfangen wir eine größere Anzahl in Commission, und ist dasselbe durch alle Buchhandlungen von uns zu beziehen.

Leipzig, im Juli 1833.

## Brockhaus & Wennerius.

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

Bei Lb. Chr. Fr. Enslin in Berlin ist nun vollständig erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Lehrbuch der Mechanik,

zugleich mit den dazu nöthigen Lehren der höhern Analysis und der höhern Geometrie.

Elementar vorgetragen und mit sehr vielen Beispielen der Anwendung versehen

von

Professor Dr. Martin Ohm in Berlin.

3 Bände, mit 4 Figurentafeln. Preis 8 Thlr. 6 Gr.

Die einzelnen Bände zu folgenden Preisen:  
1ster Bd. Mechanik des Atoms, mit 1 Tafel, 2 Thlr. 12 Gr.  
2ter = Statik fester Körper, mit 2 Tafeln, 2 = 18 =  
3ter = Dynamik fester Körper, mit 1 Tafel, 3 = — =

Alle kritischen Blätter haben sich höchst lobend über dies Werk ausgesprochen, und da der Name des Herrn Verfassers ohnehin ein in der mathematischen Literatur hochgeachteter ist, so wird dasselbe einer weitem Empfehlung wol nicht bedürfen.

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden:

## Die Eisenbahnen im Vergleich mit den Wasserstrassen.

Von

Michael Chevalier.

Auf Befehl Sr. Maj. des Königs von Würtemberg aus dem Französischen übersezt

von

Friedr. Ludw. Lindner.

Gr. 8. In Umschlag geheftet. Preis 6 Gr., oder 24 Kr.

In einer Zeit, wo der Wunsch, überall Eisenbahnen anzulegen, fast zur Leidenschaft geworden, verdient eine Schrift, in welcher diese Angelegenheit unparteiisch, mit ruhiger Berechnung untersucht wird, die Aufmerksamkeit des Publicums. In der Abhandlung des Herrn M. Chevalier, die hier in deutscher Uebersetzung erscheint, werden die verschiedenen Interessen erwogen, deren Förderung die neue Gründung beabsichtigt; in Bezug auf andere Transportmittel werden die Resultate einander gegenübergestellt, wodurch die Beurtheilung eine sichere Basis erhält. — Daß diese lehrreiche Schrift auf Befehl Sr. Majestät

des Königs übersezt und gedruckt wurde, ist ein abermaliger, in unsern Tagen keineswegs erfreulicher Beweis von der Aufmerksamkeit des erhabenen Beschüßers der Industrie auf Alles, was die Zeitbedürfnisse zu regeln und so mit Sicherheit zu besriedigen geeignet ist. Die Rücksicht auf diesen Umstand wird die öffentliche Theilnahme an der Schrift unstreitig erhöhen.

Stuttgart und Tübingen, im Juni 1833.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Bei uns sind soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu haben:

Über den Geist des Hauses Hohenzollern und die weltgeschichtliche Bedeutung des preussischen Staats. Von K. F. E. Traudorff, k. Gr. Über belletristische Schriftstellerei als Lebensberuf. Ein Wort der Warnung für Alt und Jung. Von Dr. J. E. Higin. 4 Gr.

Reise-Novellen und Erzählungen. Von Fr. Bellegno. Erster Theil. Inhalt: I. Schein trügt. Ein Reiseabenteuer. II. Der Weg zum Amte. III. Der Käufer. IV. Literat avant les lettres. 1 Thlr. 6 Gr. (Der das Werkchen schließende zweite Theil erscheint in einigen Wochen.)

Wohlfelteste Volks-Bildergalerie. Bildnisse ausgezeichneter Personen und Darstellungen nach vorzüglichen Gemälden im Holzschnitt von F. W. Gubig und unter dessen Leitung. Fünftes und sechstes Heft, à 4 Gr. (Diese beiden Hefte enthalten: 4 Bildnisse, 6 Städte- und Landschaft-Bilder, 6 Genre-Bilder.)

Berlin.

Vereins-Buchhandlung.

Bei Drell Küsti und Comp. in Zürich ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Théanthropos.

Eine Reihe von Aphorismen.

(Motto: Was ist Wahrheit?)

12. Brosch. 20 Gr., oder 1 Fl. 15 Kr.

Sehr interessante Schrift für jeden Gebildeten, vorzüglich aber für Theologie Studierende.

Neu ist in meinem Verlage erschienen und in allen Buchhandlungen vorrätzig:

## Skizzen

aus dem

## Alltagsleben.

Aus dem Schwedischen.

Erstes Bändchen:

## Die Töchter des Präsidenten.

Ergählung eines Wundervakants.

8. Geh. 1 Thlr. 16 Gr.

Die Verfasserin der „*Teckningar ur Hvardagslivet*“ hat sich in Schweden einen ausgezeichneten Namen erworben und ihre Erzählungen verdienen der deutschen Lesewelt bekannt zu werden.

Leipzig, im Juli 1833.

F. A. Brockhaus.

In neuer, wohlfeiler Ausgabe ist erschienen und durch alle Buchhandlungen von uns zu beziehen:

## Histoire de la Marine française.

Par  
*Eugène Sue.*

5 beaux volumes, grand in-8., papier vélin, avec 40 gravures sur acier, représentant des scènes de marine, les portraits des plus grands marins de l'époque, des plans, des fac-simile etc. etc.

Prix du volume 7 Fr. 50 Cent.

Der durch so manche dichterische Darstellungen aus dem Seelieben bekannte Eugène Sue hat die Aufgabe, welche er sich in dem vorstehend angezeigten Werke stellte, eine Geschichte des Seewesens unter Ludwig XIV. zu geben, in ihrem größten Umfange erfasst und mit musterhafter Gründlichkeit durchgeführt. Wie er auf der einen Seite die Vorgänge in ihrem großartigen Zusammenhange uns schildert, so begleitet er auf der andern die Seeleute nicht nur in Kampf und Gefecht, sondern auch bei friedlichen Handelszügen und in das Innere ihres Privatlebens. Was er uns gibt, ist keineswegs Roman, sondern auf authentische Documente gestützte Geschichte. Diese, größtentheils in ungedruckten Actenstücken bestehenden Documente sind äußerst zahlreich und für die politische Geschichte des 17. Jahrhunderts von hoher Wichtigkeit.

Die günstige Aufnahme, welche dem Werke zu Theil wurde, hat den Herausgeber erlaubt, den Preis dieser neuen Ausgabe von 10 Fr. auf 7 Fr. 50 Cent. per Band zu ermäßigen.

Leipzig, im Juli 1838.

**Brockhaus & Wenarius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

Bei Theod. Chr. Fr. Enslin in Berlin sind von folgenden, bereits in vielen preussischen und auswärtigen Schulanstalten eingeführten Büchern neue, sehr vermehrte und verbesserte Auflagen erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

### Terminologie der Phanerogamischen Pflanzen; zum Unterricht in der Botanik für Lehranstalten.

Nebst einer Anleitung zum Selbststudium und für den Lehrer, wie er in der Botanik mit Nutzen zu unterrichten hat.

Von  
**Dr. Albert Dietrich.**

Zweite durchaus umgearbeitete Auflage  
in Grossoctav.

Mit 24 lithogr. Tafeln, worauf mehr als 1200 Figuren befindlich sind. Gebunden 1 Thlr. 8 Gr.

### Court Abrégé de Phrases pour faciliter aux jeunes demoiselles la conversation française.

Principalement à l'usage des élèves de l'école Elisabeth  
(à Berlin).

Seconde édition, revue et augmentée de petits  
morceaux de lecture.

10 Bogen. Preis 8 Gr.

Für den speciellen Unterricht des weiblichen Geschlechts im Französischen ist die Literatur nicht eben reich und nament-

lich darunter ein dem obigen ähnliches Buch, welches alle Ausdrücke und Redensarten aus dem weiblichen Unterrichte und Geschäftskreise enthält, gar nicht vorhanden.

Ferner ist sorben fertig geworden:

### P. Vogel und Dr. W. Brennecke, Praktisches Rechenbuch

für untere, mittlere und obere Classen der Gymnasien,  
Gewerbe- und Bürgerschulen.

3. weite r Theil,

welcher eine vollständige Anleitung zum gesammten angewandten praktischen, bürgerlichen und kaufmännischen Rechnen enthält, nebst einer sehr großen Anzahl von Übungsaufgaben aus dem Gebiete der kaufmännischen Praxis, des bürgerlichen und gewerblichen Lebens, der Naturlehre u. s. w.; wie auch Angaben vielfacher Methoden vergleichender Aufgaben durch Verstandeschlüsse zu lösen und Erklärung aller auf die obigen Rechnungen bezüglichen sachlichen Verhältnisse.

19 Bogen. Preis 18 Gr.

Der erste, im Jahre 1837 erschienene Theil kostet 12 Gr.

Folgendes neue Verlagswerk debittiren wir in Commission:

### Fauna von Thüringen und den angrenzenden Provinzen.

Erscheint nach Art der Flora von Thüringen in Heften (jedoch in bedeutend größerm Formate), mit sehr schön illustrirten Kupfertafeln, zu denen der als Zeichner vieler Kupferwerke bekannte Dr. C. Schenk in Jena die Originalzeichnungen liefert. Den Text haben mehrere rühmlichst bekannte Autoren zu besorgen übernommen.

Die zuerst zu liefernden Abtheilungen sind:

### Die Schmetterlinge,

von Dr. Th. Thon,

Professor u. s. w. Verf. mehrerer entomologischer Werke,

und

### Die Säugethiere,

von Dr. C. Renner,

Prof. der vergl. Anatomie und Director der Thierarzneischule an der Universität Jena.

Der Preis des Heftes in gr. 8., mit illum. Kupfern, ist  
12 Gr.

Das 1ste und 2te Heft ist erschienen.

Leipzig.

**C. Hochhausen & Journes.**

Goeben ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu erhalten:

### Schulrede gehalten am Sylbesterabend 1837

von

Florian Felbel,

Studienrector.

Mit inactivirten und unterstellten Anmerkungen des  
Herausgebers

**Magister Wandergern.**

8. Geh. 18 Gr.

Leipzig, im Juli 1838.

**F. A. Brockhaus.**

**Brodhaus & Avenarius,**  
Buchhandlung f. deutsche u. ausländische Literatur in Leipzig  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60),  
erlauben sich auf folgende in Paris soeben erscheinende  
interessante Schrift aufmerksam zu machen:

**VIE**  
**religieuse et politique**  
de  
**TALLEYRAND,**

depuis sa naissance jusqu'à sa mort.

Ornée de trois portraits.

Par **Louis Bastide.**

(Erscheint in 15 Lieferungen, jede von 2 Bogen, im  
Preis zu 5 Gr.)

In unserm Verlag ist soeben folgende Schrift fertig ge-  
wesen und kann durch jede gute Buchhandlung bezogen werden:

**Charakteristik**

des

**Unglaubens, Halbglaubens und  
Vollglaubens,**

in Beziehung

auf die neuern Geschichten besserer Personen.

Von

**Professor Eschenmayer.**

Nebst Beleuchtung der Kritik im „Christenboten“.  
8. Geh. Preis 36 Kr.

Lüdingen.

Buchhandlung Su-Guttenberg.

**Jahrbuch für 1838.**

In der Unterzeichneten ist erschienen und an alle Buchhand-  
lungen versandt worden:

**J A H R B U C H**  
für 1838.

Herausgegeben  
von

**H. C. Schumacher,**  
mit Beiträgen von

**Bessel, Oltmans, Leopold von Buch, Kämtz,  
Aloser, Gauss, Cörsted, Olbers und Schouw.**  
8. Cart. Preis 2 Thlr., oder 3 Fl. 24 Kr.

Inhalt: Astronomische Ephemeride für 1838, Tafeln,  
um aus der Ephemeride den Aufgang der Sonne für Orte  
zwischen 44° und 55° nördlicher Breite zu berechnen. Tafeln  
zur Bestimmung der Höhen mittels des Barometers von Gauß.  
Tafeln zur Bestimmung der Höhen vermittlels des Barometers  
von J. Dittmann. Tafeln zur Verwandlung der Barometers-  
scalen. Tafeln zur Verwandlung der Thermometerscalen. Ta-

felu zur Reduction des metrischen Barometers. Tafeln für  
Vergleichung der französischen und englischen Maße. Spezifische  
Gewichte. Ausdehnung der Körper durch die Wärme. Über  
die Temperatur von Jena. Über Flut und Ebbe. Über die  
Wetterfälle. Bemerkungen über die wichtigsten Erscheinungen  
in der Atmosphäre. Gebirgswanderungen im Norden und im  
Süden. Die Sternschnuppen im August 1837.

Stuttgart und Tübingen, im Juni 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

**Bücher-Auction in Bremen.**

Montag, den 8ten Sept., und folgende Tage d. J., werden  
die von sel. Herrn Obergerichtsschreiber Dr. H. H. Meier  
und sel. Herrn Bibliothekar Prof. Rump nachgelassenen Bü-  
cher, hauptsächlich juristischen, historischen, philologischen und  
theologischen Inhalts, nebst mehrern Anhängen aus der pädago-  
gischen, theologischen, historischen, belletristischen Literatur auch  
aus andern Fächern der Wissenschaften, namentlich mit einem  
Anhang vorzüglich juristischer Werke, öffentlich den Meistbie-  
tenden durch Endgegnanten verkauft werden.

Das 14 enggedruckte Bogen starke Verzeichniß, welches  
manche ausgezeichnete Werke enthält, ist zu bekommen: in  
Berlin bei Herrn Aker, Herren List & Klemann und bei  
Herrn Wihl. Besser; in Braunschweig bei Herrn G. M.  
Meyer jun.; in Breslau bei Herren Marx & Comp.; in  
Kassel in der Krieger'schen Buchhandlung; in Frankfurt  
a. M. bei Herrn Fr. Wilmans; in Göttingen in der Expedition  
des Allgemeinen Anzeigers; in Göttingen bei Herrn Van-  
denhoed & Ruprecht; in Halle bei Herrn Auct.-Commis.  
Lippert; in Hamburg bei Herrn Schönmöller; in Hano-  
ver bei Herrn Auctionator F. Grise; in Leipzig bei Herrn  
K. Köhler und bei Herrn Otto August Schulz; in Mün-  
ster bei Herrn Regensberg; in Osnabrück bei Herrn Rack-  
horst; und in Stuttgart bei Herrn Antiquar Steinkopf.  
Zur Beförderung sicherer Aufträge ertheilen sich: Herr  
Abolf Krellenberg in der Joh. Georg Heyßel'schen Buch-  
handlung hieselbst und

Eduw. Wihl. Heyßel,  
Auctionator.

Bremen, im Juni 1838.

Neu ist in meinem Verlage erschienen:

**Naumer (Karl von),**

Professor in Erlangen,

**Beschreibung der Erdoberfläche.**

Eine Vorschule der Erdkunde.

Dritte verbesserte Auflage.

Gr. 8. 6 Bogen. 4 Gr.

Die dritte Auflage dieser kleinen Geographie ward durch  
den Verfasser mit den durch die Fortschritte der Wissenschaft  
bedingten Änderungen bereichert, unter Beibehaltung der Me-  
thode, welche auch in seinem

**Lehrbuch**

der

**allgemeinen Geographie.**

Zweite vermehrte Auflage.

Mit 6 Kupfertafeln. Gr. 8. 1 Thlr. 12 Gr.

allgemein verdienten Beifall fand. Beide Werke werden zur  
Zeitung des geographischen Unterrichts mit großem Erfolge  
benutzt.

Leipzig, im Juli 1838.

**J. A. Brodhaus.**

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXIII.

Dieser literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

In meinem Verlage ist soeben erschienen:

**Allgemeines Handwörterbuch  
der  
philosophischen Wissenschaften,  
nebst  
ihrer Literatur und Geschichte.**

Nach dem heutigen Standpunkte der Wissenschaften  
bearbeitet von

**Wilh. Traug. Krug.**

Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage.

Fünf Bände. Gr. 8. (287 Bogen.) 12 Thlr.

Der fünfte oder Supplementband auch unter dem Titel:  
Encyclopädisches Lexikon in Bezug auf die neueste Li-  
teratur und Geschichte der Philosophie. In zwei Ab-  
theilungen. A—Z. Gr. 8. 4 Thlr. 12 Gr.

Nach dem Erscheinen der zweiten Auflage der vier ersten Bände dieses Werks (1832—34, 11 Thlr.), ist der Stand der Wissenschaft durch neue Philosophen und vielerlei Schriften verändert und gefördert worden, was Lücken in manchen Artikeln zur Folge haben mußte. Der Verfasser kommt daher dem Wunsche vieler Besitzer desselben und allen Denen durch Herausgabe eines neuen Verikons entgegen, welche sich theils aus Beruf, theils mehr aus Neigung und ohne den ganzen Aufwand wissenschaftlicher Studien mit der Philosophie, als Grundlage der übrigen Wissenschaften, beschäftigen.

Um den Ankauf des ganzen nun bis auf die neueste Zeit fortgeführten Werks zu erleichtern, habe ich den Preis von 15 Thlr. 12 Gr. auf

**Zwölf Thaler**

ermäßigt, wenn alle fünf Bände zusammen genommen werden. Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an.  
Leipzig, im Juli 1838.

**F. A. Brockhaus.**

Soeben versandt wir den zweiten Band der neuen Ausgabe von:

**Gotthold Ephraim Lessing's  
sämmlichen Schriften,  
herausgegeben von Karl Zachmann.**

Zwölf Bände in Großoctav auf Velinpapier, mit Lessing's Portrait in Stahlstich. Subscriptionspreis fürs Ganze 12 Thlr.

Bis zur Michaelismesse d. J. werden in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes noch Subscriptionen angenommen.

Berlin, den 25ten Juni 1838.

Voss'sche Buchhandlung.

Bei **Imle & Liesching** in Stuttgart ist erschienen und vorrätig in allen Buchhandlungen:

**Historisch-kritische Darstellung  
der**

**POCKENSEUCHEN,**

des  
**gesammten Impf- und Revaccinationswesens  
im Königreiche Württemberg**

innerhalb der 5 Jahre Juli 1831 bis Juni 1836.

Nach den bei dem königl. Medicinalcollegium vorliegenden  
Physikatsberichten bearbeitet

von

**Professor Dr. Franz Heim.**

42 Bogen Medianformat. Preis 3 Thlr. 9 Gr., oder  
5 Fl. 24 Kr.

Wir empfehlen der Beachtung der Herren Ärzte das vorstehende Werk, das aus einer Reihe authentischer Berichte und Erfahrungen Resultate zieht, die durch ihre Neuheit und Wichtigkeit das Interesse des Mediciners im Allgemeinen, insbesondere aber des amtlichen Arztes und der Sanitätsbehörden in um so höherm Grade erregen müssen, als das vielfache Auftreten der Pockenkrankheit in neuerer Zeit die ernsthaftesten Massregeln dagegen erheischt. Nur bei einem solchen, ein geschlossenes Ganzes umfassenden Material und dem unermüdeten, durch die reichsten eignen Erfahrungen und die umfassendsten Kenntnisse der betreffenden Literatur unterstützten Fleisse des Herrn Verfassers, konnte ein Werk entstehen, dessen Verdienste in medicinischer und gesundheitspoliceilicher Beziehung gewiss die gerechteste Anerkennung finden werden.

**Neue Memoiren**

vom Verfasser der

**Mémoires tirés des papiers d'un homme d'état etc.**

Im Laufe dieses Monats erscheinen die beiden ersten Bände

**Mémoires secrets**

de 1770 à 1830,

par

**Mr. le Comte d'Allonville.**

Auteur des Mémoires tirés des papiers d'un homme d'état etc.

**6 vols. In-8.**

Preis jeder Lieferung von 2 Bänden 15 Fr.

Bestellungen bitten wir uns baldigst zukommen zu lassen.

Leipzig, im Juli 1838.

**Brockhaus & Wenarius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

# Das Pfennig-Magazin

für Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse.

1838. Juni. Nr. 270—274.

**Nr. 270.** \*Don Carlos, spanischer Kronprinz, der Gloden. \*Der Wasserfall des Niagara. Zellenwagen zum Transport der Sträflinge. Gang der Bittertraale mit Pfeffer. Eine zahlreiche Familie. Zur Statistik des Buchhandels. \*Das Grab Engelberts von Nassau in der Kirche zu Breda. — **Nr. 271.** \*Barcelona. Chronik der Erdbeben im J. 1837. Ein französischer Prinz am Senegal. \*Die Befestigung des Montblanc. Sicheres Mittel, das Rahnigwerden des Weins zu verhüten. Zusammenhang der europäischen und asiatischen Zürlfel. Amerikanische Alterthümer. — **Nr. 272.** \*Das Gnu. Das südlüche Kreuz. \*Saint-Cloud. Steinkohlenverbrauch. Senkbrunnen oder negative Quellen. Die Gieshöhlen und Kolushöhlen. Projectirter Riesenbrunnen. \*Genies der Jüngere. — **Nr. 273.** \*Bodajoz. Das Neufte aus der Natur- und Gewerbswissenschaft. Anwendung des Argentans als Küchengesätze. Actiengesellschaften in Frankreich. \*Die Befestigung des Montblanc. (Beschluss.) Feuersbrünste in London und Paris. Das Tabacksgift. — **Nr. 274.** \*Der Lustpalast zu Paris. Das Neufte aus der Natur- und Gewerbswissenschaft. (Beschluss.) Landschaftsbilder aus Abyssinien. Nächtliches Treiben in den Tropenländern. \*Die Jungfrau, nach Murillo. Die Provinz Navarra in Spanien. Schlaucht ein Schmutzger. Verbeßerte Art, Bücher einzubinden. Kyanitisches Holz. \*Die Stadt Braubach.

Die mit \* bezeichneten Aufsätze enthalten eine oder mehrere Abbildungen.

Preis dieses Jahrgangs von 52 Nummern 2 Thlr. — Der erste Jahrgang von 52 Nrn. kostet 2 Thlr., der zweite von 52 Nrn. 1 Thlr. 12 Gr., der dritte von 52 Nrn. 2 Thlr., der vierte von 52 Nrn. 2 Thlr., der fünfte von 52 Nrn. 2 Thlr. Leipzig, im Juli 1838. F. A. Brochhaus.

Von der Unterzeichneten wird demnächst versandt werden:

## Das goldene Bließ

oder  
die Erzeugung und der Verbrauch  
der Merinowolle,  
in  
ökonomischer, mercantilischer und statistischer  
Hinsicht.

Von  
J. G. Elsner.

Gr. 8. Preis 1 Thlr. 12 Gr., oder 2 Fl. 30 Kr.

Inhalt:

**Erster Hauptabschnitt.** Erzeugung und Verbrauch von Wolle in Deutschland. 1. Die Erzeugung der deutschen Wolle. A. Von der Menge der in Deutschland erzeugten Wolle. B. Von der Qualität oder Güte der Wolle und dem dabei genommenen Gange der Veredlung. 1. Die dabei begangenen Missetheile in Behandlung und Fütterung. 1) Unrichtige Behandlung der Merinos. 2) Nicht ganz der Natur gemäße Wartung und Pflege. a. Kartoffelfütterung. b. Die Getreidefütterung. c. Verkehrte Fütterung. d. Vernachlässigte Haltung. 2. Die verschiedenen Erfolge der Züchtung. A. Streben nach Verfeinerung der Wolle. Fehler, in welche man dabei versiel. 1. Das Zwirnen der Wolle. a. Entschung dieses Fehlers. b. Ausrottung desselben. c. Die Fütterungsarten begünstigen oder vermindern diesen Fehler. 2. Das Überdrehen der Wolle.

B. Streben nach Vollreichtum. 1. Durch reichwolligen Stamm. 2. Durch reichliche Fütterung. 11. Der Verbrauch deutscher Wolle. **Zweiter Hauptabschnitt.** Wollezeugung und Verbrauch in den übrigen Ländern Europas. 1) Spanien. 2) Frankreich. 3) Italien. 4) a. Ungarn mit den zugehörigen Ländern. b. Polen. 5) Rußland. 6) Die Türkei. 7) Schweden und Dänemark. 8) Ost- und Westpreußen. 9) England. **Dritter Hauptabschnitt.** Wollezeugung in den andern Erdtheilen. 1) Asien. 2) Afrika. 3) America. 4) Australien. **Vierter Hauptabschnitt.** Nähere Bezeichnung des edeln Bließes. 1. Von den Merinos. Von den verschiedenen Racen derselben. Kraft- und Sanftwollige. 1) Von den innern oder in der Wolle selbst vorhandenen Kennzeichen. 2) Von den äußern Kennzeichen, der Farbe der Wolle und der Körpergestalt der Schafe. 3) Die Vereinigung der beiderseitigen Eigenschaften. 11. Von den durch sie veredelten Schafen oder den Meritzgen. **Fünfter Hauptabschnitt.** Von der Darstellung des edeln Bließes. 1. Von den innern Ursachen, welche das edle Bließ verunstalten, oder auch günstig darstellen. Erste Ursache in der Erzeugung und Geburt. Zweite Ursache, Haltung und Wartung des Lammes. Dritte Ursache, fernere Behandlung der Schafe. Vierte Ursache, Krankheiten. 11. Die äußern Ursachen. 1) Die Einbrüche, welche die Witterung auf das Bließ macht. 2) Die Einbrüche, welche eine gute oder schlechte Schur auf das Bließ macht. 3) Die Wäße. **Sechster Hauptabschnitt.** Die Verwerthung des edeln Bließes. **Siebenter Hauptabschnitt.** Von dem Einflusse des edeln Bließes auf Leben und Verkehr in einem Lande. 1) Auf die Landwirthschaft. a. Unmittelbar. b. Mittelbar. 2) Auf die andern Gewerbe und auf den Verkehr des ganzen Landes. Schluß.

In welchem Grade der Verfasser der hier angezeigten neuesten Schrift seinen Stoff zu beherzigen versteht, ist dem betreffenden Publicum bereits hinlänglich bekannt. Hier hat er gleichsam das Innere seines reichen Schatzes aufgeschlossen. Vorzüglich hohen Werth gewinnt das Werk unstreitig noch dadurch, daß der Autor, fern von aller Compilation, Alles, was er sagt, aus eigener Erfahrung und aus Beobachtung und Anschauung an Ort und Stelle geschöpft hat. Das Buch hat übrigens für den Kameralisten und für den Kaufmann fast ebenso hohes Interesse wie für den Landwirth, weil es eine übersichtliche Darstellung aller der Wichtigkeit und dem Ertrage der Wollezeugung aller europäischen Länder gibt.

## Die Bildung des Landwirthes in der weitesten Bedeutung, von J. G. Elsner.

Gr. 8. Preis 1 Thlr. 8 Gr., oder 2 Fl. 15 Kr.

Mit dem hier angezeigten Buche glauben wir dem betreffenden Publicum um so mehr eine Freude zu machen, als es eine Lücke in der landwirthschaftlichen Literatur ausfüllt, die man zeither sehr empfindlich gefühlt hat. Sollten wir ein Urtheil darüber aussprechen, so würden wir behaupten, daß dasselbe unter dem vielen Guten, was dessen Verfasser bereits geliefert hat, zu dem Vorzüglichsten gehören dürfte.

Stuttgart und Tübingen, im Juni 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Bei Eduard Anton in Halle ist soeben erschienen:  
**Sendschreiben an J. Görres von Heinrich Leo.** Zweite Auflage. Gr. 8. 10 1/2 Bogen. Geh. Preis 16 Gr.

Kaum war die erste Auflage erschienen, so wurde eine zweite nötig. Sie blieb unverändert. Nur fand sich der Herr Verfasser veranlaßt, in einem Vorworte auf die in den Hallerschen Jahrbüchern abgedruckte Anzeige des Herrn Dr. Ruge Einiges zu erweitern.

## Zur Geschichte Frankreichs.

### RÈGLEMENTS

#### sur les arts et métiers de Paris,

rédigés au XIII<sup>e</sup> siècle, et connus sous le nom du livre des métiers d'*Etienne Boileau*; publiés, pour la première fois en entier, d'après les manuscrits de la bibliothèque du Roi et des archives du royaume, avec des notes et une introduction,

par

**G. B. Depping.**

Un volume. Gr. in-4. Paris. 4 Thlr. 12 Gr.

Dieses Werk bildet einen Band der Collection de documents inédits sur l'histoire de France, publiés par ordre du roi et par les soins du ministre de l'instruction publique, welche in Serien erscheint, von denen die erste, zu der das obige gehört, die Histoire politique umfasst.

Leipzig, im Juli 1838.

**Brockhaus & Weynarius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.

(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

Bei H. B. König in Bonn sind eben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

**Albers, S. F. H.** (Professor Dr.), Beobachtungen auf dem Gebiete der Pathologie und pathologischen Anatomie. 2ter Theil. Preis 1 Thlr. 4 Gr.

**Düntzer-Lersch,** De Versu, quem Vocant, Satornio. Preis 12 Gr.

**Kerck, L.** (Dr.), Die Sprachphilosophie der Alten, dargestellt an dem Streite über Analogie und Anomalie. Preis 1 Thlr. 4 Gr.

**van Densenort** (Dr.), Geschichte der Augenheilkunde. Aus dem Holländischen. Mit einer Vorrede vom Geh. Med.-Rath Wüger. Preis 10 Gr.

**Weber, M. S. H.** (Dr.), Handbuch der Zergliederungskunde und -Kunst des menschlichen Körpers. Erster Band. Drittes Heft. Preis 20 Gr.

Bei uns hat die Presse verlassen und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

### Uebersicht der Landbaukunst.

Ein kurzgefaßter Leitfaden zu Vorlesungen über dieselbe und ein Wiederholungsbuch für alle diejenigen, welche sich öffentlichen Prüfungen in diesem Fache zu unterziehen haben, ebenso ein Handbuch für Kameralisten und Landwirthe.

Von

**Karl August Menzel,**

Königl. Universitäts-Bauinspector, öffentlichem Lehrer der Baukunst an der staats- und landwirthschaftlichen Akademie zu Elbena und Greifswald etc.

Gr. 8. Brochirt. Preis 2 Thlr.

Der Name des Herrn Verfassers bürgt dafür, daß hier etwas Gründliches und Gebiegenes geliefert wird, und besagt die Titel hinlänglich, für wem sich das Werk eignet, es bedarf keiner weiteren Empfehlung.

Leipzig, im Juni 1838.

**E. Scheld & Comp.**  
(W. Einhorn.)

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

## Das Pfennig-Magazin für Kinder.

1838. Mai. Nr. 18 — 21.

**Nr. 18.** \*Der Granatbaum. Kleine Rechenkünste. \*Falscher Eifer bedarf sich nicht. Der Flaschenbühel, ein Märchen. \*Der Kaulbarsch. Auflösung der Räthsel im vorigen Monat. —

**Nr. 19.** \*Der punktirte Wasserfalamanther oder Wassermolch. \*Der Tob Jesu. Der Flaschenbühel, ein Märchen. (Fortsetzung.) \*Die Haar- oder stumme Schenke. — **Nr. 20.** \*Die Derwische. Einige Benutzungen der Hand. Frohsinn und Guts sein. \*Der Kukul und das Rothschilgen. Der Flaschenbühel, ein Märchen. (Beschluß.) \*Die Centauren. Räthsel. —

**Nr. 21.** \*Feldmarschall Blücher, Fürst von Wahlstatt. Urtheil. \*Die Gypstheke zu München. Torheit und Dünkel, Fleiß und Bescheidenheit. \*Der Hornoch. Räthsel. Die mit \* bezeichneten Aufsätze enthalten eine oder mehrere Abbildungen.

Preis dieses Jahrgangs von 52 Nummern 1 Thlr. — Der erste bis vierte Jahrgang kosten ebenfalls jeder 1 Thlr.

Leipzig, im Juli 1838.

**F. A. Brockhaus.**

Bei Windobff & Striese in Königsberg i. d. N. sind folgende neue Bücher erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

**Collectanea** für Anfänger im Lateinschreiben von W. Dibeltius. Kl. 8. Geh. 7½ Gr.

**Novellen und Erzählungen** von H. von Keyserlingk. Kl. 8. Geh. 1 Thlr. 20 Gr.

**Methode eines Traileur-Coups,** mit einleitendem Vorworte, von L. A. F. Schulz. Kl. 8. Geh. 7½ Gr.

**Historisch-romantische Erzählungen.** Kl. 8. Geh. 1 Thlr.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

**Zfz.** Encyclopädische Zeitschrift, vorzüglich für Naturgeschichte, Anatomie und Physiologie. Von Dfem. Jahrgang 1838. Zweites und drittes Heft. Mit einem Kupfer. Gr. 4. Preis des Jahrgangs von 12 Heften mit Kupfern 8 Thlr.

Blätter für literarische Unterhaltung. (Verantwortlicher Herausgeber: Heinrich Brockhaus.) Jahrgang 1838. Monat Juni, oder Nr. 152 — 181, 1 Beilage, Nr. 4, und 2 literarischer Anzeiger: Nr. XIX und XX. Gr. 4. Preis des Jahrgangs von 365 Nummern (außer den Beilagen) auf feinem Druck-Wellpapier 12 Thlr.

**Repertorium der gesammten deutschen Literatur.** Herausgegeben von E. G. Gersdorf. 1838. Sechszehnten Bandes viertes und fünftes Heft. (Nr. X, XI) Gr. 8. Preis eines Bandes 3 Thlr.

**Allgemeine Bibliographie für Deutschland.** Jahrgang 1838. Monat Juni, oder Nr. 22 — 26, und Bibliographischer Anzeiger: Nr. 22 — 26. Gr. 8. Preis des Jahrgangs 3 Thlr.

Leipzig, im Juli 1838.

**F. A. Brockhaus.**

Soeben ist in Paris erschienen:

**Extraits**  
**des Mémoires du Prince de**  
**Talleyrand Périgord,**  
ancien évêque d'Autun etc. etc.,  
recueillis et mis en ordre

par  
**Madame la Comtesse O. de C..**  
2 vols. In-8. 5 Thlr. 8 Gr.

**Bestellungen bitten wir uns baldigst zukom-**  
**men zu lassen.**

Leipzig, im Juli 1838.

**Brochhaus & Henarius,**  
Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

**Oestreichische militairische Zeitschrift. 1838.**  
Fünftes Heft.

Dieses Heft ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versendet worden:

Inhalt: I. Die Waffenübungen bei Wosnosensk 1837. (Schluß.) — II. Die Gesichte bei Rabanzky und Bronow, und das Treffen bei Ragimierz im polnischen Feldzuge 1831. — III. Die Operationen der verbündeten Heere gegen Paris im März 1814. (Fortsetzung.) 33. Der 21. März. Schlacht von Arcis. Zweiter Tag. — IV. Die Anwendung leichter Truppen gemäß dem Geiste der neuen Kriegsführung. — V. Literatur. — VI. Neueste Militairveränderungen. — VII. Übersicht des Inhalts der ältern Jahrgänge der Oestreichischen militairischen Zeitschrift. (Fortsetzung.)

Der Preis des Jahrganges 1838 von 12 Heften ist wie der aller frühern Jahrgänge von 1818—37 jeber 8 Thlr. Sächsl. Die Jahrgänge 1811—13 sind in einer neuen Auflage in vier Bänden vereinigt erschienen und kosten zusammen ebenfalls 8 Thlr. Sächsl. Wer die ganze Sammlung von 1811—37 auf einmal abnimmt, erhält dieselbe um  $\frac{1}{4}$  wohlfeiler.

Von dem Unterzeichneten ist diese Zeitschrift durch alle Buchhandlungen um die genannten Preise zu beziehen.

Wien, den 30sten Juni 1838.

J. G. Heubner,  
Buchhändler.

In meinem Verlage erscheint und ist durch alle Buchhandlungen zu bekommen:

**Herculanum und Pompeji.**

**Vollständige Sammlung**  
der bis auf den heutigen Tag daselbst entdeckten Malereien, Bronzen, Mosaiken u. s. w. Enthaltend sämtliche in der Antichità di Ercolano, dem Museo Borbonico und den übrigen bisher erschienenen Werken beschriebenen Antiken, mit neuern noch unedirten Gegenständen vermehrt.

Gestochen von **H. Roux** dem Ältern und **Ad. Bouchet** zu Paris. Mit erläuterndem Texte, zum Gebrauch für Künstler, Gelehrte und höhere Schulanstalten. Deutsch bearbeitet von **Dr. A. Kaiser.**

Dieses interessante Unternehmen darf gewiß für alle Kunstfreunde, Künstler und Gelehrte eine erwünschte Erscheinung genannt werden, da es ihnen Gelegenheit bietet, eine Lücke in ihren Bibliotheken auszufüllen, die sie bis jetzt entweder schmerzlich fühlen oder nur mit großem Aufwande ausfüllen konnten,

da die Werke, welche jene durch die Ausgrabungen in Herculanum und Pompeji auf die Nachwelt gekommenen Schätze beschreiben und darstellen, und deren Studium so unerläßlich zum Verständniß des Alterthums wie der Kunst und Wissenschaft im Allgemeinen ist, theils durch ihre hohen Preise, theils durch ihre Seltenheit fast ganz außer dem Bereiche der meisten Künstler und Gelehrten liegen.

Der Übersichtlichkeit wegen erscheint diese Sammlung in Serien nach Art oder verwandten Gegenständen geordnet:

**Abtheilungen des Werkes.**

Malereien.	Bronzen.
1ste Serie. — Architect. Verzierung.	1ste Serie. — Statuen.
2te „ — Gruppen von Figuren.	2te „ — Büsten.
3te „ — Einzelne Figuren.	3te „ — Geräthe, Lampen etc.
4te „ — Friese etc.	Geheime Sammlung.
5te „ — Landschaften.	1ste Serie. — Malereien.
6te „ — Mosaiken.	2te „ — Bronzen.

Das Ganze wird in 200 Lieferungen, jede von 4 feingestochenen Abbildungen mit nöthigem Text und Umschlag im größten Octavformat ausgegeben, monatlich erscheinen vier solcher Lieferungen,

deren jede 5 Groschen kostet.

Die ersten 6 Lieferungen sind bereits an alle Buchhandlungen versandt und daselbst sowie auch die über dieses Werk ausgegebenen ausführlichen Prospekte einzusehen.

Hamburg, im Juni 1838.

**Johann August Meißner.**

Nun ist bei mir erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

**Palästina.**

Von

**Karl von Hammer.**

Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit einem Plan von Jerusalem, einer Karte der Umgegend von Sichem und dem Grundriss der Kirche des heiligen Grabes.

Gr. 8. 1 Thlr. 16 Gr.

Obgleich die zweite Auflage dieser ausgezeichneten Darstellung des heiligen Landes der ersten in kurzer Zeit folgt, so enthält dieselbe doch durchgängig namhafte Verbesserungen und Zusätze, wie sich schon aus dem erweiterten Umfange und aus der Vergleichung einzelner Artikel mit der frühern Bearbeitung ergibt. Die Hinzufügung mehrer wichtigen Abhandlungen über einzelne Gegenstände wird man nur als einen wesentlichen Gewinn betrachten können.

In dem im vorigen Jahre erschienenen Versuch:

**Der Zug der Israeliten nach Kanaan.**

Mit einer Karte. Gr. 8. Geh. 12 Gr.

lieferte der Verfasser eine Beilage zu seinem „Palästina“, welche seine Forschungen über diesen Gegenstand, von dem genannten Werke unabhängig, darlegt. Die sauber gestochene Karte (in gr. 4.) ist eingeln für 6 Gr. zu erhalten.

In neuen Auflagen erschienen von demselben Verfasser:  
Beschreibung der Erdoberfläche. Eine Vorschule der Erdbeschreibung. Dritte verbesserte Auflage. Gr. 8. 4 Gr.  
Lehrbuch der allgemeinen Geographie. Zweite vermehrte Auflage. Mit 6 Kupfertafeln. Gr. 8. 1 Thlr. 12 Gr.  
Leipzig, im Juli 1838.

**F. W. Brochhaus.**



# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXIV.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brochhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

**Brochhaus & Avenarius in Paris und Leipzig**  
machen auf nachstehende vortheilhaft bekannte Sammlung französischer Reisebücher aufmerksam, die von ihnen durch alle Buchhandlungen zu beziehen sind:

## GUIDES-RICHARD.

ITINÉRAIRES EUROPÉENS IN-12. ET IN-18.,

Comprenant:

1° Les tableaux OFFICIELS des routes de chaque contrée; 2° la description archéologique, industrielle, historique des cités; 3° une notice des bourgs, villages que traverse le voyageur; 4° l'indication des curiosités de la nature et de l'art qu'il doit visiter; 5° d'amples notions sur les objets de peinture, de sculpture, les monuments antiques du moyen âge et modernes que renferment les divers musées; 6° la liste exacte des messageries, voitures, diligences d'un lieu à un autre; 7° la nomenclature des BATEAUX A VAPEUR qui naviguent sur les mers, fleuves et rivières, leurs jours et heures de départ, leur prix de trajet; 8° l'indication des HOTELS ou doit descendre le voyageur; 9° les réglemens de poste et TARIFS de chaque état; 10° la description détaillée des bains et eaux thermales; 11° le tableau comparatif des monnaies.

**Avec évaluation des frais de séjour et de voyage.**

Chaque ITINÉRAIRE-RICHARD offre une CARTE ROUTIÈRE dressée aux bureaux de la guerre, des Panoramas de villes, des Vues, Vignettes etc.

Détail des Guides dont chacun contient la matière de plusieurs volumes.

**Europe**, 2 vol in-12. et atlas. 20 Fr.  
**Nord de l'Europe**, 1 fort volume in-12. 7 Fr.  
**Midi de l'Europe**, 1 fort volume in-12. 7 Fr.  
**France et Belgique**, 1 fort volume in-12. 7 Fr.  
50 C.  
**France**, 1 volume in-18. 5 Fr.  
— 1 volume in-32. 3 Fr.  
**Paris**, conducteur de l'étranger, 1 volume in-18. 4 Fr.  
50 C.  
**Environs de Paris** dans un rayon de 15 lieues, 1 vol. in-18. 5 Fr.  
**Pyrénées**, 1 volume in-18. 5 Fr.  
**Belgique et Hollande**, 1 volume in-18. 6 Fr.  
**Suisse et Tyrol**, 1 gros volume in-12. 9 Fr.  
**Suisse**, 1 gros volume in-18. 7 Fr.  
**Tyrol**, 1 volume in-12. 3 Fr.

**Genève**, 1 volume in-18. 1 Fr. 50 C.  
**Savoie et Piémont**, 1 volume in-18. 5 Fr.  
**Oberland**, 1 volume in-18. 1 Fr. 50 C.  
**Chamouny (Vallée de)**, 1 volume in-18. 1 Fr. 50 C.  
**Italie**, 1 fort volume in-12. 8 Fr.  
— 1 fort volume in-18. 7 Fr.  
**Rome**, 1 volume in-18. 1 Fr. 50 C.  
**Allemagne**, 1 fort volume in-18. 7 Fr. 50 C.  
**Bords du Rhin**, 1 fort volume in-18. 7 Fr.  
**Bade**, 1 volume in-12. 3 Fr. 50 C.  
— 1 volume in-18. 1 Fr.  
**Angleterre, Ecosse et Irlande**, 1 volume in-18. 6 Fr.  
**Londres**, Guide de l'étranger, 1 volume in-18. 7 Fr.  
**Paris à Londres** (routes de), 1 volume in-18. 3 Fr.  
**Espagne et Portugal**, 1 volume in-18. 7 Fr.

Bei dem Unterzeichneten ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

### Petöcz (Michael), Ansicht der Welt.

Ein Versuch  
die höchste Aufgabe der Philosophie zu lösen.  
Gr. 8. Geh. 3 Thlr.  
Leipzig, im Juli 1838.

F. A. Brochhaus.

In der Universitätsbuchhandlung zu Kiel ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

### Theologische Mitarbeiten.

Eine Quartalschrift  
in Verbindung mit mehreren Gelehrten  
herausgegeben von  
A. F. Ludwig Pelt.  
Doctor und ord. Prof. der Theologie.

3tes Heft.  
Preis 20 Gr.

# Vollendete Herausgabe.

Daß

# Hausslexikon,

vollständiges Handbuch praktischer Lebenskenntnisse für alle Stände.

Unter Mitwirkung vieler Gelehrten und Praktiker

herausgegeben von

## G. H. Fechner,

ordentlichem Professor der Physik zu Leipzig.

8 Bände in Lexikon-Octav, 441 Bogen enthaltend. Mit erläuternden Holzschnitten und Steindrucktafeln.

Subscriptionspreis 12 Thlr. Sächsl., oder 21 Fl. 36 Kr. Rhein.

Es gereicht uns zur wahren Freude, die erfolgte Vollendung dieses gemeinnützigen Werkes ankündigen zu können. Was wir vor vier Jahren versprochen: ein Buch zu liefern, welches, tief eindringend in die eigentlichen Bedürfnisse des täglichen Lebens, über Alles, was für dasselbe zu wissen nicht nur nützlich, sondern nothwendig ist, Auskunft und Rechenchaft gäbe, einen sichern Rathgeber und Führer in allen Lagen des häuslichen und bürgerlichen Lebens: das glauben wir im Sinne unserer geehrten Abnehmer und nach den Anforderungen unserer Zeit erfüllt zu haben, indem wir das **Hausslexikon** als Ganzes dem Publicum übergeben.

Wir unterlassen es, den Inhalt des Werkes, welcher durch Prospekte und Anzeigen hinlänglich bekannt ist, hier im Einzelnen zu bezeichnen; es genügt, daran zu erinnern, wie das **Hausslexikon** sich über **alle Fächer des praktischen Wissens** verbreitet. So ist aus der Rechtskunde, der Heilkunde, der Land- und Hauswirtschaft, mit Einschluß der Garten-cultur und des Baumwesens, aus der Handels- und Gewerbkunde, aus der gesammten Naturkunde u. s. w. in ihren Anwendungen auf die Bedürfnisse des täglichen Lebens, überall der geeignete Stoff entlehnt und durch die bedürftigsten Praktiker so verarbeitet, daß der Leser sichere Anleitung zur unmittelbaren praktischen Anwendung findet. Es ist genaue Kenntniß öffentlicher und anderer wichtiger Anstalten und Einrichtungen (als des Postwesens, der Assurance, der Bälle u. s. w.) gegeben, und endlich ein reicher Schatz von Literaturnotizen über praktische Gegenstände beigefügt. Durch diese Bearbeitung ist das **Hausslexikon** zu einem **allgemeinen Erfahrungsllexikon** geworden, als welches wir es schon früher bezeichneten, und liegt jetzt, in seiner Vollständigkeit, als ein

## Universalwerk für das Haus

zur Benutzung vor. Es macht als solches eine unzählige Menge kostspieliger einzelner praktischer Werke entbehrlich, und ist selbst die

## vollständigste und wohlfeilste Bibliothek für jeden Haushalt.

Schon während seines Entstehens erkeute sich unser Unternehmen einer höchst günstigen Aufnahme, obgleich es seiner lexikographischen Bearbeitung halber erst als vollendetes Werk seine volle Brauchbarkeit erlangen konnte. Jetzt, nachdem diese Vollendung eingetreten, hoffen wir um so sicherer, daß eine große allgemeine Verbreitung ihm nicht fehlen werde.

Zur Erleichterung der Anschaffung lassen wir den **Subscriptionspreis** von 12 Thalern für das Ganze noch einige Zeit bestehen, und haben zugleich die Einrichtung getroffen, daß das **Hausslexikon** auch **bandweise**, in monatlichen Lieferungszeiten, der Band zu 1½ Thlr., oder 3 Fl. 12 Kr. Rhein., durch jede Buchhandlung bezogen werden kann.

Leipzig, im Juni 1838.

## Breithopf & Härtel.

Bei Weisse & Goppa in Stuttgart ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Ulrich von Hutten's

## Jugend-Dichtungen,

didaktisch - biographischen

und

satirisch - epigrammatischen Inhalts.

Zum ersten Mal vollständig übersezt und erläutert herausgegeben von **Ernst Münch**.

26½ Bogen auf Velinpapier. Broch. Preis 1 Thlr. 12 Gr., oder 2 Fl. 24 Kr.

Die Verdienste des Übersetzers der vorliegenden Poesien eines der kühnsten und geistreichsten Vorsetzters kirchlicher Frei-

heit und nationaler Selbständigkeit um die Literatur der Werke desselben sind in Deutschland hinreichend bekannt; man wird es ihm daher nur danken, wenn er die in lateinischer Sprache erschienenen poetischen Schriften des Ritters aus dessen früherer Zeit, welche bisher zu mehr als zwei Dritttheilen dem großen Publicum unzugänglich, d. h. unübersezt geblieben waren, vollständig und in fernhafter deutscher Sprache dem Vaterlande mittheilt. Hier findet man die spitzigsten jener geistigen Pfeile, welche dem Fanatismus und der Ignoranz, der Unbildungsheit und dem Aberglauben, der Heuchelei und der Feigheit ins tiefste Herz gedrungen. Die neuesten Ereignisse lassen uns die Blicke aufs Neue nach dem großen Geharnischten wenden und rechtfertigen seine Wiedererweckung. Et was Weiteres über Ulrich von Hutten beizufügen, hieße das deutsche Publicum selbst beleidigen. Wieland, Herder und Goethe haben für ihn in tiefer Bewegung der Seele gezeugt, und selbst Görrer, vom finstern Geiste noch nicht erfasst,

schrieb einst, als er die Originalausgabe empfahl, seinem Freunde Adam von Arnim: „Gönnt dem armen edlen Ulrich ein Plätzchen auf deutscher Erde, darauf er ruhen mag!“ Ja sogar der feindsich gesinnte Cardinal Pallavicini, der Jesuit und Geschichtschreiber des Conciliums von Trident, konnte dem Manne, „der mit reichen Kenntnissen ausgerüstet, nebst einer ungewöhnlichen Charakterfestigkeit eine große Uebersetzungsgabe besaß und in einem allgemeinen Ansehen stand“, seine Anerkennung nicht versagen!

Soeben ist bei uns erschienen und durch alle Buchhandlungen von uns zu beziehen:

**Edition originale pour l'Etranger.**

## *Nouveaux Elémens* **de botanique et de physiologie végétale.**

Sixième édition revue, corrigée et augmentée,  
des caractères des familles naturelles du règne  
végétale.

par

**ACHILLE RICHARD,**

ornée de 5 planches nouvelles gravées sur acier,  
et de 163 gravures intercalées dans le texte,  
gravées sur bois.

Ouvrage adopté par le conseil royal de l'instruction  
publique etc.

Un volume. Gr. in-8. 9 Fr.

Leipzig, im Juli 1838.

**Brockhaus & Menarins,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

In meinem Verlage ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## **Die chirurgische Muskellehre in Abbildungen.**

Ein Handbuch für studierende und ausübende  
Aerzte, gerichtliche Aerzte und Wund-  
ärzte etc.

von

**Dr. G. B. Günther,**

Professor der Chirurgie in Kiel,

und

**Julius Milde,**

Maler in Hamburg.

Erstes Heft. Gr. 4. 1 Thlr. 16 Gr.

Mit diesem ersten Hefte der chirurgischen Muskellehre in Abbildungen beginnt der dritte Band eines größeren, umfassenden Werkes, welches der Verfasser in acht Bänden unter dem Titel: **Die chirurgische Anatomie in Abbildungen** nach folgenden Pläne zu liefern gedenkt:

1. Theil: Osteologie. 2. Theil: Syndesmologie. 3. Theil: Myologie. 4. Theil: Angiologie. 5. Theil: Neurologie. 6. Theil: Splanchnologie. 7. Theil: Locale Anatomie aller Systeme. 8. Theil: Operative Anatomie.

und worüber der ausgegebene Prospectus das Nähere besagt.

Es besteht die zuerst erscheinende Muskellehre als ein

vollständiges Handbuch für sich und wird ungefähr 40 Tafeln colorirter Abbildungen nebst dazu gehörigem Text in groß Quartformat enthalten, die in 6 Heften erscheinen.

Das erste bereits ausgegebene Heft besteht aus Tafel 1—7 nebst 4 Bogen Text.

Das Handbuch der Muskellehre in Abbildungen, welches noch in diesem Jahre vollständig geliefert werden soll, wird 8—10 Thaler kosten.

Hamburg, im Juni 1838.

**Johann August Meißner.**

## **Ungarns historische Romanenliteratur**

zuerst in das Deutsche übersezt!!

Bei C. Schold & Comp. in Leipzig ist erschienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands, Oesterreichs und Ungarns zu haben:

**Abafi,**

von

**Nikolaus Jósika.**

Aus dem Ungarischen übersezt und mit Anmerkungen versehen von **G. Treumund.**

2 Bände. Elegant broschirt. 2 Thlr. 8 Gr., oder 3 fl. 30 Kr. C.=M.

Der Baron Nikolaus Jósika steht als Erzähler unter den neuern ungarischen Schriftstellern obenan und liefert uns in seinem „Abafi“ eine so gelungene Schilderung ungarischer und siebenbürgischer Vorzeit und Nationalität, daß jeder Freund des historischen Romans dieselbe mit besonderer Vorliebe lesen wird.

Bei Eduard Anton in Halle ist soeben erschienen:

**Eisenhart, Dr. Hugo, Sanct Georg.**

Ein Versuch zur Begründung des Neuhegelianismus, mitgetheilt auf Veranlassung des Richard: Rothe'schen Ausfalls gegen die Kirche. Gr. 8. Geh. 6 Gr.

**Derfelbe, Die Götterdämmerung.** Ein Versuch zur Begründung des angewandten Neuhegelianismus mit einer streitbaren Zuweisung an F. Görres über die heilige Dreieinigkeit. Gr. 8. Geh. 6 Gr.

**Werdelust des hallischen Dichterbundes.** 8. 23 1/2 Bogen. Geh. 1 Thlr. 12 Gr.

Neu ist erschienen und in allen Buchhandlungen vorräthig:

**Gruß an Berlin.**

Ein Zukunftsraum

von

**Heinrich Stieglitz.**

Gr. 8. Geh. 20 Gr.

In der Hand der Poesie durch die Straßen der großen Hauptstadt wandernd, schildert der Dichter das Leben und Treiben in seinen verschiedenartigen Gestaltungen, vornehmlich aber den höchsten Interessen sich zuwendend, führt er wie in einem geistigen Panorama alle Namen, welche die Vergangenheit und Gegenwart Berlins in irgend eine Beziehung zu Kunst und Wissenschaft stellte, an seiner Phantasie vorüber und schöpft aus der Erinnerung an seine Erlebnisse das Drama der Zukunft.

Ein Blick auf das Verzeichniß der vorgeschrittenen Persönlichkeiten zeigt, daß das Gedicht nicht allein Berlin, sondern die Interessen des gesammten Deutschlands berührt.

Leipzig, im Juli 1838.

**J. W. Brockhaus.**

In der Unterzeichneten ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# MILITAIR-KARTE von Deutschland

in 25 Blättern,

auf dem topographischen Bureau des königl. bairischen Generalstabs entworfen

von

**Anton Klein.**

Blätter Nr. 7 und 8. Hanover, mit Theilen von Preußen, Großherzogthum Hessen, Sachsen-Gotha, Sachsen-Weimar ic.

Preis eines jeden Blattes 1 Thlr. 4 Gr., oder 2 Fl.

Stuttgart und Tübingen, im Juni 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

**Zur spanischen Literatur.**

## DON QUIJOTTE

et

**la tâche de ses traducteurs:**  
éclaircissemens nouveaux sur le style et l'esprit  
de l'original, et sur l'interprétation de son texte;  
développés dans une analyse du début de son  
nouveau traducteur français,

M. Viardot.

Par

**F. B. FRANÇOIS BIEDERMANN.**

In-8. Paris et Leipzig, 1837. 16 Gr.

Diese kleine Schrift wird gewiß für alle Freunde des darin  
behandelten Romans des Cervantes von großem Interesse sein.  
Leipzig, im Juli 1838.

**Brockhaus & Wenariius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

Erleben ist bei mir erschienen und durch alle Buchhand-  
lungen zu beziehen:

## Die Geschichte

des

## Europäischen Staatensystems.

Aus dem Gesichtspunkte der Staatswissenschaft  
bearbeitet

von

**Friedrich Bülow,**

ord. Professor an der Universität Leipzig.

Zweiter Theil.

Bis zu dem Ausbruche der französischen Revolution.

Gr. 8. 31 Bogen. 2 Thlr. 6 Gr. — 3 Fl. 24 Kr.

C. = M. — 4 Fl. 3 Kr. Rhein.

Dieses neueste geschichtliche Werk des um die Staatswissen-  
schaften hochverdienten Herrn Verfassers ist die lang gehegte

Frucht mannichfaltiger und gründlicher Studien. Die Ausfüh-  
rung entwickelt im tiefsten Sinne des Pragmatismus die Ge-  
schichte aus den Verhältnissen, die Staatsphilosophie aus dem  
geschichtlich Gegebenen und sich Erhaltenden. Der Herr Ver-  
fasser hat sich immer frei von den Fesseln der Schule und des  
Parteigeistes gehalten, und schrieb auch dieses Werk im reinen  
Dienste der Wissenschaft und des Lebens; seine Darstellung  
läßt die Verhältnisse selbst sprechen und verschmäh in ihrer  
Gebiegenheit den eitlen Glanz einer blendenben, aber inhaltlosen  
Rede. Die unterzeichnete Verlagshandlung hofft daher auf  
eine große Theilnahme nicht allein der Männer vom Fache und  
des Staatsdienstes, sondern aller Freunde der Geschichte und  
der geistvollen Entwicklung politischer Probleme.

Der dritte, letzte Band, fortgeführt bis auf die neuesten  
Zeiten, soll so schnell als möglich folgen; es liegt in der Na-  
tur der Sache, daß das Interesse des Werkes in seinem Fort-  
gange sich steigert.

Leipzig, im Juli 1838.

**Georg Joachim Göschen.**

In meinem Verlage erschien soeben und ist in allen Buch-  
handlungen zu erhalten:

## Alphabetische Zusammenstellung der im Criminalgesetzbuch für das Königreich Sachsen,

sowie in den neuesten dazu erschienenen Gesetzen  
und Verordnungen  
enthaltene Bestimmungen.

Herausgegeben von

**Dr. Karl Heinrich Haase,**

Mitglied des Appellationsgerichts zu Leipzig.

Gr. 8. Geh. 20 Gr.

Diese mit großer Sorgfalt bearbeitete Zusammenstellung  
der neuesten strafrechtlichen Bestimmungen wird den Gebrauch  
des Criminalgesetzbuchs wesentlich erleichtern.

Leipzig, im Juli 1838.

**J. A. Brockhaus.**

Druck und Verlag von J. A. Brockhaus in Leipzig.

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXV.

Dieser literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Zeile 2 Gr.

## Nr. II.

### Neuigkeiten und Fortsetzungen, versendet von

**F. A. Brockhaus in Leipzig.**

1838. April, Mai und Juni.

(Nr. I dieses Berichtes, die Versendungen vom Januar, Februar und März enthaltend, findet sich in Nr. XIV des Literarischen Anzeigers.)

34. Adolfsine, Ideal und Wirklichkeit. 8. 1 Thlr. 6 Gr.  
35. Bibliothek deutscher Dichter des siebenzehnten Jahrhunderts. Begonnen von Wilhelm Müller. Fortgesetzt von Karl Förster. Verzechnißes Bändchen. — Auch u. d. T.: Aus-erlesene Gedichte von Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau, Daniel Casper von Lohenstein, Christian Wernike, Friedrich Rudolf Ludwig Fehr, von Ganß, Christian Weise, Johann von Besser, Heinrich Mühlforth, Benjamin Neufeld, Johann Michael Moscherosch und Nicolaus Pender. Herausgegeben von Karl Förster. 8. 2 Thlr. 12 Gr.

Preis der ganzen jetzt vollständigen Sammlung, 14 Bändchen, 1822 — 39, 20 Thlr. 16 Gr.

36. Bilder-Conversations-Lexikon für das deutsche Volk. Ein Handbuch zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse und zur Unterhaltung. In vier Bänden. Mit billigen Darstellungen und Landkarten. Zweiter Band: F—L. 9te und 10te Lieferung. — Dritter Band: M—R. 4te Lieferung. Gr. 4. Geh. Jede Lieferung 6 Gr.

37. Alteutsche Blätter von Moritz Haupt und Heinrich Hoffmann. Zweiten Bandes zweites Heft. Gr. 8. Geh. 12 Gr.

Der 1ste Band in 1 Heften kostet 2 Thlr. 4 Gr., das 1ste Heft des 2ten Bandes 16 Gr.

38. Bobuszynski (Augustin), Physikalisch-astronomischer Versuch über die Welten-Ordnung. Eine populaire Darstellung. Mit 3 Steindrucktafeln. Gr. 8. Geh. 1 Thlr.

39. (Böttiger.) Literarische Zustände und Zeitgenossen. In Schilderungen aus Karl Aug. Böttiger's handschriftlichem Nachlasse. Zweites Bändchen. Gr. 8. Geh. 1 Thlr. 16 Gr. Das 1ste Bändchen erschien zu Anfang d. 3. und kostet 1 Thlr. 12 Gr.

40. Conversations-Lexikon der Gegenwart. Zweites und drittes Hft. (Andorree—Besson.) Gr. 8. Preis eines Heftes von 10 Bogen auf Druck. 8 Gr., auf Schreibp. 12 Gr., auf Velinp. 18 Gr.

Ein für sich bestehendes, in sich abgeschlossenes Werk, zugleich ein Supplement zur achten Auflage des Conversations-Lexikons sowie zu jeder früheren, zu allen Nachdrucken und Nachbildungen desselben. Der Umfang ist nicht genau zu bestimmen, doch dürfte das Ganze 20—24 Hefte nicht übersteigen.

41. Duller (Eduard), Kaiser und Papst. Roman. Vier Theile. 8. Geh. 5 Thlr. 18 Gr.

42. Ausführliche Encyclopädie der gesammten Staatsarzneikunde. Im Vereine mit mehreren Doctoren der Rechtsgelahrtheit, der Philosophie, der Arzneiwissenschaft und Wundarzneikunst, praktischen Ärzten, Physikern und Che-

mikern bearbeitet und herausgegeben von Georg Friedrich Most. Für Gesetzgeber, Rechtsgelehrte, Polizeibeamte, gerichtliche Ärzte, Wundärzte, Apotheker und Veterinärärzte. Ersten Bandes drittes und viertes Heft. (Entbindungskunde—Hautedecken.) Gr. 8. Subscriptionspreis eines Heftes von 12 Bogen 20 Gr.

43. Fingerzeige Gottes, in göttlichen Offenbarungen für einer Communion himmlisches und irdisches Heil. Von L. v. G. Gr. 8. Weimar. Geh. (In Commission.) 16 Gr.

Der Ertrag ist zu einem wohlthätigen Zwecke bestimmt.

44. Paape (Karl Heinrich), Alphabetisches Zusammenstellen der im Criminalgesetzbuch für das Königreich Sachsen sowie in den neuesten dazu erschienenen Gesetzen und Verordnungen enthaltenen Bestimmungen. Gr. 8. Geh. 20 Gr.

45. Heinisius (Wilhelm), Allgemeines Bücher-Verzeichnis, oder Vollständiges alphabetisches Verzeichniß aller von 1700 bis zu Ende 1834 erschienenen Bücher, welche in Deutschland und in den durch Sprache und Literatur damit verwandten Ländern gedruckt worden sind. Nebst Angabe der Druckorte, der Verleger, der Preise u. A. Achter Band, welcher die von 1828 bis Ende 1834 erschienenen Bücher und die Berichtigungen früherer Erscheinungen enthält. Bearbeitet und herausgegeben von Otto August Schulz. Zwölfte Lieferung. Enthaltend: Zweite Abtheilung, Bogen 46—60. Vellejus—Jyro. Nebst drei Beilagen. Gr. 4. Druckp. 1 Thlr. 8 Gr., Schreibp. 1 Thlr. 16 Gr.

Der Preis dieses achten, oder der neuen Fortsetzung ersten Bandes ist 10 Thlr. 12 Gr. Die früheren sieben Bände (1812—29) sind zusammen genommen auf 20 Thlr. im Preise herabgesetzt; auch einzelne Bände werden billiger gegeben.

46. Hille (Karl Christian), Die Bäder und Heilquellen Deutschlands und der Schweiz. Viertes Heft. — Auch u. d. T.: Die Nord- und Ostsee-Bäder. Für Brunnen- und Baderessende bearbeitet. Mit drei Karten. 8. Geh. 1 Thlr.

Die ersten drei Hefte enthalten: I. Brunnen- und Bäderverzeichniß (12 Gr.); II. Die Bäder und Heilquellen von Böhmen und Mähren (20 Gr.); III. Die Bäder Schlesiens und der Grafschaft Glatz (16 Gr.).

47. Hoepfstein (Albert), Praktisches Handbuch der Buchführungskunde für den deutschen Buchhandel zur klaren Geschäftsführung und Vermögensübersicht. Zweite Abtheilung. Geschäftsführung. Schmal gr. 4. Geh. 2 Thlr. 20 Gr.

Preis des Ganzen 3 Thlr. 12 Gr.

48. Krug (Wilhelm Traugott), Allgemeines Handwörterbuch der philosophischen Wissenschaften nebst ihrer Literatur und Geschichte. Nach dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft bearbeitet. Fünfter Band als Supplement zur zweiten, verbesserten und vermehrten Auflage. In zwei Abtheilungen. — Auch u. d. T.: Encyclopädisches Lexikon in Bezug auf die neueste Literatur und Geschichte der Philosophie. Gr. 8. 4 Thlr. 12 Gr.

Nur bis 4ter Band, 2te Auflage, 1832—34, 11 Thlr.; alle fünf Bände zusammen nur 12 Thlr.

49. Petöcz (Michael), Ansicht der Welt. Ein Versuch die höchste Aufgabe der Philosophie zu lösen. Gr. 8. Geh. 3 Thlr.

50. Quandt (S. G. von), Kleines A-B-C-Buch für Anfänger im Lesen und Schreiben. Synonymen und Homonymen. Gr. 12. Geh. 2 Thlr.

51. Raumer (Friedrich von), Geschichte Europas seit dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. Sechster Band. (1661—1715.) Gr. 8. Subscriptionspreis Druckp. 3 Thlr. 6 Gr., Velinp. 6 Thlr. 12 Gr.

Der Subscriptionspreis für den 1ten bis 5ten Band, 1832—35, beträgt auf Druckp. 14 Thlr. 16 Gr., Velinp. 23 Thlr. 8 Gr.

52. Raumer (Karl von), Palästina. Zweite vermehrte Auflage. Mit einem Plan von Jerusalem, einer Karte der Umgegend von Sidon und dem Grundriß der Kirche des heiligen Grabes. Gr. 8. 1 Thlr. 16 Gr.

Eine Beilage hierzu: „Der Zug der Israeliten aus Ägypten nach Kanaan“ (1837), kostet 12 Gr.

53. Repertorium der gesammten deutschen Literatur. Herausgegeben mit mehreren Gelehrten von Ernst Gottlieb Gersdorf. (Beigegeben wird: Allgemeine Bibliographie für Deutschland.) 16ter Band. Gr. 8. Jeder Band etwa 50 Bogen in 14tägigen Heften 3 Thlr.

54. Schutrede gehalten am Sylvestertage 1837 von Florian Felbel. Mit Includierten und unterstellten Anmerkungen des Herausgebers Magister Wundervogen. 8. Geh. 18 Gr.

55. Schutz (Hermann), Wanderbuch. Ein Gedicht in Szenen und Liedern. 8. Geh. 18 Gr.

56. Stieglitz (Heinrich), Gruß an Berlin. Ein Zukunfts- traum. Gr. 8. Geh. 20 Gr.

Durch alle Buchhandlungen ist von uns zu beziehen:

## Nouvel Atlas communal de la France,

dédié à la Chambre des Députés; contenant une carte générale comparative, celle de l'Algérie, et une carte particulière pour chaque département (toutes à la même échelle et de même format); sur laquelle se trouvent les principaux renseignements statistiques; les villes, les bourgs et les villages; et toutes les communes d'après les derniers états officiels, — les forêts avec leur circonscription, les canaux avec leurs ports et écluses, — les routes, les chemins, les étapes, les relais de poste aux chevaux, les bureaux de poste aux lettres, — la circonscription des arrondissements et des cantons, les distances à la méridienne et à la perpendiculaire, ainsi que le rapport de chaque partie de la carte aux feuilles de Cassini;

Dressé par *Charles*, géographe, attaché au dépôt de la guerre; exécuté sous la direction de *M. Letronne*, membre de l'Institut, et publié par *Louis Letronne*.

Dieser Atlas wird aus 90 Blättern bestehen und alle 14 Tage eine Lieferung von 4 (die letzte 6) Blättern erscheinen. Jede Lieferung kostet schwarz 1 Fr., colorirt 1 Fr. 25 Cent.

Die Ausführung ist in hohem Grade sauber.  
Leipzig, im Juli 1838.

**Brochhaus & Wvenarius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

Soeben erschien:

„*Boz*“ (Dickens, Verfasser der Pickwicks):  
**Humoristische Genrebilder aus dem londoner Alltagsleben**, deutsch von Dr. A. Diezmann. **Erster Band**, mit 1 Federzeichnung nach Cruikshank. 12. Velinpapier. Geh. 21 Gr.  
Braunschweig, den 20ten Juli 1838.

*George Westermann.*

## Panorama von Deutschland.

## Panorama de l'Allemagne

par une société d'hommes de lettres français et allemands sous la direction de  
**Mr. J. Savoye.**

Alle vierzehn Tage erscheint vorläufig ein Heft von einem Bogen Text und zwei artistischen Beilagen in gr. 4.

Abonnement für 12 Hefte 2 Thlr. 16 Gr.

Dieses interessante Unternehmen verspricht ein vollständiges Gemälde von Deutschlands Gegenwart und Vergangenheit in allen seinen Beziehungen zu liefern und verbindet mit der Eleganz der französischen Presse einen wohlfeilen Preis. Nicht minder lassen die Namen der geachteten Schriftsteller Deutschlands und Frankreichs, aus deren Vereinigung das Werk hervorgegangen ist, eine so wohl getreue als anziehende Darstellung voraussetzen.

Das erste Heft ist bereits erschienen und durch alle Buchhandlungen von uns zu beziehen.

Leipzig, im Juli 1838.

**Brochhaus & Wvenarius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

## Neuestes Handbuch der Botanik.

Bei K. F. Köhler in Leipzig ist soeben erschienen:

Anleitung zum Studium der

**Botanik**

oder

Grundriss dieser Wissenschaft, enthaltend: die Organographie, Physiologie, Methodologie, die Pflanzengeographie, eine Übersicht der fossilen Gewächse, der pharmaceutischen Botanik und der Geschichte der Botanik.

Von

**Alph. De Candolle,**

Professor an der Akademie zu Genf.

Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von

**Dr. Albr. von Bunge.**

2 Theile. Mit 8 Tafeln Abbildungen.

48 Bogen. 3 Thlr. 18 Gr.

Dieses Werk empfiehlt sich durch Vollständigkeit und Kürze, sowie durch Benutzung der neuesten Arbeiten in allen Theilen der Wissenschaft, es bildet im Wesentlichen einen durch die neuesten Entdeckungen bereicherten Auszug aus den umfassenden allgemein als trefflich anerkannten Werken des berühmten Vaters des Verfassers, unter dessen Leitung das Werk abgefasst wurde. Der Verfasser hielt es für zweckmässig, das Werk in 5 Abschnitte oder Bücher einzutheilen.

Das 1ste Buch bildet die Organographie als Grundlage der Wissenschaft, das 2te Buch handelt von der Physiologie oder dem Studium des Pflanzenlebens etc., das 3te, die Methodologie, umfasst die Prüfung der auf das Pflanzenstudium bezüglichen Methoden, insbesondere Beschreibung, Nomenclatur und Classification der Pflanzen. Die Pflanzengeographie bildet das 4te Buch, dem im 5ten eine kurze Übersicht der fossilen Gewächse folgt. Beigefügt ist ein Abriss der Geschichte der Botanik, sowie mehreres der pharmaceutischen Botanik Angehörige.

In unserm Verlage erscheint vom 1sten August dieses Jahres an:

# Die Eisenbahn.

Zeitschrift zur Beförderung geistiger und geselliger Tendenzen.

Herausgegeben

von **Dr. F. Wiest.**

Enthält folgende Rubriken:

## **I. Locomotiv — die Zeit.**

Bringt die Gegenwart und ihre verschiedenen Gestaltungen theils nur in flüchtigen Contouren hingeworfen, theils in größeren Zeit- und Charakterbildern aufgefäßt.

## **II. Locomotiv — Leipzig.**

Bietet die Tagesbegebenheiten Leipzigs aus dem geistigen wie conversationellen Leben, bald ernst, bald heiter, jedesmal dem Gegenstande angemessen geschildert.

## **III. Locomotiv — der Bliz.**

Soll mit Blitzgeschnelle und zündender Sprache die neuesten Erscheinungen aus dem nord- und süddeutschen Kunstleben abhandeln. In dieser Rubrik finden sich auch alle polemischen Artikel.

## **IV. Der Gesellschafter auf der Eisenbahn, oder jede Station etwas Anderes.**

Hier findet der Leser die Novелlette, humoristische Aufsätze, Genrebilder u., überhaupt Alles, was in den Bereich der sogenannten Unterhaltungsecclecture gehört.

Im Notizenblatte, das unter der Benennung

## **Schleppwagen auf der Eisenbahn**

gegeben wird, kommen folgende Rubriken:

**I. Theaterperspective.** Nur ausgezeichnete Bühnenerscheinungen werden in dieser Rubrik besprochen, die Mittelmäßigkeit wird keines Blickes gewürdigt.

**II. Literarisch-anatomisches Theater** seht die literarischen Producte der Gegenwart. Die faulen Cadaver der sogenannten Litteratur werden von diesem anatomischen Theater ausgeschlossen sein.

**III. Mode- und Kuriosgepäck** bringt keine Notizen über die laufenden Moden des Tages. Diese Rubrik soll ausschließlich unsern Leserinnen gewidmet sein.

**IV. Bagagewagen auf der Eisenbahn.** Alles, was den Bestrebungen dieser Zeitschrift feindlich entgegensteht, wird im Bagagewagen aufgepackt.

**V. Bahnhof.** Rubrik für literarische Anzeigen; auch werden durch diese dem Lesepublicum die bedeutenden Kunsterscheinungen, welche in Leipzig angekommen sind, angemeldet.

Wir sind bemüht, diese Zeitschrift so elegant als nur möglich auszustatten und bieten auch eine außerordentliche Beilage versehen, den

## **Lendor mit Bildern.**

Lithographien von Meisterhand verfertigt. Sie theilen sich in leipziger, wiener, berliner, hamburgener und pariser Volksscenen, in die Camera obscura der Caricaturen und in die leipziger Resbilder, zu denen der Redacteur die erklärenden Notizen schreibt, und die gesammelt, eine gewiß anziehende Galerie bilden werden.

Da die bedeutendsten Literaten Österreichs, wie auch eine große Anzahl außer Österreich lebender Schriftsteller, ihre freundliche Unterstützung zugesagt haben, dürfte das Material auf der Eisenbahn nicht so bald ausgehen; daß der Dampfkegel wegen zu großen Kraftaufwandes nicht zerplatze, dafür wird schon eine einschränkende leitende Hand sorgen.

Der Preis dieser Zeitschrift ist 6 Thlr. Sächsl., oder 9 Fl. Conv.-M. Jede Woche erscheinen 3 Blätter in Großquart auf Weinpapier. Jedes Blatt wird einzeln ausgegeben und zwar Montag, Donnerstag und Sonnabend.

Man abonnet für 1 Jahr mit 6 Thlr. Sächsl., oder 9 Fl. Conv.-M., für  $\frac{1}{2}$  Jahr mit 3 Thlr. Sächsl., oder 4  $\frac{1}{2}$  Fl. Conv.-M. Ebenso werden auch alle Arten von Inseraten hierin aufgenommen und billigt berechnet.

Alle Buchhandlungen und Postämter im In- und Auslande nehmen Bestellungen darauf an.

Leipzig, im Juli 1838.

Die Verlagschandlung.  
**Pöncke und Sohn.**

Geben ist erschienen:

## **Foreign Quarterly Review.**

**No. 42.**

**Preis 2 Thlr.**

Inhalt:

1. **Jung-Stilling**, Religious Literature of Germany.
2. Queen Hortense and the Imperial Family.
3. American Literature. Du Ponceau on Chinese and Egyptian Writing.

4. **Grimm's** German Mythology.
  5. **Chateaubriand**, Spain.
  6. Dutch Literature.
  7. Italian Novels.
  8. **Eugène Sue**, French Naval Romances.
  9. **Gesenius**, Language and Writings of the Phoenicians.
  10. Critical Sketches.
- Literary Intelligence and List of Foreign Publications.  
**London**, im Juli 1838.

**Black & Armstrong.**



# Deutsche Vierteljahrs-Schrift.

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden:

## Deutsche Vierteljahrs-Schrift.

3tes Heft: Juli — September 1838.

Gr. 8. In Umschlag broschirt. Preis 1 Thlr. 20 Gr., oder 3 Fl.

Inhalt:

Die Leistungen einiger pariser Vereine in Hinsicht auf das allgemeine Wohl, von **Depping**. Die jetzige Stellung des Adels, besonders des deutschen, von **H. E.** Der bergmännische District zwischen Birmingham und Wolverhampton, mit besonderer Bezugnahme auf die Gewinnung des Eisens, von **A. v. T.** Über die Negerflaverei in den Vereinigten Staaten in Texas. **VII.** Welche Früchte hat bisher die deutsche gewerbdissenschaftliche Literatur getragen? **X.** Über die Verwendung des natürlichen und nachgeahmten Erdbarzes zu Fußpfaden, Fahrbahnen und architektonischen Zwecken in Frankreich. Die Sprachlehre-Methoden Hamilton's und Jacotot's, von **Dr. Leonh. Tafel**. Über die Versammlung der deutschen Landwirthe, von **H. W. Pabst**. Die Vorforge- und Versorgungsanstalten der Mittelstände, von **K. Mohl**. Über den Mißbrauch geistiger Getränke, von **Dr. C. Kösch**. Die zweckmäßigste Pflege der schönen Künste in Deutschland, von **A. M. Dultsamkeit**, von **F. H. v. Wessenberg**. Kurze Notizen.

Die früheren Hefte enthalten:

1stes Heft: Was wir bewegen. Über alte und neue Handelswege nach der Westküste Amerikas, von **Ed. Pöppig**. Die Steinkohlengebilde, in naturgeschichtlicher und technischer Beziehung, von **K. C. v. Leonhard**. Der Pauperismus, von Prof. **Bülow** zu Leipzig. Die neue Gestattung der deutschen Alterthumswissenschaften, von **H. Leo**. Die literarischen Zustände Belgens, von **Dr. L. W. Warnkönig**. Heine's Schriften und Tendenzen, von **G. P.** Beiträge zur Lösung der jüdischen Frage, von **M.** Auf welchem Standpunkt steht die vaterländische Geschichtsforschung, von **W. M.** Über den Somnambulismus, von Prof. **Fischer** zu Basel. Aphorismen über Kriegskunst, von Ritter **Profesch von Sten**. Über Diplomatie, von **F. K.**

2tes Heft: Rückblick auf praktische Seiten des antiken Münzwesens, von **Creuzer**. Wohlthätigkeit und Lebensgenuss in Deutschland, von **A. M.** Die Cholera, von **H.** Die Romane, von **W. M.** Blicke auf die neuesten Bearbeitungen der französischen Staats- und Rechtsgeschichte, von **L. W. Warnkönig**. Die Menschenrassen, von **H. H.** Die Gesangbuchsreform, von **G.** Über die Entstehung und Erweiterung des großen deutschen Zollvereines, von **F. Nebenius**. Übersicht der Leistungen der konstantinopolitanischen Presse in den letzten sieben Jahren, von **Hammer-Purgstall**.

\* \* \*

Was diese Zeitschrift zu erreichen wünscht, wäre für den jeweiligen Standpunkt der verschiedenen geistigen Richtungen eine Reihe von leading articles, nicht im Geiste eines Tagblatts, sondern in dem einer Vierteljahrs-Schrift übersichtlich aufgestellt, und zwar mit sorgfältiger Beachtung des Nothwendigen und Praktischen, mit reiflicher Erwägung dessen, was grade an der Zeit ist, mit gänzlicher Entfernung der Leidenenschaften des Tages, mit deutscher Unparteilichkeit und deutschem guten Glauben und mit dem ruhigen, würdigen Tone, welcher der Wissenschaft ziemt und welcher allein einer guten Sache frommen kann.

In diesem Sinne beizutragen zu der Vierteljahrs-Schrift, laden wir ebenso ansehnlich als eherbietig alle diejenigen ein, welchen das Bedürfnis, besonnen vorzuschreiten und die Nothwendigkeit vorwebt, daß die Berufsgelehrten sich auch in Deutschland der praktischen Richtung und Bildung in dem Maße nähern müssen, in welchem diese sich zum Wissen steigert.

Entsprechende Beiträge werden anständig honorirt werden und im Wege des Buchhandels, aus Norddeutschland über Leipzig

durch Herrn **L. H. Völsenberg** daselbst,

aus Süddeutschland aber

durch Beisatz unserer **Literarisch-artistischen Anstalt** zu München, unserer **Verlags-Expedition** zu Augsburg, des Herrn **Aug. Neumann** zu Nürnberg, der **Andrea'schen Buchhandlung** zu Frankfurt, oder direct durch den Postwagen uns am besten zukommen.

Stuttgart und Tübingen, im Juli 1838.

**J. C. Cotta'sche Buchhandlung.**

Druck und Verlag von **F. A. Brockhaus** in Leipzig.

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXVI.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

## Conversations-Lexikon der Gegenwart.

Ein  
für sich bestehendes und in sich abgeschlossenes Werk,  
zugleich ein Supplement  
zur achten Auflage des Conversations-Lexikons,  
sowie zu jeder frühern,  
zu allen Nachdrucken und Nachbildungen desselben.

Gr. 8. In Heften von zehn Bogen.

Preis eines Heftes:

Auf feinem Druckpapier 8 Groschen.  
Auf gutem Schreibpapier 12 Groschen.  
Auf extrafeinem Velinpapier 18 Groschen.

Leipzig, bei F. A. Brockhaus.

Inhalt des ersten bis dritten Heftes:

Aal (Jakob) — Abarca (Don Joaquin) — Abbas Mirza — Abd-el-Kader — Abegg (Johann Friedrich) — Abegg (Julius Friedrich Heinrich) — Abeken (Bernhard Rudolf) — Abel (Karl von) — Abercromby (James) — Ablösung — Abolition — Abrantes (Herzogin von) — Absolutismus — Actenverfälschung — Actienwesen — Adam (Charles Adolphe) — Adel und Bürgerstand in der neuesten Zeit — Advocatenvereine — Afrika — Aggelius (Familie) — Agardh (Karl Adolf) — Agassiz (Louis) — Agnew (Sir Andrew) — Aguado (Alexandre Marie) — Agypten — Ahlquist (Abraham) — Ahumada (Marquis de las Amarillas, Herzog von) — Alufistik — Alava (Don Miguel Ricardo de) — Albrecht (Wilhelm Eduard) — Alexander Karl (Herzog von Anhalt-Bernburg) — Alater — Allard — Almodovar (Don Jusefjo Diez de Ribera, Graf von) — Alons Maria Joseph Johann Joachim Franz (Fürst von Siechtenstein) — Alten (Karl August, Graf) — Alterthumsvereine — Alvensleben (Albrecht, Graf von) — Anann (Heinrich) — Amerika — Amici (Giovanni Battista) — Ammon (Friedrich August von) — Ammon (Friedrich Wilhelm Philipp von) — Ampère (André Marie) — Ampère (Jean Jacques) — Amberg (August Philipp Christian Theodor von) — Amster (Samuel) — Ankarvård (Karl Henrik, Freiherr) — Andertoni (Dietro) — Andersen (D. S.) — Andorsée — Andrada e Silva (Joseph Bonifaz) — Anton Karl — Martin Franz b') — Anhalt — Anton (Clemens Theodor), König von Sachsen — Appropriationsclausel — Aprilproceß in Frankreich — Aprilunruhen in Frankreich. — Arcana — Archäologie — Archivwesen — Arenberg (August Maria Raimund, Fürst von — Ernst, Freiherr von) — Arens (Franz Joseph, Freiherr von) — Argelander (Friedrich Wilhelm August) — Argentanfabrikate — Araout (Apollinaire, Graf b') — Aristokratismus und seine Gegensätze — Arlincourt (Victor, Vicomte b') — Armanzperg

(Joseph Ludwig, Graf von) — **Arnolbi** (Ernst Wilhelm) — **Artisoga y Superviela** (Don Juan Bautista de) — **Arwidsson** (Adolf Isaac) — **Aschbach** (Joseph) — **Asiatische Gesellschaften** — **Astelsöf** (Johann Christoph) — **Affecuranz** — **Associationen** — **Ast** (Georg Anton Friedreich) — **Aster** (Ernst Ludwig — Karl Heinrich) — **Asthetik** — **Athen** — **Attentate** — **Andry de Wyrtzreue** (Pierre François) — **Auffenberg** (Joseph, Freiherr von) — **August** (Paul Friedrich), Großherzog zu Oldenburg — **Augusti** (Johann Christian Wilhelm) — **Austlieferung** — **Auswanderungen** — **Baader** (Franz von) — **Babbage** (Charles) — **Bach** (Wilhelm) — **Bachmann** (Gottsch Ludwig Ernst) — **Bachmann** (Karl Friedrich) — **Bach** (Georg) — **Baden** — **Bähr** (Johann Christian Felix) — **Baiern** — **Baini** (Giuseppe) — **Baldi** (Adrian) — **Balemann** (Georg Ludwig) — **Ballauche** (Pierre Simon) — **Balzac** (Honoré de) — **Bandite** (Georg Emanuel) — **Banten** — **Bær** (Karl Ernst von) — **Barante** (Prosper Brugière, Baron de) — **Barbier** (Auguste) — **Barbaji y Azara** (Don Eusebio de) — **Barry Cornwall** (Bryan Waller Proctor) — **Barfels** (Ernst Daniel August) — **Barfels** (Karl Moriz Nikolaus) — **Barthe** (Felix) — **Barthelemy und Mery** — **Barthold** (Friedrich Wilhelm) — **Basel-Landschaft** — **Basen** — **Batschdorf** (Konstantin Nikolaewitsch) — **Baukunst** — **Baumgarten** — **Crusius** (Detlev Karl Wilhelm) — **Baumgarten** — **Crusius** (Ludwig Friedrich Dito) — **Bausen** — **Baumgarten** (Nathanael Ernst August — Moriz August) — **Baumgartner** (Andreas) — **Baumgartner** (Gallus Jakob) — **Baumwolle** — **Baur** (Ferdinand Christian) — **Bautain** (Louis) — **Bayer** (Hieronymus Johann Paul) — **Baulien** — **Bauconnay** (Wilhelm Ernst, Baron von) — **Beaumont** (Jean Baptiste Armand Louis Sénece Elie de) — **Beckstein** (Ludwig) — **Becker** (Karl Ferdinand) — **Beckmann** (Friedrich) — **Bequerel** (Antoine César) — **Beer** (Michael) — **Beer** (Wilhelm) — **Belgien** — **Bellermann** (Johann Joachim) — **Bellini** (Vincenzo) — **Bem** (Joseph) — **Bendemann** (Eduard) — **Benede** (Georg Friedrich) — **Benedict** (Julius) — **Bencke** (Friedrich Eduard) — **Bentind** — **Berg** (Günther Heinrich von) — **Berg** (Jens Christian) — **Berengren** (Jakob) — **Bergmans** (Heinrich) — **Beriot** (Charles Auguste de) — **Berlin**, in seiner neuen Gestaltung — **Berlioz** (Hector) — **Berly** (Karl Peter) — **Bernatowicz** (Felix) — **Bernhard II.** (Erich Freund (Herzog von Sachsen-Meiningen) — **Bernhard** Karl (Herzog von Sachsen-Weimar-Eisenach) — **Bernhardt** (Gottfried) — **Bernoulli** (Christoph) — **Berrier** (Pierre Antoine) — **Bertin** (Louis François — Pierre Louis Bertin de Sauv) — **Berville** (Saint-Albin) — **Bessow** (Bernhard von) — **Besson**.

Die allgemeine Theilnahme, welche das **Conversations-Lexikon der neuesten Zeit und Literatur** von 1832 gefunden, gab der Verlagsbehandlung Veranlassung, schon im Nachwort am Schluß dieses Werkes zu bemerken, daß der hier abgerissene Faden künftig wieder aufgenommen, und in einer dazu geeigneten Form ein neuer Spiegel der Zeit aufgestellt werden solle.

Jahre sind seitdem verlossen; eine neue Auflage (die **achte**) des **Conversations-Lexikons**, das trotz aller Concurrenz in immer weitem Kreise Verbreitung gefunden hat, ist beendet worden und in diese das **Conversations-Lexikon der neuesten Zeit und Literatur** seinem wesentlichen Inhalte nach übergegangen. Es hat demnach dieses Werk aufgehört, ein notwendiges Supplement des **Conversations-Lexikons** zu sein, obgleich es als ein treues Abbild jener aufgeregten Zeit von 1830 nicht bloß in Hinsicht der geschilderten Begebenheiten, Zustände und Personen, sondern auch durch die Art und Weise der Darstellung selbst, in welcher sich nicht minder deutlich die Zeit seines Erscheinens ausdrückt, einen bleibenden Werth behalten wird.

Dringend stellt sich bei den immer raschem Fortschritten in der Entwicklung des gesellschaftlichen Zustandes und bei der immer lebendiger Theilnahme, welche die Zeitgenossen dieser Entwicklung widmen, das Bedürfnis wieder heraus, die Masse der Begebenheiten, die die jüngste Vergangenheit bewegt, und die Resultate, welche während dieser Zeit in Wissenschaft, Kunst und praktischem Leben erstrebt wurden, in einem lebendigen Bilde vorgeführt zu sehen. Diesem Bedürfnisse soll das

## Conversations-Lexikon der Gegenwart

dienen, das in Anlage und Form mit der achten Auflage des **Conversations-Lexikons** übereinstimmend,

ein für sich bestehendes Ganzes

bildet, insofern alle darin enthaltenen Artikel in sich abgeschlossene Darstellungen sind, das aber zugleich die achte Auflage des **Conversations-Lexikons**, namentlich was die **neueste Zeit** betrifft, ergänzt und somit den Besitzern dieser, sowie aller frühern Auflagen, aller Nachdrucke und Nachbildungen desselben, als ein

unentbehrliches Supplement

sich darbietet.

In dem **Conversations-Lexikon** kann die Geschichte, selbst der neuesten Zeit, nur in allgemeinen Umrissen gezeichnet, die staatswissenschaftlichen Entwicklungen und andere Erörterungen interessanter Fragen können nur in ihren Resultaten gegeben, eine Menge Gegenstände nur im Allgemeinen berührt und nur die ausgezeichnetsten Persönlichkeiten biographisch geschildert und charakterisirt werden. Das neue Werk wird als Supplement in allen den berührten und vielen andern Beziehungen das Hauptwerk ergänzen und bis zur Gegenwart fortführen; es wird aber als ein selbständiges Werk nicht immer da beginnen, wo das Hauptwerk aufhört; es wird die historischen Darstellungen nicht grade vom dem Punkte aus fortsetzen, der ihnen in dem Hauptwerke als Grenze gesetzt ist; es wird im Gegentheile immer bis zu dem Punkte zurückgehen, ohne dessen Berührung die Gegenwart nicht vollkommen verstanden werden kann.

Das **Conversations-Lexikon der Gegenwart** wird Alles umfassen, was in der neuesten Zeit in irgend einer Richtung bedeutend hervorgetreten ist. Es wird in Beziehung auf das **Conversations-Lexikon**

der neuesten Zeit und Literatur von 1832 gleichsam ein zweites Zeitbild sein; wie jenes die Zeit von 1829 an schilderte, so ist dieses bestimmt, die Gegenwart zu schildern, und ein frisches aus dem Leben gegriffenes Bild derselben zu geben. **Es wird mit einem Worte Alles enthalten, was dem Gebildeten zum Verständniß der Gegenwart dient, und auf diese Weise als einen treuen und besonnenen Führer und Berather im Gedränge der Ereignisse sich zu bewähren suchen.** Der Standpunkt aber, von welchem dasselbe ausgeht, kann kein anderer sein, als der **liberale** — im edlen Sinne des Wortes —, denn **anständige Freimüthigkeit** ist die allgemeine Forderung und das Lösungswort der Gegenwart.

Der Verlagsbandlung ist es gelungen, in den meisten europäischen Staaten für die betreffenden geschichtlichen Artikel Männer zu gewinnen, die die Verhältnisse genau kennen und mit unbefangener Mäßigkeit beurtheilen. Ebenso hat sie hinsichtlich der Artikel aus dem Gebiete der Wissenschaft, der Kunst und des praktischen Lebens sowie der Biographien der thätigsten Mitwirkung der namhaftesten und hinsichtlich der Darstellungsgabe gewandtesten Fachgelehrten, Kunstkenner und Techniker sich versichert. Was endlich die zur Bearbeitung der Biographien nöthigen Materialien betrifft, so haben sich fast durchgehend mit großer, dankbar zu erkennender Bereitwilligkeit die zuverlässigsten Quellen eröffnet. Die Verlagsbandlung darf demnach hoffen, ihren Plan auf das befriedigendste ausführen und nicht nur ein nützliches und tüchtiges **Werk zum Nachschlagen**, sondern auch zugleich ein namentlich durch gewandte Darstellung anziehendes **Lesebuch** liefern zu können.

Das **Conversations-Lexikon der Gegenwart** wird, um die Artikel, da sie sich auf die Gegenwart beziehen, bald nach ihrer Abfassung in das Publicum zu bringen und die Anschaffung zu erleichtern, in

### **Heften von 10 Bogen**

zu dem Preise:

auf weißem Druckpapier 8 Gr.,  
auf gutem Schreibpapier 12 Gr.,  
auf extrafeinem Velinpapier 18 Gr.,

ausgegeben werden. Der Umfang läßt sich, da die Zeit stets Neues bringt, nicht genau bestimmen, indeß werden wol 20—24 Hefte zu einer genügenden Ausführung des Plans hinreichen. Die Hefte sollen sich so rasch folgen, als die auf die Bearbeitung und Redaction zu verwendende Sorgfalt es irgend gestatten.

Leipzig, im August 1838.

**J. A. Brodhaus.**

## **Vorteilhaftes Anerbieten für Philologen.**

**Statt 68 Thlr. 16 Gr. nur 30 Thlr.**

**J. A. FABRICII**

## **BIBLIOTHECA GRAECA**

sive notitia scriptorum veterum graecorum.

Edit. **G. C. Harles.**

XII Vol. 4<sup>o</sup> maj. 1790—1809.

Früherer Preis: Druckp. 68 Thlr. 16 Gr. Schreibp. 92 Thlr. 16 Gr.

Jetziger Preis: Druckp. 30 Thlr. Schreibp. 40 Thlr.  
Einzelne Bände: Druckp. 3 Thlr. Schreibp. 4 Thlr. 12 Gr.

Nicht allein die Forscher auf dem Gebiete der Literaturgeschichte, sondern alle Freunde gründlicher Studien im ganzen Umfange der Wissenschaft werden in diesem grossartigen Werke die seltensten und brauchbarsten Schätze der tiefsten Gelehrsamkeit finden. Die Charakterisirung der alten griechischen literarischen Welt nach ihren Schicksalen und nach ihren Leistungen, die Übersicht der Scholiasten und Commentatoren, die Fälle seltener Nachweisungen und Notizen, die, von den verschiedenartigsten Gegenständen angeregt, in reichem Ströme sich ergiesst, der umfassende Blick über alle Zweige der Literatur u. A. m. machen den Fabricius bei den verschiedenen Studien zu einem Lehrer, der sich nie erschöpft. Der Bearbeitung von Harles wird man das Lob ausdauernden Fleisses nicht versagen und übrigens nicht vergessen dürfen, wie schwer es

einem Nachfolger des Fabricius werden musste, sich eigenthümlichen Ruhm zu begründen. Die Verlagsbandlung hat zu den zwölf von Harles revidirten Bänden einen vollständigen, sorgfältig gearbeiteten Index anfertigen lassen und hofft, dass die deutsche Gelehrsamkeit im erneuten Interesse für den Fabricius ihren alten Ruhm bewahren werde.

## **I n d e x**

in Joannis Alberti Fabricii Bibliothecae graecae

Editionem Gottl. Christ. Harlesii.

1838. 4<sup>o</sup> maj. Preis 1 Thlr. 12 Gr.

Für die beigesetzten sehr ermässigten Preise ist das Werk, und gegen aparte Berechnung der Index durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Leipzig, im Juli 1838.

**Karl Onobloch.**

Durch alle Buchhandlungen ist von uns zu beziehen:

## **Des Sociétés par actions,**

par

**Mr. L. Wolowski,**

**Avocat à la Cour royale de Paris.**

In-8. Paris. 2 Fr. 50 C.

Eine höchst zeitgemäße Schrift!

Leipzig, im August 1838.

**Brodhaus & Weyenarius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.

(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

An alle Subscribenten ist versandt:

# CENTRAL-BIBLIOTHEK

der  
*Literatur, Statistik und Geschichte*

der  
**Pädagogik und des Schul-Unterrichts**  
im

*In- und Auslande.*

Herausgegeben

von

**Dr. H. G. Brzoska,**

Professor in Jena.

**Mai-Heft 1838.**

Inhalt.

## A. Literatur.

2. **Kno:** Liberale Erziehung; oder: praktische Abhandlung über die Methode der Erwerbung nützlicher und feiner Gelehrsamkeit.

(Die Fortsetzung im nächsten Heft.)

## 3. Literarische Anzeigen.

Schulatlas der neuern Erdkunde für Gymnasien und Bürgerschulen etc. von Dr. *Karl Vogel*, Director der vereinigten Bürgerschulen zu Leipzig etc. 2 Lieferungen. Leipzig, 1837 und 1838. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. (*Herbart*.)

## B. Statistik.

1. Dr. *C. A. W. Kruse*: Über das Verhältniss der Real- oder höhern Bürgerschulen zu den Gelehrtenschulen.  
2. Das Schulwesen des Grossherzogthums Hessen, dargestellt von Dr. *E. Schaumann*.

(Zweites Stück: Realschulen.)

3. Die Klein-Kinderschule der Stadt Zwoile in den Niederlanden (Provinz Oberyssel). (*J. Klein*.)

## C. Geschichte.

Die Gegenwart in ihren pädagogischen Bestrebungen und Forderungen. Mit besonderer Rücksicht auf Deutschland. Ein pädagogisch-historischer Versuch von Dr. *Fr. Cramer*.

(Viertes Stück.)

## D. Miscellaneen.

1. Beurtheilung der Abhandlung: Die Erziehung und die gelehrte Kaste der Juden etc. von *Gfrörer*.

NB. Die Redaction hat diese Abhandlung, welche vom Hrn. Verf. zum Vorgeschnack aus einem, wie es heisst, bald zu erscheinenden grossen Werke: „Urgeschichte des Christenthums“ mitgetheilt ist, einem ganz besonders dazu geeigneten Hrn. Mitarbeiter zur genauesten Beurtheilung übergeben, weil man das Gerücht verbreitet hat, das genannte Werk werde noch mehr Aufsehen in der theologischen Welt machen, als das vor drei Jahren erschienene Strauss'sche.

2. Über den Bildungsgang Jesu, besonders über den Einfluss der jüdischen Erziehung auf die Entwicklung seines Messiasbewusstseins, von Dr. *Kuhn*. (*Jost*.)  
3. Forum für Philosophen und praktische Pädagogen zu gegenseitiger Aufstellung und Lösung einzelner pädagogischer Probleme. Über die psychischen Vermögen — Anlagen — Kräfte. Zur Berichtigung einer Charakteristik meiner physiologischen Theorie im März-Hefte dieser Zeitschrift. Von *F. E. Hencke*.

## E. Journalistik.

- I. Deutsche Journale.  
II. Ausländische Journale.  
Statistisches.

Halle, im Juni 1838.

**C. A. Schwetschke und Sohn.**

Höchst interessant, belehrend und unterhaltend ist nachstehendes eben erschienene Werk, welches der Aufmerksamkeit jedes gebildeten Deutschen empfohlen wird:

## Deutschland

und

die Deutschen

von

**Eduard Beurmann.**

8. Altona. Jede Lieferung nur 9 Gr.

Dieses Werk erscheint in 16 Lieferungen, wovon bereits 3 in jeder Buchhandlung Deutschlands zu haben sind.

Herr Dr. Eduard Beurmann gehört zu den beliebtesten Schriftstellern, hat Deutschland nach allen Richtungen bereist, und besitzt neben seiner Beobachtung und geistreicher Auffassung eine freimüthige Darstellung.

Bei C. W. Leske in Darmstadt ist folgendes Werk erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die orientalischen Wäder in Bezug auf das zu Darmstadt neu errichtete Ludwigsbad. Von Dr.

**H. Segar**, grossherzoglich heffischem Hofmedicus. Mit einem lithographirten Grund- und Aufriß des Badehauses. Eleg. geh. 12. Preis 10 Gr., oder 45 Kr.

Mit Herausgabe dieser von einem der bewährtesten Ärzte Darmstadts verfaßten Schrift glaubt die obgenannte Buchhandlung einem wahren Bedürfnisse des hiesigen und auswärtigen Publicums zu entsprechen. Wer wünscht nicht, sich eine richtige Idee von der ganzen Einrichtung der nicht passend „russischen Dampfbad“ genannten Anstalt zu machen? Für Diejenigen, welche diese Bademethode befolgen wollen, halten wir aber obiges Werk seines ganzen Inhalts wegen für ganz unentbehrlich.

## Schriften über Talleyrand.

Soeben sind erschienen und durch alle Buchhandlungen von uns zu beziehen:

**Extraits des Mémoires**

du Prince de

**Talleyrand-Périgord.**

Recueillis et publiés par la Comtesse O. du C..., auteur des Mémoires d'une femme de qualité.

2 vols. In-8. 15 Fr.

**Mémoire sur Mr. de Talleyrand: sa vie politique et sa vie intime, suivi de la relation authentique de ses derniers momens et d'une appréciation phrénologique sur le crane de ce personnage célèbre, faites peu d'heures après sa mort, par**  
**Ch. Place et J. Florens.**

Avec une copie de plâtre de Mr. de Talleyrand moulé sur son visage une heure après sa mort.

In-8. 4 Fr.

Leipzig, im August 1838.

**Brochhaus & Wennerius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXVII.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

In meinem Verlage sind neu erschienen und in allen Buchhandlungen vorrätzig:

## Kaiser und Papst.

Roman

von  
**Eduard Duller.**

Vier Theile.

8. Geh. 5 Thlr. 18 Gr.

## Ideal und Wirklichkeit.

Von

**Adolfine.**

8. 1 Thlr. 6 Gr.

Leipzig, im August 1838.

**F. A. Brockhaus.**

Bei F. A. Mayer in Aachen ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Ornithologische Galerie

oder

Abbildungen aller Vögel

von

**C. F. Dubois.**

15tes Heft mit Tafel 85—90. Text 113—120.

Preis colorirt 12 Gr., schwarz 7 Gr.

Die Abbildungen sind alle nach natürlichen Exemplaren, wobei angegeben wird, aus welcher Sammlung sie entnommen sind. Die Gattungskennzeichen und Nester nebst Eier von jedem europäischen Vogel sind noch auf besondern numerirten Tafeln abgebildet.

Als eine der interessantesten Erscheinungen der Unterhaltungsliteratur unserer Zeit empfehlen wir die

## Spaziergänge und Weltfahrten

von

**Theodor Mundt.**

2 Bände. 8. Altona 1838. Geh.

Der Beifall, den dies in jeder Hinsicht ausgezeichnete Werk bei einem gebildeten Publicum gefunden, ist gewiss um so gerechter, als auch sämtliche kritische Blätter dasselbe als eine der wichtigsten literarischen Erscheinungen bezeichnen, und demselben hinsichtlich des Stils einen hohen Platz in der Literatur anweisen.

Beide Bände kosten 4 Thlr. und sind in allen Buchhandlungen Deutschlands, Österreichs, der Schweiz u. z. zu haben.

Bei F. Weinhardt in Arnstadt ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Der Thüringer Wald

und

seine nächste Umgebung.

Mit 80 malerischen Ansichten

bearbeitet von

**H. S. W. Gatham.**

In 20 Lieferungen. 1ste Lieferung mit 2 Bogen Text und 4 Ansichten. Gr. 8. 4 Gr.

Bei August Hirschwald in Berlin ist soeben (in Commission) erschienen und verhandt:

**Frauenstädt, J., Die Freiheit des Menschen**

und die **Persönlichkeit Gottes.** Ein Beitrag

zu den Grundfragen der gegenwärtigen Speculation.

Nebst einem Briefe des Dr. C. A. Gabler (ordent-

lichen Professors der Philosophie an der Universität

Berlin) an den Verfasser. 8. Geh. Preis 20 Gr.

**Eine Stimme aus der katholischen Kirche**

**Preußens in Sachen des Herrn Erzbischofs**

**Clemens August von Köln.** Posen und Ber-

lin. 1838. 8. Preis 7 1/2 Sgr.

## Botanische Abhandlungen.

Durch alle Buchhandlungen ist von uns zu beziehen:

**Spach (E.), Revisio generis Tiliarium.** In-8.

(1 B., 1 Kpf.) Paris, 1834.

— **Conspectus monographiae Hypericacearum.**

In-8. (1 1/2 B., 1 Kpf.) Paris, 1836.

— **Hypericacearum monographiae fragmenta.**

In-8. (1 1/4 B., 2 Kpf.) Paris, 1836.

— **Organographie des Cistacées.** In-8. (2 B.,

2 Kpf.) Paris, 1837.

— **Conspectus monographiae Cistacearum.** In-8.

(1 1/4 B.) Paris, 1836.

— **Revisio Grossularicarum.** In-8. (1 B.,

1 ill. Kpf.) Paris, 1835.

— **Synopsis monographiae Onagrearum.** In-8.

(1 1/4 B.) Paris, 1835.

— **Onagrearum novarum vel minus notarum**

**descriptions.** In-8. (1 1/4 B.) Paris, 1835.

Preis jeder Abhandlung 12 Gr.

Leipzig, im August 1838.

**Brockhaus & Wenarius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.

(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

Soeben erschien der erste Theil von:

**PLANTAE JAVANICAE RARIORES,**  
**DESCRIPTAE ICONIBUSQUE ILLUSTRATAE,**  
**QUAS IN INSULA JAVA, ANNIS 1802—1818, LEGIT ET INVESTIGAVIT**  
**THOMAS HORSFIELD, M. D.**

E SICCIS

DESCRIPTIONES ET CHARACTERES PLURIMARUM ELABORAVIT

**J. J. BENNETT**

OBSERVATIONES STRUCTURAM ET AFFINITATIS PRAESERTIM RESPICIENTES PASSIM  
ADJECIT

**ROBERTUS BROWN.**

Das Werk wird aus zwei Theilen bestehen, die zusammen einen Band von mittler Grösse bilden.

Jeder Theil enthält 25 Abbildungen und ungefähr 100 Seiten Text.

Das Werk erscheint in grossem Quartformat; in jedem Theile werden mehrer Folioblätter mit Abbildungen von besonders grossen Gegenständen vorkommen.

Die Beschreibungen werden in lateinischer, die Bemerkungen in englischer Sprache gegeben.

Es erscheinen colorirte und nicht colorirte Exemplare; jeder Theil eines colorirten Exemplars kostet 24 Thlr. 12 Gr.; jeder Theil eines nicht colorirten Exemplars 17 Thlr. 12 Gr.

Der zweite Theil befindet sich noch in Arbeit und wird jedenfalls im Anfange des Jahres 1839 fertig werden.

Das Werk erscheint für Deutschland in Leipzig bei **Black & Armstrong**, Hofbuchhändler in **London**,  
London, im Juni 1838.

**Black & Armstrong,**  
Hofbuchhändler.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

**Das Pfennig-Magazin**  
**für Kinder.**

1838. Juni. Nr. 22—26.

**Nr. 22.** \*Die weissen Ameisen oder Termiten. \*Der Kaffer. Der Pilatusberg, eine Volksage. \*Die gestreifte Nyäne. Auflösung der Räthsel im vorigen Monat. **Räthsel.** — **Nr. 23.** \*Der ostindische oder gebelmte Kasuar. Geschichtchen von einem klugen Hunde. \*Franz und Wilhelmine. Peter der Grosse und das weinende Heiligenbild. \*Der Karnool. — **Nr. 24.** \*Jupiter. \*Der Schnapphans in Vena. Gesellschaftliche Spinnen. Der schmalakabische Krieg. \*Der Eintenschwamm. **Räthsel.** — **Nr. 25.** \*Der Generalfeldmarschall August Reichard Graf von Gnesenau. Von Benennung der Paare. \*Presburg. Der Griff vom Ringelzuge. \*Der Sonigtukul. — **Nr. 26.** \*Seid wohlthätig und barmherzig! \*Von der Auf-erstehung Jesu. Bescheidenheit. Der Schein trügt. \*Die Seeschwalbe über der Seebahn. **Räthsel.**

Die mit \* bezeichneten Aufsätze enthalten eine oder mehrere Abbildungen.

Preis dieses Jahrgangs von 52 Nummern 1 Thlr. — Der erste bis vierte Jahrgang kosten ebenfalls jeder 1 Thlr.

Leipzig, im August 1838.

**F. A. Brockhaus.**

Soeben ist bei C. Fernbach jun. in Berlin erschienen und in jeder guten Buchhandlung zu haben:

**Selma**  
**die jüdische Seherin,**

Traumleben und Hellschen einer durch animalischen Magnetismus wiederhergestellten Kranken von **Dr. W.**

**Wiener.** Preis 1 Thlr. 8 Gr. (1 Thlr. 10 Gr.)

Der Inhalt dieses Werkes ist vor den meisten der neuern literarischen Erzeugnisse am besten geeignet, einen lebenden,

ja unaussprechlichen Eindruck auf des Lesers Gemüth zu machen. Von einem beliebigen Autor mit gewandter Feder geschrieben, enthält dieses Buch nur Schilderungen von wirklich vorgefallenen Thatfachen, die, als zu Protokoll genommene Ergebnisse am Krankenbette einer gegenwärtig vollkommen genesenen Hellschenden, sowohl die Beachtung jedes Arztes, als auch die der gesammten Menschheit überhaupt in hohem Grade verdienen. Lebensfragen, die zu den heiligsten und wichtigsten gehören, von der Seherin auf überraschende Weise beantwortet, Aufschlüsse über Judenthum und über den Zustand der Clairvoyance selbst, sowie merkwürdige Krisen, stempeln dieses Werk zu einem der interessantesten und belehrendsten Bücher.

**Deutsche Volkslieder**  
**mit ihren Originalweisen.**

Unter Mitwirkung des Professors u. Dr. Naßmann, des Herrn u. von Zuccalmaglio u. A., nach handschriftlichen Quellen herausgegeben und mit Anmerkungen versehen  
von

**A. Arctzschmer,**

königl. Geh. Kriegsrath und Ritter u.

Von diesem längst erwarteten Werke, gleich bedeutend in seinem Verhältnis zur volksthümlichen Poesie und Musik als zur gelehrten Forschung, sind soeben das 1ste und 2te Heft erschienen und können von den zahlreichen Subscribenten in Empfang genommen werden.

Wir lassen den Subscriptionspreis, à Heft 8 Gr., oder 10 Sgr., noch bestehen. Die 2 ersten Hefte liegen in allen Buchhandlungen aus, und geben von der reichen Ausstattung Zeugnis, die wir dem Werke gewidmet haben. Das Ganze wird aus höchstens 12 Lieferungen bestehen.

Berlin.

Verlags-Buchhandlung.



Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:  
**Das Pfennig-Magazin**

für Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse.

1838. Juli. Nr. 275—278.

Nr. 275. \*Kanton. Geschichte des Walfischfanges. Die Thierchmelerei. \*Johann Gutenberg's Statue in Mainz. Ausgrabungen im Birgskloster bei Salzburg. Dampfschiffahrt von England nach Amerika. \*Die Alameda und das Kloster unserer lieben Frau del Carmen zu Gabig. — Nr. 276. \*Das Rathhaus in Ulm. Bergmehl in Lappland und China. \*Über den Bau der Zähne. Das Pflaster mit Erdbarz. Tiefe unter dem Meerespiegel. \*Die Kasten der Hindus. — Nr. 277. \*General Jackson. Die Bewohner von Boothia Felix. \*Sarasgassa. Über Kaffeeverfälschung. Lange Lebensdauer von Pflanzen. \*Die Eidechsen. — Nr. 278. \*Boppard. Die Katakomben in Paris. Zucker aus Kürbissen. \*Der Anbau und die Manufactur der Baumwolle. Die Zigeuner. Zahl der Wahnsinnigen in England. \*Die Steinblöcke bei Carnac.

Die mit \* bezeichneten Aufsätze enthalten eine oder mehrere Abbildungen.

Preis dieses Jahrgangs von 52 Nummern 2 Thlr. — Der erste Jahrgang von 52 Nrn. kostet 2 Thlr., der zweite von 59 Nrn. 1 Thlr. 12 Gr., der dritte von 52 Nrn. 2 Thlr., der vierte von 53 Nrn. 2 Thlr., der fünfte von 52 Nrn. 2 Thlr. Leipzig, im August 1838.

**F. A. Brochhaus.**

**Für wissenschaftliche Aerzte und Studierende der Arzneikunde, Pharmaceuten, Forstmänner u.**

In jeder Buchhandlung ist zu haben:

**Wilbrand, Dr. J. B.** (grosch. hess. Geh. Medicinalrath und Professor zu Giessen), Handbuch der vergleichenden Anatomie in ihrer nächsten Beziehung auf die Physiologie für wissenschaftliche Ärzte und Studierende der Arzneikunde. Gr. 8. 1838. 1 Thlr. 16 Gr., oder 3 Fl.

Zunächst zum eignen Gebrauche bei dessen Vorlesungen an der Landesuniversität zu Gießen entschloß sich der verdiente Herr Verfasser zur Herausgabe des hier angegebenen Werkes; es wird dasselbe aber gewiß dem gesammten ärztlichen Publicum sehr willkommen sein, da es bisher an einem kurzgefaßten Lehrbuch der vergleichenden Anatomie mit Berücksichtigung der Physiologie fehlte, oder es sind die vorhandenen doch wenig praktisch und ihres Umfangs sowie der enormen Preise wegen Vielen unzugänglich. Kein gründlich wissenschaftlich gebildeter Arzt darf mit der vergleichenden Anatomie unbekannt sein, die Candidaten der Heilkunde können hingegen aber auch nur so viel Zeit dem Studium derselben widmen, als dieses mit dem Hauptstudium der Arzneikunde in ihrem ganzen Umfange, in theoretischer und praktischer Hinsicht, zu vereinbaren ist. Demnach ist das gegenwärtige Werk in seiner gedrängten und doch gründlichen Behandlung dem Bedürfnisse am angemessensten und wird sicher auch von manchem älteren Arzte mit Vergnügen empfangen werden.

Von demselben Verfasser erschien im vorigen Jahre:

Handbuch der Botanik nach den natürlichen Pflanzenfamilien, nebst einer Übersicht der Geschlechter nach dem Linné'schen Sexualsystem als Einleitung in die natürlichen Familien für Nichtkenner derselben, enthaltend die Diagnosen der in Deutschland wildwachsenden und aller merkwürdigen ausländischen Gewächse, nebst erläuternden Bemerkungen über das

Vaterland, über ihre etwaige Nutzenanwendung u. s. w. Zum Handgebrauche beim Aufsuchen unbekannter Pflanzen für Ärzte, Pharmaceuten, Kameralisten, wissenschaftliche Forstmänner und jeden wissenschaftlichen Pflanzenforscher, welcher mit den Pflanzenfamilien näher vertraut werden möchte. Gr. 8. 1837. 3 Thlr., oder 5 Fl. 24 Kr.

Der gelehrte Verfasser äußert sich über Inhalt und Zweck dieses Buches folgenvermaßen:

„Dieses Handbuch hat die Bestimmung, vom Linné'schen System aus das Studium der natürlichen Pflanzenfamilien, wie dieselben jetzt von den verschiedenen Pflanzenforschern aufgestellt werden, einzuleiten. Zu diesem Zweck findet sich zuvor eine Aufzählung sämmtlicher im Buche aufgeführten Pflanzengeschlechter nach diesem Systeme. Hieraus folgt eine systematische Übersicht sämmtlicher natürlichen Familien unter drei Stufen und dreizehn Pflanzengruppen vertheilt.

Es ist jetzt an der Zeit, daß das Studium der Botanik nach den natürlichen Familien auch in Deutschland allgemeiner wird; — in Frankreich und England ist diese sogenannte natürliche Methode schon die gewöhnliche. In meinem frühern Handbuche habe ich schon darauf hingearbeitet, — aber die Linné'sche Methode, als die gebräuchlichere, zur Richtschnur genommen; in dem jetzigen dagegen nehme ich die natürliche Methode zur Richtschnur, und suche die Linné'sche für die Nichtkenner zu benutzen, um diese zur natürlichen hinüber zu führen.“

Der unterzeichnete Verleger hat sich bemüht, durch deutlichen, alles Vorkommende gehörig unterscheidenden Druck, durch gutes Papier und einen wohlfeilen Preis diese gebiegenen Werke brauchbar und Jedermann zugänglich zu machen.

Darmstadt, im Juni 1838.

**Karl Wilhelm Leske.**

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

**J. J. S. Encyclopädische Zeitschrift**, vorzüglich für Naturgeschichte, Anatomie und Physiologie. Von D. N. Jahrgang 1838. Viertes Heft. Mit einem Kupfer. Gr. 4. Preis des Jahrgangs von 12 Heften mit Kupfern 8 Thlr.

**Blätter für literarische Unterhaltung.** (Verantwortlicher Herausgeber: Heinrich Brochhaus.) Jahrgang 1838. Monat Juli, oder Nr. 182—212, und 4 literarische Anzeiger: Nr. XXI—XXIV. Gr. 4. Preis des Jahrgangs von 365 Nummern (außer den Beilagen) auf seinem Druck-Beilagenpapier 12 Thlr.

**Allgemeine medicinische Zeitung.** Herausgegeben von Dr. **Karl Pabst.** Jahrgang 1838. Monat Februar, oder Nr. 10—17. Gr. 4. Preis des Jahrgangs 6 Thlr. 16 Gr.

**Repertorium der gesammten deutschen Literatur.** Herausgegeben von **E. G. Gersdorf.** 1838. Sechszehnten Bandes sechstes Heft. (Nr. XII.) Siebzehnten Bandes erstes Heft. (Nr. XIII.) Gr. 8. Preis eines Bandes 3 Thlr.

**Allgemeine Bibliographie für Deutschland.** Jahrgang 1838. Monat Juli, oder Nr. 27—30, und Bibliographischer Anzeiger: Nr. 27—30. Gr. 8. Preis des Jahrgangs 3 Thlr.

Leipzig, im August 1838.

**F. A. Brochhaus.**

In allen Buchhandlungen ist **gratis** zu erhalten:

## **Verzeichniß** außerordentlich wohlfeiler theologischer und philosophischer Schriften.

Eine Sammlung von 490 für Studium und praktische Bildung größtentheils wichtigen und brauchbaren Werken von Achard, Ammon, Anton, Augusti, Bauer, Beck, Bernstein, Bouterwek, Bruhn, Claudius, Ebert, Fabricius, Fest, Fichte, Gittermann, Heydenreich, Haas, Herklotzsch, Hezel, Hoffbauer, Hundiker, Jaspis, Ilgen, Kerndörffer, Krause, Lang, Mosheim, Müller, Münnich, Oemler, Pöhlitz, Rebs, Richter, Rosenmüller, Schelling, Schmid, Schottin, Schröder, Schuderoff, Siegel, Simon, Suabedissen, Tittmann, de Wette, Wormser u. A., **von welchen (mit Ausnahme weniger Artikel) eine bestimmte Anzahl von Exemplaren von dem unterzeichneten Verleger zu den beigedruckten, bedeutend herabgesetzten Preisen geliefert werden.**

Von den früher erschienenen Verzeichnissen über höchst billige belletristische, medicinische, juristische und philologische Schriften sind ebenfalls noch Exemplare durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Leipzig, im Juli 1838.

**Karl Cnobloch.**

**Wichtiges Werk für die Kriegsgeschichte.**

### **Journaux des sièges** faits ou soutenus par les Français dans la Péninsule, de 1807 à 1814;

rédigés d'après les ordres du Gouvernement, sur les documents existant aux archives de la guerre et au dépôt des fortifications.

Par

**J. Belmas,**

Chef du bataillon du génie.

4 vols in-8., avec un atlas de 24 planches gr. in-folio.  
22 Thlr. 6 Gr.

Die Sorgfalt, welche auf die Ausführung des großen, dem Werke beigegebenen Atlases verwandt wurde, hat bis jetzt die Ausgabe des Buchs verhindert, zu dessen Debit soeben die Erlaubnis von Seiten des französischen Gouvernements erteilt ist.

**Wir beeilen uns auf ein Werk aufmerksam zu machen, welches allen Militärbibliotheken wünschenswert ist.**

Leipzig, im August 1838.

**Brockhaus & Weyersius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

In der Unterzeichneten sind soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

**Freese, Dr. C.,** Über deutsche Affonanzen. Eine Monographie. Geh. 12 Gr.

1837 erschien von demselben Verfasser:

Deutsche Prosodie. 1 Thlr.

**Gruher, Joh. v.,** Grundriss einer historischen Geographie für Gymnasien. 12 Gr.

**Harder, Hauptmann H. W.,** Gebrauch der Artillerie vor dem Feinde, erläutert durch Beispiele aus

der Kriegsgeschichte. I. II. mit 11 Plänen. Geh. 5 Thlr.

**Ruhn, F.,** „Wie ging Christus durch des Grabes Thür?“ Ein schrift- und zeitgemäßes Zeugnis von dem Auferstehen, mit Rücksicht auf die Strauß'sche Analyse. Geh. 14 Gr.

**Rafn, C. C.,** Die Entdeckung Amerikas im zehnten Jahrhundert. Aus der dänischen Handschrift von G. Mohnike. Geh. 6 Gr.

**Sjoberg, G.,** Schwedische Sprachlehre für Deutsche. 4te Auflage. 12 Gr.

Zinsentabellen zu 4, 4½ und 5 Procent auf die Tage eines Monats, auf die Monate eines Jahres und auf ein Jahr von 1 Pfennig bis 1000 Thlr. auf das Genaueste berechnet. Geh. 8 Gr.

**C. Köpfer'sche** Buchhandlung  
in Straßburg.

### **Badeschriften.**

In meinem Verlage erschien soeben und ist in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes zu erhalten:

**Die Nord- und Ostsee-Bäder.**  
Für Brunnen- und Badereisende bearbeitet von  
**Dr. Karl Christian Wille.** Mit drei Kärtchen.  
8. Geh. 1 Thlr.

Bisher erschienen von demselben Verfasser:

Die Heilquellen in allgemein wissenschaftlicher Beziehung und deren zweckmäßige Benutzung. 8. Geh. 12 Gr.

Die Heilquellen des Königreichs Böhmen und der Markgrafschaft Mähren. Mit zwei Kärtchen und dem Plane von Karlsbad. 8. Geh. 20 Gr.

Die Bäder und Heilquellen Schlesiens und der Grafschaft Glatz. Mit zwei Kärtchen. 8. Geh. 16 Gr.

Leipzig, im August 1838.

**F. A. Brockhaus.**

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXVIII.

Dieser literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

Neu ist erschienen und an alle Buchhandlungen verfanbt:  
**Literarische Zustände und Zeitgenossen.**  
In Schilderungen aus **Karl Aug. Böttiger's** handschriftlichem Nachlasse. Zweites Bändchen. Gr. 8. Geh. 1 Thlr. 16 Gr.

Das erste Bändchen dieser interessanten Beiträge zur Geschichte der deutschen Literatur erschien zu Anfang d. J. und kostete 1 Thlr. 12 Gr.; eine „**Biographische Skizze Böttiger's**“, von demselben Verfasser, 16 Gr.  
Leipzig, im August 1838.

F. A. Brockhaus.

Soeben ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu finden:

## Geranger's Lieder.

### Auswahl

in freier Bearbeitung

von

**Adelbert v. Chamisso und Franz Frh. Gaudy.**  
Geh. Preis 1 Thlr. 18 Gr.

Leipzig, im August 1838.

**Weidmann'sche** Buchhandlung.

Bei Th. Chr. Fr. Enslin in Berlin ist nun vollständig erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Handwörterbuch der gesammten Chirurgie und Augenheilkunde.

Zum Gebrauch für angehende Ärzte und Wundärzte,

von

**Dr. Ernst Blasius,**

Professor der Chirurgie etc. in Halle.

Vier starke Bände, zusammen 225 Bogen.

Subscriptionspreis 12 Thlr.

Die kritischen Blätter haben sich so lobend über dies Werk ausgesprochen, dass der Verleger sich zuversichtlich darauf berufen darf. Für den Zweck dieser Anzeige mag es genügen, aus einer Recension des Herrn Geh. Medicinalraths Kluge, Directors der Charité zu Berlin, hier einige Worte anzuführen. „Diejenigen Anforderungen“, sagt derselbe, „wozu der Titel berechtigt, erfüllt dies Werk auf eine Weise, dass man es für ganz zeitgemäss und seinem Zwecke vollkommen genügend erachten muss, da die übrigen, theils schon vollendeten, theils noch im Werden begriffenen Werke der Art entweder zu lückenhaft und unwissenschaftlich oder von zu grosser Ausdehnung sind, um von den Jüngern der Kunst mit Nutzen gebraucht werden

zu können. Auch die alphabetische Form desselben muss für den beabsichtigten Zweck als die entsprechendste anerkannt werden, weil sie die einzige ist, welche den Classificationssystemen aller Schulen von selbst sich anpasst und daher die Schüler niemals in Widerspruch versetzt mit den Ansichten ihrer Lehrer. Es trägt die Farbe der jetzigen regen Zeit, und ist für den jetzigen Standpunkt der medicinisch-chirurgischen Wissenschaften ein treuer Spiegel, in welchem der grosse Einfluss, den die einzelnen Zweige der Anatomie, pathologischen Anatomie, Chemie und Physiologie in ihrer weit geförderten Ausbildung auf die praktische Chirurgie bis jetzt ausgeübt haben, überall ersichtlich ist etc.“

Die Bogenzahl übersteigt die für den obigen Preis versprochene um 25, dennoch ist derselbe nicht erhöht worden, und soll auch noch bis zum Schluss dieses Jahres fort dauern, dann aber der Ladenpreis von 16 Thlrn. eintreten.

Als ein vorzugsweise bedeutendes, viel belehrendes, richtigeres und nur zu lobendes Buch erwähnen die literarischen Blätter:

## Die Epigonen.

Familienmemoiren in neun Büchern.

Herausgegeben von

**Karl Immermann.**

3 Bände. 80 Bogen in 8. Auf feinem Maschinen-Velinpapier. In geschmackvollem Umschlage.

Geh. Preis 6 Thlr.

Auch unter dem Titel:

## Immermann's Schriften 5ter bis 7ter Band.

In diesem Werke haben sich die Conflicte der Gegenwart in moralischen und gesellschaftlichen Beziehungen, in Kunst, Wissenschaft und Politik zu einem reichen Lebensbilde gestaltet. Wie einst in Werther und Wilhelm Meister die einseitigen Richtungen der Zeit sich dichterisch spiegeln und dadurch ihr eignes Heilmittel und Correctiv wurden, so erhält unser späteres Zeitalter, die Zeit der Epigonen, hier ein Gegenbild, dem bei seiner psychologisch scharfen Auffassung und poetischen Milde ähnliche tiefe Wirkungen nicht fehlen werden.

Düsseldorf, den 30sten Juli 1838.

J. E. Schaub.

Bei Friedrich Fleischer in Leipzig ist eben erschienen:

## Gallus oder Römische Scenen aus der Zeit August's.

Zur Erläuterung der wesentlichsten Gegenstände  
aus dem häuslichen Leben der Römer.

Von W. A. Becker,

Professor an der Universität Leipzig.

2 Theile mit 5 grossen Tafeln. Gr. 8. Sauber geheftet.  
Preis 3 Thlr. 18 Gr., colorirt 4 Thlr. 18 Gr.

## Der Freihafen. 3tes Heft.

Erleben ist das 3te Heft vom:

### Freihafen.

#### Galerie von Unterhaltungsbildern.

Mit Beiträgen

von

**C. G. Carns, H. König, Dr. Wises, A. Rosenkranz, Zeit, Th. Mägge, Barnhagen v. Ense, Fr. v. W., Dr. Strauß &c.** erschienen.

Diese durch die steigende Gunst des Publicums ausgezeichnete Vierteljahrschrift, die bereits zu den verbreitetsten Organen der Öffentlichkeit in Deutschland gehört, fährt fort die wichtigsten Beiträge für die Interessen der Gegenwart zu liefern. Das 3te Heft enthält:

„Vergänglichliches und Bleibendes im Christenthum

von

**Dr. Strauß.**

(als Vorläufer zu der neuesten Ausgabe von des Verfassers Leben Jesu vom wissenschaftlichen Interesse!!!)

„Streifereien durch Belgien, von **Dr. Mägge**; zur Jugendgeschichte der Königin Sophie Charlotte von Preußen, nach französischen Quellen, von **Dr. Guhrauer** in Paris; eine neue Novelle von **H. v. W.**; Geschichte von **H. Gustav Kühne**; Literaturblätter; Fortgesetzte Mittheilungen über **Niebuhr** und einige ungedruckte Briefe desselben; Correspondenznachrichten aus Paris, Berlin, Prag, Danau, Leipzig, Dresden, Bremen, Hamburg &c.“

In jeder soliden Buchhandlung Deutschlands sind die bis jetzt erschienenen 3 Hefte des Freihafens vorrätig, der Preis für jedes Heft ist 1 Thlr. 12 Gr.

In alle solide Buchhandlungen wurde soeben versandt:

### Kant's sämtliche Werke,

8te und 9te Lieferung,

mit welcher der 3te Band, enthaltend die kleineren metaphysischen Schriften, vollendet ist. Der 1ste Band enthält die Schriften zur Philosophie im Allgemeinen und zur Logik; der 2te Band aber die Kritik der reinen Vernunft, und zwar zum ersten Male mit vollständiger Angabe aller Verschiedenheiten der 1sten und 2ten Ausgabe dieses Werks. Die Fortsetzung folgt so schnell, als es die auf die Redaction zu verwendende Sorgfalt zulässt, und denken wir im Laufe dieses Jahres noch 3 Bände zu vollenden. Wir haben uns bis jetzt aller Lobpreisungen enthalten, und überlassen das Urtheil über den Werth unserer Ausgabe auch jetzt dem sachverständigen unparteiischen Publicum, dessen Beifall uns die zahlreichen Bestellungen, welche noch täglich eingeht, hinlänglich verbürgen. Über die Art und Weise der Bearbeitung geben die Vorreden des Herrn Prof. Hartenstein in Leipzig sorgfältige Rechenschaft. Der Raum ist bei anständiger Ausstattung durch compendiosen Druck so gepart, daß unsere Ausgabe im Vergleich mit der bei Herrn F. Wofe erschienenen ganz unverhältnißmäßig billiger ist. Einem schlagenden Beweis liefert z. B. „Die Kritik der reinen Vernunft“, welche bei uns 1 Thlr. 21 Gr., bei Herrn Wofe aber 3 Thlr. 6 Gr. kostet, ohne daß letztere Ausgabe das Allgeringste mehr als die unsere enthielte. Einer wahrscheinlichen Berechnung nach wird unsere Ausgabe kaum viel über den 1ten Theil, bestimmt indeß noch unter der Hälfte des Preises der Wofe'schen Ausgabe kosten. — Indem wir nun die Verehrer Kant's zur ferneren Theilnahme an unserm Unternehmen einladen, fügen wir noch die Nachricht hinzu, daß eine von Kant im Jahre

1755 der philosophischen Facultät zu Königsberg handschriftlich überreichte Abhandlung: De igne, deren Entzign die vor wenigen Monaten dem gelehrten Publicum ganz unbekannt war, sich in einer Abschrift schon seit Jahren in unserm Besitze befindet. — Um einigen geäußerten Wünschen zu entsprechen, so haben wir jetzt die Einrichtung getroffen, daß unsere geehrten Abnehmer das Werk auch bandweise, statt wie bisher in Lieferungen, erhalten können.

Leipzig, im August 1838.

**Modes & Baumann.**

In Carl Gerold's Buchhandlung in Wien ist soeben erschienen und daselbst, sowie in allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

**Jahrbücher der Literatur. Zweimundachtzigster Band. 1838. April. Mai. Juni.**

### Inhalt.

- Art. I. Manners and customs of the ancient Egyptians, illustrated by drawings of those subjects by J. G. Wilkinson. London 1837. Drei Bände.
- II. 1) D'Alembert und Friedrich der Große über das Verhältniß der Wissenschaft zum Staate, akademische Einleitungssrede von August Böckh; vorgetragen in der öffentlichen Sitzung der königl. preuss. Akademie der Wissenschaften zur Feier des Jahrestages Friedrich's des Großen, am 25ten Januar 1838. Berlin 1838.  
2) Rede bei Gelegenheit der städtischen Eröffnung des Stiftungstages der Gesellschaft der Ärzte in Wien, gehalten von dem Präsidenten derselben im Consistorialsaale der k. k. Universität den 22ten März 1838. Wien.
- III. Précis du système, des progrès et de l'état de l'instruction publique en Russie, rédigé d'après des documens officiels, par Alexandre de Krusenstern. Varsavie 1837.
- IV. Bericht an Sr. Majestät den Kaiser von Rußland über das Ministerium des öffentlichen Unterrichts für das Jahr 1836. Petersburg 1837.
- V. Der Mond nach seinen kosmischen und individuellen Verhältnissen, oder allgemeine vergleichende Selenographie. Von W. Beer und Dr. J. F. Mädler. Berlin 1837.
- VI. Ernst Raupach's dramatische Werke erster, zweiter, dritter und vierter Band. Der Hohenstaufen fünfter und sechster Band. Novum testamentum graece, curavit Dr. J. Mart. Augustinus Scholz. Vol. II. Actus (Acta) Apostolorum, Epistolae, Apocalypsin completens. Lipsiae 1836.
- VIII. Gemälde der Lebensbeschreibungen großer moslimischer Herrscher der ersten sieben Jahrhunderte der Sidiksch, von Hammer-Purgstall. Erster, zweiter und dritter Band. Leipzig und Darmstadt 1837.
- IX. Historisch-diplomatische Beiträge zur Geschichte der Stadt Berlin. Drei Theile. Herausgegeben von C. F. Schmidt. Berlin 1837.
- X. Astronomy and general Physics. By W. Whewell. London 1835.

Inhalt des Anzeige-Blattes Nr. LXXXII.

Chronologische Geschichte der Verbreitung der Buchdruckerkunst. Von P. A. Budik.

Münzen von Athen, welche das k. k. Münz- und Antikencabinet aufbewahrt.

Hammer-Purgstall's morgenländische Handschriften. (Fortf.)

# BIBLIE

de Monsieur **Cahen**.

Traduction nouvelle, avec l'hébreu en regard, accompagné des points-voyelles et des accents toniques, avec les variantes de la version des septante et du texte samaritain, par

**S. CAHEN.**

A Paris, Rue des frances-bourgeois, au Marais, No. 21.

En vente les Tomes 1 à 9, contenant le Pentateuque, Josué, les Juges, Samuel, les Rois et Isaïe.

Prix du volume, in-8., 6 Fr.; papier vélin 9 Fr.

On vend séparément les volumes; mais en prenant le Pentateuque seul, ou un des volumes du Pentateuque, on paye par volume 1 Fr. de plus.

On vend aussi séparément:

Le culte des anciens Hébreux, par *Munch*; Sur la zone des villes lévétiques. 3 Fr.

Sur la femme hébreu. 2 Fr.

Traduction de la préface d'Abarbanel et d'une partie de son commentaire sur Isaïe. 2 Fr.

On trouve à la même adresse:

Cours de lecture hébraïque par *S. Cahen*. In-8. 2 Fr. 50 C.

Livre de prières, en hébreu, à l'usage des Israélites du rit portugais. In-12. 1 Fr. 50 C.

Rituel des prières, à l'usage des Israélites du rit allemand, hébreu et français; traduction d'*Anspach*. In-8. Cartonné. 4 Fr.

Dictionnaire hébreu-français par *Marchand-Ennery*. In-8. 6 Fr.

Grammaire hébraïque raisonnée et analytique par *Sarchi*. In-8. 10 Fr.

Notice sur la version arabe d'Isaïe, par Rabbi *Saadia Gaon*, et sur une version persane manuscrite de la bibliothèque royale, par *Munch*. In-8. 4 Fr.

Bestellungen erbitten sich

Leipzig, im August 1838.

**Brockhaus & Weynarius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.

(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

In der Vereins-Buchhandlung in Berlin ist eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## Deutsche Volkslieder

mit ihren Originalweisen.

Herausgegeben und Hr. königl. Hoheit dem Kronprinzen gewidmet von

**A. Kretzschmer.**

Erstes und zweites Heft, in großem Octavformat, auf Weilin, höchst elegant gedruckt und geheftet, à Heft 8 Gr., oder 36 Kr. Rhein.

Dies ist die erste Sammlung dieser Art, mit den Melodien und mit vorsichtiger Berücksichtigung, was wirklich Volks-

lieb, wirklich in dem Volke gebichtet, von ihm gesungen ist. Die handschriftliche Sammlung, an der Herr Geheimrath Kretzschmer seit fast 50 Jahren mit Liebe gesammelt, ist längst die berühmteste in ganz Deutschland. Bei der vorliegenden Herausgabe ist derselbe von den vorzüglichsten Forschern und Sammlern unterstützt worden, von dem Herrn Hofrath Kriesewetter, Herrn v. Zuccalmaglio, Herrn Geheimrath v. Harthausen, Herrn Professor Baumstark und Herrn Professor Dr. Wasmann. Die äußere Ausstattung ist splendid.

Bei **C. Schünemann** in Bremen ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

**Porter, W. H.**, Beobachtungen über die chirurgischen Krankheiten des Kehlkopfs und der Luftröhre, besonders in Rücksicht auf diejenigen Leiden dieser Organe, welche die Operation der Bronchotomie erfordern; mit Einschluss von Bemerkungen über Croup, Cyranche laryngea, Verletzungen durch Verschlucken von Säuren und kochendem Wasser, fremde Körper in den Luftwegen, Asphyxia, Wunden etc. Nach der zweiten Auflage aus dem Englischen übersetzt von **Dr. Runge**. Gr. 8. Preis 1 Thlr. 18 Gr.

Bei **G. W. Leske** in Darmstadt erschien soeben:

v. Hammer-Purgstall, Gemäldesaal der Lebensbeschreibungen großer moslimischer Herrscher der ersten sieben Jahrhunderte der Hidschret. Viertes Band. Enthaltend: Abdallah Ben Zahir — Amru Ben Leis — Nafir Ben Ahmed — Rabus — Abhaded-bewlet — Mahmud — Kutbeddin Ibel — Maadbin — Siruf Toghluk — Ahmed Ibn Zaufun. Gr. 8. Geh. Mit einer Titeltignette. Preis 1 Thlr. 8 Gr., oder 2 Fl. 24 Kr.

Die Verlagshandlung begnügt sich, das Erscheinen dieses Bandes anzuzeigen, dem der 5te Band in der Kürze folgt. Das Werk eines ausgezeichneten Gelehrten, dessen Meisterhaft von allen Seiten anerkannt ist, bedarf keiner lobpreisenden Ankündigung.

Im Verlage von Wilh. Kaiser in Bremen ist soeben erschienen:

**Gall, Fr. von, Reise durch Schweden im Sommer 1836.** 2 Bände. 8. Elegant geheftet. 1 Thlr. 16 Gr.

In meinem Verlage ist erschienen und in allen Buchhandlungen vorrätzig:

**Physikalisch-astronomischer Versuch über die Welten-Ordnung.** Eine populäre Darstellung von **Augustin Wodzinski**, Prof. zu Krakau. Mit 3 Stein-drucktafeln. Gr. 8. Geh. 1 Thlr.

Ohne den herrschenden Systemen berühmter Astronomen unbedingt zu huldigen, gelangte der Verf. durch eigne Forschungen zu überraschenden Resultaten, deren tüchtlche Darstellung jedem Denkenden von Interesse sein müssen.

Leipzig, im August 1838.

**J. W. Brockhaus.**

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen von uns zu beziehen:

**RÉPERTOIRE**  
DE  
**L'INDUSTRIE ÉTRANGÈRE,**  
OU

**Dessins et Descriptions**  
**DES MACHINES LES PLUS IMPORTANTES, BRE-**  
**VETÉES À L'ÉTRANGER.**

PUBLIÉ  
PAR A. PERIGNA, ROBINET, RENETTE  
ET C<sup>IE</sup>.

Erstes bis drittes Heft. In Folio. Paris. Subscrip-  
tionspreis 5 Thlr. 8 Gr.

Sowol durch die Wahl der dargestellten Gegenstände, als  
auch die höchste Genauigkeit und Sauberkeit der Ausführung  
wird diese Sammlung Allen unentbehrlich, welche die Fort-  
schritte des Maschinenwesens mit einiger Aufmerksamkeit ver-  
folgen. Ein ausführlicher Zert ist jedem Hefte beigegeben.  
Profecte sind auf Verlangen zu haben.

Leipzig, im August 1838.

**Brockhaus & Wenner,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

In der Nicolaischen Buchhandlung in Berlin, Bräuer-  
straße Nr. 13, ist soeben erschienen:

**Fl ü c t i g e**

**Bemerkungen eines Flüchtling = Reisenden.**

Von **C. D. L. v. Arnim.**

Vermehrte Ausgabe. Mit Abbildungen und Musik-  
beilagen. Velinpapier. Sauber gebestet. 2 Thlr.

Diese vom Publicum sehr freundlich aufgenommenen Skizzen  
sind in dieser Ausgabe vervollständigt, theils durch einen An-  
hang, enthaltend die Thronbesteigung des regierenden Sultans,  
theils durch das nach dem Leben gezeichnete, sauber colorirte  
Portrait desselben in ganzer Figur.

Bei C. Kummer in Leipzig ist erschienen:

**Stürmer, Th.,** Der letzte ultrahomöopathische Apo-  
stat, oder Dr. Trinks und sein Terrorismus, kritisch  
beleuchtet. Gr. 8. Geh. 16 Gr.

**Denkschriften** der nordamerikanischen Akademie der  
homöopathischen Heilkunst. 1ste Lieferung. Auch unter  
dem Titel: Wirkungen des Schlagengiftes zum ärzt-  
lichen Gebrauch vergleichend zusammengestellt durch  
**C. Hering.** Mit einer Einleitung in das Stu-  
dium der homöopathischen Arzneimittellehre. Gr. 8.  
Geh. 1 Thlr. 12 Gr.

**Oesterreichische militairische Zeitschrift. 1838.**  
Sechstes Heft.

Dieses Heft ist soeben erschienen und an alle Buchhand-  
lungen versendet worden:

Inhalt: I. Der Feldzug 1705 in Portugal und Spa-  
nen. Dritter Abschnitt. II. Die Operationen der verbündeten  
Heere gegen Paris im März 1814. (Fortsetzung.) Der 22te März.  
III. Militairische Charakteristik des nordamerikanischen Generals

Jackson. IV. Fragmente aus der Geschichte des Geschützwesens  
V. Literatur. VI. Neueste Militairveränderungen.

Der Preis des Jahrgangs 1838 von 12 Heften ist wie  
der aller früheren Jahrgänge von 1818—37 jeder 8 Thlr. Sächsl.

Die Jahrgänge 1811—13 sind in einer neuen Auflage  
in vier Bänden vereinigt erschienen und kosten zusammen eben-  
falls 8 Thlr. Sächsl. Wer die ganze Sammlung von 1811—37  
auf einmal abnimmt, erhält dieselbe um 1/4 wohlfeiler.

Von dem Unterzeichneten ist diese Zeitschrift durch alle  
Buchhandlungen um die genannten Preise zu beziehen.

Wien, den 5ten August 1838.

J. G. Heubner,  
Buchhändler.

Bei J. J. Weber in Leipzig ist erschienen:

**Allgemeines**  
**Recensionen-Verzeichniß.**

Wissenschaftlich geordnete  
Übersicht sämmtlicher im Jahre 1838  
in  
deutschen und ausländischen Zeitschriften recensirten  
in  
Deutschland erschienenen Bücher.

Preis für den Jahrgang 1 Thlr. 8 Gr.

Im Januar bis März ist erschienen und durch alle  
Buchhandlungen zu beziehen.

Wir theilen uns das gebildete Publicum auf ein höchst  
interessantes Werk aufmerksam zu machen, das mit dem  
Titel:

**Der Pilger der Elbe**

von  
**L. Mühlbach.**

Gr. 8. Altona, Hammerich. 1838. Geh. 2 Thlr.  
in schönster Ausstattung, geziert mit 4 herrlichen  
Stahlstichen, eben erschienen ist, und welches die allge-  
meinste Beachtung ebenso sehr verdient, wie das vor etlichen  
Jahren erschienene: Pilger des Rheins von Bulwer.

In sämmtlichen soliden Buchhandlungen ist Mühlbach's  
Pilger der Elbe vorrätzig und zu haben.

In meinem Verlage erschien und ist in allen Buchhand-  
lungen vorrätzig:

**Kleines A=B=C=Buch**  
für

**Anfänger im Lesen und Schreiben.**

**Synonymen und Homonymen.**

Von **J. G. von Quandt.**

Gr. 12. Geh. 2 Thlr.

Kein Buch für Kinder, möchte dies Werthen viel-  
mehr Jünglingen willkommen sein, die vermehren lesen und schrei-  
ben zu können, — Allen interessant, welche auf eine geistreiche  
Weise ihren Sinn für wahres Verständniß der Wörter zu schär-  
fen wünschen.

Leipzig, im August 1838.

**f. A. Brockhaus.**

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXIX.

Dieser literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

Neue schönwissenschaftliche Werke  
im Verlage von

**F. A. Brockhaus in Leipzig.**

**Adolfine, Ideal und Wirklichkeit.** 8. 1 Thlr. 6 Gr.  
**Duller (Eduard), Kaiser und Papst.** Roman.

**Die Heile.** 8. Geh. 5 Thlr. 18 Gr.

**Heering (Gustav von), Meine Reise nach Portugal im Frühjahr 1836.** Zwei Theile. 8. Geh. 3 Thlr. 12 Gr.

**Sternberg (A. von), Fortunat.** Ein Feenmärchen. Zwei Theile. 8. Geh. 3 Thlr. 18 Gr.

**Lies (K.), Bunte Skizzen aus Ost und Süd.** Entworfen und gesammelt in Preußen, Rußland, der Türkei, Griechenland, auf den ionischen Inseln und in Italien. Zwei Theile. Mit einer Musikbeilage. 8. Geh. 3 Thlr.

**Der Cavalier auf Reisen im Jahr 1837.** Vom Verfasser der „Ansichten aus der Cavalierperspective im Jahr 1835.“ 8. 12. Geh. 1 Thlr. 20 Gr.

Das frühere Werk des Verf. erschien 1836 bei Froberg in Leipzig und kostete 2 Thlr.

**Skizzen aus dem Alltagsleben.** Erstes Bändchen: Die Töchter des Präsidenten. Erzählung einer Gouvernante. Aus dem Schwedischen. 8. Geh. 1 Thlr. 16 Gr.

**Germann (Johann Peter), Gedichte.** 8. Geh. 1 Thlr. 12 Gr.

**Schulz (Germann), Wanderbuch.** Ein Gedicht in Szenen und Liedern. 8. Geh. 18 Gr.

**Stieglitz (Heinrich), Gruß an Berlin.** Ein Zukunftsraum. 8. Geh. 20 Gr.

**Wegel's (F. G.) gesammelte Gedichte und Nachlaß.** Herausgegeben von F. Funck. 8. Geh. 2 Thlr. 8 Gr.

**Funck (J.), Erinnerungen aus meinem Leben.** Zweiter Band: Aus dem Leben zweier Schauspieler: August Wilhelm Pfand's und Ludwig Devrient's. 8. Geh. 1 Thlr. 12 Gr.

Der 1ste Band: C. L. W. Hoffmann und F. G. Wegel (1830), 1 Thlr. 16 Gr.

**Literarische Zustände und Zeitgenossen.** In Schilderungen aus Karl Aug. Böttiger's handschriftlichem Nachlaß. Herausgegeben von R. W. Böttiger. Erstes und zweites Bändchen. 8. 3 Thlr. 4 Gr.

Böttiger's Leben, von demselben Verf., kostet 16 Gr.

Bei Friedrich Fleischer in Leipzig ist neu erschienen:

**Reise und Rastage  
in der Normandie**  
von J. Venedey.

Zwei Bände. 75 Bogen. Weispapier. 4½ Thaler.

Mit Vergnügen wird man diese lebendigen Schilderungen eines der interessantesten Landstriche Europas lesen, und auch der erstere Geschichtsforscher bald finden, daß ihm Werthvolles hier geboten wird.

Im Literatur-Comptoir in Stuttgart erschien soeben:

## Der Thierfreund,

oder über das pflichtmäßige Verhalten des Menschen gegen die Thierwelt. Zur Belehrung und Unterhaltung für Jung und Alt, Reich und Arm, Hoch und Niedrig.

Von Dr. Joh. Jak. Kromm,

Verfasser des Lehrbuchs für die reifere Jugend, des Preisigers am Grabe, und verschiedener anderer Schriften.

13 Bogen. Klein 8. Brosch. 40 Kr. Rhein., oder 10 gGr. Preuß.

Es ist der Zweck dieses Werthens, den in neuerer Zeit sich bildenden Vereinen gegen Thierquälerei in die Hände zu arbeiten, und es ist dasselbe deshalb zur allgemeinsten Verbreitung und besonders zur Einführung als Lesebuch in Volksschulen sehr zu empfehlen. Vereine gegen Thierquälerei und Städte- und Landgemeinden, welche diese in ihren Wirkungen segensreiche und nützliche Schrift in Mehrzahl verbreiten wollen, erhalten von der Verlagshandlung auf 6 Exemplare eins, auf 15 drei und auf 25 sechs Exemplare frei. Bei Abnahme von 50 Exemplaren wird dagegen das Exemplar nur zu 30 Kr. Rhein., oder 7½ gGr. preuß. Courant, bei Abnahme von 100 Exemplaren nur zu 24 Kr. Rhein., oder 6 gGr. preuß. Courant, berechnet, so daß durch diese billigen Verkaufsbedingungen Jedem die Anschaffung möglich gemacht worden ist.

Soeben ist erschienen:

## Lateinische Grammatik

für

die untern Classen der Gymnasien.

Nach der Anlage der Billroth'schen Grammatik bearbeitet von

Dr. Friedrich Ellendt,

Director des Königl. Gymnasiums zu Eisleben.

Preis 8 Gr., oder 10 Sgr.

Vor einigen Monaten haben wir versandt:

## Lateinische

## Schulgrammatik

von

Dr. G. Billroth.

3 weite Ausgabe

besorgt von

Dr. Friedrich Ellendt,

Director des Gymnasiums zu Eisleben.

Preis 1 Thlr.

Leipzig, im August 1838.

Weidmann'sche Buchhandlung.



Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

## Das Pfennig-Magazin

für Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse.

1838. Aug. fl. Nr. 279—282.

Nr. 279. \*Colbert. Die Kisten in Kleinasien. \*Die Hanf- und Flachsbau. Das Neueste aus der Natur- und Gewerbswissenschaft. Thiere als Bindenführer. \*Das Capitol zu Washington. — Nr. 280. \*Vincent de Paula. Erwungene Mithätigkeit. \*Die Blume Victoria Regina. Das Neueste aus der Natur- und Gewerbswissenschaft (Schluß). Die türkischen Couriere. \*Das römische Amphitheater zu El Djem. — Nr. 281. \*Das heidnische Schloß. \*Eroberung von Canaba durch die Engländer. Die baltischen Inseln. \*Die Steinbrücke auf der Insel Portland. — Nr. 282. \*Der Döbelst von Euxor in Paris. \*Die Trüffeln. Stizzen aus dem Leben der Chinesen. \*Das Ohr des Dionys.

Die mit \* bezeichneten Aufsätze enthalten eine oder mehrere Abbildungen.

Preis dieses Jahrgangs von 52 Nummern 2 Thlr. — Der erste Jahrgang von 52 Nrn. kostet 2 Thlr., der zweite von 59 Nrn. 1 Thlr. 12 Gr., der dritte von 52 Nrn. 2 Thlr., der vierte von 53 Nrn. 2 Thlr., der fünfte von 52 Nrn. 2 Thlr. Leipzig, im August 1838.

J. A. Brockhaus.

**Weidmann, F., Geschichte des ehemaligen Stiftes und der Landschaft St. Gallen** unter den zwei letzten Fürstbistümern von St. Gallen, besonders während den Jahren der helvetischen Revolution bis zur Aufhebung des Stiftes. Mit Original-Actenstücken, Correspondenz: Auszügen und andern Beilagen. Gr. 8. St. Gallen, 1834. 1 fl. 20 Kr., oder 21 Gr.

Dieses als Anhang und Schluß zu v. Arz' Geschichte von St. Gallen zu betrachtende wichtige Werk, ehemals unser Commissionsartikel, ist nunmehr in unser Verlagsseigenthum übergegangen.

St. Gallen, den 25ten Juli 1838.

Huber und Comp.

**Bei Th. Chr. Fr. Enslin in Berlin** sind in der ersten Hälfte des Jahres 1838 folgende neue Bücher erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Berens's, C. A. W. (weil. E. preuß. Geh. Med.-Rath u. Prof.), Vorlesungen über praktische Arzneiwissenschaft, oder Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie. 3. Auflage, neu durchgesehen und berichtigt von Dr. J. C. Wibers, E. preuß. Med.-Rath u. 3ter Band. Chronische Krankheiten. Gr. 8. 1 Thlr. 3 Gr.

Das ganze, aus zehn Bänden in Großoctav bestehende Werk wird in dieser neuen Auflage nur 15 Thlr. kosten, während die erste Ausgabe 23 Thlr. kostete.

Blasius, Ernst (Dr. u. Prof. in Halle), Handwörterbuch der gesammten Chirurgie und Augenheilkunde, zum Gebrauch für angehende Ärzte und Wundärzte. 4ter und letzter Band, in 2 Abtheilungen. Gr. 8. Subscriptionspreis 3 Thlr.

Das ganze, aus 4 Bänden, in 8 Abtheilungen (225 Bogen), bestehende Werk ist noch bis Ende dieses Jahres zum Subscriptionspreis von 12 Thlr. zu haben, nachher tritt der Ladenpreis mit 16 Thlr. ein.

Bonorden, H. F. (Dr. u. k. preuss. Reg.-Arzt), Classification der gesammten Krankheiten des Menschen nach ihrem Wesen, nebst Erläuterungen. Gr. 8. 12 Gr.

Ideler, Dr. K. W., Grundriss der Seelenheilkunde. 1ter und letzter Theil. Gr. 8. 5 Thlr.

Der 1ste Band (1835) kostet 4 Thlr. 6 Gr.

Rayer, Dr. P. (in Paris), Theoretisch-praktische Darstellung der Hautkrankheiten; nach der zweiten durchaus verbesserten Ausgabe des Originals in deutscher Uebersetzung herausgegeben von Dr. H. Stannius. In 3 Bänden. 2ter Band. Gr. 8. 2 Thlr. 12 Gr.

Der dritte und letzte Band wird auch baldigst erscheinen.

Richter, Dr. G. H., Wiesbaden nebst seinen Heilquellen und Umgebungen. Mit 2 Ansichten. 8. Brosch. 1 Thlr. 12 Gr.

Rust, Joh. Nep. (königl. preuss. Präsident etc. in Berlin), Helikologie, neue Bearbeitung. Stes, 4tes Heft, à 12 Bogen Text und 2 ausgemalte Kupfertafeln. Folio. Das Heft 1 Thlr. 16 Gr.

—, Die Medicinalverfassung Preussens, wie sie war und wie sie ist; acutenmäßig dargestellt und kritisch beleuchtet. Gr. 8. Brosch. 1 Thlr. 8 Gr.

Medicinische Zeitung, herausgegeben von dem Verein für Heilkunde in Preussen (unter Rust's Präsidio). 7ter Jahrgang, 1838. Folio. Wöchentlich 1—1½ Bogen. 3 Thlr. 16 Gr.

Die ersten 5 Jahrgänge dieser Zeitung, 1832—36, sind zu dem ermässigten Preis von 5 Thlr. (statt 15 Thlr. 22 Gr.) zu haben, einzeln kostet der Jahrgang 1832: 1 Thlr. 6 Gr., die folgenden, 1833—36: 1 Thlr. 8 Gr., 1837: 3 Thlr. 16 Gr.

Abrégé, Court, de Phrases, pour faciliter aux jeunes demoiselles la conversation française. Seconde édition, revue et augmentée de petits morceaux de lecture. 8. 8 Gr. Dietrich, Dr. Alb., Terminologie der phanerogamischen Pflanzen; zum Unterricht in der Botanik für Lehranstalten; nebst einer Anleitung zum Selbststudium und für den Lehrer, wie er in der Botanik mit Nutzen zu unterrichten hat. Zweite durchaus umgearbeitete Auflage. Mit 24 lithographirten Tafeln, worauf mehr als 1200 Figuren befindlich sind. Gr. 8. Geb. 1 Thlr. 8 Gr.

Dhm, Martin (Prof. in Berlin), Lehrbuch der Mechanik, zugleich mit den dazu nöthigen Lehren der höhern Analysis und der höhern Geometrie. Elementar vorgegetragen und mit sehr vielen Beispielen der Anwendung versehen. 3ter Band. Dynamik fester Körper. Mit einer Figurentafel. Gr. 8. 3 Thlr.

Das ganze aus drei Bänden bestehende Werk 8 Thlr. 6 Gr. Bogel, W., u. Dr. Brenneke (Lehrer in Berlin), Praktisches Rechenbuch für die untern, mittlern und obern Classen der Gymnasien, Gewerbe- und Bürgerschulen. 2ter Theil. 8. 18 Gr.

Der 1ste Theil (1837) kostet 12 Gr.

Sieben ist erschienen:

## Erste und letzte Liebe.

Roman

von

L. Mühlbach.

8. Altona, Hammerich. Geh. 1 Thlr. 8 Gr.

Mit entschiedenem Talente ausgestattet, tritt in dem vorstehenden Romane — dem übrigens wohlbekannte Thatsachen zu Grunde liegen — eine neue Schriftstellerin auf. Das Interesse, welches dies elegant gedruckte Buch bereits an einigen Orten erregt, wird sich gewiß immer noch steigern, und der Name Mühlbach bald den Liebingschriftstellern Deutschlands beigezählt werden.

Sammtliche solche Buchhandlungen Deutschlands u. haben Exemplare vorräthig.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen von uns zu beziehen:

## NOUVEAU SYSTÈME DE CHIMIE ORGANIQUE

fondé  
sur des nouvelles méthodes d'observation,  
et précédé  
d'un traité complet de l'art d'observer et de manipuler,  
en grand et en petit  
dans le laboratoire et sur le porte-objet du microscope;

par

**F.-V. Raspail.**

Deuxième édition entièrement refondue.

Accompagnée d'un atlas in-4. de vingt planches de figures dessinées d'après nature, et gravées avec le plus grand soin.

3 forts vol. in-8. et atlas in-4. — 10 Thlr. 16 Gr.

„L'ouvrage que publie M. Raspail est entièrement neuf; fondé sur un ensemble d'expériences microscopiques rigoureuses; il a cherché dans toutes les questions à éclairer la chimie par l'anatomie et la physiologie.“

Leipzig, im August 1838.

**Brockhaus & Wenarius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

Soeben ist fertig geworden und in allen Buchhandlungen zu haben:

**Müller, Dr. Joh..** Handbuch der  
Physiologie. 2ten Bandes 2te Abtheilung.  
1 Thlr. 12 Gr.

Die 2te Abtheilung des 1sten Bandes (3te Auflage) ist bereits vor zwei Monaten erschienen und als Rest verhandelt worden. Die 2te Abtheilung des 2ten Bandes, womit das Werk geschlossen ist, wird im Frühjahr 1839 ausgegeben, und somit das Ganze zur Ostermesse vollständig zu haben sein.

Koblenz, den 1sten August 1838.

J. Hölcher.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

**Handbuch der Hauptanzeigen**

für die  
richtige Wahl  
der

**homöopathischen Heilmittel**

oder

sämmtliche zur Zeit geprüfte homöopathische Arzneien in ihren Haupt- und Eigenwirkungen, nach den bisherigen Erfahrungen am Krankenbette bearbeitet und mit einem systematisch-alphabetischen Repertorium des Inhalts versehen

von **G. S. G. Jahr.**

Zweite durchaus umgearbeitete, verbesserte und ansehnlich vermehrte Auflage.

727 Seiten in gr. 8. Preis 4 Thlr., oder 7 Rl. 12 Kr.

Düsseldorf, bei J. E. Schaub.

Über den Werth des vorstehenden Werkes viel zu sagen, dürfte fast überflüssig sein, da die Herren Doctoren Rummel und Groß in den homöopathischen Journalen es bereits als das beste in diesem Fache und als eine der unentbehrlichsten Werke

für den homöopathischen Arzt bezeichnet haben, und der rasche Absatz der ersten Auflage die praktische Brauchbarkeit desselben hinlänglich verbürgt. Hier daher nur so viel, daß der Herr Verfasser alle seine Kräfte aufzuboten, dieser neuen Auflage bei einer ansehnlichen Menge von Zusätzen auch eine noch brauchbarere Einrichtung zu geben, wie er denn das Ganze überhaupt so durchaus umgearbeitet hat, daß die gegenwärtige Auflage sich von der vorigen ebenso wesentlich unterscheidet, als diese von den früheren Werken ähnlicher Art unterschieden war. Da- bei ist das Werk mit ganz neuen Lettern auf gutes weißes Papier vorzüglich scharf und schön gedruckt, und der Preis für die über zehn Bogen betragende Vergrößerung des Buches nur um das billigste erhöht worden.

In Karl Gerold's Buchhandlung in Wien  
ist soeben erschienen und daselbst, sowie in allen Buchhandlungen  
Deutschlands zu haben:

**Lehrbuch**

der

**Landwirthschaft.**

Von

**Johann Burger,**

Doctor der Heilkunde, k. k. Subernialrath, Mitglied mehrerer Gesell-  
schaften zur Beförderung der Landwirthschaft.

**Zwei Bände.**

Vierte verbesserte und vermehrte Auflage.

Gr. 8. Wien 1838. Preis 4 Thlr. Schf.

Es wird dem großen, landwirthschaftlichen Publicum an-  
genehm sein, zu vernehmen, daß sich die Verlagsbuchhandlung in  
die Lage gesetzt sah, eine neue Auflage dieses berühmten und  
durch ganz Deutschland verbreiteten Werkes zu veranstalten,  
über dessen ausgezeichneten Werth sich gleich anfangs alle Zeit-  
schriften vereinigt hatten, und der in der Folge durch die schnell  
aufeinander folgenden vier rechtmäßigen Auflagen, den Nach-  
druck in Würtemberg, und die in den Jahren 1834 und 1836  
in die schwedische und französische Sprache veranstalteten Über-  
setzungen außer Zweifel gesetzt worden.

Wenngleich in der vorliegenden Auflage die wesentlichsten  
Grundsätze des Lehrbuchs dieselben geblieben sind, wie sie früher  
aufgestellt worden, so sind doch die Änderungen und Zusätze, die  
das Fortschreiten der auf Erfahrung beruhenden Wissenschaften  
an dem Werke nöthig machten, von großer Bedeutung, und die  
Leser werden mit Vergnügen erfahren, daß der Verfasser von den  
Lehren der neuen Chemie, sowie von allen Beobachtungen und  
Erfahrungen Kenntniß nahm, die zur Erklärung der Erscheinun-  
gen dienen, und aus denen Regeln für die Praxis abgeleitet  
werden können.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:  
Blätter für literarische Unterhaltung. (Verantwortlicher  
Herausgeber: Heinrich Brockhaus.) Jahrgang  
1838. Monat August, oder Nr. 213 — 243, und 4  
literarische Anzeiger: Nr. XXV — XXVIII. Gr. 4.  
Preis des Jahrgangs von 365 Nummern (außer den  
Beilagen) auf seinem Druck-Wellpapier 12 Thlr.  
Repertorium der gesammten deutschen Literatur. Her-  
ausgegeben von **E. G. Gersdorf.** 1838. Sieb-  
zehnten Bandes zweites und drittes Heft. (Nr. XIV,  
XV.) Gr. 8. Preis eines Bandes 3 Thlr.

Leipzig, im August 1838.

**H. M. Brockhaus.**

Bei J. A. Mayer in Aachen ist nun **vollständig** erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

# Moliere's sämmliche Werke.

übersezt von

**L. Braunsfels, F. Demmler, E. Duller,  
W. v. Lüdemann, W. Nunkel, H. Wichoff,  
E. Weyden, D. E. W. Wolff, E. Kay u. W.**

Herausgegeben  
von

**Louis Lar.**

## Ausgabe in Einem Bande.

Lexikonformat, auf feinstem Velinpapier (gleich Schiller's und Goethe's Werken),

mit einem schönen Portrait Moliere's in Stahlstich.

Subscriptionspreis 5 Thlr., oder 9 Gulden.

Taschenausgabe in funfzehn Lieferungen, oder fünf Bänden.

Subscriptionspreis 5 Thlr., oder 9 Gulden.

Goethe sagt: „Moliere ist so groß, daß man immer von Neuem erstaunt, wenn man ihn wieder liest. Ich lese jedes Jahr einige Stücke von ihm, denn wie kleine Menschen sind nicht fähig, die Größe solcher Dinge in uns zu bewahren, und wir müssen daher von Zeit zu Zeit solchen Eindruck in uns aufrechterhalten.“ Trotzdem ist in Deutschland noch keine Übersetzung dieses größten aller Lustspieldichter erschienen, die ihn ganz unverkümmt, und die poetischen Stücke poetisch wiedergegeben hätte. Sie erscheint jetzt zum ersten Male vollständig, von rühmlichst bekannten Literaten bearbeitet, auf das würdigste ausgestattet, bei ihrem theilweisen Erscheinen schon von allen Kritikern eifrigst empfohlen, ein unentbehrliches Buch für jede Bibliothek, für jeden Freund des Schönen und Guten in der Literatur. Der Subscriptionspreis wird auf vieles Verlangen noch bis Ende des Jahres fortbestehen.

In unserm Verlage sind im Laufe dieses Jahres erschienen und in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes zu erhalten: *Biblioteca Scriptor. Latinor., curis virorum doctorum emendata et commentariis instructa, consil. G. Bernhardy instituta. Pars I. M. T. Ciceronis libri. Tom. I. Brutum contin. Smaj. 1 Thlr.*

Auch unter dem Titel:

*Ciceronis, M. T., Brutus. Emendavit et commentariis instruxit Henr. Meyer.*

Hiermit eröffnen wir eine Folge lateinischer Autoren, welche theils in den Kreis der Gymnasien gehören, theils ausserhalb des praktischen Gesichtspunktes einen mehr als mittelbaren Werth besitzen, und nach den Bedürfnissen unserer Zeit mit Commentaren ausgestattet werden. Einen Pränumerations- oder Subscriptionspreis stellen wir nicht, dagegen werden wir Schulanstalten besondere Vortheile bewilligen.

Geschichte der evangelischen Missionsanstalten zu Bekämpfung der Heiden in Ostindien. Herausgegeben von

Dr. H. A. Niemeyer. 83stes und 84stes, oder 7ten Bandes 11tes und 12tes Stück. 4. 1 Thlr. 10 Gr. (1 Thlr. 12½ Sgr.)

Günther, F., Lehrgang des Unterrichts im deutschen Styl für Lehrer an mittlern und höhern Bildungsanstalten der weiblichen Jugend. Gr. 8. 1 Thlr. 12 Gr. (1 Thlr. 15 Sgr.)

Hanow, R., Ist Horatius ein kleiner Dichter? Ein Beitrag zur Charakteristik des Horatius. 4. 8 Gr. (10 Sgr.)

Junker's Crempelstafeln, das ist: 144 Tafeln mit beinahe 2000 abgesondert ausgerechneten zweckmäßigen Crempeln. Ein unentbehrliches Hilfsmittel beim Rechnen-unterricht in Volksschulen. 6te verbesserte Auflage. 8. 16 Gr. (20 Sgr.)

— Dieselben Tafeln für die preussischen Staaten. 2te verbesserte Auflage. 8. 16 Gr. (20 Sgr.)

Juvenalis, D. Junius, Satiren. Übersetzt und erläutert von Dr. W. E. Weber (Professor und Director der Gelehrtenschule zu Bremen). Gr. 8. 2 Thlr. 8 Gr. (2 Thlr. 10 Sgr.)

Kohlrausch, Fr., Anleitung für Volksschullehrer zum richtigen Gebrauch der „Geschichten und Lehren der heiligen Schrift alten und neuen Testaments“. 4te verbesserte Auflage. Gr. 8. 18 Gr. (22½ Sgr.)

Müller, J. H. T., Lehrbuch der Mathematik für Gymnasien und Realschulen, nebst vielen Übungs-aufgaben und Excursen. Erster Theil, die gesammte Arithmetik enthaltend. Gr. 8. 1 Thlr. 16 Gr. (1 Thlr. 20 Sgr.)

Ist gleich bei seinem Erscheinen in vier Gymnasien eingeführt. Der Recensent in der A. L. Zeitung, 1838, Nr. 103—105, nennt dieses Lehrbuch am Schlusse der kritischen Beurtheilung als das beste von allen bisher bekannten Schulbüchern dieses Fachs.

Niemeyer, A. H., Gesangbuch für höhere Schulen und Erziehungsanstalten. 12te (von Dr. H. A. Daniel) umgearbeitete Auflage. 8. 10 Gr. (12½ Sgr.)

Bei dieser seit längerer Zeit vorbereiteten neuen Ausgabe ist der jetzige Herr Herausgeber eifrig bemüht gewesen, alle billigen Ansprüche möglichst zu befriedigen. Die Zahl der Gesänge ist auf 474 gestiegen, besonders ist das Fach der eigentlichen Schulleieder bereichert, und fünf Register erhöhen die praktische Brauchbarkeit.

## Buchhandlung des Waisenhauses in Halle.

In meinem Verlage ist erschienen und in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes zu haben:

**Naumer (Friedrich von), Geschichte Europas seit dem Ende des funfzehnten Jahrhunderts. Sechster Band. Gr. 8. Druckpapier 3 Thlr. 6 Gr. Velinpapier 6 Thlr. 12 Gr.**

Alle sechs Bände kosten im Subscriptionspreise auf Druckpapier 17 Thlr. 22 Gr., auf Velinpapier 35 Thlr. 20 Gr. Leipzig, im August 1838.

**J. A. Brockhaus.**

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXX.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

## Conversations-Lexikon der Gegenwart.

Ein für sich bestehendes und in sich abgeschlossenes Werk  
zugleich ein Supplement  
zur achten Auflage des Conversations-Lexikons,  
sowie zu jeder frühern,  
zu allen Nachdrucken und Nachbildungen desselben.

Gr. 8. In Heften von zehn Bogen.

Viertes Heft, Bogen 31—40.  
Bestelmeyer bis Buchdruckerkunst.

Preis eines Heftes:

Auf feinem Druckpapier 8 Groschen.  
Auf gutem Schreibpapier 12 Groschen.  
Auf extrafeinem Velinpapier 18 Groschen.

Inhalt des vierten Heftes:

Bestelmeyer (Georg) — Bestuscheff (Alexander) — Beudant (F. S.) — Beuth (Peter Kaspar Wilhelm) — Bevölkerung — Bibliographie — Bierbrauerei — Biernacki (Moiſe Prosper) — Bildhauerkunst, s. Sculptur — Billroth (Johann Gustav Friedrich) — Bischöfe (evangelische) — Björnstjerna (Magnus Friedrich Ferdinand, Graf) — Blacas d'Aulps (Herzog von) — Blanc (Ludwig Gottfried) — Bleek (Friedrich) — Bliktersdorf (Friedrich Randoſin Karl, Freiherr von) — Blüme (Friedrich) — Blum (Karl) — Bobinetmanufaktur — Böckel (Ernst Gottfried Adolf) — Böckh (Friedrich von) — Bode (Wilhelm Julius Ludwig) — Boguslawski (Anton Heinrich Ludwig von) — Böhlen (Peter von) — Böhme (Jakob) und seine Philosophie — Böhmen — Böhmer (Johann Friedrich) — Bommel (Cornelius Richard Anton van) — Bona — Bonaparte — Borgeſti (Bartolomeo, Graf) — Bornhauser (Thomas) — Bosnien — Böttiger (Karl Wilhelm), in Erlangen — Böttiger (Karl Wilhelm), in Upsala — Bourbons — Bowles (William Eise) — Bowring (John) — Brahe (Magnus, Graf) — Brandes (Rudolf) — Brandis (Christian August) — Joachim Dietrich) — Brandt (Christlieb Julius) — Branntweinbrennerei — Brastien — Braunschweig — Breithaupt (Johann August Friedrich) — Bremen — Bremer (Frederike) — Bresson (Charles, Graf) — Breton de los Herreros (Don Manuel) — Brodissjewski (Adalbert) — Brøndsted (Peter Oluf) — Brongniart (Alexandre — Adolphe) — Bronikowski (Alexander August Ferdinand von Opeln.) — Bronikowski (Kavir) — Brondère (Charles de) — Brouffais (François Joseph Victor) — Brown (Thomas S.) — Brüggemann (Johann Heinrich Theodor) — Brulliot (Franz) — Brunnens- und Badeorte — Bruns (Johann Georg Theodor) — Buchdruckerkunst.

Leipzig, im September 1838.

F. A. Brockhaus.

In der Gerstenberg'schen Buchhandlung in Hildesheim sind in den Jahren 1837 und 1838 erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Elwert, Dr. W., Das Blutlassen, kritisch untersucht. Gr. 8. 12 Gr.

Klinckhardt, F. A., Das Recht der hildesheimischen katholischen Geistlichkeit, ohne Feiertlich-

keiten gültiger Weise leghwillig verfügen zu können, nebst Bemerkungen über die Testamentation der Geistlichen in andern deutschen Diöcesen. Mit 5 Anlagen. Gr. 8. 12 Gr.

Lünzel, H. A., Die ältere Diöcese Hildesheim. Mit 2 Karten. Gr. 8. 2 Thlr. 12 Gr.

Rauterberg, F. G., Predigten. Gr. 8. 20 Gr.

**Sander, A.**, Beiträge zur Kritik und Erklärung der griechischen Dramatiker. 1tes Hft. Beiträge zur Kritik und Erklärung des Sophokles und Euripides. Gr. 8. 12 Gr.

**Seffer, J. H. Ch.**, Hanoverscher Kinderfreund, als dritter Theil der ersten Leseübungen für Kinder. 5te Auflage. 8. 5 Gr.

**Traumann, F.**, Über die Befugniß zur unentgeltlichen Verabreichung homöopathischer Heilmittel nach den Gesetzen des Königreichs Hannover, erörtert in einer Vorstellung an das königliche Ministerium des Innern zu Hannover. Gr. 8. 8 Gr.

In **Karl Gerold's Buchhandlung in Wien** ist soeben erschienen und daselbst, sowie in allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

## Die Mauerwerks = Kunst in allen ihren Theilen.

Bearbeitet  
von  
**J. Andreas Romberg,**  
Architekt.

Mit 64 Kupfertafeln.  
Wien 1838.

4. In Umschlag broschirt. Preis 3 Thlr. Sächf.

Dem Vorworte des Herrn Verfassers zufolge ist dieses Werk nach Grundsätzen bearbeitet, welche diejenigen Anweisungen und Erläuterungen zu geben bezwecken, die dem angehenden Mauerer nöthig sind, um eine höhere praktische Ausbildung zu erlangen. Hierbei wurde aber auch auf die reinen Formen der griechischen Architektur die nöthige Rücksicht genommen, zu welchem Zwecke dem Werke Darstellungen beigelegt sind, die sich ganz dazu eignen, den Kunstsinne auf zweckmäßige Weise zu erwecken und zu erhöhen. Ubrigens ist durchaus die gehörige Stufenfolge beobachtet, so daß von den einfachsten Mauern zu den complicirtesten Werken der Mauerkunst fortgeschritten wird.

Die höchst sauber und sorgfältig gearbeiteten Kupfertafeln bieten hierbei die instructiven Anhaltspunkte dar, und bilden mit ihren deutlich und scharf dargestellten Erläuterungen einen sehr bequemen Leitfaden für das Ganze der Mauerwerkskunst.

Für die äußere Ausstattung ist von der Verlagsbuchhandlung auf das Beste gesorgt worden.

Bei **DuMont-Schauberg** in Köln sind neu erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

**Alhn, Dr. F.**, Praktischer Lehrgang zur schnellen und leichten Erlernung der französischen Sprache. 1ster Cours. 5te verbesserte Auflage. Brosch. 6 Gr.

**Annalen** der Freie-Hellanstalt zu Siegburg. Herausgegeben von Dr. M. Jacobi. 1ster Band. Broschirt. 1 Thlr. 16 Gr.

**Camphausen, L.**, Versuch eines Beitrages zur Eisenbahn-Gesetzgebung. Broschirt. 12 Gr.

In einer Kritik von gewichtigem Feder heißt es u. A.: „Möchte diese Schrift in die Hände aller Behörden, aller Vereine, und der Actionnaire, sowie aller der Vaterlandsfreunde gelangen, die sich für die vaterländischen Eisenbahn-Bauunternehmungen interessieren! Der Inhalt dieser Schrift ist

so lehrreich und anziehend, daß ein jeder Leser derselben über die gründliche Behandlung dieses so wichtigen Gesetzgebungsgegenstandes gewiß ganz befriedigt werden wird.“

**Heis, C.**, Sammlung von Beispielen und Aufgaben aus der allgemeinen Arithmetik und Algebra. Für Gymnasien, höhere Bürgerschulen und Gewerkschulen in systematischer Folge bearbeitet. 1 Thlr.

Diese „Sammlung“, die sich durch Neuheit und Reichhaltigkeit des Stoffes, durch systematische Anordnung und Stufenfolge, überhaupt durch gediegenen Inhalt und die umsichtigste Behandlung einen unbestreitbaren Vorzug vor der bekannten Sammlung von Meier zeigt, darf mit Recht Allen empfohlen werden, denen die Förderung des mathematischen Studiums am Herzen liegt.

**Reisebuch** für obere Classen in katholischen Elementarschulen. Bearbeitet von praktischen Schulmännern. (364 Seiten auf Druckvelinpapier.) 8 Gr.

**Löhr, M. J.**, Flora von Koblenz, nach dem natürlichen Systeme geordnet. Brosch. 1 Thlr. 4 Gr.

**Magerath, C.**, Meditationen eines rheinischen Katholiken über die sociale und nationale Seite der kölnener Frage. Eine Flugschrift. Broschirt. 8 Gr.

**Pietze, L.**, Die Fabrication des Papiers aus Stroh u. c. im Großen, nach zahlreichen Versuchen beschrieben und mit 160 Mustern bewiesen. Cartonmirt. 4 Thlr.

**Reinick, N.**, Nieder eines Malers mit Randzeichnungen seiner Freunde. Mit 30 Original-Abdrucken düsseldorfer Künstler. (Commissionsartikel.) Cartonmirt. Subscriptionspreis 5 Thlr.

## Botanik, für Freunde und Kenner derselben!!

Vollständig in drei Bänden, als classisch von allen Botanikern anerkannt, somit für den Botaniker von Fach als auch für den Freund der Botanik unentbehrlich, kann die dritte Auflage von

**J. C. Moessler's**  
**Handbuch der Gewächskunde.**  
Dritte Auflage

herausgegeben, vermehrt und verbessert

von  
**Dr. J. C. L. Reichenbach.**  
Gr. 8. 3 Bände. Altona, Hammerich. 6 Thlr. 18 Gr. nicht dringend genug empfohlen werden.

Dieses sichere, zuverlässige Handbuch hat bereits beim Studium der Gewächskunde sich als höchst praktisch bewährt, was wol nichts besser beweist, als die allgemeine Verbreitung desselben, wodurch es auch möglich wird, einen so billigen Preis zu stellen.

Sammtliche solide Buchhandlungen Deutschlands, Österreichs, der Schweiz u. c. haben dieses gediegene Werk stets vorräthig.

Soeben ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## Vom Ärger.

Ein Büchlein für Jedermann.

Mit einer Vorrede  
von Hofrath Dr. F. E. A. Heinroth.

Leipzig. Friedrich Fleischer. Preis 8 Gr.

Vom Literatur-Comptoir in Stuttgart ist durch alle Buch- und Kunsthandlungen, jedoch nur auf feste Bestellung, zu beziehen:

## Dr. D. S. Strauß,

Verfasser des „Leben Jesu“

Nach dem Leben gezeichnet von Schmidt, in Stahl gestochen von Karl Mayer.

## Goethe, im neunundzwanzigsten Jahre.

Nach May's Gemälde, 1779, in Stahl gestochen von Karl Mayer.

Beide Portraits in drei verschiedenen Ausgaben zu folgenden Preisen:

In Quart, chinesisches Papier, 1 Fl. 50 Kr. Rhein., oder 22 Gr.  
„ „ weißes Papier, 1 Fl. 12 Kr. Rhein., oder 13 Gr.  
In Großoctav — Fl. 48 Kr. Rhein., oder 12 Gr.

## J. Ch. Freih. v. Zedlig.

Lithographie in Quart,  
in nur vierzig Exemplaren abgedruckt.  
Preis 1 Fl. 21 Kr. Rhein., oder 20 Gr.

## Karten-Neze.

Von den durch W. Walter entworfenen und von dem königl. Provinzial-Schulcollegium den Gymnasien und Seminarien empfohlenen geographischen Nezen, zum Einzeichnen von Landkarten für den geographischen Unterricht, sind nun sechs: Europa, Spanien, Frankreich, Deutschland, Rheinpreußen, Preußen nebst Sachsen, in meinem Verlage erschienen. Daß sich diese Neze als höchst zweckmäßig für das Landkartenzeichnen bewähren haben, beweisen die gleich nach deren Erscheinen von vielen Gymnasien eingegangenen Bestellungen. Jedes Blatt sowie die Gebrauchsanweisung kostet nur 1 Sgr.

S. Hölcher.

Bei G. W. Leske in Darmstadt ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen, resp. Subscribenten versendet:

Des zweiten Bandes Erste Abtheilung

von  
Encyclopädisches Handbuch

## Maschinen- und Fabrikwesen

für  
Kameralisten, Architekten, Künstler, Fabrikanten  
und Gewerbetreibende jeder Art;

nach den  
besten deutschen, englischen und französischen Hülfsmitteln  
bearbeitet von

Karl Hartmann,

der Philosophie Doctor, herzogl. braunschweig. Bergcommissar, mehrerer Beleherten- und Gewerbevereine Mitgliede ic.

Enthaltend: die Gewinnung und Verarbeitung der Metalle.

Gr. 4. 43 Bogen Text mit 41 lithographirten Tafeln.  
Subscriptionspreis 5 Thlr. 8 Gr., oder 9 Fl. 36 Kr.

Zur Empfehlung dieses in jeder Beziehung ausgezeichneten Werkes noch etwas hinzuzufügen, hatten wir für überflüssig, da die 1ste und 2te Abtheilung des 1sten Bandes schon längere

Zeit dem Publicum übergeben sind und sich in zahlreichen Händen befinden.

Die gegenwärtig angekündigte Abtheilung wird noch mehr wie die frühern allen Anforderungen sowohl an innern Gehalt, als an äußere schöne und correcte Ausstattung vollkommen genügen.

Des ersten Bandes dritte Abtheilung, über Eisenbahnen, befindet sich unter der Presse und wird in wenigen Wochen vollendet sein.

## Musterblätter

von

## Maschinenzeichnungen

zum

Gebrauche für Mechaniker, Gewerbschulen und Gewerbevereine

von

Hector Kössler,

Secretair des Gewerbevereins und Lehrer an der höhern Gewerbschule zu Darmstadt.

## 3. weites Heft.

Inhalt: Balancier — Mittel zur Erzielung einer alternativ geradlinigen Bewegung — Centrische Schreiben — Regulator.

10 lithographirte Blätter mit 1 1/2 Bogen erläuterndem Text. Großfolio. Preis in Umschlag 2 Thlr., oder 3 Fl. 30 Kr.

Diese nicht nur jedem Mechaniker, sondern auch vorzüglich in Gewerbschulen als Vorleg- und Musterblätter dienlichen Zeichnungen haben sich durch äußerste Correctheit in hohem Grade den Beifall ausgezeichneter Sachkennner erworben.

Verhandlungen des Gewerbevereins für das Großherzogthum Hessen. Zweiter Jahrgang. 1stes Quartaleft mit 3 lithographirten Tafeln in Folio. 1838. Gr. 4. Preis 10 Gr., oder 45 Kr.

Bei mir erscheint:

## Plattdeutsches oder niederdeutsches Wörterbuch,

welches sowohl das ältere wie das gegenwärtige Niederdeutsche Norddeutschlands enthält, aus den ältern niederdeutschen Schriften und Urkunden, und aus dem gegenwärtigen Sprachgebrauche, sowie aus den bisher erschienenen niederdeutschen Glossarien zusammengestellt von Dr. J. G. E. Rosengarten, Professor zu Greifswald. 4.

G. U. Koch  
in Greifswald.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen: Allgemeine medicinische Zeitung. Herausgegeben von Dr. Karl Pabst. Jahrgang 1838. Monat März, oder Nr. 18—26. Gr. 4. Preis des Jahrgangs 6 Thlr. 16 Gr.

Allgemeine Bibliographie für Deutschland. Jahrgang 1838. Monat August, oder Nr. 31—35, und Bibliographischer Anzeiger: Nr. 31—35. Gr. 8. Preis des Jahrgangs 3 Thlr.

Leipzig, im September 1838.

J. A. Brockhaus.

## Ueber Gefängnisswesen.

Sieben sind erschienen und durch alle Buchhandlungen von uns zu beziehen:

Der zweite und dritte Band von

**De la Réforme des Prisons,**  
ou de la théorie de l'emprisonnement, de  
ses principes, de ses moyens, et de ses  
conditions d'application;

par

**Mr. Charles Lucas.**

Paris. In-8. Preis aller 3 Bände 8 Thlr.

De la Réforme des Prisons, par *Léon Faucher.*  
Ein Band in 8. Paris. 2 Thlr.

Leipzig, im September 1838.

**Brochhaus & Wvenarius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

Im Verlage der Buchhandlung des Waisenhauses  
in Halle ist erschienen und durch alle Buchhandlungen des  
In- und Auslands zu erhalten:

Müller, J. H. T. (Director des Realgymnasiums zu  
Gotha), Lehrbuch der Mathematik für Gymnasien  
und Realschulen, nebst vielen Übungsaufgaben und  
Excursen. Gr. 8. 1 Thlr. 16 Gr. (1 Thlr. 20 Sgr.)

Vorstehendes Lehrbuch enthält in stufenweiser Fortschreitung  
vom Leichtern zum Schweren in 15 Abschnitten die Hauptlehren  
der gesamten allgemeinen und deskriptiven Arithmetik. Dabei  
ist fortwährend auf den innern Zusammenhang der einzelnen  
Sätze, wie sie auf den drei Rednungsstufen wiederkehren, Rück-  
sicht genommen.

Der Recensent in der A. Lit.-Zeitung, 1838, Nr. 103—105,  
schließt die kritische Beurtheilung dieses Lehrbuchs mit folgenden  
Worten:

„Alle Vorzüge jedoch des vorliegenden Buches einzeln an-  
zuführen gekostet der Raum nicht, daher begnügt sich Rec.  
dasselbe besonders jedem Lehrer aufs dringendste zu empfehlen.  
Er findet in höchst zweckmässiger Anordnung eine sehr große  
Menge Materials, das er zum Theil noch für sich selbst wird  
benutzen können, zum Theil auch nach dem jedesmaligen Stand-  
punkte seiner Schüler das für sie Passende herauszuwählen. Aber  
auch für den von der Schule abgegangenen Schüler, der sich  
ganz dem Studium der Mathematik widmen will, ist es ein  
zweckmäßiges Handbuch, um das ganze Gebiet der Mathematik,  
so weit diese in den Kreis der Schule gehört, nochmals als ein  
ordentliches System zu übersehen und sich zu den Vorträgen  
auf der Universität tüchtig vorzubereiten.

Rec. scheidet von dem Verf. mit dem Wunsche, daß er dem  
Tabel, den Rec. mitunter ausgesprochen, nichts Anderes zum  
Grunde lege als die freundschäffliche Absicht, ihn darauf auf-  
merksam zu machen, was wol bei einer neuen Auflage, die das  
Buch seiner Gelegenheit und Brauchbarkeit wegen recht bald  
verdrängt, geändert werden könnte. Zunächst aber möge der Verf.  
ellen, den versprochenen zweiten Band, welcher die geometrische  
Abtheilung der Elementar-Mathematik enthalten soll, ehestens  
nachzuliefern. Denn wenn dieser ebenso trefflich wie der vorlie-  
gende arithmetische Theil bearbeitet wird, so verdient das  
Ganze unbedingt den Vorzug vor allen bisher be-  
kannten Schulbüchern dieses Fachs.

Papier und Druck sind zu loben.“

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und an alle  
Buchhandlungen verandt worden:

**Die orientalische Cholera**  
in München und an andern Orten.

Von

**Dr. Ramppold.**

Gr. 8. Preis 1 Thlr. 16 Gr., oder 2 Fl. 42 Kr.

Die Tenenz dieser Schrift ist die, einestheils eine Beschrei-  
bung der münchner, durch die prophylaktische Behandlungs-  
weise ausgezeichneten Epidemie, anderentheils ein Bild der Cho-  
lera im Großen, wie sie sich bisher in den näher bekannt ge-  
wordenen Epidemien gezeigt hat, zu geben. Sie enthält daher  
das Ergebniß eigner Beobachtung jener Epidemie, und eine  
Zusammenstellung der von jener abweichenden Erscheinungen,  
welche andere Epidemien dargeboten haben. Ebenso soll sie  
eine kurze kritische Zusammenstellung der wichtigsten unter den  
mannichfachen bisher bekannt gewordenen Betrachtungs- und  
Behandlungsweisen der Cholera geben, und grade durch diese  
Zusammenstellung und Vergleichen in Verbindung mit der  
Sichtbeobachtung der Krankheit so leichter auf ein möglichst  
richtiges Urtheil über dieselben zu gelangen.

Obgleich sich somit die gegenwärtige Schrift von den bis-  
her über die Cholera erschienenen bedeutend unterscheidet, und  
insofern wol nicht außer der Zeit sein möchte, als die Beobach-  
tung der Choleraepidemien an so vielen verschiedenen Orten ein  
sehr großes, aber bis jetzt wenig verarbeitetes Material aufgesam-  
let hat, mußte doch die bedeutende Zahl der schon vorhandenen  
Cholerachriften zu möglichst kürze in Abfassung der gegen-  
wärtigen bestimmen, und es wurde deshalb mit möglichstster Um-  
gebung des vielen Theoretisirens, wozu die Brechruhr Anlaß  
gab, hauptsächlich nur das Factische festgehalten.

Wenn auch schon eine andere umfassende und besonders  
mehr das locale umfassende Beschreibung der münchner Epide-  
mie erschienen ist, so wird dadurch die gegenwärtige Schrift  
gewiß nicht überflüssig, wol aber konnte der Verf. durch Be-  
nutzung des über jene Epidemie schon Erschienenen sich um so  
mehr vergewissern, daß ihm keine bedeutendere Erscheinung,  
welche sie bot, entgangen sei.

Stuttgart und Tübingen, im August 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

## Die Erzbischöfe von Köln und Posen.

Darstellung der welthistorischen Bedeutung der  
katholischen Frage in Preußen. Von Anton  
Graf von \*, Domcapitular im Hohen Me-  
tropolitancapitel zu \*. Leipzig, S. Müller.

Unter diesem Titel ist eine höchst merkwürdige Beurtheilung  
der katholischen Frage erschienen, welche den frommsten Katho-  
liken befriedigt, da der Verfasser für einen hochgestellten Geist-  
lichen gehalten wird, der nicht fürchtet für seine Kirche zum  
Wärter zu werden. Andere halten diese geistreiche Schrift für  
eine hochstaple Satire gegen die Hierarchy, und die Beamten  
wollen die Antündigung in manchen Ländern nicht erlauben,  
weil nicht alle Maßregeln der Regierung blindlings gelobt wer-  
den. Man ist sehr gespannt zu erfahren, welchen Zweck der  
Verfasser bei dieser merkwürdigen Erscheinung gehabt hat.

N. 17.

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:  
Altdeutsche Blätter von **Moritz Haupt** und  
**Heinrich Hoffmann.** Zweiten Bandes erstes  
und zweites Heft. Gr. 8. 1 Thlr. 4 Gr.

Der 1ste Band, aus 4 Heften bestehend, kostet 2 Thlr. 4 Gr.  
Leipzig, im September 1838.

**J. A. Brochhaus.**



# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXXI.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brochhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

## W. Heinsius' Bücher-Lexikon. Achter Band.

In meinem Verlage ist jetzt vollständig erschienen:

### Allgemeines deutsches Bücher-Lexikon,

oder Vollständiges alphabetisches Verzeichniß derjenigen Schriften, welche in Deutschland und in den angrenzenden, mit deutscher Sprache und Literatur verwandten Ländern gedruckt worden sind. Mit ausführlichen Angaben der Verleger, Druckorte, Preise, Auflagen, Jahrezahlen, Formate, Bogenzahlen, artistischen Belagen und vielen buchhändlerischen und literarischen Nachweisungen, Angaben der anonymen und pseudonymen Schriftsteller u.

Bearbeitet und herausgegeben  
von

Otto August Schulz.

Erster Band,

die von 1828 bis Ende 1834 erschienenen Schriften enthaltend. Zwei Abtheilungen.

Gr. 4. (125 Bogen.) 10 Thlr. 12 Gr.

Der Verf. begnügte sich nicht allein, vom Jahre 1828 ausgehend, die Ergebnisse der Literatur mit größter Genauigkeit nachzutragen und sich den früheren Bänden von Heinsius' Bücher-Lexikon genau anzuschließen, sondern er machte durch stete Nachweisungen über die früheren Theile band- oder lieferungsweise erschienener Schriften, durch literarische Notizen und Berichtigungen den Anfang zu einem neuen Werk. An Sorgfalt und Genauigkeit übertrifft dieser Band gewiß seine Vorgänger und wird nicht allein dem praktischen Gebrauche des Buchhändlers vollkommene Genüge leisten, sondern auch Bibliothekaren, Bibliographen, Literaten und Bücherfreunden ein bequemes und sicheres Hülfsmittel bieten.

Die früheren Bände des „Allgemeinen Bücher-Lexikons“ von Heinsius, 1812–29, habe ich im Preise von 37 Thlr. auf Zwanzig Thaler ermäßigt; auch einzelne Bände sind zu billigen Preisen zu erhalten.

Leipzig, im September 1838.

F. A. Brochhaus.

Von der  
**Central-Bibliothek** der Literatur, Statistik und Geschichte der Pädagogik und des Schulunterrichts im In- und Auslande. Herausgegeben von  
**Dr. H. G. Brzoska**, Professor in Jena.  
Ist das Juni- und Juliheft an die respectiven Abonnenten versandt, und geben wir hierunter die Inhaltsanzeigen beider Hefte:

Inhalt des Juniheftes.

**A. Literatur:** Familienbriefe über Erziehung, von Madame Guizot.

**B. Statistik:** 1) Über die Grundverhältnisse und die Schranken der pädagogischen Kunst. Von F. E. Beneke. 2) Das Schulwesen des Grossherzogthums Hessen, dargestellt von Dr. E. Schaumann. (Drittes Stück: Gymnasien.)

**C. Geschichte:** Kurzer Überblick der historischen Entwicklung des Volksunterrichts in den Niederlanden. (Klein.)

Inhalt des Juliheftes.

**A. Literatur:** 1) Ein praktischer Blick auf christliche Erziehung der Kinder im frühesten Alter. Von Thomas Babington. 2) Ansichten über Erziehung und Unterricht in gelehrten Schulen. Von Dr. J. G. E. Fohtisch. 3) Ein Wort zur Empfehlung gymnastischer Übungen. 4) Dahlmann: Vom Universitätswesen.

**B. Statistik:** 1) Schulen in den transkaukasischen Provinzen Russlands. Die Schulen Sibiriens. (Nach Alex. von Krusenstern.) 2) Die neueste königl. bairische Verordnung über die Universitätsstudien und insbesondere über das Studium der allgemeinen Wissenschaften. 3) Correspondenznachrichten: a) Fr. Thiersch und die grossherzoglich hessischen Gelehrtenschulen. b) Preussen: Verordnung die Verleihung des Prädicats Oberlehrer betreffend. c) Niederlande.

**C. Geschichte:** Die Akademien der Araber und ihre Lehrer. Nach Auszügen aus Ibn Schohba's Classen der Schafiten bearbeitet von Ferdinand Wüstenfeld, Dr. der Philosophie und Assessor der philosophischen Facultät. Zur hundertjährigen Stiftungsfeier der Academia Georgina Augusta. Göttingen, bei Vandenhoeck und Ruprecht. 1837. (6. Flügel.)

**D. Journalistik:** I. Deutsche Journale. 1) Pädagogische. 2) Nichtpädagogische. II. Ausländische Journale. 1) Französische. 2) Holländische. 3) Italienische. 4) Nordamerikanische.

A. Pädagogisch-Wissenschaftliches.

Häusliche Erziehung. 1. 2. 3. 4. — Schul- und Unterrichtswesen im Allgemeinen: Über den guten Geist einer Schule 5. — Über die Unzweckmässigkeit der öffentlichen Belohnungen und Preisvertheilungen 6. — Über den Einfluss der Sprachlehre auf den Religionsunterricht 7. — Über den deutschen Gesangunterricht in Schulen 8. — Gymnasien: Classisches Heidenthum und die Bibel 9. — Anforderungen an ein Lesebuch fremder Sprache für Schulen 10. — Über den propädeutischen Unterricht in der Philosophie 11. — Volksschulwesen und Elementarunterricht: Sittliche Wirksamkeit der Volksschule 12. — Über die wechselseitige Schuleinrichtung 13. — Lesunterricht 14. — Über die hohe Wichtigkeit, die rechte Kenntniss der schönen Kunst unter die Anforderungen an den Lehrer einer niedern Schule aufzunehmen 15. — Was ist für einen Schullehrer notwendiger, dass er gut schreiben (aufsetzen) oder dass er gut sprechen könne? 16. — Seminare: Ist es zweckmässiger, dass die Seminaristen zusammen in Einem Seminargebäude oder einzeln in Privathäusern wohnen? 17. — Hauslehrerleben: Über das Hauslehrerleben der Candidaten der evangelischen Theologie 18. — Taubstummen- und Blindeninstitute: Einfluss der Religion auf Taubstumme 19. — Dürfen Blinde auch in den gewöhnlichen Volksschulen unterrichtet werden? 20. — Volksbildung im All-

gemeinen: Mitwirkung edler Frauen zur Belehrung des Volks 21.

#### B. Statistisches.

I. *Deutsche Länder*: Landschulwesen im Herzogthum Sachsen-Gotha 22. — Baden 23. — Westfalen: Schulen in Minden 24. — Hannover: Schullehrerverein 25. — II. *Ausland*: Bericht des Ministers des Innern über den Zustand der hohen, mittlern und niedern Schulen im Königreiche der Niederlande fürs J. 1835. 26. — Dergleichen für das J. 1836. 27. — Dänemark: Über das Universitätswesen nach X. *Marmier* 23. — Turnübungen in dem dänischen Herzogthume 29. — Norwegen: Kleinkinderschule zu Drontheim u. s. w. 30. — Frankreich: Überblick des öffentlichen Unterrichts in Frankreich seit dem J. 1791 bis jetzt 31. — Belege für den Mangel an Erkenntniß von der Wichtigkeit der Verbesserung des Schulwesens in den Kammern 32. — Über die sogenannten kleinern Seminarier 33. — In den Kammern werden ungentliche Musikschulen in dem Hauptmittelpunkte der Bevölkerung verlangt. — Das Theater soll zur Volksbildung beitragen 34. — Elementarlehrer sollen künftighin auch für den Gesangunterricht examinirt werden 35. — Gesangunterricht in den pariser Volksschulen 36. — Über die Kinder in den Fabriken 37. — Findlingshäuser 38. — Toulon: Neue Katheder für das Verwaltungswohl 39. — Prüfungen der Candidaten für das Elementarlehrerdiplom in der Sorbonne 40. — Italien: Über die Volkserziehung daselbst 41. — Statistische Übersicht der Zunahme des Elementarschulwesens in der Lombardei von 1822—32. 42. — Elementarschulen in der Lombardei 1832—33. 34. 35; 43. — Statistische Übersicht der Elementarschulen im venetianischen Gebiete im J. 1834—35; 44. — Israelitische Kleinkinderschule zu Livorno 45. — Zunahme der Schulen des gegenseitigen Unterrichts in der Welt 46. — Taubstummenanstalten in Europa und Nordamerika 47. — Nordamerika: Neuengland: Districtschullehrer ohne eigene Wohnung 48. — Hass gegen öffentliche Schulen in Massachusetts 49. — Lehrerseminar in Plymouth 50. — Seminare für Lehrerinnen 51. — Newburgh am Hudsonflusse: ein Arzt als Vorsteher einer Knaben-erziehungsanstalt 52. — Providence in St.-Rhode-Inland: Vorschlag in Betreff der Obliegenheiten des Vorstehers einer öffentlichen Schule 53. — Georgien: Neuer Plan zur Anlegung öffentlicher Schulen 54. — Marietta: Gesangunterricht soll in den Schulen eingeführt werden 55. — Dedham 56. — Keene 57. — Boston 58. 59. — Sandwichsinseln: Missionsanstalten 60.

#### C. Historisches.

Biographien: S. *Girolamo Mioni* 61. — *Girolamo Tugliazucchi* 62. — *Ottavio Assarotti* 63. — *Walter Scott* 64. — *Owen* 65. — F. W. *Klump* 66.

#### D. Vermischtes.

Von 67—73.

**Intelligenzblatt** Nr. 1.

Halle, im August 1838.

**C. A. Schwetschke und Sohn.**

In der Unterzeichneten sind erschienen und in allen Buchhandlungen zu erhalten:

**Ansichten von Rügen**, Zeichnung von Brüggemann, Stahlstich von Frommel und Winkles. 2te Lieferung. Bobbin, Harthasee und Stubbenkammer. 12 Gr. Illuminirt 1 Thlr. 6 Gr.

(Die erste, 1837 erschienene Lieferung enthält: Arccona, Königsstuhl und uhm.)

**Blume, Dr. H.**, Anleitung zum Übersetzen aus dem Lateinischen in das Griechische für obere Gymnasialclassen. 2te sehr verbesserte und vermehrte Auflage. 18 Gr.

**Hofelberg, Ch. v.**, Zwei Tage in Dänemark. Geh. 4 Gr.

**Krauthoff, Samigow, v.**, Beitrag zur Kunde der Pferdezeit Neu-Vorpommerns. Geh. 8 Gr.

**Schneider, Dr. O.**, De Veterum in Aristophanem scholiorum fontibus. 16 Gr.

Übersicht der unregelmäßigen griechischen Verba. 6 Gr.  
C. Löffler'sche Buchhandlung in Stralsund.

Sieben ist folgende Schrift erschienen:

#### *Die untrüglichen*

### **Heilkräfte der Natur.**

Dargestellt in

*Auszügen aus den medicinischen Geheimschriften*

der

königlichen Leibärzte, Oberstaatsräthe

**Drs. Le Roi und St. Pierre Le Clerc.**

Extrahirt durch

**Heinrich Karl Rudolf Huch**

in Braunschweig.

Erster Band. Gr. 8. Altona, Hammerich, 1838.

1 Thlr. 12 Gr.

Dies interessante Werk enthält nicht nur die Krankheits- und fast wunderbare Heilungsgeschichte des Herausgebers, welcher durch seltsame Fügungen des Schicksals in dem Besitze der handschriftlichen Überlieferungen der beiden auf dem Titel angegebenen berühmten Männer gelangte, und diese nun — der leidenden Menschheit zum Nutzen und Troste — den Ärzten aber zur richtigen und unparteiischen Prüfung — dem Drude übergeben hat; sondern auch höchst interessante Skizzen aus dem Leben der beiden genannten Veteranen der Arzneiwissenschaft, woraus wol hinlänglich erhellt, auf welchen dunkeln und unrichtigen Wegen die meisten practicirenden Ärzte bisher zu ihrem Ziele strebten. Der geneigte Leser wolle das kurze Vorwort nicht überfliegen!

Sämmtliche solide Buchhandlungen Deutschlands u. haben Exemplare vorrätig.

Bei Wih. Engelmann in Leipzig ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

### **Der fahrende Poet.**

#### *Dichtungen*

von

**Karl Beck.**

8. Brosch. 1 Thlr. 18 Gr.

Der junge Dichter ist dem Publicum durch seine frühern Poesien „Nächte; gepanzerte Lieder“ schon bekannt. Diese neue und vollendete Dichtung, die in vier Gesänge abgetheilt ist, hat die Überschriften: Ungarn, Wien, Weimar, Goethe's Haus (im Goethe'schen Hause geschrieben), Die Wartburg.

Bei L. C. Kehr in Kreuznach sind erschienen:

**J. C. A. Stiegler**, 192 Epigramme und Madrigale, 10 Gesellschaftslieder und 80 Denksprüche. 8. 12 Gr.

**L. C. Kehr**, Hundert Confirmationscheine. Neues Testament. Dritte Auflage. 4. 20 Gr.

**Nachstehende auf Kosten der französischen Regierung** gedruckte Werke, welche nicht im Buchhandel sind, können zu den beigefügten Preisen von uns bezogen werden:

**Demetz**, Lettre sur le système pénitentiaire, à MM. les membres du conseil général du département de la Seine. In-8. (2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Bog.) Paris, 1838. 8 Gr.

**Moreau-Christophe, L. M.**, De l'état actuel de la réforme des prisons de la Grande-Bretagne. In-8. (22 Bog.) Paris, 1838. 2 Thlr. 16 Gr.

Etats de population, de culture et de commerce des colonies françaises, pour 1836, avec le complément des états de 1835. In-8. (5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Bog.) Paris, 1838. 16 Gr.

Notices statistiques sur les colonies françaises imprimées par ordre de Mr. le vice-amiral de Rosamel, ministre secrétaire d'état etc. 2 vols. Gr. in-8. (33 Bog.) Paris, 1837—38. 4 Thlr. 12 Gr.

**Tupinier, B.**, Rapport sur le matériel de la marine présenté à Mr. le vice-amiral de Rosamel, ministre secrétaire d'état etc. Gr. in-8. (29 Bog.) Paris, 1838. 4 Thlr. 12 Gr.

Compte-rendu des travaux des ingénieurs des mines pendant l'année 1837. In-4. (17 Bog.) Paris, 1838. 4 Thlr.

Rapports à Mr. le comte de Montalivet, pair de France, ministre secrétaire d'état etc. sur les pénitenciers des Etats-Unis, par MM. **Demetz & A. Blouet**. Petit in-folio. (65 Bog, 45 lithogr. Tafeln.) Paris, 1837. 8 Thlr.

Tableau de la situation des établissements français dans l'Algérie, précédé de l'exposé des motifs et du projet de loi portant demande de crédits extraordinaires etc. 2 vols. Gr. in-4. (55 Bog., 3 Karten.) Paris, 1838. 17 Thlr. 12 Gr.

Tableau décennal du commerce de la France avec ses colonies et les puissances étrangères, publié par l'administration des douanes. 1827 à 1836. 1e part. Gr. in-4. (48 Bog.) Paris, 1838. 3 Thlr. 8 Gr.

Statistique de la France, publiée par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce. (Commerce extérieur.) Gr. in-4. (69 Bog.) Paris, 1838. 8 Thlr.

Leipzig, im September 1838.

**Brockhaus & Wenarijus,**

Paris für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

Von Joh. Ambr. Barth in Leipzig ist zu beziehen:

Description d'une collection de minéraux, formée par Mr. **Henri Heuland** et appartenant à Mr. Ch. Hampden Turner de Rooksnest; par **A. Levy**. 3 Vol. gr. in-8. avec un Atlas de 83 planches gr. in-4. 18 Thlr.

## Vollendete Herausgabe.

Das

## Sauslexikon,

vollständiges Handbuch praktischer Lebenskenntnisse für alle Stände.

Unter Mitwirkung vieler Gelehrten und Praktiker  
herausgegeben von

**G. Th. Fehner,**

ordentlichem Professor der Physik zu Leipzig.

8 Bände in Verkon-Octav, 441 Bogen enthaltend. Mit erläuterten Holzschnitten und Steindrucktafeln.

Subscriptionspreis 12 Thlr. Sächs., oder 21 Fl. 36 Kr. Rhein.

Dieses Werk, dessen Inhalt durch Prospekte und Anzeigen hinlänglich bekannt ist, liegt jetzt in seiner Vollständigkeit als ein

### Universalwerk für das Haus

zur Benützung vor. Es macht als solches eine unzählige Menge kostspieliger einzelner praktischer Werke entbehrlich, und ist selbst die

### vollständigste und wohlfeilste Bibliothek für jeden Haushalt.

Zur Erleichterung der Anschaffung lassen wir den Subscriptionspreis von 12 Thälern für das Ganze noch einige Zeit bestehen, und haben zugleich die Einrichtung getroffen, daß das Sauslexikon auch bandweise, in monatlichen Lieferungszeiten, der Band zu 1 Thlr. 12 Gr., oder 2 Fl. 42 Kr. Rhein., durch jede Buchhandlung bezogen werden kann.

Leipzig, im Juli 1838.

Breitkopf und Härtel.

In der **Jos. Vindauer'schen** Buchhandlung in München ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Das

## Lied der Nibelungen

aus

dem altdeutschen Original übersezt

von

**Joseph von Ginsberg.**

Vierte verbesserte Auflage mit 6 Kupfern.

Gr. 8. Elegant cartonnirt. Preis 2 Fl. 9 Kr., oder 1 Thlr. 5 Gr. Sächs.

Das Erscheinen einer 4ten Auflage bürgt hinlänglich für den Werth dieser Übersetzung, welche sich in dieser Auflage noch besonders durch ihre elegante Ausstattung empfiehlt.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

**Dr. Wilhelm Harnisch.**

Die wichtigsten neuern

## Land- und Seereisen,

für die Jugend und andere Leser. 16 Theile. Mit Kupfern und Karten. 8. Leipzig, bei Gerhard Fleischer. Preis geb. 12 Thlr. 6 Gr. Sächs. Auch find alle Theile einzeln zu haben.

Dieses Werk, welches allgemeinen Beifall und Aufnahme gefunden, enthält das Wichtigste und Interessanteste aus mehr als 50 der vorzüglichsten Reisen der neuern Zeit, und gewährt durch Auswahl und Darstellung nicht nur eine sehr belehrende, sondern auch höchst anziehende Lecture.

In Karl Gerolds's Buchhandlung in Wien  
ist soeben erschienen und daselbst, sowie in allen Buchhandlungen  
Deutschlands zu haben:

## Gnomonik,

oder

### Anleitung zur Verferti gung aller Arten

von

## Sonnenuhren.

Von

**J. J. von Littrow,**

Director der Sternwarte und Professor der Astronomie an der  
k. k. Universität in Wien, Ritter des k. russ. St.-Anna-Ordens  
zweiter Classe, Mitgliede mehrer gelehrten Gesellschaften.

Zweite, gänzlich umgearbeitete Auflage.

Mit zwei Kupfertafeln.

Wien 1838.

Gr. 8. In Umschlag brochirt. Preis 12 Gr. Sächsl.

Diese zweite Auflage unterscheidet sich wesentlich von der  
ersten in Beziehung auf Inhalt und Vortrag. Die eine Abthei-  
lung der gegenwärtigen Schrift ist für Leser aller Stände be-  
stimmt, und zeigt, wie man auch ohne mathematische Vorkennt-  
nisse und ohne alle Rechnung eine Sonnenuhr auf jeder gegebenen  
Stelle vorzeichnen kann, während die andere Abtheilung, für  
mit der Analyse mehr bekannte Leser, die Theorie dieses in-  
teressanten Gegenstandes enthält.

In der Unterzeichneten ist erschienen und durch alle Buch-  
handlungen zu beziehen:

## Repertorium bibliographicum,

in quo libri omnes ab arte typographica inventa  
usque ad annum MD.

typis expressi ordine alphabetico vel simpliciter enume-  
rantur vel auctoritas recensentur.

Opera

**Ludovici Hain.**

Voluminis II. pars II.

P—Z.

Gr. 8. Preis auf Schreibpapier 5 Thlr. 16 Gr., oder  
10 fl. Druckpapier 5 Thlr., oder 8 fl. 48 Kr.

Wir freuen uns, die Beendigung eines Werkes anzeigen  
zu können, das seiner Natur nach, bei der unbeschreiblich mühsa-  
men Ausarbeitung, nur langsam vordrücken konnte, und zu-  
letzt durch den während des Drucks der vierten Abtheilung ein-  
getretenen Tod seines Verfassers für längere Zeit unterbrochen wor-  
den war. Die Erscheinung desselben wird besonders in dem gegen-  
wärtigen Zeitpunkt, der so reich an Fortschritten über den Ur-  
sprung und Fortgang der Buchdruckerkunst ist, ebenso willkom-  
men sein, als sie einem längst gefühlten dringenden Bedürfnis  
auf eine durchaus befriedigende Weise abhilft. So herrlich und  
einzig in seiner Art Panzer's unsterbliches Werk über die  
Drucke des 15ten Jahrhunderts basteht, so sind doch seitdem  
so viele ihm unbekant gebliebene Drucke erschienen an das Licht  
gezogen, andere genauer und gründlicher beschrieben worden,  
dass eine möglichst vollständige Aufzählung derselben, mit be-  
sonnener Benützung der in reichem Maß vorliegenden Hülfsmittel,  
ein schon oft ausgesprochener Wunsch der zahlreichen Freunde  
der Literatur und Bucherkunde war. Dieser Wunsch ist in dem  
Hain'schen Repertorium auf eine so vollkommene Art erfüllt  
worden, wie sie nur deutschem, von den günstigsten äußern

Umständen unterstütztem Fleisse möglich werden konnte. Der  
Zugang zu der an alten Druckwerken so ungemein reichen  
münchener Bibliothek, die Benützung der wichtigsten, in neuerer  
Zeit im In- und Auslande erschienenen Kataloge, wie z. B.  
des Spencer'schen, und anderer literarischen Schriften, die Mit-  
theilungen vieler gelehrten Freunde setzten den Verfasser in den  
Stand, an unzahligen Stellen die Panzer'schen Angaben zu  
berichtigen und zu vervollständigen und so ein Werk zu liefern,  
welches in seiner Gattung Epoche machen und die Bucherkunde  
in weit höherem Grad als alle früher erschienenen fördern wird.  
Wir dürfen daher dieses Repertorium mit vollem Rechte als ein  
jedem Bücherfreund und Bibliothekar unentbehrliches Hülfsmittel  
empfehlen, das man selbst bei dem Besitze der Panzer'schen  
Annalen nothwendig haben muß, indem es nicht nur eine mit  
der größten Umsicht und Sorgfalt bearbeitete Ergänzung zu  
den von Panzer aufgestellten Artikeln darbietet, sondern außer  
ungemein vielen bei diesen fehlenden Drucken alle in deutscher  
Sprache erschienenen umfasst, welche von dem Plane der Pan-  
zer'schen Annalen gänzlich ausgeschlossen waren.

Stuttgart und Tübingen, im August 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**

Allen Freunden und Verehrern des um die Pferdezuucht und  
Chirurgie neubende hochverdienenden Herrn Major's von Ten-  
neder wird es eine angenehme Nachricht sein, wenn sie er-  
fahren, dass dieser würdige Veteran sich entschlossen hat, unter  
dem Titel:

## Erinnerungen aus meinem Leben.

Zum Theil Studienbilder

für

Cavalerieoffiziere, Stallmeister, Bereiter, Pferde-  
ärzte, Pferdezüchter, Pferdehändler und jeden Ken-  
ner und Freund der Pferde

von

**S. von Tennecker.**

8. Altona, Hammerich. Erster Band. Geh. 1 Thlr.  
Ein Werk herauszugeben, welches die Erfahrungen seines viel-  
bewegten Lebens enthalten soll. Der erste Band ist be-  
reits erschienen, und in sämtlichen Buchhandlungen  
Deutschlands, Oesterreichs, der Schweiz und Dänemarks zu haben.

Um Concurrenz zu vermeiden, zeige ich an, daß ich mit  
einer deutschen Uebersetzung der **Recherches géogra-  
phiques sur les Ruines de la Morée par**  
**M. E. Pailton Roblaye** (Paris 1835) beschäftigt bin.  
Königsberg in Preußen, im August 1838.

Dr. Hermann Vobrick.

Bei dem Unterzeichneten ist in Commission erschienen und  
in allen Buchhandlungen zu erhalten:

**Fingerzeige Gottes in göttlichen Offen-  
barungen für einer Sonnambule himm-  
lischen und irdischen Heil. Von L. v.**

**S. Gr. 8. Geh. 16 Gr.**

Die fromme Verf. bietet einen gewiß sehr merkwürdigen  
Beitrag zur Geschichte des Sonnambulismus, indem sie sich ge-  
drungen fühlte, die Offenbarungen ihres magnetischen Schlafes  
selbst schriftlich aufzuzeichnen. Der Ertrag ist zu ei-  
nem wohlthätigen Zwecke bestimmt.

Leipzig, im September 1838.

**F. A. Brockhaus.**

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXXII.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei G. A. Brochhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

## Verzeichniss

der  
auf der königl. vereinten Friedrichs-Universität  
**Halle - Wittenberg** im Winter-  
Halbjahre vom 22ten October 1838 bis 23sten  
März 1839 zu haltenden Vorlesungen und der  
öffentlichen akademischen Anstalten.

### A. Vorlesungen.

#### I. Theologie.

*Encyclopädie und Methodologie des theologischen Studiums* trägt Hr. Cons.-Rath Tholuck vor. — *Die Literaturgeschichte der Kirchenschriftsteller* lehrt Hr. Cons.-Rath Thilo. — *Einleitung in die kanonischen und apokryphischen Bücher des A. T.*, verbunden mit einer Anleitung zu der Kritik und Hermeneutik, trägt Hr. Cons.-Rath Gesenius vor. — Von Büchern des A. T. werden erklärt: *das Buch Hiob* vom Hrn. Cons.-Rath Gesenius; *die Psalmen* vom Hrn. Prof. Rödiger; *die Weissagungen des Jesajas* und *die historischen Bücher* vom Hrn. Dr. Tuch. — *Das Leben des Apostel Paulus* erzählt Hr. Cons.-Rath Tholuck. — Von Büchern des N. T. werden erklärt: *das Evangelium, die Briefe des Johannis* (in lateinischer Sprache) und *die Apostelgeschichte* vom Hrn. Prof. Wegscheider; *den Brief an die Römer* erklärt Hr. Cons.-Rath Tholuck; *die Briefe an die Korinther* und *den Brief an die Hebräer* Hr. Prof. Niemeyer. — *Exegetisch-homiletisch-apologetische Vorträge über die Parabeln Jesu Christi* hält Hr. Prof. Marks. — *Der christlichen Religions- und Kirchengeschichte ersten Theil* lehrt Hr. Prof. Dähne; derselben zweiten Theil (von Gregor VII. bis auf unsere Zeiten) Hr. Cons.-Rath Thilo. — *Die Geschichte der scholastischen Theologie* trägt Hr. Prof. Dähne vor. — *Dogmatische und symbolische Theologie* lehrt Hr. Prof. Wegscheider nach der VII. Ausg. seiner *Instit. theol. dog.* — *Biblische Theologie*, verbunden mit *Interpretation der dicta classica V. et N. T.*, Hr. Prof. Fritzsche (in lat. Sprache). — *Christl. Moral* lehrt Hr. Cons.-Rath Tholuck. — *Pastoraltheologie* trägt Hr. Prof. Marks vor. — *Homiletik und Geschichte derselben* lehrt Hr. Prof. Franke. — *Theoretisch-praktische homiletische Übungen* veranstaltet Hr. Prof. Marks. — *Katechetik* trägt Hr. Prof. Fritzsche vor. — *Liturgik in Verbindung mit liturgischen Übungen und Geschichte des Rituals der evangelischen Kirche* trägt Hr. Prof. Marks vor.

Im königl. theologischen Seminarium leitet Hr. Cons.-Rath Gesenius *die Übungen der Exegese des A. T.* und Hr. Prof. Wegscheider *in der des N. T.*; Hr. Cons.-Rath Tholuck *die Übungen der dogmatischen*, Hr. Cons.-Rath Thilo *die der historischen Abtheilung*; Hr. Prof. Marks *die homiletischen und liturgischen*, und Hr. Prof. Fritzsche *die katechetischen Übungen der Seminaristen*. *Übungen im Interpretiren des N. T.* leitet Hr. Prof. Fritzsche. — *Examinatorien und Repetitorien über Dog-*

*matik* hält Ebenderselbe; *über Kirchengeschichte* Hr. Prof. Dähne. — *Ein Repetitorium über Jesaja und Hiob* hält Hr. Prof. Rödiger in lateinischer Sprache, verbunden mit *praktischen Übungen*.

#### II. Jurisprudenz.

*Encyclopädie und Methodologie der Rechtswissenschaft* trägt Hr. Hofrath Henke vor. — *Institutionen und Geschichte des römischen Rechts* lehrt Hr. Prof. Pernice. — *Die Geschichte des römischen Rechts* lehrt auch Hr. Dr. Pfotenbauer. — *Die Pandekten* trägt Hr. Hofgerichtsrath Pfotenbauer vor; *Pandekten in Verbindung mit dem Erbrechte* Hr. Prof. Witte; *das Erbrecht* Hr. Dr. Pfotenbauer. — *Exegetische Vorträge über das 28. Buch der Pandekten* hält Hr. Prof. Witte. — *Deutsches Privatrecht* lehren die Herren Prof. Laspeyres und Wilda. — *Handelsrecht* trägt Hr. Prof. Dieck vor; *Landwirthschaftsrecht* Hr. Prof. Wilda. — *Preussisches Landrecht* lehrt Hr. Prof. Witte. — *Lehnrecht* trägt Hr. Prof. Dieck vor. — *Katholisches und protestantisches Kirchenrecht* lehrt Ebenderselbe. — *Europäisches Völkerrecht* trägt Hr. Prof. Pernice vor. — *Das öffentliche Recht des deutschen Bundes und der Bundesstaaten* lehrt Hr. Prof. Wilda. — *Preussisches Staatsrecht* trägt Hr. Prof. Pernice vor; auch liest Derselbe *über ausgewählte Lehren des Privat-Fürstenrechts*. — *Gemeines und preussisches Criminalrecht* trägt Hr. Hofrath Henke vor. — *Gemeines und preussischen Civilprocess* lehrt Hr. Hofgerichtsrath Pfotenbauer. — *Den summarischen und den Concursprocess* trägt Hr. Prof. Laspeyres vor. — *Gerichtliche Arzneikunde* lehrt Hr. Prof. Hohl.

*Übungen in der juristischen Praxis* leitet Hr. Hofgerichtsrath Pfotenbauer; *Examinatorium über Criminalrecht* hält Hr. Hofrath Henke.

Hr. Geh. Justizrath Schmeltzer ist, seiner Gesundheit wegen, auch für dieses Halbjahr von Haltung der Vorlesungen entbunden.

#### III. Medicin.

*Medicinische Encyclopädie und Methodologie*, verbunden mit dem ersten Theile der vergleichenden Anatomie, trägt Hr. Prof. d'Alton vor. — *Die Geschichte der Medicin* lehrt Hr. Prof. Friedländer. — *Exegetische Vorträge über Celsus*, verbunden mit einer *Geschichte der alten Chirurgie*, hält Hr. Dr. Rosenbaum. — *Medicinische Anthropologie* trägt Hr. Prof. Hohl vor. — *Semiotik* lehrt Hr. Dr. Rosenbaum, auch liest Derselbe *über syphilitische Krankheiten*, nach seinem Lehrbuche. — *Osteologie, Syndesmologie, Myologie, Angiologie, Neurologie*, sowie *die Lehre von den Organen der Sinne*, trägt Hr. Prof. d'Alton vor. — *Allgemeine Pathologie und Therapie* lehrt Hr. Geh. Medicinalrath Krukenberg. — *Pathologie und Therapie der Verdauungsorgane* trägt Ebenderselbe vor. — *Die Krankheitsgeschichte der Urimerkzeuge, Geschlechtstheile, des Rückenmarks, Gehirns, innern und äussern Sinnes* trägt Ebenderselbe vor. — *Allgemeine und specielle Chirurgie* lehrt Hr. Prof. Blasius. — *Die Lehre vom chirurgischen Verband* trägt Ebenderselbe vor; auch liest Derselbe *über Knochenbrüche und Verrenkungen*. — *Theorie und Praxis der Geburtshülfe* lehren die

Herren Prof. Niemeyer und Hohl; auch liest Letzterer über die Krankheiten der Kinder. — *Pharmakologie* trägt Hr. Prof. Friedländer und Hr. Dr. Krahmer vor; auch liest Letzterer über den Gebrauch der Bäder. — *Die Rezeptirkunst* lehrt Hr. Prof. Friedländer. — *Die officinellen Pflanzen in der preussischen Pharmakopöe* erläutert Hr. Prof. von Schlechtendal und Hr. Dr. Sprengel.

*Praktische Übungen in der Zergliederungskunst* veranstaltet Hr. Prof. d'Alton. — *Die medicinisch-klinischen Übungen* lehrt Hr. Geh. Medicinalrath Krukenberg. — *Chirurgisch-klinische und ophthalmiatische Übungen* lehrt Hr. Prof. Blasius. — *Praktische Übungen in der Entbindungskunst* lehrt Hr. Prof. Niemeyer in der akademischen Entbindungsanstalt, und Hr. Prof. Hohl. — *Die Übungen der Mitglieder des pharmaceutischen Instituts* leitet Hr. Prof. Schweigger.

*Examinatorien und Repetitorien* halten Hr. Geh. Medicinalrath Krukenberg und die Herren Prof. Niemeyer und Hohl, sowie die Herren Dr. Rosenbaum und Dr. Krahmer.

#### IV. Philosophie und Pädagogik.

*Allgemeine Geschichte der Philosophie* lehrt Hr. Prof. Hinrichs. — *Die Geschichte der Philosophie seit Kant* lehrt Hr. Dr. Schaller. — *Einleitung in die Philosophie, Logik und Metaphysik* trägt Hr. Dr. Schaller vor. — *Die Lehre vom menschlichen Geist (Anthropologie und Psychologie)* trägt Hr. Prof. Erdmann vor. — *Anthropologie und Psychologie* lehrt Hr. Dr. Ruge. — *Psychologie* trägt Hr. Prof. Hinrichs vor. — *Naturphilosophie* lehrt Ebenderselbe. — *Fundamentalphilosophie* trägt Hr. Prof. Gerlach vor. — *Über die Logik der Aristoteles, als Einleitung in das logische Studium*, liest Hr. Prof. Erdmann. — *Logik* trägt Hr. Prof. Gerlach vor. — *Ästhetik* lehrt Hr. Dr. Ruge. — *Rhetorik* trägt Hr. Geh. Hofrath Gruber vor. — *Ethik und Religionsphilosophie* lehrt Hr. Prof. Gerlach. — *Religionsphilosophie und comparative Religionslehre* trägt Hr. Prof. Erdmann vor. — *Religionsphilosophie* Hr. Prof. Ulrich; auch liest Derselbe über den Begriff und Ursprung der Sünde.

*Die Übungen der Mitglieder im königl. pädagogischen Seminarium* leitet Hr. Prof. Niemeyer.

#### V. Mathematik.

*Algebra* lehrt Hr. Prof. Rosenberger. — *Die Lehre von den algebraischen Gleichungen* trägt Hr. Prof. Gartz vor. — *Analytische Geometrie* lehrt Hr. Prof. Sohneke. — *Ebene und sphärische Trigonometrie* trägt Hr. Prof. Rosenberger vor. — *Die Integralrechnung* lehrt Hr. Prof. Sohneke; auch liest Derselbe über die Kreisheilung. — *Die Differentialrechnung mit vorangeschickter Einleitung in die Analysis des Unendlichen* lehrt Hr. Prof. Gartz; auch trägt Derselbe die Lehre von den Kegelschnitten vor. — *Analytische Mechanik* trägt Hr. Prof. Rosenberger vor.

#### VI. Naturwissenschaften.

*Die Urgeschichte der Physik* erzählt Hr. Prof. Schweigger. — *Experimentalphysik* trägt Hr. Prof. Kämtz vor; auch liest Derselbe über Meteorologie. — *Chemie* trägt Hr. Prof. Schweigger nach Döbereiner's und Mitscherlich's Lehrbüchern vor. — *Allgemeine Naturgeschichte* lehrt Hr. Prof. Burmeister. — *Mineralogie* trägt Hr. Prof. Gernar nach seinem Lehrbuche vor; auch liest Derselbe über einzelne Gegenstände aus dem Gebiete der gesamten Mineralogie, verbunden mit Demonstrationen und Aufgaben zu besondern Untersuchungen. — *Den zweiten Theil der Botanik mit Erläuterung der natürlichen Familien und der officinellen Pflanzen der preussischen Pharmakopöe* trägt Hr. Prof. von Schlechtendal vor; auch liest Derselbe über die Ordnungen der Kryptogamen, sowie über die Doldengewächse. — *Die Pflanzen der preussischen*

*Pharmakopöe* erläutert Hr. Dr. Sprengel. — *Naturgeschichte des Menschen* trägt Hr. Prof. Burmeister vor. — *Die allgemeine Naturgeschichte der Thiere* lehrt Hr. Dr. Buhle nach seinem Handbuche.

*Physikalische und chemische Experimentirübungen im akademischen Laboratorium* leitet Hr. Prof. Schweigger mit besonderer Rücksicht auf die Mitglieder seines physikalisch-chemischen Seminars, welche Derselbe auch zu Übungen in physikalischen Vorträgen veranlassen wird. — *Examinatorien und Repetitorien über das Gesamtgebiet der Philologie* hält Hr. Dr. Sprengel.

#### VII. Staats- und Kameralwissenschaften.

*Nationalwirthschaftslehre* trägt Hr. Prof. Eiselen vor. — *Von der Pflege des öffentlichen Wohlstandes* handelt Ebenderselbe. — *Forsttechnologie* trägt Hr. Dr. Buhle vor; auch liest Derselbe über den ökonomischen Nutzen der Hausthiere.

#### VIII. Historische Wissenschaften.

Über die *Samothrakischen Mysterien* liest Hr. Prof. Schweigger nach seiner „Einleitung in die Mythologie auf dem Standpunkte der Naturwissenschaft“. — *Den ersten Theil der Universalgeschichte* trägt Hr. Prof. Leo nach seinem Lehrbuche vor. — *Über das Kriegswesen der Römer und Griechen* liest Hr. Generalmajor Dr. von Hoyer. — *Die Geschichte der römischen Päpste* trägt Hr. Geh. Hofrath Voigtel vor. — *Über das Leben Mohammed's und dessen Lehre* liest Hr. Prof. Rödiger. — *Neuere Geschichte seit dem westfälischen Frieden* trägt Hr. Dr. Röppell vor. — *Preussische Geschichte seit dem Tode des grossen Kurfürsten* erzählt Ebenderselbe. — *Statistik der europäischen Staaten* lehrt Hr. Prof. Eiselen.

*Die Übungen der historischen Gesellschaft* leitet Hr. Geh. Hofrath Voigtel.

#### IX. Philologie und neuere Sprachkunde.

##### a) Classische Philologie: griechische und römische Literatur.

*Allgemeine philosophische und historische Einleitung in die Sprachwissenschaft* trägt Hr. Prof. Pott vor. — *Über die griechischen und lateinischen Historiker* liest Hr. Prof. Raabe. — *Die Geschichte der griechischen Literatur* trägt Hr. Prof. Bernhardt vor. — *Römische Alterthumskunde* lehrt Hr. Prof. Meier. — *Von Werken griechischer Schriftsteller* werden erklärt: die *Bacchen des Euripides* vom Hrn. Prof. Bernhardt; *Platon's Apologie des Sokrates* vom Hrn. Prof. Raabe; *Sophokles Oedipus auf Kolonos* vom Hrn. Dr. Stäger. — *Von Werken lateinischer Schriftsteller* werden erklärt: die *Satiren des Horaz* vom Hrn. Prof. Meier; *Catull's Gedichte* vom Hrn. Prof. Pott.

*Im königl. philologischen Seminarium* werden die Mitglieder im Interpretiren, Disputiren und Lateinschreiben von den Herren Prof. Meier und Bernhardt unterrichtet und geübt, und zwar hat Ersterer die Sitten-schilderungen des Theophrast, Letzterer das zweite Buch der Oden des Horaz zur Erklärung bestimmt.

##### b) Morgenländische Sprachen.

*Die syrische Sprache* lehrt Hr. Prof. Rödiger nach seiner Chrestomathie. — *Die Metrik der arabischen Sprache* trägt Hr. Dr. Tuch vor; auch setzt Derselbe die Übungen seiner hebräischen Gesellschaft fort. — *Sanskritsprache* nach Bopp's Grammatik lehrt Hr. Prof. Pott.

##### c) Neue abendländische Sprachen.

*Die italienische Grammatik* trägt Hr. Prof. Blanc vor. — *Sprechübungen im Italienischen und Portugiesischen* leitet Hr. Hofrath Hollmann. — *Die italienische, spanische und holländische Sprache* lehrt Hr. Hofrath Hollmann; auch erläutert Derselbe Calderon's „Das Leben

ein Traum<sup>c</sup>. — Die Geschichte der *dramatischen Literatur* in Frankreich trägt Hr. Prof. Blanc vor. — Die *englische Sprache* lehrt Hr. Hofrath Hollmann; auch erbetet sich Derselbe zum *Privatunterricht in Griechischen, Lateinischen und Hebräischen*. — *Grammatik der ältern deutschen Sprache* lehrt Hr. Prof. Leo; auch erläutert Derselbe *Wackernagels altheutisches Lesebuch*.

### X. Schöne und gymnastische Künste.

*Geschichte, Theorie und Technik der Malerei* lehrt Hr. Prof. Weise; auch liest Derselbe über die *Anwendung der Perspektive in der Landschaftsmalerei*. — *Theoretischen und praktischen Unterricht im Zeichnen und Malen* ertheilen die akademischen Zeichenlehrer Hr. Schumann und Hr. Herschel. — Die *Geschichte der Kirchenmusik* trägt Hr. Musikdirector Dr. Naue vor; auch unterrichtet Derselbe im *Kirchengesange*. — *Den Generalbass* lehrt Ebenderselbe, und erbetet sich zugleich zu *Privatunterricht in der Musik*.

Die *Reitkunst* lehrt Hr. Stallmeister André. — *Unterricht in der Fechtkunst* ertheilt Hr. Fechtmeister Urban. — Die *Tanzkunst* lehrt Hr. Tanzmeister Wehrhahn.

### B. Öffentliche akademische Anstalten.

I. *Seminarien*: 1) *theologisches*, unter Oberaufsicht der theologischen Facultät; 2) *pädagogisches*, unter Direction des Hrn. Prof. Niemeyer; 3) *philosophisches*, unter Direction der Herren Prof. Meier und Bernhardt. — 4) *Historische Gesellschaft*, unter Direction des Hrn. Geh. Hofrath Voigtel. — 5) *Pharmaceutisches Institut*, unter interimistischer Direction des Hrn. Prof. Schweigger. — II. *Klinische Anstalten*: 1) *medizinische Klinik*, unter Direction des Hrn. Geh. Medicinalrath Krukenberg; 2) *chirurgisch-ophthalmiatrie Klinik*, unter Direction des Hrn. Prof. Blasius; 3) *Entbindungsanstalt*, unter Direction des Hrn. Prof. Niemeyer. — III. Die *Universitätsbibliothek* wird, unter Aufsicht des Hrn. Oberbibliothekar Geh. Hofr. Voigtel und des Hrn. Bibliothekar Prof. Pernice, Mittwochs und Sonnabends von 1—3 Uhr, an den übrigen Wochentagen von 10—12 Uhr geöffnet. — IV. Die *akad. Kupferstichsammlung*, unter Aufsicht des Hrn. Prof. Weise, ist Dienstags und Sonnabends von 1—2 Uhr geöffnet. — V. Die *archäologische Sammlung* des thüringisch-sächsischen Vereins zeigt Hr. Bibliotheksecretair Dr. Förstemann auf Verlangen. — VI. *Anatomisches Theater und anatomisch-zoologisches Museum*, sowie die *Meckelschen Sammlungen*, unter Direction des Hrn. Prof. d'Alton. — VII. *Physikalisches Museum und chemisches Laboratorium*, unter Direction des Hrn. Prof. Schweigger. — VIII. *Sternwarte*, unter Aufsicht des Hrn. Prof. Rosenberger. — IX. Das *mineralogische Museum* ist, unter Aufsicht des Hrn. Prof. Gernar, Donnerstags und Freitags von 2—4 Uhr geöffnet. — X. *Botanischer Garten und Herbarium*, unter Direction des Hrn. Prof. von Schlechtendal. — XI. Das *zoologische Museum* ist, unter Aufsicht des Hrn. Prof. Burmeister und Hrn. Inspector Dr. Buhle, Mittwochs von 1—3 Uhr geöffnet.

In der Büchlerischen Verlagsbuchhandlung in Ebersfeld ist erschienen:

Lorenz, R., Dr., Die allgemeine Geschichte der Völker und ihrer Cultur. Ein Handbuch. Der erste Theil: Allgemeine Geschichte der Völker des Alterthums und ihrer Cultur. Gr. 8. 1 Thlr. Der zweite Theil: Die allgemeine Geschichte der Völker des Mittelalters und ihrer Cultur bis auf Karl V. Gr. 8. 1838. 1 Thlr. 8 Gr.

Der dritte Theil, die neue Geschichte enthaltend, erscheint im November. Nähere Anzeigen über den Werth der erschienenen

Bände, enthält die Literarische Zeitung, Berlin 1838, Nr. 4; Allgemeine Schulzeitung, Darmstadt 1837, Nr. 192, 1838, Nr. 64; Gelios, 1838, Nr. 17.

Lorentz, R., Dr., De rebus sacris et artibus veterum Tarentinorum. 4maj. 1837. 8 Gr.

Lorentz, R., Dr., Veterum Tarentinorum res gestae. 4. 1838. 8 Gr.

In Carl Gerold's Buchhandlung in Wien ist soeben erschienen und daselbst, sowie in allen Buchhandlungen Deutschlands, zu haben:

## Darstellung

# Knochenbaues

und der

## Muskeln

des

menschlichen Körpers,

mit

Angabe der Verhältnisse desselben, auf zehn Kupfertafeln.

Von

Joh. Mart. Fischer,

Nath und Prof. der Anatomie und Bildhauerkunst an der k. k. Akademie der vereinigten bildenden Künste zu Wien.

Folio. Wien 1838. In Umschlag broschirt.

Hiermit ist verbunden:

Eben desselben Verfassers:

## Erklärung

der

# anatomischen Statue

für

## Künstler.

Dritte durchaus verbesserte und vermehrte Auflage.

8. Wien 1838. In Umschlag broschirt, zusammen 2 Thlr. Säch.

Dieses Werk, obgleich seit einer Reihe von Jahren an der wiener Akademie der bildenden Künste dem Unterrichte in der Anatomie zur Grundlage dienend, kommt gleichwohl jetzt erst in den Buchhandel, und die Verlagsbuchhandlung glaubt sich durch die neue Auflage desselben den Dank des sich für den Gegenstand interessirenden Publicums um so mehr zu erwerben, da das Werk nach dem Urtheile der competentesten Männer des Faches das beste in seiner Art ist.

Durch alle Buchhandlungen ist von uns zu beziehen:

## Collection

des principaux monumens  
d'architecture Bisantine, Gothique etc. de la France.

Publié par

J. A. DETHAN.

1<sup>re</sup> livraison. Gr. in-Fol. 6 Fr.

Leipzig, im September 1838.

Brockhaus & Wennerius,

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)



Interessante Erscheinungen für Freunde der italienischen Literatur:

**Manoscritti inediti di Torquato Tasso** ed altri pregevoli documenti per servire alla biografia del medesimo, posseduti ed illustrati dal Conte **Mariano Alberti** e pubblicati con incisioni e fac-simili per cura di Romualdo Gentilucci e C. Fasc. 1—3. Fol. Lucca 1837. 7 Thlr. 8 Gr. (Die Hefte 4—6 sind unterwegs.)

**Enciclopedia storica ovvero storia universale** comparata e documentata. Opera originale italiana di **Cesare Cantù**. Dispense 1—30. 8vo gr. Torino 1838. 4 Thlr. 9 Gr.

Dieses, aus der Feder eines der berühmtesten italienischen Schriftsteller unserer Zeit geflossene Originalwerk erscheint in 3 Abtheilungen:

**Racconto**, den erzählenden Theil der Geschichte enthaltend, wovon der 1ste Band complet vorliegt.

**Documenti** in 2 Unterabtheilungen:

**Schiarimenti e note**, wovon bis jetzt 7, und

**Cronologia**, wovon 3 Hefte, jedes zu 2 Bogen, erschienen sind.

Da im erzählenden Theile oft auf die Schiarimenti e note, sowie auf die Cronologia hingewiesen wird, so werden diese 3 Abtheilungen gleichzeitig ausgegeben. Die Fortsetzung folgt regelmäßig, und Prospective stehen auf Verlangen gratis zu Diensten.

Ich empfehle zugleich mein reiches und gewähltes Lager italienischer Literatur und erbiete mich zu möglichst schneller Beforgung aller auf demselben nicht vorrätigen Werke.

**Friedrich Volke's** Buchhandlung in Wien.

## PENÉLOPE.

Taschenbuch für das Jahr 1839. 28ster Jahrgang.

Herausgegeben von **Th. Sell**.

Mit Beiträgen von **W. Alexis**, **Bernard v. Guft**, **G. Mathat**, **Kilzer**, **W. v. Lüdemann**, **S. Mosen**, **M. Wogl**, **Fr. Voigts** u. m.; nebst Portraits der **Victoria** mit Facsimile, nach Vogel von Vogelstein; Erzherzogin **Sophie**, nach Kriehuber; **Hm. Neumann-Haigin** ger von Kreuzbauer und andern Scenen in Stahlstich. 16. Leipzig, **Sinrichs**. Prachtausgabe 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Thlr.

In gepressten Decken 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Thlr.

Dieser so elegante als gehaltvolle Almanach ist eben an alle Buchhandlungen versandt.

Für Romanleser und Leihbibliotheken.

Sorben ist erschienen:

## Die Memoiren des Teufels.

Frei nach dem Französischen

des  
**Frédéric Soulié**

von  
**Julius Schuppe.**

2 Bände. 8. Altona, Hammerich. Geh. 3 Thlr.

Die Memoiren des Teufels haben, wie bekannt, in Frankreich ein ganz außerordentliches Aufsehen erregt. Eine neue Auflage nach der andern erscheint, und stets wächst das Interesse an dieses so sehr unterhaltende Werk, welches in einer fließenden Übersetzung hiermit der deutschen Lesewelt übergeben.

Sämmtliche solide Buchhandlungen und Leihbibliotheken haben dies ausgezeichnete Werk vorrätig.

Dr. Friedrich Wilhelm Rittberg,

## Die christlichen Heilslehren,

nach den Grundfragen der evangelisch-lutherischen Kirche, apologetisch dargestellt und entwickelt.

Gr. 8. 18<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Bogen. 1 Thlr. 12 Gr.

erschieden in meinem Verlage und ist in allen Buchhandlungen zu haben. Das theologische Publicum wird diesen Resultaten der Forschungen eines unserer geschäftigsten Theologen über Ursprung der Menschheit, Sünde, Erbsünde, Prädestination, Erlösung, Heilordnung, Gnadenmittel u. s. w. seine volle Anerkennung nicht versagen.

**Joh. Ambr. Barth** in Leipzig.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

## Das Pfennig-Magazin für Kinder.

1838. Juli. Nr. 27—30.

Nr. 27. \*Die Kinderzeit. Wer Andern eine Grube gräbt, fällt oft selbst hinein; ein morgenländisches Geschichtchen. \*Diez, Mies und Mies. Aufgepaßt. Der Schüze und die Spähen. \*Die Kränekte. Auflösung der Räthsel im vorigen Monat. — Nr. 28. \*Man kommt nicht immer mit der Angst davon. \*Der Comersee. Von dem Heringsfange. Der weiße Hirsch, von Umland. \*Noch etwas von den Ermiten. Räthsel. — Nr. 29. \*Die Kiegissen. \*Die Himmelfahrt Christi und die Apokal. Tüchtige Gastfreundschaft. \*Der gemeine Feigenbaum. — Nr. 30. \*Der Narr. Ein türkisches Mittagessen. \*Die große amerikanische Harpye. Eine Löwenjagd. \*Die Mauerkrone. Räthsel.

Die mit \* bezeichneten Aufsätze enthalten eine oder mehrere Abbildungen.

Preis dieses Jahrgangs von 52 Nummern 1 Thlr. — Der erste bis vierte Jahrgang kosten ebenfalls jeder 1 Thlr.

Leipzig, im September 1838.

**J. A. Brockhaus.**

Druck und Verlag von **J. A. Brockhaus** in Leipzig.

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXXIII.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brochhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

In meinem Verlage sind erschienen und in allen Buchhandlungen vorrätig:

## Kaiser und Papst.

Roman

von

Eduard Duller.

Vier Theile.

8. Geh. 5 Thlr. 18 Gr.

## Ideal und Wirklichkeit.

Von

Adolfine.

8. 1 Thlr. 6 Gr.

Leipzig, im September 1838.

F. A. Brochhaus.

Im Verlage von Joh. Ambr. Barth in Leipzig ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## ΑΝΕΚΔΟΤΑ.

Tomus I.

Athanasii Scholastici Emiseni de Novellis Constitutionibus imperatorum Justiniani Justinique commentarium, anonymique scriptoris περί διαφόρων ἀνυπογράφων: item fragmenta commentariorum a Theodoro Hermopolitano, Philoxeno, Symbatio, anonymo scriptore de Novellis Constitutionibus imperatoris Justiniani conscriptorum. Ex codicibus manuscriptoris qui Bononiae, Florentiae, Lutetiae Parisiorum, Mediolani, Oxonii, Romae, Vindobonae reperiuntur editit, in latinum sermonem transtulit, prolegomenis, annotatione critica, indicibus instruxit

G. E. Heimbach.

4maj. 50% Bogen. 5 Thlr. 12 Gr.

Dies Werk, die Frucht einer mehrjährigen literarischen Reise des Verfassers durch Frankreich und Italien, hofft um so mehr eine wohlwollende Aufnahme beim juristischen Publicum in Anspruch nehmen zu dürfen, da es dazu bestimmt ist, für die ebenso schwierige als bisher vernachlässigte Kritik und Interpretation der Justinianischen Novellen neue, bisher ungedruckte Quellen zu eröffnen. Indem ich auf die vielen neuen Resultate der Forschungen in der

Urgeschichte der Justinianischen Rechtsbücher, welche der Verfasser in den Prolegomenen niedergelegt hat, aufmerksam mache, bemerke ich zugleich, dass dies Werk auch für das griechische und russische Kirchenrecht von Bedeutung ist, da die ersten Titel des Athanasischen Novellencommentars in das *νεκρογ* des Phokianischen Nomocanon und von da in die *Kormczaja Kniga* übertragen worden sind.

## Der Delphin für 1839

ist soeben erschienen und in ganz Deutschland zu haben.

Die rege Theilnahme, mit welcher das gebildete Publicum den 1sten Jahrgang des Delphins aufgenommen, die allgemeine Zufriedenheit mit dem höchst interessanten Inhalte, lassen nicht daran zweifeln, daß die eben erschienene Fortsetzung des Almanachs in der deutschen Lesewelt freudig willkommen heißen werden wird.

## Der Delphin,

ein Almanach auf das Jahr 1839.

Herausgegeben

von

Theodor Mundt.

Mit Stahlstichen. 8. Altona, Hammerich. Elegant gebunden. 1 Thlr. 12 Gr.

Inhalt: Die Komödie der Reigungen, von Th. Mundt. Aale, Novelle von der F. v. B. Skollen, von Dr. Mises. Protestantische Bilder aus Böhmen, von Th. Mundt. Der Gefangene am Kaukasus, von Puschkin. Das Bildniß der George Sand.

Sämmtliche solbte Buchhandlungen in ganz Deutschland, Osterreich, der Schweiz u. s. w. haben den Delphin für 1839 vorrätig.

## Einladung zur Subscription!

## Galerie

Der denkwürdigsten Staatsmänner

des 18. und 19. Jahrhunderts,

welche ihre irdische Laufbahn vollendet haben.

Von \*\*\*\*\*.

Dieses Werk, das über 125 einzelne Biographien umfaßt, kann sogleich zum Druck befördert werden, sobald sich eine hinreichende Anzahl Subscribenten, deren Namen demselben vorgebrucht werden, gefunden hat. Der Subscriptionspreis ist auf 1 Thlr. 12 Gr. angesetzt, und es nehmen alle Buchhandlungen, von denen auch ein ausführlicher Prospectus gratis zu beziehen ist, darauf Bestellungen an.

Ludwig Schreck in Leipzig.

Interessante Neuigkeit für Theologen.  
Sobald ist erschienen:

**Predigten**  
über  
**den ersten Brief des Johannes**  
in seinem  
**innern Zusammenhange.**

Von  
**J. C. G. Johannsen,**  
Doctor der Theologie und Philosophie,  
Hauptprediger an der deutschen St.-Petri-Kirche zu Kopenhagen.  
Ritter des Dannebrog-Ordens.  
2 Bände. Gr. 8. Altona, Hammerich, 1838. 3 Thlr.

Die geistreichen Schriften des gelehrten und als Kanzelredner **hochberühmten** Herrn Verfassers haben auch in Deutschland die ehrenvollste Anerkennung gefunden. Die vorstehende Predigtsammlung wird um so mehr dazu beitragen, den hohen Ruf des mit seltenem Geiste ausgestatteten Herrn Dr. Johannsen noch mehr in Deutschland zu verbreiten und zu befestigen, als dieses Werk den glänzendsten Beweis von den außerordentlichen Talenten desselben liefert, welches wir daher nicht dringen genug allen Theologen zur gefälligen Beachtung empfehlen können.

Sämmtliche Buchhandlungen Deutschlands, Frankreichs, der Schweiz und Dänemarks haben Exemplare vorrätzig.

**E. L. Bulwer**  
**Complete Works**  
Leipzig, Frederik Fleischer

- Vol. XIV. Ernest Maltravers.  
Vol. XV. Alice or the Mysteries a sequel to Maltravers.  
Vol. XVI. Leila or the Siege of Granada — Calderon the Courtier — The lady of Lyons — The duchess of la Valiere.

sind kürzlich erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben.

Subscriptionspreis eines jeden Bandes 1 Thaler.

In der Schulz'schen Buchhandlung zu Hamm erschien soeben und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

**Weigen, F. W.,** Systematische Beschreibung der bekannten europäischen zweiflügeligen Insekten. Siebenter Theil, oder Supplementband. Mit 8 Steintafeln. Gr. 8. Subscriptionspreis mit schwarzen Tafeln 3 Thlr. 12 Gr. Mit illuminirten Tafeln 5 Thlr. 21 Gr.

Seit dem im Jahre 1830 erschienenen sechsten Bande dieses Werkes hat der unermüdete Verfasser eine Menge neuer Arten theils selbst gesammelt, theils von andern Liebhabern dieses Faches zugesandt erhalten, so daß dadurch Stoff zu beträchtlichen Nachträgen vorhanden war. Manche der früher von ihm aufgestellten Gattungen bedurften einer genaueren Revision und einiger Berichtigung. Besonders aber erforderte die zahlreiche Abtheilung der Zapharinen einer genaueren Darstellung und Zerlegung in mehrere Gattungen. Zwar haben einige französische Entomologen diese Zerlegung zum Theil schon vorgenommen, aber in Rücksicht auf die Darlegung der Gattungsmerkmale noch unendlich Vieles zu wünschen übrig gelassen. Der Verfasser des gegenwärtigen Werkes ist daher bemüht gewesen, diese Schwierigkeiten durch genaue Untersuchung an natürlichen Exemplaren möglichst zu beseitigen und feste Kennzeichen anzugeben, wodurch das Studium dieser interessanten Geschöpfe ungemein erleichtert wird. Die Verlagsbuchhandlung empfiehlt daher diesen siebenten

und letzten Band dieses in seiner Art einzigen Werkes allen Liebhabern der Naturgeschichte, besonders ist solches den Besitzern der früheren Bände ganz unentbehrlich, weil solche dadurch erst die gewünschte Vollständigkeit erhalten, insofern dieselbe vermahlen gesichert werden kann.

Der Subscriptionspreis erlischt mit Ablauf des Jahres 1838, und tritt alsdann der Ladenpreis von 4 Thlr. und resp. 7 Thlr. ein.

Bei uns sind soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen Deutschlands zu beziehen:

**Aristophanis Comoediae**  
et

**perditarum fragmenta, ex nova recensione Guilelmi Dindorf.**  
**Accedunt Menandri et Philemonis fragmenta auctiora et emendatiora.**  
**Graece et latine cum indicibus.**

Pars I. Lexikon: Octav. Broschirt. 2 Thlr.

Die zweite Abtheilung erscheint bis Ende September d. J.

Der Inhalt dieser trefflich ausgestatteten Ausgabe ist noch weit vollständiger und correcter als der, welcher in Oxford erschienen. Die Sammlung der Bruchstücke ist umfassender und zum ersten Male ins Lateinische überföhrt.

Dasselbe gilt von Menander, denn mehr als 100 Verse dieses Dichters sind in dieser Ausgabe enthalten, welche, bis jetzt unbekannt, die schöne Arbeit bereichern, deren sich Hr. Meineke unterzogen.

Aristophanes bildet den zweiten Band der Bibliotheca scriptorum Graecorum, deren erster Homeri Carmina enthält und 5 Thlr. 8 Gr. kostet.

Unter der Presse befindet sich:

**Xenophontis Opera,**

welche ebenfalls einen Band bilden, mit beglegener lateinischer Übersetzung des Textes und reichhaltigem Index.

Paris, den 1sten September 1838.

**Firmin Didot freres et Comp.**

**Kerner's Seherin.**

3te Auflage.

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden:

Die

**Seherin von Prevorst,**

Eröffnungen über das innere Leben des Menschen und über das Hereintragen einer Geisterwelt in die unsere.

Mittheilung von

**Augustus Kerner.**

Dritte Auflage. Mit 8 Steintafeln.

Preis 2 Thlr. 12 Gr., oder 4 Fl.

„Wenn (schreibt ein tüchtiger Mann) diesem merkwürdigen Buche eine seiner ganzen Tendenz mehr oder weniger entgegen-

stehende frühere Erziehung und Geistesbildung nicht vollkommenen Eingang in alle Gemüther verschaffen konnte, so hat es doch überall ein tiefes Eingehen in sich selbst befördert, eine Menge Fragen im Innern hervorgerufen, und den Blick auf Regionen des menschlichen Geistes und Gemüthes hingezogen, die früher entweder gänzlich unbeachtet blieben, oder doch kaum eines leichtfertigen oder wol gar verächtlichen Seitenblickes gewürdigt wurden."

Von demselben Verfasser sind früher erschienen:

## Eine Erscheinung

aus dem

## Nachtgebiete der Natur

durch

eine Reihe von Zeugen gerichtlich bestätigt und den Naturforschern zum Bedenken mitgetheilt

von

**Dr. Justinus Kerner,**

Oberamtsarzt zu Weinsberg.

8. Preis 1 Thlr., oder 1 Fl. 30 Kr.

Diese Schrift enthält die authentischen Actenstücke und Zeugnisse über ein Phänomen, das dem Naturforscher und jedem denkenden Menschen von hohem Interesse sein muß. Dieselben zeigen aufs Klarste, daß dieses Phänomen nicht auf Betrug beruhte, und daß nur Diejenigen, in deren System ein solches nicht paßt, auf dieser irrigen Meinung beharren können. Es sind in dieser Schrift aber einzig nur Actenstücke und Zeugnisse, durchaus keine Theorie, gegeben, und dabei nur einige andere ähnliche Phänomene zur Vergleichung mit diesem aufgeführt. Name und Auslegung dieses Phänomens ist jedem Forscher freigestellt, und der Herausgeber dieser Zeugnisse für dasselbe will Keinem den Glauben aufdringen, als seien solche Phänomene durchaus nichts Anderes als ein Einwirken Verstorbener auf noch Lebende, obgleich derselbe dabei auch frei bekennt, daß wenigstens er der Zeit noch keine andere genügende Auslegung dieser Phänomene weiß, da auch die gewöhnlichen Auslegungen und Theorien der magnetischen Erscheinungen (die dem Herausgeber, wie sich von selbst versteht, auch schon längst sattfam bekannt sind) auf diese Phänomene keine Anwendung finden.

## Nachricht

von dem

## Vorkommen des Besessenseins,

eines dämonisch-magnetischen Leidens,

und

einer schon im Alterthum bekannten Heilungsweise durch magisch-magnetisches Einwirken,

in einem

Sendschreiben an den Herrn Obermedicinalrath Dr. Schelling in Stuttgart.

Von

**Dr. Justinus Kerner,**

Oberamtsarzt zu Weinsberg.

8. Preis 9 Gr., oder 36 Kr.

In diesem Sendschreiben gibt der Verfasser eine bloß praktische Darstellung des ihm schon öfters vorgekommenen Leidens des Besessenseins. Er zeigt, daß dieses Leiden ein dämonisch-magnetisches ist und in sich dadurch von Manie und Epilepsie unterscheidet, und grade dieses seines magnetischen Charakters wegen am süßlichsten nur auf magisch-magnetischem Wege, wie es schon das frühe Alterthum und auch Exorcisten des vorigen Jahrhunderts heilten, geheilt werden kann. Er gibt

eine Reihe specieller Fälle aus seinen Erfahrungen an, in denen auf solchem Wege Hülfe geleistet wurde, nachdem die gewöhnlichen ärztlichen Mittel alle fruchtlos geblieben waren.

## Die Dichtungen

von

**Justinus Kerner.**

Neue vollständige Sammlung in Einem Bande.

8. Velinpapier. Brochirt. 2 Thlr., oder 3 Fl.

Kerner's Muse ist ein Kind voll Sinnigkeit, immer zwischen Freude und Leid schwebend, aber hier wie dort nicht laut und wild, sondern Vieles in sich verschließend und Weniges leise aussprechend. Und, wie bei Uhland, so klingt auch hier in dem Wenigen Vieles durch und nach. Eine seltsame Ruhe verkündet die Lust und den Schmerz des Sängers und unter den Thränen blüht immer die Rose der Kindheit auf seinen Wangen. Fast alle Romane und Balladen von Kerner sind legendenartige Märchen und Sagen vom Tode, der die Liebe, die Unschuld, das Gottvertrauen und die Demuth verkört.

In diesem Einen Bande finden sich mit den Poesien auch die prosaischen Dichtungen (überhaupt die sämtlichen Dichtungen) Kerner's abgedruckt.

Stuttgart und Tübingen, im August 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Bei J. G. Schaub in Düsseldorf ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## Die chronischen Krankheiten, ihre eigenthümliche Natur und homöopathische Heilung.

Von Dr. Sam. Hahnemann.

Vierter Theil. Antipsorische Arzneien. Zweite, vielvermehrte und verbesserte Auflage.

34 Bogen in Grossoctav auf Velinpapier.

Subscriptionspreis 2 Thlr. 20 Gr.

Daß die Hahnemann'schen Arzneiprüfungen unerreicht dastehen, wird, trotz den vielfachen neuern Bemühungen in diesem Fache, allgemein und willig anerkannt. Dieser 4te Band der chronischen Krankheiten, welche Kali, Lycopodium, Magnesia carb., Magnesia mur., Manganum, Mezereum, Muraticum acidum, Natrium carb., Natrium mur., Nitri acidum, Nitrum, Petroleum, alle reichlich vermehrt und mit Vorwort versehen, enthält, mag als neuer Beweis für die große Superiorität dieser Arbeiten dienen.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen: Blätter für literarische Unterhaltung. (Verantwortlicher Herausgeber: Heinrich Brockhaus.) Jahrgang 1838. Monat September, oder Nr. 244—273, 1 Beilage, Nr. 5, und 5 literarische Anzeiger: Nr. XXIX—XXXIII. Gr. 4. Preis des Jahrgangs von 365 Nummern (außer den Beilagen) auf seinem Druck-Velinpapier 12 Thlr.

Repertorium der gesammten deutschen Literatur, Herausgegeben von E. G. Gersdorf. 1838. Siebzehnten Bandes viertes Heft. (Nr. XVI.) Gr. 8. Preis eines Bandes 3 Thlr.

Leipzig, im September 1838.

H. A. Brockhaus.

Soeben sind in unserm Verlage erschienen:

## Prolegomena zur Historiosophie

von

**August v. Cieszkowsky.**

10 Bogen Velinpapier. Sauber broschirt. Gr. 8. 16 Gr.

**Materialien für tiefere Einblicke**  
in das Alte Testament und die rabbinischen Schriften.  
Von Salomon Plessner.

Dritter Jahrgang. Enthält:

### Das Gebet.

Eine Abhandlung in 13 Vorträgen. (Erschienen 1836.)  
Band I. 200 S. gr. 8. Geh. 1 Thlr.

### Praktisches Elementarbuch

zur Erlernung der hebräischen Sprache.

Von H. M. Ehrenberg.

7 Bogen. 8. 10 Gr.

Dieses höchst wohlfeile Elementarbuch zeichnet sich durch vorzügliche Zweckmäßigkeit aus. Es ist ganz nach dem bewährten Muster der Seidenstücker'schen Lehrbücher in andern Sprachen, unter besonderer Berücksichtigung der von den Eigenthümlichkeiten des Hebräischen bedingten Modificationen, gearbeitet. Gleichzeitig von demselben Verfasser und in ähnlicher Druckeinrichtung ist ein

### „Anhang für Lehrer“

erschienen, 6 Seiten stark, der besonders verkauft wird.

Berlin, im September 1838.

Zeit & Comp.

Bei Ed. Anton in Halle ist soeben erschienen:

**Eisenhart, Dr. Hugo, Kunen.** Versuch einer Erscheinungslehre des Reichs, veranlaßt durch die Staatsbegriffe der Herren Stahl und Leo. Mit einem Vorworte an David Strauß über den Grund seiner Verwechslung des Heilands mit dem Gemeinwesen.  
Gr. 8. 2 1/2 Bogen. Geh. 6 Gr.

**Leo, Dr. Heinr., Die Hegelingen.** Actenstücke und Belege zu der sogenannten Denunciation der ewigen Wahrheit.  
Gr. 8. 2 1/2 Bogen. Geh. 4 Gr.

**Noch ein Wort über gemischte Ehen** in Bezug auf die köln'sche Frage. Von einem Protestanten.  
Gr. 8. 2 Bogen. Geh. 4 Gr.

Bei Fleischmann in München erschien soeben:

## Bergesgrüsse

aus dem

**salzburger, tiroler und bairischen Gebirge**

von

**Heinrich Stieglitz.**

Gr. 8. 1838. In Umhlag. 1 Thlr. 12 Gr., oder  
2 Fl. 42 Kr.

Die Vielen sowohl, welche die bilder- und sagenreichen süddeutschen Alpen durchstreifen, wie die Heimgeliebten, wird dieser duftende Kranz von Gebichten mächtig anprechen. Die herrlichen Leistungen des Verfassers sind bereits in ganz Deutschland hinlänglich bekannt.

In der **Nauck'schen** Buchhandlung in Berlin ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## Handbuch der englischen Sprache und Literatur,

oder Auswahl interessanter, chronologisch geordneter Stücke aus den classischen englischen Prosaisten und Dichtern, nebst Nachrichten von den Verfassern und ihren Werken, von L. Ideler und H. Nolte.

### Dritter Theil,

die neueste Litteratur umfassend, bearbeitet von Dr. J. Ideler. 37 Bogen. Gr. 8. Maschinen-Velinpapier. Preis 2 Thlr.

### Venturini's Chronik

**des neunzehnten Jahrhunderts. Neue Folge**  
**1ster bis 10ter Band,** oder die Jahre **1826**

bis **1835**, circa 470 Bogen in gr. 8., 29 Thlr.,  
sehen wir von heute an vollständig auf **10 Thaler** herab.  
Einzelnhe Bände zu 2 Thaler.

Leipzig, den 1sten September 1838.

**J. C. Hinrichs'sche** Buchhandlung.

Durch alle Buchhandlungen ist von uns zu beziehen:

## Voyages, Relations et Mémoires originaux, pour servir à l'histoire de la découverte

## de l'Amérique,

publiés pour la première fois en français par  
**J. Cernaux-Compans.**

In-8. Paris.

Inhalt der bis jetzt erschienenen Bände:

Narration du premier voyage de Nic. Federmann, d'Ulm (1557). 6 Fr. 50 C. — Histoire de la province de Santa-Cruz, par Péro de Magalhães de Gandavo (1576). 4 Fr. 50 C. — Histoire d'un pays situé dans le nouveau monde, nommé Amérique, par Hans Staden de Homberg, en Hesse (1557). 8 Fr. 50 C. — Relation véridique de la conquête du Pérou et de la province de Cuzco, nommée Nouvelle-Castille, par Franc. Xerès (1547). 6 Fr. — Histoire véritable d'un voyage curieux fait par Ulrich Schmidel de Straubing (1559). 7 Fr. — Commentaires d'Alvar Nuñez Cabeça de Vaca, Adelantado et Gouverneur du Rio de la Plata (1555). 14 Fr. — Relation et naufrages d'Alvar Nuñez Cabeça de Vaca (1555). 9 Fr. — Recueil de pièces relatives à la conquête du Mexique (*indébit*). 14 Fr. — Cruautés horribles des conquérants du Mexique. Mémoire de Don Fernando d'Alva Ixtlilxochitl (1829). 10 Fr. — Relation du voyage de Cibola, entreprise en 1540 (*indébit*). 12 Fr.

Bibliothèque Américaine, ou Catalogue des ouvrages relatifs à l'Amérique qui ont paru depuis sa découverte jusqu'à l'an 1700. Par **H. Ternaux.** In-8. Paris. 1837. 10 Fr.

Leipzig, im September 1838.

### Brockhaus & Wvenarius,

Buchhandlung für deutsche und ausländische Litteratur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXXIV.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brochhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

In allen Buchhandlungen ist zu erhalten:

## URANIA.

Taschenbuch auf das Jahr 1839.

Neue Folge. Erster Jahrgang.

Mit dem Bildnisse Lamartine's.

8. Auf seinem Velinapap. Eleg. cartonnirt. 1 Thlr. 12 Gr.  
Inhalt: I. Des Lebens Ueberflus. Novelle von Ludwig Tieck. — II. Goethe's Briefe an die Gräfin Auguste zu Stolberg. — III. Die Entführung. Novelle von Joseph Freiherrn von Eichendorff. — IV. Der Gefreuzigte. Novelle von Leopold Schefer. — V. Irwish-Frische. Dopol-Novelle von Franz Werthold.

Mit dem Jahrgang 1839 der Urania beginnt eine neue Folge und ich erfülle daher gewiss den Wunsch vieler Freunde dieses Taschenbuchs, wenn ich die noch vorrätigen neun Jahrgänge 1830—38, die im Ladenpreise 18 Thlr. 6 Gr. kosten, **zusammengenommen für 4 Thlr. 12 Gr., einzelne Jahrgänge aber für 16 Gr. ablasse.**

Diese Jahrgänge enthalten Beiträge von W. Alexis, G. Döring, F. von Eichendorff, F. von Heyden, W. Hugo, W. Martell, G. Morike, A. Ohlenschläger, Posgaru, P. J. von Rehfues, L. Reilfab, E. F. von Rumohr, A. von Sartorius, L. Schefer, Johanna Schopenhauer, S. Schwab, E. Scävola, A. von Sternberg, F. Volz, besonders aber acht Jahrgänge Novellen von Ludwig Tieck, die zu den ausgezeichnetsten Leistungen dieses Dichters gehören dürften.

An Kupfern enthalten diese Jahrgänge außer schönen Bildnissen von Uhlant, Cornelius, Ohlenschläger, Dannecker, Zelter, Tegner, Huber, A. von Humboldt, Fedlig und sechs Darstellungen zu Bürger's Gedichten, 45 Stahlstiche nach ausgezeichneten Gemälden deutscher, französischer und englischer Künstler. Leipzig, im October 1838.

F. A. Brochhaus.

## Gedichte von Eduard Morike.

In der Unterzeichneten sind soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden:

## Gedichte

von

Eduard Morike.

8. In Umschlag broschirt. Preis 1 Thlr. 6 Gr., oder 2 fl.

Die Freunde echter Poesie, die das Gefunde, Frische, Ungekünstelte, frei aus der überwallenden Phantasie und dem reichen Gemüth Entspringene von dem Gemachten und Erzeugungen mit seinem salzigen Glanze zu unterscheiden wissen, und nur von Dem sich wahrhaft erquidt und erhoben fühlen, was jenem unergänzlichen, geheimnisvollen Born entquell, werden diese Sammlung von Poesien aufs herzlichste willkommen heißen, sich an der schönen und seltenen Verbindung

des Innigempfundnen mit dem Lebendigangesehenen und dem Blüthendphantastischen, an der Vermählung des tiefsten Natursinns mit dem offensten und weichsten Gemüth, sowie an der Fülle und Biederkeit der Form lebhaft erfreuen und dem Verfasser die Stelle unter den Lyrikern deutscher Sprache anzuweisen sich beien, um welche, in eingeschränkter Zurückgezogenheit von dem lustigen Leben und Treiben der Welt, den innern Anschauungen, Bildern und Spielen seiner Seele sich hingebend, der sorglose Dichter bisher sich zu betheuern veräumte. Stuttgart und Tübingen, im September 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

## Neuestes Werk über Paris.

Soeben ist erschienen:

Der

## Deutsche in Paris.

Herausgegeben  
vom

Verfasser des deutschen Studenten.

2 Bände. 8. Altona, Hammerich. Geh. 3 Thlr.  
Endlich erhalten wir hier eine Schilderung der französischen Hauptstadt, die ebenso treffend als wahr ist. Der Verfasser verlebte mehre Jahre in Paris, und lernte die Sitten und den Charakter der Pariser vollkommen kennen. Der Leser erhält ein klares Bild von dem Leben und Treiben dieser merkwürdigen Stadt, und besonders sind von hohem Interesse die Mittheilungen über den Zustand unserer deutschen Landsleute in Paris.

Sämmtliche solide Buchhandlungen und Leihbibliotheken haben dieses interessante Werk vorrätig.

Bei Hinrichs in Leipzig ist zu erscheinen:

## Schiller's Dichtungen,

nach ihren historischen Beziehungen und nach ihrem innern Zusammenhange von Dr. H. F. W. Hinrichs (ord. Prof. der Philos. zu Halle). 1ster, lyrischer Theil. 2ter, dramatischer Theil, 1ste Abtheilung. Gr. 8. Velin. Geh. 3 Thlr. 10 Gr.

Inhalt. I. Einleitung; Schiller und Goethe in ihrem Verhältnisse zueinander. Liebe. Zweifel und Resignation. Wehmuth. Weibliche Natur. Ideal und Kunst. Wissen. Nemesis. Liebe und Treue. Demuth. — II. 1. Einleitung; Schiller als dramatischer Dichter und sein Verhältniß zur deutschen Literatur überhaupt. Die Räuber. Kabale und Liebe. Fiesco. Don Carlos. — Die 2te Abtheilung, Schiller's übrige dramatische Originaldichtungen umfassend, erscheint bis Ostern künftigen Jahres.

Das Ganze, sich in der äußern Erscheinung der schönen Detavausgabe von Schiller's Werken vollkommen anschließend, bildet einen vortrefflichen Commentar zum Verständnisse dieses Nationaldichters.

Sieben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen  
um beigesetzte Preise zu haben:

## **Grundriss** der **MINERALOGIE**

für Vorträge in  
höhern Lehr-Anstalten

von  
**FRIEDRICH KÖHLER,**  
Dr. d. Philos., Professor und ord. Lehrer d. Chemie und Mineralogie  
an der städt. Gewerbschule zu Berlin.

Zweite, gänzlich umgearbeitete Ausgabe. Kassel,  
1839. J. C. Krieger's Verlagshandlung. (16½ Bogen.) Preis 1 Thlr., oder 1 Fl. 48 Kr. netto.

**Dr. Wilh. Münscher's**  
**LEHRBUCH**  
der christlichen

## **Dogmengeschichte.**

Mit Belegen aus den Quellschriften, Ergänzungen der Literatur, historischen Noten und Fortsetzungen versehen von

**Dr. Daniel von Coelln.**

Nach dessen Tode fortgesetzt von

**Dr. Ch. Gotthold Neudecker,**

ordentlichem Mitgliede der historisch-theologischen Gesellschaft  
zu Leipzig.

Zweiter Hälfte zweite Abtheilung. Mit dem besonderen Titel: **Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte von der Reformationszeit bis auf unsere Tage** etc. Kassel, 1838. J. C. Krieger's Verlagshandlung. (44¼ Bogen.) Preis 3 Thlr. 18 Gr., oder 6 Fl. 45 Kr.

**Akademische Vorlesungen**  
über den Gebrauch

## **kalten Wassers**

im  
gesunden und Kranken Zustande.  
Gehalten auf der Universität B.

vom  
**Professor Dr. S.,**  
wirklichem geheimen Ober-Medicinalrathe u.  
Für das gebildete Publicum bearbeitet und  
herausgegeben von

**Dr. F. Selmenfreit.**  
Erstes Heft. 1ste bis 6te Vorlesung. Kassel, 1838.  
J. C. Krieger's Verlagshandlung. (4½ Bogen.)  
Brotschirt. Preis 10 Gr., oder 45 Kr.

Den einseitigen, übertriebenen Anpreisungen des kalten Wassers beginnt allmählig die Erfahrung einen Damm entgegen zu setzen. Wie aber die Extreme sich häufig berühren, so droht bei einem Theile des Publicums dem ausgebehnern Gebrauche

bestehen, durch einzelne gemachte üble Erfahrungen ein völliges Falschseht. Der Zeitpunkt scheint mithin da zu sein, wo eine berücksichtigende sachverständige Stimme von beiden Parteien angehört werden wird; das gebildete vorurtheilsfreie Publicum wird sie in der vorliegenden Schrift des verstorbenen Ober-Medicinalrathes S. finden.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

## **Das Pfennig-Magazin**

für Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse.

1838. September. Nr. 283 — 287.

Nr. 283. \* Das Schloß Johannisberg. \* Masaniello. Das Kintaglas. Theepflanzungen in Brasilien. Harmuir. — Nr. 284. \* Der tarpejische Felsen. Masaniello. (Beschluß.) \* Der Vogel Apteryx. Erster vollendeter Themsistunnel. Ursprung der größten europäischen Monarchien und Regentenhäuser. \* Die französischen Haiden. — Nr. 285. \* Louis-saint L'Duverture. \* Der Lateran in Rom. Der Asbest. Die Albinos und Kalkriolen. \* Der Leierchwanz. — Nr. 286. \* Die Birmanen. \* Die Manufactur der Kreppezwolle. Louis-saint L'Duverture. (Fortsetzung.) \* Das naturhistorische Museum zu Paris. — Nr. 287. \* Das bener Oberland. \* Alhambra. Louis-saint L'Duverture. (Beschluß.) Das Licht einer Kerze.

Die mit \* bezeichneten Aufsätze enthalten eine oder mehrere Abbildungen.

Preis dieses Jahrgangs von 52 Nummern 2 Thlr. — Der erste Jahrgang von 52 Num. kostet 2 Thlr., der zweite von 52 Num. 1 Thlr. 12 Gr., der dritte von 52 Num. 2 Thlr., der vierte von 52 Num. 2 Thlr., der fünfte von 52 Num. 2 Thlr. Leipzig, im October 1838.

**G. A. Brochhaus.**

Dieser Tage hat die Presse verlassen und ist an die Subscriptenten versandt:

## **THESAURUS** græcae linguae

ab  
**HENRICO STEPHANO**  
constructus.

Post editionem anglicam novis additamentis auctum,  
ordineque alphabetico digestum, tertio ediderunt

**Carol. Ben. Hase, Guil. Dindorfius**  
et **Ludov. Dindorfius.**

Volumen IV. Fasc. 2.

oder des ganzen Werkes 17te Lieferung.

**Θεσάυρου — ὧν. I — Ἰννόδορος.**

Folio. Geheftet. Preis 3 Thlr. 8 Gr.

Die 1ste bis 16te Lieferung sind durch alle Buchhandlungen zu demselben Preise zu beziehen.  
Paris, den 15ten August 1838.

**Fermin Didot freres et Comp.**

Bei F. Rubach in Berlin erschien soeben und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

Annalen für die gesammte Staatsarzneikunde, oder  
auserlesene Abhandlungen aus dem Gebiete der  
gerichtlichen Medicin und der medicinischen Policei;  
herausgegeben durch einen Verein von Ärzten und  
Juristen. 1ster Band. 15tes Heft. Preis 18 Gr.



In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und wurde an alle Buchhandlungen versandt:

# Reisen und Länderbeschreibungen

der ältern und neuesten Zeit,  
eine Sammlung

der interessantesten Werke über Länder- und Staatenkunde,  
Geographie und Statistik.

Herausgegeben von  
**Dr. E. Widenmann,**

Redacteur des Auslandes,  
und

**Dr. H. Hauff,**

Redacteur des Morgenblattes.

**Sechszehnte Lieferung.**

Auch unter dem besondern Titel:

## Skizzen aus Irland,

oder

## Bilder aus Irlands Vergangenheit und Gegenwart

von

**einem Wanderer.**

**Erstes Heft.**

Gr. 8. Preis 18 Gr., oder 1 Fl. 12 Kr.

**Inhalt:**

- I. Reisefskizzen aus dem Süden und Westen von Irland** (aus dem Jahre 1832).  
**II. Die Parlamentswahl in Cavan und die Schlacht von Russ.** Scenen aus dem vorigen Decennium.  
**III. Der Todtbeyer.** Eine Erzählung aus der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts.  
Stuttgart und Tübingen, im September 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**

Bei Joh. Ambr. Barth in Leipzig ist erschienen und  
in allen Buchhandlungen zu haben:

**Dr. R. C. Riis,**

## Die christliche Kirche auf Erden

nach der Lehre der heiligen Schrift und Geschichte.

Eine gekrönte Preisschrift.

Nach der zweiten, vermehrten, holländischen Original-  
ausgabe ins Deutsche übertragen

von **Dr. Ludwig Cross.**

Gr. 8. 23 $\frac{3}{4}$  Bogen. 2 Thlr.

Dieses Werk, das die gründlichsten Forschungen, namentlich auch in Bezug auf das Verhältniß der Kirche zum Staate enthält, und von dem unermüdlischen Eifer des gelehrten Verfassers, die heilige Sache des Christenthums mittels Schrift und Geschichte zu fördern, das rühmlichste Zeugniß ablegt, gehört unbestritten zu den wichtigsten, welche im Fache der theologischen Literatur seit einer Reihe von Jahren erschienen sind, und es wird ihm daher sicher die allgemeine Beachtung wie der verdiente Beifall zu Theil werden, den es in der Originalausgabe in so reichem Maße fand, daß in kurzer Zeit zwei Auflagen nöthig wurden.

Bei Friedrich Fleischer in Leipzig ist soeben erschienen:

## Zeitschrift für die Entomologie.

Unter Mitwirkung einer Anzahl Entomologen  
herausgegeben

von Professor **E. F. Germar.**

1ster Band 1stes Heft. 13 Bogen mit 2 illuminirten Kupfern.

Preis des ersten Bandes von 2 Heften 2 $\frac{1}{2}$  Thaler.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

Repertorium der gesammten deutschen Literatur. Herausgegeben von **E. G. Gersdorf.** 1838. Siebzehnten Bandes fünftes Heft. (Nr. XVII.) Gr. 8. Preis eines Bandes 3 Thlr.

Allgemeine Bibliographie für Deutschland, Jahrgang 1838. Monat September, oder Nr. 36—39, und Biographischer Anzeiger: Nr. 36—39. Gr. 8. Preis des Jahrgangs 3 Thlr.

Leipzig, im October 1838.

**J. A. Brockhaus.**

**Neuere Geschichte.**  
**Mémoires,**  
**Correspondance manuscrits**  
 du  
**Général Lafayette**  
 publiés  
*par sa famille.*

6 volumes. In-8. Paris, 1837—38. 15 Thlr.  
 Von diesem interessanten Werke empfangen wir  
 soeben den 4ten bis 6ten Band, womit dasselbe  
 schließt; wir beilegen uns alle Freunde der neuern  
 Geschichte darauf aufmerksam zu machen.

Leipzig, im October 1838.

**Brockhaus & Weynarius,**  
 Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
 (A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

**Oestreichische militairische Zeitschrift. 1838.**  
 Siebentes Heft.

Dieses Heft ist soeben erschienen und an alle Buchhand-  
 lungen versendet worden:

Inhalt: I. Die Kriegereignisse bei Gibraltar in den  
 Jahren 1704 und 1705. II. Die Operationen der verbündeten  
 Heere gegen Paris im März 1814. (Fortsetzung.) Der 23te März.  
 34. Das Gefecht bei Sommeville. 35. Gefechte bei Vitry.  
 III. Literatur. IV. Neueste Militärveränderungen. V. Kar-  
 ten-Ankündigung. VI. Übersicht des Inhalts der ältern Jahr-  
 gänge der Oestreichischen militairischen Zeitschrift. (Schluß.)

Der Preis des Jahrgangs 1838 von 12 Heften ist wie  
 der aller frühern Jahrgänge von 1818—37 jeder 8 Thlr. Sächsl.  
 Die Jahrgänge 1811—13 find in einer neuen Auflage  
 in vier Bänden vereinigt erschienen und kosten zusammen eben-  
 falls 8 Thlr. Sächsl. Wer die ganze Sammlung von 1811—37  
 auf einmal abnimmt, erhält dieselbe um ¼ wollefeiler.

Von dem Unterzeichneten ist diese Zeitschrift durch alle  
 Buchhandlungen um die genannten Preise zu beziehen.

Wien, den 6ten September 1838.

J. G. Heubner,  
 Buchhändler.

Die dritte vermehrte Auflage  
 von  
**Prof. Dertel's**  
**grammatischem Wörterbuche**  
 der  
 deutschen Sprache,  
 2 Bände in 4 Abtheilungen

(Gr. 8. München, C. U. Fleischmann),  
 ist nun wieder complet durch alle Buchhandlungen zu erhal-  
 ten, und zwar um den so äußerst geringen Subscriptions-  
 preis von 3 Thlr., oder 4 Fl. 48 Kr. Hierauf glaubt Re-  
 ferent jeden Gelehrten, dem der Besiz eines allgemein  
 vortrefflich anerkannten Wörterbuchs nur höchst erwünscht  
 sein kann, aufmerksam machen zu müssen.

**Stieler's Schul-Atlas**

der neuern Erdbeschreibung  
 hat für alle Schulen Deutschlands einen Vorzug erhal-  
 ten, den kein anderer Schul-Atlas gewähren kann. Es wird  
 nämlich von jezt an jedem Exemplar desselben aus dem nun  
 vollständig erschienenen Atlas der Deutschen Bundes-Staaten

eine der 29 Karten nach der Wahl des Käufers gratis  
 beigegeben, sodaß für alle Landestheile Deutschlands die speci-  
 lere Darstellung der heimathlichen Gegenden, welche Lehrer  
 und Schüler zunächst angeht, nicht fehlen kann.

Schul-Atlas der neuern Erdbeschreibung. 27 ill.  
 K. nebst 1 Spezialkarte einer Deutschen Provinz.  
 Preis 1½ Thlr.

Kleiner Atlas der Deutschen Bundes-Staaten.  
 29 ill. K. Preis 2½ Thlr.

Schul-Atlas der Alten Welt. 14 ill. K. nebst Abriss  
 der alten Geographie. Preis 1 Thlr.  
 bei Justus Perthes in Gotha erschienen, sind stets in  
 den neuesten Auflagen durch alle Buchhandlungen zu haben.

**Conversations-Lexikon**  
 der  
**Gegenwart.**

Ein für sich bestehendes und in sich abgeschlossenes Werk,  
 zugleich ein Supplement  
 zur achten Auflage des Conversations-Lexikons,  
 sowie zu jeder frühern,  
 zu allen Nachbruden und Nachbildungen desselben.

Gr. 8. In Heften von zehn Bogen.

Fünftes Heft, Bogen 41—50.  
 Buchhandel bis Civilisiren.

Preis eines Heftes:  
 Auf weißem Druckpapier 8 Gr.  
 Auf gutem Schreibpapier 12 Gr.  
 Auf extrafeinem Velinpapier 18 Gr.

Inhalt des fünften Heftes:

**Buchhandel** — **Bühner** (Georg) — **Bugand** (Thomas Robert) —  
**Bugia** — **Büchsen** (Friedrich Ludwig) — **Bulan** (Friedrich) — **Bul-**  
**garia** (Abdullah) — **Bull** (Die Bernemann) — **Buller** (Karl) — **Bul-**  
**wer** (Edward Lytton) — **Henry Lytton** — **William Lytton** — **Bun-**  
**ken** (Christian Karl Julius) — **Bunfen** (Georg) — **Karl** — **Gustav** — **Bona-**  
**votti** (Philipp) — **Buchach** (Karl Friedrich) — **Burdett** (Sir Francis) —  
**Buren** (Martin von) — **Burger** (Johann) — **Burgos** (Don Francisco  
 Javier de) — **Burnouf** (Eugene) — **Jean Louis** — **Bussche** (Ludwig  
 Friedrich August von dem) — **Byström** (Johann Niclas) — **Caballero**  
 (Don Germin) — **Cabrera** (Don Ramon) — **Calatrava** (Don José Ma-  
 ria) — **Calomarde** (Don Francisco Ladre) — **Campbell** (Sir John)  
**Canada** — **Caniig** (Freiherr von) — **Cap**, f. **Kaffern** — **Capefigue**  
 (Baptiste Honoré Raymond) — **Carlisten**, f. **Carlos** (Don) und **Epa-**  
**nien** — **Carlos** (Don) **Maria Albero de Borbon** — **Carlomag-**  
 (Johs Georg von) — **Albert von** — **Carlyle** (Thomas) — **Carnier**  
 (Don Ramon) — **Carové** (Friedrich Wilhelm) — **Carrel** (Armand)  
**Carvalho** — **Causer** (Johann Ludwig) — **Cassini** (Johs Vincenz  
 Franz) — **Cassigione** (Carlo Dattolo, Graf) — **Casilho** (Antonio Be-  
 liciano) — **Augusto Federico** — **Joseph Feliciano** — **Alexandre de** — **Ca-**  
**vaigne** (Eleonor Louis) — **Cenur** — **Caig**, f. **d'Eng** — **Chai-**  
**mar** (Thomas) — **Camisso** (Adelbert von) — **Chandos** (Marquis  
 von) — **Cateandriand** (Francis Auguste, Bischof) — **China** — **Copin**  
 (Merimilian Joseph) — **Coseler** (Karl, Graf) — **Ferdinand Maria**, Graf —  
 (Friedrich Franz) — **Cotter** (Karl, Graf) — **Reinhard Maria**, Graf —  
**Christiane** (Ludwig) — **Chodko** (Konrad) — **Christian Karl Fried-**  
**rich August** (Herzog von Schleswig-Holstein-Gonderburg-Quakenburg) —  
**Christiani** (Kudolf) — **Christine**, f. **Maria Christine** — **Crow-**  
**now** (Dmitri Ivanowitsch, Graf) — **Circassien** — **Civilisiren**.

Leipzig, im October 1838.

F. A. Brockhaus.

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXXV.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Zeile 2 Gr.

## Verzeichniss der Vorlesungen, welche

an der königlich bairischen Friedrich-Alexan-  
ders-Universität zu Erlangen  
im Winter-Semester 1838 — 39 gehalten werden sollen.

Der gefegliche Anfang derselben ist der 18te October.

### Theologische Facultät.

Dr. Kaiser: Übungen des erzetischen Seminariums der alt- und neutestamentlichen Abtheilung, biblische Einleitung, oder biblische Archäologie, die Bücher Ruth und Esther mit Rücksicht auf den spätern Hebraismus, die christl. Moral. — Dr. Engelhardt: Übungen der kirchenhistorischen Abtheilung des theologischen Seminars, Kirchengeschichte, Geschichte der mystischen Theologie. — Dr. Dishaufen: Dogmatik, die Briefe an die Galater, Epheser, Philipper, Kolosser und Thessalonicher. — Dr. Hösting: Übungen des homiletischen und des catechetischen Seminariums, Homiletik und Katechetik, die kirchlichen Verfassungen, oder den Gegenstand des Protestantismus und des Katholicismus im Betreff der Lehren von der Kirche und von den Sacramenten. — Dr. Harlek: den zweiten Theil der evang. Synopsen, theol. Encyclopädie und Methodologie, Symbolik und Polemik. — Dr. Krafft: Chronologie und Harmonie der vier Evangelien. — Dr. von Ammon: Übungen im Pastoratalsinstitute, paramentische Geschäftspraxis. — Dr. Hofmann: Palmen.

Die vier angestellten Repetenten werden unter Aufsicht und Leitung des F. Ephorus wissenschaftliche Conversatorien in lateinischer Sprache und Repetitorien für die Theologie Studirenden in vier Jahrescursen halten.

### Juristische Facultät.

Dr. Bucher: das römische Erbrecht, Institutionen des römischen Privatrechts, äußere und innere Geschichte des römischen Rechts. — Dr. Schmidlein: Encyclopädie und Methodologie der Rechtswissenschaft, Criminalrecht mit steter Rücksicht auf das bairische Strafgesetzbuch vom J. 1813, Lehre von der Zurechnung. — Dr. Feuerbach: deutsches Privatrecht, unter fortwährender Berücksichtigung des bairischen Civilrechts und allgemeinen preussischen Landrechts, deutsche Staats- und Rechtsgeschichte. — Dr. Stahl: Civilproceß, Rechtsphilosophie. — Dr. von Linck: deutsches Bundes-Staatsrecht in Verbindung mit einer Übersicht der vormaligen deutschen Reichsverfassung und der Geschichte ihrer Auflösung. — Dr. Schelling: allgemeine Einleitung in den Civilproceß, ausgewählte Materien des Civilrechts, Theorie des gemeinen deutschen ordentlichen und summarischen Civilproceßes, Civilproceß-Practikum mit Beziehung auf die bairische Gerichtsordnung und ihre Novellen. — Dr. von Scheurl: Pandekten, römisches Erbrecht, ausgewählte Stellen des Corpus juris civilis.

### Medicinische Facultät.

Dr. Penke: Examinatorium in lateinischer Sprache über spezielle Pathologie und Therapie, spezielle Pathologie und Therapie der acuten Krankheiten, die praktischen Übungen in der medicinischen Klinik des Krankenhauses und der Poliklinik. —

Dr. Fleischmann sen.: menschliche pathologische Anatomie, menschliche spezielle Anatomie, das medicinisch-forensische Practicum, Secirübungen. — Dr. Koch: Anleitung zum Studium der kryptogamischen Gewächse Deutschlands, spezielle Pathologie und Therapie der chronischen Krankheiten. — Dr. Leupoldt: allgemeine Biologie, Anthropologie (mit Einschluß der Psychologie) und Diätetik, Geschichte der Medicin von 9—10 Uhr, den jatrosophischen Verein. — Dr. Roschitz: geburtschüssliche Klinik in Verbindung mit den Töschirübungen und den Manuals- und Instrumentaloperationen am Fantom, über Krankheiten des weibl. Geschlechts, Geschichte der Geburtskunde. — Dr. Wagner: Geschichte der Physiologie, Encyclopädie und Methodologie der Medicin. — Dr. Stromeyer: theoretische Chirurgie, die chirurgisch-ophthalmatrische Klinik. — Dr. Zott: Wundheilkunde, Zorologie, Semiotik. — Dr. Fleischmann jun.: Osteologie und Syndesmologie, Homöopathie, chirurgische Anatomie, Conversatorium über die wichtigsten Lehren der Medicin in Bezug auf Homöopathie.

### Philosophische Facultät.

Dr. Mehmert: Logik mit einer Einleitung in das Studium der Philosophie und der Psychologie. — Dr. Hart: Staatswirtschaft oder Nationalökonomie, Polizeiwissenschaft in Verbindung mit dem Polizeirecht, Finanzwissenschaft und Staatsrechnungskunde. — Dr. Köppen: Examinatorium, Logik und Metaphysik, Ästhetik. — Dr. Kaffner: encyclopädische Übersicht der gesammten Naturwissenschaft, Geschichte der Physik und Chemie, allgemeine Experimentalkemie, Stöchiometrie, Gewerbeschemie, Theorie der Pharmakochemie. Leitung des Vereins für Physik und Chemie. — Dr. Böttiger: den allgemeinen Theil der Statistik, allgemeine Geschichte, deutsche Geschichte. — Dr. Rückert: Sanskritgrammatik, über einen semitischen Dialekt. — Dr. Döderlein: Übungen des philologischen Seminars, ausermählte Stücke aus den römischen Elegikern und Satirikern, griechische Literaturgeschichte. — Dr. von Raumer: Kryptalkunde, allgemeine Naturgeschichte, Pädagogik. — Dr. Kopp: Hobegetik des akademischen Studiums, ausgewählte Stellen aus Plinii Historia naturalis, Aristotelis Metaphysica. — Dr. von Staudt: analytische Geometrie, Astronomie. — Dr. Martius: Pharmacognosie des Pflanzenreichs, Heilmittel des Thierreichs, Anleitung, die pharmaceutisch-chemischen Heilmittel auf ihre Reinheit und Güte zu prüfen. — Dr. Faber: politische Rechnungskunst, Encyclopädie der Cameralwissenschaften. — Dr. Drechsler: Hebräische Sprache, Alterthümer des außerbiblischen semitischen Orients. — Dr. Winterling: Ästhetik, Geschichte der Kunst. — Dr. Zmischer: Geschichte des sechzehnten Jahrhunderts. — Dr. Hofmann: Geschichte der vorchristlichen Welt. — Rector Dr. Otto: französische und spanische Sprache, englische und italienische Sprache.

Die Zeichnungskunst lehrt Rückert; die Tanzkunst Hübsch; die Reikunst Klingner; die Zeichkunst Raab.

Die Universitätsbibliothek ist jeden Tag (mit Ausnahme des Sonnabends) von 1—2, das Lesezimmer in denselben Stunden und Montags und Mittwochs von 1—3, das Naturalien- und Kunstcabinet Mittwochs und Sonnabends von 1—2 Uhr geöffnet.

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden:

## Esprit de la conversation française ou recueil

de plus de deux mille gallicismes à l'usage des étrangers qui veulent se perfectionner dans l'étude du français.

avec la traduction anglaise et allemande en regard

par

**A. Peschier,**

Professeur de littérature française et anglaise à l'université de Tübingen, membre de l'institut historique de France etc.

*Seconde livraison.*

Gr. 8. Broschirt. Preis 16 Gr., oder 1 Fl.

Kaum wäre es nöthig, das Publicum auf das oben angekündigte Werk aufmerksam zu machen, denn die erste Lieferung hat gleich grossen Beifall bei allen Denjenigen gefunden, welche sich mit der französischen Sprache ernsthaft beschäftigen und die feinen Wendungen sowol, als den Geist derselben gründlich zu kennen wünschen. Einem Jeden ist es offenbar, wie schätzbar ein Buch ist, dessen wenige Seiten, so zu sagen, ein Panorama von allen den Eigenthümlichkeiten eines Idioms darbieten, welches zur allgemeinen Sprache geworden und welches zu ignoriren heutzutage Niemandem mehr erlaubt ist. Bis jetzt war kein anderes Mittel, mit den Feinheiten und Eigenheiten der französischen Sprache vertraut zu werden, als durch die langweilige und mühsame Untersuchung der Grammatik oder des Wörterbuchs, worin die sogenannten Gallicismen sich in einer Menge von gemeinen, alltäglichen und abgedroschenen Redensarten verlieren, welche die Grammatiker einander unveränderlich übertragen, seitdem man Grammatik schreibt.

Die Erscheinung des obengenannten Werkes ist desto erfreulich, als sich ein Franzose zum ersten Mal die Mühe gibt, um eine elegante Auswahl der Idiotismen seiner Muttersprache zu liefern, und besonders, weil es mit Geschmack und Geist geschieht, wie hier.

Da der Verfasser schon hinlänglich durch seine Vorlesungen in Genf, Berlin und Frankfurt und durch seine Geschichte der deutschen Literatur als Schriftsteller bekannt ist, so müssen wir ihm also doppelt Dank schuldig sein, dass er es nicht den Sprachlehrern und Grammatikern von Profession allein überlassen hat, uns in den Geist der französischen Sprache einzuführen.

Die deutsche Übersetzung empfiehlt sich besonders dadurch, dass der Verfasser die Gallicismen mit Eigenthümlichkeiten unserer Sprache so oft wie möglich wiedergegeben hat. Was die englische betrifft, so werden wir uns auf das günstigste Urtheil der vielen Kenner dieser Sprache, welche sich in Deutschland befinden, verlassen. Auch wollen wir nicht versäumen, unsere Leser auf das interessante Vorwort dieser Sammlung aufmerksam zu machen.

Stuttgart und Tübingen, im September 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**

Soeben ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Der Staat, die Kirche und die kölnner Angelegenheit, oder: zu welchem Ausgange wird die kölnner Angelegenheit führen? Nebst einer Beilage aus dem 12. Jahrhund. Von Philadelphia. Gr. 8. Geh. in Umschlag. 1 Thlr. 12 Gr.

Der Verfasser dieser Schrift, ein preussischer akademischer Lehrer, von der wissenschaftlichen Welt als Schriftsteller gekannt und geachtet, wünscht einstweilen im Interesse der Sache, nicht aus dem Dunkel der Anonymität hervorzutreten. So wird

diese Schrift, die aus einer ebenso geistreichen als für die Wahrung und Schirmung der guten Sache begeisterten Feder geflossen, für sich selbst reden und eine gerechte und allgemeine Anerkennung finden.

Braunschweig, den 19ten September 1838.

**George Westermann.**

## Orientalische Literatur.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen von uns zu beziehen:

### Kitab Wafayat Al-A'ayan.

Vies

des hommes illustres de l'Islamisme  
en Arabe, par

### Ibn Khallikan,

publiés par le Baron Mac Guckin de Slane.

Tome I. Partie I. Paris. In-4. 10 Fr.

Le Diwan d'Amro 'Ikais, précédé de la vie de ce poëte par l'auteur du Kitab El-Aghani, accompagné d'une traduction et de notes par le B<sup>on</sup> Mac Guckin de Slane. In-4. Paris. 20 Fr.

Théâtre chinois, ou Choix de pièces de théâtre composées sous les empereurs mongols, traduites pour la première fois sur le texte original, précédées d'une introduction et accompagnées de notes par M. Bazin aîné. In-8. Paris. 7 Fr. 50 C.

De l'affinité de langues celtiques avec le Sanscrit. Par Ad. Pictet. (Mémoire couronné par l'Institut.) In-8. Paris. 5 Fr.

Leipzig, im October 1838.

### Brockhaus & Wennerius,

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

Eben ist erschienen:

### Raltzschmidt, Prof. Dr. Jac. Heinrich, Sprachvergleichendes Wörterbuch der deutschen Sprache;

worin die hochdeutschen Stammwörter in den germanischen, romanischen u. vielen andern europäischen u. asiatischen Sprachen, besonders in der Sanskrit-Sprache nachgewiesen, mit ihren Stammverwandten zusammengestellt, aus ihren Wurzeln abgeleitet u. nach ihrer Urbedeutung erklärt, auch die abgeleiteten u. die wichtigeren zusammengesetzten Wörter kurz erläutert werden. Für Freunde u. Lehrer der deutschen Sprache. 1ste Liefer.: Einleitung; Verzeichniß der indischen u. deutschen Wurzelswörter; Wörterbuch: **W bis Zee.** (8 B.) Perikongformat. Geh. 1/2 Thlr.

Ein ausführlicher Prospect liegt in allen Buchhandlungen vor.

**J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung** in Leipzig.

# Rafael als Mensch und Künstler

von  
**G. R. Nagler.**

Mit Rafael's Bildniß.

Gr. 8. München, bei Fleischmann. 2 Thlr., oder  
3 Fl. 36 Kr.

## Albrecht Dürer und seine Kunst

von  
**G. R. Nagler.**

Mit A. Dürer's Bildniß.

Gr. 8. München, bei Fleischmann. 1 Thlr., oder  
1 Fl. 48 Kr.

Zwei hoch hervorragende Männer, über deren Leben und  
Wirken beide Werke einen Schatz von zum Theil noch ganz  
unbekannten Nachrichten enthalten.

Bei **Ludwig Kohnen**, Buchhändler in Köln und  
Aachen, ist soeben erschienen:

**Das Rennpferd,**  
seine Erziehung und Vorbereitung für die Rennbahn.  
Die neueste Methode der Engländer.

Von  
**C. J. Apperley.**

Nach der Originalausgabe übersetzt.

Mit einer Abhandlung über die zum Trainiren erforderliche  
Condition des Pferdes,

von  
**C. Th. Sticker**, Departements-Thierarzt zu Köln.

Mit einer lithographirten Abbildung.

Gr. 8. Velinpapier. Geh. 1 Thaler.

Nicht allein für Freunde der Pferderennen, sondern für  
jeden Pferdezüchter und Pferdebesitzer enthält dieses Werk  
lehrreiche Winke, welche überall das Gepräge gebiegener Er-  
fahrung an sich tragen, und macht mit Versahrungsarten be-  
kannt, die Vielen von uns unbekannt und selbst in England  
geheim gehalten werden.

Bei Joh. Amb. Barth in Leipzig ist erschienen und  
in allen Buchhandlungen zu haben:

**Dr. Karl Reinhold Jachmann,**  
**Commentar über die kathol. Briefe,**  
mit genauer Berücksichtigung der neuesten Auslegungen.  
Gr. 8. 1 Thlr. 15 Gr.

Dem größten theologischen Publicum, nicht bloß dem Exege-  
ten vom Fach, wird hier ein Commentar über die katholischen  
Briefe übergeben, der, seitdem Augusti vor länger als dreißig  
Jahren seine exegetische Bearbeitung dieser neuteamentlichen  
Schriften herausgegeben, und die Literatur grade dieser Briefe  
in der neuern Zeit sich ungemein vermehrt hat, ein Bedürfnis  
geworden war. Der Verfasser hat sich zum Geseß gemacht, in  
möglichst gedrungenen Kürze eine fortlaufende Kritik der frühern,  
besonders aber der neuesten Auslegungen zu geben, selbst aber  
überall eine einfache und vorurtheilsfreie Erklärung versucht und

indem er, fern von allem Dogmatismus, rein vom historisch-  
kritischen Standpunkte aus diesen Commentar verfaßt, ist zu  
hoffen, daß er bei allen theologischen Parteien unserer Zeit ver-  
diente Anerkennung finden werde.

Bei uns ist erschienen und durch alle Buchhandlungen  
Deutschlands zu erhalten:

**Des journaux chez les Romains,**  
recherches précédées d'un mémoire sur les  
annales des Pontifes, et suivies de fragmens  
des journaux de l'ancienne Rome; par  
**J. VICT. LE-CLERC,**  
membre de l'Institut de France.

Gr. 8. Geheftet. Preis 2 Thlr.

Diese Sammlung, worin alle Urkunden niedergelegt sind,  
welche uns das Alterthum über die Tagebücher der Römer hin-  
terlassen hat, beweist augenscheinlich, daß außer der laichen  
Veröffentlichung der Annalen der Oberpriester eine dem gewöhn-  
lichen Leben mehr anpassende Art der Publicirung bestand, ähn-  
lich den Tages- und Angeheblättern, deren man sich in den äl-  
tern wie neuern Zeiten in Europa bediente.

Paris, im October 1838.

**Firmin Didot frères et Comp.**

Bei H. E. Brönnner in Frankfurt a. M. ist erschienen  
und in allen Buchhandlungen zu haben:

**Mammon,**  
oder der Geiz, die Sünde der christlichen Kirche, von J.  
Harris, Prediger zu Epfom. Aus dem Englischen über-  
setzt von C. Becker, Prediger und Missionar. Gezeichnete  
Preischrift. 14 Bogen. 8. Geh. Preis 21 Gr., oder  
1 Fl. 30 Kr.

Unter 143 Schriften über diesen so wichtigen Gegenstand  
erhielt die obige den Preis. Sie machte in England ungemei-  
nes Aufsehen und es wurden dafelbst in einem Jahre 25,000 Exem-  
plare gedruckt und abgesetzt. Es ist daher wol zu erwarten,  
daß auch dem deutschen Publicum eine so gelungene Übersetzung,  
wie die hier angezeigte, willkommen sein werde.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

**Das Pfennig-Magazin  
für Kinder.**

1838. August. Nr. 31—34.

**Nr. 31.** \*Ufiris. \*Von der ersten Ausbreitung der Lehre  
Christi. Der Dunkelskreis oder die Atmosphäre. Fremde Zho-  
heit muß man nicht nachahmen. \*Die Wasserfälle. Auflösung  
der Räthsel im vorigen Monat. — **Nr. 32.** \*Ein ostindischer  
Fakir. \*Die Pinakothek in München. Der kluge Cabot.  
Des Abends. \*Der Stöder oder die Bastardmakrel. —  
**Nr. 33.** \*Ein Pilger. \*Die Stiergefichte. Die langweilige  
Henriette. Eine Versorgungsanstalt für Kagen. \*Die Holz-  
taube oder Blautaupe. Räthsel. — **Nr. 34.** \*Ein chinesischer  
Ruchenhändler. Die zwei Kagen, eine persische Fabel. \*Der  
gemeine Leguan. Kaiser Karl V. letzte Regierungsjahre und  
Tob. \*Die Niskenamelsen.

Die mit \* bezeichneten Aufsätze enthalten eine  
oder mehrere Abbildungen.

Preis dieses Jahrgangs von 52 Nummern 1 Thlr. — Der  
erste bis vierte Jahrgang kosten ebenfalls jeder 1 Thlr.

Leipzig, im October 1838.

**F. A. Brockhaus.**

Holzschnitte  
zu  
**Schiller's Werken**  
**Taschen-Ausgabe in zwölf Bänden.**

Der außerordentliche Beifall, dessen sich unsere neueste Ausgabe von  
**Schiller's sämmtlichen Werken in 12 Bänden kl. 8.**  
zu erfreuen hat, veranlaßt uns, dem seit mehreren Jahren vorbereiteten und demnächst zur Publication reifen Unternehmen  
**einer Ausgabe sämmtlicher Werke Schiller's**  
**illustriert mit Holzschnitten**  
**nach Zeichnungen der ersten Künstler Deutschlands**  
eine kleinere Reihenfolge von 24 Holzschnitten im Format der neuesten Taschen-Ausgabe, und besonders für diese  
gefertigt, vorausgehen zu lassen.  
Sämmtliche Zeichnungen und ein Theil der Stöcke liegen bereits fertig vor; die Ausgabe wird in vier Lie-  
ferungen vor Schluß dieses Jahres noch vollständig erfolgen.  
In Wohlfeilheit des Preises schließt sich die Illustration der Ausgabe selbst vollkommen an. Die Lieferung  
von sechs ausgezeichnet schönen Holzschnitten, durch die ersten französischen Holzschnneider gefertigt, **kostet nur**  
**4 Gr., oder 15 Kr.**  
Stuttgart, den 15ten September 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**

In der Nachhorst'schen Buchhandlung in Denabrück  
ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

**Botteg, M., Dr.,** über das Wesen und die Be-  
handlung der syphilitischen Krankheiten.  
Aus dem Französischen übersezt und mit einer Nach-  
schrift begleitet von **Dr. Aug. Droste.** Gr. 8.  
Geh. 18 Gr.

über Hermes u. von **J. M. Seling.** Gr. 8.  
Geh. 6 Gr.

über die Einheit Gottes und mehres Andere, mit  
Rücksicht auf das Hermessische System und dessen  
Gegner u. Herausgegeben von **J. M. Seling.**  
Gr. 8. Geh. 9 Gr.

**Dr. Georg Friedrich Puchta,**  
**Lehrbuch der Pandekten.**

Gr. 8. 46 Bogen. 2 Thlr. 12 Gr.

Der gelehrte Verfasser läßt dieses Werk an die Stelle des  
von ihm bereits im Jahre 1832 bearbeiteten, in München  
unter dem Titel „System des gemeinen Civilrechts  
bei Pandektenvorlesungen“ erschienenen Grundrisses tre-  
ten, indem er zwar das in demselben aufgeschaltete neue Sys-  
tem beibehält, indessen nicht mehr bloß die Überschriften der  
Abschnitte und Paragraphen gibt, sondern auch den Inhalt  
derselben darstellt. Je vortheilhafter sich schon jener „Grundriß“  
ausgezeichnet, desto sicherer darf das nunmehrige „Lehrbuch“ die  
günstigste Aufnahme erwarten, da es als ein möglichst concen-

trirendes neben den vielen andern ausgebehnern Werken seinen  
Platz rühmlichst dadurch behaupten wird, daß es mit Schärfe  
und Präcision die einzelnen Lehrgänge hinstellt, sie streng logisch  
aneinander reiht und überall aus den Quellen begründet. Der  
Verleger hat die Einführung durch sehr billigen Preis zu för-  
dern nicht angestanden.

Joh. Ambr. Barth in Leipzig.

In meinem Verlage erschien und ist in allen Buchhandlun-  
gen zu erhalten:

**Alphabetische Zusammenstellung  
der im Criminalgesetzbuch für  
das Königreich Sachsen,**  
sowie in den neuesten dazu erschienenen Gesetzen  
und Verordnungen  
enthaltenen Bestimmungen.

Herausgegeben von

**Dr. Karl Heinrich Haase,**  
Mitglied des Appellationsgerichts zu Leipzig.

Gr. 8. Geh. 20 Gr.

Die mit großer Sorgfalt bearbeitete Zusammenstellung  
der neuesten strafrechtlichen Bestimmungen wird den Gebrauch  
des Criminalgesetzbuchs wesentlich erleichtern.

Leipzig, im October 1838.

**F. A. Brockhaus.**

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXXVI.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Zeile 2 Gr.

## Nr. III.

### Neuigkeiten und Fortsetzungen,

versendet von

### F. A. Brockhaus in Leipzig.

1838. Juli, August und September.

(Nr. I dieses Berichts, die Verwendungen vom Januar, Februar und März enthaltend, findet sich in Nr. XIV des Literarischen Anzeigers; Nr. II, die Verwendungen vom April, Mai und Juni, in Nr. XXV desselben.)

57. Anleitung zum Selbststudium der Geologie. Nach dem Book of science von Karl Hartmann. Mit 16 Abbildungen. 16. Geh. 21 Gr.

58. Anleitung zum Selbststudium der Verfeinerungskunde. Nach dem Book of science von Karl Hartmann. Mit 30 Abbildungen. 16. Geh. 12 Gr.

59. Anleitung zum Selbststudium der Chemie. Nach dem Book of science von Karl Hartmann. Mit 9 Abbildungen. 16. Geh. 18 Gr.

Diese drei Werthchen bilden die dritte bis fünfte Abtheilung des zweiten Bandes vom „Führer in das Reich der Wissenschaften und Künste“. Die erste Abtheilung: Mineralogie, kostet 18 Gr., die zweite: Kryptologie, 6 Gr. Der erste Band, mit 221 Abbildungen (1836) kostet 2 Thlr.

60. Bericht vom Jahre 1833 an die Mitglieder der Deutschen Gesellschaft zur Erforschung vaterländischer Sprache und Alterthümer in Leipzig. Herausgegeben von den Geschäftsführern der Gesellschaft Amilias Ludwig Richter und Karl August Ept. 8. Geh. 10 Gr.

Die Berichte von 1835, 1836 und 1837 haben gleichen Preis.  
61. Bilder-Conversations-Lexikon für das deutsche Volk. Ein Handbuch zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse und zur Unterhaltung. In vier Bänden. Mit bildlichen Darstellungen und Landkarten. Zweiter Band: F—L. 11te und 12te Lieferung. — Dritter Band: M—R. 5te Lieferung. Gr. 4. Geh. Jede Lieferung 6 Gr.

62. Conversations-Lexikon der Gegenwart. Viertes und fünftes Heft. (Besselmeyer—Civilisten.) Gr. 8. Preis eines Heftes von 10 Bogen auf Druck. 8 Gr., auf Schreibp. 12 Gr., auf Velinp. 18 Gr.

Ein für sich bestehendes, in sich abgeschlossenes Werk, zugleich ein Supplement zur achten Auflage des Conversations-Lexikons, sowie zu jeder früheren, zu allen Nachdrucken und Nachbildungen besteben. Der Umfang ist nicht genau zu bestimmen, doch dürfte das Ganze 20—24 Hefte nicht übersteigen.

63. Darstellung der Landwirtschaft Großbritanniens in ihrem gegenwärtigen Zustande. Nach dem Englischen bearbeitet von A. G. Schmecker. In zwei Bänden. Ersten Bandes erste Abtheilung. Mit 36 Holzschnitten. Gr. 8. Geh. 1 Thlr. 12 Gr.

64. Citier (Carl), Der moderne Lazarus. Eine Zeit-Novelle. 8. Geh. 2 Thlr.

65. Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste, in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet, und herausgegeben von J. G. Erich und J. G. Gruber. Mit Kupfern und Karten. Erste Section, A—G, herausgegeben von J. G. Gruber. Dreißigster Theil. (Eber-

hard—Ecklonia.) Dritte Section, O—Z, herausgegeben von M. G. E. Meier und E. F. Kämp. Zehnter Theil. (Pales—Panus.) Gr. 4. Cart. Jeder Theil im Pränumerationspreise auf gutem Druckpapier 3 Thlr. 20 Gr., auf feinem Velinpapier 5 Thlr., auf extrafeinem Velinpapier im größten Quartformate mit briten Stegen (Prachteremplare) 15 Thlr.

66. Ausführliche Encyclopädie der gesammten Staatsarzneikunde. Im Vereine mit mehreren Doctoren der Rechtsgelahrtheit, der Philosophie, der Arzneiwissenschaft und Wundarzneikunst, praktischen Ärzten, Physikern und Chemikern bearbeitet und herausgegeben von Georg Friedrich Most. Für Gesetzgeber, Rechtsgelehrte, Polizeibeamte, gerichtliche Ärzte, Wundärzte, Apotheker und Veterinärärzte. Ersten Bandes fünftes Heft. (Hautkrankheiten—Irrenanstalt.) Gr. 8. Subscriptionspreis eines Heftes von 12 Bogen 20 Gr.

67. Gaen norvegia. Von mehreren Verfassern. Herausgegeben von B. M. Keilhau. Erstes Heft. Mit vier Tafeln. Fol. 6 Thlr.

68. Repertorium der gesammten deutschen Literatur. Herausgegeben mit mehreren Gelehrten von Ernst Gottlieb Gersdorf. (Beigegeben wird: Allgemeine Bibliographie für Deutschland.) 17ter Band. Gr. 8. Jeder Band etwa 50 Bogen in 14 tägigen Heften 3 Thlr.

69. Taschenbuch dramatischer Originalien. Herausgegeben von Dr. Franz. Dritter Jahrgang. Mit drei Kupfern. 8. Cart. 2 Thlr. 12 Gr.

Der erste Jahrgang kostet 2 Thlr. 8 Gr., der zweite 3 Thlr.

70. Historisches Taschenbuch. Mit Beiträgen von Arndt, Barthold, Böttiger und Schubert. Herausgegeben von Friedrich von Raumer. 10ter Jahrgang. Gr. 12. Cart. 2 Thlr.

Der 1ste bis 5te Jahrgang kostet anstatt 9 Thlr. 16 Gr. zusammen genommen 5 Thlr., einzeln à 1 Thlr. 8 Gr.; 6ter bis 10ter Jahrgang à 2 Thlr.

71. Urania. Taschenbuch auf das Jahr 1839. Neue Folge. Erster Jahrgang. Mit dem Bildnisse Lamartine's. 8. Cart. 1 Thlr. 12 Gr.

Lamartine's Bildnis daraus einzeln in gr. 4. kostet 8 Gr. Jahrgang 1830—38 zusammen genommen kosten 4 Thlr. 12 Gr., einzeln jeder 16 Gr.

72. Winkler (Eduard), Vollständiges Real-Lexikon der medicinisch-pharmaceutischen Naturgeschichte und Rohwarenkunde. Enthaltend: Erläuterungen und Nachweisungen über alle Gegenstände der Naturreiche, welche bis auf die neuesten Zeiten in medicinisch-pharmaceutischer und toxikologischer Hinsicht bemerkenswerth geworden sind. Naturgeschichtlicher und pharmakognostischer Commentar jeder Pharmakopöe für Ärzte, Studierende, Apotheker und Drogisten. In zwei Bänden. Erstes Heft. (Aal—Beringeria.) Subscriptionspreis eines Heftes von 12 Bogen 20 Gr.

### Cornelia. Taschenbuch für deutsche Frauen. Jahrgänge 1824—39.

Bei Unterzeichnetem sind noch einige Exemplare der Jahrgänge 1824—38 des Taschenbuchs **Cornelia** von



N. Schreiber complet zu haben, und werden diese 15 Jahrgänge, zusammen genommen, zum sehr herabgesetzten Preis von 12 Thlm. erlassen. Der neue Jahrgang (auf 1839) ist in allen Buchhandlungen zu haben.

**B. Engelmann** in Heidelberg.

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden:

## Wesen und Form des **Pentateuchs.**

Von  
**M. L. Landauer.**

Mit einer Lithographie.

Gr. 8. Preis 21 Gr., oder 1 Fl. 30 Kr.

Inhalt: Begriff von Jehovah und Elohim. — **Geschichte der Bücher Moses.** Urgeschichte. Geschichte der Flutzeit. Geschichte der Patriarchen. Geschichte des Volkes. — **Symbolik der Bücher Moses.** Einleitung. Die Symbole der Sittensitte. Die hochpriesterliche Kleidung. Die Opfersymbolik. Die Festsymbolik. Die Lagersymbolik. Die Zahlensymbolik. — **Gesezgebung der Bücher Moses.** Einleitung. Verunreinigende Kraft: gewisser Thiergattungen; der todtten Körper; der Kinderbetterinnen; der Weiber während ihres Blutflusses; der Männer, denen Same entfuhr; der Ausläsigen. — Die rothe Kuh. Der Asehel in der Wüste. Die Schlange im Paradies. Das Kleid Schaafes. — **Geist und Anordnung der Geseze im Einzelnen.** Die vier Capitel des Deuteronomiums. Das 26ste Capitel. Die drei zum Andenken an den Auszug aus Aegypten gestifteten Sägungen. Die zehn Worte. Die Schemalehre. Der Priestersegen. — **Geist und Anordnung der Geseze im Allgemeinen.** Die Geheimlehre des Sohar. Alier der Sohar'schen Lehren. Der Talmud. Raimonides. — **Rückblick auf die Belege meines frühern Versuchs.**

Von demselben Verfasser ist früher bei uns erschienen:

**Jehovah und Elohim,**

oder

**die althebräische Gotteslehre**  
als

Grundlage der Geschichte, der Symbolik und der Gesezgebung der Bücher Moses.

Gr. 8. Preis 16 Gr., oder 1 Fl.  
Stuttgart und Tübingen, im September 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Bei Friedrich Regensberg in Münster ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## Geschichte Münsters.

Nach den Quellen bearbeitet

von

**Dr. Heinrich August Erhard.**

Gr. 8. Auf seinem Velin-Druckp. Geh. Ladenpr. 2½ Thlr.

Der glänzliche Mangel einer vollständigen, kritisch bearbeiteten und dabei gefällig geschriebenen Geschichte Münsters, eines zwar nicht großen, aber in mancher Hinsicht merkwürdigen und in die allgemeinen Angelegenheiten Deutschlands öfters bedeutend eingreifenden Staates, bestimmte den Verfasser,

dem, als Archivar des königlichen Provinzialarchivs zu Münster, ein großer Reichtum der zuverlässigsten und früher größtentheils unbewegten Quellen dieser Geschichte unmittelbar zugänglich ist, jene Lücke in der geschichtlichen Literatur durch das vorliegende Werk auszufüllen, welches die Resultate sorgfältiger Forschung in einer ansprechenden Darstellung vorträgt, und nicht nur so viel als möglich alle Richtungen des gesammten Staats- und Volkslebens beachtet, sondern auch die specielle Landesgeschichte durchgängig an die allgemeinen geschichtlichen Verhältnisse Deutschlands anknüpft und den organischen Zusammenhang zwischen beiden nachweist, Eigenschaften, durch welche dasselbe ohne Zweifel alle billigen Ansprüche, die man an eine solche Specialgeschichte machen kann, vollständig befriedigt, und ebenso sehr dem eigentlichen Geschichtsforscher, als dem gebildeten Leserkreise, auch außerhalb der Provinz, mit deren Geschichte es sich zunächst beschäftigt, sich empfiehlt.

**Pölig, Geh. Rath, Prof. K. H. E., Die** Weltgeschichte für gebildete Leser und Studierende dargestellt. Neue Ausg. der sechsten verb. u. verm. Aufl., fortgeführt bis zum Jahre 1838, in 15 Lieferungen. Gr. 8. Ste bis 13te Liefer. Geh. à ¼ Thlr.

Die 1ste bis 7te Lieferung wurde im vorigen Jahre ausgegeben; 14te u. 15te Lieferung, die neueste Geschichte, einschließlich der Julirevolution, bearbeitet vom Prof. Fr. Bülow, auch als selbstständiges Werk zu betrachten, erscheint nächstens.

**Zeittafeln zur Geschichte von Spanien** u. Portugal, Frankreich, England, Deutschland, Italien; nebst statistisch-politischen Tabellen der genannten Reiche, nach den neuesten Angaben von 1837. Grossfolio. à 4 Gr. — 20 Gr.

**Langenn, Geh. Rath, Dr. F. A. v., Herzog** Albrecht der Beherzte, Stammvater des königl. Hauses Sachsen. Eine Darstellung aus der sächs. Regenten-, Staats- und Cultur-Geschichte des XV. Jahrhunderts, größtentheils aus authentischen Quellen. (Nebst Urkunden.) Gr. 8. (40 Bogen.) Auf schönes Velin. 3¼ Thlr.

Obige Artikel sind durch alle Buchhandlungen zu beziehen von **Hinrichs** in Leipzig.

Von dem berühmten Romane:

**Leben und Abenteuer**

des

**Chevalier Faublas**

von

**Louvet de Couvray.**

Zum ersten Mal

vollständig aus dem Französischen übersezt und mit Nachrichten über das Leben des berühmten Verfassers versehen von

**Dr. Heinrich Eisner.**

4 Bände. Velinpapier. Eleg. brosch. Preis 5 Thlr. 8 Gr., oder 8 Fl. Rhein.

sind nunmehr vollständig Exemplare durch alle solithe Buchhandlungen zu beziehen.

Kortweil, im October 1838.

**Herder'sche** Buchhandlung.

Neue wohlfeile und elegante Ausgabe  
 von  
**G. P. R. James' Historischen Romanen.**  
 Erschienen ist bereits

**Philipp August oder die Waffenbrüder.**  
 Übersetzt von Dr. **C. Susemihl.**

4 Lieferungen mit 2 Stahlstichen 1 Thlr. 8 Gr.  
 (2 Fl. 24 Kr. Rhein.), denen in kurzer Zeit, alle noch  
 vor Ende dieses Jahres, folgen: *De l'Orme*, *Darney* und  
*Wasterton*, jedes in 3 Bänden und mit 2 trefflichen  
 Stahlstichen nach englischen Originalen, à 1 Thlr. 8 Gr.  
 (2 Fl. 24 Kr. Rhein.)

Die Romane des Sir G. P. R. James sind sämmtlich  
 gleich nach ihrem ersten Erscheinen in England in einer großer  
 gedruckten Octavausgabe, fast alle zu dem Preise von 4 Thln.,  
 in meinem Verlage erschienen. Der Beifall, den sie sowohl  
 in England als in Deutschland gefunden, hat mich veranlaßt, nach  
 der neuesten englischen Ausgabe diese neue übersehung, geschmückt  
 mit 2 Stahlstichen und zu ein Drittel des früheren Preises, um  
 sie auch außer den Bibliotheken ins Publicum einzuführen,  
 zu veranstalten.

Leipzig, den 31sten August 1838.

**C. G. Kollmann.**

Der neueste Roman dieses Verfassers:

**Der Räuber.**

Aus dem Englischen

von

**Dr. C. Susemihl.**

Erster Band. 1 Thlr. 8 Gr.

ist soeben verhandelt worden, sowie endlich auch noch der 2te und  
 letzte Band von Attila.

Wir versanden an alle Buchhandlungen die erste Abthei-  
 lung des

**Repertorium**

für

**Anatomie und Physiologie.**

Kritische Darstellung fremder und Ergebnisse  
 eigener Forschung.

Von

**G. Valentin.**

Dr. der Medicin und Chirurgie und ordentlicher öffentlicher Pro-  
 fessor der Physiologie an der Universität zu Bern.

Dritter Jahrgang. 1838. In 2 Abtheilungen. Mit  
 Kupfer. Broschirt.

Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thlr. 8 Gr., oder  
 3 Fl. 36 Kr. Die 2te Abtheilung wird im October den re-  
 spectiven Käufern nachgeliefert.

Bern, den 15ten August 1838.

Huber u. Comp.

**Oestreichische militairische Zeitschrift. 1838.**

Achtes Heft.

Dieses Heft ist soeben erschienen und an alle Buchhand-  
 lungen versendet worden.

Inhalt: I. Die Operationen des östreichischen in der  
 Laufst mit dem schlesischen Heere vereinigten Corps des Feld-  
 marschall-Lieutenants Graf Bubna im September 1813.  
 II. Der Feldzug in Sicilien 1734—35. III. Die Eroberung  
 von Kassel am 28ten September 1813. IV. Die Feldzüge

Rußlands gegen die Türken in den Jahren 1834 und 1835.  
 V. Literatur. VI. Neueste Militärränderungen.

Der Preis des Jahrgangs 1838 von 12 Heften ist wie  
 der aller früheren Jahrgänge von 1818—37 jeder 8 Thlr. 8 Gr.  
 Die Jahrgänge 1811—13 sind in einer neuen Auflage  
 in vier Bänden vereinigt erschienen und kosten zusammen eben-  
 falls 8 Thlr. 8 Gr. Aber, die ganze Sammlung von 1818—37  
 auf einmal abnimmt, erhält dieselbe um ¼ wohlfeiler.

Von dem Unterzeichneten ist diese Zeitschrift durch alle  
 Buchhandlungen um die genannten Preise zu beziehen.

Wien, den 8ten October 1838.

J. G. Heubner,  
 Buchhändler.

Soeben erschien und ist zu haben in allen Buchhandlungen:

**Das Leben und Wirken des schot-  
 tischen Baronet Sir John Sinclair**  
 dargestellt von seinem Sohne. Deutsch von Dr. Bou-  
 mann. 2 Theile. 8. Velinpapier. Geh. 3 Thlr. 12 Gr.

Wichtig für Professoren der Staatsökonomie und des Staats-  
 rechts, für Statistiker, Landeigenthümer, größere Gutsbesitzer  
 und Landwirthe, sowie von vielfältigem Interesse für jeden  
 Gebildeten.

**Boz (Dickens)**, Verfasser des Nic. Nickleby  
 und der Pickwick etc.),

**Oliver Twist,**

oder **die Laufbahn eines Waisen-  
 knaben.** Deutsch von Dr. Diezmann. **1ster**  
**Band.** Mit drei Federzeichnungen nach Cruik-  
 shank. 194 Seiten. Gr. 12. Velinpapier. In Umschlag.  
 Geh. 1 Thlr.

Der 2te Band folgt unverzüglich.

Den mit so großem Interesse aufgenommenen deutschen  
 Bearbeitungen der in demselben Verlage von demselben Ver-  
 fasser erschienenen Werke:

Genrebilder aus dem londoner Alltagsleben, und  
 Leben und Abenteuer des Nic. Nickleby,  
 schließt sich das obige vorzügliche Werk an, das ohne Zweifel  
 dieselbe Anerkennung finden wird. Die neuere deutsche belletri-  
 stische Literatur hat nichts Ähnliches in gleicher Vortrefflichkeit  
 aufzuweisen. Unsere Eleganz und billiger Preis dürften das  
 vorliegende Werk nicht minder empfehlen.

Braunschweig, im September 1838.

George Westermann.

Ein berühmtes Werk.

**Für Geologen und Freunde der Geologie.**

Bei Paul Neff in Stuttgart ist erschienen und in  
 allen Buchhandlungen zu haben:

**Die Urwelt und ihre Wunder.**

Von

**W. Schimper.**

Aus dem Englischen

von

**W. p. Schimper.**

Mit vielen Abbildungen.

2 Thlr. 12 Gr., oder 4 Fl.

Unsere Ausgabe kostet nur den sechsten Theil des Preises  
 der englischen und französischen Ausgabe, und ist von dem rühm-  
 lich bekannten Herausgeber mit Zusätzen im Text und in der  
 Kupferausgabe vermehrt.

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# BESCHREIBUNG DER STADT ROM

VON

**E. PLATNER, C. BUNSEN, E. GERHARD, W. RÖSTELL, UND L. URLLICH.**

Dritter Band:

**die sieben Hügel, der Pincio, das Marsfeld und Trastevere.**

Zweite Abtheilung:

die Foren, der Esquilin, Viminal, Quirinal und Pincius nebst ihren Umgebungen,  
oder der Beschreibung achtens und neuntes Buch, nebst Ergänzung des dritten und fünften.

Mit 3 Lithographien.

Gr. 8. Preis 4 Thlr. 12 Gr., oder 7 Fl. 30 Kr.

Der erste Abschnitt enthält die vollständige Herstellung des römischen Forums in dessen verschiedenen bisher wenig oder gar nicht beachteten Epochen. Es ist erstrebt worden, das Bild des wiedergefundenen Forums als einen Theil der Geschichte des römischen Volks und Staates, dessen Mittelpunkt und Spiegel es war, möglichst anschaulich und abgerundet darzustellen. In der zweiten Abtheilung ist das Forum des römischen Volkes mit den gleichnamigen Prachtbauten Julius Cäsar's, August's, Domitian's, Nero's und Trajan's als Eine große, in Hinsicht ihres Umfangs wie ihrer Herrlichkeit weder vorher noch nachher erreichte Anlage zur Anschauung gebracht. Den Rest dieser Abtheilung nimmt das achte und neunte Buch der Beschreibung ein. In beiden befinden sich einige kostbare Reliquien Niebuhr's.

Stuttgart und Tübingen, im September 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**

## Naturgeschichte des gestirnten Himmels

von

**F. P. Gruithuisen.**

Gr. 8. München, bei Fleischmann.

2 Thlr., oder 3 Fl. 36 Kr.

Nichts bestrundet so sehr die Größe und Weisheit des Schöpfers, als die Sternkunde. In diese Wunderwelt den Leser einzuführen, beabsichtigt der als Astronom rühmlich bekannte Hr. Verfasser durch dieses schöne Werk, das die allgemeine Verbreitung verdient.

Erschienen und versandt ist:

**Annalen der Physik und Chemie.** Herausgegeben zu Berlin von **J. E. Poggendorff.**  
Band 44. Stück 4. 1838. Nr. 8. Gr. 8.  
Geh. (Preis des Jahrgangs von 3 Bänden oder 12 Heften 9 Thlr. 8 Gr.)

Inhalt: Beiträge zur Kenntniss der jodsauren und überjodsauren Salze; von **C. Rammelsberg.** — Beschreibung einer Thermo säule für constante Ströme; von **H. W. Dove.** — Über das Sulphosinapsin, das Erucin, den schwarzen Stoff und die Säure des weissen Senfs; von **E. Simon.** — Über die Schwingungen der Luft in cylindrischen Röhren; von **W. Hopkins.** (Schluss.) — Bemerkung über das Propagationsvermögen der gebundenen Elektricität; von **P. Riess.** — Über das Gesetz zwischen der Temperatur und dem ent-

sprechenden Maximum der Spannkraft des Wasserdampfs; von **Biot.** — Versuche über die thermo-elektrischen Ströme; von **Matteucci.** — Über den galvanischen Funken; von **Jacobi.** — Über die Öltropfen, die in den Fortpflanzungskörpern der Pilze enthalten sind; von **F. M. Ascherson.** — Über die Bedeutung des Gesetzes der festen elektrolytischen Action für die Theorien vom Voltaismus.

Leipzig, den 8ten October 1838.

**Joh. Ambr. Barth.**

Bei uns ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

**Donna Diana.** Comédie en trois actes et en prose, imitée de l'espagnol.  
Gr. 8. Geh. 12 Gr.

**La dernière ressource.** Comédie en quatre actes et en prose, imitée de l'allemand de Madame de **Weissen-thurn.** Gr. 8. Geh. 12 Gr.

Nach dem Original: „Das letzte Mittel.“

**Une fiancée de la Capitale.** Comédie en prose et en deux actes, imitée de l'allemand. Gr. 8. Geh. 8 Gr.

Nach dem Original der Prinzessin Amalie von Sachsen: „Die Braut aus der Residenz.“

Leipzig, im October 1838.

**Brockhaus & Wennerius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXXVII.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigelegt, und betragen die Insertionsgebühren für die Zeile 2 Gr.

In meinem Verlage ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen vorrätig:

## Taschenbuch dramatischer Originalien.

Herausgegeben

von

Dr. Franck.

Dritter Jahrgang.

Mit drei Kupfern.

8. Elegant cartonnirt. 2 Thlr. 12 Gr.

Inhalt: I. Die Rosen. Ein dramatisches Gemälde in drei Akten und fünf Acten von Albin. — II. Das Tagebuch. Lustspiel in zwei Acten von Bauernfeld. — III. Die Opfer des Schweigens. Acquerstiel in fünf Aufzügen von Immermann. — IV. Der Casquer in Paris. Lustspiel in einem Act von Franck.

Der erste und zweite Jahrgang enthalten Beiträge von Albin, Bauernfeld, Franck, F. Halm, Immermann, Liebenau, Maltig und Pannasch, mit den Bildnissen von Bauernfeld, Immermann und Grabbe, einem Facsimile und scenischen Kupfern. Der erste Jahrgang kostet 2 Thlr. 8 Gr., der zweite 3 Thlr.

Leipzig, im October 1838.

F. A. Brockhaus.

## Vollendung der Bridgewater-Bücher.

In allen Buchhandlungen sind zu haben:

Die  
Natur, ihre Wunder und Geheimnisse,  
oder die  
Bridgewater-Bücher.

Aus dem Englischen vom Rebeater des Morgenblattes, Dr. H. Hauff und Unbern. Sieben Abhandlungen in 8 Bänden, oder 3 Lieferungen, mit zahlreichen Abbildungen. (Die Lieferung a 30 Kr. = 7½ Gr.) 8. Velinpapier. 16 Fl. = 10 Thlr.

Durch die Bridgewater-Bücher zieht sich als leitende Idee ein goldner Faden, der sie zu einem großartigen Ganzen verknüpft, nämlich die Tendenz: die Macht, Weisheit und Güte Gottes in seinen Werken darzustellen. Dadurch werden sie, indem sie die Herrlichkeit der Schöpfung vor dem Leser entrollen, zu einem religiös-sittlichen Bildungswerke im edelsten Sinne des Wortes, und geeignet wie für die Bibliothek des Privatmannes, zu Preisbüchern für Schulen, zu Weihnachtsgeschenken, so für öffentliche Bibliotheken, Museen und Lesevereine jeder Art. So lange wir noch Exemplare haben, ist die ganze Sammlung um den obigen Preis zu erhalten. Für die einzelnen Abhandlungen, wovon jede ein Ganzes für sich bildet und deren Titel hier folgen, befragen die dabei bemerkten besondern Preise:

Die menschliche Hand und ihre Eigenschaften.

Von Sir Charles Bell. Mit Abbild. 1 Fl. 36 Kr. = 1 Thlr.

Die Kräfte der Natur, Chemie, Meteorologie &c. Von W. Prout. Mit Abbild. 3 Fl. 12 Kr. = 2 Thlr. Das Leben, seine Erscheinungen und Gesetze. Von P. M. Roget. Mit Abbild. 5 Fl. 24 Kr. = 3 Thlr. Die Sternwelt. Von W. Whewell. 2 Fl. 24 Kr. = 1 Thlr. 12 Gr. Die Urwelt und ihre Wunder. Von W. Buckland. Mit Abbild. 4 Fl. = 2 Thlr. 12 Gr. Der menschliche Körper und die Natur. Von Th. Kidd. 1 Fl. 36 Kr. = 1 Thlr. Die innere Welt. Von Th. Chalmers. 1 Fl. 36 Kr. = 1 Thlr. Die Thierwelt. Von W. Kirby. 2 Fl. 24 Kr. = 1 Thlr. 12 Gr.

Stuttgart, im Herbst 1838.

Buchhandlung von Paul Neff.

Erste Taschenausgabe eines in allen Ländern deutscher Zunge berühmten Geschichtswerks.

Von der im Laufe dieses Jahres vollständig erscheinenden vierten Auflage der als classisch anerkannten

Allgemeinen

## Weltgeschichte

für alle Stände,

von den frühesten Zeiten bis zum Jahr 1831,

mit Zugrundelegung seines größern Werkes,

bearbeitet und herausgegeben

von

Dr. Karl von Rotteck,

Hofrath und Professor in Freiburg.

Sechs Bände.

Taschenformat auf feinstem Velinpapier.

Subscriptionspreis 2 Thlr. 15 Gr.

ist soeben der zweite Band erschienen.

Der 3te und 4te Band werden noch in diesem Monat, der 5te und 6te Band im November ausgegeben. Jede solide Buchhandlung nimmt mit Vergnügen Bestellung auf dieses ebenso gebiegene als äußerlich prachtvoll ausgestattete Unternehmen an.

Bei F. B. König in Bonn ist in diesem Monate erschienen:

Anthologia Sanscritica. Edidit Chr. Lassen. Smaj. Geh. Preis 4 Thlr.

Zur Geschichte der griechischen und indoskythischen Könige in

Baktrien, Kabul und Indien durch die Entzifferung der altkabalischen Legenden auf ihren Münzen, von

Chr. Lassen. 8. Geh. Preis 2 Thlr. 8 Gr.

# Auf das Publicum, und insbesondere an die Abonnenten und Leser der Zeitschrift: Europa.

Nachdem seit Kurzem von drei hiesigen Verlagsbuchhandlungen Bilder zu Schiller's Werken in Stahlstich und Holzschnitt angelündigt werden, halten wir es für Pflicht gegen uns selbst, um dem Verdachte der Nachahmung und Ausführung fremder Ideen nicht zu unterliegen, sobann aber auch gegen unsere verehrlichen Abonnenten, schon jetzt von dem längst gefaßten und vorbereiteten Plane Mittheilung zu machen, als außerordentliche

## Gratis = Beigabe

zur Europa (aus dem Album der Douboirs, im vorigen Jahre mit Illustrationen zu Hebel's allemannischen Gedichten, im laufenden zu Uhland's Gedichten bestehend) vom nächsten Jahre 1839 beginnend,

# Illustrationen zu Schiller's Werken

von

## Julius Risle

erscheinen zu lassen. Wir sind mit der Ausführung dieses Planes schon seit geraumer Zeit beschäftigt und unsere Vorbereitungen so weit gediehen, daß wir die uns eröffnete Concurrenz nicht ausschlagen vermögen, wozu wir aber auch um so weniger uns geneigt finden würden, als wir in Betreff des Kunstwerthes unserer Unternehmung, nach den vorliegenden Proben der angeforderten zu urtheilen, dieselbe nicht zu scheuen haben —, hinsichtlich des Preises aber für die Nicht-Abonnenten der Europa wir denselben jedenfalls nur auf gleicher Höhe mit dem Werthe der Unternehmung halten werden.

Wir brauchen bei der Ankündigung unserer Unternehmung den Namen unseres Künstlers nicht zu verschweigen. Herr Julius Risle hat sich bereits durch seine Umrisse zu Hebel's und Uhland's Gedichten, welche sein schönes Talent so glänzend beurkunden, einen Namen erworben, und es wird genügen, denselben an der Spitze unserer Unternehmung zu nennen, um zu bezeichnen, was das Publicum von demselben zu erwarten berechtigt ist. Wir werden auch deshalb in Allem, nur nicht in der Eile der Ausführung, es unsern Concurrenten hervor zu thun suchen, um dem Kunstwerthe nicht zu schaden, aber dennoch im Stande sein, binnen Kurzem in der Europa einige Probeblätter erscheinen zu lassen, da Herr Risle schon seit längerer Zeit eifrigst mit künstlerischen Vorstudien zu diesem Unternehmen beschäftigt ist, welches zunächst mit Umrissen zu Schiller's Wallenstein beginnen soll.

Es wird genügen, Freunde der Schiller'schen Muse und gebiegender Kunstwerke auf unser Unternehmen aufmerksam zu machen, um sie zu bestimmen, ihre Wahl mit Bedacht und genauer Prüfung zu treffen.

Stuttgart, Mitte September 1838.

Literatur: Comptoir.

## Wichtige Kartenwerke

im Verlag von **Justus Perthes** in Gotha.

**H. BERGHAUS' ASIA.** 18 Bl. in gross Adlerformat nebst ausführl. Text. Davon sind in 5 Lieferungen vierzehn Blätter erschienen. Subscriptionspreis 30 Thlr. (54 Fl.)

**H. BERGHAUS' PHYSIKALISCHER ATLAS** in 60 Bl. nebst Text. Zwei Lieferungen erschienen, jede im Subscriptionspreise zu 2 Thlr. (3 Fl. 36 Kr.)

(Inhalt der eben ausgegebenen 2ten Lieferung mit 11 Foliohogen Text. Zur Meteorologie: Humboldt's System der Isothermkurven. — Zur Hydrographie: Zwei Karten zur Übersicht der Flutwellen. — Zur Geologie: Vulkankarte des grossen Oceans. — Zur Pflanzengeographie: Ein reichhaltiges Blatt mit verschiedenen Darstellungen.)

**K. v. SPRUNER'S HISTORISCHER ATLAS.** 53 illuminierte Karten. Erste und zweite Lieferung, 1ste Abtheilung sind erschienen, jede im Subscriptionspreise zu 2 Thlr. (3 Fl. 36 Kr.)

(Die 2te Lieferung enthält sämtliche Karten zur Geschichte Deutschlands.)

Beendet:

**K. v. SPRUNER'S ATLAS zur Geschichte von BAIERN.** 10 illuminierte Karten auf 7 Bl. Preis 3 Thlr. (5 Fl. 24 Kr.)

**AD. STIELER'S HANDATLAS** über alle Theile der Erde und über das Weltgebäude. Vollständige Ausgabe in 77 Bl. nebst Erläuterungen. Cart. 16 Thlr. (28 Fl. 48 Kr.)  
Desselben Ausgabe in 63 Bl. Cart. 13 Thlr. (23 Fl. 24 Kr.)  
Desselben Ausgabe in 31 Bl. Cart. 6 Thlr. (10 Fl. 48 Kr.)  
**AD. STIELER'S KARTE von DEUTSCHLAND, den NIEDERLANDEN und der SCHWEIZ** in 15. Blättern. Masstab  $\frac{1}{800000}$  (circa 5 Meilen auf 2 Zoll). Subscriptionspreis 9 Thlr. 8 Gr. (16 Fl. 48 Kr.)

## Titus Livius römische Geschichte, übersetzt und erläutert

von

**Dr. E. F. H. Dertel.**

10 Bände. München, bei F. J. Schömann. 9 Thlr. 16 Gr., oder 16 Fl. 30 Kr.

Welcher Gebildete wünscht nicht gern diesen größten der Geschichtsschreiber Roms in seiner Bibliothek zu besitzen? Diese Dertel'sche, an Anmerkungen so schätzenswerthe Übertragung müssen wir unbedingt als die vorzüglichste empfehlen.

In der **J. C. Hinrichs'schen** Buchhandlung zu **Leipzig** seit 1835 neu erschienen.

**Die neuen Criminalgesetze für das Königreich Sachsen**, erläutert aus den Landtagsverhandlungen von den Jahren 1836 und 1837 vom **Dr. R. F. Günther**, Ordinarius der Juristenfacultät, Erstem juristischen Professor zu Leipzig, Domherrn, Comthur u. Mitgliede der hohen ersten Kammer der Ständeversammlung. Mit Sachregister. Gr. 8. 1 $\frac{1}{2}$  Thlr.

Enthält das Criminalgesetzbuch und die begleitenden Verordnungen, die Gesetze: über Abänderungen im Verfahren in Untersuchungssachen und über Fortsverbrehen; sowie in bündigster Kürze die Motiven, welche zum richtigen Verständnisse und zur Anwendung der Gesetze jedem Juristen zu kennen notwendig sind.

**Dr. Alex. Miruss, Das See-Recht und die Fluss-Schifffahrt**, nach den preussischen Gesetzen, mit Rücksicht auf die wichtigsten fremden Seegesetzgebungen systematisch bearbeitet. In 2 Bänden. Erster Band. Gr. 8. (36 Bogen.) 2 $\frac{3}{4}$  Thlr.

Der 2te Band dieses für Staatsmänner, Rechtsgelehrte, Großhändler, Consuln u. wichtigen Werkes erscheint noch vor Ablauf des Jahres.

**Story's Commentarien über die Verfassungs-Urkunde der Vereinigten Staaten von Nord-America.** Historischer Theil. Nach dem Englischen. Gr. 8. Geh.  $\frac{1}{2}$  Thlr.

Bei Joh. Ambr. Barth in Leipzig ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

**Dr. Friedrich Burchard Köster, Die Propheten des Alten und Neuen Testaments**, nach ihrem Wesen und Wirken dargestellt.

Gr. 8. 1 Thlr. 21 Gr.

Der würdige Verfasser schildert in diesem Seitenstücke zu seinem früher bearbeiteten

**Immanuel**

oder

**Charakteristik der neutestamentlichen Wundererzählungen.**

Gr. 8. 1 Thlr. 12 Gr.

die biblischen Weissagungen in ihrer ganzen Eigentümlichkeit, treu, genau, lebensvoll, und beleuchtet die Prophetie nach Inhalt und Form in ihrer historischen und religiösen Bedeutung. Die Resultate seiner Forschung werden gewiss um so größeres Interesse erregen, als gerade in unserer Zeit die Untersuchung auf die geheimnißvollsten Regionen des menschlichen Geistes doch nur mit scheinbarem Erfolge sich wagte.

Bei **Immanuel Müller** in Leipzig ist erschienen:  
**Die Erzbischöfe von Köln und Posen.**

**Darstellung der welthistorischen Bedeutung der katholischen Frage in Preußen.**

Von

**Anton Graf von \***, Domecapitular u.

7 Bogen. 12. Geh. Preis 16 Gr.

Da über den Erzbischof von Posen noch wenig erschienen, so dürfte vorstehendes Werkchen von dem größten Interesse sein.

In der **Büchler'schen** Verlagsbuchhandlung in **Elberfeld** ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

**Evangelisches Gesangbuch für Schulen.**

Herausgegeben von

**E. Langenberg und J. Hufschmidt** (Lehrer).

15 Bogen. Preis 8 Gr. 25 Exemplare 5 $\frac{1}{2}$  Thlr.

Der Inhalt der 270 Lieder, mit 100 verschiedenen Choralmelodien, ist in folgende 4 Abtheilungen gebracht: I. Schulslieder, II. Festlieder, III. Der christliche Glaube, IV. Das christliche Leben.

**Reisebuch für Elementarschulen**

in zweckgemäßer Anordnung für den Unterricht im Lesen und Rechtschreiben, von **J. Hufschmidt**.

Preis 4 Gr. Partiepreis: 50 Exemplare 5 $\frac{1}{2}$  Thlr.

**Anleitung zum Gebrauche des „Reisebuchs für Elementarschulen“** 1c. 2c.

von **J. Hufschmidt** (Lehrer). Preis 6 Gr.

Die obigen Schriften behandeln einen Theil des logischen Lesens in Verbindung mit der Lautbezeichnung. Daß diese Verbindung eine naturgemäße ist, daß mithin jeder der beiden Gegenstände bei dieser Verbindung gewinnt, das von wird eine aufmerksame Durchsicht der Schriften überzeugen.

**Spanische Literatur.**

Werben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen von uns zu beziehen:

**Diccionario**

de la

**Lengua castellana,**

por la Academia española,

*reimpreso de la octava edicion publicada*

*en Madrid en 1837, con algunas mejoras,*

por

**Don Vicente Salva.**

Ein Band von xx und 994 Seiten. Gr. 4. Paris.

Preis 18 Fr.

Allen Freunden der spanischen Sprache und Literatur wird diese schöne Ausgabe eines ihnen unentbehrlichen Wörterbuchs höchst willkommen sein.

**Tesoro del Teatro español**, desde su origen (año de 1356) hasta nuestros dias; arreglado y dividido en cuatro partes, por **Don Eugenio de Ochoa**. T. I. Origenes del teatro español, por **D. L. F. de Moratin**. Piezas dramáticas anteriores á Lope de Vega. — T. II. Teatro escogido de Lope de Vega. 2 Bände. Gr. 8. Mit Portraits. Jeder Band 10 Fr.

**Ascargorta**, Compendio de la historia de España.

Ein Band. Gr. 8. 7 Fr. 50 C.

Wir benugen diese Veranlassung, um darauf aufmerksam zu machen, daß die Verbindungen, welche wir mit Madrid unterhalten, jetzt uns erlauben, in möglichst kurzer Zeit Aufträge auf spanische Literatur auszuführen.

Leipzig, im October 1838.

**Brockhaus & Werners,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und wurde an alle Buchhandlungen versandt:

# Reisen und Länderbeschreibungen

der ältern und neuesten Zeit,  
eine Sammlung  
der interessantesten Werke über Länder- und Staatenkunde,  
Geographie und Statistik.

Herausgegeben von

**Dr. E. Widenmann,**

Redacteur des Auslandes,  
und

**Dr. H. Hauff,**

Redacteur des Morgenblattes.

**Funfzehnte Lieferung.**

Auch unter dem besondern Titel:

## Reise in Abyssinien im Jahr 1836,

VON

**A. v. Katte.**

**Mit einer Karte.**

Gr. 8. Preis 1 Thlr. 12 Gr., oder 2 Fl. 24 Kr.

Dieser unter mannichfaltigen Abenteuern und Beschwerden angestellte Versuch eines Deutschen, in das Innere Afrikas zu dringen, liefert werthvolle Beiträge zu der Kenntniß eines bis jetzt so mangelhaft erforschten, an Naturschönheiten und Naturschätzen überreichen Landes. Ihren Hauptwerth dürfte die Schrift dadurch erhalten, daß der Reisende, als Deutscher, den nur uneigennütziges Wißbegierde trieb, die natürlichen und socialen Verhältnisse des Landes häufig unbefangener beurtheilen konnte als andere Nationalen, die meistens ein commercielles Interesse mit Expeditionen verbinden. Der deutsche Charakter verräth sich auch darin, daß dem Zustande der christlichen Kirche in jenen Ländern besondere Aufmerksamkeit geschenkt und darüber vieles Neue beigebracht wird.

Stuttgart und Tübingen, im September 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**

In unserm Verlage erschienen soeben und sind in allen Buchhandlungen vorrätzig:

**Historische und romantische Erzählungen, Begebenheiten und Skizzen.** Nach dem Russischen des N. Puschkin, N. Bestuschew, T. Bulgarin und Anderer. Deutsch herausgegeben von Fr. Lietz. 8. Broschirt. Preis 1 Thlr.

Der Herausgeber dieser russischen Erzählungen ist bereits durch seine trefflichen Reiseitzigen so bekannt, als daß er den Leser nicht auch durch diese Übertragung der ausgezeichnetsten russischen Romanendichter, Puschkin, Bestuschew und Anderer, vollkommen befriedigen sollte. Jetzt, wo die russische Literatur so bedeutend ins Leben tritt, dürfte dieses Werk zeitgemäß erscheinen.

**Voss'sche Buchhandlung.**

Bei Justus Perthes in Gotha ist erschienen:

**Gothaischer genealogischer Hoffkalender** auf das Jahr 1839. 76ster Jahrgang. Mit 8 Bildnissen in Stahlstich. Preis 1 Thlr. (1 Fl. 48 Kr.)

**Genealogisches Taschenbuch** der deutschen gräflichen Häuser auf das Jahr 1839. 12ter Jahrgang. Preis 1 Thlr. 8 Gr. (2 Fl. 24 Kr.)

Bei L. C. Kehr in Kreuznach ist erschienen:

**L. C. Kehr, Hundert Confirmationsscheine, oder Auswahl biblischer Denkprüche für evangelische Christen. Altes Testament. Zweite Auflage.**  
4. 20 Gr.

Bei Unterzeichnetem ist in Commission erschienen und durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen:

## Gaea Norvegica.

Von mehreren Verfassern.

Herausgegeben von **B. M. Keilhau.**

**ERSTES HEFT.** Mit vier Tafeln.  
Folio. Preis 6 Thlr.

Der Herausgeber dieses Werkes, Professor an der Universität zu Christiania, ist schon als Verfasser mehrerer anderer geologischen Werke rühmlichst bekannt, und für die Gedenken seiner Arbeit bürgt wol am besten der Umstand, dass die königlich norwegische Gesellschaft der Wissenschaften in Drontheim die Erscheinung desselben durch eine bedeutende Unterstützung möglich gemacht hat.

Leipzig, im October 1838.

**F. A. Brockhaus.**

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXXVIII.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

## Preisermäßigung des Pfennig-Magazins.

Um das **Pfennig-Magazin**, dessen frühere Jahrgänge bereits in mehr als 100,000 Exemplaren verkauft wurden, dem großen Publicum, für das es bestimmt ist, noch zugänglicher zu machen, habe ich mich entschlossen, die ersten fünf Jahrgänge von 1833—37, enthaltend Nr. 1—248 mit mehr als 1000 der schönsten Meisterwerke englischer, französischer und deutscher Holzschneidekunst, wenn solche zusammengekommen werden, vom bisherigen schon äußerst billigen Preise von 9 Thlr. 12 Gr.

**auf 5 Thlr., einzelne Jahrgänge aber auf 1 Thlr. 8 Gr.**

herabzusetzen. Dagegen bleibt der Preis des laufenden sechsten, sowie des mit 1839 beginnenden siebenten Jahrgangs 2 Thlr.

Von dem früher schon im Preise herabgesetzten

**Sonntags-Magazin.** Drei Bände.

**National-Magazin.** Ein Band.

sind noch fortwährend Exemplare à 16 Gr. für den Band zu haben.

Sämmtliche Buchhandlungen Deutschlands und des Auslandes sind in den Stand gesetzt, diese Werke zu den bemerkten Preisen zu liefern.

Leipzig, 1. November 1838.

**F. A. Brockhaus.**

Es ist erschienen und an die respectiven Abonnenten versandt:

**Central-Bibliothek** der Literatur, Statistik und Geschichte der Pädagogik und des Schulunterrichts im In- und Auslande. Herausgegeben von **Dr. H. G. Brzosa**, Professor in Jena. 1838. September-Heft.

**Inhalt.**

**A. Literatur:** 1) Jacotot's Lehrmethode. Von Dr. Ernst Schumann. 2) Die Wichtigkeit der Elementarschule, deren Beaufsichtigung und das Eine, was derselben Noth thut u. s. w. Von **H. J. Weyand**, Elementar-Oberlehrer. Freiburg im Breisgau, Herder'sche Kunst- und Buchhandlung. 1838. (Dr. **H. Gräfe**.) 3) Worte der Liebe an Volksschullehrer gerichtet, das Amt und Leben betreffend. Von **Wohlmuth**. Breslau, Grass, Barth und Comp. 1838. (Dr. **H. Gräfe**.) 4) Handbuch des Wissenswürdigsten aus der Natur und Geschichte der Erde und ihrer Bewohner. Von **Dr. L. G. Blanc**, Domprediger und Professor zu Halle. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage, mit einem Atlas von 24 Karten in Querfolio. Halle, C. A. Schwetschke und Sohn. 1837.

**B. Statistik:** 1) a) Des aveugles et de leur éducation, ouvrage couronné par la Société de la morale chrétienne etc. par Mme. **Eugénie Niboyet**. Paris. 1837. b) Essai sur l'état physique, moral et intellectuel des aveugles nés, avec un nouveau plan pour l'amélioration de leur condition sociale, par **P. A. Dufau**. Ouvrage couronné par la Société de la morale chrétienne. Paris, imprimé par autorisation de Roi à l'Imprimerie Royale. 1837. (Th. **Fritz**.) 2) I. Grundzüge für den Lehrplan des grossherzoglichen

Gymnasiums in Weimar. 1838. — II. Verordnungen für die Schüler des grossherzoglichen Gymnasiums in Weimar. 1838. (Ellendt.) 3) Die höhere Bürgerschule zu Hanover. 4) Amerikanischer Verein für Unterrichtswissenschaft.

**C. Miscellaneen:** Paränesen.

**D. Journalistik:** I. Deutsche Journale. Nichtpädagogische. II. Ausländische Journale: 1) Französische. 2) Italienische.

**A. Pädagogisch-Wissenschaftliches.**

Die Erziehung des Kindes 1.

**B. Statistisches.**

Italien: Über die Reinheit der italienischen Sprache beim Unterricht 2. — Beschreibung der Kleinkinderschule *Santa Maria della Pietà* zu Venedig 3. — Armenschule der Brüder Grafen von Cavanis zu Venedig 4. — — Frankreich: Widersetzlichkeit der Schullehrer gegen Beihilfe beim Kirchendienst im Strassburgischen 5. — Über Ackerbauanstalten 6. — Bemühungen in Frankreich zur Besserung junger und erwachsener Sträflinge 7. 8. 9. 10. — — Spanien: Bericht über den Zustand des Elementarunterrichts 11. — — England: Das grosse Schülertfest zu Eton 12. — — China: Über den Primärunterricht daselbst 13.

**C. Historisches.**

*Biographie.* Fr. Cuvier 14.

**D. Vermischtes.**

Über die gegenwärtige Schriftstellerei in Frankreich 15.

**Intelligenzblatt** Nr. 1.

Halle, den 1sten October 1838.

**C. A. Schwetschke und Sohn.**

Bei J. E. Schaub in Düsseldorf ist erschienen und  
in allen Buchhandlungen zu haben:

**Handbuch der Hauptanzeigen**  
für die  
**richtige Wahl**  
der  
**homöopathischen Heilmittel,**  
oder

*sämmtliche zur Zeit geprüfte homöopathische Arzneien in ihren Haupt- und Einwirkungen nach den bisherigen Erfahrungen am Krankenbette, bearbeitet und mit einem systematisch-alphabetischen Repertorium des Inhalts versehen*

VON  
**G. H. G. JAHR.**

Zweite umgearbeitete, verbesserte und ansehnlich vermehrte Auflage.

727 Seiten in gr. 8. Preis 4 Thlr., oder 7 Fl. 12 Kr.

Über den Werth des vorstehenden Werkes viel zu sagen, dürfte fast überflüssig sein, da die Herren Doctoren Rummel und Gross in den homöopathischen Journalen es bereits als das Beste in diesem Fache und als eines der unentbehrlichsten Werke für den homöopathischen Arzt bezeichnet haben und der rasche Absatz der ersten Auflage die praktische Brauchbarkeit desselben hinlänglich verbürgt. Hier daher nur soviel, dass der Verfasser alle seine Kräfte aufgeboten, dieser neuen Auflage bei einer ansehnlichen Menge von Zusätzen auch eine noch brauchbarere Einrichtung zu geben, wie er denn das Ganze überhaupt so durchaus umgearbeitet hat, dass die gegenwärtige Auflage sich von der vorigen ebenso wesentlich unterscheidet, als diese von den frühern Werken ähnlicher Art unterschieden war. Dabei ist das Werk mit ganz neuen Lettern auf gutem weissem Papier vorzüglich scharf und schön gedruckt und der Preis für die über sechszehn Bogen betragende Vergrößerung des Buches nur um das billigste erhöht worden.

In **Karl Gerold's** Buchhandlung in Wien  
ist soeben erschienen und daselbst, sowie in allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

**Neueste**  
**Dampfschiffahrt**  
von  
**Wien nach Trapezunt**  
oder die  
grosse **Donaustrasse** zu einem der **reichen**  
**Ursitze** des asiatischen **Welthandels.**

Von  
**Anton von Steinbüchel,**

Director des k. k. Münz- und Antikencabinetts, ord. öffentl. Professor der Münz- und Alterthumskunde an der k. k. Wiener Universität, Mitglied der Akademien zu Wien, Rom, Neapel, Cambridge, der Gesellschaft für nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung, der Academia Florimontana di Monteleone.

Gr. 8. Wien 1836.

In Umschlag brochirt. Preis 16 Gr. Sächs.

In dem Augenblicke, wo, mittels der Dampfschiffahrt, Wien in solche Nähe zu dem **schwarzen Meere** und den daranstossenden Küsten **Asiens**, des reichsten und grössten

unter den Welttheilen, tritt, wo die Hauptstadt des österreichischen Kaiserthums, und durch so lange Zeit die Deutschlands, nahe daran ist, obschon mitten im Inlande gelegen, den Bewohnern der Monarchie und denen der Donauländer überhaupt alle Vortheile eines belebten Seeplatzes zu gewähren, sodass die **Donau** für Oestreich und Deutschland Das würde, was die **Themse** für London ist, und seit so langer Zeit der **Rhein** für die Uferstaaten an beiden Seiten desselben — in einem solchen Augenblicke verlohnte es sich wol, den Blick auf den ehemaligen Zustand des Handels im schwarzen Meere und in den daranstossenden Küstenländern **Asiens** zu richten, insofern als in dem Wechsel der Tage, wenn auch in veränderter Gestalt, ähnliche Ereignisse so häufig wiederkehren, Thatsachen aber immer ein rubiges gesichertes Urtheil begründen.

Für umsichtige, kräftige, wohl berechnete Thätigkeit ist in der angegebenen Richtung für den Fabrikanten, für den Kaufmann im Grossen und Kleinen, eine viel versprechende, erfolgreiche Bahn eröffnet. Niemand wird es bereuen, der Sache einige Aufmerksamkeit gewidmet, sich mit der Lage dieser Handels- und Verkehrsverhältnisse und mit den betreffenden Gegenden vertraut gemacht zu haben.

Der Name des Verfassers bürgt für den Gehalt der Sache, die Verlagshandlung hat ihrerseits für Ausstattung das ihrige gethan.

Von der Unterzeichneten wurde an alle solche Buchhandlungen versandt:

**Lehrbuch**  
der  
**Rhetorik und Poetik**  
nach  
**Hugo Blair.**  
**Für Deutsche**  
bearbeitet  
von  
Professor **J. Eiselein.**

2 Bände. In Umschlag brochirt. Preis 1 Thlr. 12 Gr.,  
oder 2 Fl. 30 Kr.

Vorstehende Bearbeitung von Blair's berühmtem Werke Lectures on rhetoric and belles letters ist keine bloße wörtliche Uebersetzung, sondern dem gegenwärtigen Stande der deutschen Sprache und Literatur vollkommen angepasst, sodass sie sich zum Gebrauche in den höhern Lehranstalten Deutschlands besonders eignen dürfte.

Kotzwil, im October 1833.

**Gerder'sche** Buchhandlung.

In der Buchhandlung von A. D. Geisler in Bremen ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands und der Schweiz vorrätzig:

**Daevs, A., Gedichte.** Gr. 8. Brochirt. 2 Thlr.

Nur durch den allgemeinen Wunsch hat sich der Herr Verfasser bewegen gefunden, seine zerstreuten Gedichte zu sammeln und herauszugeben. Möge man sie auch auswärts freundlich willkommen heißen,

dann wäre Dem der schönste Lohn bereitet,  
der diesen Kranz bescheiden dargebracht.

Holzschritte

zu

# Schiller's Werke

**Taschen-Ausgabe in zwölf Bänden.**

Der außerordentliche Beifall, dessen sich unsere neueste Ausgabe von

**Schiller's sämtlichen Werken in 12 Bänden kl. 8.**

zu erfreuen hat, veranlaßt uns, dem seit mehren Jahren vorbereiteten und demnächst zur Publication reifen Unternehmen

**einer Ausgabe sämtlicher Werke Schiller's**

**illustrirt mit Holzschnitten**

**nach Zeichnungen der ersten Künstler Deutschlands**

eine kleinere Reihenfolge von 24 Holzschnitten im Format der neuesten Taschen-Ausgabe, und besonders für diese gefertigt, vorausgehen zu lassen.

Sämtliche Zeichnungen und ein Theil der Stöcke liegen bereits fertig vor; die Ausgabe wird in vier Lieferungen vor Schluß dieses Jahres noch vollständig erfolgen.

In Wohlfeilheit des Preises schließt sich die Illustration der Ausgabe selbst vollkommen an. Die Lieferung von sechs ausgezeichnet schönen Holzschnitten, durch die ersten französischen Holzschnneider gefertigt, **kostet nur 4 Gr., oder 15 Kr.**

Stuttgart, den 15ten September 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**

## Wichtige Schrift für jeden Gebildeten!

Im Verlage von L. Vabst in Darmstadt ist erschienen:

**Der  
religiöse Stabilismus.**

**In Briefen**

**an Herrn Dr. Ernst Sartorius,**

königl. preuß. Oberhofprediger und Generalsuperintendenten,  
von

**Pfarrer F. E. W. Wagner.**

Gr. 8. Geh. 1 Thlr., oder 1 Fl. 48 Kr.

Diese gehaltvolle Schrift ist sowohl für die Gegner als Freunde eines vernunftgemäßen Bibel-Christenthums vom höchsten Interesse. Der Herr Verfasser ist bereits durch seinen „evangelischen Pessimismus“ rühmlichst bekannt, man entschäft sich deshalb jeder weiteren Lobpreisung.

Bei **Eduard Meißner** in Leipzig sind soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu haben:

**Elba und Waterloo,**

**Ein historischer Roman**

von

**Ferdinand Stolle.**

(Fortsetzung von „1813“ von demselben Verfasser.)

3 Theile. 8. Velinpapier. Geh. Preis 4 Thlr. 12 Gr.

Vorliegendes Gemälde, die Ereignisse der Jahre 1814 und 1815 in höchst ansprechender Form darstellend, schließt sich an

den im vorigen Jahre von demselben Verfasser bei mir erschienenen und mit auszeichnetem Beifall aufgenommenen historischen Roman „1813“ (3 Theile, 4 Thlr. 12 Gr.) an und wird sich ebenfalls einer gleich günstigen Aufnahme zu erfreuen haben.

## Camelien.

Novellen, Erzählungen und Genrebilder von  
**Ferd. Stolle.** 2 Theile. 8. Velinpapier. Geh.  
2 Thlr. 12 Gr.

**Novellen von St. Kelly.** 3ter Band. 8.  
Velinpapier. Geh. 1 Thlr. 12 Gr.  
welche als höchst ansprechende Lecture gleichfalls bestens empfohlen werden können.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen von uns zu beziehen:

**Essai sur l'Analyse physique des  
langues, ou de la formation et de  
l'usage d'un Alphabet méthodique**  
par **Paul Ackermann**, l'un des auteurs du Vocabulaire de l'Académie française.

In-8. Geh. 18 Gr.

Leipzig, im November 1838.

**Brockhaus & Wenarius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

# Interessante Monatschrift für das gebildete Deutschland.

In unserm Verlage ist soeben erschienen und an diejenigen Handlungen, welche Nova annehmen, versendet worden:

## **ATHENAEUM**

für  
**Wissenschaft, Kunst und Leben.**  
Erstes Heft.

Alle Monate erscheint ein Heft in der Stärke von 6—7 Druckbogen in gr. 8.

**Preis eines halben Jahrgangs**

3 Thlr. 16 Gr. Sächs., oder 6 Fl. Rhein.

Die unterzeichnete Verlagsbandlung hat nichts geachtet, um in der Form von Monatsheften eine Zeitschrift zu begründen, welche in Folge ihrer Anlage und Intention mit der Zeit als ein erwünschter Vereinigungspunkt der anerkanntesten Gelehrten und tüchtigsten Literaten Deutschlands erscheinen dürfte, und welche sowohl in keinem Lesezirkel fehlen darf, als auch für jede Privatbibliothek ein Werk voll Werth und Inhalt sein wird.

Unter der großen Anzahl der schon gewonnenen oder noch zu hoffenden Mitarbeiter zählen wir die Namen:

Bacherer. Beck. Wensen. Beumann. Carové. Daumer. Dingelstedt. Vuller. f. Fruehbach. Gambieler. Gans. Schillang. Gutzkow. Heine. Hotho. Kühne. Laube. Lunk. Lützelberger. Marggraff. Fr. Mayer. Mügge. Münch. Ottokar. Riedel. Rosenkranz. Schlemmer. Schlesier. Sölll. Stich. Strauss. Vischer. Werner. Wienberg. Willkomm.

**Inhalt des ersten Heftes:**

Form und Tendenz der Zeitschrift.

Mittheilungen über Kaspar Hauser. Von Prof. G. Fr. Daumer.

Mein häusliches Leben als Erklärungsgrund meiner gewordenen Überzeugung und meines gethanen Schrittes. Eine Entgegnung von G. E. F. Lützelberger.

Die Frauencharaktere in Goethe's Werken. Von Dr. W. Stich. über Justinius Kerner, den Dichter und den Gläubigen. Von Dr. Amadeus Ottokar.

Aus einem Divan orientalischer Gedichte. Von Prof. G. Fr. Daumer.

übersicht der neuesten und interessantesten literarischen Erscheinungen.

Feuilleton.

Das zweite Heft wird in wenigen Tagen folgen und unter Anderm enthalten:

Deutsche Kulturzustände. Von Dr. Karl Riedel. Die Repräsentativ-Verfassungen in Deutschland und der Fürst Ludwig von Solms-Lich mit seiner politischen Schule. Von Dr. G. Bacherer. über den Zusammenhang der amerikanischen Indianer und der alten Hebräer. Von Dr. A. Ottokar.

**Bauer & Raspe.**

Im Verlage der **Voss'schen** Buchhandlung in Berlin erschienen in diesem Jahre:

Ergählungen, historische und romantische, Begebenheiten und Sitten. Nach dem Russischen des A. Puschkin, A. Beskujew, E. Bulgarin und Anderer, deutsch herausgegeben von Fr. Litz. 8. Brochirt. 1 Thlr. Esquirol, E., Die Geisteskrankheiten in Beziehung zur Medicin und Staatsarzneikunde vollständig dargestellt. Ins Deutsche übertragen von Dr. W. Bernhard. 2 Bände. Gr. 8. 4 Thlr.

Fichte, Johann Gottlieb, Die Bestimmung des Menschen. Neue Auflage. 8. Geh. 16 Gr., oder 20 Sgr. Heine, W., Hitzgard und Hohenhof. Neue Ausgabe in 6 Heften. 8. 6 Gr., oder 7 1/2 Gr.

Hippel, T. G. v., Über die Ehe. 6te Auflage. 8. 1 Thlr. Lessing, G. E., sämtliche Schriften. Herausgegeben von Karl Lachmann. 12 Bände auf Velinpapier. Mit Portrait in Stahlstich. Gr. 8. Subscriptionpreis 12 Thlr.

—, Nathan der Weise. 8te Auflage. Gr. 8. Geh. 20 Gr., oder 25 Sgr.

—, Emilia Galotti. 6te Auflage. Gr. 8. Geh. 10 Gr., oder 12 1/2 Sgr.

—, Minna von Barnhelm. 6te Auflage. Gr. 8. Geh. 10 Gr., oder 12 1/2 Sgr.

Ependen der Zeit. Enthaltend: Neue Dichtungen von A. v. Chamisso, Cohnfeld, Ferrand, Förster, v. Gaudy, Gengel, Grumbach, Möllenbeck, Quien, Kellstab, v. Keitzenstein, Köfel, v. Sallet, Seidelzmann, Schmidt und mehren Andern. 8. Geh. 16 Gr., oder 20 Sgr.

über den Ritter Gluck und seine Werke. Briefe von ihm und andern berühmten Männern seiner Zeit. Eine historisch-kritische Beurteilung seiner Opernmusik. Aus dem Französischen von J. G. Siegmeier. 2te Auflage. Gr. 8. Geh. 1 Thlr. 12 Gr., oder 1 Thlr. 15 Sgr.

Wolff, Prof. F., Vorlesungen über die Chemie für gebildete Leser aus allen Ständen. Nach Laugier's cours de chimie générale. Neue mit der ersten Auflage gleichlautende Ausgabe in 4 Heften. 12 Gr., oder 15 Sgr.

Berlin, im October 1838.

## **A. Blumauer's sämmliche Werke,**

herausgegeben

von

**A. Ristenfeger.**

3 Bände. Zweite verbesserte Auflage.

8. München, bei Fleischmann. 1 Thlr. 12 Gr., oder 2 Fl. 42 Kr.

Blumauer, bisher von keinem deutschen Classiker an sechsendem Witz, beißender Satyre und unerforschlicher Laune erreicht, und dieser Vorträge wegen allbekannt, wird durch diese wohlfeile Auflage neue Freunde gewinnen.

Im Verlage des Unterzeichneten ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden:

## **Darstellung der Landwirthschaft Großbritanniens in ihrem gegenwärtigen Zustande.**

Nach dem Englischen bearbeitet von

**Dr. A. G. Schweitzer,**

Prof. der Landwirthschaft zu Tharandt.

Ersten Bandes erste Abtheilung. Mit 36 Holzschnitten. Gr. 8. Geh. 1 Thlr. 12 Gr.

Das ganze aus zwei Bänden bestehende Werk wird im Laufe des nächsten Jahres vollständig erscheinen, und sicher zu dem, der sich für Landwirthschaft interessiert, ein so willkommenes sein, als andere Großbritanniens in dieser Beziehung fast unter allen Ländern Europas den ersten Rang einnimmt. Für die gebiegene und zweckmäßige Bearbeitung bürgt Schweitzer's Name.

Leipzig, im November 1838.

**F. A. Brockhaus.**

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXXIX.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei K. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeachtet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

## Neue schönwissenschaftliche Schriften im Verlage von **F. A. Brockhaus in Leipzig.**

**Adolfine, Ideal und Wirklichkeit.** 8. 1 Thlr. 6 Gr.  
**Duller (Eduard), Kaiser und Papst.** Roman.  
Vier Theile. 8. Geh. 5 Thlr. 18 Gr.  
**Citner (Karl), Der moderne Lazarus.** Eine Zeit-  
Novelle. 8. Geh. 2 Thlr.  
**Skizzen aus dem Alltagsleben.** Erstes Bändchen: Die  
Töchter des Präsidenten. Erzählung einer Gouver-  
nante. Aus dem Schwedischen. 8. Geh. 1 Thlr. 16 Gr.  
**Sternberg (M. von), Fortunat.** Ein Feenmärchen.  
Zwei Theile. 8. Geh. 3 Thlr. 18 Gr.

**Der Cavalier auf Reisen im Jahr 1837.** Vom Ver-  
fasser der „Ansichten aus der Cavalierperspective  
im Jahr 1835.“ Gr. 12. Geh. 1 Thlr. 20 Gr.

Das frühere Werk des Verf. erschien 1836 bei Frobergner in  
Leipzig und kostet 2 Thlr.

**Heeringens (Gustav von), Meine Reise nach  
Portugal im Frühjahr 1836.** Zwei Theile. 8.  
Geh. 3 Thlr. 12 Gr.

**Lieg (F.), Bunte Skizzen aus Ost und Süd.** Ent-  
worfen und gesammelt in Preußen, Rußland, der Türkei,  
Griechenland, auf den ionischen Inseln und in Italien. Zwei  
Theile. Mit einer Musikbeilage. 8. Geh. 3 Thlr.

**Germann (Johann Peter), Gedichte.** 8.  
Geh. 1 Thlr. 12 Gr.

**Schulz (Hermann), Wanderbuch.** Ein Gedicht in  
Scenen und Liedern. 8. Geh. 18 Gr.

**Stieglist (Heinrich), Gruß an Berlin.** Ein  
Zukunftstraum. Gr. 8. Geh. 20 Gr.

**Weigel's (F. G.) gesammelte Gedichte und Nach-  
laß.** Herausgegeben von F. Funck. 8. Geh. 2 Thlr. 8 Gr.

**Funck (F.), Erinnerungen aus meinem Leben.**  
Zweiter Band: Aus dem Leben zweier Schauplätze: Aus-  
gust Wilhelm Jffland's und Ludwig Devrient's.  
8. Geh. 1 Thlr. 12 Gr.

Der 1te Band: E. T. W. Hoffmann und F. G. Weigel  
(1836), kostet 1 Thlr. 16 Gr.

**Literarische Zustände und Zeitgenossen.** In Schilder-  
ungen aus Karl Aug. Böttiger's handschriftlichem Nach-  
laß. Herausgegeben von K. W. Böttiger. Erstes  
und zweites Bändchen. Gr. 8. 3 Thlr. 4 Gr.

Böttiger's Leben, von demselben Verf. kostet 16 Gr.

Im Verlage von **Duncker & Humblot**  
ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen  
zu beziehen:

**Becker's (K. F.), Weltgeschichte.** Siebente, verbesserte u.  
vermehrte Ausgabe. 2ter Abdruck. Herausg. von J. W.  
Loebell. Mit den Fortsetzungen von J. G. Woltmann und  
K. A. Menzel. 14 Theile od. 28 Lief. Gr. 8. Lief. 25 u.  
26, u. Theil 13. Jede Lief. 1/2 Thlr. Jeder Theil 7/2 Thlr.

**Daub's, Dr. C., Philosophische u. theologische Vorlesungen,**  
herausg. von Dr. Ph. Marheineke und Th. W. Dittenberger.  
2ter Band. Gr. 8. 33 Bogen. Subscriptionspreis 2<sup>12</sup> Thlr.

Auch unter dem besondern Titel einzeln zu haben:

—, Vorlesungen über die Prolegomena zur Dogmatik  
und über die Kritik der Beweise für das Dasein Gottes  
herausgegeben von Marheineke und Dittenberger. Gr. 8.  
33 Bogen. Preis 2<sup>14</sup> Thlr.

**Göschel, Karl Friedrich, Beiträge zur speculativen Philoso-  
phie von Gott und dem Menschen und von dem Gottmen-  
schen.** Mit Rücksicht auf Dr. D. F. Strauss' Christologie.  
Gr. 8. Preis 1<sup>12</sup> Thlr.

**Kunth, C. Sig., Flora Berolinensis sive enumeratio plantarum  
circa Berolinum sponte crescentium secundum familias na-  
turales disposita.** Tom. I et II. 8. Engl. cart. Preis  
8<sup>34</sup> Thlr.

**Ranke, Leop., Die römischen Päpste, ihre Kirche und ihr  
Staat im 16ten und 17ten Jahrhundert.** Erster Band.  
2te Auflage. Gr. 8. Preis 2<sup>14</sup> Thlr.

Dies Werk ist nun wieder vollständig in drei Bänden  
zu dem Preise von 8<sup>12</sup> Thlr. zu haben.

**Toepfer, Dr. C., Lustspiele, 3ter Band.** Enthaltend: Die  
Einfalt vom Lande. — Lasst mich lesen. — Karl der  
Zwölfte auf der Heimkehr. — Der pariser Taugenichts.  
8. Geh. Preis 2<sup>12</sup> Thlr.

Die frühern Bände dieser Lustspiele (Thl. 1, Preis  
1<sup>12</sup> Thlr. und Thl. 2, Preis 2 Thlr.) enthalten (Thl. 1):  
Der beste Ton. — Nehmt ein Exempel d'an. — Schein  
und Sein. (Thl. 2): Bube und Dame. — Der Krieg mit  
dem Onkel. — Freien nach Vorschrift.

Bei C. W. Leske in Darmstadt ist soeben erschie-  
nen und in jeder soliden Buchhandlung zu haben:

**Mayo, Herbert** (Wundarzt am Middlesex-Ho-  
spital und Professor am königl. Collegium der Ärzte  
in London), Grundriss der speciellen Pathologie mit  
besonderer Berücksichtigung auf die pathologische  
Anatomie. Aus dem Englischen übersetzt und mit  
einigen Zusätzen und Anmerkungen herausgegeben  
von Dr. F. Amelung, grossherzogl. hess. Medicinal-  
rath etc. Erste Abtheilung. Gr. 8. Velindruck-  
papier. 25<sup>12</sup> Bogen. Preis 1 Thlr. 16 Gr., oder  
3 Fl.

Das Original der hier angezeigten Übersetzung hat sich  
bereits die Anerkennung ausgezeichneten deutscher Gelehr-  
ten erworben, und Heusinger nennt es in Schmidt's Jah-  
rbüchern der gesammten Medicin, Jahrgang 1836, Band XI,  
Heft 8, eine der ausgezeichnetsten Erscheinungen der neuern  
Literatur, empfiehlt es der sorgfältigen Beachtung der deu-  
tschen Ärzte und spricht die Überzeugung aus, dass kaum  
ein anderes Werk mehr zur allgemeinen Einführung der  
pathologischen Anatomie in die praktische Medicin beitragen  
wird, als das vorliegende. Die zweite Abtheilung erscheint  
bald nach Neujahr.

Darmstadt, im October 1838.

Diese erst Ende Mai d. J. in Venedig erschienene Schrift des in der gelehrten Welt und als praktischer Arzt berühmten Verfassers enthält so viel Wissenschaftliches, Gebiegenes und

Neues, sowohl in Bezug auf die klimatischen Verhältnisse Venedigs, als auch und besonders über die Heilbarkeit dieser Stadt für solche Kranke, welche die in dem berühmten Badesorte Ischl begonnene Cur fortsetzen und vollenden wollen, daß wir mit Recht voraussetzen können, daß eine gründliche Übersetzung derselben deutschen Lesern höchst willkommen sein dürfte. Der Übersetzer war auch darauf bedacht, mehr aus authentischen

Quellen geschöpfte Zusätze, vorzüglich in Bezug auf die Heilkräfte Ischls, als Beilage hinzuzufügen. Vorzüglich werden Brustkranke, scrophulöse und rheumatische Individuen und Personen, die an Steinbeschwerden leiden, viel Neues und Belehrendes aus dieser sowohl für Ärzte als Nichtärzte interessanten Schrift schöpfen, deren Interesse durch eine Selbstbiographie des gelehrten Verfassers noch erhöht wird.

## Deutsche Vierteljahrs-Schrift, IV. Heft.

Wir versenden soeben an die verehrlichen Sortimentshandlungen:

Das vierte Heft  
der

# Deutschen Vierteljahrs-Schrift. 1838.

Inhalt: Über die Schwankungen der Goldproduction mit Rücksicht auf staatswirthschaftliche Probleme von **N. v. Humboldt**. — Die Literatur, ihr Zusammenhang mit dem Leben und ihr Einfluß darauf von **G. P.**. — Die Stellung Kant's zur Philosophie vor und nach ihm. — Das englisch-amerikanische Bankwesen in seinen commerciellen, politischen, staatswirthschaftlichen und moralischen Beziehungen. — Über die preussische Municipalverwaltung. — Der Arzt und die Euthanasie. — Die Findelhäuser und die Waisenhäuser von **R. Mohl**. — Die Statistik der Cultur im Geist und nach den Forderungen des neuesten Völklerlebens. — Aphorismen über Kriegeskunst von **Prokesch v. Osten**. — Kurze Notizen.

Gr. 8. In Umschlag broschirt. Preis 1 Thlr 20 Gr., oder 3 fl.

Der Preis des ganzen Jahrgangs von 4 Heften ist 7 Thlr. 8 Gr., oder 12 fl.

Inhalt des ersten Heftes: Was wir bezwecken. — Über alte und neue Handelswege nach der Westküste Amerikas. — Die Steinkohlengelände in naturgeschichtlicher und technischer Beziehung. — Der Pauperismus. — Die neue Gestaltung der deutschen Alterthumswissenschaften. — Die literarischen Zustände Belgiens. — Heine's Schriften und Tendenz. — Beiträge zur Lösung der jüdischen Frage. — Auf welchem Standpunkt steht die vaterländische Geschichtsforschung. — Über den Sonnambulismus. — Aphorismen über Kriegeskunst. — Über Diplomatie.

Inhalt des zweiten Heftes: Rückblick auf praktische Seiten des antiken Münzwesens. — Wohnlichkeit und Lebensgenuss in Deutschland. — Die Cholera. — Die Romane. — Blicke auf die neuesten Bearbeitungen der französischen Staats- und Rechtsgeschichte. — Die Menschenrauen. — Die Gesangbuchsreform. — Über die Entstehung und Erweiterung des großen deutschen Zollvereines. — Übersicht der Leistungen der constantinopelitanischen Presse in den letzten sieben Jahren.

Inhalt des dritten Heftes: Die Leistungen einiger pariser Vereine in Hinsicht auf das allgemeine Wohl. — Die jetzige Stellung des Adels, besonders des deutschen. — Der bergmännische District zwischen Birmingham und Wolverhampton, mit besonderer Bezugnahme auf die Gewinnung des Eisens. — Über die Negerflaverei in den Vereinigten Staaten und in Texas. — Welche Früchte hat bisher die deutsche gewerbewissenschaftliche Literatur getragen? — Über die Verwendung des natürlichen und nachgeahmten Erdbarges zu Fußpfaden, Fahrbahnen und architektonischen Zwecken in Frankreich. — Die Sprachlehremethoden Hamilton's und Jacotot's. — Über die Versammlung der deutschen Landwirthe. — Die Vorforg- und Versorgungsanstalten der Mittelstände. — Über den Mißbrauch geistiger Getränke. — Die zweckmäßigste Pflege der schönen Künste in Deutschland. — Duldsamkeit. — Kurze Notizen.

Diese Vierteljahrs-Schrift, welche allgemeinen Beifall gefunden und von den ersten Namen Deutschlands mit Beiträgen für die künftigen Hefte beehrt wurde, wird auch im kommenden Jahre fortgesetzt.

Das erste Heft des Jahres 1839, oder Nr. V, wird eben in die Presse gegeben und erscheint noch im Laufe der letzten Monate dieses Jahres.

Stuttgart, den 1ten October 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**



Im **Literatur-Comptoir in Stuttgart** erschien soeben und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Prachtausgabe

von  
**Hebel's allemanischen Gedichten**  
mit

siebenundzwanzig Umrissen

von

**Julius Nisle.**

Zweite, mit den illustrirten Gedichten vermehrte Ausgabe der Umrisse.

Elegant gebunden mit Goldschnitt,

in Octav 3 Thlr. Preuss., oder 4 Fl. 48 Kr. Rhein.

in Quart 4 Thlr. 12 Gr., oder 7 Fl. 12 Kr. Rhein.

Album der Bourdoirs.

## Illustrationen

zu

**Uhland's Gedichten**

in sechsunddreissig Umrissen

von

**Julius Nisle.**

Mit poetischen Spenden

von Alexander Graf von Württemberg, Heine, C. Reinhold, Dingelstedt, F. R. Vogl, F. G. Seidl und Andern.

Herausgegeben von **Aug. Lewald.**

Elegant gebunden mit Goldschnitt.

Preis 4 Thlr. 18 Gr. Preuss., oder 8 Fl. 6 Kr. Rhein.

In der **Augsburger Allgemeinen Zeitung** hat sich über diese Erscheinungen bereits eine Stimme vernahmen lassen wie folgt:

Es sind hier sechsen zwei Prachtwerke erschienen, welche den Beifall aller Freunde der Poesie und Kunst in hohem Grade auf sich ziehen werden. Das Eine ist eine zweite Ausgabe der **Siebenundzwanzig Umrisse zu Hebel's allemanischen Gedichten** von **Julius Nisle**, welche Umrisse bereits im vorigen Jahre einen glänzenden Success erhielten; die gegenwärtige Ausgabe, in Octav und in Quart erschienen, ist zugleich eine wahre **Prachtausgabe von Hebel's allemanischen Gedichten**, da sie mit dem auf feinstem Kupferdruckpapier prachtvoll gedruckten Text der illustrirten Gedichte vermehrt ist, was um so mehr anerkannt werden muß, als dieselben in einer würdigen Gestalt bis jetzt nicht existirten und nur auf grauem Löschpapier gedruckt vorhanden waren. Das andere der Prachtwerke erscheint zum ersten Male; es sind von demselben Künstler **Illustrationen zu Uhland's Gedichten** in **36 Umrissen**, welche mit dem weiten Titel: **Album der Bourdoirs**, herausgegeben von **Aug. Lewald**, in der Form eines Taschenalbums von einer ansehnlichen Sammlung von Gedichten begleitet werden, zu welcher ausgezeichnete Dichter, wie Alexander Graf von Württemberg, Heine, C. Reinhold, Dingelstedt, F. R. Vogl, F. G. Seidl und Andere beigetragen haben. Die Ausstattung beider Werke von Seiten der Verlagehandlung ist dem innern Werthe derselben entsprechend; mit Goldschnitt und in äußerst geschmackvollem Kleide, scheinen sie sich in den Rang der jährlichen Taschenbücher und Almanache stellen zu wollen, vor welchen sie jedoch voraus haben, daß ihr Kern einen höhern und dauernden Werth hat, als der diesen Eintagsfliegen der Literatur eigen ist. Es läßt sich daher vermuthen, daß die schöne und elegante Welt, welche bisher mit dem Literaturzweig der Almanache einen jährlichen Tribut zu zahlen pflegte, jetzt begierig nach den eben besprochenen

Erscheinungen greifen wird, welche sich überdies noch durch einen verhältnißmäßig billigen Preis auszeichnen. Es sollen, wie wir hören, von demselben Künstler auch **Illustrationen zu Schiller's Werken** zunächst als **Gratis-Beigabe** zur **Zeitschrift Europa für 1839** erscheinen, auf welche, nach geleisteten Proben eines so schönen Talentes, wol mit allem Recht im Voraus aufmerksam gemacht werden darf.

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu haben:

**Genera et Species**

## Gentianearum,

adjectis observationibus quibusdam phytogeographicis, auctore

**A. H. R. Griesebach,**

Med. Doct. Societatis regiae botan. Ratisbon. sodali, in universitate Göttingensi privatim Docente.

Gr. 8. Preis 2 Thlr., oder 3 Fl. 24 Kr.

Stuttgart und Tübingen, im September 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**

## O. Horatius Flaccus

## sämmtliche Werke,

übersetzt und erläutert

von

**Dr. J. H. M. Ernesti.**

2 Bände. München, bei Fleischmann. 3 Thlr. 4 Gr., oder 5 Fl. 30 Kr.

Es gehörte einer unserer Koryphäen, wie Herr Ernesti, dazu, den herrlichen Horaz in deutscher Sprache so wiederzugeben, daß man die Uebersicht vor sich zu haben glaubt; aber auch des großen Schatzes der Anmerkungen wegen, womit dieses Werk ausgestattet ist, darf der berühmte Übersetzer auf den Dank aller Freunde des classischen Alterthums gerechten Anspruch machen.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

## Das Pfennig-Magazin

für Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse.

1838. October. Nr. 288—291.

Nr. 288. \* Elisabeth, Königin von England. Die Choccolate. Die Halbweiden der Provence. \* Der Leuchthurm von Pharos. — Nr. 289. \* Elisabeth, Königin von England. (Beischluß.) \* Die Ureinwohner von Südafrika. Geburtsort des Columbus. \* Der runde Thurm in Gloyne. — Nr. 290. \* Die Gemmi und das leucke Bad. Die Bastsfabrikate. \* Correggio. Entdeckung der nordwestlichen Durchfahrt um Amerika. Die heißen Quellen von Hammam = Meskhutin im Atlas. — Nr. 291. \* Die türkischen Kaffeehäuser. Der Eispalast. \* Die englischen Krönungssingnien. Entdeckung der nordwestlichen Durchfahrt um Amerika. (Beischluß.) Blumenhandel in Paris. Die mit bezeichneten Aufsätze enthalten eine oder mehrere Abbildungen.

Preis dieses Jahrgangs von 52 Nummern 2 Thlr. — Der Preis der ersten fünf Jahrgänge von 1833—37, Nr. 1—248, enthaltend, ist von 9 Thlr. 12 Gr. auf nur 5 Thlr. ermäßigt. Jeder dieser Jahrgänge einzeln kostet 1 Thlr. 8 Gr.

Leipzig, im November 1838.

**J. A. Brochhaus.**

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXXX.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brochhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

An alle Buchhandlungen ist jetzt versandt:

## Historisches Taschenbuch.

Herausgegeben  
von

**Friedrich von Kaumer.**

Zehnter Jahrgang. Gr. 12. Cart. 2 Thlr.

Inhalt: I. Deutsches Bürgerthum in Pommern um die Mitte des 15. Jahrhunderts. Von **F. W. Barthold.** — II. Spanien in seinem Verhältnisse zu den Staaten Europas bei dem Uebergange der Herrschaft von dem Hause Habsburg auf das Haus Bourbon. Von **F. W. Schubert.** — III. Greifsoß Martin Wieland nach seiner Freunde und seinen eigenen Äußerungen. Zusammengestellt und mitgetheilt von **K. W. Böttiger.** — IV. Bericht des Cornelius Ettenius, kaiserlichen Notars und Schreibers beim apostolischen Archiv, über die Reise des Legaten Vorisius, Bischofs von Ayr, um dem römischen Könige und den deutschen Fürsten die allgemeine Kirchensynode zu Mantua anzukündigen. 1536—37. Aus der Handschrift herausgegeben von **H. A. Arendt.**

### Im Preise herabgesetzt

sind der erste bis fünfte Jahrgang (1830—34) und kosten anstatt 9 Thlr. 16 Gr. zusammen genommen jetzt nur **5 Thlr.**, einzeln jeder 1 Thlr. 8 Gr.; der sechste, siebente, achte und neunte Jahrgang (1835—38) jeder 2 Thlr.

Die Beiträge lieferten: **H. A. Arendt, F. W. Barthold, K. W. Böttiger, F. Förster, Ed. Gans, K. G. Jacob, F. Leo, J. W. Koebell, F. Lorenz, Fr. Passow, F. v. Kaumer, K. Roepell, F. W. Schubert, J. D. F. Soemann, Chr. L. Stieglitz, K. A. Wagnen von Ense, J. Voigt, G. F. Waagen, L. Wachler, W. Wachsmuth, F. Wilken und J. W. Zinkeisen.**

Leipzig, im November 1838.

**F. A. Brochhaus.**

Italienisch-Deutsche Zeitschrift:

## Rivista Viennese.

Collezione mensile di articoli originali, traduzioni, estratti e critiche di opere di letteratura, italiana e tedesche, tendente a metter in luce lo stato e i bisogni della letteratura, di queste due nazioni.

Redattore: **Dottore G. B. Bolza.**

Die Leistungen dieser Zeitschrift, welche in deutschen wie in italienischen öffentlichen Blättern bereits rühmlichst besprochen wurde, haben ihren literarischen Ruf begründet, und mag die nachstehende Aufzählung einiger Artikel des nun beendigten ersten Semesters, in 2 Bänden oder 6 Hefen, den Beweis ihres gewählten, interessanten und werthvollen Inhaltes liefern. Es ist das eifrigste Bestreben der Redaction, durch immer weiter ausgebreitete Verbindungen der Tendenz dieses Journals die

entsprechendsten Garantien zu verleihen, welche ihm jetzt schon eine so erfreuliche Aufnahme verschaffen.

Unter der Rubrik: *Articoli originali*, zeichnen sich Druckstücke eines noch unter der Presse befindlichen historischen Romanes: „*Margherita Pusterla di Ces. Cantù*“, aus, eines der ersten Schriftsteller Italiens; ein Abschnitt der *Storia di Vienna*, schizzo di **G. B. Bolza**, welchem noch weitere folgen; ein interessanter Artikel des berühmten Statistikers **Adriano Balbi**: *Sui progressi dell' industria nell' impero d'Austria*. Unter den *Traduzioni* col testo a fronte o senza find Camoens, *dramma di Fed. Halm*; *la storia di Pietro Schlemihl del Chamisso*; *la veste fatale (das Nothhemd) di Uhlund*; *la pentecoste di Manzoni*; *Cenni storici sul paese di Montenegro*, nebst vielen andern classischen Stücken aus *Schiller, Ariosto, Ugo Foscolo, Grillparzer, Bachsmann, Vittorelli, Tieck, Zedlitz, Körner, Engel, Caroline Pichler*, von ausgezeichneten Übersetzern, wie *Negrelli, Bolza, Gar, Sonnleithner, Knoll u. A.* zu finden.

Der philologische Theil bietet dem Leser, außer den vergleichenden Mittheilungen der mailänder, venetianer, neapolitaner, berner und österrischen Dialekte, verschiedene interessante Aufsätze, welche den Geist der Sprache und Poesie Deutschlands und Italiens wechselseitig entwickeln.

In der kritischen Abtheilung sind die neuesten Erscheinungen der beiden Länder besprochen, als: *Fausto*, trag. di *Goethe* trad. di *Scalvini*, *Vita di S. Elisabetta*, di *Montalembert*, *Dustböcker* von *Hammer-Purgstall*, *Bojardo's verlebter Roland*, überf. von *Grös*, *Strenna italiana*, il *Pressagio*, *Almanacchi pel 1838*, iscrizioni di *Lambertenghi*, *Enciclopedia moderna*, o *dizionario di conversazione*, *Dante's göttliche Komödie*, überf. von *Koppisch*, *Storia de' municipii italiani* del *Cav. Morbio*, *Orazioni di Torricelli*, die *Verlobten* von *Manzoni*, deutsch von *Bülow*, *Edermann's Gespräche mit Goethe*, *Friede's Wanderungen in Tirol*, *Saggio di collezione per la critica della letteratura europea degli ultimi cinquant' anni* und viele Andere. Am Schluß sind unter der Aufschrift: *Varietà*, gelehrte und unterhaltende Aufsätze über *Sitten, Gebräuche, Zustände, Erfindungen* und endlich *bibliographische* Mittheilungen.

Mit jedem Monatshefte werden Concurrenz zu Beiträgen ausgeschrieben, welche den Freunden beider Sprachen angenehme Gelegenheit zu Veruchen ihres Talents und ihrer Kenntnisse und nebstdem anständige Prämien darbieten. — Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen darauf an.

Wien, im October 1838.

**Fendler und Schaefer,**  
Buchhändler.

In der *Crensch'schen* Buchhandlung zu Magdeburg erschien:

**Der Thurm am See.** Nach dem Französischen von **F. Wesenfeld.** 2 Theile. 2 Thlr.

Der überraschende Gang der Begebenheiten, blühende Sprache und die moralische Tendenz machen dieses Werkchen zu einem der interessantesten für die deutsche gebildete Lesewelt.

In Karl Gerold's Buchhandlung in Wien  
ist in Commission erschienen und daselbst, sowie in allen Buch-  
handlungen Deutschlands zu haben:

**Für Kalobiotik,**  
Kunst, das Leben zu verschönern, als neu  
ausgestrecktes Feld menschlichen Strebens,

von  
**W. Brunn.**

Zweite Lieferung, von der ersten unabhängig und  
zugleich Fortsetzung.

Gr. 12. Wien 1838.

In Umschlag broschirt. 12 Gr. Säch.

Die Neuheit und handgreifliche praktische Wichtigkeit des  
Angestrebten, die Ausdehnung, welche das Gebiet der Ästhetik  
dadurch erhält, lassen auch für gegenwärtiges Bandchen dieselbe  
günstige Aufnahme hoffen, welche dem früheren gleichen Titels  
im Publicum und in den angesehensten Zeitschriften Deutsch-  
lands geworden. Beide Theile bilden jeder für sich, wie auch  
zusammen ein Ganzes, dessen Tendenz ein stets wachsendes  
Interesse finden möge, um ihre Bohlthätigkeit zu voller Aner-  
kennung zu bringen.

Der erste Theil erschien 1835 und kostet in Umschlag  
broschirt 16 Gr. Säch.

Ferner:

**Andeutungen**

über die

**Anwendung und heilsame Wirkung  
der medicinischen Dampfbäder,**

von

**Dr. G. H. Mosing.**

8. Lemberg, 1838. Broschirt. 5 Gr. Säch.

**Für praktische Ärzte und Wundärzte.**

Bei F. A. Herbig in Berlin sind erschienen und in  
allen Buchhandlungen zu haben:

**Specielle Pathologie und Therapie**

von Dr. C. G. Neumann. 4ter Band. In 2 Abthei-  
lungen. Zweite verbesserte Auflage. 1838. 4 1/2 Thlr.,  
alle 4 Bände in 7 Theilen 15 3/4 Thlr.

Hiermit ist dieses aus einer 40jährigen Praxis hervor-  
gegangene Werk in der zweiten Auflage wieder vollständig  
durch alle Buchhandlungen zu haben. Es umfasst, wie noch  
kein anderes vor ihm, die gesammte ärztliche Praxis, mit  
Einschluss der Chirurgie und Augenheilkunde, in-  
sofern diese nicht operative Fertigkeit erfordern, und fand  
eine so allgemein günstige Beurtheilung und Aufnahme,  
dass gleich nach seiner Vollendung eine zweite Auflage er-  
forderlich wurde. Wol wenige Werke von diesem Umfange  
können sich dessen rühmen! Nach einer kürzlich erfolgten  
Recension hat sich der Verfasser einen Denkstein der Un-  
sterblichkeit durch dasselbe gesetzt.

**Grundlehren der Chirurgie**

von Charles Bell. Aus dem Englischen von Dr.  
C. A. Mörer, bevorwortet von C. v. Gräfe, königl.  
preuss. Geh. Rathe, Generalstabarzt der Armee etc.  
2 Theile. Gr. 8. 1838. 3 1/2 Thlr.

Nach einer kürzlich erfolgten Beurtheilung hat der be-  
rühmte Verfasser dieses Buch in demselben Sinne geschrie-  
ben, in welchem Hufeland sein Enchiridion schrieb;  
er wollte ein Werk hinterlassen, das in gedrängter Kürze

das Resultat seiner langen Erfahrung enthält. Überall sind  
belehrende Winke, klare Ansichten, echt praktischer Geist  
sichtbar, und so kurz die mitgetheilten Lehren und Vor-  
schriften ausgedrückt sind, wird man sie doch überall an-  
wendbar und verständlich finden. Nicht um das Theoretische,  
sondern allein um kurze praktische Vorschriften war es dem  
Verfasser zu thun.

**Der Schrägschnitt.**

eine neue Amputations-Methode, nebst Erörterungen  
anderer die Amputationen betreffender Gegenstände,  
von Prof. Dr. E. Blasius. Mit 6 Kupfertafeln.  
1838. Gr. 4. Geheftet. 1 1/2 Thlr.

In meinem Verlage ist erschienen und in allen Buchhand-  
lungen zu haben:

**Forschungen**

auf dem

**Gebiete der neuern Geschichte.**

Herausgegeben

von

**H. A. Müller.**

Erste Lieferung: Kurfürst Johann Georg der Erste, seine  
Familie und sein Hof. Nach handschriftlichen Quellen des  
königl. sächs. Haupt-Staatsarchivs. Ein Beitrag zur Cul-  
tur- und Sittengeschichte des 17ten Jahrhunderts. Gr. 8.  
1 Thlr. 12 Gr.

Zweite Lieferung: Das Söldnerwesen in den ersten Zeiten des  
dreißigjährigen Krieges. Aus handschriftlichen Quellen des  
königl. sächs. Haupt-Staatsarchivs. Ein Beitrag zur Kriegs-  
und Sittengeschichte des 17ten Jahrhunderts. Gr. 8. 9 Gr.

**Dr. Fedor Platner.**

**Bemerkungen**

über das

**Quadratbein**

und die Paukenhöhle der Vögel. Mit 2 Stein-  
drucktafeln. Gr. 4. 20 Gr.

Der

**Ironbadour.**

Romantisches Gemälde aus dem letzten Viertel  
des 12ten Jahrhunderts

von

**Ernst von Brunnow.**

2 Bände. 8. 2 Thlr. 12 Gr.

Dresden, im October 1838.

**Gerhard Fleischer.**

**Wiederholung einer Übersetzungs-Anzeige.**

In der Unterzeichneten erscheint, gleichzeitig mit dem eng-  
lischen Original, eine Übersetzung von

**The Spirit of the East**

illustrated in a Journal of travels during  
an eventful period

by **D. Urquhart, Esq.**

London, Colburn.

Stuttgart und Tübingen, im October 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

In sämmtlichen Buchhandlungen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz ist vorräthig und zur Ansicht zu erhalten:

# Atlas.

## Zur Kunde fremder Welttheile.

Herausgegeben von August Lenzold.

**1838. Erster Band (halber Jahrgang).**

36 Bogen in großem Octav, prachtvoll gedruckt und mit Lithographien, Stahlstichen und Karten geschmückt.

Sauber broschirt. 3 Thlr. 12 Gr. Preuß., oder 6 Fl. Rhein.

Den Abnehmern der Fortsetzung dieses Werkes kann dieser Band, um die Anschaffung des Ganzen zu erleichtern, um einen enorm billigen, die Herstellungskosten kaum erreichenden Preis erlassen werden; ebenso können dieselben die Jahrgänge 1836 und 1837 in fünf Bänden (deren jeder einzeln 1 Thlr. 16 Gr., oder 2 Fl. 42 Kr. kostet) zusammengekommen für nur 5 Thlr., oder 3 Fl. 6 Kr. beziehen.

Wegen der belehrend-unterhaltenden Tendenz dieses Unternehmens, welches die Verlags-handlung durch prachtvolle Ausstattung und herrliche bildliche Beigaben noch besonders anziehend gemacht hat, kann dasselbe als eine vorzügliche Winterlecture sowohl als auch zu Weihnachtsgeschenken für die erwachsene Jugend mit Recht empfohlen werden. Es läßt sich vermuthen, daß die so sehr ermäßigten Preise zu häufiger Benutzung zu den erwähnten Zwecken veranlassen werden, weshalb um baldigste Bestellungen gebeten wird, um solche bei Zeiten ausführen zu können.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

## Das Pfennig-Magazin für Kinder.

1838. September. Nr. 35 — 39.

Nr. 35. \*Der Mais. \*Der Apostel Paulus. Der stählerne Labislaus, ein ungarisches Märchen. \*Der Thurmfall. Auflösung des Räthfels im vorigen Monat. — Nr. 36. \*Anubis. Der stählerne Labislaus, ein ungarisches Märchen. (Fortsetzung.) \*Zinnbrud. Die zärtlichen Strauße. \*Der Parforce-Jagdhund. — Nr. 37. \*Der Herzog von Wellington. \*Die feuerpeinenden Berge oder Vulkane. Der stählerne Labislaus, ein ungarisches Märchen. (Beschluß.) Der Serpentinstein. — Nr. 38. \*Die Birmanen. \*Der Paradiesvogel. Die Kaiser Ferdinand I. und Maximilian II. \*Die Zerichorose. Räthsel. — Nr. 39. \*Die Schiffbrüchigen. Die Johannisbeeren, von Agnes Franz. Eine Bettstelle von Krystall. \*Das Schnemmon. Der beschundene Hannes. \*Das sechsthige Kamm.

Die mit \* bezeichneten Aufsätze enthalten eine oder mehrere Abbildungen.

Preis dieses Jahrgangs von 52 Nummern 1 Thlr. — Der erste bis vierte Jahrgang kosten ebenfalls jeder 1 Thlr. Leipzig, im November 1838.

**F. A. Brockhaus.**

Bei Eduard Weber in Bonn ist soeben erschienen:

Das

## Nibelungenlied.

Übersetzt von

**Dr. Karl Simrock.**

Zweite Auflage.

In einem Octavbände von 384 Seiten. Auf Velinpapier. Gehftet 1 Thlr. 4 Gr. Cartonnirt 1 Thlr. 6 Gr.

Über die erste Auflage dieser anerkannten besten Übersetzung unseres Nationalpos, welche Goethe (Nachgel. Werke, V. S. 209), indem er „alle Deutsche zur Lesung dieses unsterblichen Gedichts“ auffodert, als eine „höchst willkommen“ begrüßt, äußert derselbe zugleich: „Der neue Bearbeiter ist so nahe als möglich Jelle vor Jelle beim Original geblieben. Es sind die alten Wörter, aber nur

erhehlt, eben als wenn man einen verdunkelten Steinis von einem Gemälde weggenommen hätte und die Farben in ihrer Frische uns wieder ansprächen. Wir wünschen diesem Werke viele Leser; der Bearbeiter, indem er einer zweiten Auflage entgegen sieht, wird wohl thun, noch manche Stellen zu überarbeiten, daß sie, ohne dem Ganzen zu schaden, noch etwas mehr ins Klare kommen.“ Dies ist nunmehr in dieser neuen Ausgabe so sehr geschehen, daß fast keine Strophe ohne wesentliche Verbesserung geblieben ist.

Moße das herrliche Gedicht, das schönste und großartigste deutsche Volksbuch, in dieser erneuten Gestalt sich immer mehr der Gunst der Deutschen aller Länder erfreuen!

Die äußere Ausstattung ist sehr anständig, der Preis, zum Zweck der allgemeinen Verbreitung, so daß dieses Buch in keinem Hause fehle, höchst billig.

Bei dem Verleger dieses Werkes ist ferner erschienen:

**Rheinfagen aus dem Munde des Volks und deutscher Dichter** für Schule, Haus und Wanderschaft. Von Dr. K. Simrock. Zweite vermehrte Auflage. 8. Mit einem Titellupfer. Cartonnirt. 1 Thlr. 12 Gr.

**Wieland der Schmied.** Deutsche Heldensage von K. Simrock. Nebst Romanzen und Balladen. 8. Geh. 1 Thlr.

In der Creutz'schen Buchhandlung zu Magdeburg erschien:

Naturhistorisches, botanisch-pharmaceutisches Lehrbuch für Ärzte, Apotheker, Droguisten und zum Gebrauch in Gewerbschulen von **C. G. Meerfeld.** Preis 2 Thlr. 18 Gr.

In alphabetischer Ordnung hat hier ein langjähriger Praktiker, dessen Name schon durch mehrere Schriften aus dem Gebiete der Pharmacie rühmlich bekannt ist, seine Erfahrungen mit Benutzung der neuesten Entdeckungen in der pharmaceutischen Waarenkunde niedergelegt, und ein Werk geliefert, dessen Gebrauch von entscheidendem Nutzen sein wird, und das ganz besonders Apothekern und Droguierhändlern mit Überzeugung empfohlen werden kann, um es ihren Gehülfen und Jünglingen als treuen Rathgeber in die Hand zu geben.

# Goethe's poetische und prosaische Werke

in  
**Zwei Bänden.**

Unter den schützenden Privilegien sämmtlicher Staaten des deutschen Bundes.

Mit acht Stahlstichen  
und einem Facsimile der Handschrift Goethe's.

Subscriptionspreis 14 Thlr., oder 24 Fl.

Wesentlich unterscheidet sich diese Ausgabe von allen früheren:

- 1) Durch übersichtliche Zusammenstellung und Aufeinanderfolge des Gleichartigen und Verwandten.
- 2) Durch vieles bisher Niegedruckte, das, wie eben gesagt, neuhinzugekommen, und zwar aus allen Gattungen der Poesie, namentlich Lieder, Distichen, Epigramme, Invectiven, Gedichte zum Divan; Fragmente vom ewigen Juden, von Hanswursts Hochzeit, von Tragödien, Singspielen und Romanen, Schema einer Fortsetzung der natürlichen Tochter und der Pandora; ein Lustspiel: Die Wette; endlich eine große Anzahl neuer Maximen und Reflexionen, sowie interessante biographische Einzelheiten, die theils in die Annalen eingeschaltet, theils einzeln abgedruckt worden.
- 3) Durch Angabe der Zeit, in welcher jede Production entweder entstanden, oder doch zuerst durch den Druck bekannt gemacht worden. Dieser Anzeige ist ein sehr genaues Inhaltsverzeichnis hinzugefügt, und das Neuhinzugekommene immer mit einem Sternchen bezeichnet.

**Der niedrige Subscriptionspreis bleibt nur bis Weihnachten d. J. noch offen; nach diesem Termin tritt ein verhältnißmäßig erhöhter Ladenpreis ein.**

Stuttgart und Tübingen, im October 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Soeben erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

**Trollope, Mrs. Fr., Vater, Mutter und Sohn, ein Roman aus Wien.** Deutsch von Dr. G. N. Wärmann. 3 Bände. 12. Velinpapier. Geh. 3 Thlr. 12 Gr.

**Der Herzlose.** Nach dem Englischen des H. Ran-kin, von Dr. G. N. Wärmann. 2 Bände. 8. Velinpapier. Geh. 2 Thlr. 16 Gr.

**Hoz, Oliver Twist,** oder die Laufbahn eines Waisenknaben. 1ster und 2ter Band. Mit 6 Federzeichnungen. 12. Velinpapier. 2 Thlr.

**Hoz, Leben und Abenteuer des Nikolaus Nickleby.** 1ster und 2ter Band. Mit 12 Federzeichnungen. 12. Velinpapier. Geh. 2 Thlr.

Braunschweig, den 20ten October 1838.

G. Westermann.

Bei F. H. Köhler in Stuttgart ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu erhalten:

## Anekdoten

von

Regenten, Staatsmännern, Feldherren und andern historischen Personen.

2tes, 3tes und 4tes Bändchen, à 6 Gr., oder 24 Kr.  
Den zahlreichen Kennern dieser mit so großem Beifall aufgenommenen Sammlung historischer Anekdoten wird die Nachricht vom Erscheinen dieser lange erwarteten Fortsetzung gewiß willkommen sein. (Das erste Bändchen erschien 1836.)

## Heinrich Heine's neuestes Werk.

Binnen Kurzem erscheint und ist durch alle Buchhandlungen von uns zu beziehen:

**SHAKSPEARE'S  
Mädchen und Frauen,**  
mit Erläuterungen

von

**H. HEINE.**

Prachtausgabe in Einem Bande, in gr. 8.

45 von den besten Künstlern in London gestochene Portraits, mit Text, enthaltend.

Preis 8 Thlr.

Die geistvollen Erläuterungen H. Heine's, reich an den anziehendsten Bemerkungen über die uns von Shakspeare vor-geführten weiblichen Charaktere, namentlich der Tragicolle, sichern an sich schon diesem prachtvollen Werke die günstigste Aufnahme in allen gebildeten Kreisen Deutschlands.

Von hohem Interesse wird Vielen die Einleitung des Buchs sein, wo der Verf. mit großer Freimüthigkeit seine Ansichten über die Leistungen Derrers auspricht, welche bisher die Erklärung Shakspeare's zum Gegenstande ihrer literarischen Arbeiten gemacht haben.

Leipzig, im November 1838.

**Brockhaus & Wenarius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXXXI.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

In meinem Verlage ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen vorrätig:

## Vollständiges Real-Lexikon der medicinisch - pharmaceutischen Naturgeschichte und Rohwaarenkunde.

Enthaltend:  
Erklärungen und Nachweisungen über alle Gegenstände der Naturreiche, welche bis auf die neuesten Zeiten in medicinisch-pharmaceutischer, toxikologischer und diätetischer Hinsicht bemerkenswerth geworden sind.

Naturgeschichtlicher und pharmakologischer Commentar jeder Pharmakopöe für Aerzte, Studierende, Apotheker und Droguisten.

Herausgegeben von

**Dr. EDUARD WINKLER.**

Ersten Bandes erstes Heft. Aal — Beringeria.  
Gr. 8. Auf gutem Druckpap. Subscriptionspreis 20 Gr.

Dieses Werk, das zwei Bände bilden und in Heften von 12 Bogen ausgegeben wird, dürfte einem seit langer Zeit lebhaft gefühlten Bedürfniss entsprechen; dasselbe ist mit Benutzung aller wichtigen Werke der ausgezeichnetsten Schriftsteller in diesem Fache und nach eignen Erfahrungen dem Stande der Wissenschaften genau bearbeitet worden.  
Leipzig, im November 1838.

**F. A. Brockhaus.**

Das soeben erschienene 4te Quartalheft von dem

## Freihafen.

Galerie von Unterhaltungsbildern.

Mit Beiträgen von  
den ausgezeichnetsten Schriftstellern  
Deutschlands.

8. Altona, Hammerich. Geh. 1 Thlr. 12 Gr.  
enthält: 1. Zum Gedächtniß Adolbert's von Chamisso. Von K. A. Wagnen von Ense. — 2. Der neue Phacelin, Novelle von Friedrich von Seyden. — Shakespeare als verlorner Sohn. Von H. Koenig. — 4. Über Goethe's Verhältnis zur Konstantin. Von Dr. Aug. Kahlert. — 5. Die neuesten

Schicksale der Hegel'schen Schule. — 6. Ungedruckte Beiträge zu der neuen Ausgabe von Lessing's Werken. — 7. Vorgänge und Zustände der Schweiz. (Auf diese aus der Feder eines der ausgezeichnetsten Publicisten der Schweiz stießenden Artikel, die in den folgenden Heften unserer Vierteljahrschrift ihre regelmäßige Fortsetzung erhalten werden, erlauben wir uns bei den gegenwärtigen Verhältnissen dieses Landes noch besonders hinzuweisen.) — 8. Verschiedene kleinere Artikel in den Literatur- und Correspondenzblättern.

Die allgemeinste Anerkennung und die lebhafteste Theilnahme, welche diese, durch ihren Inhalt ausgezeichnete Zeitschrift gefunden, ermutigt die Redaction auf die begonnene Weise fortzufahren. Das erste Heft des **Freihafens** für 1839 befindet sich bereits unter der Presse.

Gämmtliche Buchhandlungen Deutschlands u. s. w. haben stets den **Freihafen** vorrätig.

## Ramayana.

Soeben ist erschienen und durch alle solide Buchhandlungen von dem Unterzeichneten zu beziehen:

## RAMAYANA

id est

carmen epicum de Ramae rebus gestis poetae antiquissimi Valmici opus. Textum codd. mss. collatis recensuit, interpretationem latinam et annotationes criticas adiecit

**Augustus Guilelmus a Schlegel.**

Vol. I. Pars 2<sup>a</sup>

Vol. II. Pars 1<sup>a</sup>

Smaj. Bonnæ, 1838.

Die geehrten Subscribenten wollen diese Bände gegen Zahlung des Subscriptionspreises von 14 Thalern für Vol. II, P. 1, 2 (2 wird bald nachgeliefert), in derselben Prachtausgabe auf seinem starken Belpapier wie Vol. I, P. 1, bei ihren resp. Buchhandlungen in Empfang nehmen.

Der bisherige Subscriptionspreis von 14 Thalern für jeden aus zwei Theilen bestehenden Band dauert noch fort.  
Bonn, im October 1838.

**Eduard Weber.**

Bei Eduard Anton in Halle ist soeben erschienen:

Leo, Dr. Heinr., **Lehrbuch der Universalgeschichte** zum Gebrauche in höhern Unterrichtsanstalten. Erster Band. Die Einleitung und die alte Geschichte enthaltend. Zweite Auflage. Gr. 8. 38 Bogen. Preis 2 Thlr. 12 Gr.

—, **Leitfaden für den Unterricht in der Universalgeschichte.** Dritter Theil. Gr. 8. 18 $\frac{1}{2}$  Bogen. Preis 16 Gr.

(Vorläufige Ankündigung.)

## Allgemeine Geschichte der neuesten Zeit,

vom  
Abschluß des ersten pariser Friedens  
bis

auf unsere Tage.

Nach dem frühern Werke umgearbeitet, vermehrt und  
fortgesetzt, mit besonderer Rücksicht auf die Geschichte der  
außereuropäischen Welttheile, und die Religions- und  
Kirchen-, Literatur- und Kunst-, Handels- und Indu-  
strie-Geschichte dieses Zeitraums

von  
**Ernst Münch.**

Gr. 8.

Der nähere Prospectus über dieses Werk, welches mit der  
unlängst vom Literat.-Comptoir in Stuttgart angekündigten  
zweiten wohlfeilen Ausgabe der frühern Arbeit und den (mit  
dieser letzten in Zusammenhang gebrachten, von dem Verfasser  
unveranlaßten) Kottenkamp'schen Supplementen nicht zu ver-  
wechseln ist, wird demnächst folgen, und durch alle Buchhand-  
lungen Deutschlands und des Auslandes versendet werden.

## Für Theologen und gebildete Freunde christlicher Wissenschaft und Erbauung.

Soeben ist vollständig erschienen:

## Die Dritte Auflage des Handbuchs der Kirchengeschichte.

Von  
**H. C. F. Guericke, Th. Dr.**

Ausgabe in 12 Hefen.

Preis jedes Heftes 8 Gr. (10 Sgr.)

Nach einem Zeitraum von noch nicht einem Jahre ist  
die zweite Auflage von Guericke's Handbuch der Kir-  
chengeschichte vergriffen, und eine dritte, welche wir  
hiermit dem Publicum vollständig übergeben, nothwendig  
geworden.

Über den Charakter und die Vorträge dieses Werkes erlau-  
ten wir uns nachstehend einige Andeutungen.

Guericke's Kirchengeschichte ist nicht allein für den  
gelehrten Theologen, für Theologie Studierende, sowie für solche,  
welche es wieder einmal sein wollen, sondern auch hauptsächlich  
für jeden gebildeten Freund der Theologie bestimmt. Eine  
klare und übersichtliche, bündige und doch vollständige Darstel-  
lung der Thatfachen und deren Entwicklung führt die Leser in  
ein lebendiges Verständniß der allgemeinen Kirchengeschichte ein,  
und es möchte in den verschiedenen Zweigen der theologischen  
Wissenschaften nicht leicht ein Werk gefunden werden, welches  
in gleich hohem Maße den Anforderungen des gelehrten Lesers  
wie des gebildeten Freundes christlicher Wissenschaft und Er-  
bauung entspräche.

Den Blick der Lesern auf das Unternehmen hinzulenken  
und ihrer Theilnahme dasselbe noch besonders zu empfehlen,

dessen wir es bei der weiten Verbreitung des Buches an den  
meisten Orten nicht mehr bedürfen; wo dasselbe aber bisher  
noch nicht näher bekannt, so hoffen wir, so hoffen wir, bald  
theilnehmende und zahlreichere Leser um sich her sammeln.

Der höchst billige Preis jedes Heftes in Umschlag ist 8 Gr.  
(10 Sgr.) Der Druck ist scharf und deutlich und auf weißem  
Papier ausgeführt.

Halle, im October 1838.

Noch empfehlen wir der Beachtung des theologischen Publicums  
folgendes im vorigen Jahre in unserm Verlage erschienene  
wichtige Werk:

## Philipp Jakob Spener's deutsche und lateinische theologische Bedenken.

In einer zeitgemäßen Auswahl

herausgegeben von

**F. A. C. Hennicke.**

Gr. 8. Preis 1 Thlr. 12 Gr.

Die theologische Literatur besitzt von Spener nichts, was  
so bedeutend wäre als diese Gurachten, in welchen die wich-  
tigsten Angelegenheiten des innern und äußern Christenlebens,  
der Kirche und des Predigtamts zur Sprache kommen, und  
welche als ein Anhang oder als eine Sammlung von Belegen  
zu Hopsbach's Schrift über P. J. Spener und seine Zeit  
angesehen werden können.

Damit die obige Auswahl auch für ungelehrte Leser zu-  
gänglich sein möchte, so ist aus den lateinischen Bedenken, deren  
Inhalt übrigens fast ganz in den deutschen vorkommt, ver-  
hältnismäßig nur Weniges ausgehoben worden.

Halle, im October 1838.

Gebauer'sche Buchhandlung.

Soeben ist erschienen:

Geschichte und System der Platoni-  
schen Philosophie von Dr. Karl Fr.  
Hermann, ordentl. Professor der Philologie  
an der Universität zu Marburg. Erster  
Theil, die historisch-kritische Grund-  
legung enthaltend. (In 3 Lieferungen.)  
Gr. 8. 2 Thlr. 20 Gr.

Um das Buch schneller in die Hände der zahlreichen  
Besteller zu bringen, hat uns der Herr Verfasser gestattet,  
diesen ersten Theil in 3 Lieferungen auszugeben, wovon  
2 bereits an alle gute Buchhandlungen versandt sind. Die  
unter der Presse befindliche 3te Lieferung wird jedenfalls  
vor Schluss dieses Jahrs noch fertig und versichert.

Inhalt: Buch I. Plato's Lebensentwicklung und Verhält-  
niß zur Aussenwelt. Buch II. Plato's Verhältniß zu dem  
philosophischen Standpunkte seiner Zeit und Einfluss die-  
ses auf seine Lehre. Buch III. Plato's schriftstellerischer  
Nachlass als Quelle seines Systemes gesichtet und geordnet.  
Heidelberg, im October 1838.

Akademische Verlagsbuchhandlung von  
**C. F. Winter.**

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

## Genrebilder.

Nach dem Leben gezeichnet

von

**Junia Romäna.**

2 Bände. Broch. 2 Thlr., oder 3 fl. 36 Kr.

N. G. Erwert in Marburg.



# Der Cid mit Holzschnitten.

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden:

## Der Cid.

Nach spanischen Romanzen  
besungen durch

**Johann Gottfried von Herder.**

**Illustriert durch 70 Holzschnitte,**

nach Zeichnungen von Eugen Neurenther

geschnitten von den besten englischen Holzschnайдern:

*Thompson, Orrin Smith, Williams, Gray, Wright, Folkard etc.*

Erste Lieferung. Bogen 1—8.

Diese Prachtausgabe des unsterblichen Gedichtes erscheint auf dem feinsten Velinpapier in vier Lieferungen je zu 7—8 Bogen. Der Preis jeder Lieferung ist 1 Thlr., oder 1 fl. 36 Kr. Rhein. Das Ganze wird im Laufe dieses Jahres beendet werden.

Stuttgart und Tübingen, im October 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**

Das in der Creuz'schen Buchhandlung in Magdeburg  
erschienene Werkchen:

Die Vor- und Nachsyben der deutschen Sprache, bear-  
beitet von J. F. Meyer (Lehrer am Doimgymna-  
sium zu Magdeburg). Preis 18 Gr.

verdient die Berücksichtigung eines jeden Lehrers der deutschen  
Sprache, der mehr als das rein Mechanische beachtet, und es  
haben sich nicht nur Disterweg in seinem Lehrgang der deut-  
schen Sprache, und Heyse im ausführlichen Lehrbuch der deut-  
schen Sprache, sondern auch ein Recensent in der Hall'schen  
Literaturzeitung, 1837, Nr. 36, darüber auf das entscheidend  
Günstigste ausgesprochen.

Einem neuen Beweis seiner Thätigkeit und als Frucht lang-  
jähriger Erfahrungen hat der Verfasser dargelegt in der ge-  
genwärtigen Herausgabe eines Werkchens, unter dem Titel:  
Deutsche Grammatiken für Gymnasien von J. F.  
Meyer. Preis 18 Gr., und in Partien über 12  
Stück 15 Gr.

von welcher zu erwarten ist, daß es vielen gelehrten Schulen  
eine ebenso willkommene Erscheinung sein wird, als es dem  
hiefigen Doimgymnasium war, wo es sogleich für die 6te bis  
3te Classe eingeführt wurde.

In unserm Verlage ist erschienen:

**Adelbert von Chamisso's Werke.**

4 Bände in gr. 12.

Velinpapier. In Umschlag geheftet. Mit Chamisso's  
Portrait, vier tabirten Blättern von Adolff Schroeder u. s. w.  
Preis 4 Thlr. 15 Gr.

Leipzig.

Weidmann'sche Buchhandlung.

Bei Tenzler und Schaefer, Buchhändler in Wien,  
sind soeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu  
haben:

Thaliens Spenden von Herzogskron. Auch unter dem Ti-  
tel: Dramatische Kleinigkeiten. 8ter Band, enthaltend:  
Das Geschenk des Fürsten — Seraphine — Der Fußschmid.  
8. In Umschlag broschirt. 21 Gr.

Kanger, J., Neue Erzählungen und Humoresken. 2 Bänd-  
chen. Mit Titelliefer. 8. In Umschlag broschirt. 2 Thlr.  
Schilling, A., Reisepersen, Novellen: Der Alchymist — Das  
Zimmer eines Improvisators — Natur und Gutta — An-  
tonio Negro — Emmy. Mit Titelliefer. 8. In Um-  
schlag broschirt. 20 Gr.

Früher erschienen:  
Tollb, Fr. A., Abendstunden, Erzählungen und Novellen.  
6 Bändchen. 8. 1836. In Umschlag broschirt. 3 Thlr.  
Stegmayer, C., Klänge aus der Aue, bergmännische Ge-  
dichte und Aphorismen. Mit dem Bildnisse des Verfassers.  
2te verbesserte Ausgabe. 8. 1836. Broschirt. 12 Gr.  
Braun v. Braunkthal, Phantasie- und Thierfide. 8. 1836.  
Broschirt. 16 Gr.

Thielen, F. W., Neueste Erzählungen und Novellen. Nach  
dem Französischen des Victor Hugo, Alexander Dumas,  
George Sand u. A. 2 Bände. 8. 1835. Broschirt. 1 Thlr.  
8 Gr.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:  
Repertorium der gesammten deutschen Literatur. Her-  
ausgegeben von E. G. Gersdorf. 1838. Acht-  
zehnten Bandes erstes Heft. (Nr. XIX.) Gr. 8.  
Preis eines Bandes 3 Thlr.

Leipzig, im November 1838.

**F. A. Brockhaus.**

## Illustrirte Ausgaben.

**Laurent**, Histoire de Napoléon, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Un vol. Gr. in-8.

Mit 500 dem Text eingebrachten Zeichnungen in Holzschnitt von **Horace Vernet**. (Unter der Presse.)

**Le Sage**, Histoire de Gil Blas de Santillane, ornée de 600 desins par **Gigoux**. 2<sup>me</sup> édition. Un vol. Gr. in-8. 15 Fr.

**Molière**, Œuvres complètes, précédés d'une notice sur sa vie et des œuvres par **Sainte-Beuve**; avec 800 dessins de **Johannot**. 2 vols. Gr. in-8. 30 Fr.

**Cervantes**, Don Quichotte. Traduction nouvelle par **Louis Viardot**; ornée de 800 dessins de **Johannot**. 2 vols. Gr. in-8. 30 Fr.

Les Evangiles. Traduction de **Le Maître de Sacy**. Edition illustrée par **Th. Fraugourd**. Un vol. In-8. 18 Fr.

Wir machen auf ein **Fest** ausführlicher Anzeigen dieser Prachtwerke aufmerksam, welches Proben des eleganten Drucks sowohl als der meisterhaften Ausführung der Abbildungen enthält und gratis von uns zu beziehen ist.

Leipzig, im November 1838.

**Brockhaus & Wenenarius**,

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

In **Karl Gerold's Buchhandlung in Wien** ist soeben erschienen und daselbst, sowie in allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

## Leitfaden zum Unterrichte chirurgischer Lehrlinge und zur Bildung chirurgischer Gehülfen.

Von  
**F. W. Arming**,

Magister der Chirurgie und der Geburtshülfe, k. k. Kreiswundarzte und Operateur, wie auch Obervorsteher des chirurgischen Gremiums des Trauteneises in Hirschel ob der Gasse, correspondirendem Mitgliede der Preussisch-medicalisch-chirurgischen Gesellschaft zu Berlin.  
Wien 1839.

Gr. 8. In Umschlag geh. Preis 1 Thlr. 8 Gr. Säch.

Bei einem Reichthume an Werken aller Art fehlte in der medicinisch-chirurgischen Literatur bisher immer noch ein zweckmäßiges Handbuch für die chirurgischen Lehrlinge und Gehülfen, in welchem alles dieses zu wissen Nöthige dergestalt faßlich zusammengefaßt ist, daß es dem Lehrhern zu einem genügenden Anhaltspunkte bei dem Unterrichte seines Lehrlings diene, und diesem zu einem leicht verständlichen Lehrbuche während seiner Lehrzeit, zu einer Vorbereitung für die zu seiner Freisprechung vorgeschriebene Prüfung, und zu einem nützlichen und treuen

Gefährten in seinem fernern Wirken als Gehülfe eines Wundarztes werde.

Diesem fühlbaren Bedürfnisse hat der Verfasser durch die Bearbeitung dieses Leitfadens vollkommen abgeholfen. Für das Gelingen dieser umfassenden Arbeit spricht der Name des durch seine literarischen Arbeiten rühmlichst bekannten Verfassers, wie auch, und ganz besonders der Umstand, daß Er, hochwohlgeboren, Herr J. R. Ebl. v. Raimann, erster Leibarzt Sr. k. k. Majestät, k. k. wirkl. Rath, Director des med. chirurg. Studiums u. c., die Widmung dieses Wertes genehmigte.

Bei **Joh. Fr. Hartknoch** in Leipzig ist eben neu erschienen und in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes vorrätig:

## Schweizer-Skizzen

von  
Verfasser des deutschen Studenten, der  
Deutsche in Paris u.

8. Geh. 15 Bogen auf seinem Vellinpapier. 1 Thlr. 8 Gr. — 1 Thlr. 10 Gr. — 2 Fl. 24 Kr. Rhein. — 2 Fl. Conv.-M.

## ist die Klage

über  
Verarmung und Nahrungslosigkeit  
in Deutschland gegründet,

welche  
Ursachen hat das Uebel und welche Mittel  
bieten sich zur Abhülfe dar?

Von  
**Fr. Aug. Benedict**,

königl. preuss. Landgerichtsrathe in Wittenberg.  
Gr. 8. Geh. 10 Bogen auf weißem Druckpapier. 18 Gr. — 22½ Gr. — 1 Fl. 21 Kr. Rhein. — 1 Fl. 8 Kr. Conv.-M.

über  
die neuesten Darstellungen und Beurtheilungen  
der  
**Schbart'schen Philosophie**

von  
**G. Hartenstein**,  
ordentl. Professor der Philosophie an der Universität zu Leipzig.  
Gr. 8. Geh. 9½ Bogen auf weißem Druckpapier. 18 Gr. — 22½ Gr. — 1 Fl. 21 Kr. Rhein. — 1 Fl. 8 Kr. Conv.-M.

**Snell's Anfangsgründe der Physik**. Vierte verbesserte und vermehrte Auflage, von Dr. Koch in Gießen. 2te und letzte Lieferung.  
Wird in kürzester Zeit die Presse verlassen.

## La Russie pittoresque.

Geben wurde von **Weise** und **Stoppani** in Stuttgart verfaßt und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

## La Russie pittoresque,

sous la direction de  
**M. Jean Czyski**.  
24 vignettes de **M. J. B. Gatti**.  
TOME PREMIER.  
Paris, imprimerie de Wittersheim.  
Royal-8. Preis 2 Thlr. 6 Gr.

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXXXII.

Dieser literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brochhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

Bei mir ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

**Citner (Karl),**

## Der moderne Lazarus.

Eine Zeit- u. Novelle.

8. Geh. 2 Thlr.

Leipzig, im November 1838.

**F. A. Brochhaus.**

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden:

### Vorlesungen

über die Geschichte der Poesie,  
gehalten zu Dresden und Berlin im Jahr 1837  
von

**C. Kortlage.**

Gr. 8. Preis 2 Thlr., oder 3 Fl. 12 Kr.

Der Verfasser gibt hier den Versuch einer vergleichenden Charakteristik der poetischen Ideale aller Zeiten und Völker, und einer darin enthaltenen Gränzmessung der poetischen Entzückungen selbst durch eine vollständige, gebrängte und möglichst starke Reproduktion der Gefühlsweise jeder poetischen Epoche, und durch eine Gegenüberstellung des poetischen Lebens in allen seinen Höhenpunkten, wo es wie ein mächtiger Frühling auf den unbefangenen Geist eindringt. Dadurch, daß so die poetischen Ideale in ihren eigenthümlichen Contrasten gegen einander treten, wiegen sie sich gegen einander nach der Schwere ihres innern Gewichts, mit dem sie als leidenschaftliche bewogende Kräfte ebenso viele Volksscharen entflammten und besetzten, und sich so auch thätig in der Weltgeschichte einander aufzuwiegen, die Stange hielten und bekämpften.

Stuttgart und Tübingen, im October 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**

### Oestreichische militairische Zeitschrift. 1838.

Neunter Heft.

Dieses Heft ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden.

Inhalt: I. Die Bestürmung von Warschau am 6ten und 7ten September 1831. Mit dem Plane des Schlachtfeldes. II. Der Insurrectionskrieg in Spanien 1822 und 1823 mit besonderer Berücksichtigung der Ereignisse in Catalonien. III. Die Operationen der verbündeten Heere gegen Paris im März 1814. (Fortsetzung.) Die Südamree vom 24ten März bis zum Ende des Krieges. IV. Die Feldzüge Rußlands gegen die Türken in den Jahren 1834 und 1835. (Schluß.) V. Literatur. VI. Neuße Militairveränderungen.

Der Preis des Jahrgangs 1838 von 12 Heften ist wie der aller frühern Jahrgänge von 1818—37 jeder 2 Thlr. Sächsl.

Die Jahrgänge 1811—13 sind in einer neuen Auflage in vier Bänden vereinigt erschienen und kosten zusammen eben-

falls 8 Thlr. Sächsl. Wer die ganze Sammlung von 1811—37 auf einmal abnimmt, erhält dieselbe um  $\frac{1}{4}$  wohlfeiler.

Von dem Unterzeichneten ist diese Zeitschrift durch alle Buchhandlungen um die genannten Preise zu beziehen.

Wien, den 9ten November 1838.

**J. G. Heubner,**  
Buchhändler.

Soeben ist der 2te Band von den

## Erinnerungen aus meinem Leben.

Bum Theil Studienbilder

für

Cavalieroffiziere, Stallmeister, Bereiter, Pferde-  
ärzte, Pferdehändler, Pferdehändler und jeden Ken-  
ner und Freund der Pferde

von

**J. von Tennecker,**

königl. sächsl. Major der Reiterei, Stallmeister und Oberpferdearzt,  
des königl. sächsl. Civilverdienstordens Ritter u.

8. Altona, Hammerich. Geh. 1 Thlr. 12 Gr.  
erschieden.

Mit dem freudigsten Erstaunen sehen wir aus der Feder des Herrn Majors von Tennecker, welcher bisher für die Thierheilkunde mit so vieler Auszeichnung thätig gewesen, die anziehendsten, belehrendsten und selbst romantischsten Erzählungen, die alle Begut auf des Verfassers vielbewegtes Leben haben, hervorgehen.

Dieser 2te Band enthält unter Anderm die Geschichte des alten Stallmeisters von Kammergeier, welche selbst dem vermöhten Geschmac eines Romanlesers genügen wird.

Sämmtliche Buchhandlungen haben dies interessante Werk vorrätig.

### Weihnachtsgeschenk für fleissige Schüler.

In der J. Palm'schen Verlagsbuchhandlung in Landshut ist erschienen und in allen guten Buchhandlungen zu haben:

### Histoire de Gil Blas de Santillane

par Le Sage. Arrangée pour la jeunesse par L. de Taillez, Dr. et Prof. etc. Druckpapier 21 Gr., oder 1 Fl. 30 Kr. Velinpapier 1 Thlr. 3 Gr., oder 1 Fl. 48 Kr.

Bei dem Mangel an guten französischen Jugendschriften ist es gewiß ein sehr dankenswerthes Verdienst des würdigen Bearbeiters, diesem trefflichen Werke eine dem jugendlichen Alter angemessene Gestalt gegeben zu haben. Wie sehr es ihm gelungen ist, beweist die bereits geführte Einführung unsers Gil Blas de la jeunesse in mehren Lehranstalten. Derselbe kann Altern und Erziehern als passendes Weihnachtsgeschenk für die Jugend, und Schulkorrekturen als Prämienbuch für fleissige Schüler mit vollem Rechte empfohlen werden.

# Ankündigung.

## Die Bibel,

oder die ganze

## Heilige Schrift

alten und neuen Testaments.

Dr. Martin Luther's Übersehung,

nach dem Grundtext berichtigt.

Luther's Bibelübersehung, der von Gott dem deutschen Volke gegebene heilige Schatz, soll ihm auch bewahrt bleiben, und keine deutsche Bibel, die eine ganz andere Übersehung wäre, darf, kann und wird je an die Stelle treten. Aber unter denen, die das mit vollem Rechte behaupten, sind doch in neuester Zeit Viele, um nicht zu sagen Alle, darüber einig geworden, was einst schon A. S. Francke bescheidenlich nachwies: daß an dem herrlichen Ganzen sich einzelne Mängel finden, nach jetziger Wissenschaft noch nicht richtig übersezt worden, nach jetziger Sprache nicht mehr deutlich, gewandt oder anständig genug geredet wird. Ob dieser Mängel im Verhältniß wenig oder viele seien, ob ihre Besserung dringend noth thue oder nicht, endlich durch wen und auf welchem Wege solche Berichtigung der deutschen Volks- und Kirchenbibel geschehen und gültig werden könne: darüber ist die Meinung getheilt und die Verhandlung in lebhaftem Fortschritt.

Dr. J. J. von Meyer ist der Erste und bis jetzt Einzige, welcher den allein ausführbaren Gedanken, Luther's Bibel im Ganzen zu bewahren durch nöthige Fortbildung im Einzelnen, wirklich seinerseits ausgeführt und uns eine berichtigte deutsche Bibel dargeboten hat. Dieser seit 1818 zuerst als Beiblwerk mit Anmerkungen, sodann auch ohne dieselben als eigentliche Volksbibel in mehreren Auflagen erschienene Bibeltext hat sich natürlich eine große Beachtung erworben. Er wird von den Einen eifrig empfohlen, wie von Vielen schon mit Segen gebraucht, von den Andern in mancherlei Weise, meist ohne genau's Eingehen aus vorgefaßten Meinungen getadelt und bekämpft; doch bleibt er jedenfalls die einmal gegebene Grundlage alles Weiteren, das in der hochwichtigen Angelegenheit geschehen könnte.

Es handelt sich dabei nicht um die Anmerkungen des für sich bestehenden, einem engern Kreise bestimmten Bibelwerks, sondern einzig um den berichtigten deutschen Text, dessen bisherige zwei Auflagen gänzlich vergriffen sind. In unserm Verlage soll nun eine neue Ausgabe desselben erscheinen, nicht, wie früher, in großem, sondern in dem mittlern Format gewöhnlicher Volks- und Schulbibeln. Eine abermalige genaue Revision des Ganzen von Seiten des Berichtigers wird diese Ausgabe zu einer wahrhaft neuen, verbesserten erheben, und so das Beste darstellen, was derselbe mit gewissenhafter Beachtung alles jetziger wieder Gewonnenen und Verhandelten jetzt zu liefern vermag.

Es ist und bleibt Luther's Bibelübersehung, aber eine in ihrem eignen Ton und Geist nach dem Grundtext berichtigte, ein neben weit aussehendes und uneinigen Vorschlägen einwilligen fertiges Werk, das wir hiermit allen unbefangenen Freunden des reinen Wortes Gottes ankündigen und darbieten. Wie denen, die gründlich prüfen und über etwaige Verbesserung des vorliegenden Anfangs mittheilen wollen, zum gewis unentbehrlichen Befehl, so noch mehr Allen, welche nicht länger aus Ungewisse warten, sondern die vorzuziehende gereinigte Bibel jetzt schon mit dankbarem Vertrauen sich

aneignen wollen, zum fernern gesegneten Gebrauch. Damit für die Lesern diese Bibelausgabe, die einen Vorzug behauptet, nicht sonst irgendwie gegen die gewöhnlichen lutherischen im Nachtheil bleibe, so sind nun auch, von einer andern Hand als der des Berichtigers, doch mit dessen völligem Einverständnis, dem Texte die gebräuchlichen Parallelen beigelegt. Nicht etwa ein Abdruck der mitunter sehr mangelhaften und im Argen liegenden Parallelen = Ausstattung, welche die andern Bibeln seit Langem ohne gründliche Revision fortplanzen, sondern eine ganz neu und selbständig geordnete Auswahl, wie sie dem verbesserten Texte entspricht und an vielen Orten, namentlich auch was die von Meyer fast erst wörtlich hergestellten Apokryphen angeht, durch den jetzigen Text erst möglich wird. Wobei endlich noch zu bemerken ist, daß nur diejenigen apokryphischen Bücher und Stücke, welche die alte lutherische Bibel enthält, sich hier wiederfinden.

Die so ausgestattete berichtigte Volksbibel wird binnen Jahresfrist erscheinen, und wir empfehlen das Unternehmen im Voraus mit der Versicherung, daß wir nicht allein für die größte Correctheit und für ein anständiges Äußere gewissenhaft Sorge tragen, sondern auch Bedacht nehmen werden, den Preis so niedrig als nur irgend möglich zu stellen.

Das Nähere hierüber behalten wir uns vor, zur Zeit der Erscheinung öffentlich bekannt zu machen.

Halle, im September 1838.

C. A. Schwetschke und Sohn.

Bei Goedsche in Meissen ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## Psychische Heilmittellehre für Ärzte und Psychologen

bearbeitet von

Dr. Bräunlich.

Gr. 8. Preis 1 Thlr. 12 Gr.

Jedem Psychologen und vor allem jedem denkenden Arzte dürfte unbestreitbar dieses neueste Werk des bereits rühmlichst bekannten Verfassers reichen Stoff zu fruchtbringendem Nachdenken geben. Klar ist in ihm nachgewiesen, wie jedwede geistige Thätigkeit des Menschen unter bestimmten Verhältnissen bei körperlichen wie psychischen Krankheiten als Heilmittel erkannt und benutzt werden kann, und was einzelne Schriftsteller vergangener und gegenwärtiger Zeit einzeln kaum andeuteten, findet sich hier zu einem systematischen Ganzen vereinigt, sodaß durch das Werk selbst eine bedeutende Lücke in der medicinischen Literatur ausgefüllt erscheint.

Von der schon früher angekündigten und durch Subscription bereits vielfach verbreiteten:

## Weltgeschichte in vier Tableaus von F. Wesenfeld. Imperialfolio. Colorirt nach den Epochen.

ist soeben das erste Tableau erschienen und in allen Buchhandlungen für 10 Gr. zu bekommen. Die 3 folgenden sind bereits im Druck und werden zusammen baldigst nachgeliefert.

Diese bequeme tabellarische Übersicht, besonders auf den trefflichen Grundriß der Weltgeschichte von Dr. C. A. Schmid basirt, welcher fast in allen preussischen Lehranstalten eingeführt ist, wird in ihrer ansprechenden, eleganten Ausstattung des verdienten Beifalls nicht verfehlen, und, eine schnelle und klare Übersicht der Weltbegebenheiten gewährend, beim Studiren und zum Wiederholen eine willkommene Erleichterung sein.

Creutz'sche Buchhandlung zu Magdeburg.

## (Schilling's Harmonielehre.)

Im Verlage der Unterzeichneten erschien soeben und wurde an alle Buchhandlungen versandt:

# POLYPHONOMOS

oder die Kunst

in 36 Lektionen sich eine vollständige Kenntniss der musikalischen Harmonie zu erwerben.

Ein Lehrbuch,

zugleich zur Weckung und Förderung einer echten musikalischen Bildung,

von

**Dr. Gustav Schilling,**

mehrer gelehrten und musikalischen Gesellschaften Mitgliede.

Etwa 50 Bogen. Gr. 8. Subscriptionspreis für das Ganze 3 Thlr., oder 3 Fl. 24 Kr.

Erste Lieferung. 12 Bogen. Subscriptionspreis 18 Gr.

Dies schöne Werk hat schon vor seinem Erscheinen durch zahlreiche verehrliche Subscribenten so außerordentlichen Beifall gefunden, daß die Verleger weitere Anpreisungen desselben verschmähen müssen.

Wir bitten daher nur diejenigen Freunde der Musik, welche sich das Ganze der Harmonielehre auf die leichteste, angenehmste und wohlfeilste Weise zu eigen machen wollen, sich die erste Lieferung des obigen Werkes (welcher ein ausführlicher Prospectus beigebrückt ist) von der nächstgelegenen Buchhandlung zur Einsicht kommen zu lassen und selbst den Werth des Werkes zu prüfen.

Stuttgart, im October 1838.

**Weise & Stoppani.**

Bei J. E. Schaub in Düsseldorf ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Erfahrungen aus dem Gebiete der

## Thier - Heilkunde,

oder Anweisung zum Gebrauche echt specifischer, durch mehrjährige Prüfung bewährter homöopathischer Heilmittel

gegen die am häufigsten vorkommenden Krankheiten der Haus- und Nutzthiere. Von einem praktischen

Landwirthe.

88 Seiten in 8. Preis 9 Gr.

Diese kleine Schrift enthält in bündigster Kürze die praktischen Verordnungen zum Gebrauche von funfzig der bewährtesten Mittel gegen die am häufigsten vorkommenden Krankheiten der Nutz- und Hausthiere, und empfiehlt sich besonders Landwirthen zur leichten und schnellen Heilung ihrer erkrankten Thiere.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

**Arago, Populaire Vorlesungen über die Astronomie, gehalten auf der Königl. Sternwarte zu Paris. Deutsch bearbeitet von Dr. C. F. Schnuse. Mit 2 Foliotafeln. 8. 20 Gr.**

Arago's Verdienste im Gebiete der Astronomie sind bekannt. Nur Das mag hier bemerkt werden, daß dieser große Mann zugleich die seltene Gabe besaß, auch die abstractesten Gegenstände mit der größten Deutlichkeit und Eleganz zur Darstellung zu bringen. Die wichtigsten Lehren der Astronomie hat er ohne

die eigentliche mathematische Form in einen so klaren, aber wissenschaftlichen Vortrag zu fassen gewußt, daß das genannte Werk jedem Gebildeten (auch Damen) die zweckmäßigste Belehrung in dieser sublimen Wissenschaft in möglichster Kürze darbietet.

## Empfehlungswerthe Festgeschenke!

Bei Schelb & Comp. in Leipzig ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

### Weihgeschenk

## für deutsche Jungfrauen

in Briefen an Selma über höhere Bildung von **Chr. Defer.**

Gr. 8. Elegant cartonnirt. Preis 1 Thlr. 12 Gr.

Von demselben Verfasser:

### Die guten Mädchen

oder der Pfarrer von Lindenheim und seine Kinder.

Ein Lesebuch für Mädchen von 12—15 Jahren, mit eingestreuten Novellen, Schauspielen und Gedichten. Mit 1 Kupfer. Elegant cartonnirt. Preis 1 Thlr. 8 Gr.

Bei G. Bethge in Berlin ist erschienen und durch jede Buchhandlung zu bekommen:

**Calvini, J.** Commentarius in Genesis ed. **Hengstenberg.** 2 Tomi. 2 Thlr.

**Kimchi, Rabbi Dr.,** Radicum liber sive Hebraeum Bibliorum Lexicon. Textum ex duorum manuscriptorum atque editorum omnium librorum auctoritate denuo recognitum, interpunctione distinctum, Bibliorum locis ad capitum versusque numerum et Rabbinorum ad tractatum et paginarum titulum accurate citatis, triplice denique appendice instructum edd. **J. H. Biesenthal et F. S. Lebrecht.** Fasc. 1. Subscriptionspreis 1 Thlr. 18 Gr.

**Neuterdaahl, Dr. H.,** Geschichte der Schwedischen Kirche. Aus dem Schwedischen von Dr. Mayerhoff. 1ster Theil: Aengarius oder der Anfangspunkt des Christenthums in Schweden. 20 Gr.

**Ratke, Prof.,** Die biblische Theologie, wissenschaftlich dargestellt. 1ster Band: Die Religion des alten Testaments nach den kanonischen Büchern entwickelt. 1ster Theil. 3 Thlr.

Soeben ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

**Verzeichniß der Concilien, welche sich in der Sammlung von H. C. Anton befinden, herausgegeben von dem Besizer. Halle, C. Anton. Gr. 4. Geh. 1 Thlr. 10 Sgr.**

Bei der Anordnung dieses Verzeichnisses wurde im Allgemeinen das Lamarck'sche System zu Grunde gelegt, zugleich aber versucht, durch Berücksichtigung der Übergänge von Gattungen und Arten, durch Gruppierungen der Arten, sowie durch Citate von Abbildungen und Aufnahme der Synonymen diesen Katalog für Sammler u. s. w. möglichst brauchbar zu machen. Er umfaßt 8410 Arten, von denen 343 neu und darum hier beschrieben sind.

# Subscription

auf

## Johannes v. Müller's Weltgeschichte

in Einem Band.

Mit dem Bildniss des Verfassers in Stahlstich.

Das anerkannt ausgezeichnete Geschichtswerk deutscher Zunge, **Johannes v. Müller's vierundzwanzig Bücher allgemeiner Geschichte** besonders der europäischen Menschheit, soll neu gedruckt werden. Im Begriff, dasselbe in die Presse zu geben, glauben wir darauf aufmerksam machen zu müssen, daß diese Ausgabe, welche die beliebte Einrichtung der Ausgaben in Einem Bande erhalten soll, bedeutend wohlfeiler sein wird als die bisherigen. Wir hoffen dadurch diesem vortrefflichen Werke noch größere Verbreitung zu gewinnen, wie es diese in so hohem Grade verdient.

Aus diesem Grunde eröffnen wir auch den Weg der Subscription, der bis Ostern 1839 offen bleibt, bis zu welchem Zeitpunkt das Werk fertig sein wird, nach welcher Zeit aber ein erhöhter Ladenpreis eintreten soll.

Der Subscriptionspreis ist **2 Thlr. 16 Gr.**, oder **4 Fl. 24 Kr.**, nicht 5 Fl. 24 Kr., wie er irrthümlich in mehren Anzeigen bekannt gemacht worden ist.

Stuttgart und Tübingen, im October 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**

Bei **G. Weber in Bonn** ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

### Zeitschrift

für

### Philosophie und speculative Theologie

herausgegeben von

Professor **Dr. F. H. Fichte.**

Zweiter Band. In zwei Hefen. Preis 2 Thlr.

Inhalt: Vom Leben der Menschheit, von Carus. — über das Verhältnis des Form- und Realprinzips in den gegenwärtigen philosophischen Systemen, von F. H. Fichte. — Zur Geschichte des Unsterblichkeitsglaubens unter den Völkern des Alterthums, von G. H. Weisse. — über Erdmann's Vorlesungen über Glauben und Wissen, von F. M. Chalzbäus. — über Willroth's Vorlesungen über Religionsphilosophie, von Sengler. — über den wissenschaftlichen Anfang der Philosophie, von G. H. Weisse. — über das Problem der Erkenntnis, von Demselben. — Neue Systeme und alte Schule, von F. H. Fichte. — über die Philosophie der Offenbarung, von A. Günther.

Des 2ten Bandes 1tes Heft oder 2ten Jahrganges 1tes Heft erscheint im November t. J.

In der Universitäts-Buchhandlung von **H. G. Ewert** zu Marburg ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

### Elemente der analytischen Chemie.

Von

**Dr. C. Winkelblech,**

Professor der Chemie zu Marburg.

Erste Lieferung.

Velinpapier. Gr. 8. Brosch. 20 Gr., oder 1 Fl. 30 Kr.

Binnen Kurzem werden wir die zweite Lieferung versenden; inzwischen sind wir so frei, den Herren Chemikern, Ärzten und Apothekern dieses ausgezeichnete Werk bestens zu empfehlen.

In gleichem Verlage ist früher erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Über die chemischen und physiologischen Wirkungen des Lichtes. Von **Dr. Landgrebe** zu Kassel. Gr. 8. Geb. 3 Thlr., oder 5 Fl. 24 Kr.

In unserm Verlage sind soeben erschienen und in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes zu haben:

**Credner, Dr. R. A.**, Beiträge zur Einleitung in die biblischen Schriften. 2ter Band. (Das alttestamentliche Uevangelium.) Gr. 8. 1 Thlr. 16 Gr. (1 Thlr. 20 Sgr.)

Der 1ste Band (Die Evangelien der Petriner oder Judenchristen) erschien 1832, und kostet 2 Thlr. 6 Gr. (2 Thlr. 7½ Sgr.)

Von demselben Verfasser erschien ebenfalls in unserm Verlage: **Der Prophet Joel**, übersezt und erklärt. Gr. 8. 1831. 1 Thlr. 12 Gr. (1 Thlr. 15 Sgr.)

Einleitung in das Neue Testament. Erster Band. In zwei Abtheilungen. Gr. 8. 1836. 3 Thlr. 6 Gr. (3 Thlr. 7½ Sgr.)

**Tuch, Dr. Fr.**, Commentar über die Genesis. Gr. 8. 3 Thlr. 6 Gr. (3 Thlr. 7½ Sgr.)

Buchhandlung des Waisenhauses in Halle.

Durch alle Buchhandlungen ist von uns zu beziehen:

### Physiologie de l'espèce,

histoire

### de la génération de l'homme,

précédée de l'étude comparative de cette fonction dans les divisions principales du règne animal,

par

**Grimaud de Caux**

et

**G. J. Martin-Saint-Ange.**

Avec un Atlas de 20 planches.

Gr. in-4. Paris. 12 Thlr.

Eine Ausgabe dieses in der gelehrten Welt bekannten Werks auf größtem Velinpapier mit colorirten Abbildungen kostet 60 Francs.

Leipzig, im November 1838.

**Brockhaus & Wennerius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur. (A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

1838. Nr. XXXIII.

Dieser literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brochhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

# Conversations-Lexikon der Gegenwart.

Ein für sich bestehendes und in sich abgeschlossenes Werk,  
zugleich ein Supplement  
zur achten Auflage des Conversations-Verikons,  
sowie zu jeder früheren,  
zu allen Nachdrücken und Nachbildungen desselben.

Gr. 8. In Heften von zehn Bogen.

Sechstes Heft, Bogen 51—60.

Slam-Martinis bis Deutsche Literatur und Sprache.

Preis eines Heftes:

Auf weißem Druckpapier 8 Gr.

Auf gutem Schreibpapier 12 Gr.

Auf extrafeinem Velinpapier 18 Gr.

Inhalt des sechsten Heftes:

[illegible]

Leipzig, in November 1838.

**F. A. Brockhaus.**

Sieben ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

James, G. V. R., Leben und Zeitalter Ludwig's des  
Vierzehnten. Aus dem Englischen übersezt. Zwei  
Theile. Velindruckpapier. Geh. 3 Thlr.

Heinse, Wilh., **Wrdinghello** und die glückseligen Inseln. Ausgabe in einem Bande. Vierte, einzig rechtmäßige Ausgabe. 8. Velindruckpapier. 1 Thlr.

Diese Ausgabe ist nicht mit dem bei Fr. Goldmann in Leipzig erschienenen Nachdruck, der überdem noch 2 Thlr. kostet, zu verwechseln.

Meyer'sche Hofbuchhandlung in Lemgo.

In der Unterzeichneten ist erschienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

Technologische Encyclopädie  
oder  
alphabetisches Handbuch

Technologie, der technischen Chemie und des  
Maschinenwesens.

Zum  
Gebrauche für Kameralisten, Ökonomen, Künstler,  
Fabrikanten und Gewerbtreibende jeder Art.  
Herausgegeben

Joh. Jos. Prechtl,

K. k. niederöstr. wirkl. Regierungsrathe und Director des k. k. polytechnischen Instituts in Wien etc.

Neunter Band.

**Kupfer — Metallgießerei.**

Mit den Kupfertafeln 178 — 202.

Preis 3 Thlr. 12 Gr., oder 6 Fl.

Die in diesem Bande enthaltenen Artikel bilden ebenso viele Originalabhandlungen, in denen der Gegenstand nach seinem wesentlichen und neuesten Zustande sachkundig und erschöpfend dargestellt ist, sobald ein Ueber hier auf wenigen Seiten zusammengefaßt finden kann, was er oft selbst mit Benutzung einer bedeutenden Bücherammlung nicht aufzufinden im Stande wäre, da die einzelnen Artikel oft wichtige, den Verfasser eigenthümliche, noch nicht durch den Druck bekannt gemachte Erfahrungen und Beobachtungen enthalten.

Von den ersten acht Bänden, mit 177 Kupfertafeln, kostet jeder 3 Thlr. 12 Gr., oder 6 Rl.

Stuttgart und Tübingen, im October 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

HERMANN, Dr. C. F. (Prof.), Disputatio de loco  
Horatii Serm. I, 6, 74—76. 5 Bogen. 4.  
Broschirt. 8 Gr., oder 36 Kr.

HASELBACH, Dr. H., De insula Thaso. Dissertatio  
geographica et historica. 3 Bogen. Gr. 8. Broschirt.  
8 Gr., oder 36 Kr.

**N. G. Elwert** zu Marburg.



# Corpus scriptorum historiae Byzantinae.

Mit dem soeben erschienenen 8ten Bande ist nunmehr vollendet:

## Procopius

ex recensione  
**Guil. Dindorfii.**

III Volumina.

Subscriptionspreis für alle drei Bände auf seinem Druckpapier 9 Thlr. 8 Gr., welcher bei Abnahme dieses Autors einzeln jedoch nur noch kurze Zeit besteht.

Von der byzantinischen Sammlung sind ferner soeben erschienen:

**Georgius Cedrenus. Joannis Scylitzae** ope ab **Immanuele Bekkero** suppletus et emendatus. 2 Vol. Subscriptionspreis: Druckpapier 8 Thlr. 12 Gr., Schreibpapier 11 Thlr., Velinpapier 13 Thlr. 16 Gr.

(Der zweite Band wird in wenigen Monaten nachgeliefert.)

**Georgius Phrantzes. Joannes Cananus. Joannes Anagnostes** ex recensione **Imm. Bekkeri.** 1 Vol. Subscriptionspreis: Druckpapier 2 Thlr. 20 Gr., Schreibpapier 3 Thlr. 16 Gr., Velinpapier 4 Thlr. 12 Gr.

**Theophanes continuatus. Joannes Cameniata. Symeon Magister. Georgius Monachus** ex rec. **Imm. Bekkeri.** 1 Vol. Subscriptionspreis: Druckpapier 4 Thlr. 16 Gr., Schreibpapier 6 Thlr., Velinpapier 7 Thlr. 12 Gr.

Bonn, im October 1838.

**Eduard Weber.**

Bei A. Hirschwald in Berlin ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

**Phöbus, Dr. P.** Deutschlands kryptogamische Giftgewächse in Abbildungen und Beschreibungen. Auch unter dem Titel: Abbildung und Beschreibung der in Deutschland wildwachsenden und in Gärten im Freien andauernden Giftgewächse, nach natürlichen Familien erläutert von Prof. Dr. J. F. Brandt, Dr. P. Phöbus und Prof. Dr. J. T. C. Ratzeburg. Zweite Abtheilung: Kryptogamen. Gr. 4. Mit 9 sauber colorirten Kupfertafeln. Geheset. 3 Thlr.

## Interessante Neuigkeit.

In der Joh. Palm'schen Verlagsbuchhandlung zu Landshut ist erschienen und in allen guten Buchhandlungen zu haben:

**Franz von Paula Gruithuisen's**

**Kritik der neuesten Theorien der Erde, und Sieg der Natur über dieselben.** Für Geologen und überhaupt für Naturhistoriker, Physiker und Astronomen. 3te Auflage. Gr. 8. Brotschirt. Preis 8 Gr., oder 30 Kr. Rhein.

Dieses interessante Schriftchen eines geistreichen Verfassers hat allenthalben so günstige Aufnahme gefunden, daß schon nach wenigen Monaten eine 2te, und nun, ein halbes Jahr nach

seinem ersten Erscheinen, auch diese 3te Auflage nothwendig ward. Früher erschien von demselben Verf. in gleichem Verlage: **Analekten für Erd- und Himmelskunde.** 1stes — 7tes Heft. 8. Brotschirt. Preis jedes Heftes 12 Gr., oder 48 Kr. Rhein.

Soeben ist erschienen:

## Christliche Predigten für denkende Verehrer Jesu.

Von  
**Alexander Schweizer.**

Zweite Sammlung:

Predigten gehalten zu Zürich in den Jahren  
**1834 — 38.**

Preis 1 Thlr. 12 Gr.

Die erste Sammlung, welche 1834 erschienen ist, enthält die in demselben Jahre in der reformirten Kirche zu Leipzig gehaltenen Predigten. Der Preis derselben ist ebenfalls 1 Thlr. 12 Gr. Leipzig, im October 1838.

**Weidmann'sche Buchhandlung.**

Im Verlage der Buchhandlung des Waisenhauses in Halle sind soeben erschienen und in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes zu haben:

**Daniel, Dr. A. A.** (Lehrer am königl. Pädagogium zu Halle), Hilfsbuch für den Gottesdienst der Synagogen, nebst einer einleitenden Abhandlung. Gr. 8. 1 Thlr. 16 Gr. (1 Thlr. 20 Sgr.)

Inhalt:

I. Poetischer Theil. Geistliche Lieder und Dichtungen. Seite 1—138. II. Prosaischer Theil. Erster Abschnitt. Schulgebete. Seite 141—232. Zweiter Abschnitt. Längere und kürzere religiöse Vorträge für höhere Schulen. Seite 233—528. 1) Ohne nähere und specielle Beziehung auf Verhältnisse des Natur-, Kirchen- oder Schuljahrs. 2) Vorträge für besondere Zeiten des Naturjahrs. 3) Vorträge für besondere Zeiten des Kirchenjahrs. 4) Vorträge für besondere Verhältnisse des Schullebens.

**Lucian's Traun, Anacharsis, Demonax, Timon, Doppelte Anklage und Wahre Geschichte.** Für den Schulgebrauch mit Einleitungen und erklärenden Anmerkungen versehen von Dr. F. G. Schoene (Oberlehrer am Domgymnasium zu Halberstadt). Mit 1 Kupfertafel. Gr. 8. 1 Thlr. Schmid, Dr. B. (Missionar), Über Sprachen- und Völkerverwandtschaft. Gr. 4. Geh. 10 Gr. (12½ Sgr.)

**Gebete für christliche Volksschulen, nebst einem Anhang von G. Heinrich (Schullehrer in Heitra bei Eisleben).** Mit einem Vorworte vom Confessorialrath Prof. Dr. Tholuck. 8. 9 Gr. (11½ Sgr.)

Inhalt: 1) Gebete bei dem Anfange der Schule. 2) Gebete zum Beschluß der Schule. 3) Gebete bei öffentlichen Schulprüfungen. 4) Festgebete. Anhang. 1) Morgengebete. 2) Tischgebete. 3) Abendgebete. 4) Einige Lieder bei dem Tode und Begräbnisse.

Bei J. S. Bohné in Kassel ist soeben erschienen und in allen soliden Buchhandlungen zu haben:

**von Dittfurth, Max.** Die Hefen in den Feldzügen von 1793, 1794 und 1795 in Flandern, Brabant, Holland und Westfalen. Ein Beitrag zur Kriegsgeschichte. 1ster Band. Feldzug von 1793. Mit einer Übersichtskarte und einem Plan. Gr. 8. 1 Thlr. 12 Gr. **Weisserlin, Fr.** Die Verhältnisse der Staatsdiener nach rechtlichen Grundbüssen entwickelt. 8. Geh. 12 Gr.

In allen Buchhandlungen ist vorrätzig, und allen Besitzern der Geschichtswerke von Becker, Pölig und denjenigen der neuen Taschenausgabe von Kottke's Weltgeschichte, sowie der größern freiburger Ausgabe zu empfehlen:

## **Ernst Münch's allgemeine Geschichte der neuesten Zeit von dem Ende des großen Kampfes der europäischen Mächte wider Napoleon Bonaparte, bis auf unsere Tage.**

### **Neue, wohlfeile Ausgabe mit Gratis-Supplementbänden.**

Dieselbe erscheint (noch im Laufe dieses Jahres) in 14 Halbbänden à 12 Gr. Preuß., oder 48 Kr. Rhein., oder in 7 Bänden, à 1 Thlr. Preuß., oder 1 Fl. 36 Kr. Rhein., und es haben diejenigen Abnehmer, welche diese neue Ausgabe vollständig bezogen und bezahlt haben, folgende zwei Supplementbände zu diesem Werke ganz gratis anzufordern:

**Allgemeine Geschichte der neuesten Zeit von dem Ende des Jahres 1830. Von Dr. Franz Kottenkamp.**

Preis 1 Thlr. 6 Gr. Preuß., oder 2 Fl. Rhein.

**Der Unabhängigkeitskampf der spanisch-amerikanischen Colonien. Von Dr. Franz Kottenkamp. (Erscheint forben.)**

Preis 1 Thlr. 21 Gr. Preuß., oder 3 Fl. Rhein.

und sind alle Buchhandlungen zur Erfüllung dieser Bedingung in den Stand gesetzt, sobald denselben der Entschluß zum Ankauf noch in diesem Jahre erklärt wird; spätern Abnehmern können die Supplementbände nur zu den beigesetzten Ladenpreisen geliefert werden.

Stuttgart, im October 1838.

## **Literatur-Comptoir.**

Allen, welche eine unterhaltende Lecture, die von Anfang bis zu Ende die Spannung und lebhafteste Aufmerksamkeit des Lesers erregt, lieben und suchen, empfehlen wir die eben erschienenen:

### **Memoiren des Teufels.**

von  
**Fr. Soulié.**

Aus dem Französischen  
von

**J. Schoppe.**

8. Altona, Hammerich. 2 Bände. Geh. 3 Thlr.

Die seltsamsten Ereignisse wechseln miteinander ab, der Leser fällt aus einer Überraschung in die andere. Frankreich hat diese Memoiren verschlungen, in Deutschland werden sie bald als die unterhaltendste Lecture allgemein verbreitet sein. In jeder guten Bibliothek und jedem Lesevereine sind diese Memoiren vorrätzig, und durch alle Buchhandlungen Deutschlands zu haben.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

### **Dr. Karl Hartmann's Taschenbuch für reisende Mineralogen,**

Geologen, Berg- und Hüttenleute durch die Hauptgebirge Deutschlands und der Schweiz. Nebst einem Atlas von 14 illuminirten Gebirgsdurchschnitten und Karten. 8. Elegant in Wachstafel gebunden mit Goldschnitt und Futteral. 3 Thlr. 18 Gr.

Bei den häufigen Reisen, welche von Naturforschern in mineralogischer, berg- und hüttenmännischer Beziehung gemacht werden, war ihnen eine mineralogische Topographie des deutschen Vaterlandes ein wahres Bedürfnis. Nach einer Einleitung über einige allgemeine geologische Punkte und über die geologische Geographie geht der Verf. zu den einzelnen Gebirgen über. Er beginnt mit dem Harz, geht über den Kyffhäuser nach dem Thüringerwalde, von diesem durch den Franken-

wald nach dem Fichtelgebirge, von dort nach dem sächsischen Erzgebirge, dann nach dem nieder-sächsischen, glasischen und böhmischen Gebirge, darauf nach den Alpen, nach dem Schwarzwalde und endlich nach dem niederrheinisch-westfälischen Gebirge. Von jedem dieser Gebirge ist zuvörderst eine orographisch-petrographische Übersicht gegeben, dann wird von seiner geologischen Beschaffenheit, darauf von den darin vorkommenden Mineralien und endlich von dem in dem Gebirge umgebenden Bergbau- und Hüttenbetriebe geredet.

Bei unterzeichneter Buchhandlung ist erschienen:

### **Handbuch**

**der Statistik und Geographie des Großfürstenthumes Siebenbürgen,**

von

**J. A. Benigni Adler v. Mildenberg,**

k. k. Feldkriegs-Secretair.

- I. Heft: Statistik. 1fter Abschnitt: Grundmacht.
- II. Heft: Statistik. 2ter Abschnitt: Staatsverfassung. 3ter Abschnitt: Staatsverwaltung.
- III. Heft: Geographie.

Alle 3 Hefte kosten 3 Thlr.

Dieses Werk füllt eine bisher in der Specialstatistik der Provinzen des österreichischen Kaiserstaats bestandene fühlbare Lücke aus. Die Eigentümlichkeiten der Verfassung und der Verwaltungsnormen Siebenbürgens, welche bisher nicht nur im Auslande, sondern auch selbst im Publicum des Kaiserstaats wenig gekannt waren, sind von dem Herrn Verfasser nach den Resultaten 30jähriger Diensteserfahrung und auffassender Studien über die Geschichte und Staatsverfassung des Landes, nach den echten Quellen mit Vollständigkeit geschildert, und machen dieses Werk, das erste vollständige über die in demselben geschilderten Gegenstände, sowohl für den Statistiker und Geographen ex professo, als für die Dilettanten in dieser Wissenschaft unentbehrlich.

Hermannstadt, den 20ten October 1838.

**W. W. Thierry'sche Buchhandlung.**

# 24 Holzschnitte zu Schiller's Werken.

Preis 16 Gr., oder 1 Fl., in 4 Lieferungen je zu 4 Gr., oder 15 Kr.

Der Beifall, dessen sich unsere neueste Ausgabe von

**Schiller's sämmtlichen Werken in 12 Bänden in kl. 8.**

zu erfreuen hat, veranlaßt uns, dem seit mehren Jahren vorbereiteten und demnächst zur Publication reifen Unternehmen

**einer Ausgabe sämmtlicher Werke Schiller's  
illustriert mit Holzschnitten.**

**nach den Zeichnungen der ersten Künstler Deutschlands**

eine kleinere Reihenfolge von 24 Holzschnitten im Format der neuesten Ausgabe, und besonders für diese gefertigt, vorausgehen zu lassen.

Sämmtliche Zeichnungen und ein Theil der Stöcke liegen bereits fertig vor; die Ausgabe wird in vier Lieferungen vor Schluß dieses Jahres noch vollständig erfolgen.

In Wohlfeilheit des Preises schließt sich die Illustration der Ausgabe selbst vollkommen an.

**Die Lieferung von sechs Holzschnitten kostet nur 4 Gr., oder 15 Kr., die vier Hefte zusammen also nur 16 Gr., oder 1 Fl.**

Stuttgart und Tübingen, im October 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**

In **Karl Gerold's** Buchhandlung in Wien ist erschienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

## **Pittoreske Donaufahrt** von

**Ulm bis Konstantinopel.**

Eine romantisch-malerische Schilderung der merkwürdigsten Ortschaften, Schlösser, Burgen, der schönsten Gegenden und Fernsichten an der Donau, wie auch der gefährlichsten Stellen dieses Flusses,

nebst einer  
**Uebersicht der Dampfschiffahrt auf demselben.**

Ein Handbuch für Donaureisende.

**Mit einer Stromkarte.**

Gr. 12. Wien, 1838. In Umschlag broschirt. 20 Gr. Sächs.

Wie glauben einem allgemein gefühlten Bedürfnisse durch dieses Werk abzuhelfen, welches das ganze schiffbare Stromgebiet der Donau von Ulm bis zu den Donaumündungen in pittoresker, geschichtlicher, commercieller und nautischer Hinsicht behandelt, und den Reisenden nicht nur als ein unentbehrlicher Wegweiser auf dem Strome und in den vorzüglichsten Städten begleitet, sondern ihn selbst in die türkische Kaiserstadt einführt. Die beigegebene Stromkarte, die das ganze schiffbare Gebiet der Donau umfaßt, sowie die äußere gefällige Ausstattung, werden dieses Werk zu einem ebenso nützlichen als angenehmen Begleiter auf dieser interessanten Fahrt machen, während die pittoresken Schilderungen und der gefällige Styl auch dem Nichtreisenden eine unterhaltende Lecture gewähren dürfte.

Zur Begegnung vielfältiger Bestellungen auf  
**Blasius' Handbuch der Liturgie**, 3 Bände, zeige ich hiermit an, daß von diesem Buche gegenwärtig eine neue Auflage erscheint und der erste Band derselben spätestens zu Anfange des nächsten Jahres versandt werden wird.  
Halle, im November 1838.

**Ed. Anton.**

Neuerlich erschienen in Athen und sind durch alle Buchhandlungen von uns zu beziehen:

**Μαζκελδεύ (Φερδινάνδος), Ἐγχειρίδιος τοῦ ὁριμαίου διαιτοῦ ὑπὸ κτλ. Μεταφρασθὲν ἐκ τοῦ γεγραμμένου ὑπὸ Γ. Α. Πάλλη καὶ Μ. Πενιέρη. 2 vol. 8maj. Ἐν Ἀθῆναις.**

Diese durch Sitate aus den Basiliken noch vermehrte Bearbeitung von Macledzey's „Lehrbuch des heutigen römischen Rechts“ erscheint in zwei Bänden oder 3 Lieferungen zu 16 Gr.

**Θεοφίλου Ἀντίζηνωσος τὰ ἱνστιτοῦτα μετὰ τῶν οὐδωδεστέγων ποικίλων γραφῶν τῶν διαφόρων χειρογράφων, καὶ τινῶν ἄλλων σημειώσεων, ἐκ τῆς ἐκδόσεως τοῦ Πεντζίου, οἷς προστεθῇ καὶ πῖναξ ἀναλυτικὸς τῶν ἐπιμελεχουσῶν, ἐπιμείλεια τοῦ Γ. Α. Π. 8maj. Ἐν Ἀθῆναις. 2 Thlr. 8 Gr.**

Leipzig, im November 1838.

**Brockhaus & Wennerius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXXIV.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

Durch alle Buchhandlungen ist **gratis** zu erhalten:

## Verzeichniss

einer Sammlung von Romanen, Schauspielen, Briefen, Biographien, Reisen etc., historischen und andern werthvollen Schriften

aus dem Verlage von

**F. A. Brockhaus in Leipzig,**

welche sich zur Errichtung und Ergänzung von Privat- und Leihbibliotheken eignen und zu sehr vortheilhaften Bedingungen erlassen werden.

Freunden gediegener Unterhaltung, Lesegesellschaften und Leihbibliotheken wird dieses Verzeichniss zur Durchsicht empfohlen.

**Die aussergewöhnlichen Vortheile gelten nur noch bis Ende März 1839.**



## Für Juristen.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

### Leitfaden

für

## Pandekten-Vorlesungen

von **Dr. A. A. von Bangerow,**

ordentl. Professor zu Marburg.

**Erster Band.**

(Allgemeine Lehren. E. g. Familienrecht. Dingliche Rechte.)

Gr. 8. Gebunden. 825 Seiten. 3 Thlr. 12 Gr., oder 6 Fl. 18 Kr.

Der zweite Band, welcher die noch übrigen Lehren, das Erbrecht und das Obligationen-Recht, umfassen wird, soll möglichst bald nachfolgen; demselben soll auch ein alphabetisches Register über das ganze Werk beigelegt werden. — Bei Anzeige dieses für jeden Juristen höchst brauchbaren Werkes entnehmen wir aus des Herrn Verfassers Vorrede nachstehende wenige Zeilen: — In diesem Sinne nun ist der vorliegende Grundriß ausgearbeitet, der sich von den bisherigen Hülfsmitteln für Pandekten-Vorlesungen namentlich durch die sehr beträchtliche Anzahl mehr oder weniger ausführlicher Anmerkungen unterscheidet. Gerade diese wesentliche Verschiedenheit in der ganzen Anlage gab mir auch den Muth zur Veröffentlichung desselben; denn ich durfte mich der Hoffnung hingeben, daß ein Buch, nach diesem Plan ausgearbeitet, nicht bloß meinen individuellen Bedürfnissen für meine Vorlesungen

entsprechen, sondern auch in einem größern Kreise nützlich sein würde. Namentlich glaubte ich mir den Dank tüchtigerer Praktiker zu verdienen, wenn ich ihnen in gedrängter Kürze eine kritische Darstellung neuerer Untersuchungen über eine bedeutende Zahl civilistischer Rechtsfragen darbiete.

Marburg, im November 1838.

Akademische Buchhandlung **R. G. Elwert.**

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen, und an alle Buchhandlungen verandt worden:

## Vorhalle zur Griechischen Geschichte und Mythologie,

von

**Johann Aschold,**

Professor am königl. bairischen Gymnasium zu Straubing.

### Zweiter Theil.

Gr. 8. Preis 1 Thlr. 16 Gr., oder 2 Fl. 42 Kr.

Inhalt: 1) Die Thier-Symbolik. 2) Einfluß der Thier-Symbolik auf den Cultus. 3) über die symbolische Bedeutung einiger Bäume. 4) Die symbolische Bedeutung des Zanges. 5) Die symbolische Bedeutung der Kampfspiele. 6) über den doppelten Wirkungskreis des Sonnengottes. 7) über das Verhältniß des Apollon zum Dionysos. 8) über das feindliche Verhältniß einiger Brüder. 9) über den Streit des Eurytos mit Dionysos. 10) über den Kampf des Herakles mit Eurytos. 11) über den Kampf der Hera mit Herakles. 12) über den Kampf der Pallas und Hera mit Poseidon. 13) über die symbolische Bedeutung vieler Kriege. 14) über die Erfindung der Buchstaben-Schrift durch Hermes. 15) über Atlas als Himmelsträger. 16) Andeutungen über die Moiren, Horen und Charitiden. 17) Andeutungen über die Nymphen. 18) über die Feier der Panlopiea. 19) Das Gefolge des Dionysos. 20) Die Homerischen Äthiopen. 21) Die Hyakten. 22) Die Hyperborer. 23) Die Amazonen. 24) Die Kyklopen. 25) Die Telchines und Heliaden. 26) Die Kureten und Korybanten. 27) Die Ibalischen Daktylen.

Der Verfasser dieser Schrift hat durch seine Geschichte des trojanischen Krieges bereits bewiesen, wie sehr er mit dem griechischen Alterthume vertraut ist. Während er sich aber in jener Schrift auf den gefeierten Krieg und die zunächst mit demselben in Verbindung stehenden Stoffe beschränkte, verbreitete er sich in dieser Vorhalle über alle jene dunkeln Sagen, welche bisher wenig beachtet wurden, mit einer solchen Gründlichkeit, daß dieselben dadurch nicht bloß ihre volle Bedeutung bekommen, sondern überhaupt die ganze Urgeschichte und Mythologie der Griechen neues Licht und eine sichere Grundlage gewinnt. Daher zweifeln wir nicht, daß dieses Werk zur Lösung vieler bisher streitigen Punkte wesentlich beitragen und bei der einfachen Darstellung des Verfassers und dem hohen Interesse des Gegenstandes allen Freunden der Literatur, besonders jener des classischen Alterthums, ebenso viel Vergnügen gewähren dürfte, als den Gelehrten vom Fache.

Stuttgart und Tübingen, im October 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Kürzlich ist erschienen:

## Plantarum vascularium genera

eorumque  
characteres et affinitates tabulis diagnosticis  
exposita et secundum ordines naturales digesta  
auctore

**C. F. Meisner, M. D.,**

in universitate Basilicensi P. P. O., soc. lit. plur. membro.

Accedit

## Commentarius

exhibens

praeter adnotationes atque explicationes varias generum  
synonyma et indicationem librorum, in quibus descrip-  
tiones fusiores iconesque nec non specierum novarum  
diagnoses etc. inveniantur.

Fasciculus V.

Preis jeden Heftes in grösstem Folio 1 Thlr. 8 Gr.

Dieses Werk, dessen übrige Hefte rasch folgen sollen,  
hat überall die günstigsten Recensionen und besonders im  
Auslande die grösste Anerkennung erfahren. Namentlich  
rühmt es Decandolle, und erwähnt es unter Anderm  
im 7ten Bande seines Prodomus als ein „liber aureus“,  
dessen Erscheinen seinen früher versprochenen Index generum  
überflüssig mache.

Leipzig, im November 1838.

**Weidmann'sche Buchhandlung.**

In der unterzeichneten ist soeben erschienen und an alle  
Buchhandlungen versandt worden:

## National-Kalender für die deutschen Bundesstaaten auf das Jahr 1839.

Oder:  
**Haus- und Volksfreund**

zur  
Belehrung und Unterhaltung

für  
den deutschen Bürger und Landmann.  
Mit einem Kalender für Katholiken, Protestanten und  
Israeliten, für die Länder, wo derselbe zulässig ist.

**Fünfzehnter Jahrgang.**

Preis 12 Gr., oder 45 Kr.

Mit zwei Lithographien, einem auf Schreibpapier gedruck-  
ten, für alle Monate des Jahres eingerichteten ökonomischen  
Tagebuch, einem Correspondenz-Journal und einer Ge-  
dächtnissbüchse, sämmtlich zum Einschreiben dienend für Ge-  
schäfte des Berufs, der häuslichen und Familienangelegen-  
heiten, durch welche Beigabe dieser Kalender für alle  
Haushaltungen von besonderer Nützlichkeit ist.

Inhalt: Das Gebetbuch. Die Mannichfaltigkeiten.  
Die Stimme der Natur. Kalenderbestimmungen. Jahn-  
jährige Übersicht der vorzüglichsten Feste. Winkenkaleber. Von  
der Witterung. Die Beschaffenheit der Erde. Das Waldconcert.  
Die Ständewahl. Der Einfluß geistiger Beschäftigungen auf  
den menschlichen Charakter. Volksfagen. Über das häusliche

Leben. Die Nachbarn. Neue deutsche Sprichwörter. Luther  
über den Ehestand. Milde Stiftungen. Zur Raqachmung.  
Gottlob Mathusius. Arm Glend. Vom Reichwerden. Das  
seltene Gastmahl. An den Schlaf. Gemeinnützige Anstalten.  
Über Warteichulen oder Kinder-Bewahrungsanstalten. Wuthes  
und seine Gefährten. Die menschliche Hand und ihre Eigen-  
schaften. Der Antikrist. König's neuer Kodexapparat. Unter-  
haltungen aus dem Reiche der Gifte. Mittel gegen das Aufblähen  
des Kindes und der Schafe. Die geschwähige Magd. Ein  
gutes Wort findet eine gute Herberge. Gute und böse,  
vernünftige und unvernünftige Menschen. Wohl-  
thäter und Feinde des Menschengeschlechts. A. Die  
Edlern, Bessern, Vernünftigen. I. Lebensretter.  
a) Der muthige Schiffer. b) Ein anderer Fall. c) Die hoch-  
herzige Frau. B. Die Schlechteren, weniger Vernünf-  
tigen. I. Mörder. a) Ein unnatürlicher Gatte. b) Der  
rachebursige Verwandte. II. Selbstmörder. a) Selbstmord  
in Folge übertriebener Eufucht. b) Zwei andere Selbstmörder.  
c) Noch ein merkwürdiger Selbstmord. III. Brandstifter.  
IV. Betrüger. Der verführte Dieb. Zögere nicht mit der  
Ausführung guter Vorfälle. Der menschenfreundliche Säng-  
er. Einige Hauptmängel der Kindererziehung. Der Herderoluth.  
Seltsamer Lohn für Lebensretter. Statuten des von Wihel-  
mine Halberstadt gegründeten Fräuleinstituts für Deutsch-  
lands väterlose unvermählte Töchter jedes Standes und jeder  
Confession. Kern des Rüpfens Nr. XX vom vorigen Jahre.  
Gewittergefahren. 1) In Schlesien. 2) In Köln.  
3) In Heinsberg. 4) Schädlichkeit des Glockenläutens bei  
Gewittern. Seltsame Lebensberechnung. Die Brantwein-  
pest. 7) Eine Entdeckung. 8) Das schreckliche Schicksal.  
Feuergefahren. 1) Feuerbrunst, durch unvorsichtiges  
Zeigen des Ofens veranlaßt. 2) Ein ähnlicher Fall. 3) Feuer  
und Licht in den Händen Unmündiger thut nicht gut. 4) Eine  
Wasserfalle als Brandstifter. Anweisung zum Bau der Dorn-  
schin Lehmöcher. Der Schmuggler. Vorthelle in der Land-  
wirthschaft. Tod des berühmten Viceadmirals Tordenskiöld.  
Alte Leute. Beispiele aus neuerer Zeit. Miß Hirsch. Die  
erste Wasserheilanstalt zu Grafenberg in Schlesien und ihre  
Stifter Preisnitz. Unglücksfälle zur Belehrung und  
Warnung. A. Durch Stürme und Ungewitter.  
1) In der Walachei. 2) In Ostreich. 3) In Tirol. B. Durch  
Einsturz. C. Durch Dämpfe, Gase und deren Ent-  
zündung. 1) Schädlichkeit des Kohlendampfs. 2) Ein anderer  
Fall. 3) Noch ein trauriger Fall. 4) Unglücksfall durch Gas-  
explosion. 5) Noch eine Gasexplosion. 6) Vorsicht beim Aus-  
bringen tiefer Brunnen. 7) Ein ähnlicher Fall. D. Durch  
Schiefpulver und Gewehre. 1) Putzerexplosion. 2) Un-  
vorsichtigkeit mit Schießgewehren. 3) Überabug von Schief-  
gewehr. 4) Ein anderer Fall. 5) Noch ein trauriger Fall.  
E. Durch Thiere und thierisches Wuthgift. F. Bei  
Kindern aus Mangel an Aufsicht. Vorsichtmaßregeln  
beim Räumen von Brunnen. Noch einige Verschläge über  
lebendig Begrabenwerden.

Stuttgart und Tübingen, im November 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**

Bei H. B. König in Bonn ist erschienen und durch  
alle Buchhandlungen zu beziehen:

**Scriptorum Arabum De Rebus In-  
dicis loci et opuscula inedita. Ad codicum  
Parisinorum Leidanorum Gothanorum fidem recen-  
suit et illustravit Joannes Gildemeister.**  
Fasc. I. 8. Geh. Preis 2 Thlr. 16 Gr.

**Weber's, W. S. (Dr.), Vollständiges Handbuch  
der Anatomie des menschlichen Körpers  
(Zergliederungs-Kunde und -Kunst). Zunächst für die  
Besitzer des anatomischen Atlases. Erster Band. Vier-  
tes Heft. Preis 20 Gr.**

Im Verlage von **Alexander Duncker** in Berlin sind  
 foeben folgende Neuigkeiten erschienen und durch alle Buchhand-  
 lungen zu beziehen:

**Dr. L. Böhm,**  
 praktischer Arzt zu Berlin,

**Die kranke Darmschleimhaut**  
 in der asiatischen Cholera,  
 mikroskopisch untersucht.  
 Mit zwei Kupfertafeln. Gr. 8. Geh. 20 Gr.

**Theodor Mügge,**  
**Novellen und Skizzen.**

3 Theile. Gr. 12. Geh. 4 Thlr.

Inhalt: Die Spanier in London. Der Unversöhnliche. Ab-  
 sicht und Zufall. Der Candidat. Die Brüder. Rosinchen.  
 Streifzüge durch Belgien. Der Retter.

Diese ausgewählte Sammlung interessanter Novellen und  
 Skizzen des beliebten Autors wird den zahlreichen Lesern seines  
 „Chevalier“, seiner „Vendéerinn“ u. a. eine sehr willkommene  
 Gabe sein.

**Denkschriften und Briefe**  
 zur Charakteristik der Welt und Literatur.  
 Zweiter Band.

Gr. 8. Geh. 1 Thlr. 18 Gr.

Inhalt: a) Briefe von J. J. Engel, H. Genelli, Fr.  
 v. Gentz, Samuel Hahnemann, Ph. Hackert,  
 Joseph Fürst von Hohenzollern, Fr. L. Jahn,  
 Joh. H. Jung-Stilling, Karl XIV. König von  
 Schweden, Abr. G. Kaestner, K. W. Kolbe,  
 Papst Leo XII., Moses Mendelssohn, Adam v.  
 Müller, Frz. V. Reinhard, Ludw. Robert,  
 Gustav Graf von Schlabrendorf, Fr. E. Dan.  
 Schleiermacher, Chr. M. Wieland, Fr. Aug.  
 Wolf, Pius Alex. Wolff, J. H. D. Zschokke.

b) Denkschriften, Briefe, Depeschen und diplomatische  
 Noten aus der französischen Revolution von 1792 bis 1799.  
 Ange Elis. Louis Ant. Bonnier d'Arco, Boul-  
 land, E. Nicolas Calon, André Dumont, Flo-  
 real Guioit, Labadie, J. P. Lacombe St.-Mi-  
 chel, Napoléon Bonaparte, Rivaud, Philippe  
 Rühl, Sotin.

Der erste Band erschien vor einigen Monaten und hatte  
 sich einer ungewöhnlich großen Theilnahme zu erfreuen, dem  
 vorliegenden wird diese vielleicht in noch höherm Grade zu Theil  
 werden.

In demselben Verlage sind unlängst erschienen:

**Stalia.** Mit Beiträgen von A. Hagen, A. Ko-  
 pisch, H. Leo, C. Fr. v. Rumohr, K. Witte  
 u. A. Herausgeg. v. **Wf. Neumont.** Mit einem  
 Titelkupfer nach C. Magnus. 8. Eleg. cart. 2 Thlr.  
**Cooper's, S. Fenim,** Streifereien durch die  
 Schweiz. Nach dem Engl. v. Dr. G. N. Bärmann.  
 2 Theile. Gr. 12. Geh. 3 Thlr.

**Galerie** dramatischer Künstler der königl.  
 Hofbühne zu Berlin.

Heft I. Charlotte von Hagn.  
 Schwarz 1 Thlr. 20 Gr. Color. 2 Thlr. 6 Gr.

Heft II. Karl Seydelmann.  
 Schwarz 1 Thlr. 16 Gr. Color. 2 Thlr.

**Henriette Temple,** eine Liebesgeschichte vom Verf.  
 des Vivian Grey. Nach dem Engl. von Dr. G. N.  
 Bärmann. 3 Theile. Gr. 12. Geh. 3 Thlr. 12 Gr.

**Kopisch, Aug.,** Gedichte. Gr. 12. Geh. 1 Thlr. 18 Gr.

**Mügge, Th.,** Die Vendéerinn, ein Roman.  
 3 Theile. Gr. 12. Geh. 3 Thlr. 16 Gr.  
**Revolution,** Die französische, von 1789—1836.  
 Gr. 12. Geh. 16 Gr.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

**Dr. E. Mignet,**

**Das Kresot in physischer, chemischer,**  
 pharmaceutischer, medicinischer, technischer und ökono-  
 mischer Beziehung, oder: Darstellung der Geschichte  
 des Kresots, seiner physischen und chemischen Eigen-  
 schaften und Verbindungen, seiner pharmaceutischen  
 Verhältnisse und verschiedenen Bereitungsweisen, seiner  
 schädlichen und therapeutischen Wirkung, belegt durch  
 die vorzüglichsten Beobachtungen deutscher und franzö-  
 sischer Ärzte, und seiner Anwendung theils auf Me-  
 dicin, theils auf die Technik (Optik, Färberei u.) und  
 auf die Haushaltung. Übersetzt, nach dem neuesten  
 Standpunkte der Wissenschaft bearbeitet und mit ei-  
 nem Anhange über kresothaltige Mittel und Surro-  
 gate des Kresots versehen von A. Martinp. Gr. 8.  
 12 Gr.

Gleich andern neu erschienenen Arzneimitteln fand auch  
 das Kresot eifriges Lob und heftigen Tadel; Viele hielten es  
 für die Panacee aller Übel, Andere dagegen sprachen ihm jede  
 Wirkung ab, und unter diesen extremen Ansichten litt die  
 Sache der Menschheit, bis jahrelange Erfahrung aus hier der  
 Wahrheit ihr Recht verlieh; denn es ist ja längst bekannt, daß  
 sie besonders durch den Scharfmann, die Gleichsamkeit, den  
 Eifer und die Sondernerkunst Mignet's gefunden wurde,  
 welche Gaben auf jeder Seite seiner vorliegenden Schrift er-  
 kenntbar hervortreten.

## Euripidis TRAGOEDIAE.

Recensuit

**Godofredus Hermannus.**

Von dieser schönen Ausgabe sind bisher erschienen:

Voluminis I pars I. Hecuba. 1 Thlr. 6 Gr.

— — — II. Iphigenia in Aulide. 1 Thlr. 6 Gr.

— — — III. Iphigenia Taurica. 1 Thlr. 12 Gr.

Voluminis II pars I. Helena. 1 Thlr. 6 Gr.

— — — II. Andromache. 18 Gr.

— — — III. Cyclops. 12 Gr.

Letzteres haben wir soeben versandt.

Leipzig, den 10ten November 1833.

**Weidmann'sche Buchhandlung.**

Durch alle Buchhandlungen ist zu erhalten:

Bericht vom Jahre 1838 an die Mitglieder der Deut-  
 schen Gesellschaft zu Erforschung vaterländischer Sprache  
 und Alterthümer in Leipzig. Herausgegeben von den  
 Geschäftsführern der Gesellschaft **Amilios Lud-  
 wig Richter** und **Karl August Espe.** Gr. 8.  
 Geh. 10 Gr.

Die Berichte der Jahre 1835, 1836 und 1837 sind zu  
 gleichen Preisen zu beziehen.

Leipzig, im November 1838.

**F. A. Brockhaus.**

Eben ist in der **Hinrich'schen** Buchhandlung in Leipzig erschienen:

**Kaltschmidt, Prof. D. F. H., Sprachvergleichendes Wörterbuch der deutschen Sprache**, worin die hochdeutschen Stammwörter in den germanischen, romanischen u. v. a. europ. u. asiät. Sprachen, besonders in der Sanskrit nachgewiesen, mit ihren Stammverwandten zusammenge stellt, aus ihren Wurzeln abgeleitet und nach ihrer Urbedeutung erklärt, auch die abgeleiteten und die wichtigsten zusammenge setzten Wörter kurz erläutert werden. **Zweite Lieferung, Bee bis Du.** Gr. 8. Geh. 1/2 Thlr.

Das Ganze wird aus 6 Lief. in 1 Bände besichen, Mitte 1839 vollständig sein und die bisher dem Unternehmen bewiesene Theilnahme vollkommen verdienen.

## **Pölig Weltgeschichte**

für gebildete Leser; 6te Aufl. fortgesetzt bis mit **1838** vom Prof. **F. Bülow**, in 15 Lieferungen (175 Bogen. Gr. 8. 5 Thlr. Schreibp. 6 2/3 Thlr.) ist nun vollständig, und als ein höchst werthvolles Geschenk zu empfehlen.

Der Ergänzungsband ist auch unter folgendem Titel:

**Allgemeine Geschichte der Jahre 1830 bis 1838** vom Prof. **Friedr. Bülow** zu Leipzig. 23 Bogen. Gr. 8. 1 Thlr.

besonders zu haben und wird durch die geistvolle, klare und anziehende Darstellung des Interesses an der neuesten Zeitgeschichte sehr erhöhen. Eine ausführliche Anzeige ist in allen Buchhandlungen zu finden.

## **Neuer Atlas der ganzen Erde**

nach den neuesten Bestimmungen für Zeitungleser, Geschäftsleute, Schulen etc. mit Rücksicht auf **Stein's** geograph. Werke. **Siebenzehnte** Aufl. in 26 K. und 7 Zeit- und geogr. statist. Tafeln. **Colort.** Grossfolio. 1838. 4 1/3 Thlr. netto.

In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen verandt worden:

## **Gerichtsärztliche Arbeiten**

von

**Karl Friedrich Burdach,**

königl. vreuß. Geh. Medicinalrathe, Dirigenten des Medicinalcollegiums und Prof. zu Königsberg.

**Erster Band.**

Gr. 8. Preis 1 Thlr. 20 Gr., oder 3 Fl.

Inhalt: Über die Advocatur der Ärzte. Über den Beweis der Vergiftung. I. Arsenikvergiftung, erwiesen durch das gleichzeitige Erkranken nach derselben Gelfe, die Krankheitserscheinungen, die Leichenöffnung und die Ausgrabung. II. Arsenikvergiftung, erwiesen durch die Krankheitserscheinungen, die Leichenöffnung und den Gehalt des überreifes der genossenen Speise. III. Arsenikvergiftung, durch die Krankheitserscheinungen und den Leichenbefund wahrscheinlich gemacht, ohne nähern Beweis. IV. Vergiftung durch Schwefelsäure im Schlafe. Ob Mord? ob Selbstmord? I. Selbstmord undenkbar. Stich in die Brust. II. Selbstmord wahrscheinlich. Erwürgung. III. Selbstmord möglich. Zerbrechung des Kehlkopfs. Über die nähere Bestimmung der Tödtlichkeit einer Verletzung. Kopfverletzungen. I. Unbedingt nothwendige Tödtlichkeit. a) Schädelbruch mit Extravasat. b) Desgleichen mit Depression und

Erweichung des Gehirns. 2. Bedingt nothwendige Tödtlichkeit. a) Zerreißung innerer Hirngefäße. b) Schleimige Entzündung und Eiterung des Gehirns. c) Hirnerkütterung bei Trunkenheit und Erstickung. 3. Individuell nothwendige Tödtlichkeit. a) Zerreißung des Querschlüßlers. b) Extravasat in den Hirnschalen und unter dem kleinen Hirne. c) Schädelbruch und Extravasat. d) Extravasat. 4. Zufällige Tödtlichkeit. a) Meningitis. b) Schleimige Entzündung und Eiterung des Gehirns. c) Wahnitis. 5. Unerwartige Ursache des Todes. Brustwunde und Erstickung. a) Stich durch die Brust in die Leber. b) Erstickung durch Betten. c) Zusammenbrüchung des Kehlkopfs. d) Desgleichen. e) Ertränkung. Verletzungen des Unterleibes. I. Peritonitis mit Ergießung nach einem Stiche. II. Desgleichen nach Verwundung mit einem glühenden Eisen. III. Verletzung der Milz nach einem Stiche. Vielfache Mißhandlungen. I. Unbedingt nothwendige Tödtlichkeit. II. Desgleichen. III. Unerwartige Ursache des Todes.

Stuttgart und Tübingen, im November 1838.

**J. C. Cotta'sche Buchhandlung.**

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

**Person (Abbé), Das Ende der alten und das Aufleben einer neuen Welt. Streifzüge durch rationalistische Gebiete.**

Gr. 8. Geheftet. 1 Thlr. 8 Gr.

In einem Augenblick, wo der in alle Höhen und Tiefen der socialen und individuellen Zustände so mächtig eingreifende Rationalismus aus verdammen Urtheile bereits überreife überlebt hat und wissenschaftlich gesichtet und getäutert zum eigentlichen Geist der Zeit sich erhebt, kann ein Buch, welches dieselbe Richtung bei einer bedeutenden Zahl französischer und zwar katholischer Gelehrten unumwunden darlegt, jedem Gebildeten nur willkommen und höchst interessant erscheinen.

In unserm Verlage erschien und ist durch alle guten Buchhandlungen zu beziehen:

**Prolegomena zur Historiosophie**

von

**August von Cieszkowski.**

10 Bogen. Velinpapier. Sauber broschirt. Gr. 8. 16 Gr. Berlin, im November 1838.

**Zeit & Comp.**

Durch alle Buchhandlungen ist von uns zu beziehen:

**Guide pratique pour l'étude et le traitement DES MALADIES DES YEUX,**

par

**Ch. J. F. Charron du Villards.**

2 vols. Avec planches. In-8. Paris. 6 Thlr

Dieses neue Werk des berühmten Arztes wird als ein Gewinn für die Wissenschaft auch seinen deutschen Kunstgenossen willkommen sein.

Leipzig, im November 1838.

**Brochhaus & Wenarius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur. (A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)



# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXXV.

Dieser literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Zeile 2 Gr.

## An den Redacteur der „Blätter für literarische Unterhaltung“.

Pinsk (Rußland), 14. Nov. 1838.

Sie werden sich wundern, daß ein Bewohner aus Pinsk, dessen Geist in der Einsamkeit sich mit Ihren Blättern erquickt, Sie mit dem Gesuche beunruhigt, auch seiner Stimme in Ihrer Zeitschrift den Platz einzuräumen. Den Anlaß dazu gab der wüthige Ausfall über die Sprache der Thiere, den ich in Nr. 301 d. Bl. nicht ohne heilsame Lebererquickung gelesen habe. Aber dem Großsinne folgt der Geist sehr oft schnell nach. Als Mitglied der medicinischen Gesellschaft zu Wilna bekannt mit den Umständen der erschienenen Inaugural-Dissertation des Hrn. Wisniewski, erlauchte ich über die spöttische Umfassung einer einsachen, reinen Thatsache; und, eingebend des bekannten Spruchs: Amicus Plato, amicus Cato, sed magis amica veritas, konnte ich meinen heftigen Drang zur Schriftstellerei diesmal nicht bezwingen. Die Dissertation des Hrn. Wisniewski, ehemaligen Zuhörers in der medicinischen Facultät der gemeinen wilnaer Universität, welcher die Stelle eines außerordentlichen Professors in der Charower Universität bekleidet und der im verfloßenen Jahre nach Wilna kam, um die Doctorwürde zu erlangen, führt den Titel: „Descriptio Raphaniae epidemice grassantis etc.“ (von der Kriebelkrankheit), und ist auf der andern Seite des Titelblatts mit der Unterschrift des gelehrten Secretars der Akademie, des Hrn. Doctors der Medicin und Philosophie, Staatsraths Eichwald's, bekräftigt, dem nach den akademischen Gesetzen die Pflicht obliegt, alle von der Konferenz approbirten und zum Druck bestimmten Inaugural-Dissertationen unter seiner Aufsicht und Sorge zu haben. Sollte schon das Titelblatt und der bekannte Name eines gelehrten Mannes dem Spötter nicht hinreichend gewesen sein, um eine folgerechte Muthmaßung zu hegen, daß die medicinisch-chirurgische Akademie zu Wilna einen ganz andern Bewegungsgrund gehabt habe, um dem Candidaten die in dieser Anstalt so schwer zu erreichende Doctorwürde zu theilen, als die am Ende der Dissertation angeknüpfte Meinung besäßen über die Sprache der Thiere? Der Candidat Wisniewski wurde, nach einer strengen theoretischen Prüfung aus allen Gegenständen der Medicin, zu der Vertheidigung seiner Dissertation über die Kriebelkrankheit in einer öffentlichen Versammlung zugelassen, und hat den Forderungen der Gesetze Genüge geleistet. Es war damals keine Erwähnung von der Sprache der Thiere. Der Druck dieser Epistole war ihm allein nur deswegen gestattet, weil er, von der vorgefaßten Meinung darüber eingenommen, selbst dringend darauf bestand und dieselbe als sein intellectuelles Eigenthum behauptete: ein Beweis, daß man in Rußland gegen die Meinungen der Gelehrten nachsichtig ist. Dies war auch ohne allen Zweifel die Ursache, daß die kaiserliche Charower Universität nicht nur dem Hrn. Wisniewski gestattet, in einer öffentlichen Sitzung in der von ihm gehaltenen lateinischen Rede (Artis veterinariae conditio praesens, — impedimenta quae eidem perniciendae hodieum obstant, — atque momenta, quae ad illam excolendam magis valent. Charcoviæ, 30<sup>to</sup> Augusti. A. 1838. Typis Universitatis) unter Anderm auch diese Idee zu entfalten, sondern ließ auch seine Rede auf seine eignen Kosten drucken. Es ist kein Wunder, daß in akademische Inaugural-Dissertationen, deren un-

geheure Menge fast alle wissenschaftliche Gegenstände erschöpft zu haben scheint, manche Ungereimtheiten sich einschleichen, wenn auch größere Werke nicht ganz frei davon sind. Haben Sie je gehört, daß ein Kal auf den Federn weidet? Und doch liest man in dem Werke eines unserer rühmlichst bekannten Zoologen (Zoologia Specialis. Vilnae 1829: Pars posterior — tertia — S. 109): „Anguilla agros pisorum frequentare diligit.“ Warum verläßt der Kal sein Element? Warum floppet er auf dem fremden Gebiete nach? Ein Wistling würde antworten: Fremde Erbsen schmecken gut. — Hat jemand bis dahin vermuthen können, daß der persische König Darius mit seinem ganzen Heere, die Scythen und Melanchlanen vor sich treiben, bis in die Gegenden von Pinsk gekommen sei? Und doch finden wir diese Behauptung in einem sehr gelehrten Aufsatze. (In einer Zeitschrift: Russische Encyclopädie, Bd. 27, Heft 2, März 1838, S. 81.) Wir Einwohner von Pinsk glauben daran gar nicht; denn wäre es der Fall gewesen, so würden wir in den großen pinskischen Sümpfen und Morästen von ungefähr auf eine Masse Menschen und Thierknochen stoßen! Dieser Umstand, wie manche andere aus dem Dunkel des grauen Alterthums ausgegrabenen Anzeigen würden manchen Zoologen verleitet haben zu behaupten, daß diese Sümpfe den Rückstand von der fünfjährigen Überschwemmung ausmachen, daß die ganze pinskische Gegend von Käsefressern, blauen und rothen Menschenrazen (Rubinen, Wubinen) bewohnt war, und daß die vorfindenden Thierknochen zu dem antebulbianischen Geschlechte der Elefanten (E. primigenius), Mammonten, Mastodonten und der den amerikanischen ähnlichen Megatherien und Megalonyxen gehören! Welch ein Feld zu neuen Entdeckungen! Welche vortheilhafte Ausichten für die rastlose Bemühung, ein neues Buch zu schreiben!

Ich zweifle nicht an Ihrer Wahrheits- und Gerechtigkeitssiebe, und bin überzeugt, daß diese Zeilen das Licht der Presse auf dem classischen deutschen Boden erblicken werden.

X.

## Nüge eines literarischen Verschens.

In Hrn. Micheler's „Geschichte der letzten Systeme der Philosophie in Deutschland“ liest man Bd. 2, S. 635, folgende Worte:

„Als ich den ersten Band der Hegel'schen Werke 1832 „herausgab, wollte Weiße die Hegel'sche Abhandlung, „über das Verhältniß der Naturphilosophie zur Philosophie überhaupt“ in öffentlichen Blättern Schelling's, doch gewiß „unaufgefordert, vindiciren, und es bedurfte einer förmlichen „Erwiderung von meiner Seite, sowie des beharrlichen „Schweigens Schelling's, um diesen Mangel des kritischen „Takte in seine Schranken zu verweisen.“

Erst durch diese Aufforderung fand Unterzeichneter sich veranlaßt, über den eigentlichen Verfasser jener bekanntlich zuerst in Schelling's und Hegel's „Kritisches Journal der Philosophie“, gleich allen Aufsätzen dieser Zeitschrift ohne Namensunterzeichnung erschienenen Abhandlung des Hrn. Geheimraths v. Schelling schriftlich anzufragen, dessen „beharrliches Schweigen“, bei seiner bekannten Geringschätzung aller von gewisser Seite her so reichlich ihm zugefügter Anklagen, keineswegs bescheiden oder in der einmal gefaßten, wohlbegründeten Überzeugung ihrer machden konnte. Verbunden ward damit eine ähnliche Anfrage hinsichtlich des im 16ten Bande von Hegel's Werken wieder ab-

gebrachten Auffassungen: „über das Wesen der philosophischen Kritik überhaupt und ihr Verhältniß zum gegenwärtigen Zustand der Philosophie insbesondere.“ Die Antwort Schelling's in einem Briefe vom 18ten Oct. d. J. lautet wie folgt:

„Was den unter Hegel's Schriften aufgenommenen Aufsatz: „Verhältniß der Naturphilosophie zur Philosophie überhaupt“, betrifft, so ist Ihre Vermuthung vollkommen gegründet. Es ist darin kein Buchstabe von Hegel, ja er hat ihn vor dem Abdruck nicht gesehen. Was die Einleitung zu dem kritischen Journal betrifft (Wesen der philosophischen Kritik u. s. w.), so ist sie zum Theil von Hegel geschrieben; viele Stellen, die ich jedoch im Augenblick nicht näher zu bezeichnen wüßte, sowie die Hauptgedanken, sind indeß von mir; es mag wol keine Stelle sein, die ich nicht wenigstens revidirt.“

Dies zugleich als Beitrag zur Beantwortung der Frage: welche von beiden besser mit Hegel vertraut sind, die „Treu-gebliebenen“, oder die „Pseudo-Hegelianer“, die „von der Schule Ausgestoßenen“ (etwa als „der Stein, den die Bauleute verworfen haben“, Matth. 21, 42—44, da ja Hr. Michelet auf derselben Seite, a. a. D. S. 630, wo er diesen Letzten des Ausstoßens berichtigt, den Spruch Matth. 22, 14 anführt?), die von Jenen unaufhörlich, Hegel nicht verstanden zu haben, bezüchtigt werden.

Leipzig, den 26ten November 1838.

Weiße.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

## Das Pfennig-Magazin

für Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse.

1838. November. Nr. 292—295.

Nr. 292. \*Überlin. Behemoth und Leviathan. Das Neueste aus der Natur- und Gewerbswissenschaft. Beharrlichkeit eines Hindu. \*Der Saugeisch. — Nr. 293. \*Die Ruinen von Babylon. Der Abaffater. Die schlagenden Wetter. \*Nelson. Das Neueste aus der Natur- und Gewerbswissenschaft. (Fortsetzung.) Gewinnung des Seesalzes. Eine ungeheure Mattenfalle. — Nr. 294. \*Wiesbaden. Das Neueste aus der Natur- und Gewerbswissenschaft. (Beischluß.) \*Corneille. Die Stednabelfabrikation. \*Die südafrikanischen Dschin. — Nr. 295. \*Die spanische Armada. Panama. \*Robin Hood. Das Filtriren des Wassers. Das menschliche Gehirn. \*Cafarea. Die mit \* bezeichneten Aufsätze enthalten eine oder mehrere Abbildungen.

Preis dieses Jahrgangs von 52 Nummern 2 Thlr. — Der Preis der ersten fünf Jahrgänge von 1833—37, Nr. 1—248 enthaltend, ist von 9 Thlr. 12 Gr. auf nur 5 Thlr. ermäßigt. Einzelne kostet jeder dieser Jahrgänge 1 Thlr. 8 Gr. Leipzig, im December 1838.

F. A. Brockhaus.

Bei Th. Fischer in Kassel ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Abbildung und Beschreibung blühender Cacteen von Dr. L. Pfeiffer und Fr. Otto. königl. Gartendirector in Berlin. 1ste Lieferung. Gr. 4. Subscriptionspreis à Lieferung 1 Thlr.

Das Werk erscheint in einzelnen Heften in gr. 4., deren jedes 5 lithographirte Tafeln und ebenso viele Blätter Text enthalten wird.

Die Tafeln werden nicht in systematischer Ordnung folgen, sondern aus den bereits vorhandenen, seit einer Reihe von Jahren sowohl im berliner botanischen Garten als an andern Orten entworfenen Abbildungen blühender Cacteen, mit vorzüglichster Berücksichtigung des Neuesten und Interessantesten, allmählig ausgewählt, und in jedem Hefte aus verschiedenen Gattungen Arten mitgetheilt werden. Die Blu-

men, Früchte und andere instructive Theile der Pflanzen werden colorirt, wie auch jedesmal ein charakteristischer Theil des Stammes; das Übrige bleibt uncolorirt und wird in Lithographie von geübten Künstlern ausgeführt.

Der Text zu jeder Tafel wird die lateinische Diagnose der Art, mit Hinweisung auf die vorhandenen Hülfsquellen, und eine kurze Beschreibung in deutscher und französischer Sprache enthalten, und so eingerichtet werden, dass das Ganze später nach systematischer Folge geordnet und zusammengebunden werden kann.

Exemplare mit vollständig colorirtem Stamm werden auf besondere Bestellungen für 3 Thlr. die Lieferung abgegeben.

Bei F. B. Wallischauffert in Wien ist zu haben und durch jede gute Buchhandlung zu beziehen:

## AGLaja.

Taschenbuch. Neue wohlfeilere Ausgabe. XVI. Band. 1 Thlr. 4 Gr. Feiner Einband 1 Thlr. 8 Gr. Preis für complet 1—XVI 18 Thlr. 16 Gr. und seine Ausgabe 21 Thlr. 8 Gr.

Diese wohlfeilere Ausgabe besteht nur aus 16 Jahrgängen, weil der Vorrath nicht erlaubte, sie gleich der ersten Ausgabe bis 18 zu vermehren. Nur sehr wenige Exemplare der ersten Ausgabe mit feinsten Kupfern und Satineteinband sind noch vorrätig. Auch von der wohlfeilen Ausgabe werden die completen Exemplare bald vergriffen sein.

Die 16 Jahrgänge enthalten 93 Sohn'sche Kunstblätter und Erzählungen und Gedichte von den ausgezeichnetsten Schriftstellern, so daß diese Sammlung gewiß jedem Käufer Vergnügen machen wird. Sie ist das Wohlfeilste, welches bei so viel ausgezeichnetem Werth an literarischem Product geliefert werden kann.

Bei C. W. Leske in Darmstadt ist soeben erschienen und in jeder soliden Buchhandlung zu haben:

Mayo, Herbert (Wundarzt am Middlesex-Hospital und Professor am königl. Collegium der Ärzte in London), Grundriss der speciellen Pathologie mit besonderer Berücksichtigung auf die pathologische Anatomie. Aus dem Englischen übersetzt und mit einigen Zusätzen und Anmerkungen herausgegeben von Dr. F. Amelung, grossherzogl. hess. Medicinalrath e. etc. Erste Abtheilung. Gr. 8. Velindruckpapier. 25½ Bogen. Preis 1 Thlr. 16 Gr., oder 3 Fl.

Das Original der hier angezeigten Übersetzung hat sich bereits die Anerkennung ausgezeichnetester deutscher Gelehrten erworben, und Heusinger nennt es in Schmidt's Jahrbüchern der gesamten Medicin, Jahrgang 1836, Band XI, Heft 3, eine der ausgezeichnetsten Erscheinungen der neuern Literatur, empfiehlt es der sorgfältigen Beachtung der deutschen Ärzte und spricht die Überzeugung aus, dass kaum ein anderes Werk mehr zur allgemeinen Einführung der pathologischen Anatomie in die praktische Medicin beitragen wird, als das vorliegende. Die zweite Abtheilung erscheint bald nach Neujahr.

Darmstadt, im October 1838.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Bozzaris, G., Die Schande der deutschen Journalistik. 6 Gr.

Leipzig, im November 1838.

Wilhelm Naud.

Im Literatur-Comptoir in Stuttgart erschien soeben und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

# Der Unabhängigkeits-Kampf

der  
spanisch-amerikanischen Colonien.

Dargestellt

von

Dr. Franz Kottenkamp.

Zugleich Supplementband zu Ernst Münch's allgemeiner Geschichte der neuesten Zeit,  
in 7 Bänden.

Geh. Preis 1 Thlr. 21 Gr. Preuss., oder 3 Fl. Rhein.

## GRATIS

für die Käufer der soeben ausgegebenen, neuen, wohlfeilen Ausgabe von Münch's Geschichte der neuesten Zeit in 7 Bänden, à 1 Thlr. Preuss., oder 1 Fl. 36 Kr. Rhein.; dieselben erhalten ferner gratis den bereits im vorigen Jahre erschienenen Supplementband von Dr. Kottenkamp (Preis 1 Thlr. 6 Gr., oder 2 Fl.), zusammen also eine Prämie im Werth von 8 Thlr. 8 Gr. Preuss., oder 5 Fl. Rhein.

Die Verhältnisse der spanisch-amerikanischen Colonien, noch in Deutschland fast gar nicht bekannt und doch so wichtig, daß sie selbst auf die Entwicklung europäischer Zustände oft den unmittelbarsten Einfluß üben, sind darin in einer Weise geschildert, wie sie nur aus einem gründlichen und mühsamen Quellenstudium, aus einer genauen Kenntniß der europäischen Geschichte der letzten drei Jahrhunderte, und aus jener ruhigen, vorurtheilsfreien Anschauung der Thatfachen hervorgehen konnte, welche die erste und schönste Eigenschaft jedes Historikers sein muß.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

## Das Pfennig-Magazin für Kinder.

1838. October. Nr. 40—43.

Nr. 40. \*Die wilden Eingeborenen von Neuhollland. \*Der Alligator oder Kaiman. Die Sage von der Friedenspfeife. Der Bär und der Panther. Die zwei Bäume. \*Das Cabriolet. Auflösung des Räthfels im vorigen Monat. — Nr. 41. \*Die Fliegenfalle. Übung macht den Meister. Die Wirkungen eines Erkrans in Ostindien. \*Die St.-Korenkirche. Die Elefanten in Indien. \*Die Brandente. — Nr. 42. \*Fränzchen und Marie. \*Die Rosengallwespe und die Schlafäpfel. Die Affen in Ostindien. Das Wiesel und die Schwalben. \*Die Windrose. Räthfel. — Nr. 43. \*Großer Prahler, schlechter Richter. \*Das Fest des Nils. Der Ausbruch des dreißigjährigen Krieges. \*Der aschgraue Waffertreter.

Die mit \* bezeichneten Aufsätze enthalten eine oder mehre Abbildungen.

Preis dieses Jahrgangs von 52 Nummern 1 Thlr. — Der erste bis vierte Jahrgang kosten ebenfalls jeder 1 Thlr. Leipzig, im December 1838.

F. A. Brockhaus.

Bei F. H. Köhler in Stuttgart ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## Anekdoten von Gelehrten

und

### Curiositäten der Literatur.

2tes, 3tes, 4tes Bändchen.

Elegant broschirt. à 6 Gr., oder 24 Kr.

Den zahlreichen Abnehmern dieser mit großem Beifall aufgenommenen interessanten Sammlung wird die Nachricht von dem Erscheinen dieser Fortsetzung gewiß sehr willkommen sein. Man findet unter vielen andern auch Scenen aus dem

Leben von Hoffmann, Schiller, Wieland, Voltaire, Montesherbes, d'Argens, Zinkgräf, Rousseau, Boerhave u. s. w. u. s. w.

Das erste Bändchen erschien 1836.

Bei R. G. Elwert in Marburg ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## Über die falsche Idealität.

Von

Geheime Hofrath Gd. Platner zu Marburg.

Gr. 8. Brosch. 2 Gr., oder 9 Kr.

Unabediffen (Hofrath und Professor), Die Grundzüge der philosophischen Tugend- und Rechtslehre. Gr. 8. 13 Bogen. Brosch. 20 Gr., oder 1 Fl. 30 Kr.

Früher ist bei uns erschienen und ebenfalls in allen Buchhandlungen zu haben:

Die Grundzüge der Metaphysik von Hofrath Unabediffen. Gr. 8. Brosch. 18 Gr., oder 1 Fl. 21 Kr.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

Blätter für literarische Unterhaltung. (Verantwortlicher Herausgeber: Heinrich Brockhaus.) Jahrgang 1838. Monat November, oder Nr. 305—334, und 5 literarische Anzeiger: Nr. XXXVIII—XXXII. Gr. 4. Preis des Jahrgangs von 365 Nummern (außer den Beilagen) auf seinem Druck-Weinpapier 12 Thlr. Repertorium der gesammten deutschen Literatur. Herausgegeben von E. G. Gersdorf. 1838. Achtzehnten Bandes zweites Heft. (Nr. XX.) Gr. 8. Preis eines Bandes 3 Thlr.

Allgemeine Bibliographie für Deutschland, Jahrgang 1838. Monat November, oder Nr. 44—48, und Bibliographischer Anzeiger: Nr. 44—48. Gr. 8. Preis des Jahrgangs 3 Thlr.

Leipzig, im December 1838.

F. A. Brockhaus.

In der Unterzeichneten ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Gedichte

von

**Ludwig Uhland.**

**Swülke, einzig vollständige Original-Ausgabe.**

Mit dem Bildnisse des Verfassers in Stahl gestochen.

8. Velinpapier. In Umschlag broschirt. Preis 2 Thlr. 12 Gr., oder 3 Fl. 36 Kr.

Da verschiedene süddeutsche Nachdrücke nur die vor dem Jahr 1818 erschienenen, mithin 19 Gedichte weniger enthalten, so können sie auf die Vollständigkeit gegenwärtiger zwölften Original-Auflage keinen Anspruch machen, der sie in Beziehung auf Ausstattung überdies weit nachstehen.

Stuttgart und Tübingen, im October 1838.

**J. G. Cotta'sche Buchhandlung.**

## Geschichte Napoleon's.

**LAURENT,**  
**Histoire**  
*de l'empereur*  
**NAPOLÉON.**

illustrée  
par **Horace Vernet.**  
In-8. Paris. 20 Fr.

**DE NORVINS,**  
**Histoire de Napoléon.**

*Avec Vignettes*  
par **R A F F E T.**  
In-8. Paris. 20 Fr.

Wir machen mit Vergnügen auf zwei Prachtwerke aufmerksam, welche sich den Ruhm streitig machen, das Leben Napoleon's durch Wort und Zeichnung zu verherrlichen. Norvins' anerkannte geschichtliche Darstellung mit Raffet's Zeichnung auf der einen Seite, Laurent's neue Auffassungsweise verbunden mit Horace Vernet's künstlerischen Vignetten auf der andern, verfolgen beide Werke die großartige Erscheinung von ihrer Geburt bis an ihr Ende.

Beide Werke erscheinen in höchst eleganter Ausstattung in 80 Lieferungen zu 2½ Gr. Die ersten Lieferungen sind durch alle Buchhandlungen von uns zu beziehen.

Leipzig, den 1sten December 1838.

**Brockhaus & Wenarius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

Sieben ist bei Unterzeichnetem erschienen:

**Die Vorzüge der doppelten Spurbahn-**  
**straße** vor den gewöhnlichen Kunststraßen, zur theore-  
tischen und praktischen Prüfung empfohlen von  
**Dr. F. G. Germar.** 111 Seiten. Gr. 8.  
Mit Steindruck. 16 Gr.

Der Zweck der Schrift ist, nach des Verf. Angabe, Einl.  
S. 1: den Kunststraßen bei geringern Kosten eine größere Be-  
quemlichkeit, Sicherheit und Ausdauer zu geben, ja, so weit es  
thunlich ist, den Vorzügen der Eisenbahnen nahe zu bringen,

dadurch aber eine Möglichkeit zu eröffnen, daß sie, die bisher  
eine große Last aller Staaten waren, bei einem angemessenen  
Abgabentarif ein Gegenstand der Bewilligungen für Privats-  
vereine werden können.

Kttona, im November 1838.

Karl Aue.

Im Verlage von Alexander Duncker in Berlin  
ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu  
beziehen:

**Medicinish - Chirurgisch -**  
**THERAPEUTISCHES WÖRTERBUCH**  
oder

**Repertorium der vorzüglichsten Curarten,**  
die in dem Zeitraume von 1750 — 1838,  
mit Rückblicken auf die ältere und älteste Zeit,  
von den berühmtesten Ärzten Deutschlands, Eng-  
lands, Frankreichs und Italiens angewendet und  
empfohlen worden sind.

Herausgegeben

*durch einen Verein von Aerzten.*

Mit einem Vorworte des Geheimen Medicinalraths Professors

**Dr. Barez.**

1ster Band. 2te Lieferung.

Die medicinische Welt hat bereits bei der Publica-  
tion der 1sten Lieferung dieses Werks eine so lebhaft  
Theilnahme für dasselbe an den Tag gelegt und sich so  
beifällig über Plan und Ausführung desselben ausgesprochen,  
dass es überflüssig erscheint, hier noch Empfehlendes  
und Lobendes hinzuzufügen. Mögen nunmehr auch die-  
jenigen Mediciner, denen das Werk noch nicht zu Gesicht  
kam, sich die Einsicht der beiden erschienenen Lieferungen  
verschaffen, da ich es gern einem Jeden überlasse, sich durch  
eine Anschauung von dem Werth und der praktischen  
Brauchbarkeit des Buches zu überzeugen. Nicht der Zahl  
inhaltloser Speculationsunternehmungen ist dies **thera-  
peutische Wörterbuch** zuzugesellen, es gehört der  
Wissenschaft und deren Förderung, und die Medicina wird  
es den Herausgebern Dank wissen, darin eine übersichtliche  
Zusammenstellung eines so reichen, aber bisher ungeord-  
neten und darum unbrauchbaren Stoffes geliefert zu haben.

Die Hefte folgen nun alle Monate regelmässig aufein-  
ander. Nach Beendigung des 1sten Bandes tritt ein ver-  
hältnismässig höherer Ladenpreis ein.

Berlin, den 15ten November 1838.

**Alexander Duncker.**

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXXXVI.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

## Leipziger Allgemeine Zeitung.

Motto: Wahrheit und Recht, Freiheit und Gesetz!

Die Stimmen, welche über die Leipziger Allgemeine Zeitung im ersten Jahre ihres Bestehens laut geworden sind, freundliche und unfreundliche, haben uns die Zuversicht einflößen dürfen, daß wir das Ziel, welches bei diesem Unternehmen uns vorschwebte, nicht ganz verfehlt haben; den Wohlwollenden danken wir für die Anerkennung unseres Strebens, die Uebellwollenden haben uns auf unserm Wege nicht irre gemacht, und auch ihnen sind wir verbunden, da sie uns auf manche Klippe aufmerksam gemacht haben, die zu vermeiden war. Wir haben uns bei dem Beginne des Unternehmens die Schwierigkeiten keineswegs verhehlt, die theils aus der Natur und dem Umfange desselben hervorgehen, theils in den eigenthümlichen Verhältnissen liegen, welche in Deutschland der Besprechung öffentlicher Angelegenheiten nur zu ungünstig sind; aber bei dem Versuche, sie zu überwinden, ist der Redaction sowohl ihr Ziel immer klarer vor Augen getreten, als sie auch mit den Mitteln es zu erreichen vertrauter geworden ist, und sie glaubt erfüllt zu haben, was sie bei dem Eintritt in ihre Laufbahn aussprach, daß ihre Anstrengungen mit den Schwierigkeiten der Aufgabe wachsen sollten.

Unparteiische Darstellung der Zeitgeschichte ist unverbrüchlich ihr Gesetz gewesen, und sie ist demselben gewissenhaft nie untreu geworden, so schwierig es immer für den Zeitgenossen der Ereignisse ist, mitten unter den Eindrücken der Gegenwart, unter streitenden Ansichten und Meinungen, oft unter geflüstert hervorgerufenen Täuschungen und Wirren so unbefangen zu bleiben, als es dem Geschichtsschreiber möglich ist, der einen Zeitraum der Vergangenheit nach kritischer Prüfung der Zeugnisse darzustellen unter-

nimmt. Ihren Wahlspruch: „Wahrheit und Recht, Freiheit und Gesetz!“ hat unsere Zeitung, wie wir hoffen, nie verleugnet; sie hat stets getrachtet, in ihren Berichten der Wahrheit treu zu bleiben, und wo sie durch ungenaue und allerdings in einigen Fällen durch falsche Mittheilungen irre geführt war, nie verhehlte Berichtigungen aufzunehmen; sie hat jeder Meinung Raum zu offener Erörterung gegeben, die mit Gründen und ohne gehässige Leidenschaftlichkeit auftrat; sie hat endlich, indem sie dem Grundsätze des unhemmbaren Fortschrittes in allen menschlichen Dingen huldigte, das heilige Gesetz geachtet, das der starke Anker der gesellschaftlichen Ordnung und dabei auch die sichere Bürgschaft jenes Fortschrittes ist. Diesen Grundsätzen wird die Leipziger Allgemeine Zeitung unwandelbar anhangen; aber, ermuntert durch die Anerkennung ihrer Bemühungen, wird von uns Alles angeboten werden, diesem Organ der Öffentlichkeit immer mehr das Vertrauen der Unbefangenen zu gewinnen, und durch Auswahl des Stoffes, durch Mannichfaltigkeit der Mittheilungen, die eine immer weiter sich ausbreitende Correspondenz erleichtert, durch Genauigkeit und Vollständigkeit ihrer Berichte, durch sorgfältige Beachtung der großen politischen Fragen, welche die Zeit bewegen, durch vorzügliche Berücksichtigung deutscher Angelegenheiten und durch Auffassung der wichtigsten culturgeschichtlichen Momente der Gegenwart, allen höhern Anforderungen immer mehr zu genügen.

Dem Vorstehenden erlaubt sich die unterzeichnete Verlags-Handlung der Leipziger Allgemeinen Zeitung noch hinzuzufügen, daß die bedeutende Theilnahme, die das Blatt in der kurzen Zeit seines Bestehens in allen Theilen Deutschlands und des Auslandes gefunden, es ihr gestattet, schon vom nächsten Jahre eine

### bedeutende Preisermäßigung

eintreten zu lassen. Der Preis, der für Sachsen auf jährlich 10 Thlr. berechnet war, wird vom Jahre 1839 an auf

### acht Thaler

für den ganzen, 4 Thlr. für den halben Jahrgang und 2 Thlr. für das Vierteljahr gestellt und demgemäß überall in diesem Verhältnisse ermäßigt werden. Im Königreich Preußen wird das Blatt anstatt 15 Thlr. 12 Sgr. künftig nur höchstens 11 Thlr. jährlich, 5 Thlr. 15 Sgr. halb- und 2 Thlr. 22½ Sgr.

vierteljährlich kosten. Die **Leipziger Allgemeine Zeitung** erscheint wie bisher täglich Abends in 1 oder 1½ Bogen in Hochquart auf schönem Velinpapier und ein vollständiges Register wird jährlich geliefert.

In dem Maße, als die **Leipziger Allgemeine Zeitung** den Kreis ihrer Leser vergrößerte, hat sich auch bei dem Publicum die Überzeugung befestigt, daß gerade in diesem Blatt

## Ankündigungen aller Art

die allgemeinste Verbreitung finden, sodaß die Anzahl der Ankündigungen in dem laufenden Jahre mit der der ältesten und gelesensten Blätter Deutschlands sich messen darf. Auf die typographische Anordnung der Ankündigungen wird große Sorgfalt gewendet und sie finden ihren Platz sämmtlich in dem Hauptblatte, was nicht wenig zur Beachtung der Anzeigen beiträgt. Für den Raum einer Zeile werden 1½ Gr. berechnet.

**Alle Postämter und Zeitungsexpeditionen nehmen Bestellungen auf die Leipziger Allgemeine Zeitung an, die man bald zu machen bittet, um die Auflage bestimmen zu können.**

Leipzig, im December 1838.

**F. A. Brockhaus.**

Sieben erschienen in **Ernst Klein's** literarischem Comptoir in Leipzig:

### Das kalte Wasser.

Wo ist es anzuwenden, wo nicht?

Geschichte der Wasserheilkunde, diätetische Benützung des kalten Wassers. Darstellung der wichtigsten Krankheitsformen nach ihren charakteristischsten Erscheinungen nebst ihrer zweckdienlichen Behandlung. Als zweckmäßiges Haus- und Hülfsbuch für alle Stände nach den besten und neuesten Quellen und nach eigener mehrjähriger Erfahrung bearbeitet von Dr. R. A. Koch. Nebst systematischem Inhaltsverzeichnis und alphabetischem Register. Broschirt. 1 Thlr. 8 Gr.

### Classische Denksteine.

Sammlung ausgewählter Gedanken und Sentenzen über Welt und Menschenleben, aus den Werken der Griechen und Römer. In den Originalsprachen mit deutschen Übersetzungen herausgegeben von Dr. Heinrich. Broschirt. 9 Gr.

### Musterung oder Grundelemente äußerer weiblicher Schönheitsheile.

Mit Anhang: Voboskopie. Frauen Spiegel. Herren Spiegel. Deutung der Schönheitsmaler. 2te Auflage. Broschirt. (In Commission.) 3 Gr.

### Panorama und Schilderung

des Reiches der Liebe.

Herausgegeben von Ritter Gb. v. Schaul. Mit einem lithographirten Kärtchen. 2te Auflage. (In Commission.) Broschirt. 4 Gr.

### N ä c h t e.

Romantische Skizzen aus dem Leben und der Zeit, von Hermann Goebische. 1ster Theil. Velindruckpapier. Broschirt. 1 Thlr.

### A h m e d B e y,

oder: Der Harem und die Erstürmung von Konstantine im Jahre 1837. Historisches Charakter- und Völkergemälde aus Nordafrika. Vom Herausgeber des Schobri. 1 Thlr.

### Die drei Hauptbrände

des Winters 1837 — 38.

I. Der Brand des Winterpalastes in St.-Petersburg, oder Wohlthun und Vergeltung. II. Der Brand der Börse in London. III. Der Brand des italienischen Opernhauses in Paris. 21 Gr.

### Der Glückspilz,

oder: Hans kommt durch seine Dummheit fort. Komischer Roman von Dr. E. Glockentreter, Verf. v. Casanova's II. Eigenschaften und Abenteuer u. 1 Thlr.

### Neugriechischer Dolmetscher,

nebst türkischem und albanesischem. Enthaltend: Kleine neugriechische Sprachlehre, systematisch geordnete Wörter und kurze Redensarten. Mit überall beigefügter Aussprache. Von M. J. A. E. Schmidt. Zweite Ausgabe, vermehrt mit allen auf die neue Gestaltung Griechenlands bezüglichen Ausdrücken, auch einer Salvations- und vergleichenden Tabelle. Geh. 10 Gr.

3 zweites Heft (zur 1sten Ausgabe), vorzüglich Ausdrücke in Bezug auf die neue Gestaltung Griechenlands enthaltend. 4 Gr.

### Mémoires

de

### J. Casanova de Seingalt

écrits par lui-même.

Édition originale. Tomes 9, 10, 11, 12.

Preis 6 Thlr. 20 Gr.

Obige seit langer Zeit erwarteten letzten 4 Bände dieses bekannten Werkes, welche besonderer Verhältnisse wegen nicht früher ausgegeben werden konnten, sind soeben erschienen.

Brüssel, im November 1838.

**Karl Muquardt,**

Buchhandlung für in- und ausländische Literatur.

**Beachtenswerthe Anzeige für Bibliotheken, Lesevereine, Gutsbesitzer, Landbeamte,  
Gewerbtreibende u.**

**Neue Journale und neueste Sammlung von Länder- und Reisebeschreibungen.**

Vom 1ten Januar 1839 an erscheinen bei Fr. Schwend in Schwäbisch Hall:

**1) Flora.**

**Original-Chronik für die gewählteste schönwissenschaftliche Literatur des  
In- und Auslandes.**

In Verbindung mit Mehreren herausgegeben

von  
**Karl Winkler.**

Jährlich 156 Bogen groß Periktonoctav auf ausgezeichnet schönem weißen Papier mit scharfen Lettern in 52 Wochenheften von je 2½ Bogen Haupttext und ¼ Bogen Miscellen mit Quartaltiteln und Inhaltsverzeichnissen. Pränumerationspreis 3 Thlr. 12 Gr. oder 6 Fl. 18 Kr. Rhein. jährlich; 2 Thlr. oder 3 Fl. 36 Kr. halbjährlich, und 1 Thlr. 6 Gr. oder 2 Fl. 15 Kr. vierteljährlich.

Die Tendenz dieser Zeitschrift geht aus dem Titel hervor, und beabsichtigt hauptsächlich novellistische Darstellungen in deutschen Originalaufträgen neben dem Interessantesten der gesammten ausländischen Journalistik und Literatur in freier, eleganter Bearbeitung allen Ständen in einer Mannichfaltigkeit und Reichhaltigkeit und zu einem Preise darzubieten, wie dies von keiner Zeitschrift des In- und Auslandes erreicht wird.

Daneben enthält die „Flora“ als Beilage des Hauptblattes tageseigentliche Neuigkeiten, statistische und andere Notizen in größter Abwechselung unter dem Titel Miscellen.

Literarische Intelligenz Nachrichten werden zu ½ Gr. oder 2¼ Kr. Rhein. die gespaltene Zeile oder deren Raum aufgenommen.

**2) Merkur.**

**Zeitschrift für die Kenntniß aller Länder und Völker, ihrer Sitten und  
Zustände.**

Zur Unterhaltung und Belehrung für alle Stände.

In Verbindung mit Mehreren herausgegeben

von  
**Karl Winkler.**

Jährlich 104 Bogen groß Periktonoctav auf ausgezeichnet schönem weißen Papier mit scharfen Lettern in 52 Wochenheften von je 1¼ Bogen Haupttext und ¼ Bogen Miscellen mit Quartaltiteln und Inhaltsverzeichnissen. Pränumerationspreis 3 Thlr. oder 5 Fl. 24 Kr. Rhein. jährlich; 1 Thlr. 18 Gr. oder 3 Fl. 9 Kr. halbjährlich, und 1 Thlr. oder 1 Fl. 48 Kr. vierteljährlich.

Auch dieser Zeitschrift Tendenz ist es: allen Ständen zu einem von keinem ähnlichen Blatte erreichten Preise das Neueste aus der Länder- und Völkerkunde in reichster Mannichfaltigkeit vorzuführen. Sie enthält: Originalaufsätze zur Kunde fremder Länder und Völker, Auszüge aus See- und Landreisen aller Sprachen, Reiseftizgen, Schilderungen, Bilder- und Charakterzüge und Originalcorrespondenzen über den wissenschaftlichen, sittlichen und gewerblichen Verkehr des Auslandes.

Der „Merkur“ wird gleichfalls neben dem Hauptblatte unter dem Titel Miscellen eine Beilage erhalten, worin gebrängte Neuigkeiten aus der Tagesgeschichte, statistische, geographische und commerciale Notizen, Anekdoten und Ähnliches in großer Abwechselung mitgetheilt werden.

Literarische Intelligenz Nachrichten werden auch in dieses Blatt zu ½ Gr. oder 2¼ Kr. Rhein. die gespaltene Zeile oder deren Raum aufgenommen.

**3) Neueste fortlaufende Sammlung**

**der interessantesten Länder- und Reisebeschreibungen der ältern und  
neuesten Zeit.**

In Verbindung mit Mehreren herausgegeben

von  
**Karl Winkler.**

Jährlich gleichfalls 104 Bogen groß Periktonoctav auf ausgezeichnet schönem weißen Papier mit scharfen Lettern in 52 Wochenheften, mit Haupt- und Specialtiteln. Pränumerationspreise wie bei unserer Zeitschrift „Merkur“, aber nur in Verbindung



mit dem Merkur genommen, ohne diesen um die Hälfte höher, und die Einzelwerke um das Doppelte des ursprünglichen Preises.

In enger Verbindung mit unserer Zeitschrift „Merkur“ werden wir dem Publicum, auch hier von derselben Tendenz geleitet wie bei den beiden vorgenannten Zeitschriften, eine fortlaufende Sammlung der interessantesten, vorzugsweise der neuesten Länder- und Reisebeschreibungen in gebiegenen, klaren und eleganten Bearbeitungen aus allen Sprachen zu einem in der That unerhöbten billigen Preise liefern.

Die an alle Buchhandlungen und Postämter versendeten ausführlichen Prospekte besagen das Nähere.

Die erste Bogenlieferung einer jeden der drei Unternehmungen liegt vom 1sten December 1838 an bei allen Buchhandlungen und Postämtern vor.

**Man abonniert bei allen Postämtern und Buchhandlungen Deutschlands und des Auslandes.**

**Victor Hugo.**

In unserm Verlage ist soeben die Originalausgabe für Deutschland erschienen von:

## **RU Y BLAS,** Drame en cinq actes

par  
**Victor Hugo.**

In-18. Leipzig. 12 Gr.

Außer dieser wohlfeilen Originalausgabe von Victor Hugo's neuestem Drama, welches das Théâtre de la Renaissance glänzend eröffnete, ist auch die größere Ausgabe (Oeuvres complètes, T. VII, in-8.) zu 2 Thlr. 6 Gr durch alle Buchhandlungen von uns zu beziehen.

Leipzig, im December 1838.

**Brochhaus & Wennerius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

In der Hoffmann'schen Verlagsbuchhandlung in Stuttgart ist soeben erschienen:

## **Handbuch** über

## **die Krankheiten der Haut.**

Mit Zugrundelegung von Gibert's und Benutzung der übrigen vorzüglichsten Werke über die Hautkrankheiten herausgegeben

von  
**Dr. R. W. Nöck,**

Mitglied des Vereins für Heilkunde in Preußen, des Vereins großherzoglich hessischer Medicinalbeamter zur Beförderung der Staats- arzneikunde, des württemb. ärztl. Vereins, der medic. Gesellschaft zu Leipzig, Dijon, Lyon, Marseille und Zürich.

2 Bände in 8. Broschirt. Preis 3 Thlr., oder 5 Fl. 24 Kr.

Soeben ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## **Wien wie es ist.**

Eine Sammlung von Original-Volks-scenen, Anekdoten, Bonmots, Räthseln &c.

**Von Mikrostoph.**

Ein Seitenstück von: „Berlin wie es ist und trinkt“.

1stes Hft. Mit 1 illum. Kupfer 8 Gr.

2tes Hft. Mit 1 illum. Kupfer 8 Gr.

3tes Hft. Mit 1 illum. Kupfer 6 Gr.

Leipzig. C. Schels & Comp.

Im Laufe des Monats December erscheint in unserm Verlage:

## **Die Krönung in Mailand,** im Jahre 1838.

Von

**August Lewald.**

Prachtwerk in gr. 4.

Mit 5 Stahlstichen und Titeloignette, gezeichnet vom Volk, gestochen von Ed. Schuler, Gray, Hestloef. Elegant gebunden. 6 Thlr. 16 Gr., oder 12 Fl. Rhein.

Carlruhe, den 10ten November 1838.

**Greuzbauer'sche Buch- und Kunsthandlung.**

Bei Bindolff und Strieff in Königsberg i. d. P. ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

**Uebrig der neuesten Geographie aller fünf Welttheile;** in facheitlicher Form. Deutsch und Französisch. Zum Gebrauch für Schulen, besonders aber für Erziehungsanstalten und häuslichen Unterricht. Von Dr. August Jfe. 380 Seiten. Kl. 8. Broschirt. Preis 18 Gr. (22½ Sgr.)

In meinem Verlage ist erschienen und in allen Buchhandlungen vorräthig:

## **Taschenbuch** **dramatischer Originalien.**

Herausgegeben

von

**Dr. Franck.**

**Dritter Jahrgang.**

Mit drei Kupfern.

8. Elegant cartonirt. 2 Thlr. 12 Gr.

Inhalt: I. **Die Rosen.** Ein dramatisches Gemälde in drei Akten; und fünf Acten von **Albini**. — II. **Das Tagebuch.** Lustspiel in zwei Acten von **Bauernfeld**. — III. **Die Opfer des Schweigens.** Trauerspiel in fünf Aufzügen von **Immermann**. — IV. **Der Casacogner in Paris.** Lustspiel in einem Act von **Franck**.

Der erste und zweite Jahrgang enthalten Beiträge von Albini, Bauernfeld, Franck, F. Palm, Immermann, Liebenau, Mattig und Pannasch, mit den Bildnissen von Bauernfeld, Immermann und Grabbe, einem Facsimile und sechshundert Kupfern. Der erste Jahrgang kostet 2 Thlr. 8 Gr., der zweite 3 Thlr.

Leipzig, im December 1838.

**F. A. Brochhaus.**

# Literarischer Anzeiger.

1838. Nr. XXXXVII.

Dieser Literarische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipzig erscheinenden Zeitschriften: Blätter für literarische Unterhaltung, Isis, und Allgemeine medicinische Zeitung, beigelegt oder beigeheftet, und betragen die Insertionsgebühren für die Seite 2 Gr.

## Leipziger Allgemeine Zeitung.

Motto: Wahrheit und Recht, Freiheit und Geseß!

Dieses Blatt, das sich in der kurzen Zeit seines Bestehens bereits einen sehr bedeutenden Leserkreis erworben, wird auch im nächsten Jahre ganz in der bisherigen Weise täglich Abends erscheinen. Redaction und Verlags-handlung finden in der großen Theilnahme, die man ihrem schwierigen Unternehmen geschenkt, die Aufforderung, nichts zu versäumen, was dem Blatt einen erhöhten Werth geben kann, und sie werden vom nächsten Jahre an noch mehr wie bisher den Wünschen des Publicums, die sie sorgfältig beachtet, zu entsprechen wissen.

Der bedeutende Absatz, den das Blatt gefunden, macht es möglich, schon vom nächsten Jahre an den Preis zu ermäßigen; es wird von 1839 an in Sachsen jährlich nur 8 Thlr. (4 Thlr. halb, 2 Thlr. vierteljährlich) und in Preußen nur höchstens 11 Thlr. (5 Thlr. 15 Sgr. halb, 2 Thlr. 22½ Sgr. vierteljährlich) kosten und hiernach im Verhältniß überall der Preis billiger wie bisher gestellt werden.

Für Ankündigungen aller Art, die stets im Hauptblatt ihre Stelle finden, bietet Leipzigs Lage im Mittelpunkte von Deutschland besondere Vortheile, und sie finden durch die Leipziger Allgemeine Zeitung schnell die allgemeinste Verbreitung. Der Raum einer Zeile wird mit 1½ Gr. berechnet.

Bestellungen auf die Leipziger Allgemeine Zeitung werden bei allen Postämtern und Zeitungsverkäufern angenommen und man bittet sie zeitig zu machen, um die Auflage bestimmen zu können.

Leipzig, im December 1838.

F. A. Brockhaus.

Erschienen ist bei J. G. C. Schreiner in Düsseldorf erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

### Dichtungen

von

Hermann Reumann.

- I. Dichterjahr. 8. 19 Bogen. Geh. Preis 1 Thlr. 12 Gr., oder 2 Fl. 42 Kr.
- II. Dichterjahr, 1ste Abtheilung. 8. 16 Bogen. Geh. Preis 1 Thlr. 12 Gr., oder 2 Fl. 42 Kr.
- III. Dichterjahr, 2te Abtheilung. 8. 9 Bogen. Geh. Preis 16 Gr., oder 1 Fl. 12 Kr.

Diese Dichtungen den Freunden der Poesie noch besonders zu empfehlen, dürfte überflüssig erscheinen; sie empfehlen sich selbst.

In der Arnoldischen Buchhandlung in Dresden und Leipzig ist erschienen:

**Dr. C. Schmalz**, über die Taubstummen und ihre Bildung, in ärztlicher, statistischer, pädagogischer und geschichtlicher Hinsicht; nebst einer Anleitung zur zweckmäßigen Erziehung der taubstummen Kinder im älterlichen Hause. Mit vielen Tabellen. Gr. 8. 2 Thlr. 16 Gr.

Der Herr Verfasser hat, als Ergebnis seiner Reisen, seiner vieljährigen Erfahrung bei Behandlung von Gehör- und Sprach-

krankheiten und seiner Stellung als Arzt an der hiesigen Taubstummenanstalt, Alles, was über die Taubstummen wichtig ist, zusammengefaßt. Die Ältern taubstummer Kinder werden durch die ausführliche Anleitung zu der bisher meist vernachlässigten Erziehung derselben belehrt werden und jeder Lehrer wird darin eine Entwicklung der Mittel, sowie eine Anweisung zu dem ersten Unterrichte der Taubstummen finden.

Bei J. C. Schaub in Düsseldorf ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

### Klinisches Taschenbuch

für

praktische Ärzte,

von Dr. C. H. Ebermaier,

Kreiphsikus in Düsseldorf.

1ster Theil. Enthaltend: Einleitung. Fieber. Entzündungen. Exantheme.

634 Seiten. 8. Preis 2 Thlr. 20 Gr.

Der Verfasser hat in der vorliegenden Schrift versucht, die gegenwärtige Richtung der Heilkunde durch das Gebiet der einzelnen Krankheiten, von dem Standpunkte eines praktischen Arztes aus, zu verfolgen und die höchste Achtung vor der Naturheilskraft mit consequenter Benützung der allgemeinen Heilmethoden, der Diät und der äußern Verhältnisse zu verbinden.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

# Das Pfennig-Magazin für Kinder.

1838. November. Nr. 44—47.

Nr. 44. \* Der wilde Franz. Die Indianer und die Bären. \* Die Kaschmir. oder tibetanischen Ziegen. Die Rächer. \* Ein Märchen. Auflösung des Räthsels im vorigen Monat. — Nr. 45. \* Pan. \* Der Kaiser Ferdinand II. Die Rächer. (Fortsetzung.) Die Rächer. (Schluß.) Ein Beispiel von Gegenwart des Geistes. \* Die Zerstörung von Jerusalem. Zuversicht, von E. Ziehl. Räthsel. — Nr. 47. \* Ein schottischer Sackpfeifer. Die Leopardenjagd am Berggipfel der guten Hoffnung. \* Der Trutzhahn oder Puter. Der gute Paul. \* Das Pferd. Räthsel.

Die mit \* bezeichneten Aufsätze enthalten eine oder mehrere Abbildungen.

Preis dieses Jahrgangs von 52 Nummern 1 Thlr. — Der erste bis vierte Jahrgang kosten ebenfalls jeber 1 Thlr.

Leipzig, im December 1838.

F. A. Brockhaus.

## Höchstwichtige Schrift!

Geben hat die Presse verlassen und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

### Der Freiherr von Sandau

oder  
die gemischte Ehe.

Eine Geschichte unserer Tage

von  
**Dr. K. G. Bretschneider,**

Geh. Oberconsistorialrath und Generalsuperintendent zu Gotha, Ritter  
des sächs. Ernestinischen Hausordens.

Gr. 8. Elegant geh. Preis 21 Gr. (26 $\frac{1}{2}$  Sgr.)

### Inhalt.

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| Cap. I. Das Jubelfest der heiligen Urfula.  | Cap. VIII. Das Kernrohr.  |
| — II. Der Vater Eyrar.  | — IX. Der Doppelbesuch.   |
| — III. Der Erzbischof.  | — X. Mainz.               |
| — IV. Die kranke Mutter.  | — XI. Das Gastmahl.       |
| — V. Der glückliche Tag.  | — XII. Die gemischte Ehe. |
| — VI. Die Jofe.   | — XIII. Die Brautwerber.  |
| — VII. Roma loquuta est;<br>res judicata est.<br>(Rom hat gesprochen, dann<br>gilt kein Widerspruch.) | — XIV. Das Braut-Examen.  |

Diese Schrift hat den Zweck, ein unbefangenes Urtheil über die jetzigen Maßregeln des römischen Stuhls gegen die evangelischen Regierungen Deutschlands und gegen die gemischten Ehen zu vermitteln, die dadurch angeregten Erbitterung zwischen Katholiken und Evangelischen zu steuern, beide Theile zu christlicher Verträglichkeit und Einigkeit zu stimmen, dem lieblosen Klerikalismus zu beugen, und endlich diejenigen, welche in gemischter Ehe leben oder eine solche schließen wollen, auf die Schwierigkeiten dieses Verhältnisses und auf die Gefährdungen und Überzeugungen hinzuweisen, bei denen allein in solchen Ehen auf Frieden und häusliches Glück gerechnet werden kann. Sie

ist nicht geschrieben für Gelehrte und Staatsmänner, für welche diese Gegenstände schon vielfach in gelehrten Schriften besprochen worden sind, sondern für das große Publicum, für alle Gebildete der katholischen und evangelischen Kirche, zu deren Verständigung und Beruhigung in diesen Angelegenheiten noch wenig oder nichts geschrieben worden ist.

Halle, im December 1838.

C. A. Schwetschke und Sohn.

Bei J. B. Wallishauser in Wien ist erschienen und durch jede solide Buchhandlung zu beziehen:

### Handbuch der Geburtshülfe.

Nach den besten Quellen und eigenen Erfahrungen zum Gebrauche für angehende Geburtshelfer. 2 Bände. Gr. 8. 4 Thlr. 18 Gr.

### Lehrbuch der Geburtshülfe.

Als Leitfaden bei seinen akademischen Vorlesungen und bei dem Studium des Faches für angehende Geburtshelfer. Mit 1 Kupfertafel. 3te verbesserte Auflage. Zweiter Theil, mit dem besondern Titel: Gesammelte Aufsätze über einige der wichtigsten und am häufigsten vorkommenden geburtshilflichen Operationen, nebst Bemerkungen und Erfahrungen über einige Gegenstände der praktischen Geburtshülfe. 2te Auflage. Mit 1 Kupfertafel. Beide Theile 4 Thlr.

Der 2te Theil apart 1 Thlr. 12 Gr.

### Kunst die italienische Sprache

in einigen Monaten zum nothwendigen Bedarf Sprechen, Lesen und Verstehen zu lernen; oder erster Unterricht in der italienischen Sprache für Jung und Alt, um in einigen Monaten, ohne Hülfe eines Lehrers, das Sprechen, Lesen, Verstehen und Schreiben auf eine sehr leichte Art sich eigen zu machen; enthält das ABC, Lese-regeln, Leseübungen, Einleitung zu den Redetheilen, Aufgaben, Sammlung der nöthigsten Wörter zum Sprechen, leichte Gespräche, italienische Anekdoten, Novellen und Erzählungen mit dem deutschen Texte zur Seite, von J. B. Hoffsteller, Professor an der k. k. Ileresien-Mitterakademie. Gr. 8. Geh. 12 Gr.

### L'Anecdotier moderne.

Der neueste französische Anekdoten-Schatz, oder 100 biographische Skizzen, Erzählungen, Anekdoten, witzige Einfälle, Schwänke, Gaumonts, Räthsel u. aus der neuesten Zeit geschöpft, zur Veredlung des Verstandes und des Herzens, für solche Leser, die sich im Französischen auf eine angenehme und nützliche Art üben wollen, von Hoffsteller, Professor u. 1te Lieferung. Gr. 16. Geh. 6 Gr.

### Visa reperta

und  
gerichtlich-medizinische Gutachten. Verfaßt und als erläuternder Anhang zu seinem systematischen Handbuche der gerichtlichen Arzneikunde herausgegeben von J. Vernt, Professor u. 2ter Band. Gr. 8. 2 Thlr. 6 Gr.

### Kempis sämtliche Werke.

Übersetzt von J. P. Silbert.

Neue wohlfeilere Ausgabe. Gr. 8. Lieferung 1—13. Jede 5 Gr.

Diese 13 Lieferungen bilden den 1sten und 2ten Band. Die 14te Lieferung ist bereits unter der Presse.

## Der fromme katholische Christ.

Gebet- und Andachtsbuch für katholische Christen, von L. Schlicht, Diaristen-Ordenspriester und Professor in Gr. 12. Ordinaire Ausgabe mit 1 John'schen Kupfer 9 Gr. Auf Velinbrudpapier mit 1 Kupfer 12 Gr.

Auf Velinpapier mit 3 John'schen Kupfern 18 Gr.

## K. k. österreichischer Zolltarif.

Unter dem Titel:

Auseinanderlegung der k. k. Ein-, Aus- und Durchfuhrzölle, in durchaus alphabetischer Ordnung. Zur Bequemlichkeit des Handels durch L. F. Steinheil. 1835.

Mit Anhang. Gr. 8. Gebunden. 1 Thlr. 9 Gr.

Die bedeutende Ausdehnung der österreichischen Grenze und die großen Handelsinteressen machen es dem kaufmännischen Publicum sehr wünschenswerth ein Werk zu besitzen, welches augenblicklich über jeden Waarenartikel Aufschluß gibt. Den bei derseitigen Grenzgebühren wird dieser Tarif willkommen sein; mit dem Anhang ist derselbe bis jetzt vollständig.

## Reise im Innern von Brasilien.

Auf allerhöchsten Befehl Sr. Majestät des Kaisers von Frankreich Franz I. in den Jahren 1817—21 unternommen und herausgegeben von J. L. Pohl. 2ter Band. Mit 3 großen Ansichten gestochen von J. Arnmann und J. Passini. Gr. 4. Cartonnet 28 Thlr. Feine Ausgabe auf baseler Velinpapier 36 Thlr.

Hiermit ist dieses werthvolle Werk geschlossen. Der ganze Schatz von Erfahrungen der planmäßig angelegten und ausgeführten Reise ist darin niedergelegt. Die Auflage ist sehr beschränkt gemacht, jedoch Bibliotheken, Liebhaber und die Besitzer des 1ten Bandes wohl thun werden, ihre Bestellungen zeitig zu machen.

## Für Staatsbeamte und Veseirkel.

Eben ist bei Hinrichs in Leipzig erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Neue Jahrbücher der Geschichte und Politik.

Begründet von Pölig. In Verbindung mit mehreren (65) gelehrten Männern herausgegeben von Prof. Fr. Bülow. 1839. Januar. Gr. 8. Der Jahrgang 6 Thlr.

„Ein Wortort“ von Fr. Bülow eröffnet sehr lesenswerth den 12. Jahrgang dieser gehaltvollen Zeitschrift, dem interessante Aufsätze: über Gemarkungsrecht vom Geh. Rath Rettig; Erinnerungen an G. B. Niebuhr von G. Münch; die Repräsentativverfassungen nach Ansichten des Fürsten Solms-Lich vom Präsid. v. Weber; Recension über die Vertheidigung des Staatsgrundgesetzes herausgegeben von Dahlmann; Preussers Jugendbildung; Jügens Zeitschrift, folgen.

Die Fortsetzung erscheint so regelmäßig wie bisher.

Bei J. H. C. Schreiner in Düsseldorf ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## Gedichte

von

## Heinrich Bone.

8. 17 Bogen. Geh. In Umschlag. Preis 1 Thlr., oder 1 Fl. 48 Kr.

Die Strenge in der Auswahl und der daraus hervorgegangene, jetzt so seltene Vorzug, daß das Werk in religiöser und moralischer Hinsicht, trotz der großen Mannichfaltigkeit der einzelnen Gedichte, jedem Alter und jedem Geschlechte unbedingt in die

Hand gegeben werden darf, läßt uns erwarten, daß es bald allgemein die Anerkennung und Verbreitung finden wird, welche ihm in der nächsten Umgebung zu Theil geworden ist. Besonders glauben wir auch noch auf den rein-lyrischen Charakter der Lieder aufmerksam machen zu dürfen, wodurch sie sich zur Composition in vorzüglichem Grade eignen.

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:

## B. Funk,

## Drei Novellen nach dem Leben.

- I. Liebe und Aristokratismus.
- II. Hoffmann und die Epigonen in Bamberg 1808 und 1837.
- III. Corsicanische Blutrache.

Velinpapier. 1 Thlr. 12 Gr.

Es eignet sich dieses Buch für jede Leihbibliothek und für jedes Gebildeten Privatbibliothek. Die beiden letztern Novellen sind aus dem Leben des Helden der

## Fahrten eines Musikers

von Ludw. Bechstein.

3 Bände. 1837.

auf welches Werk ich nochmals aufmerksam mache, daß in keiner Leihbibliothek und in keinem Leserkreis fehlen sollte; denn wo es einmal bekannt ist, wird es so viel gelesen, daß Ein Exemplar nicht ausreicht.

Schleusingen, den 1sten December 1838.

Konr. Glafer.

Seeben ist erschienen:

## Handbuch

der

## speciellen Therapie

von

## Friedrich Masse,

Geh. Medicinrath und Director der medicinischen Klinik in Bonn.

2ter Band. 2te Abtheilung.

Mit dieser Abtheilung ist der 2te Band dieses Handbuchs geschlossen, und sind jetzt beide Bände ganz vollständig durch alle Buchhandlungen für den Ladenpreis von 4 Thlr. zu beziehen. Leipzig, im December 1838.

Karl Enobloch.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

Jf's. Encyclopädische Zeitschrift, vorzüglich für Naturgeschichte, Anatomie und Physiologie. Von Flen. Jahrgang 1838. Sechstes Heft. Gr. 4. Preis des Jahrgangs von 12 Heften mit Kupfern 8 Thlr.

Allgemeine medicinische Zeitung. Herausgegeben von Dr. Karl Pabst. Jahrgang 1838. Monat Mai, oder Nr. 35—43. Gr. 4. Preis des Jahrgangs 6 Thlr. 16 Gr.

Repertorium der gesammten deutschen Literatur. Herausgegeben von E. G. Gersdorf. 1838. Achtzehnten Bandes drittes Heft. (Nr. XXI.) Gr. 8. Preis eines Bandes 3 Thlr.

Leipzig, im December 1838.

F. A. Brockhaus.

In allen Buchhandlungen ist zu erhalten:

## URANIA.

Taschenbuch auf das Jahr 1839.

Neue Folge. Erster Jahrgang.

Mit dem Bildnisse Camartine's.

8. Auf seinem Belinapap. Eleg. cartonnirt. 1 Zht. 12 Gr.

Inhalt: I. Des Lebens Ueberfluß. Novelle von Ludwig Tieck. — II. Goethe's Briefe an die Gräfin Auguste zu Stolberg. — III. Die Entführung. Novelle von Joseph Freiherrn von Eichendorff. — IV. Der Gefrenzte. Novelle von Leopold Schefer. — V. Jüdisch-Frische. Doyll-Novelle von Franz Berthold.

Mit dem Jahrgang 1839 der Urania beginnt eine neue Folge und ich erfülle daher gewiß den Wunsch vieler Freunde dieses Taschenbuchs, wenn ich die noch vorrätigen neun Jahrgänge 1830—38, die im Ladenpreise 18 Zht. 6 Gr. kosten, **zusammengennommen für 4 Zht. 12 Gr.,** einzelne Jahrgänge aber für 16 Gr. ablasse.

Diese Jahrgänge enthalten Beiträge von W. Alexis, G. Döring, J. von Eichendorff, F. von Eydens, W. Hugo, W. Martell, E. Müllers, A. Ohlenschläger, Pösgaru, P. J. von Richsues, E. Rellstab, G. F. von Rumohr, A. von Sartorius, L. Schefer, Johanna Schopenhauer, G. Schwab, G. Scävola, A. von Sternberg, F. Voigts, besonders aber acht Jahrgänge Novellen von Ludwig Tieck, die zu den ausgezeichnetsten Leistungen dieses Dichters gehören dürften.

An Kupfern enthalten diese Jahrgänge außer schönen Bildnissen von Uhlant, Cornelius, Ohlenschläger, Dannecker, Zelter, Zeaner, Auber, A. von Humboldt, Sebald und sechs Darstellungen zu Bürger's Gedichten, 45 Stahlstiche nach ausgezeichneten Gemälden deutscher, französischer und englischer Künstler.

Leipzig, im December 1838.

**J. A. Brockhaus.**

### Beendigung eines Werks für Alterthumsforscher.

Der 3te (letzte) Band von

**K. A. Böttiger, Kleine Schriften archäologischen und antiquarischen Inhalts, gesammelt und herausgegeben von J. E. Cillig.**

Mit 5 Kupfertafeln.

ist nun erschienen und für 2 Zht. 20 Gr. in allen namhaften Buchhandlungen zu bekommen.

Der 1ste Band kostet 3 Zht. 4 Gr., der 2te Band 2 Zht. 16 Gr., mithin alle 3 Bände 8 Zht. 16 Gr.

**Arnold'sche Buchhandlung**  
in Dresden und Leipzig.

### Nützliche Weihnachtsgeschenke für Damen.

In Ernst Klein's literarischem Comptoir in Leipzig erschienen:

**Die Unpäßlichkeiten der Damen, ihre bequemste und leichteste Heilung, von Dr. C. Fenz.** 8 Bogen. Gr. 12. Gebunden. 16 Gr.

In gefälliger Sprache tröstet und berathet der Verfasser hiezu das zarte Geschlecht über die Leiden des Körpers und erheitert ihr Gemüth dabei; nöthigt sie auch keineswegs zur Entfagung aller Freuden oder zu bitterbösen Arzneien, indem er die Hüfe in einfachen, ja angenehmen Mitteln (oft sogar vom Conbitor) nachweist. Durch geschmackvolle Ausstattung empfiehlt sich dieses und folgendes Büchlein auch als nützliches Geschenk.

## Die Kunst der Frauen

sich die Liebe und Treue ihrer Gatten zu sichern. Festgabe für bräutliche Jungfrauen und junge Frauen. Von Dr. A. Heinrich. 6 1/2 Bogen. Cartonnirt. 15 Gr.

In herzlicher und eindringender Sprache ist hier das Leben und Gemüth der Männer und der Frauen geschildert, diesen die besten Rathschläge für ihr Wohl gegeben.

### Unterricht

für junge Frauen, um frohe Mütter gesunder Kinder zu werden und selbst dabei gesund und schön zu bleiben. Mit einem Anhange, enthaltend Gebete für Schwangere und Gebärende. Zweite Auflage. 8 Bogen. Gr. 8. (In Commission.) 9 Gr.

Was ist wol wichtiger für die Menschheit, als der Gegenstand dieses Buchs? Belehrend und allgemein verständlich ist zweckmäßig Alles abgehandelt, was auf Gemüth und Körper in diesem Zustand Einfluß hat.

Gesehen wurde ausgegeben und ist durch alle Buchhandlungen von uns **gratis** zu erhalten:

## Verzeichniss

der vorzüglichsten in

## Frankreich und England

für 1839

erscheinenden Journale u. s. w.,

welche durch

## Brockhaus & Avenarius,

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur,

in

Leipzig und Paris,

zu beziehen sind.

Die in diesem Verzeichniß notirten Preise der Journale bei Beziehung durch unsere leipziger Handlung — welche dieselben wöchentlich mit Post erhält und franco Leipzig liefert — sind möglichst billig berechnet; Bestellungen auf vollständige Jahrgänge, sowie bei den meisten Journalen, welche täglich und wöchentlich erscheinen, auch auf ein Halb- oder Vierteljahr, letztere jedoch zu verhältnismäßig etwas höhern Preisen, werden in jeder solchen Buchhandlung angenommen.

Directe Aufträge auf französische Journale bei unserer pariser Handlung (Rue de Richelieu, No. 60) effectuiren wir zu pariser Originalpreisen, welche natürlich weit billiger sind; doch werden sie nur angenommen, wenn der ungefähre Abonnementsbetrag in einer Anweisung der Bestellung beigefügt ist, und alle Portoposten fallen dann dem Empfänger zur Last.

Leipzig, den 15ten December 1838.

**Brockhaus & Avenarius,**

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur.  
(A Paris: même maison, Rue de Richelieu, No. 60.)

### Für Freunde

## der englischen Literatur

liegt der heutigen Nummer der „Blätter für literarische Unterhaltung“ die Liste der für das Jahr 1839 erscheinenden englischen Journale bei, welche, sowie alle Producte der englischen Presse, durch Unterzeichneten und, mit Berechnung einer billigen Provision, durch alle Buchhandlungen Deutschlands um die beigesetzten Preise zu beziehen sind.

Leipzig, den 14ten December 1838.

**J. A. G. Weigel,**  
Buchhändler.

## botanische Verlags-Werke

von

J. L. Schrag in Nürnberg.

Anthou, C. F.,

Tabelle über die in Deutschland vorkommenden natürlichen  
Pflanzenfamilien.

6 Bogen in Folio. Schreibpap. 12 gr. oder 45 fr.

Diese 6 Bogen, welche zu 1 Tabelle vereinigt werden, enthalten in der ersten Rubrik die Namen von 67 Pflanzenfamilien, mit der beigefügten Benennung nach Jussieu und Batsch. In den übrigen Columnen findet man auf jeder Linie die Hauptabtheilung des natürlichen Systems und die Linneische Klasse, welcher die Familie angehört, dann den Habitus und den Familiencharakter der einzelnen Pflanzentheile; ferner folgen Beispiele von Gattungen bei jeder Familie, die Unterabtheilungen der Familie und endlich die Anzahl der in dieselbe gehörigen Gattungen. Diese Tabelle gewährt demnach eine bequeme Übersicht, um sich mit den Unterzeichnungsmerkmalen der Pflanzenfamilien recht vertraut zu machen.

Brown's, N.,

## vermischte botanische Schriften;

in Verbindung mit einigen Freunden ins Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Dr. C. G. Nees v. Esenbeck.

Erster und zweiter Band, mit 1 Steintaf. gr. 8. (I. 46 B., II. 51 1/2 B.) 1825 u. 1826. 3 Thlr. 12 gr. oder 6 fl. 18 fr.

Dritten Bandes, erste Abtheilung: *Prodromus Florae novae Hollandiae*. Vol. I. (20 1/2 B.) 1827. 2 Thlr. 12 gr. oder 4 fl. 30 fr.

Die zweite Abtheilung (Vol. II.) ist noch nicht erschienen. Vierten Band, mit 5 Steintaf. (35 B.) 1830. 3 Thlr. 8 gr. oder 6 fl.

Fünfter Band, mit 4 Zink- und Kupfertaf. 1834. (30 1/2 B.) 3 Thlr. oder 5 fl. 24 fr.

Der Recensent in der Halle'schen allgem. Literat. Zeitung 1835. Ergänz. Blätter Nr. 59 sagt hierüber:

„Wir sprechen aus innigster Überzeugung, wenn wir behaupten, daß diese gesammelten Brown'schen Schriften für jeden gründlichen botanischen Forscher rein unentbehrlich seyen, und daß es nicht hinreiche, sie einmal durchgesehen oder gelegentlich nachgeschlagen zu haben, sondern sie wollen studirt und täglich, ja stündlich benutzt seyn, wenn sie den Nutzen leisten sollen, den sie zu leisten im Stande sind. Möchten namentlich unsere jüngern Studiengenossen an dem glänzenden Beispiele des H. Brown's lernen, wie überhaupt die Pflanzenwelt erforscht und studirt werden müsse, um brauchbare und erfreuliche Ergebnisse ihrer Studien zu liefern! Wir kennen wenigstens kein besseres Vorbild.“

Die V Bände, wie sie vorkehend beschrieben, werden zusammen für 8 Thlr. oder 14 fl. 24 fr. erlassen.

## Florae Germaniae Compendium.

Sectio I. Plantae phanerogamicae seu vasculosae. Editio altera, aucta et amplificata, curantibus Bluff, Nees ab Esenbeck et Schauer. II Tomi. 12. 1838.

Sectio II. Plantae cryptogamicae s. cellululosae scrips. F. W. Wallroth. II Tomi. 12. (70 B.) 1831—1833.

Die Flora Deutschlands von Bluff und Fingerhuth fand schon bei ihrem ersten Erscheinen vielen Beifall, und derselbe vergrößerte sich noch, als sie durch den kryptogamischen Theil des Hrn. Wallroth zu einem vollendeten Ganzen gedieh, und als die vollständigste neuere Flora bestand. Der phanerogamische Theil fehlte längere Zeit und wird sich im laufenden Jahre in einer neuen gänzlich umgearbeiteten Ausgabe wieder anschließen. Die beiden Theile sind bis auf das Register fertig. Was insbesondere den kryptogamischen Theil dieser Flora betrifft, so ist der Umstand,

daß Herr Walther dafür gewonnen wurde, nur ein glücklicher zu nennen, da dieser gelehrte Botaniker aus dem Studium dieser Pflanzenabtheilung sich ein besonderes Geschäft gemacht und die Wissenschaft in dieser Beziehung schon mit manchen wichtigen Entdeckungen bereichert hat. Durch diese Walther'sche Flora der Kryptogamen Deutschlands wird nicht nur dem allgemein gefühlten Bedürfnisse einer solchen abgeholfen, sondern sicherlich auch das Studium dieser Pflanzengruppe in größere Aufnahme gebracht werden.

Bis Michaelis 1838 gelten noch nachstehende ermäßigte Preise:

Die vollständige Flora in 4 Theilen, (140 Duodezibogen) für 6 Thlr. oder 10 fl. 48 kr. Die phanerogamische, so wie die kryptogamische Flora, einzeln 4 Thlr. oder 7 fl. 12 kr.

---

Lindley, J.,

### Nixus Plantarum.

Die Stämme des Gewächsreiches, verdeutscht durch C. F. Beilschmied, nebst einem Vorwort von Dr. C. G. Nees von Esenbeck. In Umschlag. gr. 8. 1834. 12 gr. oder 45 kr.

Der Recensent in der Halle'schen allgem. Lit. Zeit. (1834. No. 159) sagt darüber:

„Wir freuen uns, versichern zu können, daß viel Beifallswürdiges, Sinnreiches und Originelles in diesen wenigen Blättern niedergelegt wurde, zu deren Studium wir dringend mahnen und zwar besonders deshalb, damit solcher Versuch durch die harmonische Bemühung mehrerer Forscher seiner Vollkommenheit immer näher gebracht werde.“

---

Martius, Dr. C. Fr. Ph. v.,

### Conspectus regni vegetabilis.

Uebersicht der Classen, Ordnungen und Familien des Gewächsreiches nach morphologischen Grundsätzen, unter besonderer Rücksicht auf den Fruchtbau, mit Angabe von Beispielen und von den in der Medicin, Technik und Oekonomie besonders wichtigen Pflanzen, zunächst als Leitfaden bei seinen akademischen

Vorlesungen entworfen. gr. 8. 1835. 12 gr. oder 45 kr.

Der Herr Verfasser macht in diesen wenigen Bogen ein neues Pflanzensystem bekannt, welches, nach morphologischen Prinzipien die allmächtige Entwicklung vom Niederen zum Höheren verfolgend, die Summe aller bis jetzt bekannten Pflanzen-Ordnungen oder sogenannten Familien classificirt. Es ist hierbei vorzugsweise die noch nicht genug beachtete Zusammensetzung der Frucht aus mehreren Fruchtblättern hervorgehoben, und die Abtheilungen sind in aphoristischer Kürze charakterisirt worden. Die Anführung aller in der Medicin und Technik vorzugsweise nuzbaren Gewächse eignet diese kleine Schrift besonders für Solche, welche sich genauer mit dem Studium dieser Gewächse nach der natürlichen Methode beschäftigen wollen.

---

Nees ab Esenbeck, C. G.,

### Genera et Species Asterearum.

Recensuit, Descriptionibus et Animadversionibus illustravit. Synonyma emendavit. gr. 8. (21 B.) 1833. 1 Thlr. 18 gr. od. 3 fl.

Die benannte Pflanzengattung erscheint hier in streng wissenschaftlichem Gewande. Die charakteristischen Merkmale, ausführlichen Beschreibungen, Synonymen u. s. w. sind mit solcher Sorgfalt ausgeführt, daß man nicht allein die Pflanzenarten genau danach bestimmen kann, sondern daß es schwer fallen möchte, etwas Wichtiges noch hinzuzusetzen, indem dem Hrn. Verf. keine wichtige Erscheinung in der hieher gehörigen Literatur entgangen ist. Interessant ist die angehängte geographische Vertheilung der Asten.

---

Richard's, M.,

### neuer Grundriß der Botanik und der Pflanzenphysiologie,

nach der vierten, mit den Characteren der natürlichen Familien des Gewächsreiches vermehrten und verbesserten Originalausgabe überfist und mit Zusätzen, Anmerkungen, einem Sach- und Wort-Register versehen von M. B. Kittel. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 8 Kupfertaf. 8. (52 1/2 B.) 1831. 2 Thlr. 12 gr. oder 3 fl. 45 fr.



Die Zweckmäßigkeit dieses für den ersten Unterricht in der Botanik bestimmten Werkes hat sich am schönsten durch die Anerkennung bewährt, die ihm von Seiten des botanischen Publicums zu Theil geworden ist; denn schon nach anberthalb Jahren seines ersten Erscheinens war eine neue Auflage nöthig geworden. Der Bearbeiter derselben hat diese Auflage nicht nur mit den Resultaten der neuesten, gediegenen Arbeiten der Botanik vermehrt, sondern auch zahlreiche Verbesserungen angebracht. Der vielen Zusätze und Berichtigungen nicht zu gedenken, welche der Theil der allgemeinen Botanik erfährt, bezeichnen wir nur die Anführung aller wichtigen Gattungen der Pflanzen in der Charakteristik der Familien, wodurch der Anfänger in den Stand gesetzt wird, die ihm in seiner einheimischen Flora oder in Gärten und Herbarien bekannt werdenden Pflanzen nach ihren Familiencharakteren zu untersuchen, und sich so mit dem jetzt allgemein anerkannten natürlichen Systeme vertraut zu machen. Ueberdies erhält er dadurch zugleich einen Schlüssel, wonach er sein anzulegendes Herbarium naturgemäß ordnen kann. — Ein Werk, das in Frankreich und Deutschland von seinem ersten Erscheinen an so vielen Beifall von Gelehrten und Dilettanten erhielt, bedarf nicht des Lobes; die Freunde der Wissenschaft und der schönen Natur haben ihm das schönste Lob ertheilt, indem sie sich desselben bei ihren Lehrvorträgen und Studien bedienen.

Kittel, Dr. M. B.

**Taschenbuch der Flora Deutschlands**  
zum bequemen Gebrauche auf botanischen  
Excursionen. 54 Druckbogen in 12. Preis  
1 Thlr. 16 gr. oder 2 fl. 48 kr.

In diesem Taschenbuche der deutschen Flora erhalten die Freunde der Botanik einen Führer auf ihren botanischen Excursionen, wie ihn kein anderes ähnliches Werk darbietet. Alle bisher erschienenen Floren Deutschlands sind so voluminös, daß sie dem Botanisirenden auf seinen Wanderungen mehr zur Beschwerde fallen, als den Zweck fördern. Diese neue Flora aber ist leicht zu haben und leicht unterzubringen.

Außerdem verbindet dieses Taschenbuch die Vorzüge des Linneischen und des natürlichen Systems und weiset den Anfänger auf gleich leichte und angenehme Weise in beiderlei Methoden zur Bestimmung der aufgefundenen Pflanzen ein. Dabei ist es so abgefaßt, daß es die glückliche Mitte zwischen der trockenen Aufzählung kurzer Definitionen und weitwendigen Beschreibungen hält. Sein Preis ist so mäßig gestellt, daß es auch dem Wenigbemittelten vergönnt ist, des so reinen und befriedigenden Vergnügens theilhaftig zu werden, welches mit dem Botanisiren so wesentlich verbunden ist. Diese Eigenschaften mit einander vereinigt, müssen das Werkchen nicht bloß für den Anfänger, sondern auch für den schon gebildeten Botaniker zu einer willkommenen Erscheinung machen.

Ältere botanische Werke in demselben Verlag.

Eschweiler, F. G.,

**Systema Lichenum,**

genera exhibens rite distincta, pluribus-novis adaucta.

Cum tabula lapidi incisa. gr. 4. (3  $\frac{1}{4}$  B.) 1824.

16 gr. oder 1 fl.

Haworth, A. H.,

**synopsis Plantarum succulentarum**

cum Descriptionibus synonymis Locis, Observationi-

bus culturae. Usui Hortorum Germaniae accom-

modata. gr. 8. (24 B.) 1819. 2 Thlr. 12 gr. oder

3 fl. 45 kr.

Fingerhuth, C. A.,

**Tentamen florulae Lichenum Eifflicae**

sive Enumeratio Lichenum in Eiffilia provenientium

gr. 8. (6  $\frac{1}{2}$  B.) 1829. 12 gr. oder 54 kr.

Hoffmann, G. F.,

**Vegetabilia in Hercyniae Subterraneis**

collecta iconibus descriptionibus et observationibus illu-

strata. 20 Bogen Text und XVIII fein kolor. Kupfer-

tafeln. Med. Folio. 1811. 12 Thlr. od. 21 fl. 36 kr.

Der frühere Ladenpreis war 18 Thlr. od. 32 fl. 24 kr.

**Martius, C. F. P. v.,**  
**Flora Cryptogamica Erlangensis,**

sistens Vegetabilia e Classe ultima Linn. in agro Erlangensis hucusque detecta. Accedunt Tab. II. aeneae, muscos nonnullos, et IV. lapidi incis. Jungermannias germanicas foliosas illustrantes. gr. 8. (37 B.) 1817. 2 Thlr. 16 gr. oder 4 fl. 30 kr.

**Martyn's, J.,**

**Abbildung und Beschreibung seltener Gewächse,**

systematisch bestimmt und mit Anmerkungen begleitet von Dr. G. W. Fr. Panzer. Lateinisch und Deutscher

Text, mit 50 fein kolorirten Kupfertafeln. Med. Folio. 1797. 2 Thlr. 12 gr. oder 4 fl. 30 kr.

**Nees von Esenbeck, C. G.,**

**Handbuch der Botanik**

Für Vorlesungen und zum Selbststudium. Zwei Bände. gr. 8. (96 B.) 1820—1821. 5 Thlr. 21 gr. oder 10 fl.

**Im neuen, naturwissenschaftlichen Verlag ist sonst noch erschienen:**

Bachmann, W. L., Handwörterbuch der praktischen Apothekerkunst. In zwei Bänden. Perifonoktav. 1837 u. 1838.

Erster Band A bis L. Ladenpreis 5 Thlr. oder 9 fl. Vom zweiten Band sind bereits 3 Lieferungen fertig, für die noch der Subscript.-Preis à 20 gr. oder 1 fl. 30 fr. besteht, und mit der 5ten Lief. wird auch dieser Band, und somit das ganze Werk geschlossen seyn.

Bergelius, J. J., die Anwendung des Köthrohrs in der Chemie und Mineralogie. Dritte Auflage, mit 4 Kupfertafeln. gr. 8. 1837. 2 Thlr. 12 gr. oder 4 fl. 30 fr.

Buchner, Rudw. Andr., Betrachtungen über die isomerischen Körper, so wie über die Ursachen der Isomerie. gr. 4. 1836. 12 gr. oder 48 fr.

Glocker, C. Fr., mineralogische Jahreshefte. 5tes Heft, oder systematischer Bericht über die Fortschritte der Mineralogie im Jahre 1835, mit Berücksichtigung der Geologie und Petrefactenfunde. gr. 8. 1837. 2 Thlr. oder 3 fl. 36 fr.

— dessen neuer Grundriß der Mineralogie mit Einschluß der Geognosie und Petrefactenfunde. Mit Kupfern. 8. 1838. Befindet sich unter der Presse.

Goldfuß, G. H., Grundriß der Zoologie. 2te vermehrte und verb. Aufl. 8. 1834. 3 Thlr. oder 4 fl. 30 fr.

Hänte, C. F., Entwurf zu einer der Zeit angemessenen Apotheker-Ordnung. Mit einem Anhang von Dr. Buchner. Abdruck aus dem Repert. f. Pharm. 12. 1837. 12 gr. oder 54 fr.

Kobell, Fr. v., Grundzüge der Mineralogie. Zum Gebrauche bei Vorlesungen, so wie zum Selbststudium entworfen. Mit 4 lithographirt. Tafeln. gr. 8. 1838. 2 Thlr. 12 gr. oder 4 fl. 30 fr.

Kurrer, W. v., das Neueste oder die neuesten Erfahrungen in der Bleichkunst, als Supplement, zu des Verfassers Kunst vegetabilische, vegetabilisch-animalische und rein animalische Stoffe zu bleichen. Mit 2 lithograph. Tafeln. gr. 8. 1838. 1 Thlr. oder 1 fl. 48 fr.

Meyer, H. v., Tabelle über die Geologie, zur Vereinfachung derselben und zur naturgemäßen Classification der Gesteine. 8. 1833. 18 gr. oder 1 fl. 12 fr.

Repertorium für die Pharmacie, herausgegeben von Dr. J. M. Buchner. Fünfzig Bände. 1815 bis 1834. Complet zur Erleichterung des Ankaufs anstatt 75 Thlr. oder 135 fl. nur 36 Thlr. oder 64 fl. 48 fr. Einzelne Bände, so weit sie noch vorrätig sind, 20 gr. oder 1 fl. 30 fr. Einzelne Hefte 12 gr. oder 54 fr.

— dessen neue Reihe von 1835 anfangend. Erster bis dreizehnter Band, jeder Band zu 1 Thlr. 12 gr. oder 2 fl. 45 fr.

**K u p f e r s t i c h e.**

Buchholz, (des Chemikers) Bildniß. 8 gr. oder 36 fr.  
 Buchner, Dr., Bildniß, lithograph. 16 gr. ob. 1 fl. 12 fr.

Frauenhofers Bildniß. 8 gr. oder 36 fr.  
 Gehler's Bildniß. 8 gr. oder 36 fr.









Isis von oken.

Isis von oken. V.3

18860 LFF H WER  
ASSOC GEN  
ENTOMOLOG

12870 LFF H WER  
ASSOC GEN  
ENTOMOLOG

10910 LFF H WER  
ASSOC GEN  
ENTOMOLOG



AMNH LIBRARY



100016632